ISSN 2312-9581 (Online)

ISSN 2075-1508 (Print)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

1 / 2016

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські науки), переатестація від 06.11.2014 (наказ Міністерства освіти і науки України №1279)

Засновник та видавник — Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20934-10734 ПР від 18.08.2014

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ГРИЦІНЯК ІГОР ІВАНОВИЧ, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, директор Інституту рибного господарства НААН

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ТРЕТЯК Олександр Михайлович, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН

КОЛЕСНИК Наталія Леонідівна, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності, Інститут рибного господарства НААН

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, зав. кафедрою водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА

Литвиненко Олександр Іванович, доктор біол. наук, іноземний член Національної академії аграрних наук України, генеральний директор, Федеральне державне унітарне підприємство «Госрыбцентр», Росія

Потрохов Олександр Спиридонович, доктор біол. наук, с.н.с., керівник лабораторії біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, УКРАЇНА

Бучацький Леонід Петрович, доктор біол. наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), провідний науковий співробітник лабораторії біотехнологій у рибництві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Бузевич Ігор Юрійович, доктор біол. наук, с.н.с., завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Соломатіна Валентина Дмитрівна, доктор біол. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник відділу кормів та годівлі риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Крупінський Єджей, доктор наук, професор, іноземний член Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут зоотехнії Польщі, ПОЛЬЩА

Єфименко Михайло Якович, доктор с.-г. наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник, Інститут розведення і генетики тварин НААН, УКРАЇНА

Тарасюк Сергій Іванович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, зав. відділу молекулярно-генетичних досліджень, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Кольман Ришард, доктор наук, професор, зав. відділу іхтіології, Інститут прісноводного рибного господарства ім. Станіслава Саковича, ПОЛЬЩА

Бех Віталій Валерійович, доктор с.-г. наук, с.н.с., зав. відділу селекції риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Шерман Ісаак Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедри рибництва, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

Костенко Олександр Іванович, канд. с.-г. наук, с.н.с., нач. відділу ветеринарної медицини та зоотехнії, Національна академія аграрних наук України, УКРАЇНА

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

є штатними працівниками Інституту рибного господарства НААН України: **Тушницька Наталія Йосифівна**, канд. ветерин. наук, с.н.с., вчений секретар ІРГ НААН; **Дерень Ольга Володимирівна**, кандидат с.-г. наук, с.н.с., зав. відділу кормів і годівлі риб ІРГ НААН; **Тучапський Ярослав Васильович**, канд. с.-г. наук, зав. лабораторії розведення коропа ІРГ НААН; **Залоїло Ольга Василівна**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ІРГ НААН; **Забитівський Юрій Михайлович**, канд. біол. наук, заст. директора Львівської дослідної станції ІРГ НААН; **Мельник Анатолій Пилипович**, канд. хім. наук, с.н.с., зав. лабораторії екологічних досліджень ІРГ НААН; **Мрук Антоніна Іванівна**, зав. лабораторії лососівництва та відтворення зникаючих видів риб ІРГ НААН; **Григоренко Тетяна Володимирівна**, кандидат с.-г. наук, завідувач лабораторії гідробіології та технологій культивування цінних безхребетних ІРГ НААН; **Рудь Юрій Петрович**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії біотехнологій в рибництві ІРГ НААН; **Матвієнко Наталія Миколаївна**, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу іхтіопатології ІРГ НААН; **Діденко Олександр Володимирович**, канд. біол. наук, с.н.с., старший науковий співробітник відділу вивчення біоресурсів водосховищ; **Чернік Віктор Васильович**, зав. лабораторії менеджменту в рибництві ІРГ НААН

Редакція журналу «Рибогосподарська наука України», вул. Обухівська, 135, м. Київ-164, 03164

тел.: +38 (044) 223-84-34, тел./факс: +38 (044) 423-74-62

<http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Підписано до друку 14.03.2016 р. Формат 70х108/16. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 7,1. Наклад 500 прим.

Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту рибного господарства НААН (Протокол від 15.03.2016 р. № 2)

Дизайн макету: Колесник Н. Л., Шинкар С. В., Безусий О. Л. **Верстка:** Симон М. Ю., Архангельський Є. Ю. **Літературне редагування:** Олексієнко О. О., Швець Т. М. **Коректори:** Люткевич І. С. **Комп'ютерний набір:** Ковальчук Г. В.

Друкарня «Спектр Друк», вул. М. Раскової, 23 А, Київ-002, 02002, тел.: +38 (044) 331-14-38

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

1/2016(35)

Заснований у 2007 р.
Виходить 4 рази на рік

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 1-132
DOI: <http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01>

З М І С Т

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 5-30
<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.005>

Д. О. Янович, І. І. Грициняк, Т. М. Швець

Використання лососевих риб (*Salmonidae*) у біомоніторингу якості
водного середовища (огляд)..... 5

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 31-42
<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.031>

К. М. Гейна

Біологічна характеристика тарані (*Rutilus heckelii*) Дніпровсько-Бузької
гірлової системи 31

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 43-56
<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.043>

Г. А. Куріненко, А. І. Мрук, О. М. Колос

Вирощування пеляді (*Coregonus peled* Gmelin) в полікультурі з
короповими (*Cyprinidae*) та осетровими (*Acipenseridae*) рибами 43

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 57-69
<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.057>

Г. Зодапе, М. Тайаде, Г. Мехетре, М. Дхарне

Молекулярна ідентифікація і ДНК-штрихкування двох видів креветок
(*Parapenaeopsis sculptilis* і *Parapenaeopsis hardwickii*) з Горай-Крік,
Мумбаї, західне узбережжя Індії 57

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 70-77
<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.070>

А. Ю. Пуговкін, І. С. Кононенко, В. О. Черепнін, І. І. Грициняк,
Є. Ф. Копейка

Проникність мембран сперматозоїдів стерляді (*Acipenser ruthenus* L., 1758)
для молекул води..... 70

© Інститут рибного господарства НААН України, 2016

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 78-87

<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.078>

О. Ф. Дунаєвська

Мікроскопічна будова та морфометричні показники селезінки сома
(*Silurus glanis* L.) 78

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 88-101

<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.088>

Л. Я. Куровская, Г. А. Стрилько

Вплив рН водного середовища на рівень зараження ектопаразитами, вміст
білка та лізоциму у деяких видів коропових риб (*Cyprinidae*) 88

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

Ю. О. Желтов, *О. О. Олексієнко, В. І. Грех*

Використання деяких нетрадиційних кормів в годівлі різновікових груп
коропа 102

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 106-126

<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.106>

М. Ю. Симон

Особливості переходу ранньої молоді осетрових риб (*Acipenseridae*) на
годівлю штучними кормами в УЗВ (огляд) 106

ЮВІЛЕЇ

О. О. Олексієнко, Н. Л. Колесник

До 85-річчя Інституту рибного господарства
Національної академії аграрних наук України 127

СОДЕРЖАНИЕ

БИОРЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ ВОДОЕМОВ

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 5-30

<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.005>

Д. А. Янович, И. И. Грициняк, Т. М. Швець

Использование лососевых рыб (*Salmonidae*) в биомониторинге качества

водной среды (обзор) 5

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 31-42

<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.031>

К. Н. Гейна

Биологическая характеристика тарани (*Rutilus heckelii*) Днепровско-Бугской устьевой

системы 31

ТЕХНОЛОГИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 43-56

<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.043>

А. А. Куриненко, А. И. Мрук, Е. Н. Колос

Выращивание пеляди (*Coregonus peled* Gmelin) в поликультуре с карповыми (*Cyprinidae*) иосетровыми (*Acipenseridae*) рыбами 43

СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 57-69

<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.057>

Г. Зодане, М. Тайаде, Г. Мехетре, М. Дхарне

Молекулярная идентификация и ДНК-штрихкодирование двух видов креветок

(*Parapenaeopsis sculptilis* и *Parapenaeopsis hardwickii*) из Горай-крик, Мумбаи, западное

побережье Индии 57

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 70-77

<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.070>

А. Ю. Пуговкин, И. С. Кононенко, В. А. Черепнин, И. И. Грициняк, Е. Ф. Конейка

Проницаемость мембран сперматозоидов стерляди (*Acipenser ruthenus* L., 1758)

для молекул воды 70

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 78-87

<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.078>

О. Ф. Дунаевская

Микроскопическое строение и морфометрические показатели селезенки сома (*Silurus glanis* L.).... 78

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 88-101

<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.088>

Л. Я. Куровская, Г. А. Стрилько

Влияние pH водной среды на уровень заражения эктопаразитами, содержание белка и

лизоцима у некоторых видов карповых рыб (*Cyprinidae*) 88

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

Ю. А. Желтов, А. А. Алексеенко, В. И. Грех

Использование некоторых нетрадиционных кормов в кормлении

разновозрастных групп карпа 102

СТРАНИЦА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 106-126

<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.106>

М. Ю. Симон

Особенности перехода ранней молоди осетровых рыб (*Acipenseridae*) на кормление

искусственными кормами в УЗВ (обзор) 106

ЮБИЛЕИ

А. А. Алексеенко, Н. Л. Колесник

К 85-летию Института рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины 127

CONTENTS

BIORESOURCES AND ECOLOGY OF WATER BODIES

- Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 5-30
<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.005>
D. Yanovych, I. Hrytsyniak, T. Shvets
 Application of salmonids (*Salmonidae*) in the biomonitoring of aquatic environment (a review) **5**
- Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 31-42
<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.031>
K. Geyna
 Biological features of taran (*Rutilus heckelii*) of the Dnieper-Bug estuary system **31**

TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE

- Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 43-56
<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.043>
G. Kurinenko, A. Mruk, O. Kolos
 Rearing of peled (*Coregonus peled* Gmelin) in polyculture with cyprinids (*Cyprinidae*) and sturgeons (*Acipenseridae*) **43**

SELECTION, GENETICS AND BIOTECHNOLOGY

- Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 57-69
<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.057>
G. Zodape, M. Tayade, G. Mehetre, M. Dharne
 Molecular identification and barcoding of two shrimp species (*Parapenaeopsis sculptillis* and *Parapenaeopsis hardwickii*) collected from Gorai creek of Mumbai, West coast of India **57**
- Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 70-77
<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.070>
A. Puhovkin, I. Kononenko, V. Cherepnin, I. Hrytsyniak, E. Kopeika
 Permeability of sterlet sperm membranes (*Acipenser ruthenus* L., 1758) for water molecules **70**

PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

- Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 78-87
<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.078>
O. Dunaevskaya
 Microscopic structure and morphometric parameters of catfish (*Silurus glanis* L.) spleen **78**
- Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 88-101
<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.088>
L. Kurovskaya, G. Stril'ko
 Effect of aquatic environment pH on the level of ectoparasite infestation, protein and lysozyme content in some cyprinid species (*Cyprinidae*) **88**

PROPOSITIONS FOR PRODUCTION

- Iu. Zhelton, *O. Oleksiienko, V. Hrehk*
 Use of some non-traditional feeds in the feeding of the multiple age groups of carp **102**

YOUNG SCIENTIST PAGE

- Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 106-126
<http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.106>
M. Simon
 Peculiarities of the transition of early sturgeon (*Acipenseridae*) fry to artificial formulated feeds in RAS (a review) **106**

ANNIVERSARIES

- O. Oleksiienko, N. Kolesnyk*
 On the occasion of 85 years of the Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine **127**

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 5-30

DOI: <http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.005>

УДК 628.394.6:597.553.2

ВИКОРИСТАННЯ ЛОСОСЕВИХ РИБ (*SALMONIDAE*) У БІОМОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (ОГЛЯД)

Д. О. Янович, yandeni@yandex.ru, Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, м. Львів

І. І. Грициняк, hrytsyniak@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Т. М. Швець, irguaan@bigmir.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. У зв'язку із забрудненням рибогосподарських водойм промисловими та сільськогосподарськими стоками, а також ксенобіотиками, які надходять з інших джерел, з огляду на прогнозоване зростання обсягів подібних викидів у коротко- та довготерміновій перспективі, особливої актуальності набувають питання дослідження впливу забруднюючих речовин різної природи та походження на гідробіонтів, зокрема риб, а також прогнозування можливих несприятливих наслідків забруднення водних екосистем. Метою представленої роботи є аналіз та узагальнення існуючих літературних відомостей щодо індикації в системі біомоніторингу якості водного середовища на підставі показників реакції лососевих риб як високочутливих об'єктів їхтіофауни до дії зовнішніх чинників.

Результати. У роботі узагальнено та систематизовано дані стосовно використання лососевих риб у системі біомоніторингових досліджень. Виділено та охарактеризовано специфічність таких біоіндикаційних показників екологічного стану водного середовища як біохімічні, генетичні, фізіологічні, морфологічні, гістопатологічні та популяційні маркери, а також біоіндикаційне значення поведінкових реакцій риб. Означено наслідки екотоксикації гідроекосистем у розрізі різних рівнів біологічної організації (клітина, особина, популяція, угруповання риб). Описано можливість проведення біологічного моніторингу, базуючись на індексах сапробності, виявлених для видів-індикаторів з родини лососевих риб.

Наукова новизна. В статті наведено структуру та визначено переваги і недоліки використання окремих біомаркерів організму та популяцій лососевих риб для оцінки екологічного стану водного середовища.

Практична значимість. Наведені у статті дані можуть бути використані для вдосконалення системи екологічного моніторингу водного середовища шляхом включення до індикаторних показників біомаркерів організму та популяцій високочутливих видів лососевих риб.

Ключові слова: біомоніторинг, лососеві риби, водні екосистеми, біохімічні маркери, генетичні біомаркери, фізіологічні біомаркери, морфологічні біомаркери, гістопатологічні біомаркери, популяційні біомаркери.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Можливості використання представників родини лососевих риб у системі біомоніторингових досліджень зумовлені їх підвищеною токсикочутливістю [1–3]. Біоіндикація з використанням цих риб застосовується для оцінки якості

© Д. О. Янович, І. І. Грициняк, Т. М. Швець, 2016

водного середовища за станом показників реакції лососевидних, сиговидних і харіусовидних видів. Кожна з цих груп має ряд переваг і недоліків, які визначають можливості та обмеження у виконанні тих чи інших задач. Так, одним з біоіндикаторів погіршення екологічних умов водойми та тест-об'єктом для їх оцінки є представник сиговидних риб — європейська ряпушка. Від інших представників роду сигів її відрізняє порівняно короткий цикл розвитку. Процеси обміну речовин та накопичення токсикантів в її організмі протікають швидше. У довгоциклічних сигових ці процеси затягуються у часі. Так, Антонова В. П. зі співавторами відзначали різке збільшення чисельності ряпушки з порушеннями у розвитку внутрішніх органів (печінки, серця, гонад), а потім і зниження виживання її потомства після нафтових аварій на річці Печорі, що супроводжувались надходженням до водного середовища тисяч тонн нафти. В стадії ж звичайного сига патологія виявилася дещо пізніше, однак за спільною з ряпушкою схемою [3–6].

Для вивчення дії забруднювачів на риб у якості індикаторного об'єкта обирається також райдужна форель. Для дослідження токсичного впливу в ранньому онтогенезі цей вид, в порівнянні з іншими, має низку переваг. Тривалі ембріональний і личинковий періоди розвитку форелі дозволяють проводити хронічні експерименти тривалістю до 70–75 діб. Порівняно з іншими лососевими рибами, широкі температурні межі дозволяють здійснювати досліди в звичайних морозильних камерах. Ікра і личинки форелі є відносно великими за розміром експериментальними об'єктами, що розширює можливість їхнього використання для оцінки токсичності водного середовища [7].

Взаємодія як окремого організму риб, так і їх популяцій та угруповань з навколишнім середовищем ґрунтується на адаптаційних механізмах. Забруднення водного середовища призводить до порушення їхнього функціонування, що супроводжується загибеллю окремих клітин, пригніченням певних фізіолого-біохімічних процесів, а за подальшого наростання — загибеллю організму, зникненням із угруповань чутливих видів з переважанням толерантних та зміни продуктивних характеристик водойм. Як складові елементи інтегральної оцінки негативного впливу забруднюючих сполук як на організм риб, так і на гідроекосистему в цілому, постають специфічні біологічні ефекти (табл. 1) та генетичні, молекулярні, біохімічні, фізіологічні, морфологічні біомаркери, що ґрунтуються на них (табл. 2) [5, 6, 8–12].

Біомаркери характеризують взаємодію організму риб з потенційно небезпечними речовинами різного походження, та включають функціональні зміни в організмі, що відбуваються переважно на молекулярному та клітинному рівнях організації, а також біохімічні показники, як, наприклад, біохімічний склад тканин та рідин тіла риб. Реакції організму, що виникають на субклітинному рівні, призводять до змін процесів метаболізму в цілому, і можуть бути ідентифіковані в доволі короткий термін та за досить низьких концентрацій полютантів. Разом з тим, вважається, що молекулярні маркери характеризуються порівняно низькою екологічною інформативністю, на відміну від популяційних або біоценотичних показників, таких як екологічна структура популяцій, видове та таксономічне різноманіття тощо, недоліком яких, втім, є низький рівень чутливості [5, 12–14].

Таблиця 1. Наслідки негативного впливу забруднюючих речовин на іхтіофауну в розрізі різних рівнів біологічної організації [6]

Рівень	Відсутність згубної дії	Вплив токсикантів
Клітина	Нормальне функціонування клітин, стабільність лізосом, генетична цілісність	Тривала детоксикаційна активність, генетичні ушкодження
Особина	Відсутність морфологічних відхилень, низький рівень зараженості паразитами, нормальні поведінка та коефіцієнт вгодованості	Пошкодження плавців та інші аномалії, утворення пухлин, поведінкові відхилення, зниження коефіцієнта вгодованості
Популяція	Самопідтримуваність популяцій, нормальна демографічна структура, представленість усіх вікових груп, передбачуваний просторовий розподіл	Недостатнє або нульове популяційне поповнення личинками, низька чисельність молоді та дозріваючих особин, зміни просторового розподілу
Угрупування	Нормальна або висока різноманітність, присутність усіх трофічних рівнів, комплексна біотична взаємодія, очікувані сезонні цикли	Низька різноманітність, відсутність деяких груп, зменшення чисельності чутливих видів, послаблення біотичної взаємодії, зміни сезонних циклів

Біохімічні маркери

Біохімічні механізми, що використовуються як маркери реакцій організму риб на дію зовнішніх чинників, включають синтез специфічних білків (цитохром-Р450-монооксигеназ, металотіонеїнів, білків стресу і множинної стійкості до ліків, ферментів другої фази метаболізму ксенобіотиків, антиоксидантних ферментів), утворення ендогенних метаболітів (флуоресцентних ароматичних сполук, порфіринів, ретиноїдів), а також індикаторів генотоксичної дії [9, 15].

Для прикладу, цитохром-Р450-монооксигенази — мультигенна група ферментів, з яких цитохром Р4501А часто використовується як маркер у процесі проведення біомоніторингових досліджень. Його експресія зростає через активацію арил-вуглеводневого рецептора цитозолу, що слугує фактором транскрипції, ініціює експресію мРНК цитохрому Р4501А, індукуючи синтез етоксирезоруфін-О-диетилази. З огляду на вибірковість зв'язування арил-вуглеводневих рецепторів з ароматичними вуглеводнями, експресія цитохрому Р4501А може бути використана у якості біомаркера як інтоксикації, так і адаптації організму лососевих риб до забруднення водою широким спектром вказаних органічних сполук — від поліхлорованих біфенілів і діоксинів до численних поліциклічних ароматичних вуглеводнів.

В основі визначення активності цитохрому Р4501А лежить реакція деетилювання 7-етоксирезоруфіну, з використанням як кофактора НАДФ відновленого, до флуоресцентного продукту — резоруфіну. Останній легко визначається в гомогенатах печінки у дослідженнях, для яких обґрунтованим є відбір самців або незрілих особин однакового розміру та аналогічної стадії онтогенезу [5, 9, 12, 16–24].

Важливим індикатором впливу на лососевих риб іонів деяких металів є металотіонеїни — внутрішньоклітинні низькомолекулярні термостабільні білки з

високим вмістом тілових груп, що беруть участь у кон'югації ксенобіотиків (табл. 2). Вони задіяні у низці процесів, пов'язаних з метаболізмом певних елементів, зокрема міді, цинку, кадмію, селену, миш'яку та ртуті — від регулювання їхнього поглинання (для есенціальних металів) і депонування до детоксикації. Крім того, зростання вмісту металотіонеїнів за певних умов є можливим у відповідь на розвиток оксидативного стресу. З метою проведення біомоніторингових досліджень не слід обирати статевозрілих самиць, оскільки у лососевих риб спостерігається пригнічення рівня металотіонеїнів за впливу естрадіолу, свідченням чого стали досліди з райдужною фореллю. Крім того, в експерименті слід уникати стресових ситуацій, наприклад, хендлінгу, різкої зміни температури тощо [5, 12, 15, 31–41].

Таблиця 2. Біомаркери риб [5, 12, 25–30]

Біомаркер	Індикатор забрудненням конкретним токсикантом	Специфічність біологічних процесів	Вплив нетоксичних чинників
Акумуляція	Так	Низька специфічність	Чинники середовища
Біотрансформація	Кілька груп ліпофільних ксенобіотиків	Детоксикація	Температура води, стать, вид риб
Оксидативний стрес	Ні	Детоксикація	Відсутній
Металотіонеїни	Кадмій, ртуть, цинк, мідь	Детоксикація	Стрес
Білки теплового шоку	Ні	Захист білків	Стрес, температура води, захворювання
Амінолевулінат-дегідратаза (АЛД)	Неорганічний свинець	Зниження гемосинтезу за надзвичайно високого вмісту свинцю	Умови середовища, вид, розмір риб
Ацетилхолін-естераза	Більшість інсектицидів	Нервова система	Вид риб, середовище
Гістологія	Ні	Специфічні ушкодження тканин, компенсаційні процеси	Захворювання, вік риб
Гематологія	Зазвичай — ні, за виключенням метгемоглобіну — для окислювачів та АЛД — для свинцю	Стресові реакції, анемія, пошкодження тканин	Стрес, захворювання риб
Ендокринні розлади	Гормони та гормоноподібні токсиканти	Відтворення	Відсутній
Скелетні деформації	Тератогенні сполуки, нейротоксини	Зниження виживання	Генетичний вплив, механічні ушкодження, вітамін С

Білки теплового шоку (хітшовкові протеїни — HSP30, HSP60, HSP70, HSP90 та інші) — неспецифічна група висококонсервативних внутрішньоклітинних

гострофазових білків, що виконують важливу захисну та гомеостатичну роль, забезпечуючи, в тому числі, адаптацію клітини до цитотоксичних чинників. Індукторами їх експресії, яка є індикатором негативного впливу та основою використання цих білків як біомаркерів, можуть виступати дія металів, зокрема кадмію, міді, цинку, миш'яку, свинцю; поліциклічних ароматичних вуглеводнів; детергентів; гіпертермія; оксидативний стрес тощо. Утворення хітшових протеїнів в організмі риб характеризується тканинно-видовою специфічністю. В той час як білки родини HSP70 локалізуються у цитоплазмі, мітохондріях, ендоплазматичному ретикулумі та ядрі, HSP90 — в цитозолі, ядрі, HSP60 (шаперонін) є мітохондріальним білком.

Білки родини HSP70 є найбільш вивченими, в тому числі у лососевих риб. Експресія їх спостерігалась у випадках впливу на них сезонних чинників, температури, а також деяких органічних та неорганічних забруднювачів. Зокрема, показовим є приклад зміни метаболічного статусу печінки райдужної форелі за дії β -нафтофлаону, зі зниженням активності фосфоенолпіруваткарбоксікінази, лактатдегідрогенази та 3-гідроксиацил-коА-дегідрогенази, яка корелює з експресією HSP70 печінки риб [44, 45].

Протеїн HSP30, відомий як гемоксигеназа, виконує роль ферменту, що бере участь у катаболізмі простетичних груп до білівердину та білірубину за участю білівердинредуктази. Індукцію його активності за впливу хімічних токсикантів спостерігали на прикладі кількох видів лососевих риб, зокрема атлантичного лосося. Оскільки індукція HSP30 є обернено пропорційною до зростання активності цитохрому P4501A, перший може використовуватися як підтверджуючий маркер пригнічення цитохромів [12, 48].

HSP90 слугує біомаркером у випадку забруднення водойм детергентами та поліциклічними ароматичними вуглеводнями, а також арсенітами [5, 12, 42–49].

Ще однією категорією білкових біомаркерів є білки множинної лікарської, або мультіксенобіотичної, стійкості — Р-глікопротеїни. Це мембранні протеїни, які забезпечують транспорт ліпідів, пептидів, білірубину та інших речовин через клітинну мембрану, та задіяні у формуванні стійкості пухлинних клітин до хіміотерапевтичних препаратів. Зростання їхнього рівня спостерігається за впливу багатьох як органічних полютантів, зокрема поліциклічних ароматичних вуглеводнів — креозоту, бенз(а)пірену тощо, пестицидів, так і неорганічних сполук. Згідно з дослідженнями, значна їх експресія відмічається у тканинах з індукованою неоплазією, що вказує на перспективність Р-глікопротеїнів як біохімічних маркерів онкогенних процесів або потенційної сприйнятливості до них організму риб [12, 50–55].

Біотрансформація токсикантів в організмі риб проходить протягом двох фаз. Перша включає модифікацію молекули ксенобіотика з залученням ферментних систем, що результує в утворення чи вивільнення функціональних груп, зокрема (OH), (NH₂), (SH), друга являє собою кон'югацію полютантів або їх метаболітів з великими ендогенними полярними молекулами. Експресія деяких ферментів, задіяних у другій фазі біотрансформації, наприклад глутатіон-S-трансферази (за хронічної дії) або уридиндифосфат-глюкуронозилтрансферази, вказує на забрудненість водного середовища полютантами, серед яких можуть бути поліхлоровані біфеніли, поліциклічні ароматичні вуглеводні, хлорорганічні

пестициди. З огляду на це, вказані ферменти можна використовувати як біомаркери впливу на організм риб вказаних забруднюючих речовин [5, 9, 12, 56].

Основою токсичної дії багатьох органічних сполук та важких металів є посилення продукування активних форм кисню, здатних пошкоджувати структуру мембранних білків, нуклеїнових кислот та ліпідів. З цієї причини, біомаркери оксидативного стресу можна використовувати як індикатори токсичної дії полютантів. Клітинні тіюли, зокрема глутатіон, відіграють вкрай важливу роль у підтриманні окисно-відновного потенціалу клітини впродовж розвитку оксидативного стресу. В свою чергу, ферменти, що забезпечують підтримання глутатіону у відновленому стані, можуть використовуватися як індикатори оксидативного стресу за дії на організм риб токсичних речовин. Крім того, біомаркером вказаних процесів може виступати ДТ-діафараза, експресія якої пов'язана з дією планарних ароматичних вуглеводнів, таких як поліциклічні ароматичні вуглеводні та поліхлоровані біфеніли [5, 12, 56–58].

Значна кількість біологічних маркерів включає в себе ендогенні метаболіти токсичних речовин. Перш за все, це стосується флуоресцентних ароматичних сполук. У процесі біотрансформації численних поліциклічних ароматичних вуглеводнів утворюються активні проміжні сполуки, які здатні зв'язуватися з макромолекулами клітин, порушуючи їх нормальне функціонування. Оскільки токсичність вказаних полютантів безпосередньо залежить від їх трансформації в організмі, закономірною є оцінка і використання метаболітів ПАВ як специфічних біомаркерів забруднення водного середовища даними сполуками та впливу їх на організм лососевих риб. Слід зазначити, що необхідною умовою застосування вказаних маркерів є однаковий розмір досліджуваних особин [12, 59, 60].

Досить ефективними маркерами забруднення водойм та інтоксикації риб хлорованими вуглеводнями є порфірини — продукти катаболізму гему. Так, у випадку впливу стоків крафт-целюлозного заводу на озерного сига *Хи Н.* зі співавторами було запропоновано використання профілів карбоксильованого порфірину як біологічного індикатора [12, 61, 62].

Перспективним є використання з біоіндикаційною метою ретиноїдів — ендогенних похідних вітаміну А, утворення яких пов'язане з впливом на риб планарних ароматичних вуглеводнів. Показовим у даному випадку є експеримент з американською палією, підданою впливу ін'єкції тетрахлорбіфенілу, що результувало у зниження вмісту ретиноїдів у деяких її тканинах [63–65].

Генетичні біомаркери

Важливою групою індикаторів токсичного впливу ксенобіотиків є генетичні біомаркери, оскільки зміни у генетичному матеріалі риб, у кінцевому результаті, мають наслідки для всіх рівнів організації живої речовини — від молекулярного до популяційного та біоценотичного. В окремих випадках, пошкодження молекули ДНК, що не спричиняють прямого негативного впливу на організм, можуть служити джерелом генетичного обтяження популяції. На даний час набули поширення декілька методів, що застосовуються для оцінки генетичних ефектів як на молекулярному та клітинному рівнях, так і для визначення генетичної структури популяції. До першої групи відносяться: ідентифікація ДНК-аддуктів, аналіз одиничних клітин (ДНК-комет), мікроядерний аналіз, метод

лужного розкручування ДНК, проточна цитометрія, специфічна оцінка точкових мутацій, до другої — метод випадково ампліфікованої поліморфної ДНК (RAPD), аналіз алозимів та мітохондріальної ДНК, метод поліморфізму довжини ампліфікованих фрагментів (AFLP), мікросателітів, а також ДНК-фінгерпринтинг [12, 66–73].

Фізіологічні біомаркери

Іншою групою біомаркерів, що відрізняються широким упровадженням у практику біологічного моніторингу та застосовуються у комплексі з біохімічними, є фізіологічні маркери, які включають гематологічні та клініко-хімічні параметри, показники фізичного стану риб (коефіцієнт вгодованості, темп росту, органосоматичні індекси), респіраторні та серцево-судинні показники, поведінкові особливості.

Кров — одна з найбільш доступних для аналізу рідин організму лососевих риб, що дозволяє визначати в ній кількість кров'яних клітин, гемоглобіну, концентрацію іонів плазми, активність ферментів і гормонів, вміст токсикантів тощо. Гематологічні параметри, що мають індикаторне значення при забрудненні середовища існування лососевих риб металами, компонентами стічних вод целюлозної промисловості, поліхлорованими біфенілами та численними іншими поллютантами, включають такі показники: гематокрит, кількість еритроцитів в одиниці об'єму крові, вміст гемоглобіну, концентрація натрію та калію у плазмі, вміст кров'яних ензимів, білка, ендометаболітів (холінестераза, аланінамінотрансфераза, дегідратаза амінолевулінової кислоти, альбумін, сечовина, глюкоза; естрогени, андрогени, прогестини, тиреоїдні гормони, кортизон, інсуліноподібний чинник росту). Передумовами отримання вірогідних результатів під час проведення гематологічних досліджень у іхтіотоксикології вважається використання уніфікованих методик та врахування можливості зміни показників крові за дії низки чинників, зокрема антикоагулянтів, хендлінгу, анестезії тощо. З огляду на це, найбільш доцільним видається відбір проб крові риб протягом 5 хв. після їх вилову [12, 74–79].

Морфологічні біомаркери

Наступною групою біомаркерів є показники фізичного стану організму, що здавна використовувалися з метою оцінки здоров'я риб. Найбільш поширеними з них є співвідношення розміру тіла (або окремого органа) і маси особини. Зокрема, при визначенні патологічних змін у функціях окремо взятих органів доцільно використовувати морфометричні показники — коефіцієнт вгодованості, виражений як відношення маси риби до її довжини, а також органосоматичні індекси — відношення маси певного органа до маси тіла. Перевагою вказаних біомаркерів є легкість проведення досліджень, однак вони перебувають у тісній залежності від сезонних і температурних чинників, фізіологічного стану риб, що ускладнює процес ідентифікації визначального чинника, яким не обов'язково є вплив поллютанта. Разом з тим, останній може спровокувати швидкі та масштабні зміни у роботі органів, наприклад, гонад лососевих риб, що значною мірою відрізнятимуться від таких, викликаних сезонними чи подібними чинниками [12, 37, 80–82]. Приклади реакції організму представників родини лососевих за дії забруднюючих речовин з позицій впливу на коефіцієнт вгодованості та органосоматичні індекси наведені у таблиці 3.

Таблиця 3. Зміни фізичного стану лососевих риб в умовах впливу токсичних речовин [12, 82, 88–91]

Вид риб	Токсикант	Тип відповіді
<i>Коефіцієнт вгодованості</i>		
Озерний сиг	Хронічний дієтарний вплив нікелю (до 1000 мг/г корму) впродовж 104 діб	Відсутність впливу на ріст чи коефіцієнт вгодованості
Райдужна форель	Стоки мідних шахт	Відсутність впливу на коефіцієнт вгодованості
	Згодовування кальцію у складі корму (60 мг/г) протягом 30 діб	Зниження коефіцієнта вгодованості
<i>Гепатосоматичний індекс</i>		
Райдужна форель	Вплив фенолу у концентрації 0,6; 1,2 та 2,4 мг/дм ³ протягом 8 тижнів	Зниження гепатосоматичного індексу
Атлантичний лосось	Дієтарний вплив хлориду ртуті (до 100 мг/кг корму) або метилртуті (до 10 мг/кг корму) протягом 4 місяців	Відсутність впливу на масу, довжину або гепатосоматичний індекс
<i>Гонадосоматичний індекс</i>		
Райдужна форель	Згодовування кальцію у складі корму (60 мг/г) протягом 30 діб	Зниження гонадосоматичного індексу

Використання гепатосоматичного індексу як біомаркера доцільне за умови впливу на риб гепатотоксичних сполук, прикладом яких є кадмій, в той час як гонадосоматичний індекс виявляє дію ксеноестрогенних поллютантів. Інші ж показники (спленосоматичний та соматовісцеральний індекси, відносна маса шлунка) використовують для досліджень впливу солоності, температури і сезонних змін, та переважно не застосовують у іхтіотоксикологічній практиці [12, 83, 84].

Окрім наведених параметрів, традиційним біомаркером вважається ріст риб, який вираховується як на організмовому — шляхом визначення змін маси тіла протягом тривалого часу, так і на біохімічному рівнях — з урахуванням змін вмісту протеїну в клітині або розрахунком співвідношення РНК/ДНК. Причини зниження темпу росту за впливу поллютантів полягають у зменшенні споживання енергії або зростанні її витрат рибами для уникнення небезпечних сполук, детоксикації ксенобіотиків та відновлення тканин [12, 85–87].

Слід згадати також дихальні та серцево-судинні показники лососевих риб, зміна яких може вказувати на забруднення водойм. Наведені біомаркери включають частоту та об'єм вентиляції, споживання кисню, вміст газів у крові, парціальний тиск кисню в артеріальній крові, парціальний тиск вуглекислого газу. Загалом, будь-який полютант, що впливає на два останні параметри, змінює рН крові, судинний опір, кровопостачання або індукує проліферацію клітин зябер, здатний спричинити порушення дихальної функції [92, 93].

Гістопатологічні біомаркери

Окремою категорією індикаторних показників є патологічні маркери. За сублетальних впливів токсичних речовин на риб відбуваються зміни у гістологічній структурі тканин та органів, і провокуються патології, здатні значною мірою порушити їхнє функціонування. Впровадження в практику

біоіндикації гістологічних досліджень із залученням імуногістохімічних методів дозволяє досліджувати органи та клітини-мішені токсичної дії забруднюючих сполук як за гострого, так і за хронічного впливу. З огляду на висококонсервативну природу органел клітин і загальної клітинної організації риб, та тісний зв'язок молекулярних, генетичних, цитологічних і гістологічних показників, гістопатологічні маркери виявляються дієвими інструментами детермінації негативної дії поллютантів, що знайшли широке застосування у їхтіотоксикологічній практиці. Вони постають як прямі, чутливі та надійні індикатори впливу зовнішніх стресорів. Найчастіше вивчаються специфічні зміни структури тканин зябер як мультифункціонального органу, через який відбувається поглинання поллютантів, печінки, де проходить їхня біотрансформація та детоксикація, нирок як одного з органів виведення поллютантів, гонад — за умови дії сполук з характерними ксеноестрогенними властивостями, залоз внутрішньої секреції — у випадку забруднення водойм ендокринними дизрапторами тощо. Разом з тим, до недоліків використання гістопатологічних біомаркерів відносяться інвазивність, трудомісткість та висока вартість досліджень [12, 94–97].

Поведінкові реакції риб як біомаркери

Поведінкові реакції риб також дають інформацію про функціональні зміни в організмі. За впливу токсичних сполук, найбільш вираженими реакціями лососевих риб є уникнення забруднювачів, зміни рухливості, поведінки, пошуку їжі та живлення, а також репродуктивної, соціальної та плавальної активності. Поведінкові біомаркери відзначаються низкою переваг перед біохімічними, фізіологічними та морфологічними внаслідок їхньої часто порівняно вищої індикаторної чутливості до дії поллютантів, можливості швидкого виявлення гострого впливу цих речовин, інтегративності ефектів, в основі яких лежать біохімічні та фізіологічні зміни, та відображення комплексів токсичних реакцій і компенсаторних відповідей [12, 98–105].

Популяційні біомаркери

Біоіндикація стану водного середовища в умовах антропогенного забруднення може ґрунтуватися і на оцінці параметрів структури популяцій лососевих риб та різноманіття особин з відмінними властивостями в одній популяції. Із вказаною метою проводиться аналіз кількох показників, серед яких співвідношення статей, абсолютна плодючість, розмірна різноманітність особин, чисельність особин з морфологічними відхиленнями. Співвідношення статей береться до уваги у випадках яскравого виявлення статевого диморфізму лососевих риб, та показує відхилення від норми, які знаходять відображення у зниженні урожайності поколінь, у той час як абсолютна плодючість є індикатором сприятливості умов для нересту риб. Важливим біомаркером є розмірне різноманіття особин в межах окремих вікових груп, оскільки якість середовища здатна значною мірою визначати їхній фізичний стан, зокрема темп росту, коефіцієнт вгодованості особин тощо, про що йшлося вище. Показники відносної частки особин з наявністю морфологічних асиметрій у різних вікових групах та різноманітності вікових груп у особин з морфологічними асиметріями в популяції спроможні вказати на актуальний екологічний стан водойми і тимчасову зміну якості водного середовища, а також визначати присутність несприятливих чинників у минулому на основі показників відповідних вікових груп лососевих риб [5, 11, 106, 107].

Оцінити якість вод природних водних об'єктів з позиції пристосованості виду до певного рівня забрудненості і гідрохімічної відповідності можна за допомогою **індексів сапробності** [108]. Види лососевих риб, що використовуються для біоіндикації, із зазначенням ступеня сапробності води, яку витримують дані об'єкти, індикаторного значення та їх сапробної валентності, що показує, якою мірою вид характерний для водойми того чи іншого ступеня сапробності, і яка виражається однією або декількома цифрами, рівними для кожного виду 10, представлені в таблиці 4.

Таблиця 4. Біологічні показники якості води за видами-індикаторами з родини лососевих риб [109]

Види	СС	КС	ОС	α-М	β-М	ПС	ІЗ
Звичайний сиг	ОС	—	8	2	—	—	4
Дунайський лосось	ОС-МС	—	2	4	4	—	2
Райдужна форель	ОС-МС	—	5	5	—	—	3
Струмкова форель	КС-ОС	6	4	—	—	—	3
Європейський харіус	ОС	1	7	2	—	—	3

Примітка. СС — ступінь сапробності; КС — ксеносапроби; ОС — олігосапроби; α-М — α-мезосапроби; β-М — β-мезосапроби, ПС — полісапроби; ІЗ — індикаторне значення.

Вказаний метод має характер спостереження та передбачає існування певного виду лососевих риб за оптимальних для нього параметрів водного середовища і зникнення з водойм за погіршення екологічних умов. Як показують дані таблиці 4, наведені види лососевих риб, яким властива низька токсикорезистентність та підвищена сприйнятливість до негативного впливу, є переважно ксено- та олігосапробами.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Загострення проблеми забруднення водного середовища поллютантами різноманітної природи, походження та характеру впливу на живі організми вимагає вдосконалення системи екологічного моніторингу гідроєкосистем. Можливими шляхами цього є включення до системи моніторингових досліджень чутливих видів риб, до яких відносяться лососеві. Такий підхід, з одного боку, дозволяє встановити факт забруднення водойм, а з іншого — вивчити особливості впливу ксенобіотиків на живі організми на різних рівнях організації живої речовини — від субклітинного до популяційного. В свою чергу, одержані під час проведення біомоніторингових досліджень дані можуть бути використані для нормування антропогенного навантаження на водні екосистеми.

ЛІТЕРАТУРА

- Алабастер Дж. Критерии качества воды для пресноводных рыб / Дж. Алабастер, Р. Ллойд ; [пер. с англ. М. П. Ерофеева, С. В. Кожин, В. В. Кузнецов, О. П. Цвылев]. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1984. — 344 с.
- Васенко А. Г. О роли биотестирования и биоиндикации в системе токсикологического контроля / А. Г. Васенко // Первая Всесоюзная

- конференція по рыбохозяйственной токсикологии (Юрмала, декабрь 1988 г.) : тезисы докл. Ч. 1. — Рига, 1988. — С. 55—56.
3. Моисеенко Т. И. Водная экотоксикология. Теоретические и прикладные аспекты / Моисеенко Т. И. ; Институт водных проблем РАН. — М. : Наука, 2009. — 400 с.
4. Причины неблагополучного состояния запасов лососевидных рыб Печорского бассейна в современных условиях / В. П. Антонова, А. Л. Безумова, А. Г. Завиша [и др.] // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. — 2000. — Вып. 326. — С. 31—40.
5. Chovanec A. Fish as bioindicators / A. Chovanec, R. Hofer, F. Schiemer // Bioindicators & biomonitors. Principles, concepts and applications / [eds. B. A. Markert, A. M. Breure, H. G. Zechmeister]. — Oxford : Elsevier, 2003. — P. 639—676.
6. Scardi M. Monitoring methods based on fish / M. Scardi, L. Tancioni, S. Cataudella // Biological monitoring of rivers / [eds. G. Ziglio, M. Siligardi, G. Flaim]. — Chichester : John Wiley & Sons, 2006. — P. 135—153.
7. Курзыкина Л. Г. Влияние полиамидной смолы «Кюмене» на рыб и водных беспозвоночных / Л. Г. Курзыкина, Н. В. Артемьева // Проблемы водной токсикологии : межвузовский сборник. — Петрозаводск, 1985. — С. 54—57.
8. USEPA biomonitoring and bioindicator concepts needed to evaluate the biological integrity of aquatic systems / J. M. Lazorchak, B. H. Hill, B.S. Brown [et al.] // Bioindicators & biomonitors. Principles, concepts and applications / [eds. B. A. Markert, A. M. Breure, H. G. Zechmeister]. — Oxford : Elsevier, 2003. — P. 831—874.
9. Van der Oost R. Fish bioaccumulation and biomarkers in environmental risk assessment: a review / R. Van der Oost, J. Beyer, N. P. E. Vermeulen // Environ. Toxicol. Pharmacol. — 2003. — Vol. 13. — P. 57—149.
10. Дудкин С. И. Биохимические методы биоиндикации токсического воздействия на гидробионты / С. И. Дудкин // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне. — Краснодар, 2005. — С. 292—315.
11. Биоиндикация качества воды и состояния гидрозкосистем с использованием характеристик особей, популяций и сообществ рыб / В. А. Демченко, А. Г. Антоновский, Н. А. Демченко [и др.] // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : І Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф. : тези. — Канів, 2008. — С. 52—56.
12. Biomarkers / D. Schlenk, R. Handy, S. Steinert [et al.] // The toxicology of fishes / [eds. R. T. Di Giulio, D. E. Hinton]. — Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, 2008. — P. 683—731.
13. Munkittrick K. R. An integrated approach to aquatic ecosystem health: top-down, bottom-up or middle-out? / K. R. Munkittrick, L. S. McCarty // J. Aquat. Ecosyst. Health. — 1995. — Vol. 4. — P. 77—90.
14. Руднева И. И. Применение биомаркеров рыб для экотоксикологической диагностики водной среды / И. И. Руднева // Рибе господарство України. — 2006. — № 1(42). — С. 20—24.
15. Molecular responses to environmental contamination: enzyme and protein systems as indicators of chemical exposure and effect / J. J. Stegeman, M. Brouwer, R. T. DiGuilio [et al.] // Biomarkers: biochemical, physiological, and histological markers of anthropogenic stress. — Boca Raton, FL : Lewis Publishers, 1992. — P. 235—335.

16. Stegeman J. J. Biochemistry and molecular biology of monooxygenases: current perspectives on forms, functions, and regulation of cytochrome P450 in aquatic species / J. J. Stegeman // Aquatic Toxicology: Molecular, Biochemical, and Cellular Perspectives. — Boca Raton, FL : Lewis Publishers, 1994. — P. 87—206.
17. Stegeman J. J. Cytochrome P450 monooxygenase systems in aquatic species: carcinogen metabolism and biomarkers for carcinogen and pollutant exposure / J. J. Stegeman, J. J. Lech // Environ. Health Perspect. — 1991. — Vol. 90. — P. 101—109.
18. Stegeman J. J. The cytochromes P450 in fish / J. J. Stegeman // Molecular Biology Frontiers. — Amsterdam : Elsevier, 1993.
19. Bucheli T. D. Induction of cytochrome P450 as a biomarker for environmental contamination in aquatic ecosystems / T. D. Bucheli, K. Fent // CRC Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. — 1995. — Vol. 25. — P. 201—268.
20. Cook P. M. The TCDD toxicity equivalence approach for characterizing risks for early life-stage mortality in trout / P. M. Cook, E. W. Zabel, R. E. Peterson // Chemically induced alterations in functional development and reproduction of fishes. — Pensacola, FL : SETAC Press, 1997. — P. 9—27.
21. Buhler D. R. Rainbow trout cytochrome P450s: purification, molecular aspects, metabolic activity, induction, and role in environmental monitoring / D. R. Buhler, J. L. Wang-Buhler // Comp. Biochem. Physiol. — 1998. — Vol. 121C. — P. 107—137.
22. Sarasquete C. Cytochrome P4501A (CYP1A) in teleostean fishes. A review of immunohistochemical studies / C. Sarasquete, H. Segner // The Science of the Total Environment. — 2000. — Vol. 247, № 2—3. — P. 313—332.
23. Hahn M. E. Xenobiotic receptors in fish: structural and functional diversity and evolutionary insights / M. E. Hahn, R. R. Merson, S. I. Karchner // Biochemistry and molecular biology of fishes. Vol. 6. Environmental Toxicology. — Amsterdam : Elsevier, 2005. — P. 191—232.
24. Юрченко В. В. Активность этоксирезорифин-О-диэтилазы (ЭРОД) рыб как биомаркер загрязнения водной среды стойкими органическими загрязняющими веществами / В. В. Юрченко, Г. М. Чуйко // Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов. Т. 1 : Экологическая физиология и биохимия водных организмов : сборник науч. статей. — Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2010. — С. 316—319.
25. Johansson-Sjöbeck M. L. Effects of inorganic δ -amino levulinic acid dehydratase activity and haematological variables in rainbow trout (*Salmo gairdneri*) / M. L. Johansson-Sjöbeck, A. Larsson // Arch. Environ. Contam. Toxicol. — 1979. — Vol. 8. — P. 419—431.
26. Cortisol induction of metallothionein in primary cultures of rainbow trout hepatocytes / J. S. Hyllner, C. Haux, T. Andersson [et al.] // J. Cell Physiol. — 1989. — Vol. 139. — P. 24—28.
27. The role of metallothionein in cadmium accumulation of Arctic charr (*Salvelinus alpinus*) from high mountain lakes / R. Dallinger, M. Egg, G. Köck [et al.] // Aquat. Toxicol. — 1997. — Vol. 38. — P. 47—66.
28. Stress protein expression in fish / G. K. Iwama, M. M. Thomas, M. M. Vijayan [et al.] // Rev. Fish Biol. Fish. — 1998. — Vol. 8. — P. 35—56.
29. Heat shock proteins and physiological stress in fish / G. K. Iwama, M. M. Vijayan, R. B. Forsyth [et al.] // Am. Zoologist. — 1999. — Vol. 39. — P. 901—909.
30. Janssens de Bisthoven L. Biomonitoring with morphological deformities in aquatic organisms / L. Janssens de Bisthoven // Biomonitoring of Polluted Water. Environmental Research Forum. — 1999. — Vol. 9. — P. 65—94.

31. Петухов С. А. Роль металлотіонеїна в концентруванні важких металів рибами / С. А. Петухов, А. І. Глибоков, І. Н. Горкін // Екологічні аспекти хімічного і радіоактивного забруднення водної середовища : збірник наук. трудов ВНИРО. — М. : Легка і харчова промисловість, 1983. — С. 36—40.
32. Roesijadi G. Metallothionein in metal regulation and toxicology / G. Roesijadi // *Aquat. Toxicol.* — 1992. — Vol. 22. — P. 81—114.
33. Sato M. Oxygen free radicals and metallothionein / M. Sato, I. Bremner // *Free Radic. Biol. Med.* — 1993. — Vol. 14. — P. 325—337.
34. Olsson P. E. Metallothionein gene expression and regulation in fish / P. E. Olsson // *Biochemistry and Molecular Biology of Fishes.* — Amsterdam : Elsevier, 1993. — P. 259—278.
35. Olsson P. E. Metallothioneins in fish: induction and use in environmental monitoring / P. E. Olsson // *Toxicology of Aquatic Pollution: Physiological, Molecular and Cellular Approaches.* — Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 1996. — P. 187—203.
36. Interaction of cadmium and oestradiol 17 beta on metallothionein and vitellogenin synthesis in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) / P. E. Olsson, P. Kling, C. Pettersson [et al.] // *Biochem. J.* — 1995. — Vol. 307. — P. 197—203.
37. The physiological impairment of free-ranging brown trout exposed to metals in the Clarke Fork River, Montana / A. M. Farag, M. A. Stansbury, C. Hogstrund [et al.] // *Can. J. Fish. Aquat. Sci.* — 1995. — Vol. 52. — P. 2038—2050.
38. Столяр О. Б. Роль металотіонеїнів в детоксикації йонів міді і цинку, марганцю та свинцю в організмі прісноводних риб і молюсків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. біол. наук / О. Б. Столяр. — Львів, 2004. — 32 с.
39. Порівняльний аналіз функції металотіонеїнів прісноводних тварин за дії на організм важких металів / О. Б. Столяр, Г. І. Фальфушинська, Р. Л. Михайлів [та ін.] // *Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка.* — 2005. — №3(26) : Спеціальний випуск: Гідроекологія. — С. 423—425. — (Серія : Біологія).
40. Kling P. Metallothionein: structure and regulation / P. Kling, P. E. Olsson // *Biochemistry and Molecular Biology of Fishes.* Vol. 6. *Environmental Toxicology.* — Amsterdam : Elsevier, 2005. — P. 289—302.
41. Функції металотіонеїнів та системи антиоксидантного захисту за дії Co- та Zn-вмісних нанокompatитів на карася сріблястого (*Carassius auratus gibelio*) / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, О. О. Турта [та ін.] // *Український біохімічний журнал.* — 2013. — Т. 85, № 3. — С. 52—61.
42. Kothary R. K. Induction of a novel set of polypeptides by heat shock or sodium arsenite in cultured cells of rainbow trout / R. K. Kothary, E. P. M. Candido // *Can. J. Biochem.* — 1982. — Vol. 60. — P. 347—357.
43. Sanders B. M. Stress proteins in aquatic organisms: an environmental perspective / B. M. Sanders // *CRC Crit. Rev. Toxicol.* — 1993. — Vol. 23. — P. 49—75.
44. Accumulation of HSP70 in juvenile and adult rainbow trout gill exposed to metal-contaminated water and/or diet / J. H. Williams, A. M. Farag, M. A. Stasbury [et al.] // *Environ. Toxicol. Chem.* — 1996. — Vol. 15. — P. 1324—1328.
45. Handling stress does not affect the expression of hepatic heat shock protein 70 and conjugation enzymes in rainbow trout treated with beta-naphthoflavone / M. M. Vijayan, C. Pereira, R. B. Forsyth [et al.] // *Life Sci.* — 1997. — Vol. 61. — P. 117—127.

46. Heat shock protein expression in fish / G. K. Iwama, P. T. Thomas, R. B. Forsyth [et al.] // Rev. Fish Biol. Fish. — 1998. — Vol. 8. — P. 35—56.
47. Induction of heme oxygenase in fish by heavy metals, phenylhydrazine and high lipid diets / M. Lunde, B. E. Gosvik, K. Hamre [et al.] // 9th Intern. Symp. on Pollutant Responses in Marine Organisms (PRIMO 9) (Bergen, Norway, April 27-30) : proc. — Bergen, 1998.
48. Genetic damage and the molecular/cellular response to pollution / M.P. Cajaraville, L. Hauser, G. Carvalho [et al.] // Effects of pollution on fish. Molecular effects and population responses / [eds. A. Lawrence, K. Hemingway]. — Oxford : Blackwell Science, 2003. — P. 14—82.
49. Онисковец М. Я. Влияние ионов свинца на уровень экспрессии белков теплового шока HSP70 и HSC70 в головном мозге *Cyprinus carpio* L. / М. Я. Онисковец, В. В. Снитинский // Труды БГУ. — 2013. — Т. 8, ч. 1. — С. 167—169.
50. Kurelec B. A new type of hazardous chemical: the chemosensitizers of multixenobiotic resistance / B. Kurelec // Environ. Health Perspect. — 1997. — Vol. 105. — P. 855—860.
51. Kurelec B. The multixenobiotic resistance mechanism in aquatic organisms / B. Kurelec // CRC Crit. Rev. Toxicol. — 1992. — Vol. 22. — P. 23—43.
52. Expression and functional activity of P-glycoprotein in cultured hepatocytes from *Oncorhynchus mykiss* / A. Sturm, C. Ziemann, K. I. Hirsch-Ernst [et al.] // Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. — 2001. — Vol. 281. — P. R1119—1126.
53. Sturm A. P-glycoproteins and xenobiotic efflux transport in fish / A. Sturm, H. Segner // Biochemistry and Molecular Biology of Fishes / [eds. T. P. Mommsen, T. W. Moon]. — 2005. — Vol. 6. — P. 495—533.
54. Gene expression analysis of the ABC efflux transporters in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) / J. Loncar, M. Popovic, R. Zaja [et al.] // Comp. Biochem. Physiol. — 2010. — Vol. C, 151. — P. 209—215.
55. P-gp expression in brown trout erythrocytes: evidence of a detoxification mechanism in fish erythrocytes / E. Valton, C. Amblard, I. Wawrzyniak [et al.] // Scientific Reports. — 2013. — № 3.
56. Effects on UDP glucuronosyl transferase, glutathione transferase, DT-diaphorase and glutathione reductase activities in rainbow trout liver after long-term exposure to PCB / L. Forlin, S. Blom, M. Celander [et al.] // Mar. Environ. Res. — 1996. — Vol. 42. — P. 213—216.
57. Forlin L. Comparative studies of hepatic xenobiotic metabolizing and antioxidant enzymes in different fish species / L. Forlin, P. Lemaire, D. R. Livingstone // Mar. Environ. Res. — 1995. — Vol. 39. — P. 201—204.
58. Борвинская Е. В. Глутатион-S-трансферазы рыб — потенциальные экологобиохимические индикаторы антропогенного воздействия на водную среду (обзор) / Е. В. Борвинская, Л. П. Смирнов, Н. Н. Немова // Труды Карельского научного центра РАН. — 2009. — № 3. — С. 8—19.
59. Incorporation of biomarkers into ecological risk assessments of contaminated nearshore marine habitats / T. K. Collier, L. L. Johnson, M. S. Myers [et al.] // Mar. Environ. Res. — 1996. — Vol. 42. — P. 274—275.
60. Ruddock P. J. Bile metabolites of polycyclic aromatic hydrocarbons in three species of fish from the severn estuary / P. J. Ruddock, D. J. Bird, D. V. McCalley // Ecotoxicol. Environ. Saf. — 2002. — Vol. 51. — P. 97—105.

61. Metabolic products as biomarkers / M. J. Melancon, R. Alscher, W. H. Benson [et al.] // Biomarkers: Biochemical, Physiological, and Histological Markers of Anthropogenic Stress. — Boca Raton, FL : Lewis Publishers, 1992. — P. 87—123.
62. Xu H. Suitability of carboxylated porphyrin profiles as a biochemical indicator in whitefish (*Coregonus clupeaformis*) exposed to bleached kraft pulp mill effluent / H. Xu, S. Lesage, K. R. Munkittrick // Environ. Toxicol. Water Q. — 1994. — Vol. 9. — P. 223—230.
63. Spear P. A. Retinoids: from metabolism to environmental monitoring / P. A. Spear, A. Y. Bilodeau, A. Branchard // Chemosphere. — 1992. — Vol. 25. — P. 1733—1738.
64. Effects of 3,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl on the dynamics of vitamin A in brook trout (*Salvelinus fontinalis*) and intestinal retinoid concentrations in lake sturgeon (*Acipenser fulvescens*) / A. Ndayibagira, M. J. Cloutier, P. D. Anderson [et al.] // Can. J. Fish. Aquat. Sci. — 1995. — Vol. 52. — P. 512—520.
65. The biology and toxicology of retinoids in fish / D. Alsop, G. Van der Kraak, S. B. Brown [et al.] // Biochemistry and Molecular Biology of Fishes. Vol. 6. Environmental Toxicology. — Amsterdam : Elsevier, 2005. — P. 413—430.
66. Gillespie R. B. Allozyme frequency analysis of aquatic populations as an indicator of contaminant-induced impacts / R. B. Gillespie, S. I. Guttman // Environmental Toxicology and Risk Assessment. Vol. 2. — Philadelphia, PA : American Society for Testing and Materials, 1993. — P. 34—135.
67. Genetic and molecular ecotoxicology: a research framework / S. Anderson, W. Sadinski, L. Shugart [et al.] // Environ. Health Perspect. — 1994. — Vol. 102, suppl. 12. — P. 3—8.
68. High frequency of K-ras mutations in pink salmon embryos experimentally exposed to Exxon Valdez oil / N. K. Roy, J. Stabile, J. E. Seeb [et al.] // Environ. Toxicol. Chem. — 1999. — Vol. 18. — P. 1521—1528.
69. Theodorakis C. W. Genetic responses as population-level biomarkers of stress in aquatic ecosystems / C. W. Theodorakis, I. I. Wirgin // Biological indicators of aquatic ecosystem stress. — Bethesda, MD : American Fisheries Society, 2002. — P. 149—186.
70. Wirgin I. I. Molecular biomarkers in aquatic organisms: DNA damage and RNA expression / I. I. Wirgin, C. W. Theodorakis // Biological indicators of aquatic ecosystem stress. — Bethesda, MD : American Fisheries Society, 2002. — P. 43—110.
71. Fish and chips: various methodologies demonstrate utility of a 16,006-gene salmonid microarray / K. R. von Schalburg, M. L. Rise, G. A. Cooper [et al.] // BMC Genomics. — 2005. — Vol. 6. — P. 126.
72. Gene expression patterns in rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*, exposed to a suite of model toxicants / S. E. Hook, A. D. Skillman, J. A. Small [et al.] // Aquat. Toxicol. — 2006. — Vol. 77. — P. 372—385.
73. Differential gene expression associated with dietary methylmercury (MeHg) exposure in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) and zebrafish (*Danio rerio*) / Q. Liu, N. Basu, G. Goetz [et al.] // Ecotoxicology. — 2013. — Vol. 22(4). — P. 740—751.
74. Korcock D. E. Effects of sampling conditions on selected blood variables of rainbow trout, *Salmo gairdneri* Richardson / D. E. Korcock, A. H. Houston, J. D. Gray // J. Fish Biol. — 1988. — Vol. 33. — P. 319—330.

75. Iwama G. K. The effects of five fish anaesthetics on acid-base balance, haematocrit, blood gases, cortisol, and adrenaline in rainbow trout / G. K. Iwama, J. C. McGeer, M. P. Pawluk // Can. J. Zool. — 1989. — Vol. 76. — P. 2065—2073.
76. Waring C. P. The effects of handling on flounder (*Platichthys flesus* L.) and Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) / C. P. Waring, R. M. Stagg, M. G. Poxton // J. Fish Biol. — 1992. — Vol. 41. — P. 131—144.
77. Houston A. H. Review: are the classical hematological variables acceptable indicators of fish health / A. H. Houston // Trans. Am. Fish. Soc. — 1997. — Vol. 126. — P. 879—894.
78. Sepúlveda M. S. Physiological changes in largemouth bass exposed to paper mill effluents under laboratory and field conditions / M. S. Sepúlveda, E. P. Gallagher, T. S. Gross // Ecotoxicology. — 2004. — Vol. 13. — P. 291—301.
79. Histopathological markers for copper toxicity in rainbow trout fry (*Oncorhynchus mykiss*) / N. A. Salman, J. L. Ullman, K. Snekvik [et al.] // Basrah J. Agric. Sci. — 2012. — Vol. 25, sp. iss. 2. — P. 26—39.
80. Inhibition of testicular growth in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) exposed to estrogenic alkylphenolic chemicals / S. Jobling, D. Sheahan, J. A. Osborne [et al.] // Environ. Toxicol. Chem. — 1996. — Vol. 15. — P. 194—202.
81. Руднева И. И. Изменение состава сывороточных преальбуминов рыб как ответная реакция на хроническое загрязнение морской среды / И. И. Руднева, Т. Б. Вахтина, И. Н. Залевская // Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов-2 : Междунар. науч.-практ. конф. : расш. мат. — Борок ; М., 2007. — С. 230—233.
82. Ali Louei Monfared. Histomorphometric and biochemical studies on the liver of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) after exposure to sublethal concentrations of phenol / Ali Louei Monfared, Amir Parviz Salati // Toxicology and Industrial Health. — 2012. — Vol. 29, № 9. — P. 856—861.
83. A field study of physiological effects on fish in lead-contaminated lakes / C. Haux, Å. Larsson, G. Lithner [et al.] // Environ. Toxicol. Chem. — 1986. — Vol. 5. — P. 283—288.
84. Inhibition of testicular growth in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) exposed to estrogenic alkylphenolic chemicals / S. Jobling, D. Sheahan, J. A. Osborne [et al.] // Environ. Toxicol. Chem. — 1996. — Vol. 15. — P. 194—202.
85. Pottinger T. G. The three-spined stickleback as an environmental sentinel: effects of stressors on whole-body physiological indices / T. G. Pottinger, T. R. Carrick, W. E. Yeomans // J. Fish Biol. — 2002. — Vol. 61. — P. 207—229.
86. Immunocompetence of juvenile Chinook salmon against *Listonella anguillarum* following dietary exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons / R. C. Palm, D. B. Powell, A. Skillman [et al.] // Environ. Toxicol. Chem. — 2003. — Vol. 22. — P. 2986—2994.
87. Toxic effects of dietborne metals: laboratory studies / R. D. Handy, J. C. McGeer, H. E. Allen [et al.] // Toxic effects of dietborne metal exposure: laboratory studies. — Pensacola, FL : SETAC Press, 2005. — P. 59—112.
88. Dethloff G. M. Effects of dissolved copper on select hematological, biochemical, and immunological parameters of wild rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) / G. M. Dethloff, H. C. Bailey, K. J. Maier // Arch. Environ. Contam. Toxicol. — 2001. — Vol. 40. — P. 371—380.
89. Toxicology of dietary nickel in lake whitefish (*Coregonus clupeaformis*) / M. D. Ptashynski, R. M. Pedlar, R. E. Evans [et al.] // Aquat. Toxicol. — 2002. — Vol. 58. — P. 229—247.

90. Maximum limits of organic and inorganic mercury in fish feed / M. H. G. Berntssen, K. Hylland, K. Julshamn [et al.] // *Aquacult. Nutr.* — 2004. — Vol. 10. — P. 83—97.
91. Adiele R. C. Reciprocal enhancement of uptake and toxicity of cadmium and calcium in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) liver mitochondria / R. C. Adiele, D. Stevens, C. Kamunde // *Aquatic Toxicology.* — 2010. — Vol. 96, iss. 4. — P. 319—327.
92. Desforges P. R. The effects of exogenous extracellular carbonic anhydrase on CO₂ excretion in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*): role of plasma buffering capacity / P. R. Desforges, K. M. Gilmour, S. F. Perry // *J. Comp. Physiol.* — 2001. — Vol. 171B. — P. 465—473.
93. Handy R. D. Biomarker approaches for ecotoxicological biomonitoring at different levels of biological organisation / R. D. Handy, A. N. Jha, M. H. Depledge // *Handbook of Environmental Monitoring.* — New York, 2002. — P. 9.1—9.32.
94. Hinton D. E. Integrative histological approaches to detecting effects of environmental stressors on fishes / D. E. Hinton, D. J. Laurén // *Biological Indicators of Stress in Fish.* Vol. VIII. — Bethesda, MD : American Fisheries Society, 1990. — P. 51—66.
95. Histopathologic biomarkers / D. E. Hinton, P. C. Baumann, G. R. Gardner [et al.] // *Biomarkers: biochemical, physiological, and histological markers of anthropogenic stress.* — Boca Raton, FL : Lewis Publishers, 1992. — P. 155—209.
96. Liebel S. Fish histopathology as biomarker to evaluate water quality / S. Liebel, M. E. M. Tomotake, C. A. Oliveira Ribeiro // *Ecotoxicol. Environ. Contam.* — 2013. — Vol. 8, iss. 2. — P. 9—15.
97. Reddy P. B. Assessment of aquatic pollution using histopathology in fish as a protocol / P. B. Reddy, S. S. Rawat // *International Research Journal of Environment Sciences.* — 2013. — Vol. 2, iss. 8. — P. 79—82.
98. Терновенко В. А. Поведенческие реакции рыб и их использование для обнаружения загрязнителей в водной среде / В. А. Терновенко, Е. Л. Никифоров // *Методы ихтиотоксикологических исследований : Первый Всесоюз. симп. по методам ихтиотокс. исследований (Ленинград, октябрь 1987 г.) : тезисы докл.* — Л., 1987. — С. 125—126.
99. Черкашин С. А. Метод оценки токсичности веществ, основанный на избегании гидробионтами неблагоприятных факторов / С. А. Черкашин // *Методы ихтиотоксикологических исследований : Первый Всесоюз. симп. по методам ихтиотокс. исследований (Ленинград, октябрь 1987 г.) : тезисы докл.* — Л., 1987. — С. 133—135.
100. Little E. E. Swimming behaviour as an indicator of sublethal toxicity in fish / E. E. Little, S. E. Finger // *Environ. Toxicol. Chem.* — 1990. — Vol. 9. — P. 13—20.
101. Handy R. D. Physiological responses: their measurement and use as environmental biomarkers in ecotoxicology / R. D. Handy, M. H. Depledge // *Ecotoxicology.* — 1999. — Vol. 8. — P. 329—349.
102. Metabolic trade-off between locomotion and detoxification for maintenance of blood chemistry and growth parameters by rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) during chronic dietary exposure to copper / R. D. Handy, D. W. Sims, A. Giles [et al.] // *Aquat. Toxicol.* — 1999. — Vol. 47, № 1. — P. 23—41.
103. Campbell H. A. Increased metabolic cost of swimming and consequent alterations to circadian activity in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) exposed to dietary

- copper / H. A. Campbell, R. D. Handy, D. W. Sims // Can. J. Fish. Aquat. Sci. — 2002. — Vol. 59. — P. 768—777.
104. Campbell H. A. Shifts in a fish's resource holding power during a contact paired interaction: the influence of a copper contaminated diet in rainbow trout / H. A. Campbell, R. D. Handy, D. W. Sims // Physiol. Biochem. Zool. — 2005. — Vol. 78. — P. 706—714.
105. Scott G. R. The effects of environmental pollutants on complex fish behaviour: integrating behavioural and physiological indicators of toxicity / G. R. Scott, K. A. Sloman // Aquatic Toxicology. — 2004. — Vol. 68. — P. 369—392.
106. Шакирова Ф. М. Биоиндикация загрязнения Куйбышевского водохранилища по морфологическим аномалиям рыб / Ф. М. Шакирова // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК»: Междунар науч.-практ. конф., 17-19 дек. 2007 г. : мат. — М., 2007. — С. 370—372.
107. Швырева Н. С. Ихтиоценозы как эффективный индикатор экологического состояния водоемов / Н. С. Швырева // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК»: Междунар науч.-практ. конф., 17-19 дек. 2007 г. : мат. — М., 2007. — С. 432—433.
108. Kolkwitz R. Grundsätze für die biologische Beurteilung des Wassers nach seiner Flora und Fauna. Aus. 1 / R. Kolkwitz, M. Marsson. — BerlinDahlem : Mitteilungen der königlichen Prüfanstalt Wasserversorgung Abwasserbeseitigung, 1902. — P. 33—72.
109. Олексив И. Т. Показатели качества природных вод с экологических позиций / Олексив И. Т. — Львов : Свит, 1994. — 234 с.

REFERENCES

1. Alabaster, Dzh., & Lloyd, R. (1984). *Kriterii kachestva vody dlya presnovodnykh ryb*. Moskva : Legkaya i pishchevaya promyshlennost'.
2. Vasenko, A. G. (1988). O roli biotestirovaniya i bioindikatsii v sisteme toksikologicheskogo kontrolya. *Pervaya Vsesoyuznaya konferentsiya po rybokhozyaystvennoy toksikologii: tezisy dokladov. Ch. 1*. Riga, 55-56.
3. Moiseenko, T. I. (2009). *Vodnaya ekotoksikologiya. Teoreticheskie i prikladnye aspekty*. Moskva : Nauka.
4. Antonova, V. P., Bezumova, A. L., & Zavisha, A. G. et al. (2000). Prichiny neblagopoluchnogo sostoyaniya zapasov lososevidnykh ryb Pechorskogo basseyna v sovremennykh usloviyakh. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 326, 31-40.
5. Chovanec, A., Hofer, R., & Schiemer, F. (2003). Fish as bioindicators. *Bioindicators & biomonitors. Principles, concepts and applications*. Oxford : Elsevier, 639-676.
6. Scardi, M., Tancioni, L., & Cataudella, S. (2006). Monitoring methods based on fish. *Biological monitoring of rivers*. Chichester : John Wiley & Sons, 135-153.
7. Kurzykina, L. G., & Artem'eva, N. V. (1985). Vliyanie poliamidnoy smoly «Kyumene» na ryb i vodnykh bespozvonochnykh. *Problemy vodnoy toksikologii*. Petrozavodsk, 54-57.
8. Lazorchak, J. M., Hill, B. H., & Brown, B. S. et al. (2003). USEPA biomonitoring and bioindicator concepts needed to evaluate the biological integrity of aquatic systems. *Bioindicators & biomonitors. Principles, concepts and applications*. Oxford : Elsevier, 831-874.

9. Van der Oost, R., Beyer, J., & Vermeulen, N. P. E. (2003). Fish bioaccumulation and biomarkers in environmental risk assessment: a review. *Environ. Toxicol. Pharmacol.*, 13, 57-149.
10. Dudkin, S. I. (2005). Biokhimicheskie metody bioindikatsii toksicheskogo vozdeystviya na gidrobionty. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom bassejne*. Krasnodar, 292-315.
11. Demchenko, V. A., Antonovskiy, A. G., & Demchenko, N. A. et al. (2008). Bioindikatsiya kachestva vody i sostoyaniya gidroekosistem s ispol'zovaniem kharakteristik osobey, populyatsiy i soobshchestv ryb. *Suchasni problemy teoretychnoi ta praktychnoi ikhtiologii : I Mizhnarodna ikhtiologichna naukovopraktychna konferentsiia : tezy*. Kaniv, 52-56.
12. Schlenk, D., Handy, R., & Steinert, S. (2008). Biomarkers. *The toxicology of fishes*. Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, 683-731.
13. Munkittrick, K. R., & McCarty, L. S. (1995). An integrated approach to aquatic ecosystem health: top-down, bottom-up or middle-out? *J. Aquat. Ecosyst. Health*, 4, 77-90.
14. Rudneva, I. I. (2006). Primenenie biomarkerov ryb dlya ekotoksikologicheskoy diagnostiki vodnoy sredy. *Rybne hospodarstvo Ukrainy*, 1(42), 20-24.
15. Stegeman, J. J., Brouwer, M., & DiGuilio, R. T. (1992). Molecular responses to environmental contamination: enzyme and protein systems as indicators of chemical exposure and effect. *Biomarkers: biochemical, physiological, and histological markers of anthropogenic stress*. Boca Raton, FL : Lewis Publishers, 235-335.
16. Stegeman, J. J. (1994). Biochemistry and molecular biology of monooxygenases: current perspectives on forms, functions, and regulation of cytochrome P450 in aquatic species. *Aquatic Toxicology: Molecular, Biochemical, and Cellular Perspectives*. Boca Raton, FL : Lewis Publishers, 87-206.
17. Stegeman, J. J., & Lech, J. J. (1991). Cytochrome P450 monooxygenase systems in aquatic species: carcinogen metabolism and biomarkers for carcinogen and pollutant exposure. *Environ. Health Perspect.*, 90, 101-109.
18. Stegeman, J. J. (1993). The cytochromes P450 in fish. *Molecular Biology Frontiers*. Amsterdam : Elsevier.
19. Bucheli, T. D., & Fent, K. (1995). Induction of cytochrome P450 as a biomarker for environmental contamination in aquatic ecosystems. *CRC Crit. Rev. Environ. Sci. Technol.*, 25, 201-268.
20. Cook, P. M., Zabel, E. W., & Peterson, R. E. (1997). The TCDD toxicity equivalence approach for characterizing risks for early life-stage mortality in trout. *Chemically induced alterations in functional development and reproduction of fishes*. Pensacola, FL : SETAC Press, 9-27.
21. Buhler, D. R., & Wang-Buhler, J. L. (1998). Rainbow trout cytochrome P450s: purification, molecular aspects, metabolic activity, induction, and role in environmental. *Comp. Biochem. Physiol.*, 121C, 107-137.
22. Sarasquete, C., & Segner, H. (2000). Cytochrome P4501A (CYP1A) in teleostean fishes. A review of immunohistochemical studies. *The Science of the Total Environment*, 247, 2-3, 313-332.
23. Hahn, M. E., Merson, R. R., & Karchner, S. I. (2005). Xenobiotic receptors in fish: structural and functional diversity and evolutionary insights. *Biochemistry and molecular biology of fishes. 6. Environmental Toxicology*. Amsterdam : Elsevier, 191-232.

24. Yurchenko, V. V., & Chuyko, G. M. (2010). Aktivnost' etoksirezorufin-O-dietilazy (EROD) ryb kak biomarker zagryazneniya vodnoy sredy stoykimi organicheskimi zagryaznyayushchimi veshchestvami. *Sovremennye problemy fiziologii i biokhimi vodnykh organizmov. T. 1 : Ekologicheskaya fiziologiya i biokhimiya vodnykh organizmov : sbornik nauchnykh statey*. Petrozavodsk : KarNTs RAN, 316-319.
25. Johansson-Sjöbeck, M. L., & Larsson, A. (1979). Effects of inorganic δ -amino levulinic acid dehydratase activity and haematological variables in rainbow trout (*Salmo gairdneri*). *Arch. Environ. Contam. Toxicol.*, 8, 419-431.
26. Hyllner, J. S., Haux, C., & Andersson, T. et al. (1989). Cortisol induction of metallothionein in primary cultures of rainbow trout hepatocytes. *J. Cell Physiol.*, 139, 24-28.
27. Dallinger, R., Egg, M., & Köck, G. et al. (1997). The role of metallothionein in cadmium accumulation of Arctic char (*Salvelinus alpinus*) from high mountain lakes. *Aquat. Toxicol.*, 38, 47-66.
28. Iwama, G. K., Thomas, M. M., & Vijayan, M. M. et al. (1998). Stress protein expression in fish. *Rev. Fish Biol. Fish.*, 8, 35-56.
29. Iwama, G. K., Vijayan, M. M., & Forsyth, R. B. et al. (1999). Heat shock proteins and physiological stress in fish. *Am. Zoologist.*, 39, 901-909.
30. Janssens de Bisthoven, L. (1999). Biomonitoring with morphological deformities in aquatic organisms. *Biomonitoring of Polluted Water. Environmental Research Forum*, 9, 65-94.
31. Petukhov, S. A., Glubokov, A. I., & Gorkin, I. N. (1983). Rol' metallothioneina v kontsentriruvanii tyazhelykh metallov rybami. *Ekologicheskie aspekty khimicheskogo i radioaktivnogo zagryazneniya vodnoy sredy : sbornik nauchnykh trudov VNIRO. M. : Legkaya i pishchevaya promyshlennost'*, 36-40.
32. Roesijadi, G. (1992). Metallothionein in metal regulation and toxicology. *Aquat. Toxicol.*, 22, 81-114.
33. Sato, M., & Bremner, I. (1993). Oxygen free radicals and metallothionein. *Free Radic. Biol. Med.*, 14, 325-337.
34. Olsson, P. E. (1993). Metallothionein gene expression and regulation in fish. *Biochemistry and Molecular Biology of Fishes*. Amsterdam : Elsevier, 259-278.
35. Olsson, P. E. (1996). Metallothioneins in fish: induction and use in environmental monitoring. *Toxicology of Aquatic Pollution: Physiological, Molecular and Cellular Approaches*. Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 187-203.
36. Olsson, P. E., Kling, P., & Petterson, C. et al. (1995). Interaction of cadmium and oestradiol 17 beta on metallothionein and vitellogenin synthesis in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Biochem. J.*, 307, 197-203.
37. Farag, A. M., Stansbury, M. A., & Hogstrund, C. et al. (1995). The physiological impairment of free-ranging brown trout exposed to metals in the Clarke Fork River, Montana. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.*, 52, 2038-2050.
38. Stoliar, O. B. (2004). Rol metalotioneiniv v detoksykatsii yoniv midi i tsynku, marhantsiu ta svyntsiu v orhanizmi prsnovodnykh ryb i moliuskiv. *Extended abstract of Doctor's thesis*. Lviv.
39. Stoliar, O. B., Falfushynska, H. I., & Mykhailiv, R. L. et al. (2005). Porivnialnyi analiz funktsii metalotioneiniv prsnovodnykh tvaryn za dii na orhanizm vazhkykh metaliv. *Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka*, 3(26), 423-425.
40. Kling, P., & Olsson, P. E. (2005). Metallothionein: structure and regulation. *Biochemistry and Molecular Biology of Fishes. 6. Environmental Toxicology*. Amsterdam : Elsevier, 289-302.

41. Falfushynska, H. I., Hnatyshyna, L. L., & Turta, O. O. (2013). Funktsii metalotioneiniv ta systemy antyoksydantnoho zakhystu za dii Co- ta Zn-vmisnykh nanokompozytiv na karasia sribliastoho (*Carassius auratus gibelio*). *Ukrainskyi biokhimichnyi zhurnal*, 85, 3, 52-61.
42. Kothary, R. K., & Candido, E. P. M. (1982). Induction of a novel set of polypeptides by heat shock or sodium arsenite in cultured cells of rainbow trout. *Can. J. Biochem.*, 60, 347-357.
43. Sanders, B. M. (1993). Stress proteins in aquatic organisms: an environmental perspective. *CRC Crit. Rev. Toxicol.*, 23, 49-75.
44. Williams, J. H., Farag, A. M., & Stasbury, M. A. et al. (1996). Accumulation of HSP70 in juvenile and adult rainbow trout gill exposed to metal-contaminated water and/or diet. *Environ. Toxicol. Chem.*, 15, 1324-1328.
45. Vijayan, M. M., Pereira, C., & Forsyth, R. B. et al. (1997). Handling stress does not affect the expression of hepatic heat shock protein 70 and conjugation enzymes in rainbow trout treated with beta-naphthoflavone. *Life Sci.*, 61, 117-127.
46. Iwama, G. K., Thomas, P. T., & Forsyth, R. B. et al. (1998). Heat shock protein expression in fish. *Rev. Fish Biol. Fish*, 8, 35-56.
47. Lunde, M., Gosvik, B. E., & Hamre, K. (1998). Induction of heme oxygenase in fish by heavy metals, phenylhydrazine and high lipid diets. *9th International Symposium on Pollutant Responses in Marine Organisms (PRIMO 9) : proceedings*. Bergen.
48. Cajaraville, M. P., Hauser, L., & Carvalho, G. et al. (2003). Genetic damage and the molecular/cellular response to pollution. *Effects of pollution on fish. Molecular effects and population responses*. Oxford : Blackwell Science, 14-82.
49. Oniskovets, M. Ya., & Snitinskiy, V. V. (2013). Vliyanie ionov svintsa na uroven' ekspresii belkov teplovogo shoka HSP70 i HSS70 v golovnom mozge *Cyprinus carpio* L. *Trudy BGU*, 8, 1, 167-169.
50. Kurelec, B. (1997). A new type of hazardous chemical: the chemosensitizers of multixenobiotic resistance. *Environ. Health Perspect.*, 105, 855-860.
51. Kurelec, B. (1992). The multixenobiotic resistance mechanism in aquatic organisms. *CRC Crit. Rev. Toxicol.*, 22, 23-43.
52. Sturm, A., Ziemann, C., & Hirsch-Ernst, K. I. et al. (2001). Expression and functional activity of P-glycoprotein in cultured hepatocytes from *Oncorhynchus mykiss*. *Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol.*, 281, R1119-1126.
53. Sturm, A., & Segner, H. (2005). P-glycoproteins and xenobiotic efflux transport in fish. *Biochemistry and Molecular Biology of Fishes*, 6, 495-533.
54. Loncar, J., Popovic, M., & Zaja, R. et al. (2010). Gene expression analysis of the ABC efflux transporters in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Comp. Biochem. Physiol.*, C, 151, 209-215.
55. Valton, E., Amblard, C., & Wawrzyniak, I. et al. (2013). P-gp expression in brown trout erythrocytes: evidence of a detoxification mechanism in fish erythrocytes. *Scientific Reports*, 3.
56. Forlin, L., Blom, S., & Celander, M. et al. (1996). Effects on UDP glucuronosyl transferase, glutathione transferase, DT-diaphorase and glutathione reductase activities in rainbow trout liver after long-term exposure to PCB. *Mar. Environ. Res.*, 42, 213-216.
57. Forlin, L., Lemaire, P., & Livingstone, D. R. (1995). Comparative studies of hepatic xenobiotic metabolizing and antioxidant enzymes in different fish species. *Mar. Environ. Res.*, 39, 201-204.

58. Borvinskaya, E. V., Smirnov, L. P., & Nemova, N. N. (2009). Glutation-S-transferazy ryb — potentsial'nye ekologobiokhimicheskie indikatory antropogennogo vozdeystviya na vodnuyu sredu (obzor). *Trudy Karel'skogo nauchnogo tsentra RAN*, 3, 8-19.
59. Collier, T. K., Johnson, L. L., & Myers, M. S. (1996). Incorporation of biomarkers into ecological risk assessments of contaminated nearshore marine habitats. *Mar. Environ. Res.*, 42, 274-275.
60. Ruddock, P. J., Bird, D. J., & McCalley, D. V. (2002). Bile metabolites of polycyclic aromatic hydrocarbons in three species of fish from the severn estuary. *Ecotoxicol. Environ. Saf.*, 51, 97-105.
61. Melancon, M. J., Alscher, R., & Benson, W. H. et al. (1992). Metabolic products as biomarkers. *Biomarkers: Biochemical, Physiological, and Histological Markers of Anthropogenic Stress*. Boca Raton, FL : Lewis Publishers, 87-123.
62. Xu, H., Lesage, S., & Munkittrick, K. R. (1994). Suitability of carboxylated porphyrin profiles as a biochemical indicator in whitefish (*Coregonus clupeaformis*) exposed to bleached kraft pulp mill effluent. *Environ. Toxicol. Water Q.*, 9, 223-230.
63. Spear, P. A., Bilodeau, A. Y., & Branchard, A. (1992). Retinoids: from metabolism to environmental monitoring. *Chemosphere*, 25, 1733-1738.
64. Ndayibagira, A., Cloutier, M. J., & Anderson, P. D. et al. (1995). Effects of 3,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl on the dynamics of vitamin A in brook trout (*Salvelinus fontinalis*) and intestinal retinoid concentrations in lake sturgeon (*Acipenser fulvescens*). *Can. J. Fish. Aquat. Sci.*, 52, 512-520.
65. Alsop, D., Van der Kraak, G., & Brown, S. B. (2005). The biology and toxicology of retinoids in fish. *Biochemistry and Molecular Biology of Fishes*. 6. *Environmental Toxicology*. Amsterdam : Elsevier, 413-430.
66. Gillespie, R. B., & Guttman, S. I. (1993). Allozyme frequency analysis of aquatic populations as an indicator of contaminant-induced impacts. *Environmental Toxicology and Risk Assessment*. 2. Philadelphia, PA : American Society for Testing and Materials, 34-135.
67. Anderson, S., Sadinski, W., & Shugart, L. (1994). Genetic and molecular ecotoxicology: a research framework. *Environ. Health Perspect.*, 102, suppl. 12, 3-8.
68. Roy, N. K., Stabile, J., & Seeb, J. E. et al. (1999). High frequency of K-ras mutations in pink salmon embryos experimentally exposed to Exxon Valdez oil. *Environ. Toxicol. Chem.*, 18, 1521-1528.
69. Theodorakis, C. W., & Wirgin, I. I. (2002). Genetic responses as population-level biomarkers of stress in aquatic ecosystems. *Biological indicators of aquatic ecosystem stress*. Bethesda, MD : American Fisheries Society, 149-186.
70. Wirgin, I. I., & Theodorakis, C. W. (2002). Molecular biomarkers in aquatic organisms: DNA damage and RNA expression. *Biological indicators of aquatic ecosystem stress*. Bethesda, MD : American Fisheries Society, 43-110.
71. Schalburg, K. R. von, Rise, M. L., & Cooper, G. A. et al. (2005). Fish and chips: various methodologies demonstrate utility of a 16,006-gene salmonid microarray. *BMC Genomics*, 6, 126.
72. Hook, S. E., Skillman, A. D., & Small, J. A. et al. (2006). Gene expression patterns in rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*, exposed to a suite of model toxicants. *Aquat. Toxicol.*, 77, 372-385.

73. Liu, Q., Basu, N., & Goetz, G. et al. (2013). Differential gene expression associated with dietary methylmercury (MeHg) exposure in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) and zebrafish (*Danio rerio*). *Ecotoxicology*, 22(4), 740-751.
74. Korcock, D. E., Houston, A. H., & Gray, J. D. (1988). Effects of sampling conditions on selected blood variables of rainbow trout, *Salmo gairdneri*, Richardson. *J. Fish Biol.*, 33, 319-330.
75. Iwama, G. K., McGeer, J. C., & Pawluk, M. P. (1989). The effects of five fish anaesthetics on acid-base balance, haematocrit, blood gases, cortisol, and adrenaline in rainbow trout. *Can. J. Zool.*, 76, 2065-2073.
76. Waring, C. P., Stagg, R. M., & Poxton, M. G. (1992). The effects of handling on flounder (*Platichthys flesus* L.) and Atlantic salmon (*Salmo salar* L.). *J. Fish Biol.*, 41, 131-144.
77. Houston, A. H. (1997). Review: are the classical hematological variables acceptable indicators of fish health. *Trans. Am. Fish. Soc.*, 126, 879-894.
78. Sepúlveda, M. S., Gallagher, E. P., & Gross, T. S. (2004). Physiological changes in largemouth bass exposed to paper mill effluents under laboratory and field conditions. *Ecotoxicology*, 13, 291-301.
79. Salman N. A., Ullman J. L., Snekvik K. et al. (2012). Histopathological markers for copper toxicity in rainbow trout fry (*Oncorhynchus mykiss*). *Basrah J. Agric. Sci.*, 25, 2, 26-39.
80. Jobling, S., Sheahan, D., & Osborne, J. A. et al. (1996). Inhibition of testicular growth in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) exposed to estrogenic alkylphenolic chemicals. *Environ. Toxicol. Chem.*, 15, 194-202.
81. Rudneva, I. I., Vakhtina, T. B., & Zalevskaya, I. N. (2007). Izmenenie sostava syvorotochnykh preal'buminov ryb kak otvetnaya reaktsiya na khronicheskoe zagryaznenie morskoy sredy. *Problemy immunologii, patologii i okhrany zdorov'ya ryb i drugikh gidrobiontov-2 : Mezhdunarodnaya konferentsiya: materialy*. Borok ; Moskva, 230-233.
82. Ali, Louei Monfared, & Salati, Amir Parviz (2012). Histomorphometric and biochemical studies on the liver of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) after exposure to sublethal concentrations of phenol. *Toxicology and Industrial Health.*, 29, 9, 856-861.
83. Haux, C., Larsson, Å., & Lithner, G. et al. (1986). A field study of physiological effects on fish in lead-contaminated lakes. *Environ. Toxicol. Chem.*, 5, 283-288.
84. Jobling, S., Sheahan, D., & Osborne, J. A. et al. (1996). Inhibition of testicular growth in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) exposed to estrogenic alkylphenolic chemicals. *Environ. Toxicol. Chem.*, 15, 194-202.
85. Pottinger, T. G. Carrick, T. R., & Yeomans, W. E. (2002). The three-spined stickleback as an environmental sentinel: effects of stressors on whole-body physiological indices. *J. Fish Biol.*, 61, 207-229.
86. Palm, R. C., Powell, D. B., & Skillman, A. (2003). Immunocompetence of juvenile Chinook salmon against *Listonella anguillarum* following dietary exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons. *Environ. Toxicol. Chem.*, 22, 2986-2994.
87. Handy, R. D., McGeer, J. C., & Allen, H. E. et al. (2005). Toxic effects of dietborne metals: laboratory studies. *Toxic effects of dietborne metal exposure: laboratory studies*. Pensacola, FL : SETAC Press, 59-112.
88. Dethloff, G. M., Bailey, H. C., & Maier, K. J. (2001). Effects of dissolved copper on select hematological, biochemical, and immunological parameters of wild

- rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Arch. Environ. Contam. Toxicol.*, 40, 371-380.
89. Ptashynski, M. D., Pedlar, R. M., & Evans, R. E. et al. (2002). Toxicology of dietary nickel in lake whitefish (*Coregonus clupeaformis*). *Aquat. Toxicol.*, 58, 229-247.
90. Berntssen, M. H. G., Hylland, K., & Julshamn, K. (2004). Maximum limits of organic and inorganic mercury in fish feed. *Aquacult. Nutr.*, 10, 83-97.
91. Adiele, R. C., Stevens, D., & Kamunde, C. (2010). Reciprocal enhancement of uptake and toxicity of cadmium and calcium in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) liver mitochondria. *Aquatic Toxicology*, 96, 4, 319-327.
92. Desforges, P. R., Gilmour, K. M., & Perry, S. F. (2001). The effects of exogenous extracellular carbonic anhydrase on CO₂ excretion in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*): role of plasma buffering capacity. *J. Comp. Physiol.*, 171B, 465-473.
93. Handy, R. D., Jha, A. N., & Depledge, M. H. (2002). Biomarker approaches for ecotoxicological biomonitoring at different levels of biological organisation. *Handbook of Environmental Monitoring*, 9.1-9.32.
94. Hinton, D. E., & Laurén, D. J. (1990). Integrative histological approaches to detecting effects of environmental stressors on fishes. *Biological Indicators of Stress in Fish. VIII*. Bethesda, MD : American Fisheries Society, 51-66.
95. Hinton, D. E., Baumann, P. C., & Gardner, G. R. et al. (1992). Histopathologic biomarkers. *Biomarkers: biochemical, physiological, and histological markers of anthropogenic stress*. Boca Raton, FL : Lewis Publishers, 155-209.
96. Liebel, S., Tomotake, M. E. M., & Oliveira Ribeiro, C. A. (2013). Fish histopathology as biomarker to evaluate water quality. *Ecotoxicol. Environ. Contam.*, 8, 2, 9-15.
97. Reddy, P. B., & Rawat, S. S. (2013). Assessment of aquatic pollution using histopathology in fish as a protocol. *International Research Journal of Environment Sciences*, 2, 8, 79-82.
98. Ternovenko, V. A., & Nikiforov, E. L. (1987). Povedencheskie reaktsii ryb i ikh ispol'zovanie dlya obnaruzheniya zagryazniteley v vodnoy srede. *Metody ikhtiotoksikologicheskikh issledovaniy : Pervyy Vsesoyuznyy simpozium po metodam ikhtiotoksikologicheskikh issledovaniy: tezisy dokladov*. Leningrad, 125-126.
99. Cherkashin, S. A. (1987). Metod otsenki toksichnosti veshchestv, osnovanny na izbeganii gidrobiontami neblagopriyatnykh faktorov. *Metody ikhtiotoksikologicheskikh issledovaniy : Pervyy Vsesoyuznyy simpozium po metodam ikhtiotoksikologicheskikh issledovaniy: tezisy dokladov*. Leningrad, 133-135.
100. Little, E. E., & Finger S. E. (1990). Swimming behaviour as an indicator of sublethal toxicity in fish. *Environ. Toxicol. Chem.*, 9, 13-20.
101. Handy, R. D., & Depledge, M. H. (1999). Physiological responses: their measurement and use as environmental biomarkers in ecotoxicology. *Ecotoxicology*, 8, 329-349.
102. Handy, R. D., Sims, D. W., & Giles, A. (1999). Metabolic trade-off between locomotion and detoxification for maintenance of blood chemistry and growth parameters by rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) during chronic dietary exposure to copper. *Aquat. Toxicol.*, 47, 1, 23-41.
103. Campbell, H. A., Handy, R. D., & Sims, D. W. (2002). Increased metabolic cost of swimming and consequent alterations to circadian activity in rainbow trout

- (*Oncorhynchus mykiss*) exposed to dietary copper. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.*, 59, 768-777.
104. Campbell, H. A., Handy, R. D., & Sims, D. W. (2005). Shifts in a fish's resource holding power during a contact paired interaction: the influence of a copper contaminated diet in rainbow trout. *Physiol. Biochem. Zool.*, 78, 706-714.
105. Scott, G. R., & Sloman, K. A. (2004). The effects of environmental pollutants on complex fish behaviour: integrating behavioural and physiological indicators of toxicity. *Aquatic Toxicology*, 68, 369-392.
106. Shakirova, F. M. (2007). Bioindikatsiya zagryazneniya Kuybyshevskogo vodokhranilishcha po morfologicheskim anomalijam ryb. *Ratsional'noe ispol'zovanie presnovodnykh ekosistem — perspektivnoe napravlenie realizatsii natsional'nogo proekta «Razvitie APK» : Mezhdunarodnaya nauchno-prakt. konf. : materialy*. Moskva, 370-372.
107. Shvyreva, N. S. (2007). Ikhtiotensozy kak effektivnyy indikator ekologicheskogo sostoyaniya vodoemov. *Ratsional'noe ispol'zovanie presnovodnykh ekosistem — perspektivnoe napravlenie realizatsii natsional'nogo proekta «Razvitie APK» : Mezhdunarodnaya nauchno-prakt. konf.: materialy*. Moskva, 432-433.
108. Kolkwitz, R., & Marsson, M. (1902). *Grundsätze für die biologische Beurteilung des Wassers nach seiner Flora und Fauna. Aus. 1*. BerlinDahlem : Mitteilungen der königlichen Prüfanstalt Wasserversorgung Abwasserbeseitigung, 33-72.
109. Oleksiv, I. T. (1994). *Pokazateli kachestva prirodnikh vod s ekologicheskikh pozitsiy*. L'vov : Svit.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ (*SALMONIDAE*) В БИОМОНИТОРИНГЕ КАЧЕСТВА ВОДНОЙ СРЕДЫ (ОБЗОР)

Д. А. Янович, yandeni@yandex.ru, Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого, г. Львов

И. И. Грициняк, hrytsyniak@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Т. М. Швець, irguaan@bigmir.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Вследствие загрязнения рыбохозяйственных водоемов промышленными и сельскохозяйственными стоками, а также ксенобиотиками, поступающими из других источников, с учетом прогнозируемого увеличения объемов подобных выбросов в кратко- и долгосрочной перспективе, особую актуальность приобретают вопросы исследования влияния загрязняющих веществ различной природы и происхождения на гидробионтов, в частности рыб, а также прогнозирования возможных неблагоприятных последствий загрязнения водных экосистем. Целью проведенной работы является анализ и обобщение существующих литературных сведений по индикации в системе биомониторинга качества водной среды на основе показателей реакции лососевых рыб как высокочувствительных биологических маркеров объектов ихтиофауны к воздействию внешних факторов.

Результаты. В работе обобщены и систематизированы данные по использованию лососевых рыб в системе биомониторинговых исследований. Выделена и охарактеризована специфичность таких биоиндикационных показателей экологического состояния водной среды как биохимические, генетические, физиологические, морфологические, гистопатологические и популяционные маркеры, а также биоиндикационное значение поведенческих реакций рыб. Отмечены последствия экотоксикации гидроэкосистем в разрезе различных уровней биологической организации (клетка, особь, популяция, сообщество рыб). Описана возможность проведения биологического мониторинга, основываясь на индексах сапробности, выявленных для видов-индикаторов из семейства лососевых рыб.

Научная новизна. В статье приведена структура, определены преимущества и недостатки использования отдельных биомаркеров организма и популяций лососевых рыб для оценки экологического состояния водной среды.

Практическая значимость. Приведенные в статье данные могут быть использованы для совершенствования системы экологического мониторинга водной среды путем расширения индикаторных показателей биомаркерами организма и популяций высокочувствительных видов лососевых рыб.

Ключевые слова: биомониторинг, лососевые рыбы, водные экосистемы, биохимические маркеры, генетические биомаркеры, физиологические биомаркеры, морфологические биомаркеры, гистопатологические биомаркеры, популяционные биомаркеры.

APPLICATION OF SALMONIDS (*SALMONIDAE*) IN THE BIOMONITORING OF AQUATIC ENVIRONMENT (A REVIEW)

D. Yanovych, yandeni@yandex.ru, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj, Lviv

I. Hrytsyniak, hrytsyniak@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

T. Shvets, irgaaan@bigmir.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Due to the pollution of fisheries water bodies by industrial and agricultural waste waters, as well as by xenobiotics coming from other sources, taking into account a predictable increase in the amounts of such effluents in the short and long terms, the problems related to the study of the effects of the pollutants of different nature and origin on aquatic organisms, especially fish, as well as a prediction of possible adverse consequences on aquatic ecosystems, becomes particularly important. The aim of our work was an analysis and synthesis of existing literature data concerning the indication in the biomonitoring of aquatic environments based on biological markers of salmonids as highly sensitive objects of fish fauna to external factors.

Findings. The review summarizes and systematizes the data concerning the use of salmonids in biomonitoring studies. Furthermore, we highlighted and characterized the specificity of bioindication parameters of the aquatic environment state, such as the biochemical, genetic, physiological, morphological, histopathological, behavioral and population markers and noted the effects of hydroecosystem ecotoxication on different levels of biological organization (cell, individual, population, fish community). We also described the possibility of biological monitoring based on saprobic indexes identified for indicator species belonging to salmonids.

Originality. In the article describes the structure, pros and cons of the use of specific biomarkers of individual salmonid fish and their populations for assessing the ecological status of aquatic environments.

Practical value. The data given in the article can be used to improve the system of the ecological monitoring of aquatic environments by extending the range of indicator indices with organism and population biomarkers of highly sensitive salmonid species.

Keywords: biomonitoring, salmonids, aquatic ecosystems, biochemical markers, genetic biomarkers, physiological biomarkers, morphological biomarkers, histopathological biomarkers, population biomarkers.

БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТАРАНІ (*RUTILUS HECKELII*) ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКОЇ ГИРЛОВОЇ СИСТЕМИ

К. М. Гейна, Geina_k@mail.ru, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати морфологічну мінливість та основні біологічні характеристики сучасного стада тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи в умовах трансформованого стоку Дніпра.

Методика. Морфологічна мінливість визначена на підставі порівняння морфологічних ознак плітки *Rutilus rutilus* (Linnaeus, 1758) Каховського водосховища та напівпрохідної тарані *Rutilus rutilus heckelii* (Nordmann, 1840) Дніпровсько-Бузької гирлової системи. За основний критерій оцінки біологічного стану стада тарані взяті вікова, статева структури, характеристики росту, плодючість та вгодованість. Відбір іхтіологічних зразків здійснювався на стаціонарних контрольно-спостережних пунктах Інституту рибного господарства НААН України. Польова та камеральна обробка зібраних матеріалів виконана у відповідності до загальноновизнаних методик та керівництв.

Результати. Морфологічна мінливість тарані відмічається за пластичними ознаками, які стосуються рухового апарату, зокрема плавців, що є відповідною реакцією на перебіг трансформаційних процесів.

Особливістю сучасного біологічного стану стада є нестабільність вікової структури з домінуванням молодших вікових груп. Низька чисельність особин граничних груп правого крила вікового ряду при відносній стабільності темпу лінійного та масового росту свідчить про потужний тиск на поповнення промислової частини стада.

Наукова новизна. Вперше за останні роки проведений порівняльний аналіз пластичних та меристичних ознак тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи. Суттєво поновлена та доповнена існуюча інформація щодо вікової, статеві структури та темпу лінійно-вагового росту.

Практична значимість. Отримані дані є науковим підґрунтям оптимізації промислового навантаження на іхтіофауну Дніпровсько-Бузької гирлової системи, що має актуальність в плані підтримки біорізноманіття природних акваторій України.

Ключові слова: Дніпровсько-Бузька гирлова система, тараня, морфологічна мінливість, вікова структура, темп росту, плодючість, вгодованість.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Перебіг трансформаційних процесів у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі, який за сучасних умов відрізняється підвищеною інтенсивністю [1–3], призвів до суттєвих змін структурних характеристик іхтіофауни та промислових уловів, що знайшло відображення у відповідних публікаціях [4–6].

Попередніми дослідженнями встановлено, що у недалекому минулому тараня Дніпровсько-Бузької гирлової системи формувала основну частку промислових уловів серед категорії дрібночастикових риб. Проте сучасні улови характеризуються сталою тенденцією до зниження, що супроводжується негативними змінами відносної чисельності молодших вікових груп, які формують поповнення промислової частини популяції [7].

© К. М. Гейна, 2016

Вікова структура стада тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи характеризувалася певною нестабільністю. В кінці минулого та на початку поточного століття кількість вікових груп, які реєструвалися у нерестовому стаді, змінювалася від шести до одинадцяти, що обумовлювало коливання показників середнього виваженого віку при відносно сталих характеристиках росту [8]. Біологічний стан стада в цілому вказував на певну обмеженість запасу, що є наслідком інтенсивного промислового навантаження, особливо селективними знаряддями лову — дрібновічковими ставними сітками [9].

Ситуація, що склалася, викликає актуальну необхідність вивчення сучасного стану стада тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи з акцентуванням уваги на особливостях морфологічної будови тіла та основних біологічних показників.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Переважає більшість досліджень з вивчення біології тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи була проведена у минулому столітті. Питанням аналізу мінливості морфологічних ознак приділялася недостатня увага. Проте існуючі уявлення з даного питання свідчать про високу екологічну валентність напівпрохідної тарані [10]. При цьому визначено, що мінливість пластичних ознак не залежить від перебігу гідрологічних процесів [11].

У зв'язку з цим, основною метою даної роботи є вивчення сучасного стану стада тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи з акцентуванням уваги на мінливості пластичних та меристичних ознак в умовах трансформації річкового стоку Дніпра.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Збір іхтіологічних матеріалів здійснювався протягом 2001–2015 рр. на стаціонарних контрольно-спостережних пунктах Інституту рибного господарства НААН України, розташованих на акваторії Дніпровсько-Бузької гирлової системи.

Всі науково-дослідні роботи, які були пов'язані з вилученням водних біоресурсів, проводилися згідно протокольних рішень Науково-промислової ради центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства України. Дозволи на право проведення контрольних ловів надавалися місцевими органами рибохорони у відповідності до виділених квот на вилучення водних біоресурсів.

Іхтіологічні дослідження базувалися на контрольних та промислових ловах, у процесі яких було проведено зважування та комплекс морфологічних вимірювань за загальною схемою для корошових риб [12]. Вікову структуру стада визначали за методичними розробками В. Л. Брюзгіна [13] та Н. І. Чугунової [14]. Математична обробка отриманих результатів виконана за З. М. Аксютіною [15] з використанням електронних таблиць редактора Microsoft Office Excel 2003.

На неповний біологічний аналіз оброблено 2516 екз. тарані. Плодючість визначена в 255 екз. Морфологічна мінливість проаналізована на 195 екз. Зібрана та оброблена кількість іхтіологічного матеріалу дала змогу з певною мірою достовірності оцінити сучасний стан стада тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи. Матеріали стосовно плітки Каховського водосховища зібрані під час промислових зйомок 2014–2015 рр. у нижній ділянці водойми.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

У водоймах України, окрім номінативної форми плітки звичайної (*Rutilus rutilus*), дослідниками виділяється два підвиди: тараня *Rutilus rutilus heckelii* та плітка карпатська, або дунайська *Rutilus rutilus carpathorossicus*. Проте в сучасних умовах плітку розглядають в якості поліморфного виду *Rutilus rutilus*, який здатний утворювати в умовах нижніх течій річок з астатичним сольовим режимом напівпрохідні форми, зокрема у Каспійському басейні воблу (*Rutilus rutilus caspicus*), а в Азово-Чорноморському — тараню *Rutilus rutilus heckelii* [10].

Меристичні ознаки тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи виражені у наступних показниках: D — II–III 10–11; A — II (9–10) 11–12; P — I (14) 15–16; V — II 7–8; l.l. (42) 43–45; Sgu₁ (7) 8 (9); Sgu₂ 5–6.

За співвідношенням довжини до висоти, тіло тарані можна охарактеризувати як помірно видовжене, але досить високе — $H=29,91\pm0,31\%$ (lim 26,19–33,19%). Хвостове стебло коротке, становить в середньому $pl=19,34\pm0,36\%$ при коливаннях (lim) від 16,34 до 25,00% (табл. 1).

Таблиця 1. Пластичні ознаки тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи, n=160 екз.

Ознака	M	$\pm m$	Cv, %	min	max
l, см	21,35	0,30	17,7	18,20	25,30
У % до l					
l cor	79,74	0,23	3,7	76,60	82,59
H	29,91	0,31	13,1	26,19	33,19
h	9,86	0,13	17,3	8,29	11,16
iH	13,20	0,14	13,1	11,39	15,35
aD	51,68	0,37	9,1	48,62	57,69
pD	38,93	0,21	6,8	36,82	41,33
aP	24,39	0,19	9,7	22,53	27,32
aV	45,64	0,48	13,3	41,50	50,24
aA	72,22	0,37	6,5	68,89	75,66
PV	26,99	0,19	9,0	24,14	29,12
VA	26,03	0,37	17,8	22,55	29,47
ID	15,23	0,17	14,0	13,17	17,26
hD	21,34	0,22	13,0	18,81	24,02
IA	12,61	0,17	16,8	10,89	14,29
hA	13,25	0,16	15,1	11,39	14,98
IP	17,57	0,34	24,7	14,22	26,73
IV	16,86	0,33	25,1	13,79	25,74
pl	19,34	0,36	23,3	16,34	25,00
lc	21,75	0,18	10,4	20,00	24,23
У % до lc					
ar	27,75	0,36	16,3	23,91	32,00
do	25,45	0,31	15,2	22,45	29,55

**БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТАРАНІ (*RUTILUS HECKELII*)
ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКОЇ ГИРЛОВОЇ СИСТЕМИ**

Продовження табл. 1

Ознака	M	±m	Cv,%	min	max
pc	49,22	0,63	16,2	44,19	60,42
hc	80,66	0,93	14,6	69,77	91,67
io	38,04	0,37	12,4	34,04	41,46

Довжина основи дорсального плавця дорівнює $ID=15,23\pm0,17\%$ (lim 13,17–17,26%), висота $hD=21,34\pm0,22\%$ (lim 18,81–24,02%), що дозволяє охарактеризувати його як відносно невеликий. Перший промінь анального плавця розташований помітно позаду від вертикалі заднього кінця дорсального плавця. При цьому постдорсальна відстань дорівнює $pD=38,93\pm0,21\%$ (lim 36,82–41,33%).

Голова відносно невелика, досягає приблизно 1/5 частини довжини тіла – $lc=21,75\pm0,18\%$ (lim 20,00–24,23%). Співвідношення її висоти до довжини дорівнює в середньому $80,66\pm0,21\%$ (lim 36,82–41,33%). Рило тупе, коротке ($ag=27,75\pm0,36\%$), з відносно великим оком, діаметром приблизно рівним довжині рила — $do=25,45\pm0,31\%$ (lim 22,45–29,55%). Ширина лоба змінюється в межах від 34,04 до 41,46% довжини голови.

Аналіз морфологічних ознак тарані за районами Дніпровсько-Бузької гирлової системи вказує на існування певних відмінностей.

У дніпровської тарані черевні плавці розташовані ближче до хвостового відділу. При цьому анальний плавець бузької тарані є більш зміщеним у каудальному напрямку ($aA=73,13\pm0,42\%$). Різниця є статистично значимою ($p<0,05$), t-критерій Стюдента (t_d) дорівнює 4,05. За розташуванням грудних плавців достовірних розбіжностей не виявлено.

Також відмічена різниця і у розміщенні спинного плавця. У дніпровської тарані в порівнянні з бузькою він розташований ближче до відділу голови — відповідно $aD=50,28$ та 52,52% по відношенню до довжини тіла. У пониззі Південного Бугу тараня є більш високотілою ($H=30,52\%$; $h=10,26\%$), що є достовірним за показником t-критерію Стюдента, який дорівнює 3,00 та 4,97 відповідно до вказаних ознак. Також у тарані Південного Бугу довша та вища голова ($t_d=3,32$ –3,89). Найбільш суттєва різниця спостерігається за антевентральною відстанню — t-критерій Стюдента (t_d) =11,19 (табл. 2).

Таблиця 2. Порівняння пластичних ознак тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи (t_d)

Ознака	р. Дніпро, n=80 екз.			р. Південний Буг, n=80 екз.			t_d
	M	±m	Cv,%	M	±m	Cv,%	
l, см	21,14	0,34	14,2	21,48	0,44	18,2	0,60
У % до l							
l cor	79,16	0,44	5,0	80,08	0,24	2,7	1,84
H	28,89	0,38	11,8	30,52	0,38	11,2	3,00
h	9,19	0,18	17,3	10,26	0,12	10,4	4,97
iH	12,91	0,33	22,8	13,37	0,08	5,7	1,34
aD	50,28	0,33	5,8	52,52	0,47	8,1	3,90

Ознака	р. Дніпро, n=80 екз.			р. Південний Буг, n=80 екз.			t_d
	М	$\pm m$	Cv,%	М	$\pm m$	Cv,%	
pD	38,71	0,30	6,9	39,06	0,29	6,6	0,85
aP	24,00	0,19	7,1	24,62	0,27	9,6	1,88
aV	48,69	0,29	5,4	43,81	0,32	6,6	11,19
aA	70,71	0,43	5,4	73,13	0,42	5,1	4,05
PV	26,40	0,37	12,7	27,13	0,24	7,8	1,65
VA	24,47	0,45	16,6	26,96	0,39	13,1	4,14
ID	15,14	0,25	15,1	15,29	0,23	13,2	0,45
hD	21,33	0,32	13,3	21,35	0,30	12,6	0,05
IA	12,94	0,24	16,3	12,42	0,22	15,8	1,63
hA	13,49	0,12	7,9	13,11	0,24	16,4	1,41
IP	17,49	0,21	10,9	17,62	0,54	27,4	0,21
IV	16,59	0,28	15,2	17,02	0,51	26,8	0,73
pl	20,27	0,46	20,4	18,78	0,46	22,1	2,29
lc	21,10	0,24	10,0	22,13	0,21	8,3	3,32
У % до lc							
ar	27,30	0,61	20,1	28,01	0,44	14,1	0,94
do	24,91	0,51	18,3	25,77	0,37	12,9	1,35
pc	48,91	0,71	13,0	49,41	0,92	16,7	0,43
hc	76,67	1,36	15,9	83,04	0,91	9,8	3,89
io	37,08	0,66	16,0	38,62	0,41	9,4	1,98

За меристичними ознаками між дніпровською та бузькою таранею достовірної різниці не виявлено.

Важливим є порівняння тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи з пліткою Каховського водосховища, яка утворила жилу форму після зарегулювання стоку Дніпра. Аналіз показав, що плітка Каховського водосховища є більш високоспинною — за $N=32,79\%$ значення t -критерію Стюдента дорівнювало 5,65. При цьому черевні плавці є більш зміщеними у каудальному напрямку — $t_d=5,28$, що, в свою чергу, обумовило статистично значиму різницю ($p<0,05$) у вентроанальній відстані ($t_d=4,26$). У тарані також відзначено дещо меншу довжину основи анального плавця ($t_d=4,73$), але з більшою висотою — $t_d=5,78$ (табл. 3).

Таблиця 3. Порівняння пластичних ознак тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи (ДБГС) та плітки Каховського водосховища (t_d)

Ознака	ДБГС, n=160 екз.			Каховське водосховище, n=35 екз.			t_d
	М	$\pm m$	Cv,%	М	$\pm m$	Cv,%	
l, см	21,35	0,30	17,7	20,13	0,34	9,9	2,72
У % до l							
H	29,91	0,31	13,1	32,79	0,41	7,3	5,65
h	9,86	0,13	17,3	9,94	0,16	9,7	0,40

**БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТАРАНІ (*Rutilus rutilus*)
ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКОЇ ГИРЛОВОЇ СИСТЕМИ**

Продовження табл. 3

Ознака	ДБГС, n=160 екз.			Каховське водосховище, n=35 екз.			t _d
	M	±m	Cv,%	M	±m	Cv,%	
iH	13,20	0,14	13,1	13,67	0,17	7,3	2,15
aD	51,68	0,37	9,1	50,81	0,44	5,1	1,52
pD	38,93	0,21	6,8	38,63	0,25	3,8	0,91
aP	24,39	0,19	9,7	25,04	0,23	5,4	2,23
aV	45,64	0,48	13,3	49,81	0,63	7,4	5,28
aA	72,22	0,37	6,5	69,34	0,42	3,6	5,14
PV	26,99	0,19	9,0	27,83	0,24	5,0	2,74
VA	26,03	0,37	17,8	23,72	0,40	9,9	4,26
ID	15,23	0,17	14,0	15,43	0,20	7,8	0,73
hD	21,34	0,22	13,0	22,01	0,27	7,2	1,92
IA	12,61	0,17	16,8	13,93	0,22	9,4	4,73
hA	13,25	0,16	15,1	11,91	0,17	8,4	5,78
IP	17,57	0,34	24,7	17,52	0,41	13,8	0,10
IV	16,86	0,33	25,1	17,90	0,42	14,0	1,94
pl	19,34	0,36	23,3	19,23	0,42	13,0	0,19
Ic	21,75	0,18	10,4	22,24	0,22	5,8	1,76
У % до Ic							
ar	27,75	0,36	16,3	26,80	0,41	9,1	1,73
do	25,45	0,31	15,2	24,02	0,34	8,5	3,10
pc	49,22	0,63	16,2	45,85	0,70	9,0	3,58
hc	80,66	0,93	14,6	70,30	0,97	8,2	7,69
io	38,04	0,37	12,4	45,87	0,54	6,9	11,94

Статистично значима різниця також спостерігається за висотою голови — $h_c=80,66$ та $70,30\%$ відповідно у тарані та плітки ($t_d=4,64$). Проте у плітки голова набагато ширше, ніж у тарані — відповідно $45,87$ та $38,04\%$, що є статистично значимою різницею ($p<0,05$) за $t_d=11,94$. Достовірні відмінності існують за висотою голови ($t_d=7,69$) та позаоковим простором ($t_d=3,58$). За меристичними ознаками розбіжностей не виявлено.

У поточному столітті характерною рисою вікової структури стада тарані є поступове омолодження його промислової частини протягом 2003–2010 рр., коли середній виважений вік знизився з 5,2 до 3,9 років. Проте у 2011–2015 рр. цей показник поступово збільшився до 4,4–4,5 років (рис. 1).

Віковий ряд тарані складався з дев'яти груп — від трирічки до одинадцятирічки. При цьому граничні групи правого крила реєструвалися не кожного року і є малочисельними. Важливо наголосити, що у 2012–2015 рр. спостерігалася незначне розширення вікового ряду за рахунок особин старше дев'ятирічного віку. Їх частка в зазначені роки збільшилася від 0,2 до 1,7% загальної чисельності стада. Проте групами, які формують ядро стада, залишалися три-чотирирічки з питомою вагою 61,6–70,9% та приблизно рівним співвідношенням.

Примітка. Віковий склад 2001–2005 рр. — [8]

Рис. 1. Середній виважений вік стада тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи

Аналіз росту тарані вказує на відносну сталість показників середньої довжини та маси тіла. Крива росту характеризувалася повільним зростанням по мірі збільшення віку. Більшою мінливістю лінійний ріст відрізняється до семирічного віку. Варіабельність довжини тіла (C_v) зростала від 2,3% у чотирирічок (лім 17,6–19,3 см) до 4,0% у семирічок (лім 24,6–28,6 см). Зі збільшенням віку мінливість лінійних розмірів тарані суттєво знижувалася до 2,4% у дев'ятирічок.

За масою тіла ситуація дещо відрізнялася. Найбільша мінливість спостерігалася у трирічок (лім 61–88 г; $C_v=10,2\%$), шестирічок (лім 245–346 г; $C_v=10,7\%$), дев'ятирічок (лім 400–610 г; $C_v=10,4\%$) та десятирічок (лім 521–778 г; $C_v=15,2\%$). Відмічені особливості обумовлювалися статеву структурою вікових груп, де домінувала та чи інша стать, що вносило корективи у мінливість маси тіла.

Результати досліджень вказують на те, що протягом 2001–2015 рр. у нересті були задіяними від шести до дев'яти генерацій тарані. При цьому статеве співвідношення у стаді знаходилося у повній залежності від вікової структури стада взагалі.

Динаміка змін статевої структури характеризувалася поступовим вирівнюванням співвідношення самців і самиць до п'яти-шестирічного віку з подальшим зниженням частки самців у граничних групах правого крила вікового ряду, що є закономірним наслідком взаємовпливу статевого дозрівання та тривалості життєвого циклу.

Абсолютна індивідуальна плодючість тарані в залежності від віку змінюється в межах від $11,7 \pm 0,30$ тис. ікр. (лім 10,7–12,7 тис. ікр.) у трирічок до $134,1 \pm 1,65$ тис. ікр. (лім 132,4–135,7 тис. ікр.) у десятирічок (рис. 2).

Наведені дані вказують на те, що найбільш суттєві відхилення від середніх показників плодючості спостерігаються у віці шести–семи років — лім 78,9–91,2 та 96,4–109,4 тис. ікр. відповідно. На це вказує і динаміка змін коефіцієнтів варіації, які з трирічного до п'ятирічного віку спочатку знижуються від 6,9 до 4,1% з подальшим підвищенням у шести–семирічок до 5,6–7,6%. У старших вікових групах мінливість плодючості є незначною через малочисельність поколінь внаслідок суттєвого промислового тиску у відповідні роки.

**БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТАРАНІ (*RUTILUS HECKELII*)
ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКОЇ ГИРЛОВОЇ СИСТЕМИ**

Рис. 2. Абсолютна індивідуальна плодючість тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи, тис. ікр.

Динаміка змін вгодованості тарані свідчить про поступове збільшення від трирічного до п'яти-шестирічного віку — коефіцієнти за Фультоном зростали з 1,87 до 2,34–2,37 відповідно до вказаних вікових груп. Найбільш суттєвими відхилення від середніх показників спостерігаються у віці повного дозрівання стада — у п'ятирічок $\text{lim}=2,05\text{--}2,84$; у шестирічок $\text{lim}=1,91\text{--}2,63$ (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка вікових змін вгодованості тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи

Як свідчать наведені дані, у вікових групах від п'ятирічок до дев'ятирічок мінливість вгодованості була на відносно високому рівні ($Cv=8,1\text{--}9,8\%$). Суттєва нестабільність цього показника у граничних групах правого крила вікового ряду обумовлювалася значною різницею маси гонад та домінуванням самиць. При цьому, в молодших вікових групах, де кількість самців була вищою, варіабельність показників вгодованості є набагато нижчою — $Cv=5,77\text{--}7,39\%$.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Основними проявами морфологічної мінливості тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи є зміни пластичних ознак, які стосуються рухового апарату, зокрема плавців, що є відповідною реакцією організму на перебіг трансформаційних процесів, пов'язаних переважно зі змінами гідрологічного режиму водойми.

Найбільш важливою особливістю біологічного стану стада тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи протягом 2001–2015 рр. є відносна нестабільність вікової структури з домінуванням молодших вікових груп. Низька чисельність старших вікових груп при відносній сталості темпу лінійного та вагового росту свідчить про потужний промисловий тиск на ліве крило вікового ряду. Така ситуація потребує введення відповідних заходів, які б оптимізували промислове навантаження, що орієнтує на продовження досліджень щодо вивчення тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи під кутом раціоналізації промислової експлуатації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Екологічні передумови підвищення ефективності рибогосподарської експлуатації Дніпровсько-Бузької гирлової області / Б. С. Артющик, І. М. Шерман, Б. І. Правоторов [та ін.] // Таврійський науковий вісник. — 2003. — Вип. 29. — С. 17—20.
2. Шерман І. М. Генезис трансформації іхтіофауни після зарегулювання стоку річкових систем і утворення водосховищ / І. М. Шерман, В. Г. Пелих // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 2. — С. 39—42.
3. Екологічні трансформації річкових гідроекосистем та актуальні проблеми рибного господарства / І. М. Шерман, К. М. Гейна, С. В. Кутіщев [та ін.] // Рибогосподарська наука України. — 2013. — № 4. — С. 5—16.
4. Уловы и современное состояние промысловых рыб Днепровско-Бугской устьевой области / Б. И. Правоторов, В. И. Саркисян, В. Н. Горбонос [и др.] // Рыбное хозяйство Украины. — 2005. — № 5. — С. 15—18.
5. Правоторов Б. І. Зміни складу іхтіофауни та промислових уловів риби в Дніпровсько-Бузькій гирловій області / Б. І. Правоторов // Таврійський науковий вісник. — 2006. — Вип. 43. — С. 197—204.
6. Гейна К. Н. Качественная структура промысловых уловов рыбы в Днепровско-Бугской устьевой системе в конце XX века / К. Н. Гейна // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб : Вторая междунар. науч. конф. : матер. докл. — СПб. : ГосНИОРХ, 2013. — С. 95—97.
7. Гейна К. М. Ефективність відтворення та якісний склад молоді риб пониззя Дніпра на початку ХХІ століття / К. М. Гейна, В. М. Горбонос, Ю. К. Гейна // Современные рыбохозяйственные и экологические проблемы Азово-Черноморского региона : VIII Междунар. науч. конф. : матер. — Керчь : ЮгНИРО, 2013. — С. 178—181.
8. Гейна К. М. Вікова структура тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи у зв'язку з її промислом / К. М. Гейна, В. М. Горбонос // Таврійський науковий вісник. — 2006. — Вип. 46. — С. 118—123.
9. Дурова Ю. Г. Сучасний стан та шляхи оптимізації промислу тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи / Ю. Г. Дурова, К. М. Гейна // Таврійський науковий вісник. — 2014. — Вип. 90. — С. 167—172.

10. Мовчан Ю. В. Фауна України / Ю. В. Мовчан, А. І. Смирнов. — К. : Наукова думка, 1981. — Т. 8 : Риби. Вип. 2 : Коропів. — Ч. 1 : Плітка, ялець, голянь, краснопірка, амур, білізна, верховка, лин, чебачок амурський, підуст, пічкур, марена. — 428 с.
11. Спесивий Т. В. Вплив гідрологічних умов на мінливість пластичних ознак плітки (*Rutilus rutilus* L.) / Т. В. Спесивий, Ю. Г. Кузьменко // Рибогосподарська наука України. — 2008. — № 4. — С. 18—23.
12. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб / Правдин И. Ф. — М. : Пищевая промышленность, 1966. — 376 с.
13. Брюзгин В. Л. Методы изучения роста рыб по чешуе, костям и отолитам / Брюзгин В. Л. — К. : Наукова думка, 1969. — 187 с.
14. Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб / Чугунова Н. И. — М. : АН СССР, 1959. — 164 с.
15. Аксютин З. М. Элементы математической оценки результатов наблюдений в биологических и рыбохозяйственных исследованиях / Аксютин З. М. — М. : Пищевая промышленность, 1968. — 289 с.

REFERENCES

1. Artiushchuk, B. S., Sherman, I. M., & Pravotorov, B. I. et al. (2003). Ekologichni peredumovy pidvyshchennia efektyvnosti rybohospodarskoi ekspluatatsii Dniprovsko-Buzkoi hyrlovoi oblasti. *Tavriiskyi naukovyi visnyk*, 29, 17-20.
2. Sherman, I. M., & Pelykh, V. H. (2009). Henezys transformatsii ikhtiofauny pislia zarehuliuvannia stoku richkovykh system i utvorennia vodoskhovyshch. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 39-42.
3. Sherman, I. M., Heina, K. M., & Kutishchev, S. V. et al. (2013). Ekologichni transformatsii richkovykh hidroekosystem ta aktualni problemy rybnoho hospodarstva. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 5-16.
4. Pravotorov, B. I., Sarkisyan, V. I., & Gorbos, V. N. et al. (2005). Ulovy i sovremennoe sostoyanie promyslovyykh ryb Dneprovsko-Bugskoy ust'evoy oblasti. *Rybnoe khozyaystvo Ukrainy*, 5, 15-18.
5. Pravotorov, B. I. (2006). Zminy skladu ikhtiofauny ta promyslovyykh uloviv ryby v Dniprovsko-Buzkii hyrlovii oblasti. *Tavriiskyi naukovyi visnyk*, 43, 197-204.
6. Geina, K. N. (2013). Kachestvennaya struktura promyslovyykh ulovov ryby v Dneprovsko-Bugskoy ust'evoy sisteme v kontse XX veka. *Vosproizvodstvo estestvennykh populyatsiy tsennykh vidov ryb : Vtoraya mezhdunar. nauch. konf. Sankt-Peterburg : GosNIORKh*, 95-97.
7. Heina, K. M., Gorbos, V. M., & Heina, Yu. K. (2013). Efektyvnist vidtvorennia ta yakisnyi sklad molodi ryb ponyzzia Dnipra na pochatku XX stolittia. *Sovremennye rybokhozyaystvennye i ekologicheskie problemy Azovo-Chernomorskogo regiona : VIII Mezhdunar. nauch. konf. Kerch : YuhNYRO*, 178-181.
8. Heina, K. M., & Gorbos, V. M. (2006). Vikova struktura tarani Dniprovsko-Buzkoi hyrlovoi systemy u zviazku z yii promyslom. *Tavriiskyi naukovyi visnyk*, 46, 118-123.
9. Durova, Yu. H., & Heina, K. M. (2014). Suchasnyi stan ta shliakhy optymizatsii promyslu tarani Dniprovsko-Buzkoi hyrlovoi systemy. *Tavriiskyi naukovyi visnyk*, 90, 167-172.

10. Movchan, Yu. V., & Smyrnov, A. I. (1981). *Fauna Ukrainy. T. 8 : Ryby. Vyp. 2 : Koropovi. Ch. 1 : Plitka, yalets, holian, krasnopirka, amur, bilyzna, verkhovka, lyn, chebachok amurskyi, pidust, pichkur, marena.* (Vol. 1-40). Kyiv : Naukova dumka.
11. Spesyvyi, T. V., & Kuzmenko, Yu. H. (2008). Vplyv hidrolohichnykh umov na minlyvist plastychnykh oznak plitky (*Rutilus rutilus* L.). *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 18-23.
12. Pravdin, I. F. (1966). *Rukovodstvo po izucheniyu ryb.* Moskva : Pishchevaya promyshlennost'.
13. Bryuzgin, V. L. (1969). *Metody izucheniya rosta ryb po cheshue, kostyam i otolitam.* Kyiv : Naukova dumka.
14. Chugunova, N. I. (1959). *Rukovodstvo po izucheniyu vozrasta i rosta ryb.* Moskva : AN SSSR.
15. Aksyutina, Z. M. (1968). *Elementy matematicheskoy otsenki rezul'tatov nablyudeniy v biologicheskikh i rybokhozyaystvennykh issledovaniyakh.* Moskva : Pishchevaya promyshlennost'.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАРАНИ (*RUTILUS HECKELII*) ДНЕПРОВСКО-БУГСКОЙ УСТЬЕВОЙ СИСТЕМЫ

К. Н. Гейна, Geina_k@mail.ru, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Проанализировать морфологическую изменчивость и основные биологические характеристики современного стада тарани Днепроовско-Бугской устьевой системы в условиях трансформированного стока Днепра.

Методика. Морфологическая изменчивость определена на основании сравнения морфологических признаков плотвы *Rutilus rutilus* (Linnaeus, 1758) Каховского водохранилища и полупроходной тарани *Rutilus rutilus heckelii* (Nordmann, 1840) Днепроовско-Бугской устьевой системы. В качестве основного критерия оценки биологического состояния стада тарани взяты возрастная, половая структуры, характеристики роста, плодовитость и упитанность. Отбор ихтиологических проб осуществлялся на стационарных контрольно-наблюдательных пунктах Института рыбного хозяйства НААН Украины. Полевая и камеральная обработка собранных материалов выполнена в соответствии с общепринятыми методиками и руководствами.

Результаты. Анализ морфологической изменчивости показал, что между днепровской и бугской таранью имеются статистически достоверные различия. Наиболее существенными они отмечены по антеветральному расстоянию ($t_d=11,19$). Также достоверное различие наблюдалось по антеанальному и вентроанальному расстояниям $t_d=4,05-4,14$. По меристическим признакам достоверной разницы не отмечается.

Между таранью Днепроовско-Бугской устьевой системы и плотвой Каховского водохранилища, которая образовала жилую форму после зарегулирования стока Днепра, также отмечены определенные отличия. Плотва Каховского водохранилища более высокоспинная — при $N=32,79\%$ значение t -критерия Стьюдента составляло 5,65. При этом брюшные плавники оказались более смещенными к хвостовому плавнику ($t_d=5,28$), что, в свою очередь, обусловило статистически значимую разницу ($p<0,05$) по вентроанальному расстоянию ($t_d=4,26$). У тарани также отмечена несколько меньшая длина основы анального плавника ($t_d=4,73$), но его высота оказалась большей — $t_d=5,78$.

Главной особенностью современного биологического состояния стада тарани является доминирование младших возрастных групп. Низкая численность особей граничных групп правого крыла возрастного ряда при относительной стабильности характеристик роста свидетельствует об интенсивной нагрузке на пополнение промысловой части стада.

Научная новизна. Впервые за последние годы осуществлен сравнительный анализ пластических и меристических признаков тарани Днепроовско-Бугской устьевой системы. Существенно обновлена и дополнена существующая информация относительно возрастной, половой структуры стада и темпа линейно-весаого роста.

Практическая значимость. Полученные данные являются научной основой оптимизации промысловой нагрузки на ихтиофауну Днепроовско-Бугской устьевой системы, которая имеет актуальность в плане сохранения биоразнообразия природных акваторий Украины.

Ключевые слова: Днепроовско-Бугская устьевая система, тарань, морфологическая изменчивость, возрастная структура, темп роста, плодовитость, упитанность.

BIOLOGICAL FEATURES OF TARAN (*RUTILUS HECKELII*) OF THE DNIEPER-BUG ESTUARY SYSTEM

K. Geina, Geina_k@mail.ru, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To analyze morphological variability and basic biological features of the modern stock of taran of the Dnieper-Bug estuary system in the conditions of the transformed Dnieper flow.

Methodology. Morphological variability was determined based on the comparison of morphological features of roach *Rutilus rutilus* (Linnaeus, 1758) of the Kakhovka reservoir and semi-migratory taran *Rutilus rutilus heckelii* (Nordmann, 1840) of the Dnieper-Bug estuary system. As a main criterion of the evaluation of the taran stock biological state, we used age, sex structure, growth characteristics, fecundity and condition factor. Fish sampling was carried out at stationary monitoring-observation stations of the Institute of Fisheries NAAS of Ukraine. Field and cameral processing of the collected materials were performed based on conventional methods and guidelines.

Findings. Morphological variability analysis demonstrated significant differences between Dnieper and Bug taran. The highest differences were observed for antroventral distance ($t_d=11.19$). Significant differences were also observed for antenanal and ventroanal distances $t_d=4.05-4.14$. No significant differences were found for meristic features.

There were also significant differences between Dnieper-Bug taran and Kakhovka reservoir roach, which had formed a resident form after regulating the Dnieper River flow. Kakhovka reservoir roach is more deep-bodied with $H=32.79\%$, t -test value was 5.65. Pelvic fins were more shifted to the caudal fin ($t_d=5.28$) that resulted in significant difference ($p<0.05$) in ventroanal distance ($t_d=4.26$). Taran also had somewhat smaller length of the anal fin base ($t_d=4.73$) but its height was higher – $t_d=5.78$.

The main peculiarity of the current biological state of taran stock is the domination of young age groups. The small number of fish in the boundary groups of the age series right wing with relative stability of growth features indicate on intensive pressure on the commercial stock recruitment.

Originality. For the first time in recent years, we performed a comparative analysis of plastic and meristic features of taran of the Dnieper-Bug estuary system. The information on age, sexual structure and length-weight growth of the taran stock was significantly updated and supplemented.

Practical value. The obtained values are a scientific basis for optimizing commercial fishing pressure on fish fauna of the Dnieper-Bug estuary system, which is important in the regard of biodiversity conservation in the natural water bodies of Ukraine.

Keywords: Dnieper-Bug estuary system, taran, morphological variability, age structure, growth rate, fecundity, condition factor.

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 43-56

DOI: <http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.043>

УДК 639.371.14:639.371.2:639.371.5(477)

ВИРОЩУВАННЯ ПЕЛЯДІ (*COREGONUS PELED* GMELIN) В ПОЛІКУЛЬТУРІ З КОРОПОВИМИ (*CYPRINIDAE*) ТА ОСЕТРОВИМИ (*ACIPENSERIDAE*) РИБАМИ

Г. А. Куріненко, annazakharenko@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

А. І. Мрук, amruk@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

О. М. Колос, ilona_krasa@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати результати вирощування та дати рибницько-біологічну характеристику пеляді, вирощеної в полікультурі з осетровими та короповими рибами за ставової технології.

Методика. Матеріалом для досліджень слугували молодь, цьоголітки, однорічки та дволітки пеляді, отримані від ікри, завезеної в березні 2009 р. з Російської Федерації. Вирощування пеляді проводили за технологією, розробленою ВНДІСРГом для сигових риб з використанням методичних рекомендацій щодо біотехніки індустріального вирощування рибопосадкового матеріалу сигових риб. Дослідження проводилися у фермерському ставовому господарстві «Короп» Львівської області. Водопостачання вирощувальних ставів здійснювалось самопливом.

Вивчення живлення риб та гідробіологічні дослідження проводили за загальноприйнятими методиками.

Результати. Проведено доінкубування ікри та отримання личинок з подальшим підрощуванням у плаваючих садках до стадії малька.

Вирощування товарної пеляді в полікультурі дозволяє підвищити показники рибопродуктивності на першому році вирощування на 1,3%, та другому — на 0,9%. Середні показники маси однорічок та дволіток пеляді становили 185,3 г та 450,0 г відповідно. За даних умов вирощування показники добового приросту цьоголіток перебували в межах 0,1–1,5 г, дволіток — 1,1–3,3 г. Як позитивний результат вирощування, також потрібно відмітити високий показник зростання маси в зимовий період, що становив понад 50%.

Також досліджено кількісний і якісний склад зоопланктону дослідних ставів та характер живлення молоді.

Наукова новизна. Вперше проведені роботи з вирощування пеляді за ставовою технологією в полікультурі з короповими та осетровими рибами.

Практична значимість. Результати проведеної роботи разом з аналогічними попередніми роботами з вирощування в ставах будуть використані для створення методичних рекомендацій з вирощування рибопосадкового матеріалу пеляді в ставах, які в подальшому використовуватимуться рибницькими господарствами України.

Ключові слова: пелядь, ставове вирощування, полікультура, ріст, маса, морфометричні проміри, зоопланктон, живлення.

© Г. А. Куріненко, А. І. Мрук, О. М. Колос, 2016

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасний економічний стан аквакультури України потребує використання низьковитратних технологій. Тому пріоритетності набули випасні методи вирощування, основними об'єктами яких є планктоноїдні риби. Останні 60 років дана проблема в Україні успішно вирішується за рахунок далекосхідних інтродуцентів — білого та строкатого товстолобиків. Однак сучасний ринок вимагає більш широкого асортименту риб з цінними харчовими якостями. Таким перспективним планктонофагом є пелядь. Пелядь, або сирок (*Coregonus peled* Gmelin) — ендемічний вид сигових риб, які розповсюджені від р. Мезень (Республіка Комі, РФ) на заході до р. Колими (Якутія, Магаданська обл., РФ) на сході. Північна межа розповсюдження сибірської озерно-річкової пеляді збігається з морським узбережжям північних морів, а південна опускається до 60° північної широти. Дослідження минулих років показали, що пелядь може давати економічний ефект не лише за вирощування в озерних та ставових господарствах, організованих при вирощуванні її в монокультурі, але й як додатковий вид в коропових ставах. Пелядь має суттєві переваги, порівняно з основним планктонофагом аквакультури України — строкатим товстолобиком, а саме:

- живиться як за низької, так і за високої температури води (у завезеної в Україну в 60-х роках пеляді верхній поріг живлення становив 28°C);

- добре росте як у прісній, так і в мінералізованій воді (до 20 г/л);

- інкубування ікри відбувається в зимовий період, коли інкубаційний цех вільний;

- м'ясо пеляді характеризується високими смаковими якостями, його жирність складає 18%, частка філе в товарної риби досягає 75,8%;

- пелядь добре піддається технологічному обробленню, що дозволяє завантажувати коптільні цехи в міжсезоння та підвищувати рентабельність виробництва;

- вирощування пеляді в полікультурі з коропом та рослиноїдними рибами сприяє профілактиці гельмінтозів: проміжними господарями гельмінтів є активно споживані пеляддю веслоногі ракоподібні;

- за вирощування пеляді в полікультурі відсутня необхідність у додатковій годівлі штучними кормами (за виключенням індустріальної технології);

- пелядь — швидко дозріваюча риба — статева зрілість самиць настає на 2–3 році життя (в залежності від кількості градусоднів та забезпечення кормовою базою);

- за вирощування пеляді в монокультурі рибопродуктивність ставів може досягати 5–6 ц/га, за полікультурі — додатково 2–3 ц/га до основної рибопродуктивності;

- пелядь легко адаптується до несприятливих умов довкілля;

- вселення пеляді у водойми може сприяти зниженню чисельності аборигенних малоцінних риб, підвищуючи вихід цінної рибопродукції [1–7].

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Матеріалом для досліджень слугували цьоголітки, однорічки та дволітки пеляді. Завершальні етапи інкубації ікри проводили в апаратах Вейса об'ємом 8 л в інкубаційному цеху ДП ДГ «Нивка» ІРГ НААН. Підрощування личинок пеляді проводили в пластикових басейнах об'ємом 3,12 м³, згідно методичних рекомендацій з біотехніки індустриального вирощування рибопосадкового матеріалу сигових риб [8]. Водообмін в басейнах складав 5–6 л/хв. Густота посадки — 25 тис. екз./м³.

Вирощування цьоголіток проводили в ставах фермерського сільського господарства (ФСГ) «Короп» Львівської області за технологією, розробленою ВНДІСРГом для сигових риб [9]. Молодь риб підрощували упродовж місяця у плаваючих сіткових садках площею 1 м², розміщених безпосередньо у вирощувальному ставу. Вирощування цьоголіток пеляді відбувалося в полікультурі з осетровими та короповими рибами; площа вирощувального ставу становила 0,67 га. Джерелом водопостачання була річка місцевого значення. Подача води до ставу відбувалася самопливом. У стави вносили органічні та мінеральні добрива. З метою нейтралізації органічної речовини проводили вапнування. Удобрювачем органічного комплексу була гноївка, яку вносили з розрахунку 5 т/га по дну ставу. Мінеральні добрива (суперфосфат та аміачну селітру з розрахунку 70 кг/га та 56 кг/г відповідно) вносили по воді за 2 тижні до зарибнення.

Відбір та опрацювання проб зоопланктону дослідного ставу проводили за загальноприйнятими в гідробіології методами [10–12].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Ранній онтогенез пеляді. Ікру пеляді (єндирської популяції) в кількості 200 тис. ікринок було завезено до ДП ДГ «Нивка». Розвиток ікри знаходився на 5 етапі, 16 стадії ембріонального розвитку — вільного ембріону, під час якої відбувається закладання грудних плавців та початок пігментації очей. Період доінкубування ікри тривав 24 доби, що складало 154 градусодні (табл. 1).

Таблиця 1. Параметри та рибницько-біологічні показники за інкубування ікри пеляді в умовах Дослідного господарства «Нивка» ІРГ НААН

Рибницько-біологічні показники	Одиниця виміру	Кількісний показник
Закладено ікри	тис. екз.	200
Середня температура води	°C	6,4
Період інкубування	діб	24
Температурні витрати	градусодні	154
Отримано вільних ембріонів	тис. екз.	180
Вихід ембріонів	%	90
Маса вільного ембріона	мг	3,9
Довжина тіла вільного ембріона	см	0,8

Вилуплення ембріонів відбувалося несинхронно та було розтягнуте на декілька днів, однак масове вилуплення спостерігали через дві доби після появи перших ембріонів. Вихід ембріонів за період доінкубування ікри становив 90% (з

урахуванням втрат за період транспортування). Вільні ембріони мали середню масу 3,9 мг за довжини тіла 0,8 см.

Середня температура води становила 6,4°C, досягаючи максимальних показників у останні дні інкубування ікри (рис. 1). Середній показник вмісту розчиненого у воді кисню був на рівні 7,6 мгО/дм³, максимальні його значення спостерігалися на початку інкубування (9,0 мгО/дм³), мінімальні — в кінці (6,0 мгО/дм³).

Рис. 1. Динаміка температури та насичення води киснем під час інкубування ікри пеляді, дослідне господарство «Нивка»

За результатами хімічного аналізу води, що надходила до інкубаційного цеху господарства «Нивка», за класифікацією О. А. Алюкіна вона належала до гідрокарбонатного класу. Хімічні показники якості води в період доінкубування ікри перебували в межах прийнятих нормативів, за винятком нітратів та комплексу солей (Ca^{+2} , Mg^{+2} , Na^{+} , SO_4^{-2}) (табл. 2).

Таблиця 2. Хімічні показники води, яка надходила до інкубаційного цеху господарства «Нивка» ІРГ НААН під час інкубування ікри пеляді

№ з/п	Показники якості води	Результати досліджень	Нормативні показники
1	Водневий показник (рН) води	7,9±0,57	7,0–8,0
2	Вільний аміак, NH_3 , мгN/дм ³	0,01±0,01	0,05
3	Перманганатна окислювальність, мгО/дм ³	5,9±0,75	до 10
4	Біхроматна окислювальність, мгО/дм ³	14,8±1,91	до 30
5	Амонійний азот, NH_4^{+} , мгN/дм ³	0,4±0,03	0,5
6	Нітрити, NO_2^{-} , мгN/дм ³	0,03±0,02	0,1
7	Нітрати, NO_3^{-} , мгN/дм ³	1,5±0,23	1,0
8	Мінеральний фосфор, PO_4^{3-} , мгP/дм ³	0,1±0,05	0,3
9	Загальне залізо, Fe^{2+3+} , мгFe/дм ³	0,3±0,11	0,5
10	Кальцій, Ca^{2+} , мг/дм ³	104,4±8,26	до 40
11	Магній, Mg^{2+} , мг/дм ³	25,2±3,69	до 15
12	Натрій, Na^{+} K^{+} , мг/дм ³	17,5±2,86	до 10
13	Гідрокарбонати, HCO_3^{-} , мг/дм ³	272,6±18,6	до 150

№ з/п	Показники якості води	Результати досліджень	Нормативні показники
14	Хлориди, Cl^- , мг/дм ³	106,9±12,41	до 50
15	Сульфати, SO_4^{2-} , мг/дм ³	44,0±5,16	до 40
16	Загальна твердість, мг-екв./дм ³	7,3±0,50	до 4
17	Мінералізація, мг/дм ³	579,7±13,92	до 300

Означені перевищення є закономірними для даного господарства у зв'язку з тим, що джерелом водопостачання господарства є річка Нивка, до якої надходить велика кількість стічних вод, а в зимовий період на прилеглі території звозять брудний сніг з м. Київ, результати танення якого надходять також до річки Нивка.

Після переходу личинок на змішане живлення та досягнення ними середньої маси 10,0 мг їх було перевезено на вирощування до ФСГ «Короп» Львівської області.

Вирощування цьоголіток пеляді в умовах ФСГ «Короп» складалося з двох етапів — підрощування личинок та власне вирощування цьоголіток. Підрощування молоді проводили в плаваючих сіткових садках площею 6 м² (3х2 м), розміщених безпосередньо у вирощувальному ставу, впродовж місяця до середньої маси 0,3 г. Зарибнення садків проводили підрощеними личинками масою 5 мг. Виживання риб було в межах 68–72%. Загальна рибопродуктивність садків становила 166,0 і 168,0 г/м² (табл. 3).

Таблиця 3. Рибницько-біологічні показники за підрощування в садках личинок пеляді

№ досліджу	Посаджено		Отримано		Вихід, %	Добовий приріст, мг	Рибопродуктивність, г/м ²
	екз.	середня маса, мг	екз.	середня маса, мг			
1	5000	5,0	3416	291,6	68,3	9,3	166,0
2	5000	5,0	3631	277,6	72,6	8,8	168,0

Підгодівлю личинок проводили культивованими наупліями артемії та дрібними формами зоопланктону з дафнієвих ям. Кратність годівлі становила 6 разів за період світлої частини доби упродовж першого тижня підрощування. За досягнення маси 1,0 г кратність годівлі було скорочено до 4 разів. Динаміку масонакопичення личинками пеляді за період підрощування показано в таблиці 4. За рахунок повноцінної годівлі живими кормами масонакопичення личинок в садках було рівномірним. Показник добового приросту становив 9,3 мг в першому досліді та 8,8 мг у другому. За досягнення личинками малькової стадії та середніх показників маси 0,3 г було проведено зарибнення вирощувального ставу.

Абіотичні умови у дослідному ставу упродовж всього вегетаційного періоду були задовільними. Температура води коливалась в межах від 14 до 24°C, критичний показник — 28,0°C — був зафіксований 1–3 липня, вміст розчиненого у воді кисню не опускався нижче 4 мгО/дм³, водневий показник води (рН) був нейтральним та слабколужним (7,0–7,4) (рис. 2).

Таблиця 4. Динаміка масонакопичення (мг) личинками пеляді за період підрощування (n = 15)

Доба підрощування	Дослід № 1		Дослід № 2	
	M±m	Cv	M±m	Cv
1	5,0±0,38	7,56	5,0±0,38	7,56
5	25,6±3,78	14,7	23,7±3,04	12,9
10	68,2±8,58	12,6	69,9±8,09	11,6
15	120,0±3,88	3,2	119,4±4,11	3,4
20	170,1±7,69	4,5	166,9±8,44	5,1
25	227,1±13,7	6,0	224,2±10,61	4,7
30	291,6±10,23	3,5	277,6±17,07	6,2

Рис. 2. Динаміка температурного, кисневого режимів та показника рН за період вирощування цьоголіток

Видове різноманіття зоопланктону обмежувалося 14 видами організмів, що належать до трьох систематичних груп — *Rotifera*, *Cladocera* та *Copepoda*. Максимальний показник кількості видів був у червні — 9, мінімальний у липні — 4, з них домінували представники *Rotifera* — 7 видів. Найбільші показники біомаси та чисельності зафіксовані в липні — 6,667 г/м³ і 561,6 тис. екз./м³ відповідно, мінімальні у вересні — 2,284 г/м³ і 216,0 тис. екз./м³ (табл. 5).

Таблиця 5. Динаміка розвитку зоопланктону вирощувального ставу

Групи організмів	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень
<i>Rotifera</i>	<u>26400</u> 0,528	<u>54600</u> 0,946	<u>17520</u> 0,350	<u>40000</u> 0,746	<u>18000</u> 0,040
<i>Cladocera</i>	<u>4400</u> 0,141	<u>26000</u> 0,198	<u>490560</u> 5,781	<u>6000</u> 0,060	<u>6000</u> 0,600
<i>Copepoda</i>	<u>453200</u> 3,561	<u>345800</u> 2,812	<u>53560</u> 0,536	<u>210000</u> 1,953	<u>192000</u> 1,644
Всього зоопланктону	<u>484000</u> 4,230	<u>426400</u> 3,956	<u>561640</u> 6,667	<u>256000</u> 2,759	<u>216000</u> 2,284

* Примітка: чисельність, екз./м³
біомаса, г/м³

Вирощування цьоголіток пеляді проводили в полікультурі з короповими та осетровими рибами. До складу полікультури входили 6 видів риби — пелядь, короп, стерлядь, муксун, бестер, білий амур. Даний склад полікультури в умовах аквакультури України досліджувався вперше. Специфікою даного дослідження, окрім наявності в складі полікультури 6 видів риби, було зарибнення різновіковими групами риби.

Густота посадки мальків пеляді, як основного представника зоопланктофагів, складала 17,8% від загальної кількості посаджених риби. Найбільшу кількість при зарибненні становили осетрові риби — бестер та стерлядь — 27,8 та 26,6% відповідно. Найменшу частку в зарибненні склали коропові риби — короп та білий амур — 3,0 і 5,9% відповідно (рис. 3). Високі показники густоти посадки осетрових риби розраховані за умови використання годівлі штучними кормами.

Рис. 3. Склад полікультури за ставового вирощування цьоголіток пеляді

Рибопродуктивність ставу складала 1046,4 кг/га. Основна її частина була отримана за рахунок осетрових риби: стерляді — 26,6% та бестера — 27,8%. Рибопродуктивність за пеляддю становила 13,7 кг/га, що складає 1,3% від загальної. Вихід з вирощування її цьоголіток був одним з найнижчих серед представників полікультури і складав 35,3% (табл. 6). Низький показник виживання цьоголіток пеляді пояснюється несприятливими природними умовами, що були зафіксовані на початку липня.

Таблиця 6. Результати вирощування риби у полікультурі

Вид	Густота посадки, екз./га		Середня маса, г	Вихід, %	Рибопродуктивність, кг/га
	посаджено	виловлено			
Пелядь	448	158	86,7	35,3	13,7
Короп (1+)	75	69	1180	92,0	81,1
Стерлядь (1+)	672	639	485	95,1	309,8
Муксун	478	75	329	15,6	24,56
Бестер (1+)	701	631	786	90,0	496,2
Білий амур (1+)	149	142	854	95,0	121,1
Всього	2523	1714	-	-	1046,4

Накопичення маси та збільшення лінійного розміру упродовж вегетаційного періоду відбувалося поступово та рівномірно. Найбільші показники вагового приросту в літні місяці було зафіксовано в липні й серпні — 6,09 г та 12,4 г відповідно. Восени спостерігалася така ж тенденція щодо збільшення вагових та лінійних показників, що і в «Оконську», що підтверджується дослідженнями І. А. Созінова щодо фізіологічної здатності пеляді розподіляти до 60–70% потоку енергії використаного корму за низьких температур води в бік пластичного обміну [13]. Тож у період з вересня по листопад маса цьоголіток збільшилася на 65,2 г, що становить 72,5%. Середній показник коефіцієнта вгодованості за сезон складав 1,8, з межами коливань від 1,2 до 3,2. Високий показник коефіцієнта вгодованості 1,5–3,2 був у літні місяці, коли значення біомаси зоопланктону перебували в межах від 3 до 7 г/м³. Найнижчий показник зафіксовано в листопаді — 1,8.

Середній показник довжини тіла за Смітом за літній період вирощування складав 11,3 см. За осінній період довжина тіла збільшилася на 8,2 см, що становить 42% (табл. 7).

Таблиця 7. Рибницько-біологічні показники за ставового вирощування цьоголіток пеляді

Місяці	Маса, г (M±m)	Довжина тіла, см (M±m)	Приріст маси		Коефіцієнт вгодованості
			г	%	
Травень (n=6)	3,2±0,39	4,6±0,52	0,3	10,2	3,2
Червень (n=7)	7,6±0,43	6,9±0,45	4,3	57,8	2,3
Липень (n=25)	13,3±1,87	9,5±0,43	6,1	44,8	1,6
Серпень (n=5)	21,6±2,70	11,3±0,65	8,0	37,0	1,5
Вересень (n=5)	34,0±3,39	13,5±0,84	12,4	36,5	1,4
Жовтень (n=6)	62,1±10,25	17,2±0,78	28,1	45,3	1,2
Листопад (n=20)	86,8±14,36	19,5±1,32	24,6	28,4	1,2

Під час осіннього облову ставів середній показник маси цьоголіток дорівнював 86,8 г, однак спостерігалася значне його коливання від 63 до 113 г. Найбільшу частку — 30% — становила розмірна група 80–90 г, що відповідало близькому до середнього. Групи організмів з індивідуальною масою 60–70 та 70–80 г складали по 15%. На 5% вищою виявилася частка груп, де вагові межі становили 90–113 г (рис. 4).

Зимівлю цьоголіток пеляді проводили в тому ж ставу, що й вирощування. Під час зимівлі риб середні показники температури води перебували в межах від 0,8 до 11,6°C. Максимальний показник зафіксовано у квітні, мінімальний — в лютому.

Рис. 4. Розподіл цьоголіток пеляді за масою за ставового вирощування

Після облову зимувального ставу було відловлено 50 екз. однорічок пеляді середньою масою 185,3 г та довжиною тіла 24,1 см. Низький вихід продукції пояснюється суворими умовами зимівлі. Максимальний показник маси становив 225 г, мінімальний — 160 г, максимальна довжина тіла за Смітом — 29 см, мінімальна — 20,8 см. Таким чином, приріст маси за зимовий період складав 99,8 г, що становить 53,9%. Найбільша кількість серед товарних однорічок була серед особин масою 170 г — 25%. Особи з масою, близькою до середньої, склали 20%. Найменша кількість виявилася серед риб зі значенням цього показника на рівні 190–200 г — 15%. Однорічки з масою тіла понад 200 г склали 20% дослідної групи (рис. 5).

Рис. 5. Розподіл товарних однорічок пеляді за масою тіла за ставового вирощування

Однорічок пеляді було пересаджено до вирощувального ставу на подальше утримання з осетровими та короповими рибами.

Гідрохімічний та температурний режими під час вирощування дволіток були задовільними, за виключенням початку липня, коли температура води становила понад 27°C. Внаслідок цього спостерігалася явище задухи риб. Загалом, середній показник температури води в ставу становив 17°C (межі коливань 10–27°C).

За вирощування дволіток пеляді до складу полікультури входили 5 видів риб — пелядь, короп, стерлядь, бестер та білий амур (рис. 6).

Однорічки пеляді складали 5,1% від загальної кількості посаджених риб. Найбільшу частку становили представники осетрових риб — стерлядь та бестер — 41,2 та 40,7% відповідно, найменшу — коропові риби — короп та білий амур, частка яких в полікультурі становила 4,0 та 9,0% відповідно.

Рис. 6. Склад полікультури за ставового вирощування дволіток пеляді

Середня маса дволіток пеляді становила 450 г з межами коливань 380–490 г. Рибопродуктивність ставу складала 2290,8 кг/га. Основна її частина була отримана за рахунок осетрових риб: стерляді — 998,0 кг/га, бестера — 975,0 кг/га. Рибопродуктивність пеляді становила 23,5 кг/га (табл. 8).

Відловлені особини жіночої статі мали сформовані статеві продукти, однак в інкубаційному процесі вони використані не були. Показник виживання дволіток пеляді перевищував такий цьоголіток та однорічок, і становив 70%.

Таблиця 8. Рибницькі показники однорічок та дволіток пеляді за ставового вирощування

Вікові групи	Густота посадки, екз./га		Середня маса, г	Вихід, %	Рибопродуктивність, кг/га
	посаджено	виловлено			
Однорічки	158	75	185,3	47,1	13,8
Дволітки:					
Пелядь (1+)	75	52	450,1	70,0	23,5
Короп (2+)	60	55	1563	92,5	86,3
Стерлядь (2+)	612	576	1732	94,1	998,0
Бестер (2+)	604	545	1789	90,1	975,0
Білий амур (2+)	134	128	1620	95,6	208,0
Всього	1485	1357	-	-	2290,8

Накопичення маси та збільшення лінійного розміру у дволіток пеляді упродовж вегетаційного періоду відбувалося поступово та рівномірно. За

вегетаційний сезон (з травня до другої декади вересня) ваговий приріст становив 265 г, лінійний — 9,1 см. Максимальні показники приросту маси були зафіксовані в травні 53,9%, мінімальні в серпні та вересні — 8,9 та 7,2% відповідно. Показник вгодованості упродовж вирощування перебував у межах 1,1–1,4 одиниць. Значних коливань не було, середнє значення становило 1,3 одиниці (табл. 9).

Таблиця 9. Динаміка вагового та лінійного росту дволіток пеляді за ставового вирощування

Місяці	Маса, г ($M \pm m$)	Довжина тіла, см ($M \pm m$)	Приріст маси		Коефіцієнт вгодованості
			г	%	
Травень (n=20)	185,3 $\pm$ 17,70	24,1 $\pm$ 2,21	99,8	53,9	1,32
Червень (n=4)	279,8 $\pm$ 33,80	29,1 $\pm$ 0,67	94,6	33,8	1,14
Липень (n=3)	383,3 $\pm$ 28,87	30,8 $\pm$ 0,76	103,5	27,0	1,31
Серпень (n=4)	417,5 $\pm$ 30,14	31,3 $\pm$ 2,69	34,2	8,9	1,36
Вересень (n=10)	450,1 $\pm$ 36,57	33,2 $\pm$ 2,95	32,6	7,24	1,23

Аналіз показників добового приросту засвідчив про більш інтенсивне зростання маси дволітками пеляді, порівняно з цьоголітками. Так, середні показники добового приросту дволіток з травня по липень перебували в межах від 3,2 до 3,3 г та 1,1 г в серпні–вересні, тоді як у цьоголіток вони коливалися від 0,14 г до 0,26 г в літні місяці та від 0,41 до 1,54 г в осінні.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Дана наукова робота присвячена дослідженню товарного вирощування пеляді в полікультурі з представниками корошових та осетрових риб. У результаті проведених досліджень, зроблено висновок, що сумісне вирощування кількох видів риб, які розрізняються за способом живлення, виявилось дієвим заходом підвищення рибопродуктивності ставів. Вирощування пеляді в полікультурі з осетровими та корошовими рибами дозволило отримати цьоголіток середньою масою 86,7 г та дволіток — 450 г, що збільшило показники загальної рибопродуктивності на першому році вирощування на 1,3%, на другому — на 0,9%. В зимовий період відбувалося більш інтенсивне масонакопичення, ніж влітку. Приріст риб за зимовий період склав 98,5 г, що становить 53,2%.

ЛІТЕРАТУРА

1. Головков Г. А. Инструкция по разведению пеляди в прудах и озерах / Г. А. Головков, А. Н. Кузьмин. — Л., 1970. — 44 с.
2. Нестеренко Н. А. Химический состав и пищевая ценность новых объектов акклиматизации и товарного выращивания рыб в озерах юга Западной Сибири / Н. А. Нестеренко, С. Е. Кац // Рибопродуктивність озер Західної Сибіри. — Новосибірськ : Наука. Сиб. отд., 1991. — С. 64—70.
3. Бурмакин Е. В. Биология и рыбохозяйственное значение пеляди / Е. В. Бурмакин // Труды Барабинского отделения ВНИОРХ. — 1953. — Том IV, вып. 1. — С. 24—89.

4. Соловьев В. П. Сиговые рыбы в карпово-сиговой зоне озерного рыбоводства / В. П. Соловьев, З. И. Новоселова // Четвертое Всесоюзное совещание по биологии и биотехнике разведения сиговых рыб : мат-лы. докл. — Л., 1990. — С. 144—146.
5. Любарский А. И. Абиотические факторы при вселении сиговых рыб в водоемы Украинской ССР : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук / А. И. Любарский. — К. : Украинская сельскохозяйственная академия, 1963. — 18 с.
6. Канеп С. В. Биологические и морфологические особенности пеляди *Coregonus peled* (Gmelin) в малых озерах северо-запада СССР : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук / С. В. Канеп. — Л. : ГосНИОРХ, 1972. — 16 с.
7. Терешенков И. И. Биологические основы товарного выращивания карпа, пеляди, белого амура и пестрого толстолобика в озерах Северо-Запада : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук / И. И. Терешенков. — Л. : ГосНИОРХ, 1979. — 19 с.
8. Методические рекомендации по биотехнике промышленного выращивания рыбопосадочного материала сиговых рыб. — СПб, 1991. — 29 с.
9. Инструкция по биотехнике выращивания молоди сиговых рыб / Канидьев А. М., Гамыгин Е. А., Пономарев С. Г. — М. : ВНИИПРХ, 1987. — 11 с.
10. Природна кормова база вирощувальних та нагульних ставів і шляхи її покращення. Методичні рекомендації. — К. : УААН, Мін-во риб. госп., 1997. — 96 с.
11. Жизнь пресных вод СССР / [под ред. В. И. Жадин]. — М., Л. : АН СССР, 1940. — 453 с.
12. Методические рекомендации по применению современных методов изучения питания рыб и расчета рыбной продукции по кормовой базе в естественных водоемах. — Л. : ГосНИОРХ, 1986. — 28 с.
13. Созинов И. А. Экология питания, рост и продукция сиговых рыб, выращиваемых в поликультуре в озерах юга Западной Сибири : автореферат дис. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук / И. А. Созинов. — Л. : ГосНИОРХ, 1984. — 21 с.

REFERENCES

1. Golovkov, G. A., & Kuz'min, A. N. (1970). *Instruktsiya po razvedeniyu pelyadi v prudakh i ozerakh*. Leningrad.
2. Nesterenko, N. A., & Kats, S. E. (1991). Khimicheskiy sostav i pishchevaya tsennost' novykh ob'ektov akklimatizatsii i tovarnogo vyrashchivaniya ryb v ozerakh yuga Zapadnoy Sibiri. *Ryboproduktivnost' ozer Zapadnoy Sibiri*. Novosibirsk : Nauka. Sib. otd., 64-70.
3. Burmakin, E. V. (1953). Biologiya i rybokhozyaystvennoe znachenie pelyadi. *Trudy Barabinskogo otdeleniya VNIORKh, I, IV*, 24-89. Novosibirsk.
4. Solov'ev, V. P., & Novoselova, Z. I. (1990). Sigovye ryby v karpovo-sigovoy zone ozernogo rybovodstva. *Chetvertoe vsesoyuznoe soveshchanie po biologii i biotekhnike razvedeniya sigovykh ryb*. Leningrad, 144-146.

5. Lyubarskiy, A. I. (1963). Abioticheskie faktory pri vselenii sigovykh ryb v vodoemy Ukrainoy SSR. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kiev : Ukrainskaya sel'skokhozyaystvennaya akademiya.
6. Kanep, S. V. (1972). Biologicheskie i morfologicheskie osobennosti pelyadi *Coregonus peled* (Gmelin) v mal'kikh ozerakh severo-zapada SSSR. *Extended abstract of candidate's thesis*. Leningrad : GosNIORKh.
7. Tereshenkov, I. I. (1979). Biologicheskie osnovy tovarnogo vyrashchivaniya karpa, pelyadi, belogo amura i pestrogo tolstolobika v ozerakh Severo-Zapada. *Extended abstract of candidate's thesis*. Leningrad : GosNIORKh.
8. *Metodicheskie rekomendatsii po biotekhnike industrial'nogo vyrashchivaniya ryboposadochnogo materiala sigovykh ryb*. (1991). Sankt-Peterburg.
9. Kanid'ev, A. M., Gamygin, E. A., & Ponomarev, S. G. (1987). *Instruktsiya po biotekhnike vyrashchivaniya molodi sigovykh ryb*. VNIIPRKh.
10. *Pryrodna kormova baza vyroshchuvalnykh ta nahulnykh staviv i shliakhy yii pokrashchennia. Metodychni rekomendatsii*. (1997). Kyiv : UAAN, Min-vo ryb. hosp.
11. Zhadin, V. I. (Ed.). (1940). *Zhizn' presnykh vod SSSR*. Moskva, Leningrad, AN SSSR.
12. *Metodicheskie rekomendatsii po primeneniyu sovremennykh metodov izucheniya pitaniya ryb i rascheta rybnoy produktsii po kormovoy baze v estestvennykh vodoemakh*. (1986). Leningrad : GosNIORKh.
13. Sozinov, I. A. (1984). Ekologiya pitaniya, rost i produktsiya sigovykh ryb, vyrashchivaemykh v polikul'ture v ozerakh yuga Zapadnoy Sibiri. *Extended abstract of candidate's thesis*. Leningrad : GosNIORKh.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕЛЯДИ (*COREGONUS PELED* GMELIN) В ПОЛИКУЛЬТУРЕ С КАРПОВЫМИ (*CYPRINIDAE*) И ОСЕТРОВЫМИ (*ACIPENSERINAE*) РЫБАМИ

А. А. Куриненко, annazakharenko@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

А. И. Мрук, amruk@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Е. Н. Колос, ilona_krasa@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Проанализировать результаты выращивания и дать рыбоводно-биологическую характеристику пеляди, выращенной в поликультуре с осетровыми и карповыми рыбами в условиях прудов.

Методика. Материалом для исследований служили разновозрастные группы пеляди, полученные от икры, завезенной в марте 2009 г. из Российской Федерации. Выращивание пеляди проводили по технологии, разработанной ВНИИПРХом для сиговых рыб, а также пользовались методическими рекомендациями по биотехнике индустриального выращивания рыбопосадочного материала сиговых рыб. Исследования проводились в фермерском прудовом хозяйстве «Карп» Львовской области.

Изучение питания рыб и гидробиологические исследования проводили по общепринятым методикам.

Результаты. Проведены доинкубирование икры и получение личинок с последующим подращиванием в плавающих садках до стадии мальков.

Выращивание товарной пеляди в поликультуре позволяет повысить показатели рыбопродуктивности на первом году выращивания на 1,3%, втором — на 0,9%. Средние

показатели массы годовиков и двухлеток пеляди составляли 185,3 г и 450,0 г соответственно. При данных условиях выращивания показатели суточного прироста сеголеток находились в пределах 0,1–1,5 г, двухлеток — 1,1–3,3 г. Как позитивный результат выращивания, также нужно отметить высокий показатель увеличения массы в зимний период, который составлял свыше 50%.

Также изучено количественный и качественный состав зоопланктона и характер питания сеголеток.

Научная новизна. Впервые проведены работы по выращиванию пеляди в прудах в поликультуре с карповыми и осетровыми рыбами.

Практическая значимость. Результаты, проведенной работы будут способствовать выращиванию рыбопосадочного материала пеляди в прудах рыбоводными хозяйствами Украины.

Ключевые слова: пелядь, прудовое выращивание, рост, масса, морфометрические измерения, зоопланктон, питание.

REARING OF PELED (*COREGONUS PELED* GMELIN) IN POLYCULTURE WITH CYPRINIDS (*CYPRINIDAE*) AND STURGEONS (*ACIPENSERIDAE*)

G. Kurinenko, annazakharenko@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

A. Mruk, amruk@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

O. Kolos, ilona_krasa@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To analyze the results of rearing and provide aquaculture-biological characteristic of peled reared in polyculture with sturgeons and cyprinids based on pond technology.

Methodology. The material for the studies were fry, young-of-the-year, yearlings and age-1+ peled produced from eggs exported in March 2009 from Russian Federation. Rearing of peled was carried out based on the technology developed by the All-Union Scientific and Research Institute of Pond Fish Culture for coregonids with the use of methodical recommendations on the biotechnology of industrial rearing of seed coregonids. Studies were carried out at the pond fish farm “Korop” of Lviv region. Water supply of rearing ponds was done by self-flow.

The investigation of fish diet and hydrobiological studies were carried out using conventional methods.

Findings. We performed a study of fish egg incubation and produced larvae with their further rearing in floating cages to the fingerling stage.

Rearing of peled in polyculture allows increasing the fish productivity parameters at the first year of rearing by 1.3%, at the second year by 0.9%. Average weights of age-1 and age-1+ peled were 185.3 g and 450 g, respectively. In these rearing conditions, daily growth of the young-of-the-year was within 0.1–1.5 g, age-1+ – 1.1–3.3 g. As a positive result of rearing, we should note high weight gain during winter period that was more than 50%.

We also investigated qualitative and quantitative composition of zooplankton and peled juvenile diet.

Originality. The works of peled rearing based on pond technology in polyculture with sturgeons and cyprinids were carried out in the conditions of Ukraine for the first time.

Practical value. The results of the performed works along with similar previous works on peled rearing in ponds will be used for the creation of methodical recommendations on rearing of peled seeds, which will be used by Ukrainian fish farms in future.

Keywords: peled, pond rearing, polyculture, growth, weight, zooplankton, feeding.

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 57-69

DOI: <http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.057>

УДК: 575:595.384.12(540)

MOLECULAR IDENTIFICATION AND BARCODING OF TWO SHRIMP SPECIES (*PARAPENAEOPSIS SCULPTILLIS* AND *PARAPENAEOPSIS HARDWIKII*) COLLECTED FROM GORAI CREEK OF MUMBAI, WEST COAST OF INDIA

G. Zodape, drgautamvz5@gmail.com, Departments of Zoology, Shivaji University, Kolhapur

M. Tayade, tayade.madhuri@gmail.com, Departments of Zoology, S.S. & L.S. Patkar College of Arts and Science & V.P. Varde College of Commerce and Economics, Mumbai

G. Mehetre, ms.dharne@ncl.res.in, National Collection of Industrial Microorganisms, CSIR-NCL, Pune

M. Dharne, msdharne@gmail.com, National Collection of Industrial Microorganisms, CSIR-NCL, Pune

Purpose. Molecular identification of two shrimp species (*Parapenaeopsis sculptillis* and *Parapenaeopsis hardwickii*) from Gorai creek, Mumbai, west coast of India.

Methodology. The specimens of Shrimps *Parapenaeopsis sculptillis* and *Parapenaeopsis hardwickii* were collected from Gorai creek. The samples were morphologically identified as per the FAO guidelines manual and by using taxonomic keys. Genomic DNA was extracted from muscle tissue using DNA isolation kit (Hi Media, India). Molecular identification was carried out by using cytochrome oxidase subunit I (COI), gene sequencing by using specific primers LCO1490 and HCO2198. Phylogenetic tree was constructed by neighbour-joining method using mega 6 software to determine the relationship of the samples with known sequences in database.

Findings. The *P. sculptillis* and *P. hardwickii* showed closest sequence similarities with *P. cornuta* (84%) and *Thysanopoda obtusifrons* (83%). A phylogenetic tree was constructed based on COI gene, which separates the populations into thirteen stable clades. The results on DNA barcoding and current distribution of *P. sculptillis* and *P. hardwickii* and their haplotype *P. cornuta* and *Thysanopoda obtusifrons* showed phylogenetic relationship among them, providing insights into the adaptive evolution of DNA sequences. The phylogenetic divergence analyses of the selected species showed worldwide distribution because the above said species and their haplotype species showed complex sequence diversities that are having functional relevance with energy metabolism and environmental adaptation.

Originality. First attempt to use molecular genetic techniques for the identification of *Parapenaeopsis sculptillis* and *Parapenaeopsis hardwickii* and to compare their DNA sequences with other haplotype species such as *P. cornuta* and *Thysanopoda obtusifrons*.

Practical value. The obtained data can be used for shrimp species identification and studies of their phylogenetics and population genetics.

Keywords: species identification, barcoding, shrimp, phylogenetic, Gorai Creek.

© G. Zodape, M. Tayade, G. Mehetre, M. Dharne, 2016

PROBLEM STATEMENT AND ANALYSIS OF LAST ACHIEVEMENTS AND PUBLICATIONS

Shrimps and prawns have great economical value as they earn valuable foreign exchange. Generally, more than 10 million tons of crustaceans are produced annually for human consumption. Crustacean often referred to as “Insect of Sea” as the range of morphological characteristics for taxonomical identification exceeds than that of the insecta. There are approximately 50,000–67,000 crustaceans have been estimated worldwide. They show an enormous diversity and different range of sizes. Morphological identification of crustaceans is very critical because, this group has different larval stages, sexual dimorphism, plasticity trading etc. [26]. The unique colour system in crustacean often plays an important role in aquaculture because their colour affects the quality and market price CSIRO [8]. Prawns, like most other crustaceans are able to change colour depending upon growth, background coloration and time of day due to chromatophores Montgomery [23]. These problems can be overcome by molecular identification or DNA Barcoding.

HIGHLIGHT OF THE EARLIER UNRESOLVED PARTS OF THE GENERAL PROBLEM. AIM OF THE STUDY

The term ‘DNA barcode’ was recently used in the literature by Floyd, et al., and Hebert, et al. [9, 14]. It is generally use for rapid and accurate species identification [13]. The term ‘DNA barcodes’ was first used by Arnot, et al. [3], in their research paper but they have not received more attention from the scientific community. Even though the concept of species identification using molecular tools was older one and it was proposed by Kangethe, et al. [17]. However, the work carried out by Hebert, et al. [14] has given the golden age of DNA barcoding which embark on 2003, due to which many biological scientist have started their work on DNA barcoding. Therefore, DNA barcoding is currently used as a powerful and efficient tool for species level identification and also found useful for taxonomic and biodiversity research. Nowadays, a number of DNA barcode sequences provides a unique ‘horizontal’ genomics perspective with broad implications [22]. Computational technology found very useful for sequencing and it also provides a major source of new information for advancing our understanding about the evolutionary and genetic relationship with the help of DNA barcoding. The footprints of DNA sequence are now useful in almost all areas of biological sciences [29].

Classification and identification of Species by traditional method has become specialized domain of taxonomists. Nomenclature of species provides a backbone and key prerequisite for numerous biological studies. Nowadays, human society is facing numerous crucial biological issues including maintenance of biodiversity, wild life conservation, bio-security and many others to protect the species. To achieve such goals successive action plans are needed in a global basis to identify and describe the species and prevent them from extinction. Therefore to achieve this goal we have applied a tool of molecular identification of shrimp species and find its molecular phylogenetics and population genetics by DNA barcoding.

MATERIALS AND METHODS

a) Sample Collection and Identification:

The specimens of Shrimps *Parapenaeopsis sculptillis* and *Parapenaeopsis hardwickii* were collected from 200 meters away from Gorai creek of Mumbai from September, 2014 to, December 2014. The Shrimp samples, packed in propylene bags, were stored at -20°C in deep freeze in the Department of Zoology, S.S & L.S. Patkar College, Goregaon (West) Mumbai for further analysis. The samples were identified as per the FAO guidelines manual and by using taxonomic keys described by Kathirvel and Thirumilu [18], “Edible Penaeid Shrimps in India” in the Training Manual “GIS and Marine Biodiversity” edited by John Milton (2008).

b) Genomic DNA isolation and PCR amplification of cytochrome oxidase gene

Genomic DNA was extracted from muscle tissue of sample MT1 and MT2 using DNA isolation kit (Hi Media, India) as per manufacturer's instructions. Integrity of the extracted DNA was assessed by 0.8% agarose horizontal gel electrophoresis in TAE buffer (40 mM Tris, 20 mM acetate, and 2 mM EDTA) visualized by Gel Red staining on a gel documentation unit (Protein simple). The concentration of the extracted DNA was analyzed by Nano Drop Lite spectrophotometer (Nano Drop Biotechnologies). PCR amplification of 700 base pair fragment of cytochrome oxidase subunit I (COI) gene was carried out using specific primers LCO1490(5'-GGTCAACAAATCATAAGATATTGG-3') and HCO2198(5'TAAACTTCAGGGT GACCAAAAAATCA-3') [10]. The PCR was carried out in 50 μL of reaction mixture containing 10 nM (each) primer (Eurofins), 200 μM (each) deoxynucleoside triphosphate (dNTP) (Genei), 1 U of Taq polymerase (Genei) in the appropriate reaction buffer, and 100 ng of DNA extract as a template. PCR conditions were 35 cycles of 60 s at 95°C , 60 s at 58°C , and 1 min 30 s at 72°C . PCR amplified products were purified using Exo-rSAP (USB) and sequenced in ABI 3500xl genetic analyzer (Thermo fisher). The COI sequences of MT1 and MT2 have deposited under gen bank accession number (genbank accession MT1_KT898913 and genbank accession MT2_KT898914) respectively.

c) Phylogenetic analysis

The edited mitochondrial COI gene sequences from shrimp samples collected from west cost of India were analyzed by BLASTN and BLASTX databases from NCBI [2]. High quality alignment of around 550 bp sequences was used to construct Phylogenetic tree. For both the samples MT1 and MT2, phylogenetic tree was constructed by neighbour-joining method using MEGA 6 software to determine the relationship of these samples with known sequences in database. One thousand bootstrap iterations were generated to derive a consensus tree (Tamura et al. 2013).

STUDY RESULTS AND THEIR DISCUSSION

In this study, a total of two species of Penaeid shrimps namely *Parapenaeopsis sculptillis* and *Parapenaeopsis hardwickii* were identified by morphologically. Among these, according to Kathirvel and Thirumilu [18], the Penaeid shrimps family comprises of 13 genera and 105 species. The photographs of *Parapenaeopsis sculptillis* and *Parapenaeopsis hardwickii* species and their morphological differences are presented in Figure 1.

Parapenaeopsis sculptillis

Parapenaeopsis hardwickii

Figure 1. The Shrimp samples *Parapenaeopsis sculptillis* and *Parapenaeopsis hardwickii* were collected from Gorai creek of Mumbai

Among the above species identified morphologically were further subjected to DNA barcoding. These species successfully amplified with the universal decapods COI specific primer used in this study. This may be due to several reasons right from the handling of tissue samples to the steps involved in PCR amplification, since the same primer has produced successful amplification. The isolated genomic DNA showed greater than 1Kb nucleotides (Figure 2).

Figure 2. Genomic DNA and PCR amplification of Cytochrome oxidase gene. Lane 1; 1Kb DNA ladder (Genei), Lane 2; Genomic DNA of MT1, Lane 3; Genomic DNA of MT2, Lane 4; PCR amplified product of MT1, Lane 5. PCR amplified product of MT2.

The amplified products showed approximately 700bp (Figure 2). Several studies have been reported that sequence diversity in a ~650 bp region near the 5' end of the MT-COI gene provides strong species-level resolution for varied animal groups, including birds [1, 12], fishes [7, 30], springtails [5, 24], spiders [5, 6] and moths [16, 20]. It has been reported that the primer pair, (LCO_MT1_NC101214 and LCO_MT2_NC021214) was not so “universal” as thought before, as it would still fail to amplify some taxa [21, 28]. While performing BLAST (using BLASTn and BLASTx), the sequences of the above said species showed varied degrees of similarity with existing data in the NCBI database (Table 1).

Table 1. Sequence analysis of MT1 and MT2 Samples in the NCBI database

Sr. No	Sample	Gene sequence	NCBI BLASTn	NCBI BLASTx
1	MT1_NC101214	COI	KP072694 <i>Parapenaeopsis cornuta</i> voucher NTOU-M0186 Identities:436/516(84%) Yang et. al.(Zool. Scr. 44 (3), 312-323 2015	AGV33575 <i>Parapenaeopsis stylifera</i> Identities: 140/159(88%) unpublished
2	MT2_NC021214	COI	GU183782 <i>Thysanopoda obtusifrons</i> voucher UConn:Eu02.2.1 Identities:444/534(83%) Bucklin et. al. (Deep Sea Res. Part II Top. Stud. Oceanogr. 57 (24-26), 2234-2247 2010) ++ AY350987 <i>Munidapsamathe</i> voucher Fo89 Identities:434/522(83%) Machordom et. al. (Mol. Phylogenet. Evol. 33 (2), 259-279 2004)	AEX10285 <i>Munidarutllanti</i> Identities: 138/156(88%) Matzen et al PLoS ONE 6 (5), E19449 (2011)

For BLASTn (i.e. at nucleotide level) *Parapenaeopsis sculptillis* showed 84% similarity with the *Parapenaeopsis cornuta*) and the species *Parapenaeopsis hardwickii* showed 83% similarity with the *Thysanopoda obtusifrons* voucher UConn:Eu02.2.1 cytochrome oxidase subunit I (COI) gene genbank accession MT2_KT898914 voucher NTOU-M01863 cytochrome oxidase subunit I (COI) gene (GenBank accession MT1_KT898913) (GenBank accession MT2_KT898914). For BLASTx (i.e. at amino acid level) *P. sculptillis* showed 88% similarity with *P. stylifera* (Genbank accession AGV33575) and *P. hardwickii* showed 88% similarity with *Munidarutllanti* (GenBank accession AEX10285).

Divergence estimation:

DNA barcoding has become a promising tool for rapid and accurate identification of various taxa and it has been used to reveal unrecognized species in several animal groups. The COI gene was selected as the standard barcode to establish phylogenetic relationships among species *Parapenaeopsis culptillis* and *Parapenaeopsis hardwickii*

from major habitats, in West coast of India including Gorai Creek west coast of Mumbai. This study has revealed in identifying the shrimp species *Parapenaeopsis sculptillis* and *Parapenaeopsis hardwickii* with the help of potentiality of DNA barcodes. Phylogenetic tree of MT1 and MT2 samples based on COI gene, and determined using MEGA tool, wherein 1000 bootstrap replicates. For maximum likelihood phylogenetic tree showed polyphyletic clades (Figure 3).

Figure 3. Phylogenetic tree of MT1 and MT2 samples based on COI gene, and determined using MEGA tool, wherein 1000 bootstrap replicates were used.

The non-linear tree exhibited two major clades among the subjected and retrieved species. This may be due to the differences in primers used. Similar opinion has been postulated by [25]. In the present study, the nucleotide divergence for the selected shrimp species was calculated as between 0.00 -0.207% with the average interspecies nucleotide divergent value of 0.103% which is less than the significant 3% threshold value as per the 10X rule of [11]. Our results are also found similar with the reports drawn by Avise [4] who found genetic divergence in majority of the recorded species are less than 1% in the case of same species, whereas the divergence exhibited greater than 2% for mitochondrial DNA in few cases. Ratnasingham and Herbert [27] also drawn similar conclusion by using similar criteria for identification of species through matching of query sequence with the reference barcode records. Ward et al. [30] reported a divergence level of 0.39% and 9.93% for individuals within species and species within genera for Australian fishes respectively, while Lakra et al. [19] observed the average distances within species and genera as 0.30% and 6.60% respectively in Indian marine fishes. Our results are also in agreements with the above said demonstrations. Therefore, both the species studied are closely related to each other, and also with the retrieved species. The phylogram constructed in this study showed that the *Parapenaeopsis cornuta* and *Thysanopoda obtusifrons* are having a separate branch which indicates the reliability of phylogenetic tree. The pair-wise analysis suggests that the mean pair-wise distance between LCO_MT1 and LCO_MT2 was relatively low when compared with out-group. The nucleotide sequence diversity

was found to be low within the different clades of LCO_MT1 and LCO_MT2. BOLD analysis has precisely identified both the sequence as *Parapenaeopsis cornuta* and *Thysanopoda obtusifrons*. Figure 3 depicts the details of distinct haplotypes available in the database for the selected shrimp species. While searching for species haplotypes only one sequence was retrieved from the GenBank databases *Parapenaeopsis sculptillis* showed its haplotype *Parapenaeopsis cornuta* where as we were unable to find the sequence in GenBank databases of *Parapenaeopsis hardwickii* its haplotype *Thysanopoda obtusifrons*.

Table 2: The distance matrix based on COI gene (similarity index) between MT1 and MT2 sample. The standard sequences from genbank were used for comparison.

[1] #MT1_LCO
 [2] #MT2_LCO
 [3] #796675163_Parapenaeopsis_cornuta_voucher_NTOU-M01863
 [4] #560207874_Rimopenaeus_constrictus_voucher_CCDB_3639
 [5] #197631340_Pugettia_quadridens_isolate_Pug_q_166
 [6] #796675178_Metapenaeopsis_palmensis_voucher_NTOU-M01864
 [7] #764014620_Lutomyia_nunez-tovari
 [8] #646227935_Synalpheus_cf._paraneomeris_KMH-2014
 [9] #71392404_Upogebia_africana_isolate_Uafr33
 [10] #572165637_Eudasyphora_cyanella_voucher_NICC0280_11621959
 [11] #270271520_Nematobrachion_sexspinosum_voucher_UCONN:Eu07
 [12] #188501773_Chymomyza_procnemis_voucher
 [13] #557371239_Nonala_holderi_voucher_ULLZ_9282
 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13]

[1]
 [2] 0.207
 [3] 0.188 0.253
 [4] 0.183 0.173 0.193
 [5] 0.188 0.217 0.238 0.193
 [6] 0.183 0.173 0.178 0.164 0.212
 [7] 0.207 0.270 0.238 0.227 0.222 0.259
 [8] 0.173 0.197 0.202 0.183 0.212 0.173 0.253
 [9] 0.183 0.207 0.217 0.197 0.193 0.188 0.178 0.207
 [10] 0.212 0.264 0.297 0.253 0.227 0.270 0.136 0.286 0.197
 [11] 0.173 0.183 0.238 0.197 0.183 0.183 0.193 0.217 0.136 0.202
 [12] 0.212 0.264 0.280 0.212 0.227 0.248 0.141 0.270 0.183 0.154 0.169
 [13] 0.178 0.243 0.238 0.233 0.173 0.217 0.248 0.202 0.164 0.233 0.159 0.227

Geographical distribution:

We have also found the general distribution pattern of *Parapenaeopsis sculptillis* and its haplotype *Parapenaeopsis cornuta* and it was found that the general distribution of *Parapenaeopsis sculptillis* from west coast of India through Malaysian waters and Indonesia to Hong Kong in the north and tropical Australia and New Guinea in the south. Along the Indian coasts this is mostly represented in the northern region of the west coast and the east coast. In these places the species contribute to the fishery to a certain extent, where as the distribution pattern of its haplotype *Parapenaeopsis cornuta* was found in two different geographical regions, an equatorial spread from the west coast of India and Ceylon through Malaysia to the Philippines and New Guinea. In Indian waters although not contributing to a fishery it has been recorded from Bombay and Kerala on the west coast and off Madras on the east coast. The general distribution pattern of *Parapenaeopsis hardwickii* and its haplotype *Thysanopoda obtusifrons* was found, in Indian coasts including Gorai Creek west coast of Mumbai. It was found that the *Parapenaeopsis hardwickii* reported in Indian waters the species is distributed in the North West coast in Bombay waters and on the east mainly off river Godavari estuary. In these two places it contributes to a fairly good fishery, especially in Bombay waters. With respect to the global distribution it was reported in Malaysia to southern China waters where as its haplotype *Thysanopoda obtusifrons* the general distribution pattern was found in the Indian Ocean from the equator to about 30°S. With respect to the global distribution the known range is approximately 40°N-30°S in the Atlantic, including the Gulf of Mexico and off northwest Africa but not the Gulf of Guinea. In the Pacific it is from 35°N to 35°S, but is lacking in the Eastern Tropical Pacific, eastern boundary currents, and much of the western tropical Pacific.

CONCLUSION AND PERSPECTIVES OF FURTHER DEVELOPMENT

In this study, the universal decapods primer, LCO_MT1_NC101214 and LCO_MT2_NC021214 has worked well with both the species *Parapenaeopsis sculptillis* and *Parapenaeopsis hardwickii*. Further studies with other species are necessary to conclude that whether the primer used is species specific. The subjected species and literature data showed average nucleotide divergence of *Parapenaeopsis* is 1.43% [26] from its closest relative. Consequently, our results on DNA barcoding and comparative analysis reveal the current distribution of *Parapenaeopsis sculptillis* and *Parapenaeopsis hardwickii* and their haplotype *Parapenaeopsis cornuta* and *Thysanopoda obtusifrons* showed phylogenetic relationship among them, providing insights into the adaptive evolution of DNA sequences. Based on their phylogenetic and divergence analyses, the selected species showed worldwide distribution because these species and their haplotype species reveal complex sequence diversities that are expected to have functional relevance such as energy metabolism and environmental adaptation. Therefore the species could not be discriminated.

BIBLIOGRAPHY

1. DNA barcoding of Dutch birds / M. Aliabadian, K. K. Beentjes, C. S. Roselaar [et al.] // Zookeys. — 2013. — Vol. 365 — P. 25—48.
2. Basic local alignment search tool / S. F. Altschul, W. Gish, W. Miller [et al.] // J. Mol. Biol. — 1990. — Vol. 215. — P. 403—404.
3. Digital codes from hypervariable tandemly repeated DNA sequences in the *Plasmodium falciparum* circumsporozoite gene can genetically barcode isolates / D.

- E. Arnot [et al.] // Mol. Biochem. Parasitol. — 1993. — Vol. 61. — P. 15—24.
4. Avise J. C. Phylogeography: The History and Formation of Species / Avise J. C. — Cambridge : Harvard University Press, 2000. — 447 p.
5. Barrett D. H. Identifying spiders through DNA barcodes / D. H. Barrett, P. D. N. Hebert // Canadian J Zool. — 2005. — Vol. 83. — P. 481—491.
6. Spiders (*Araneae*) of Churchill, Manitoba: DNA barcodes and morphology reveal high species diversity and new Canadian records / G. A. Blagoev, N. I. Nikolova, C. N. Sobel [et al.] // BMC Ecol. — 2013. — Vol. 13. — P. 44.
7. Cawthorn D. M. DNA barcoding reveals a high incidence of fish species misrepresentation and substitution on the South African market / D. M. Cawthorn, H. A. Steinman, R. C. Witthuhn // Food Res Intr. — 2012. — Vol. 46. — P. 30—40.
8. Crustaceans unique colour control system // Eco. Sciences Precinct / CSIRO. — Dutton Park, Australia, 2013.
9. Molecular barcodes for soil nematode identification / R. Floyd [et al.] // Mol. Ecol. — 2002. — Vol. 11. — P. 839—850.
10. DNA primers for amplification of mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I from diverse metazoan invertebrates / O. Folmer, M. Black, W. Hoeh [et al.] // Mol Mar BiolBiotechnol. — 1994. — Vol. 3, iss. 5. — P. 294—299.
11. Ten species in one: DNA barcoding reveals cryptic species in the Neotropical skipper butterfly *Astraptes fulgerator* / P. D. N. Hebert, E. H. Penton, J. M. Burns [et al.] // Proc Natl Acad Sci USA. — 2004. — Vol. 101. — P. 14812—14817.
12. Identification of birds through DNA barcodes / P. D. N. Hebert, M. Y. Stoeckle, T. S. Zemlak [et al.] // PLoS Biol. — 2004. — Vol. 2. — P. 312.
13. Hebert P. D. N. The promise of DNA barcoding for taxonomy / P. D. N. Hebert, T. R. Gregory // Syst. Biol. — 2005. — Vol. 54. — P. 852—859.
14. Barcoding animal life: cytochrome c oxidase subunit 1 divergences among closely related species / P. D. N. Hebert [et al.] // Proc. Biol. Sci. — 2003. — Vol. 270. — P. S96—S99.
15. Hogg I. D. Biological identifications of springtails (*Hexapoda: Collembola*) from the Canadian arctic, using mitochondrial barcodes / I. D. Hogg, P. D. N. Hebert // Canadian J Zool. — 2004. — Vol. 82. — P. 749—754.
16. Wedding biodiversity inventory of a large and complex Lepidoptera fauna with DNA barcoding. Philosophical Transactions of the Royal Society / D. H. Janzen, M. Hajibabaei, J. M. Burns [et al.] // Biological Sci. — 2005. — Vol. 360B. — P. 1835—1845.
17. Kangethe E. K. Identification of the species origin of fresh meat using an enzyme-linked immunosorbent-assay procedure / E. K. Kangethe [et al.] // Meat Sci. — 1982. — Vol. 7. — P. 229—240.
18. Diversity in Indian Penaeoid shrimps // Perspectives of Animal Taxonomy and Systematics. — School of Biodiversity and Environmental Monitoring / [eds. M. Kathirvel, P. Thirumilu, M. C. John Milton]. — Chennai, India : Dept. of Advanced Zoology and Biotechnology, Loyola College, 2011. — P. 136—158.
19. DNA barcoding Indian marine fishes / W. S. Lakra, M. S. Verma, M. Goswami [et al.] // Mol. Ecol. Resour. — 2011. — Vol. 1, iss. 1. — P. 60—71.
20. Identifying species of moths (*Lepidoptera*) from Baihua Mountain, Beijing, China, using DNA barcodes / X. F. Liu, C. H. Yang, H. L. Han [et al.] // Ecol Evol. — 2014. — Vol. 4. — P. 2472—2487.

21. Enhanced primers for amplification of DNA barcodes from a broad range of marine metazoans / J. Lobo, P. M. Costa, M. A. L. Teixeira [et al.] // BMC Ecol. — 2013. — P. 13—34.
22. DNA barcoding: how it complements taxonomy, molecular phylogenetics and population genetics / Mehrdad Hajibabaei, Gregory A. C. Singer, Paul D. N. Hebert [et al.] // Trends in Genetics. — 2011. — Vol. 23, iss. 4. — P. 167—172.
23. Biology and life cycles of prawns / S. Montgomery // Primefact. — 2010. — Vol. 268.
24. Challenging species delimitation in *Collembola*: cryptic diversity among common springtails unveiled by DNA barcoding / Porco D., Bedos A., Greenslade P. [et al.] // Invertebrate Systematics. — 2012. — Vol. 26, iss. 6. — P. 470—477.
25. Phylogenetic relationships of 12 Penaeoidea shrimp species deduced from mitochondrial DNA sequences / J. Quan, Z. Zhuang, J. Deng et al. // Biochem Genet. — 2004. — Vol. 42. — P. 331—345.
26. Molecular identification of shrimp species, *Penaeus semisulcatus*, *Metapenaeus dobsoni*, *Metapenaeus brevicornis*, *Fenneropenaeus indicus*, *Parapenaeopsis stylifera* and *Solenocera crassicornis* inhabiting in the coromandel coast (Tamil Nadu, India) using MT-COI gene / G. Rajkumar, P. Saravana Bhavan, R. Udayasuriyan [et al.] // IJFAS. — 2015. — Vol. 2(4). — P. 96—106.
27. Ratnasingham, S. The Barcode of Life Data System / Ratnasingham S., Hebert P. D. N. Mol Ecol Notes. — 2007. — 7. — P. 355—364.
28. Schubart C. D. Mitochondrial DNA and decapods phylogenies: the importance of pseudogenes and primer optimization / C. D. Schubart // Decapod Crustacean Phylogenetics. — Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009. — P. 47—65.
29. Tibayrenc M. Bridging the gap between molecular epidemiologists and evolutionists / M. Tibayrenc // Trends Microbiol. — 2005. — Vol. 13. — P. 575—580.
30. DNA barcoding Australia's fish species / R. D. Ward, T. S. Zemlak, B. H. Innes, [et al.] // Philos T Roy Soc B. — 2005. — Vol. 360. — P. 1847—1857.

REFERENCES

1. Aliabadian, M., Beentjes, K. K., Roselaar, C. S., Brandwijk, H. V., Nijman, V., & Vonk, R. (2013). DNA barcoding of Dutch birds. *Zookeys*, 365, 25-48.
2. Altschul, S. F., Gish, W., Miller, W., Myers, E. W., & Lipman, D. J. (1990). Basic local alignment search tool. *J. Mol. Biol.*, 215, 403-404.
3. Arnot, D. E. et al. (1993). Digital codes from hypervariable tandemly repeated DNA sequences in the *Plasmodium falciparum* circumsporozoite gene can genetically barcode isolates. *Mol. Biochem. Parasitol.* 61, 15-24.
4. Avise, J. C. (2000). *Phylogeography: The History and Formation of Species*. Cambridge, MA : Harvard University Press.
5. Barrett, D. H., & Hebert, P. D. N. (2005). Identifying spiders through DNA barcodes. *Canadian J Zool*, 83, 481-491.
6. Blagoev, G. A., Nikolova, N. I., Sobel, C. N., Hebert, P. D. N., & Adamowicz, S. J. (2013). Spiders (*Araneae*) of Churchill, Manitoba: DNA barcodes and morphology reveal high species diversity and new Canadian records. *BMC Ecol*, 13, 44.
7. Cawthorn, D. M., Steinman, H. A., & Witthuhn, R. C. (2012). DNA barcoding reveals a high incidence of fish species misrepresentation and substitution on the South African market. *Food Res Intr*, 46, 30-40.

8. CSIRO. (2013). Crustaceans unique colour control system. *Eco. Sciences Precinct*. Dutton Park, Australia.
9. Floyd, R. et al. (2002). Molecular barcodes for soil nematode identification. *Mol. Ecol.* 11, 839-850.
10. Folmer, O., Black, M., Hoeh, W., Lutz, R., & Vrijenhoek, R. (1994). DNA primers for amplification of mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I from diverse metazoan invertebrates. *Mol Mar BiolBiotechnol.*, 3, 5, 294-299.
11. Hebert, P. D. N., Penton, E. H., Burns, J. M., Janzen, D. H., & Hallwachs, W. (2004). Ten species in one: DNA barcoding reveals cryptic species in the Neotropical skipper butterfly *Astraptes fulgerator*. *Proc Natl Acad Sci USA*, 101, 14812-14817.
12. Hebert, P. D. N., Stoeckle, M. Y., Zemlak, T. S., & Francis, C. M. (2004). Identification of birds through DNA barcodes. *PLoS Biol*, 2, 312.
13. Hebert, P. D. N., & Gregory, T. R. (2005). The promise of DNA barcoding for taxonomy. *Syst. Biol.*, 54, 852-859.
14. Hebert, P. D. N. et al. (2003). Barcoding animal life: cytochrome c oxidase subunit 1 divergences among closely related species. *Proc. Biol. Sci.*, 270, S96-S99.
15. Hogg, I. D., & Hebert, P. D. N. (2004). Biological identifications of springtails (*Hexapoda: Collembola*) from the Canadian arctic, using mitochondrial barcodes. *Canadian J Zool*, 82, 749-754.
16. Janzen, D. H., Hajibabaei, M., Burns, J. M., Hallwachs, W., Remigio, E., & Hebert, P. D. N. (2005). Wedding biodiversity inventory of a large and complex Lepidoptera fauna with DNA barcoding. *Philosophical Transactions of the Royal Society. Biological Sci*, 360B, 1835-1845.
17. Kangethe, E. K. et al. (1982). Identification of the species origin of fresh meat using an enzyme-linked immunosorbent-assay procedure. *Meat Sci.*, 7, 229-240.
18. Kathirvel, M., Thirumilu, P., & Milton, M. C. J. (Ed.). (2011). Diversity in Indian Penaeoid shrimps. *Perspectives of Animal Taxonomy and Systematics*. Chennai, India : School of Biodiversity and Environmental Monitoring, Dept. of Advanced Zoology and Biotechnology, Loyola College, 136-158.
19. Lakra, W. S., Verma, M. S., Goswami, M., Lal, K. K., Mohindra, V., Punia, P. et al. (2011). DNA barcoding Indian marine fishes. *Mol Ecol Resour.*, 11, 1, 60-71.
20. Liu, X. F., Yang, C. H., Han, H. L., Ward, R. D., & Zhzng, A. B. (2014). Identifying species of moths (*Lepidoptera*) from Baihua Mountain, Beijing, China, using DNA barcodes. *Ecol Evol*, 4, 2472-2487.
21. Lobo, J., Costa, P. M., Teixeira, M. A. L., Ferreira, M. S. G., Costa, M. H., & Costa, F. O. (2013). Enhanced primers for amplification of DNA barcodes from a broad range of marine metazoans. *BMC Ecol*, 13-34.
22. Hajibabaei, M., Singer, G. A. C., Hebert, P. D. N., & Hickey, D. A. (2011). DNA barcoding: how it complements taxonomy, molecular phylogenetics and population genetics. *Trends in Genetics*, 23, 4, 167-172.
23. Montgomery, S. (2010). Biology and life cycles of prawns. *Primefact*, 268.
24. Porco, D., Bedos, A., Greenslade, P., Janion, C., Skarzynski, D., Stevens, M. I. et al. (2012). Challenging species delimitation in *Collembola*: cryptic diversity among common springtails unveiled by DNA barcoding. *Invertebrate Systematics*, 26, 6, 470-477.
25. Quan, J., Zhuang, Z., Deng, J., & Dai, J. (2004). Phylogenetic relationships of 12 Penaeoidea shrimp species deduced from mitochondrial DNA sequences. *Biochem Genet.*, 42, 331-345.

26. Rajkumar, G., Saravana, Bhavan P., Udayasuriyan, R., & Vadivalagan, C. (2015). Molecular identification of shrimp species, *Penaeus semisulcatus*, *Metapenaeus dobsoni*, *Metapenaeus brevicornis*, *Fenneropenaeus indicus*, *Parapenaeopsis stylifera* and *Solenocera crassicornis* inhabiting in the coromandel coast (Tamil Nadu, India) using MT-COI gene. *IJFAS.*, 2, 4, 96-106.
27. Ratnasingham, S., & Hebert, P. D. N. (2007). The Barcode of Life Data System. *Mol Ecol Notes*, 7, 3, 355-364.
28. Schubart, C. D. (2009). Mitochondrial DNA and decapods phylogenies: the importance of pseudogenes and primer optimization. *Decapod Crustacean Phylogenetics*. Martin, J. W., Crandall, K. A., & Felder, D. L. (Eds.). Boca Raton, F. L. : CRC Press, Taylor & Francis Group, 47-65.
29. Tibayrenc, M. (2005). Bridging the gap between molecular epidemiologists and evolutionists. *Trends Microbiol.* 13, 575-580.
30. Ward, R. D., Zemlak, T. S., Innes, B. H., Last, P. R., & Hebert, P. D. N. (2005). DNA barcoding Australia's fish species. *Philos T Roy Soc B*, 360, 1847-1857.

МОЛЕКУЛЯРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ І ДНК-ШТРИХКОДУВАННЯ ДВОХ ВИДІВ КРЕВЕТОК (*PARAPENAEOPSIS SCULPTILLIS* І *PARAPENAEOPSIS HARDWIKII*) З ГОРАЙ-КРІК, МУМБАЇ, ЗАХІДНЕ УЗБЕРЕЖЖЯ ІНДІЇ

Г. Зодапе, drgautamvz5@gmail.com, Кафедра зоології університету Шиваджи, Колхапур

М. Тайаде, tayade.madhuri@gmail.com, Кафедра зоології, С.С. і Л.С. Паткар коледж мистецтв і науки та В.П. Варді коледж торгівлі й економіки, Мумбаї

Г. Мехетре, ms.dharne@ncl.res.in, Національна колекція промислових мікроорганізмів, РНПД-НХЛ, Пуне

М. Дхарне, msdharne@gmail.com, Національна колекція промислових мікроорганізмів, РНПД-НХЛ, Пуне

Мета. Провести молекулярну ідентифікацію двох видів креветок (*Parapenaeopsis sculptilllis* та *Parapenaeopsis hardwikii*) з Горай-Крік, Мумбаї, західне узбережжя Індії.

Методика. Креветки *Parapenaeopsis sculptilllis* і *Parapenaeopsis hardwikii* були виловлені в Горай-Крік і ідентифіковані за морфологічними ознаками з використанням таксономічних ключів визначника ФАО. Геномна ДНК була виділена з м'язової тканини із застосуванням набору для виділення ДНК (Hi Media, Індія). Молекулярна ідентифікація зразків здійснювалася з використанням цитохромоксидазної субодиниці I (COI), секвенування генів проводилося з використанням специфічних праймерів LCO1490 and HCO2198. Філогенетичне дерево було побудоване методом «приєднання сусідів» за допомогою програми Мега 6, яка визначає зв'язок досліджуваних зразків з відомими послідовностями, що знаходяться в базі даних.

Результати. Показано, що ДНК-послідовності креветок *P. sculptilllis* і *P. hardwikii* дуже схожі з ДНК-послідовностями *P. cornuta* (84%) та *Thysanopoda obtusifrons* (83%). Було побудовано філогенетичне дерево, яке розділяє популяції на тринадцять стабільних клад. Результати ДНК-штрихкування і сучасне поширення креветок *P. sculptilllis* і *P. hardwikii* і їх заплотунів *P. cornuta* і *Thysanopoda obtusifrons* показали близькі зв'язки філогенезу між ними, що дозволяє зрозуміти адаптивну еволюцію їх ДНК-послідовностей. Аналіз філогенетичної дивергенції досліджуваних видів показав їх широке поширення, що пов'язано з тим, що ці види, а також їх родинні види, характеризуються значною різноманітністю ДНК-послідовностей, що відіграє активну роль в енергетичному метаболізмі і адаптації до різних умов навколишнього середовища.

Наукова новизна. Була виконана перша спроба проведення молекулярної ідентифікації креветок *Parapenaeopsis sculptilllis* і *Parapenaeopsis hardwikii* та порівняння їх ДНК-послідовності з іншими спорідненими видами, такими як *P. cornuta* і *Thysanopoda obtusifrons*.

Практична значимість. Отримані дані можуть бути використані для ідентифікації видів креветок і дослідження їх філогенетики і популяційної генетики.

Ключові слова: ідентифікація видів, ДНК-штрихкодуювання, креветки, філогенетика, Горай-Крик.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДНК-ШТРИХКОДИРОВАНИЕ ДВУХ ВИДОВ КРЕВЕТОК (*PARAPENAEOPSIS SCULPTILLIS* И *PARAPENAEOPSIS HARDWIKII*) ИЗ ГОРАЙ-КРИК, МУМБАИ, ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ИНДИИ

Г. Зодапе, drgautamvz5@gmail.com, Кафедра зоологии университета Шиваджи, Колхапур

М. Тайаде, tayade.madhuri@gmail.com, Кафедра зоологии, С.С. и Л.С. Паткар колледж искусств и науки и В.П. Варде колледж торговли и экономики, Мумбаи

Г. Мехетре, ms.dharne@ncl.res.in, Национальная коллекция промышленных микроорганизмов, СНПИ-НХЛ, Пуна

М. Дхарне, msdharne@gmail.com, Национальная коллекция промышленных микроорганизмов, СНПИ-НХЛ, Пуна

Цель. Провести молекулярную идентификацию двух видов креветок (*Parapenaeopsis sculptillis* и *Parapenaeopsis hardwickii*) из Горай-Крик, Мумбаи, западное побережье Индии.

Методика. Креветки *Parapenaeopsis sculptillis* и *Parapenaeopsis hardwickii* были выловлены в Горай-Крик и идентифицированы по морфологическим признакам с помощью таксономических ключей определителя ФАО. Геномная ДНК была выделена из мышечной ткани при помощи набора для выделения ДНК (Hi Media, Индия). Молекулярная идентификация образцов осуществлялась с использованием цитохромоксидазной субъединицы I (COI), секвенирование генов проводилось с использованием специфических праймеров LCO1490 и HCO2198. Филогенетическое дерево было построено методом «присоединения соседей» с помощью программы Мега 6, которая определяет связи исследуемых образцов с известными последовательностями, находящимися в базе данных.

Результаты. Показано, что ДНК-последовательности креветок *P. sculptillis* и *P. hardwickii* очень схожи с ДНК-последовательностями *P. cornuta* (84%) и *Thysanopoda obtusifrons* (83%). Было построено филогенетическое дерево, которое разделяет популяции на тринадцать стабильных клад. Результаты ДНК-штрихкодирования и современное распространение креветок *P. sculptillis* и *P. Hardwickii*, а также их гаплотипов *P. cornuta* и *Thysanopoda obtusifrons* показали близкие филогенетические связи между ними, что позволяет понять адаптивную эволюцию их ДНК-последовательностей. Анализ филогенетической дивергенции исследованных видов показал их широкое распространение, что связано с тем, что эти виды, а также их родственные виды, характеризуются значительным разнообразием ДНК-последовательностей, что имеет функциональную значимость в энергетическом метаболизме и адаптации к разным условиям окружающей среды.

Научная новизна. Была выполнена первая попытка проведения молекулярной идентификации креветок *Parapenaeopsis sculptillis* и *Parapenaeopsis hardwickii* и сравнения их ДНК-последовательности с другими родственными видами, такими как *P. cornuta* и *Thysanopoda obtusifrons*.

Практическая значимость. Полученные данные могут быть использованы для идентификации видов креветок и исследования их филогенетики и популяционной генетики.

Ключевые слова: идентификация видов, ДНК-штрихкодирование, креветки, филогенетика, Горай-Крик.

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 70-77
DOI: <http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.070>
УДК 576.08

ПРОНИЦАЕМОСТЬ МЕМБРАН СПЕРМАТОЗОИДОВ СТЕРЛЯДИ (*ACIPENSER RUTHENUS* L., 1758) ДЛЯ МОЛЕКУЛ ВОДЫ

А. Ю. Пуговкин, lima@online.ua, Институт криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

И. С. Кононенко, kononenkois@mail.ru, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

В. А. Черепнин, diglador@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

И. И. Грициняк, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Е. Ф. Копейка, ekopeik@yahoo.com, Институт криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

Цель. На основе анализа результатов криоконсервирования спермы разных видов рыб выявлено варьирование показателя выживаемости сперматозоидов в процессе замораживания-размораживания. Поэтому, целью проведенной работы было исследование и установление причин различной степени криоустойчивости сперматозоидов рыб. Также изучалась возможность определения оптимальных путей повышения эффективности выживания дефростированных сперматозоидов разных видов рыб для их дальнейшего использования с целью получения жизнеспособного потомства.

Методика. Определение проницаемости мембран сперматозоидов стерляди осуществлялось после проведения всех необходимых рыбоводных манипуляций с производителями, которые включают: преднерестовое выдерживание, гормональную стимуляцию, определение степени созревания половых продуктов, получение спермы путем отцеживания. Измерения проницаемости мембран сперматозоидов стерляди для молекул воды проводились по методике, аналогичной применяемой ранее для спермы карпа, при этом учитывались специфические свойства, присущие сперме стерляди.

Результаты. На основании проведенных измерений была определена проницаемость мембран сперматозоидов стерляди для молекул воды с использованием фотометрического метода. Полученные в результате эксперимента данные свидетельствуют о высшей степени проницаемости мембран сперматозоидов стерляди для молекул воды по сравнению с проницаемостью мембран сперматозоидов карпа.

Научная новизна. В результате проведения данного эксперимента впервые было определено абсолютное значение проницаемости мембран сперматозоидов стерляди для молекул воды с использованием фотометрического способа и проведение сравнения результатов с полученными при работе со спермой карпа.

Практическое значение. Данные, полученные в результате проведенных экспериментальных исследований, могут использоваться в практике криоконсервации для повышения эффективности результатов низкотемпературного замораживания спермы разных видов рыб.

Ключевые слова: стерлядь, сперматозоиды, криоконсервирование, мембрана сперматозоида, проницаемость мембран, молекулы воды, фотометрический метод, выживаемость сперматозоидов.

© А. Ю. Пуговкин, И. С. Кононенко, В. А. Черепнин, И. И. Грициняк,
Е. Ф. Копейка, 2016

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Ныне криоконсервирование спермы рыб — это направление, благодаря которому удается сохранить генетический материал множества ценных видов рыб с целью последующего его использования. Проведя анализ многочисленных литературных источников установлено, что для каждого вида рыб свойственна различная устойчивость сперматозоидов к процессам охлаждения-отогрева и как результат — различная эффективность криоконсервирования.

Так, для таких промысловых видов рыб как лососевые и карповые выживаемость сперматозоидов в процессе криоконсервирования обычно не превышает 25–70% в зависимости от температуры их нереста [2, 7, 9]. В то же время, результаты исследований показывают, что эффективность криоконсервирования спермы такого представителя осетровых видов рыб как стерляди может достигать в отдельных случаях и 100% [6, 8].

Есть предположения, что различная криорезистентность сперматозоидов рыб может быть связана со степенью проницаемости мембран клеток, что лимитирует потоки веществ через мембрану, в частности воды.

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕРЕШЕННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Была поставлена задача определить проницаемость мембран сперматозоидов стерляди и сравнить полученные значения с ранее определенной проницаемостью мембран сперматозоидов карпа.

Проницаемость мембран сперматозоидов карпа для молекул воды (коэффициент фильтрации — L_p) была ранее определена фотометрическим способом [1]. Поскольку в основе фотометрического способа для вычисления проницаемости мембран лежит регистрация динамики объема сперматозоидов, фотометрическое определение этого показателя для сперматозоидов стерляди сопряжено с некоторыми трудностями. Результатами некоторых исследований установлено, что на протяжении периода движения сперматозоидов стерляди их клеточный объем практически не изменяется [11]. На основании этого предполагалось, что мембраны сперматозоидов практически не имеют аквапоринов (мембранные водные каналы), и вода медленно проникает через мембрану путем диффузии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для экспериментальных исследований служила сперма 5 самцов стерляди индивидуальной массой 1,7–2,3 кг. Преднерестовое содержание производителей проходило в условиях, приближенных к природным, при температуре 15°C. В качестве стимулятора созревания половых продуктов использовался препарат «Нерестин-5а». Инъекции самцов стерляди проводилось по стандартной для рыбоводства методике с соблюдением всех правил и норм. Получение половых продуктов от самцов стерляди проводили через 24 часа после гормональной инъекции. Объем полученных молок от каждого производителя в среднем составлял 20–30 мл. Оценка качества половых

продуктов проводилась с помощью микроскопа по 5-бальной шкале Г. М. Персова [4]. Вся полученная сперма по качеству была оценена на 5 баллов.

Измерения проницаемости мембран сперматозоидов стерляди для молекул воды проводили с помощью фотоэлектрического колориметра Zalimp KF-77 (Польша), оборудованного магнитной мешалкой и термостатированным кюветным отделением.

Исследования проводились по следующей схеме: полученную сперму добавляли в кювету, заполненную водным раствором NaCl, куда погружали специальную магнитную мешалку, размешивая содержимое путем интенсивного встряхивания. Далее кювету помещали в кюветное отделение и с помощью самописца фиксировали динамику светопропускания. Для измерения использовался световой диапазон 610 нм при температуре кюветного отделения +20°C [1].

Измерения проницаемости сперматозоидов стерляди производили методом, аналогичным для спермы карповых [3] с отличиями, учитывающими специфические свойства спермы данного вида рыб:

1) более низкая по сравнению с карповыми рыбами осмотичность семенной жидкости, которая определила среду инкубации, а именно дистиллированную воду или низкоосмотичные солевые среды. Если для карпа осмотичность семенной плазмы, как правило, составляет 250–300 мОсмоль/кг, то для сперматозоидов стерляди — примерно 100–150 мОсмоль/кг;

2) различная форма сперматозоидов, которая может вносить ограничения в использование принятой в основе способа модели. Однако для изменения светопропускания суспензии рассеивающих частиц соответствующего размера характерна незначительная чувствительность к их форме;

3) существенно более низкая концентрация спермы стерляди (0,5–2 млрд/мл) по сравнению со спермой карповых рыб (10–20 млрд/мл). Исходя из этого, отношение спермы к среде инкубации в случае спермы стерляди было существенно выше: если в случае карповых рыб сперма составляет 1–2%, то для стерляди это 15–20%;

4) сильно варьирующая концентрация спермы между различными эякулятами. Для каждого измерения была подобрана такая концентрация спермы, которая бы приводила к наибольшему сигналу (рис. 1, 2).

Рис. 1. Зависимость динамики светопропускания от концентрации инкубируемой спермы

Рис. 2. Зависимость относительного светопропускания от концентрации инкубируемой спермы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных экспериментальных исследований установлено, что в условиях гипотонической среды происходит увеличение объема сперматозоидов стерляди. Этот процесс происходит за счет проникающих внутрь клетки молекул воды. Данный факт позволяет определить проницаемость мембран сперматозоидов с использованием фотометрического способа (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость характерного времени проникновения молекул воды в клетку (L_p) от температуры инкубации сперматозоидов.

Как видно из данных рисунка 2, относительное изменение объема сперматозоидов стерляди меньше, чем сперматозоидов карпа в идентичных условиях. В то же время, у сперматозоидов стерляди скорость установления равновесного значения объема выше, что говорит о более высокой проницаемости для молекул воды. При температуре воды 20°C L_p мембран сперматозоидов стерляди составляет около 0,3 мкм/(атм.×мин), тогда как при аналогичных условиях этот показатель для сперматозоидов карпа составляет 0,17 мкм/(атм.×мин).

Известен тот факт, что проницаемость мембран связана с криоустойчивостью сперматозоидов, о чем свидетельствуют исследования в некоторых научных работах [5, 10]. Так, в работе Дзюбы Б. Б. с соавторами показано, что кратковременная экспозиция сперматозоидов карпа в гипотонической среде перед добавлением криозащитной среды существенно увеличивает эффективность результатов криоконсервирования за счет повышения проницаемости мембран сперматозоидов [10]. Повышение проницаемости мембран половых клеток себрюги изучала Пономарева Е. Н. с коллегами. Для этого ими использовался метод электростимуляции с частотой сигнала 20 Гц. В результате применения указанного метода наблюдалось повышение проницаемости мембран сперматозоидов себрюги и впоследствии увеличение их выживаемости на 30% [5].

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Подтверждена возможность определения проницаемости мембран сперматозоидов стерляди для молекул воды с использованием фотометрического метода.

Степень проницаемости мембран сперматозоидов влияет на результаты криоконсервирования половых продуктов рыб.

Проницаемость мембран сперматозоидов стерляди для молекул воды является более высокой по сравнению с таковой у сперматозоидов карпов. Более высокая водопроницаемость мембран сперматозоидов является одной из причин высокой выживаемости сперматозоидов стерляди после её дефростации по сравнению со сперматозоидами карпа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Исследование проницаемости мембран сперматозоидов карпа для молекул воды / А. Ю. Пуговкин, Е. Ф. Копейка, О. А. Нардид [и др.] // Биофизика. — 2014. — Т. 59, вып. 3. — С. 481—487.
2. Копейка Е. Ф. Экологическая ниша как фактор, определяющий криорезистентность сперматозоидов рыб / Е. Ф. Копейка // Проблемы криобиологии и криомедицины. — 2014. — № 24, 4. — С. 302—311.
3. Пат. № 104809. Україна, МПК G01N 33/48 G01N 15/00. Спосіб визначення проникності мембран сперматозоїдів коропа до молекул води / [Пуговкін А. Ю., Копейка Є. Ф., Гордієнко Є. О., Нардід О. А.]. — № 2012 15035 ; заяв. 27.12.2012 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.
4. Персов Г. М. Дозирование спермиев как способ управления оплодотворением яйцеклеток осетровых / Г. М. Персов // Докл. АН СССР. — 1953. — Т. 90, № 6. — С. 1183—1185.
5. Повышение эффективности криоконсервации половых клеток себрюги с помощью электростимуляции / Е. Н. Пономарева, М. М. Богатырева, Н. В. Болонина [и др.] // Вестник АГТУ. — 2009. — № 1. — С. 100—103. — (Серия : Рыбное хозяйство).
6. Butskiy K. Obtaining high quality sterlet (*Acipenser ruthenus*) sperm after freezing and influence of hormonal stimulations / K. Butskiy // SLTB Conference, London, UK, October, 08–10, 2014 : book of abstracts. — London, 2014. — P. 90.

7. Comparison of sperm velocity, motility and fertilizing ability between firstly and secondly activated spermatozoa of common carp (*Cyprinus carpio*) / O. Linhart, S. M. H. Alavi, M. Rodina [et al.] // J. Appl. Ichthyol. — 2008. — Vol. 24. — P. 386—392.
8. Cryopreservation and short-term storage of sturgeon sperm, a review / R. Billard, J. Cosson, S. B. Noveiri [et al.] // Aquaculture. — 2004. — Vol. 236. — P. 1—9.
9. Horvath A. Cryopreservation of common carp sperm / A. Horvath // Aquatic Living Resources. — 2003. — Vol. 16. — P. 457—460.
10. Hypotonic treatment prior to freezing improves cryoresistance of common carp (*Cyprinus carpio*) spermatozoa / B. Dzyuba, J. Cosson, G. Yamaner [et al.] // Cryobiology. — 2013. — Vol. 66. — P. 192—194.
11. Volume changes during the motility period of fish spermatozoa: interspecies differences / O. Bondarenko, B. Dzyuba, J. Cosson [et al.] // Theriogenology. — 2013. — Vol. 79. — P. 872—881.

REFERENCES

1. Pugovkin, A. Ju., Kopejka, E. F., Nardid, O. A., & Cherkashina Ja. O. (2014). Issledovanie pronicaemosti membran spermatozoidov karpa dlja molekul vody. *Biofizika*, 59, 3, 481-487.
2. Kopejka, E. F. (2014). Jekologicheskaja nisha kak faktor, opredelajushhij kriorezistentnost' spermatozoidov ryb. *Problemy kriobiologii i kriomeditsiny*, 24, 4, 302-311.
3. Puhovkin, A. Iu., Kopieika, Ye. F., Hordiienko, Ye. O., & Nardid, O. A. (2014). *Sposib vyznachennia pronyknosti membran spermatozoidiv koropa do molekul vody*. Patent № 104809. Ukraina, MPK G01N 33/48 G01N 15/00. №2012 15035; Zaiavleno 27.12.2012; Opublikovano 11.03.2014. 5.
4. Ponomareva, E. N., Bogatyreva, M. M., Bolonina, N. V., & Tihomirov, A. M. (2009). Povyshenie jeffektivnosti kriokonservacii polovyh kletok sevrjugi s pomoshh'ju jelektrostimuljacii. *Vestnik AGTU. Ser.: Rybnoe hozjajstvo*, 1, 100-103.
5. Persov, G. M. (1953). Dozirovanie spermiev kak sposob upravlenija oplodotvorenijem jajcekletok osetrovyh. *Dokl. AN SSSR*, 90, 6, 1183-1185.
6. Butskiy, K. (2014). Obtaining high quality sterlet (*Acipenser ruthenus*) sperm after freezing and influence of hormonal stimulations. *SLTB Conference*. London, UK, 90.
7. Linhart, O., Alavi, S. M. H., Rodina, M., Gela, D., & Cosson, J. (2008). Comparison of sperm velocity, motility and fertilizing ability between firstly and secondly activated spermatozoa of common carp (*Cyprinus carpio*). *J. Appl. Ichthyol.*, 24, 386-392.
8. Billard, R., Cosson, J., Noveiri, S. B., & Pourkazemi, M. (2004). Cryopreservation and short-term storage of sturgeon sperm, a review. *Aquaculture*, 236, 1-9.
9. Horvath, A. (2003). Cryopreservation of common carp sperm. *Aquatic Living Resources*, 16, 457-460.

10. Dzyuba, B., Cosson, J., Yamaner, G., Bondarenko, O., Rodina, M., Gela, D. et al. (2013). Hypotonic treatment prior to freezing improves cryoresistance of common carp (*Cyprinus carpio*) spermatozoa. *Cryobiology*, 66, 192-194.
11. Bondarenko, O., Dzyuba, B., Cosson, J., Yamaner, G., Prokopchuk, G., Psenicka, M., & Linhart, O. (2013). Volume changes during the motility period of fish spermatozoa: interspecies differences. *Theriogenology*, 79, 872-881.

ПРОНИКНІСТЬ МЕМБРАН СПЕРМАТОЗОЇДІВ СТЕРЛЯДІ (*ACIPENSER RUTHENUS* L., 1758) ДЛЯ МОЛЕКУЛ ВОДИ

А. Ю. Пуговкін, lima@online.ua, Інститут кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

І. С. Кононенко, kononenkois@mail.ru, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

В. О. Черепнін, diglador@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

І. І. Грициняк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Є. Ф. Копейка, ekopeik@yahoo.com, Інститут кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

Мета. На підставі аналізу результатів кріоконсервування сперми різних видів риб виявлено варіювання показника виживання сперматозоїдів в процесі заморожування-розморожування. Саме тому метою проведеної роботи було дослідження і встановлення причин різного ступеня кріостійкості сперматозоїдів риб. Також вивчалася можливість визначення оптимальних шляхів підвищення ефективності виживання дефростованих сперматозоїдів різних видів риб для їх подальшого використання з метою отримання життєстійкого потомства.

Методика. Визначення проникності мембран сперматозоїдів стерляді здійснювалося після проведення всіх необхідних рибницьких маніпуляцій з плідниками, які включають: переднерестове витримування, гормональне стимулювання, визначення стадії зрілості статевих продуктів, отримання сперми шляхом відціджування. Вимірювання проникності мембран сперматозоїдів стерляді для молекул води проводилося за методикою, аналогічною тій, що застосовувалася раніше для сперми коропа, але з урахуванням специфічних особливостей, характерних для сперми стерляді.

Результати. На підставі проведених вимірювань була визначена проникність мембран сперматозоїдів стерляді для молекул води з використанням фотометричного методу. Отримані в результаті експерименту дані свідчать про вищий ступінь проникності мембран сперматозоїдів стерляді для молекул води в порівнянні з проникністю мембран сперматозоїдів коропа.

Наукова новизна. В результаті проведення даного експерименту вперше було визначено абсолютне значення проникності мембран сперматозоїдів стерляді для молекул води з використання фотометричного способу і проведено порівняння результатів з отриманими в процесі роботи зі спермою коропа.

Практичне значення. Дані, отримані в результаті проведених експериментальних досліджень, можуть використовуватися в практиці кріоконсервування для підвищення ефективності результатів низькотемпературного заморожування сперми різних видів риб.

Ключові слова: стерлядь, сперматозоїди, кріоконсервування, мембрана сперматозоїда, проникність мембран, молекули води, фотометричний метод, виживання сперматозоїдів.

**PERMEABILITY OF STERLET SPERM MEMBRANES
(*ACIPENSER RUTHENUS* L., 1758) FOR WATER MOLECULES**

A. Puhovkin, lima@online.ua, Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the NAS of Ukraine, Kharkiv

I. Kononenko, kononenkois@mail.ru, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

V. Cherepnin, diglador@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

I. Hrytsyniak, info@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

E. Kopeika, ekopeik@yahoo.com, Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the NAS of Ukraine, Kharkiv

Purpose. *The literature analysis of the results cryopreservation of different fish species highlights a variation of many parameters, in particular the sperm survival rate during the freezing and unfreezing process. The survival capability of spermatozoa may be called the main parameter, which identifies the efficiency of the entire process of low temperature freezing of reproductive products. Therefore, the goal of this work was to investigate and find the causes of different degrees of fish sperm cryoimmunity, in particular that of sterlet, which is a valuable of sturgeon (*Acipenser*) species. We also studies the possibility to find the optimum ways to improve the efficiency of the survival rate of the defrosted spermatozoa of different fish species for their further use to produce viable offspring.*

Methodology. *The determination of sterlet sperm membrane permeability was performed after carrying out all necessary manipulations with brood males which included: prespawning incubation, hormonal stimulation, determination of sperm maturity degree, obtaining the sperm by stripping. The measurement of sperm membrane permeability for water molecules was performed based on the technique, which had been used earlier to measure carp sperm permeability, but taking account the specific peculiarities inherent to sterlet sperm.*

Findings. *Based on the performed measurements, we determined the sterlet sperm membrane permeability for water molecules with the use of photometric method. The received experimental data show the highest degree of sterlet sperm membrane permeability for water molecules as compared to carp sperm membrane permeability.*

Originality. *As a result of this experiment, we determined for the first time the absolute value of sterlet sperm membrane permeability for water molecules with the use of photometric method as well as compared the results with those obtained during our work with the carp sperm.*

Practical value. *The data obtained during the experimental studies can be used in the practice of sperm cryopreservation for improving the efficiency of the sperm different of fish species during the process of low temperature freezing especially for such commercially valuable fish species as sturgens.*

Keywords: *sterlet, spermatozoa, cryopreservation, sperm membrane, low temperature freezing, membrane permeability, water molecules, photometric method, spermatozoa survival rate.*

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 78-87
DOI: <http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.078>
УДК 597.2/5:639.217:591.144

МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА ТА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ СЕЛЕЗІНКИ СОМА (*SILURUS GLANIS* L.)

О. Ф. Дунаєвська, Oksana_Fd@ukr.net, Житомирський національний
агроєкологічний університет, м. Житомир

Мета. Дослідження мікроскопічної будови та морфометричних показників селезінки сома європейського.

Методика. Для дослідження використовували селезінку клінічно здорових дворічних сомів європейських (*Silurus glanis* L.). Визначали абсолютну, відносну масу органу або індекс розвитку селезінки. Для гістологічних досліджень шматочки матеріалу фіксували в 10–12%-му охолодженому розчині нейтрального формаліну, з подальшим заливанням у парафін. Парафінові зрізи виготовляли на санному мікротомі, товщиною не більше 10 мкм. Для визначення морфології клітин і тканин при світловій мікроскопії застосовували фарбування гістозрізів гематоксиліном і еозином. Визначення лінійних розмірів селезінки, морфометричні дослідження здійснювали за допомогою програми «Master of Morphology». Кількісні показники опрацьовували за допомогою програми «Statistic 6.0».

Результати. Селезінка сома європейського відповідала загальним закономірностям будови селезінки риб: виявлялись опорно-скоротливий апарат, біла і червона пульпи та властивий клітинний склад. Особливостями мікроскопічної будови досліджуваного органу сома європейського є нерозвиненість радіальних трабекул, слабкий розвиток періартеріальних лімфоїдних піків, відсутність диференціації на зони в лімфоїдних вузликах. Найбільшого розвитку отримала червона пульпа ($70,82 \pm 10,76\%$), найменшого — опорно скоротливий апарат ($7,04 \pm 0,65\%$). Основою білої пульпи ($22,14 \pm 6,61\%$) є лімфоїдні вузлики переважно без центру розмноження. Опорно-скоротливий апарат селезінки, до якого входить капсула і система трабекул, розвинений нерівномірно. Так, товщина капсули на різних ділянках органу неоднакова: найбільша вона у воротах, має нерівномірні потовщення та значення $21,85 \pm 7,44$ мкм, її відносна площа — $3,06 \pm 0,32\%$. Відносна площа трабекулярного апарату становить $3,98 \pm 2,57\%$, найбільшого розвитку досягають судинні трабекули. Відносна маса селезінки становила $0,086 \pm 0,0006\%$.

Наукова новизна. З'ясовано особливість будови селезінки сома європейського та здійснено морфометричний аналіз структурних складників органу: співвідношення білої пульпи до червоної складає 1:3,2; опорно-скоротливого апарату до паренхіми — 1:13,2, відносна маса — $0,086 \pm 0,0006\%$.

Практична значимість. Визначення морфометричних показників селезінки сома європейського як органу кровотворення та імунного захисту необхідно для промислового вирощування здорової риби. Вивчення їх змін, особливо таких параметрів як відносна маса та відносна площа білої пульпи, можна використовувати для виявлення негативних чинників, моніторингу водних систем та створення сприятливих умов для гідробіотів.

Ключові слова: селезінка, морфологія, морфометрія, сом європейський, трабекули, капсула, біла пульпа, червона пульпа, лімфоїдний вузлик, відносна площа.

© О. Ф. Дунаєвська, 2016

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Селезінка наявна у всіх хребетних [1]; у риб це один з основних імунокомпетентних органів [2]. Її формування та поділ на білу та червону пульпу в осетрових риб відбувається до 5-місячного віку [3]. Селезінка риб, завдяки наявності гемопоетичної тканини, виконує функцію кровотворення [4]. В селезінці кісткових риб відбувається розвиток клітин моноцитарної і лімфоїдної ліній диференціації, але основна її роль — депонування крові, тому у багатьох видів костистих риб селезінка залишається переважно еритроїдною [5]. Селезінка осетрових риб впродовж всього життєвого циклу зберігає напівстовбурові клітини крові [6]. В селезінці формується імунна відповідь [7]; це імунний орган та біологічний фільтр [5]. У риб після видалення селезінки спостерігається зменшення кількості лімфоцитів в периферичній крові [5], хоча це і не призводить до пригнічення імунної відповіді [8]. Імунна система риб лабільна, що дає змогу використовувати імунологічні параметри риб для моніторингу екологічного стану водних систем [9], а зміни розмірів внутрішніх органів, в тому числі селезінки, враховувати для оцінки фізіологічного стану та створення оптимальних умов для гідробіонтів в період їх формування [10].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Значна кількість висновків та досліджень з питань онтогенезу і архітекτονіки імунної системи риб не тільки не збігаються, але й знаходяться у протиріччі. Це пов'язано з тим, що будова імунної системи риб у різних класів, і навіть видів риб, має певні суттєві відмінності [11].

Метою роботи було з'ясування основних морфометричних характеристик та особливостей мікроскопічної будови селезінки сома європейського.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Для дослідження були відібрані зразки селезінки 18-ти клінічно здорових дворічних сомів європейських (*Silurus glanis* L.), родини сомові (*Siluridae*), ряду сомоподібних (*Siluriformes*), підкласу новоперих риб (*Neopterygii*), класу променеперих риб (*Actinopterygii*) обох статей [12, 13]. Риба була вирощена у ставах ТОВ «СГФ «Інтерриба» с. Кримок Радомишльського району Житомирської області. Визначали абсолютну, відносну масу органу або індекс розвитку селезінки (IC) [14]. Уся експериментальна частина дослідження була проведена згідно з вимогами міжнародних принципів «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються в експерименті та інших наукових цілях» (Страсбург, 1986 р.) та відповідного Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (№ 3446-IV від 21.02.2006 р., м. Київ).

Для гістологічних досліджень шматочки матеріалу фіксували в 10–12%-му охолоджену розчині нейтрального формаліну, з подальшим заливанням у парафін. Парафінові зрізи виготовляли на санному мікротомі MC-2, товщиною не більше 10 мкм. Для вивчення морфології клітин і тканин при світловій мікроскопії застосовували фарбування гістозрізів гематоксиліном та еозином [15]. Визначення лінійних розмірів селезінки, морфометричні дослідження здійснювали за допомогою програми «Master of Morphology». Кількісні показники опрацьовували за допомогою програми «Statistic 6.0».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Результати наших досліджень показують, що селезінка сома європейського розміщена в черевній порожнині, зовні вкрита тонкою сполучнотканинною оболонкою, пружної консистенції, доволі м'яка, темно-червоного забарвлення. Такі ознаки селезінки притаманні також іншим представникам променеперих риб та класу хрящових риб [5, 6, 16]. Морфометрично досліджено, що товщина селезінки сома становила $0,61 \pm 0,02$ см, довжина — $2,22 \pm 0,07$ см, ширина — $1,71 \pm 0,02$ см, відношення ширини до довжини — 0,77, отже її форма є овально-видовженою. Абсолютна маса селезінки становила $1,71 \pm 0,02$ г, ІС — $0,086 \pm 0,0006\%$.

У зв'язку з тим, що основою органу є опорно-скоротливий апарат, до якого входить капсула і система трабекул, досліджували їх особливості. Товщина капсули у різних ділянках органу була неоднаковою — найбільшою вона була у воротах селезінки (до 40 мкм). Капсула мала нерівномірні потовщення (до 37,5 мкм), її товщина в середньому становила $21,85 \pm 7,44$ мкм. Відносна площа капсули складала $3,06 \pm 0,32\%$. Капсула і трабекули були утворені щільною сполучною та гладкою м'язовою тканиною. У сполучній тканині капсули і трабекул переважну частину становили еластичні волокна, які дають змогу селезінці змінювати свої розміри, витримувати значне збільшення в об'ємі та виконувати функцію депонування крові. Трабекули були чітко диференційовані на судинні, сполучні і радіальні. Судинні (рис. 2) несли в собі артерії, вени, нерви і входили в паренхіму в ділянці воріт селезінки; сполучні трабекули не містили судин і відходили латерально від судинних; радіальні трабекули відходили від внутрішньої поверхні капсули радіально вглиб. Більшість трабекул мала видовжену форму. На мікропрепаратах селезінки сома характерною особливістю була наявність незначної кількості радіальних трабекул; вони ледве помітні. Добре розвинені сполучні трабекули, які мали неправильну форму і були сформовані переважно пухкою сполучною тканиною. Довжина сполучних трабекул варіювала в значних межах: від 37,5 мкм до 162,5 мкм (середнє значення становило $84,06 \pm 39,59$ мкм), ширина — від 17,5 мкм до 90,0 мкм (середнє значення — $38,75 \pm 24,01$ мкм). Діаметр сполучних трабекул становив $28,75 \pm 8,75$ мкм, інколи траплялись поодинокі трабекули довжиною 90,0–122,5 мкм. Найбільшого розвитку досягали судинні трабекули; їх довжина була в межах від 32,5 мкм до 1275,0 мкм, ширина від 15,0 мкм до 367,5 мкм. Відношення ширини до діаметра та довжини становило 1:1,27:4,14. Відносна площа трабекулярного апарату становила $3,98 \pm 2,57\%$ (рис. 3).

Міжтрабекулярна частина селезінки складалась із ретикулярної тканини, в якій розрізняли білу та червону пульпу (рис. 1). Як відомо, біла пульпа — це комплекс лімфоїдних вузликів. В розвинених вузликах розрізняють кілька зон, зокрема, світлий центр [11]. У досліджувальних нами зразках лімфоїдні вузлики частіше за все виявлялися без чітких меж. Визначались округлі та овальні лімфоїдні вузлики без центру розмноження діаметром $71,67 \pm 25,05$ мкм, траплялись як малі за величиною лімфоїдні вузлики (діаметр 27,5–40 мкм), так і великі (діаметр 100–130 мкм). Нерідко в них розташовувалась артеріола. Виділялися дрібні вузлики з тонким темним обідком товщиною $6,667 \pm 1,179$ мкм. Кількість лімфоїдних вузликів на одиницю площі ($0,021 \text{ мм}^2$) становила $109,4 \pm 15,93$ штук.

Періартеріальна зона — своєрідна піхва, яка складається з малих лімфоцитів, що щільно прилягають один до одного, та інтердигітуючих клітин [11], саме тому наші дослідження були зосереджені на характеристиці цієї зони у сома. Періартеріальні лімфоїдні піхви мали різну довжину і ширину, найчастіше складаючись з 2–3-х рядів щільно розташованих клітин. Відносна площа білої пульпи становила $22,14 \pm 6,61\%$ (рис. 3). Кожен лімфоїдний вузлик складався із комплексу клітин лімфоїдної тканини: лімфоцити (малі, середні, великі), лімфобласти, макрофаги, дендритні клітини, плазматичні клітини. В паренхімі селезінки дифузно розміщувалися меланомакрофагоцити, що мали велику кількість пігменту гемосидерину.

*Рис. 1. Паренхіма селезінки сома.
а – червона пульпа; б – біла пульпа.
Гематоксилін та еозин. $\times 280$.*

*Рис. 2. Судинна трабекула.
Гематоксилін та еозин. $\times 280$.*

Гістологічно досліджували червону пульпу — міжтрабекулярну та міжвузликову тканину, що заповнена еритроцитами, які зумовлювали її червоне забарвлення. Еритроцити знаходились на різних етапах розвитку: дозріваючі, зрілі, зруйновані. В ретикулярній тканині знаходились вільні клітинні елементи: клітини крові, плазматичні клітини, макрофаги. Клітини в червоній пульпі розташовувались дифузно і пухкіше, ніж у білій пульпі. В червоній пульпі, крім клітинних елементів, розміщувались численні артеріоли, капіляри, своєрідні венозні синуси, в порожнинах яких депонувались клітинні елементи. Також спостерігались венозні синуси (синусоїди).

Навколо артеріол інколи виявлялись острівці гемопоєзу. У паренхімі органу також містились і фрагментарні широкі пучки сполучної тканини. Судини селезінки мали різну довжину та ширину. Їх параметри у більшості випадків знаходилися в межах: довжина — від 17,5 мкм до 75 мкм, ширина — від 10 мкм до 15,5 мкм, діаметр — від 10 до 60 мкм, діаметр судинної стінки — від 2,5 мкм до 12,5 мкм (рис. 4). Артеріальні судини мали щільні стінки з чітко оконтурованим ендотелієм. Судини, розташовані в трабекулах, повнокровні. Відносна площа червоної пульпи становила $70,82 \pm 10,76\%$ (рис. 3). Співвідношення білої пульпи до червоної складало 1:3,2. Співвідношення опорно-скоротливого апарату до паренхіми — 1:13,2.

Отже, спільною рисою селезінки сома європейського з іншими представниками променеперих та хрящових риб була її топографія, що підтверджується дослідженнями науковців, які визначали масу органу інших видів риб. Так, у 2-річного лускатого коропа відносна маса селезінки становила $0,22 \pm 0,01\%$; у малолускатого — $0,20 \pm 0,01\%$, за дефіциту корму збільшуючись до $0,23 \pm 0,01\%$ [17]. ІС осетра віком сорок діб становив $0,25\%$ [10]. ІС масових видів чорноморських риб знаходився в межах від $0,072 \pm 0,005\%$ (морський йорж, клас променепері) до $0,712 \pm 0,104\%$ (морський кіт, клас хрящові). Це зумовлювалося тим, що у хрящових риб селезінка є основним органом еритропоезу, тоді як у променеперих — нирки, що і призводило до інтенсивного розвитку цього органу [14]. Нашими дослідженнями статевих відмінностей при цьому не виявлено, що узгоджувалося з літературними даними [14].

Рис. 3. Відносна площа основних структурних елементів селезінки сома європейського

Рис. 4. Морфометричні показники судин селезінки сома європейського

Відмінності у мікроскопічній будові та морфометричних показниках прослідковуються не лише між класами, але й між рядами, родинами, родами, видами риб [18]. У ската (клас хрящові риби) біла і червона пульпа чітко виділялись, біла концентрувалась навколо судин, її площа на перетині складала $31,0 \pm 3,15\%$ [6]. У більшості представників цього класу наявна лише червона

пульпа, в якій виділяють окремі лімфоїдні скупчення [8]. У риб класу променеперих отримані різні результати щодо розташування та співвідношення білої і червоної пульпи в селезінці. Так, у осетрових виразно виділялась біла і червона пульпа; у вобли це розділення нечітко [5]: у 3-річних самок вобли поділу на червону і білу пульпи взагалі не було, виявлялись лише незначні, нечітко окреслені ділянки білої пульпи, червона ж займала понад 80% об'єму селезінки [5]. У дводишних риб у білій пульпі виявляються фолікулоподібні скупчення лімфоцитів [8]. Відносна площа білої пульпи становила у севрюги 28% та 30% у білуги. У судака звичайного основну частину займає червона пульпа, біла пульпа представлена незначними ділянками неправильної форми, які концентрувались навколо артерійол. Вона без чіткої межі переходила в червону [5].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Селезінка сома європейського сформована опорно-скоротливим апаратом і білою та червоною пульпами. Особливостями мікроскопічної будови її є нерозвиненість радіальних трабекул, слабкий розвиток періартеріальних лімфоїдних півх, відсутність диференціації на зони в лімфоїдних вузликах. Біла пульпа ($22,14 \pm 6,61\%$) представлена великою кількістю лімфоїдних вузликів невеликих розмірів та періартеріальними лімфоїдними півхами. Червона пульпа ($70,82 \pm 10,76\%$) сформована ретикулярною тканиною, клітинними елементами, численними судинами (артеріоли, капіляри, венозні синуси). Опорно-скоротливий апарат ($7,04 \pm 0,65\%$) представлений системою капсули і трабекул.

Подальші дослідження спрямовані на вивчення морфометричних особливостей селезінки інших представників риб класу променеперих, які вирощуються в рибних господарствах Житомирської області з метою розроблення критеріїв для моніторингу водних об'єктів, оцінки фізіологічного стану риби.

ЛІТЕРАТУРА

1. Сапин М. Р. Иммунная система, стресс и иммунодефицит / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк. — М. : АПП Джангар, 2000. — 184 с.
2. Микряков Д. В. Влияние некоторых кортикостероидных гормонов на структуру и функцию иммунной системы рыб : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология», 14.00.36 «Аллергология и иммунология» / Д. В. Микряков. — М., 2004. — 28 с.
3. Говядинова А. А. Исследование локализации и особенностей строения кроветворной ткани у осетровых рыб : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.11 «Эмбриология, гистология и цитология» / А. А. Говядинова. — М., 1998. — 25 с.
4. Шеина Т. А. Состав крови и содержание тяжёлых металлов в органах и тканях у трёх видов рыб в бассейне реки Кама : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. биол. наук : спец. 03.02.08 «Экология (биология)» / Т. А. Шеина. — Пермь, 2014. — 20 с.
5. Грушко М. П. Клеточный состав кроветворных органов половозрелых самок представителей класса рыб, земноводных и пресмыкающихся : автореф. дисс. на соискание науч. степени докт. биол. наук : спец. 03.03.04 «Клеточная биология, цитология, гистология» / М. П. Грушко. — Астрахань, 2010. — 44 с.

6. Ложниченко О. В. Цитогенез форменных элементов крови и особенности формирования органов кроветворения у осетровых рыб : автореф. дисс. на соискание науч. степени докт. биол. наук : спец. 03.00.25 «Гистология, цитология, клеточная биология» / О. В. Ложниченко. — Астрахань, 2007. — 44 с.
7. Здоровая рыба. Профилактика, диагностика и лечение болезней / [Рахконен Р., Веннерстем П., Ринтамяки П., Каннел Р.]. — Хельсинки, 2013. — 180 с.
8. Киташова А. А. Реакции врождённого и приобретённого иммунитета рыб в естественных и экспериментальных условиях : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология», 14.00.36 «Аллергология и иммунология» / А. А. Киташова. — М., 2002. — 26 с.
9. Минченок Е. Е. Некоторые защитные явления у молоди семги и горбуши / Е. Е. Минченок, Н. Г. Журавлёва // Вестник МГТУ. — 2006. — Т. 9, № 5. — С. 770—778.
10. Фунг Н. Д. Морфобиологическая характеристика заводской молоди осетра для формирования запасов / Н. Д. Фунг, В. М. Распопов, Ю. В. Сергеева // Вестник АГТУ. — 2013. — № 2. — С. 191—196. — (Серия : Рыбное хозяйство.).
11. Клименко О. М. Особливості гістологічної будови імунної системи риб : Атлас мікрофотографій / Клименко О. М., Слюсаренко А. О., Присяжнюк Н. М. — Біла Церква, 2010. — 32 с.
12. Куцоконь Ю. Українські назви міног і риб фауни України для наукового вжитку / Ю. Куцоконь, Ю. Квач // Біологічні студії. — 2012. — Т. 6, № 2. — С. 199—220.
13. Мовчан Ю. В. Риби України (таксономія, номенклатура, зауваження) / Ю. В. Мовчан // Зб. праць Зоологічного музею. — 2008–2009. — № 40. — С. 47—86.
14. Кузьминова Н. С. Видовые, сезонные, половые отличия индекса селезёнки некоторых видов черноморских рыб и его подверженность антропогенному фактору / Н. С. Кузьминова // Vestnik zoologii. — 2008. — № 42(2). — С. 135—142.
15. Горальський Л. П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології: навч. посібник / Горальський Л. П., Хомич В. Т., Кононський О. І. — Житомир : Полісся, 2005. — 288 с.
16. Амплеева А. В. Морфофункциональные особенности кроветворных органов и клеток крови у сеголеток белорыбицы / А. В. Амплеева, О. В. Ложниченко // Вестник АГТУ. — 2012. — № 2. — С. 125—130. — (Серия : Рыбное хозяйство.).
17. Пронина Г. И. Физиолого-иммунологическая оценка культивируемых гидробионтов: карпа, сома обыкновенного, речных раков : автореф. дисс. на соискание науч. степени докт. биол. наук : спец. 03.03.01 «Физиология» / Г. И. Пронина. — М., 2002. — 39 с.
18. Степанова В. М. Влияние экологических факторов различной природы на клеточное звено иммунной системы рыб : автореф. дисс. на соискание науч.

степени канд. биол. наук : спец. 03.02.16 «Екологія» / В. М. Степанова. — Борок, 2003. — 21 с.

REFERENCES

1. Sapin, M. R., & Nikitiuk, D. B. (2000). *Imunnaya sistema, stress i immunodefitsyt*. Moskva : APP Dzhanhar.
2. Mikrjakov, D. V. (2004). Vliyanie nekotorykh kortikosteroidnykh gormonov na strukturu i funktsiju immunnoi sistemy ryb. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moskva.
3. Govjadinova, A. A. (1998). Issledovanie lokalizatsii i osobennostej stroeniya krovetvornoj tkani u osetrovyyh ryb. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moskva.
4. Sheina, T. A. (2014). Sostav krovi i sodержanie tyazhelykh metallov v organakh I tkanyakh u trekh vidov ryb v bassejne reki Kama. *Extended abstract of candidate's thesis*. Perm'.
5. Grushko, M. P. (2010). Kletochnyy sostav krovetvornykh organov polovozrelykh samok predstaviteley klassa ryb, zemnovodnykh i presmykayushchikhsya. *Extended abstract of doctor's thesis*. Astrakhan'.
6. Lozhnichenko, O. V. (2007). Tsitogenez formennykh elementov krovi i osobennosti formirovaniya organov krovetvoreniya u osetrovyyh ryb. *Extended abstract of doctor's thesis*. Astrakhan'.
7. Rakhkonen, R., Vennerstem, P., Rintamyaki, P., & Kannel, R. (2013). *Zdorovaya ryba. Profilaktika, diagnostika i lechenie bolezney*. Khel'sinki.
8. Kitashova, A. A. (2002). Reaktsii vrozhdennogo i priobretnennogo immuniteta ryb v estestvennykh i eksperimental'nykh usloviyakh. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moskva.
9. Minchenok, E. E., & Zhuravleva, N. G. (2006). Nekotorye zashchitnye yavleniya u molodi semgi i gorbushy. *Vestnik MGTU*, 9, 5, 770-778.
10. Fung, N. D., Raspopov, V. M., & Sergeva, Yu. V. (2013). Morfobiologicheskaya kharakteristika zavodskoy molodi osetra dlya formirovaniya zapasov. *Vestnik AGTU. Ser. : Rybnoe khozyaystvo*, 2, 191-196.
11. Klymenko, O. M., Sliusarenko, A. O., & Prysiashniuk, N. M. (2010). *Osoblyvosti histolohichnoi budovy imunnoi systemy ryb: Atlas mikrofotohrafii*. Bila Tserkva.
12. Kutsokon, Iu., & Kvach, Iu. (2012). Ukrainski nazvy minoh i ryb fauny Ukrainy dlia naukovoho vzhytku. *Biologichni studii*, 6, 2, 199-220.
13. Movchan, Iu. V. (2008-2009). Ryby Ukrainy (taksonomiia, nomenklatura, zauvazhennia). *Zb. prats Zoolohichnoho muzeiu*, 40, 47-86.
14. Kuz'minova N. S. (2008). Vidovye, sezonnye, polovye otlichiya indeksa selezenki nekotorykh vidov chernomorskikh ryb i ego podverzhennost' antropogennomu faktoru. *Vestnik zoologii*, 42(2), 135-142.
15. Horalskyi, L. P., Khomych, V. T., & Kononskyi, O. I. (2005). *Osnovy histolohichnoi tekhniki i morfofunktsionalni metody doslidzhen u normi ta pry patolohii. Navch. posibnyk*. Zhytomyr : Polissia.
16. Ampleeva, A. V., & Lozhnichenko, O. V. (2012). Morfofunktsional'nye osobennosti krovetvornykh organov i kletok krovi u segoletok belorybicy. *Vestnik AGTU. Ser. : Rybnoe hozjajstvo*, 2, 125-130.

17. Pronina, G. I. (2002). Fiziologo-immunologicheskaya otsenka kul'tiviruemyykh gidrobiontov: karpa, soma obyknovennogo, rechnykh rakov. *Extended abstract of doctor's thesis*. Moskva.
18. Stepanova, V. M. (2003). Vliyanie ekologicheskikh faktorov razlichnoy prirody na kletochnoe zveno immunnyy sistemy ryb. *Extended abstract of candidate's thesis*. Borok.

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЕЗЕНКИ СОМА (*SILURUS GLANIS L.*)

О. Ф. Дунаевская, Oksana fd@ukr.net, Житомирский национальный
агроэкологический университет, г. Житомир

Цель. Исследование микроскопического строения и морфометрических показателей селезёнки сома европейского.

Методика. Для исследования использовали селезёнку клинически здоровых двухгодичных сомов европейских (*Siluris glanis L.*). Определяли абсолютную, относительную массу органа или индекс развития селезёнки. Для гистологических исследований кусочки материала фиксировали в 10–12%-м охлажденном растворе нейтрального формалина, с последующей заливкой в парафин. Парафиновые срезы изготавливали на санном микротоме, толщиной не более 10 мкм. Для определения морфологии клеток и тканей при световой микроскопии применяли окрашивание гистосрезов гематоксилином и эозином. Определение линейных размеров селезёнки, морфометрические исследования осуществляли с помощью программы «Master of Morphology». Количественные показатели обрабатывали с помощью программы «Statistica 6.0».

Результаты. Селезенка сома европейского отвечала общим закономерностям строения селезёнки рыб: определялись опорно-сократительный аппарат, белая и красная пульпы и свойственный клеточный состав. Особенности микроскопического строения исследуемого органа сома европейского является неразвитость радиальных трабекул, слабое развитие периартериальных лимфоидных влаглищ, отсутствие дифференциации на зоны в лимфоидных узелках. Наибольшее развитие получила красная пульпа ($70,82 \pm 10,76\%$), наименьшее — опорный сократительный аппарат ($7,04 \pm 0,65\%$). Основой белой пульпы ($22,14 \pm 6,61\%$) являются лимфоидные узелки преимущественно без центра размножения. Опорно-сократительный аппарат селезенки, в который входит капсула и система трабекул, развит неравномерно. Так, толщина капсулы на разных участках органа неодинакова: наибольшая она в воротах, имеет неравномерные утолщения и значение $21,85 \pm 7,44$ мкм, ее относительная площадь — $3,06 \pm 0,32\%$. Относительная площадь трабекулярного аппарата составляет $3,98 \pm 2,57\%$, наибольшего развития достигают сосудистые трабекулы. Относительная масса селезёнки составляла $0,086 \pm 0,0006\%$.

Научная новизна. Выяснено строение селезёнки сома европейского и осуществлен морфометрический анализ составляющих органа, установлены особенности строения: соотношение белой пульпы и красной составляет 1:3,2; опорно-сократительного аппарата и паренхимы — 1:13,2, относительная масса $0,086 \pm 0,0006\%$.

Практическая значимость. Определение морфометрических показателей селезёнки сома европейского как органа кроветворения и иммунной защиты необходимо для промышленного выращивания здоровой рыбы. Изучение их изменений, особенно таких параметров как относительная масса и относительная площадь белой пульпы, можно использовать для выявления негативных факторов, мониторинга водных систем и создания благоприятных условий для гидробионтов.

Ключевые слова: селезенка, морфология, морфометрия, сом европейский, трабекулы, капсула, белая пульпа, красная пульпа, лимфоидный узелок, относительная площадь.

MICROSCOPIC STRUCTURE AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF EUROPEAN CATFISH (*SILURIS GLANIS L.*) SPLEEN

O. Dunaevskaya, Oksana_Fd@ukr.net, Zhytomyr National Agro-Ecological University,
Zhytomyr

Purpose. Study of the microscopic structure and morphometric parameters of European catfish spleen.

Methodology. For the study, we used the spleen of clinically healthy age-2 European catfish (*Silurus glanis L.*). We determined the absolute and relative weight of the organ or the index of spleen development. For the histological studies, pieces of the material were preserved in 10-12 % cooled neutral formalin solution, with subsequent filling in paraffin. Paraffin sections were prepared using a sledge microtome, with a thickness of no more than 10 microns. To determine the cell and tissue morphology under light microscopy, we the staining of histological sections with hematoxylin and eosin. Determination of spleen linear dimensions, morphometric measurements were carried out using the "Master of Morphology". Quantitative parameters were analyzed in "Statistica 6.0".

Findings. European catfish spleen corresponded to general regularities of fish spleen structure: we identified support-contractile apparatus, white and red pulp and inherent cellular composition. Peculiarities of the microscopic structure of this organ in European catfish is underdevelopment of radial trabeculae, poor development of periarterial lymphoid sheaths, absence of the differentiation to zones in lymphoid nodules. The most developed was red pulp ($70.82 \pm 10.76\%$), the least developed — support-contractile apparatus ($7.04 \pm 0.65\%$). The base of the white pulp ($22.14 \pm 6.61\%$) is lymphoid nodules without propagation center. The support-contractile apparatus of the spleen, which includes capsule and trabecular system, is developed unevenly. E.g., the capsule thickness in different parts of the body is not the same, the biggest thickness is in porta, where it attains 21.85 ± 7.44 micrometers, its relative area is $3.06 \pm 0.32\%$. Relative area of the trabecular system is $3.98 \pm 2.57\%$, the most developed are vascular trabeculae.

Originality. We found the peculiarities of spleen structure of European catfish and performed a morphometric analysis of the structural components of this organ: the ratio of white to red pulp is 1: 3.2; support-contractile apparatus to parenchyma — 1: 13.2, the relative weight is $0.086 \pm 0.0006\%$.

Practical value. The determination of morphometric parameters of European catfish spleen as a hemopoietic organ and immune protection organ is necessary for the industrial cultivation of healthy fish. Detection of their changes, especially such parameters as relative weight and relative area of white pulp, can be used for the identification of negative factors, monitoring of water systems and creation of favorable conditions for aquatic organisms.

Keywords: spleen, morphology, morphometry, European catfish, trabeculae, capsule, white pulp, red pulp, lymphoid nodule, relative area.

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 88-101
DOI: <http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.088>
УДК 639.3.09

ВЛИЯНИЕ pH ВОДНОЙ СРЕДЫ НА УРОВЕНЬ ЗАРАЖЕНИЯ ЭКТОПАРАЗИТАМИ, СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА И ЛИЗОЦИМА У НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КАРПОВЫХ РЫБ (CYPRINIDAE)

Л. Я. Куровская, kurovskajal@mail.ru, Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена
НАН, г. Киев

Г. А. Стрилько, kurovskaja@izan.kiev.ua, Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена
НАН, г. Киев

Цель. Изучить влияние pH водной среды на уровень заражения эктопаразитами, содержание белка и лизоцима в органах и сыворотке крови у некоторых видов карповых рыб в экспериментальных условиях.

Методика. Объектами исследований служили годовики карпа, серебряный карась и амурский чебачок, выловленные из прудов рыбного хозяйства «Нивка» (Киевская обл.) в весенний период. Рыб содержали в экспериментальных условиях при нейтральных значениях pH воды (6,8–7,2) и температуре 17–18°C. Для изучения изменений уровня заражения рыб эктопаразитами при разных значениях pH использовали годовиков карпа, как объект, наиболее зараженный паразитами. Рыб помещали в аквариумы с водой при pH 5,0–5,5 (слабокислая среда) и 8,5–9,0 (слабощелочная среда) на 5 сут. После этого подсчитывали количество эктопаразитов на поверхности тела и жабрах. В сыворотке крови и экстрактах тканей органов (печень, почки, селезенка) серебряного карася и амурского чебачка, зараженных и незараженных эктопаразитами, после выдерживания их в слабокислой или слабощелочной среде в течение 8 сут. определяли содержание белка методом Лоури и лизоцима диффузионным методом на агаре.

Результаты. Дана сравнительная оценка количества эктопаразитов (*Ichthyophthirius multifiliis*, *Trichodina* sp., *Dactylogyrus* sp., *Gyrodactylus* sp.) на поверхности тела и жабрах рыб, содержания белка и лизоцима в сыворотке крови и органах при разных значениях pH водной среды. Показано, что количество эктопаразитов на поверхности тела и жабрах значительно уменьшается при выдерживании рыб в слабокислой или слабощелочной среде. У зараженного серебряного карася по сравнению с незараженными особями наблюдалось снижение содержания белка и лизоцима в печени, почках и сыворотке крови только в нейтральной среде. В слабокислой или слабощелочной среде при значительном сокращении числа эктопаразитов уровень белка и лизоцима в органах и сыворотке крови рыб существенно не отличался от показателей незараженных особей, которые находились в воде с соответствующими значениями pH. У амурского чебачка при низком уровне заражения эктопаразитами не установлено изменений уровня белка и лизоцима в органах и сыворотке крови рыб в нейтральной среде. Влияние разных значений pH воды на исследуемые показатели амурского чебачка показали достоверные их изменения.

Научная новизна. Впервые показаны изменения уровня заражения эктопаразитами, содержание белка и лизоцима в сыворотке крови и органах рыб (каarp, серебряный карась, амурский чебачок), которые находились в слабокислой или слабощелочной водной среде.

Практическая значимость. Концентрация водородных ионов, или активная реакция водной среды (pH), играет важную роль как в жизни рыб, их развитии, так и в предрасположенности к различным заболеваниям. Проведенные исследования показали, что

© Л. Я. Куровская, Г. А. Стрилько, 2016

при изменении рН воды может существенно снизиться заражение эктопаразитами, что ведет к оздоровлению рыб и восстановлению их нормальных физиологических функций, нарушение которых вызывает токсическое воздействие паразитов.

Ключевые слова: карп, серебряный карась, амурский чебачок, слабокислая среда, слабощелочная среда, эктопаразиты, белок, лизоцим.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

В современных условиях наблюдаются значительные колебания рН воды рыбохозяйственных водоемов, как в специализированных рыбоводных хозяйствах, так и в естественных акваториях. Это обстоятельство интересует биологов-рыбоводов, ветеринарных врачей-ихтиопатологов с точки зрения действия этого экологического фактора не только на физиологическое состояние рыб, но и на их паразитов, возникновение и течение болезней, вызываемых ими, а также на результаты проводимых ветеринарно-санитарных, рыбоводно-мелиоративных и противозооитических мероприятий. По данным отечественных и зарубежных исследователей, пресноводные рыбы могут выживать в пределах колебаний рН воды от 4,5–5,0 до 9,5–10,5. Оптимальными условиями для многих видов рыб являются нейтральная, слабокислая или слабощелочная среда [1, 2]. Не обладающие физиологическим эффектом на рыб величины рН находятся в пределах 6,5–8,5. Эта закономерность распространяется и на паразитов пресноводных рыб на тех фазах их развития, когда они непосредственно находятся в воде (яйца, свободноживущие личинки) или паразитируют на поверхности тела и жабрах, постоянно омываемых водой. Паразитическая инфузория *Ichthyophthirius multifiliis* активно размножается при рН 7–8. При отклонении этих величин в ту или иную сторону замедляется скорость деления паразитов внутри цисты, паразит не прикрепляется, циста не образуется, деление не наступает. Другая паразитическая инфузория — *Costia necatrix* встречается в больших количествах в зимовальных карповых прудах при рН воды 4,5–6,0 и вызывает гибель зимующих двухлетков карпа. В то же время, в прудах с нейтральной и слабощелочной средой *C. necatrix* регистрируется в незначительных количествах. Численность инфузорий *Chilodonella piscicola* у карпа нарастает быстрее в слабокислой среде и чаще наблюдается в прудах, снабжаемых водой из болотных массивов. Нейтральная среда наиболее благоприятна для развития простейших *Apiosoma piscicolum* у карпа, а молодь налима была значительно заражена *A. lotae* в слабощелочной среде (рН 8) [3]. Эпизоотии дактилогироза (возбудитель — моногенеи *Dactylogyrus* sp.) обычно случаются в прудах с нейтральной и слабокислой средой, а в прудах с повышенной рН (до 9) гибель рыб от дактилогироза не наблюдалась [4]. Этими данными практически исчерпываются сведения о влиянии рН водной среды на эктопаразитов рыб.

Изменения рН водной среды в сторону увеличения или уменьшения от нейтрального значения возникают в результате растворения в воде различных химических веществ, изменении парциального давления углекислого газа в воде. В этих условиях у рыб в той или иной степени наблюдаются изменения физиологического состояния, в частности изменения ионной концентрации и рН внутренней среды рыб [5]. Это ведет к нарушению метаболических реакций и

переноса кислорода от жабр к тканям. Стресс, вызванный действием, например, пониженной pH (ниже 6,5) воды является причиной увеличения секреции слизи жаберным эпителием и разрушения его структуры, что влечет за собой тканевую гипоксию. Повышенные значения pH (8,7–11,2) водной среды вызывают значительные изменения в крови рыб. Как резкое, так и постепенное повышение pH воды приводит к изменениям уровня глюкозы и гемоглобина в крови годовиков карпа [6]. Исследованиями по влиянию повышенного уровня pH (8,5–8,9) на показатели крови форели установлено изменение концентрации гемоглобина, числа эритроцитов, гематокрита, а нарушение поверхностных зон эритроцитов в крови рыб может служить даже информативным показателем для мониторинга качества воды [7]. Лизоцим (фермент группы гликозидаз НФ 3.2.1.17) — важный компонент врожденной защиты — широко распространен в организме рыб (ткани, биологические жидкости, секреторные выделения) [8]. Исследователи, изучавшие влияние различных видов стресса на содержание сывороточного лизоцима рыб, пришли к выводу, что активность этого фермента отражает модулирующее действие защитной системы организма, зависящие не только от природы, но и от силы стрессора [9, 10]. Данные о влиянии pH водной среды на содержание или активность лизоцима у рыб немногочисленны. Японские исследователи изучали влияние pH воды на активность лизоцима в плазме тилапии и установили повышение активности лизоцима при pH 4 [11]. Исследование влияния pH на бактериологическую активность лизоцима плазмы крови русского осетра показало, что оптимальными параметрами для действия лизоцима были величины pH 6,0–6,4 [12]. Не менее важным является определение уровня белка в сыворотке крови и тканях рыб как информативных показателей состояния организма при заражении паразитами или действии стресс-факторов (токсиканты, повышенная температура, pH среды и др.) на рыб [2, 13–15]. Концентрацию сывороточных белков относят к основным параметрам физиологического состояния, что связано с их разносторонними функциями в организме рыб [16]. Они принимают непосредственное участие в метаболических процессах; имеются сведения о возможном использовании их в качестве энергетического субстрата, а также рекомендации использовать уровень белка в качестве одного из критериев упитанности рыб [17].

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕРЕШЕННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

В настоящее время существует немало информации о заражении карпа, серебряного карася и других видов карповых рыб эктопаразитами в весенний период [1, 2, 18, 19]. Определение влияния слабодиссоциированной или слабощелочной среды на численность паразитических инфузорий *I. multifiliis* и моногеней *Dactylogyrus* sp. при смешанном заражении рыб имеет важное практическое значение, так как, изменяя pH воды, можно снизить уровень заражения рыб эктопаразитами. В литературе есть сведения об изменении физиологического состояния рыб при влиянии слабощелочной или слабодиссоциированной среды, однако исследования совместного воздействия эктопаразитов и pH водной среды на рыб отсутствуют [5–7].

Целью данной работы являлось изучение влияния разных значений pH водной среды на уровень заражения эктопаразитами, содержание белка и лизоцима в сыворотке крови и органах незараженных и зараженных рыб в экспериментальных условиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Опыты проводили в экспериментальных условиях при температуре воды 17–18°C и значениях pH воды: 6,8–7,2 (нейтральная среда), 5,0–5,5 (слабокислая) и 8,5–9,0 (слабощелочная среда). Измерение pH воды осуществляли высокоточным прибором pH-602. Для установления необходимых значений pH к водопроводной воде (pH 6,8–7,2) добавляли определенное количество 0,1 н раствора HCl или 0,1 н раствора NaOH. До начала опыта в аквариумы объемом 100 л заливали водопроводную воду и отстаивали 2 сут. для удаления хлора. По данным лаборатории ионного обмена и адсорбции химико-технологического факультета НТУУ «КПИ» за 2015 г., водопроводная вода в г. Киеве имеет следующие характеристики (усредненные данные по месяцам и районам города): цветность — 30 градусов, окисляемость — 4,8 млO₂/л, жесткость — 3,5–4,2 мг-экв/л, сухой остаток — 280 мг/л, содержание железа — 0,07–0,08 мг/л, алюминия — 0,16 мг/л, сульфатов — 25 мг/л, хлоридов — 35 мг/л, марганца — 0,03 мг/л, нитратов — 1–7 мг/л.

В опытах использовали такие виды рыб: годовики карпа (*Cyprinus carpio*), серебряный карась (*Carassius auratus gibelio*), амурский чебачок (*Pseudorasbora parva*), выловленные из прудов рыбного хозяйства «Нивка» (Киевская обл.) в весенний период. Акклиматизация рыб к экспериментальным условиям составляла 3–5 сут. Перед опытом рыб содержали в лотках объемом 2 м³ в отстоянной водопроводной воде с аэрацией и кормлением живым кормом.

Паразитологическое исследование рыб проводили по общепринятой методике [20]; учет простейших (*Trichodina* sp.) — подсчетом среднего от общего числа обнаруженных особей в десяти полях зрения микроскопа (8×20) с одного мазка соскоба с поверхности тела и жабр рыб. Количество *I. multifiliis*, *Dactylogyrus* sp. и *Gyrodactylus* sp. подсчитывали отдельно на поверхности тела рыбы и жабрах или определяли как общее количество с одной особи. Рассчитывали индекс обилия (ИО, экз.) заражения рыб эктопаразитами.

Для биохимических исследований из сердца рыб отбирали кровь для получения сыворотки, готовили гомогенаты тканей печени, почек, селезенки в разведении 1:50, в которых определяли содержание лизоцима (мурамидаза) диффузионным методом на агаре и белка методом Лоури [21, 22].

У незараженных и зараженных рыб определяли морфометрические показатели: массу (г), длину рыб (l, см), рассчитывали коэффициент упитанности.

Статистическую обработку результатов исследований проводили по общепринятой методике. Отличия между контрольными и опытными рыбами считали достоверными при $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведено три серии опытов. В первой серии изучали влияние разных значений pH воды на численность эктопаразитов у годовиков карпа (масса рыб — 20–30 г, длина — 9–11 см) при значительном смешанном заражении рыб моногенезиями *Dactylogyrus* sp. и паразитическими инфузориями *I. multifiliis*. Рыб содержали в аквариумах в течение 5 сут. в нейтральной, слабокислой и слабощелочной средах, после чего проводили подсчет эктопаразитов отдельно на

поверхности тела и жабрах. Рыб, находившихся в нейтральной среде, считали контрольными (табл. 1).

Таблица 1. Количество эктопаразитов на поверхности тела и жабрах годовиков карпа при экспериментальном содержании в воде с разными значениями pH в течение 5 сут ($M \pm m$, $n=10$)

Вид паразита	Количество паразитов, экз.		
	pH 6,8–7,2 (контроль)	pH 5,0–5,5	pH 8,5–9,0
Поверхность тела			
<i>Ichthyophthirius multifiliis</i>	99±10*	2±1*	13±3*
<i>Dactylogyrus</i> sp.	14±3*	7±1	2±1*
Жабры			
<i>Ichthyophthirius multifiliis</i>	145±19*	8±3*	63±8*
<i>Dactylogyrus</i> sp.	258±21*	106±10	87±8

Примечание. Здесь и далее: * — различия между контрольными и опытными рыбами достоверны (пояснения в тексте).

На поверхности тела карпов в воде с pH 5,0–5,5 количество *I. multifiliis* снизилось в 49,5 раза, в воде с pH 8,5–9,0 — в 7,6 раза по сравнению с контрольными рыбами ($p<0,001$). Численность *Dactylogyrus* sp. уменьшилась в слабокислой среде в 2 раза, слабощелочной — в 7 раз ($p<0,01$). На жабрах рыб в воде с pH 5,0–5,5 количество *I. multifiliis* снизилось в 8,1 раза, в воде с pH 8,5–9,0 — 2,3 в раза ($p<0,001$). Численность *Dactylogyrus* sp. на жабрах уменьшилась в слабокислой среде в 2,4 раза, в слабощелочной — в 3 раза ($p<0,001$).

В нейтральной (контрольной) среде наблюдалась самая высокая степень заражения годовиков карпа *I. multifiliis* и *Dactylogyrus* sp. Опыты, проведенные в экспериментальных условиях, показали снижение количества эктопаразитов на поверхности тела и жабрах годовиков карпа при содержании рыб в слабокислой или слабощелочной среде. Снижение численности *I. multifiliis* было значительнее в слабокислой среде, а количество *Dactylogyrus* sp., наоборот, уменьшилось в слабощелочной среде. Полученные результаты не противоречат литературным данным, указывающим на оптимальные значения pH водной среды для развития *I. multifiliis* (pH 7–8) и *Dactylogyrus* sp. (pH 6–7) [2, 23]. Отклонения от этих значений в ту или иную сторону приводят к нарушению развития паразитов и их гибели.

Так как высокий уровень заражения годовиков карпа эктопаразитами *I. multifiliis* и *Dactylogyrus* sp. привел к возникновению заболеваний рыб ихтиофтириозом и дактилогирозом, рыбы погибали через 7–8 сут, находясь в нейтральной среде. Как видим из предыдущего опыта, содержание рыб в слабокислой или слабощелочной среде хоть и приводит к значительному снижению количества эктопаразитов, однако полностью незараженную рыбу получить не удалось. Поэтому для опытов второй серии был взят серебряный карась, который также имел смешанную инвазию эктопаразитами, но количество паразитов было меньше, а число видов больше. В исследуемой популяции серебряного карася были найдены незараженные особи, что дало возможность во

второй серии опытов изучить влияние разных значений pH водной среды на содержание белка и лизоцима в сыворотке крови и внутренних органах рыб, незараженных и зараженных эктопаразитами (табл. 2).

Таблица 2. Содержание белка и лизоцима у серебряного карася, незараженного и зараженного эктопаразитами, при экспериментальном содержании в воде с разными значениями pH в течение 8 сут ($M \pm m$, $n=5$)

Показатель	pH 6,8–7,2 (контроль)	pH 5,0–5,5	pH 8,5–9,0
Масса рыб, г	14,3±2,4	13,0±1,7	13,1±0,9
Длина рыб (l), см	8,8±0,5	8,7±0,5	8,8±0,2
Коэффициент упитанности	2,10±0,07	1,97±0,09	1,93±0,08
Незараженные рыбы			
Содержание белка, г/100 г ткани			
Печень	2,5±0,4	2,9±0,2	2,4±0,1
Почки	2,8±0,2*	4,2±0,2*	2,8±0,1
Селезенка	2,8±0,3*	5,2±0,3*	3,0±0,1
Сыворотка крови, г/л	24,3±0,9*	41,0±2,5*	27,8±0,9*
Содержание лизоцима, мкг/г ткани			
Печень	154,3±27,0*	28,4±5,3*	30,2±2,9*
Почки	316,0±34,2*	49,2±1,0*	53,6±2,6*
Селезенка	58,7±12,7	67,0±7,0	61,2±5,6
Сыворотка крови, мкг/мл	4,3±1,0*	3,4±0,9	8,1±1,3*
Зараженные рыбы			
Заражение паразитами (ИО), экз.			
<i>Ichthyophthirius multifiliis</i>	12	2	3
<i>Trichodina sp.</i>	8	0	0
<i>Dactylogyrus sp.</i>	27	3	2
<i>Gyrodactylus sp.</i>	5	0	0
Содержание белка, г/100 г ткани			
Печень	2,0±0,3*	3,0±0,3*	2,6±0,2
Почки	2,1±0,3*	4,2±0,4*	2,9±0,1*
Селезенка	2,9±0,4*	5,3±0,4*	3,3±0,3
Сыворотка крови, г/л	15,0±0,7*	35,0±2,0*	25,2±0,8*
Содержание лизоцима, мкг/г ткани			
Печень	53,7±8,0*	29,5±3,9*	28,2±2,8*
Почки	82,3±12,2*	48,7±1,8*	51,6±2,5*
Селезенка	58,2±10,6	66,3±5,7	59,2±4,6
Сыворотка крови, мкг/мл	1,5±0,5*	2,2 ±0,6	4,0±0,7*

Рыб содержали в аквариумах в слабокислой и слабощелочной средах в течение 8 сут. У незараженных рыб, содержащихся в слабокислой среде, отмечено достоверное повышение содержания белка в почках в 1,5 раза, селезенке — в 1,9 раза, сыворотке крови — в 1,7 раза по сравнению с показателями рыб из нейтральной среды ($p < 0,001$). У рыб, которые находились в слабощелочной среде, достоверные изменения уровня белка отмечены только в сыворотке крови ($p < 0,05$). Содержание лизоцима у незараженных рыб достоверно ниже в печени и почках: в слабокислой среде в 5,4 и 6,4 раза, слабощелочной — в 5,1 и 5,9 раза соответственно ($p < 0,01-0,001$). Незначительное снижение содержания лизоцима (в 1,3 раза) отмечено в сыворотке крови рыб из слабокислой среды. В сыворотке крови рыб из слабощелочной среды, наоборот, отмечено увеличение содержания лизоцима в 1,9 раза ($p < 0,05$).

У серебряного карася, которого содержали в нейтральной (контрольной) среде, на поверхности тела и жабрах были найдены такие виды паразитов: простейшие *I. multifiliis*, *Trichodina* sp. и моногенеи *Dactylogyrus* sp., *Gyrodactylus* sp. После выдерживания в воде с pH 5,0–5,5 и 8,5–9,0 у рыб были зарегистрированы только *I. multifiliis* и *Dactylogyrus* sp., количество эктопаразитов уменьшилось соответственно в 6 и 9 раз (слабокислая среда), а также в 4 и 13,5 раза (слабощелочная среда).

У зараженных рыб из нейтральной среды отмечено снижение содержания белка в печени в 1,2 раза, почках — в 1,3 раза и сыворотке крови — в 1,6 раза по сравнению с данными у незараженных особей ($p < 0,001$). В слабощелочной или слабокислой среде, где количество паразитов значительно уменьшилось, содержание белка в исследуемых органах равнялось значениям у незараженных рыб, которые находились в среде соответствующего значения pH. В сыворотке крови зараженных рыб из слабокислой среды содержание белка снизилось на 12,5%, из слабощелочной — на 9,4%. Уровень лизоцима у зараженных рыб из нейтральной среды уменьшился в печени и сыворотке крови в 2,9 раза, почках — в 3,8 раза по сравнению с незараженными особями ($p < 0,05-0,001$). В органах слабозараженных рыб, которые находились в воде с pH 5,0–5,5 и pH 8,5–9,0, содержание лизоцима не отличалось от данных у незараженных особей, которых содержали в воде таких же значений pH. Однако, в сыворотке крови рыб при незначительном количестве эктопаразитов содержание лизоцима, как и содержание белка, снизилось: в слабокислой среде в 1,5 раза, в слабощелочной — в 2 раза ($p < 0,05$).

В третьей серии опытов изучали влияние pH водной среды на содержание белка и лизоцима в сыворотке крови и внутренних органах амурского чебачка, незараженного и зараженного эктопаразитами (табл. 3).

Амурский чебачок — рыба-вселенец в водоемы Украины — часто встречается в прудах рыбных хозяйств. Этот вид карповых рыб довольно устойчив к заражению паразитами, его паразитофауна насчитывает всего 14 видов [24]. В нашем эксперименте заражение рыб небольшим количеством эктопаразитов не отразилось на показателях уровня белка и лизоцима во внутренних органах амурского чебачка, поэтому в таблице 3 приведены данные только для зараженных рыб, которые не отличались от показателей незараженных особей.

Таблица 3. Содержание белка и лизоцима у амурского чебачка при экспериментальном содержании в воде с разными значениями pH в течение 8 сут ($M \pm m$, $n=5$)

Показатель	pH 6,8–7,2 (контроль)	pH 5,0–5,5	pH 8,5–9,0
Масса рыб, г	4,4±0,2	4,3±0,4	4,2±0,8
Длина рыб (l), см	6,9±0,2	6,8±0,3	6,8±0,5
Коэффициент упитанности	1,34±0,03	1,37±0,07	1,34±0,05
Заражение паразитами (ИО), экз:			
<i>Ichthyophthirius multifiliis</i>	2	0	0
<i>Trichodina</i> sp.	2	0	0
<i>Dactylogyrus</i> sp.	2	0	0
Содержание белка, г/100 г ткани			
Печень	2,5±0,1	2,1±0,2	2,8±0,2
Почки	2,2±0,1*	5,9±0,5*	3,5±0,3*
Селезенка	2,9±0,1*	4,2±0,3*	3,7±0,2*
Сыворотка крови, г/л	28,0±2,0*	28,6±1,3	35,4±2,4*
Содержание лизоцима, мкг/г ткани			
Печень	30,0±1,1*	69,8±7,8*	95,4±12,5*
Почки	51,0±3,0*	53,0±2,1	59,0±1,5*
Селезенка	57,0±4,1	62,0±4,0	64,0±3,7
Сыворотка крови, мкг/мл	1,9±1,0*	2,6±0,7	7,4±2,2*

Проведенные исследования показали, что амурский чебачок был заражен паразитическими инфузориями *I. multifiliis*, *Trichodina* sp. и моногенейми *Dactylogyrus* sp., но индекс обилия заражения этими видами паразитов низкий. Это существенно не повлияло на содержание белка и лизоцима в органах и сыворотке крови рыб, которые находились в нейтральной среде.

Однако влияние разных значений pH воды на исследуемые показатели в органах и сыворотке крови амурского чебачка было существенным, с достоверной разницей изменений. Так, содержание белка в печени рыб, находившихся в слабокислой среде, снизилось в 1,2 раза, но повысилось в почках в 2,7 раза и селезенке в 1,4 раза ($p < 0,01-0,001$). У рыб из слабощелочной среды отмечено увеличение уровня белка в почках в 1,6 раза, селезенке и сыворотке крови в 1,3 раза ($p < 0,01$). Проведенные исследования показали увеличение содержания лизоцима в органах и сыворотке крови рыб, содержащихся в средах, отличных от нейтральной. Достоверные различия установлены для печени рыб из обеих сред, почек и сыворотки крови рыб из слабокислой среды ($p < 0,05-0,001$).

Таким образом, изменение концентрации водородных ионов в водной среде приводит к увеличению содержания белка в органах и тканях амурского чебачка, содержащих лизоцим, и соответственно увеличению концентрации лизоцима, одной из функций которого, как указано выше, является противодействие влиянию стресса на рыб, каким является изменение pH среды.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Количество эктопаразитов на поверхности тела и жабрах годовиков карпа при содержании рыб в слабокислой или слабощелочной среде снижается. Более значительное снижение численности паразитической инфузории *I. multifiliis* наблюдалось в воде с pH 5,0–5,5, а количество моногеней *Dactylogyrus* sp. — в воде с pH 8,5–9,0.

Отмечены достоверные изменения содержания белка в почках, селезенке и сыворотке крови при выдерживании незараженного серебряного карася в слабокислой среде, в сыворотке крови — в слабощелочной среде. Достоверные изменения содержания лизоцима наблюдались в печени, почках и сыворотке крови рыб, содержащихся в средах, которые отличались от нейтральной. У зараженного серебряного карася по сравнению с незараженными особями установлено снижение содержания белка и лизоцима в печени, почках и сыворотке крови только в нейтральной среде. В воде с pH 5,0–5,5 и pH 8,5–9,0, при значительном сокращении числа эктопаразитов, уровни содержания белка и лизоцима существенно не отличались от таких у незараженных рыб, которые находились в средах соответствующих pH.

При слабом заражении амурского чебака эктопаразитами достоверные изменения уровня белка и лизоцима в органах и сыворотке крови установлены только при изменении pH водной среды. Отмечено увеличение содержания белка в почках и селезенке, лизоцима в печени рыб из слабокислой или слабощелочной среды. В воде с pH 8,0–8,5 установлено увеличение уровня лизоцима в почках и сыворотке крови.

Отмечены видовые различия в содержании белка и лизоцима у серебряного карася и амурского чебака. У серебряного карася достоверных изменений содержания белка в органах и сыворотке крови отмечено больше в слабокислой среде, чем слабощелочной, в отличие от амурского чебака. По содержанию лизоцима у обоих видов исследуемых карповых рыб большее число изменений отмечено в слабощелочной среде.

Параметры изменений содержания белка и лизоцима в тканях и органах рыб (в частности карповых) могут рассматриваться в качестве перспективных биоиндикаторов для оценки физиологического состояния этих рыб при изменении среды обитания и уровня заражения паразитами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Давыдов О. Н. Болезни пресноводных рыб / О. Н. Давыдов, Ю. Д. Темниханов. — К. : Ветинформ, 2004. — 544 с.
2. Экология паразитов рыб водоемов Украины / [Давыдов О. Н., Неборачек С. И., Куровская Л. Я., Лысенко В. Н.]. — К. : Вестник зоологии, 2011. — 492 с.
3. Чернышева Н. Б. Влияние абиотических и биотических факторов среды на паразитов молоди хищных рыб / Н. Б. Чернышева // Известия Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. — 1979. — Вып. 140. — С. 143–156.
4. Васильков Г. В. Гельминтозы рыб / Васильков Г. В. — М. : Колос, 1983. — 208 с.
5. Soivio Antti. Happamoitumisen fysiologisista vaikutuksista kaloissa = Acidification physiological effects in fish / Soivio Antti // Luonnon Tutkija = Natural Researcher. — 1982. — Vol. 86, № 1. — P. 52–54.

6. Краснова Т. Н. Влияние щелочных значений pH на физиологическое состояние карпа / Т. Н. Краснова // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института прудового рыбного хозяйства. — 1987. — Вып. 50. — С. 175—179.
7. Sordyl Holmer. Influence of exposure time on the effects of elevated water pH values on blood parameters of the rainbow trout (*Salmo gairdneri*) / Sordyl Holmer // Zoologische Jahrbücher. Abteilung für allgemeine Zoologie und Physiologie der Tiere. — 1990. — Vol. 94, № 1. — P. 31—41.
8. Субботкина Т. А. Лизоцим сыворотки крови объектов аквакультуры (отряды *Cypriniformes* и *Perciformes*) Центрального Вьетнама / Т. А. Субботкина, М. Ф. Субботкин // Вестник Астраханского государственного технического университета. — 2012. — № 2. — С. 140—147. — (Серия : Рыбное хозяйство).
9. Mock A. Lysozyme activity in rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*, stressed handling, transport and water pollution / A. Mock, G. Perers // Journal Fish Biology. — 1990. — Vol. 37, № 6. — P. 873—875.
10. Влияние сублетальных концентраций солей ртути, кадмия и меди на содержание лизоцима в тканях молоди ленского осетра *Asipenser baeri* / Т. Б. Лапирова, В. Р. Микряков, А. С. Маврин [и др.] // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. — 2000. — Т. 36, № 1. — С. 37—39.
11. Dominguez Miriam. Effects of changes in environmental factors on the non-specific immune response of Nile tilapia, *Oreochromis niloticus* L. / Dominguez Miriam, Takemura Akihiro, Tsuchiya Makoto // Aquaculture Research. — 2005. — Vol. 36, № 4. — P. 391—397.
12. Кольман Г. С. Влияние температуры и pH среды инкубации на бактериологическую активность лизоцима плазмы крови русского осетра (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt, 1833) / Г. С. Кольман, Р. В. Кольман // Известия Калининградского технического университета. — 2004. — № 5 : Инновации в науке и образовании — 2003 : Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию высшего рыбохозяйственного образования в России : мат. — С. 23—27.
13. Куровская Л. Я. Динамика численности эктопаразитов и содержания белков в сыворотке крови зараженных карпов в экспериментальных условиях / Л. Я. Куровская // Паразитология. — 1998. — Т. 32, № 6. — С. 530—537.
14. Куровская Л. Я. Влияние смешанной инвазии на содержание белка в органах годовиков карпа, выращиваемых на теплых водах / Л. Я. Куровская // Гидробиологический журнал. — 2000. — Т. 36, № 5. — С. 91—97.
15. Куровская Л. Я. Влияние стресс-факторов на заражение эктопаразитами и некоторые биохимические показатели рыб-вселенцев водоемов Украины / Л. Я. Куровская, В. Н. Лысенко // Современные проблемы зоологии и паразитологии. Чтения памяти проф. И. И. Барабаш-Никифорова : VI Междунар. науч. конф. : мат. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2014. — С. 80—84.
16. Лапирова Т. Б. Сравнительный анализ некоторых иммунологических параметров крови щуки *Esox lucius* (L.) и судака *Stizostedion lucioperca* (L.) / Т. Б. Лапирова, Е. А. Флерова // Вестник Астраханского государственного технического университета. — 2013. — № 1. — С. 140—145. — (Серия : Рыбное хозяйство).
17. Берестовский Е. Г. Физиолого-биохимические особенности шук тундровых и лесотундровых озер Кольского полуострова / Е. Г. Берестовский, И. А. Ерохина // Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов

- Европейского Севера. XXVIII Междунар. конф. : мат. — Петрозаводск : Изд-во КарНЦ РАН, 2009. — С. 84—89.
18. Davydov O. N. Species diversity of carp, *Cyprinus carpio* (Cypriniformes, Cyprinidae), parasites in some cultivation regions / O. N. Davydov, V. N. Lysenko, L. Ja. Kurovskaya // Vestnik zoologii. — 2011. — Vol. 45, № 6. — P. 491—502.
19. Анализ видового разнообразия паразитов карася серебряного южной Палеарктики / О. Н. Давыдов, В. Н. Лысенко, Л. Я. Куровская [и др.] // Рыбогосподарська наука України. — 2012. — № 3. — С. 63—72.
20. Быховская-Павловская И. Е. Паразиты рыб. Руководство к изучению / Быховская-Павловская И. Е. — Л. : Наука, 1985. — 121 с.
21. Строев А. Е. Практикум по биологической химии / Е. А. Строев, П. П. Макарова. — М. : Высшая школа, 1986. — 231 с.
22. Давыдов О. Н. Патология крови рыб / Давыдов О. Н., Темниханов Ю. Д., Куровская Л. Я. — К. : Украинский фитосоциологический центр, 2005. — 212 с.
23. Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР / Под ред. О. Н. Бауера. Т. 1. Паразитические простейшие [отв. ред. С. С. Шульман]. — Л. : Наука, 1984. — 428 с.
24. Видовое разнообразие паразитов рыб, непреднамеренно интродуцированных в водоемы Украины / О. Н. Давыдов, Л. Я. Куровская, В. Н. Лысенко [и др.] // Збірник праць Зоологічного музею. — 2011. — № 42. — С. 3—12.

REFERENCES

1. Davydov, O. N., & Temnikhanov, Yu. D. (2004). *Bolezni presnovodnykh ryb*. Kiev : Vetrinform.
2. Davydov, O. N., Neborachek, S. I., Kurovskaya, L. Ya., & Lysenko, V. N. (2011). *Ekologiya parazitov ryb vodoemov Ukrainy*. Kiev : Vestnik zoologii.
3. Chernysheva, N. B. (1979). Vliyanie abioticheskikh i bioticheskikh faktorov sredy na parazitov molodi khishchnykh ryb. *Izvestiya Gosudarstvennogo nauchno-issledovatel'skogo instituta ozernogo i rechnogo rybnogo khozyaystva*, 140, 143-156.
4. Vasil'kov, G. V. (1983). *Gel'mintozy ryb*. Moskva : Kolos.
5. Soivio, Antti. (1982). Happamoitumisen fysiologisista vaikutuksista kaloissa = Acidification physiological effects in fish. *Luonnon Tutkija = Natural Researcher*, 86, 1, 52-54.
6. Krasnova, T. N. (1987). Vliyanie shchelochnykh znacheniy pH na fiziologicheskoe sostoyanie karpa. *Sbornik nauchnykh trudov Vsesoyuznogo nauchno-issledovatel'skogo instituta prudovogo rybnogo khozyaystva*, 50, 175-179.
7. Sordyl, Holmer. (1990). Influence of exposure time on the effects of elevated water pH values on blood parameters of the rainbow trout (*Salmo gairdneri*). *Zoologische Jahrbücher. Abteilung für allgemeine Zoologie und Physiologie der Tiere*, 94(1), 31-41.
8. Subbotkina, T. A., & Subbotkin, M. F. (2012). Lizotsim syvorotki krovi ob'ektov akvakul'tury (otryady Cypriniformes i Perciformes) Tsentral'nogo V'etnama. *Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Ryboe khozyaystvo*, 2, 140-147.
9. Mock, A. & Perers, G. (1990). Lysozyme activity in rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*, stressed handling, transport and water pollution. *Journal Fish Biology*, 37(6), 873-875.

10. Lapirova, T. B., Mikryakov, V. R., Mavrin, A. S., & Vinogradov, G. A. (2000). Vliyanie subletal'nykh kontsentratsiy soley rtuti, kadmiya i medi na sodержanie lizotsima v tkanyakh molodi lenskogo osetra *Asipenser baeri*. *Zhurnal evolyutsionnoy biokhimii i fiziologii*, 36(1), 37-39.
11. Kol'man, G. S., & Kol'man, R. V. (2004). Vliyanie temperatury i pH sredy inkubatsii na bakteriologicheskuyu aktivnost' lizotsima plazmy krovi russkogo osetra (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt, 1833). *Innovatsii v nauke i obrazovanii – 2003: Mezhdunar. nauch. konf., posvyashch. 90-letiyu vysshego rybokhozyaystvennogo obrazovaniya v Rossii. Izvestiya Kaliningradskogo tekhnicheskogo universiteta*, 5, 23-27.
12. Dominguez, Miriam, Takemura, Akihiro, & Tsuchiya, Makoto. (2005). Effects of changes in environmental factors on the non-specific immune response of Nile tilapia, *Oreochromis niloticus* L. *Aquaculture Research*, 36(4), 391-397.
13. Kurovskaya, L. Ya. (1998). Dinamika chislennosti ektoparazitov i sodержaniya belkov v syvorotke krovi zarazhennykh karpov v eksperimental'nykh usloviyakh. *Parazitologiya*, 32(6), 530-537.
14. Kurovskaya, L. Ya. (2000). Vliyanie smeshannoy invazii na sodержanie belka v organakh godovikov karpa, vyrashchivaemykh na teplykh vodakh. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 36(5), 91-97.
15. Kurovskaya, L. Ya., & Lysenko, V. N. (2014). Vliyanie stress-faktorov na zarazhenie ektoparazitami i nekotorye biokhimicheskie pokazateli ryb-vselentsev vodoemov Ukrainy. *Sovremennye problemy zoologii i parazitologii. Chteniya pamyati prof. I. I. Barabash-Nikiforova : VI Mezhdunar. nauch. konf. Voronezh : Izdatel'skiy dom VGU*, 80-84.
16. Lapirova, T. B., & Flerova E. A. (2013). Sravnitel'nyy analiz nekotorykh immunologicheskikh parametrov krovi shchuki *Esox lucius* (L.) i sudaka *Stizostedion lucioperca* (L.). *Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Rybnoe khozyaystvo*, 1, 140-145.
17. Berestovskiy, E. G., & Erokhina I. A. (2009). Fiziologo-biokhimicheskie osobennosti shchuk tundrovyykh i lesotundrovyykh ozer Kol'skogo poluostrova. *Biologicheskie resursy Belogo morya i vnutrennikh vodoemov Evropeyskogo Severa: XXVIII Mezhdunar. konf. Petrozavodsk : Izd-vo KarNTs RAN*, 84-89.
18. Davydov, O. N., Lysenko, V. N., & Kurovskaya, L. Ya. (2011). Species diversity of carp, *Cyprinus carpio* (Cypriniformes, Cyprinidae), parasites in some cultivation regions. *Vestnik zoologii*, 45(6), 491-502.
19. Davydov, O. N., Lysenko, V. N., Kurovskaya, L. Ya., & Neborachek, S. I. (2012). Analiz vidovogo raznoobraziya parazitov karasya serebryanogo yuzhnoy Palearktiki. *Rybohospodars'ka nauka Ukrainy*, 3, 63-72.
20. Bykhovskaya-Pavlovskaya, I. E. (1985). *Parazity ryb. Rukovodstvo k izucheniyu*. Leningrad : Nauka.
21. Stroeve, A. E., & Makarova, P. P. (1986). *Praktikum po biologicheskoy khimii*. Moskva : Vysshaya shkola.
22. Davydov, O. N., Temnikhanov, Yu. D., & Kurovskaya, L. Ya. (2005). *Patologiya krovi ryb*. Kiev : Ukrainskiy fitosotsiologicheskii tsentr.
23. Bauer, O. N. (Ed.). (1984). *Opredelitel' parazitov presnovodnykh ryb fauny SSSR. V. 1. Paraziticheskie prosteyshie*. Shul'man, S. S. (Ed.). Leningrad : Nauka.
24. Davydov, O. N., Kurovskaya, L. Ya., Lysenko, V. N., & Neborachek, C. I. (2011). Vidovoe raznoobrazie parazitov ryb, neprednamerennno introdutsirovannykh v vodoemy Ukrainy. *Zbirnyk prats' Zoologichnogo muzeyu*, 42, 3-12.

**ВПЛИВ pH ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РІВЕНЬ
ЗАРАЖЕННЯ ЕКТОПАРАЗИТАМИ, ВМІСТ БІЛКА ТА ЛІЗОЦИМУ
У ДЕЯКИХ ВИДІВ КОРОПОВИХ РИБ (CYPRINIDAE)**

Л. Я. Куровська, kurovskajal@mail.ru, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН,
м. Київ

Г. О. Стрілько, kurovskaja@izan.kiev.ua, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН,
м. Київ

Мета. Вивчити вплив pH водного середовища на рівень зараження ектопаразитами, вміст білка та лізоциму в органах та сироватці крові у деяких видів коропових риб в експериментальних умовах.

Методика. Об'єктами досліджень слугували однорічки коропа, сріблястий карась та амурський чебачок, виловлені зі ставків рибного господарства «Нивка» (Київська обл.) у весняний період. Риб утримували в експериментальних умовах за нейтральних значень pH води (6,8–7,2) та температури 17–18°C. Для вивчення змін рівня зараження риб ектопаразитами за різних значень pH використовували однорічок коропа, як об'єкт, найбільш заражений ектопаразитами. Риб поміщали в акваріуми з водою за pH 5,0–5,5 (слабокисле середовище) та 8,5–9,0 (слаболужне середовище) на 5 діб. Після цього підраховували кількість ектопаразитів на поверхні тіла та зябрах. У сироватці крові та екстрактах тканин органів (печінка, нирки, селезінка) сріблястого карася та амурського чебачка, заражених та незаражених ектопаразитами, після витримування їх в слабокислому або слаболужному середовищі протягом 8 діб визначали вміст білка методом Лоурі та лізоциму дифузійним методом на агарі.

Результати. Надана порівняльна оцінка кількості ектопаразитів (*Ichthyophthirius multifiliis*, *Trichodina* sp., *Dactylogyrus* sp., *Gyrodactylus* sp.) на поверхні тіла та зябрах риб, вмісту білка та лізоциму в органах та сироватці крові риб за різних значень pH водного середовища. Показано, що кількість ектопаразитів на поверхні тіла та зябрах значно зменшується за витримування риб у слабокислому або слаболужному середовищі. У зараженого сріблястого карася в порівнянні з незараженими особинами спостерігалось зниження вмісту білка та лізоциму в печінці, нирках та сироватці крові тільки в нейтральному середовищі. У слабокислому або слаболужному середовищі за значного скорочення числа ектопаразитів рівень білка та лізоциму в органах та сироватці крові риб суттєво не відрізнявся від показників незаражених особин, які знаходилися у воді з відповідними значеннями pH. У амурського чебачка за низького рівня зараження ектопаразитами не встановлено змін рівня білка та лізоциму в органах та сироватці крові риб в нейтральному середовищі. Вплив різних значень pH води на досліджувані показники амурського чебачка показали достовірні їх зміни.

Наукова новизна. Вперше показані зміни рівня зараження ектопаразитами, вміст білка та лізоциму у сироватці крові та органах риб (короп, сріблястий карась, амурський чебачок), які знаходилися в слабокислому або слаболужному водному середовищі.

Практична значимість. Концентрація водневих іонів або активна реакція водного середовища (pH), відіграє важливу роль як в житті риб, їх розвитку, так і в схильності до різних хвороб. Проведені дослідження показали, що за зміни pH води може суттєво знизитися зараження ектопаразитами. Це приводить до оздоровлення риб та відновлення їх нормальних фізіологічних функцій, порушення яких спричинюється токсичною дією паразитів.

Ключові слова: короп, сріблястий карась, амурський чебачок, слабокисле середовище, слаболужне середовище, ектопаразити, білок, лізоцим.

**EFFECT OF AQUATIC ENVIRONMENT pH ON THE LEVEL
OF ECTOPARASITE INFESTATION, PROTEIN AND LYSOZYME
CONTENT IN SOME CYPRINID SPECIES (CYPRINIDAE)**

L. Kurovskaya, kurovskajal@mail.ru, Schmalhausen Institute of Zoology, NAS, Kyiv
G. Stril'ko, kurovskaja@izan.kiev.ua, Schmalhausen Institute of Zoology, NAS, Kyiv

Purpose. To study the effect of pH values of the aquatic environment on the level of ectoparasite infestation, protein and lysozyme content in organs and serum of some cyprinid species in experimental conditions.

Methodology. The objects of the study were yearlings of *Cyprinus carpio*, *Carassius auratus gibelio* and *Pseudorasbora parva* caught in ponds of fish farm "Nyvka" (Kiev region) in spring. Fish were kept in experimental conditions at neutral pH water (6.8-7.2) and a temperature of 17-18°C. To study the changes in the level of fish parasite infestation at different pH values, we used carp yearlings, as an object, the most infected with parasites. Fish were placed in aquariums with water pH of 5.0-5.5 (slightly acidic environment) and 8.5-9.0 (slightly alkaline environment) for 5 days. Thereafter, the ectoparasites were counted on fish body surface and gills. The protein content in serum and tissue extracts of organs (liver, kidney, spleen) of *Carassius auratus gibelio* and *Pseudorasbora parva* infected and uninfected ectoparasites, after holding them in slightly acidic or slightly alkaline environment for 8 days, was determined by Lowry's method, while lysozyme content was determined by a diffusion method on agar.

Findings. A comparative assessment of the number of ectoparasites (*Ichthyophthirius multifiliis*, *Trichodina* sp., *Dactylogyrus* sp., *Gyrodactylus* sp.) on fish body surface and gills, the content of protein and lysozyme in serum and organs at different pH values of aquatic environment has been presented. It was demonstrated that the number of ectoparasites on fish body surface and gills was significantly reduced when keeping the fish in both slightly acidic and slightly alkaline environments. In infected *Carassius auratus gibelio*, a reduction in the protein and lysozyme content in liver, kidney and serum was observed only in the neutral pH environment compared to uninfected individuals. In the slightly acidic or slightly alkaline environments with a significant reduction in the number of ectoparasites, the protein and lysozyme levels in fish serum and organs were not significantly different from those of non-infected individuals that were kept in water of corresponding pH values. In *Pseudorasbora parva* with low level of parasite infestation, we did not detect any changes in the protein and lysozyme levels in fish serum and organs in a neutral pH environment. The effect of different pH levels of water on the studied parameters of *Pseudorasbora parva* showed their significant changes.

Originality. For the first time, we demonstrated the change in the level of ectoparasite infestation, protein and lysozyme contents in fish serum and organs (*Cyprinus carpio*, *Carassius auratus gibelio*, *Pseudorasbora parva*), which were kept in the slightly acidic or slightly alkaline aquatic environments.

Practical value. The concentration of hydrogen ions, or an aqueous active reaction (pH), plays an important role in the life of fish, their development and in the predisposition to various diseases. The performed studies showed that infestation of fish with parasites can be significantly decreased when changing water pH. This leads to the recovery and restoration of fish normal physiological functions, the impairment of which causes the toxic effects of parasites.

Keywords: *Cyprinus carpio*, *Carassius auratus gibelio*, *Pseudorasbora parva*, slightly acidic environment, slightly alkaline environment, ectoparasites, protein, lysozyme.

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ НЕТРАДИЦІЙНИХ КОРМІВ В ГОДІВЛІ РІЗНОВІКОВИХ ГРУП КОРОПА

Желтов Ю. О., Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Олексієнко О. О., osipenko59@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

Грех В. І., rybalyubin@ukr.net, Львівська дослідна станція Інституту рибного
господарства НААН, смт. Великий Любін

Підвищення продуктивності рибогосподарських ставів поряд з іншими методами інтенсифікації рибництва (виращування відселекціонованих високопродуктивних груп риб, удобрення ставів тощо) здійснюється також за рахунок годівлі риб штучно виготовленими кормами [1–6]. У зв'язку з високою ціною на низку компонентів для рибних комбікормів і кормосумішей, виникла нагальна необхідність пошуку альтернативних нетрадиційних компонентів. При введенні до складу комбікормів нетрадиційних компонентів, комбікорми в цілому повинні бути дешевшими, а за поживністю — не поступатися промисловим. Їх можна вводити до складу кормів безпосередньо в рибних господарствах, використовуючи місцеву сировину, або в промислових умовах.

Пошуком дешевої комбікормової сировини учені, які працюють над питаннями годівлі тварин і риб, займаються постійно у всіх країнах світу.

При вирощуванні різновікових груп коропа у складі комбікормів, а також для згодовування їх окремо, використовують побічні продукти зернового, пивоварного, баштанного та багатьох інших виробництв, зокрема: тирсу, формальдегід (консервний), сечовину з жиром, соєві плівки, лушпиння вівса, насіння бавовни, капелюшки соняшника, крохмаль, відходи сиру, овочеві, кухонні відходи, пастишний послід тощо.

Перед використанням тієї чи іншої кормової сировини для годівлі риб, необхідно встановити вміст в ній протеїну, жиру, клітковини, БЕР (безазотисті екстрактивні речовини), енергії, вітамінів, мінеральних речовин, визначити токсичність, а окремі види кормів повинні пройти ветеринарно-санітарну експертизу.

Перспективними, з огляду на вищевикладене є такі кормові компоненти.

Буряковий жом (сухий) виробляють з відпрацьованої та висушеної бурякової стружки. Він сірого кольору, і випускається у розсипному або гранульованому вигляді.

Хімічний склад: протеїну — 9,4%, сума амінокислот — 74,6 г/кг, у т.ч. незамінних — 27,4, з них метіоніну — 1,4; лізину — 5,5 г/кг; жиру — 0,5%; клітковини — 19,0%; БЕР — 55,7%; вміст енергії — 3819 ккал/кг.

При вирощуванні товарного коропа, буряковий жом (сухий) рекомендовано вводити до складу комбікормів або кормосумішей власного виробництва у

© **Желтов Ю. О.**, **Олексієнко О. О.**, **Грех В. І.**, 2016

кількості до 10%. Згодовувати його окремо, в період зниження розвитку у ставу природної кормової бази, не рекомендовано, а за високого її розвитку, можна проводити підгодівлю риби цим кормом. Кормовий коефіцієнт становить до 10 кг/кг приросту маси риб.

Мелясу отримують при переробці цукрового буряку на цукор. Вона має вигляд темно-коричневої густої маси.

Хімічний склад: сухої речовини — 70–80%, протеїну — 8–9%, цукру — 54–63, БЕР — 16,7%, енергії — 4079 ккал/кг.

До складу комбікормів і кормосумішей вводиться як в'язуча речовина у кількості до 3%.

Сапропель утворюється на дні озер, ставів та інших водойм. У ньому високий вміст білків, вуглеводів, органічних кислот, макро- і мікроелементів, вітамінів тощо.

Хімічний склад різний і залежить від місцезнаходження: органічної речовини — 4,5–26%, протеїну — 6–10%, кальцію — до 1,6%, фосфору — 0,2%. Кількість енергії становить 14,3–14,6 МДж.

Рекомендується згодовувати рибі в залежності від потреби її у мінеральних речовинах, але не більше 5%.

Пташиний (курячий) послід можна використовувати тільки в складі кормосумішей в кількості 10–15%. Перед введенням до складу кормосуміші його спочатку треба продезинфікувати та подрібнити до стану борошна, а окремо згодовувати його коропа не рекомендовано. У висушеному вигляді курячий послід містить майже 94% абсолютно сухої речовини, 68% органічних речовин, 34% сирого протеїну.

Ряска мала суха. В ній міститься (%): протеїну — 27,7; жиру — 4,6; клітковини — 24,5; енергії — 4355 ккал/кг, або 18,2 МДж.

До складу кормосуміші вводиться у вигляді борошна в кількості до 30%.

Рдесник гребінчастий сухий. В цьому кормі міститься (%): протеїну — 20,9; жиру — 2,6; клітковини — 26,0; енергії — 4224–4285 ккал/кг, або 17,7–18,0 МДж.

Згодовувати його в складі кормосуміші необхідно у вигляді борошна в кількості до 10%.

Гіпергалінна аквакультура (ГГА), або протеїново-мінеральна добавка. Це сипуча екологічно чиста маса, до складу якої входять мікроводорості, продукти їх переробки, рачки, інфузорії та інші форми гідробіонтів.

Вміст протеїну в ній становить 36–37%, жиру — 0,2%, сума амінокислот — 220–225 г/кг, у тому числі незамінних — 80–100 г/кг; кількість енергії — 3627 ккал/кг, або 15,2 МДж.

При вирощуванні цього літоку і товарного коропа цю добавку рекомендовано включати до складу кормосуміші замість зернових в кількості до 20%, а замість шротів — до 10%. Для кращого перетравлення коропом її необхідно екструдувати.

Виноградні вичавки сухі. В них міститься (%): протеїну — 14,0; жиру — 3,0; клітковини — 9,4; енергії — 2027 ккал/кг, або 8,5 МДж.

До складу кормосуміші вводяться у вигляді борошна в кількості до 10%.

Згодовувати рекомендується окремо або в складі кормосуміші.

Яблучні вичавки сухі (темні або світлі). В них міститься відповідно: протеїну — 6,8 і 6,4%; жиру — 3,9 і 3,9%; клітковини — 17 і 25; енергії 3469 ккал/кг, або 14,5 МДж, і 3660 ккал/кг, або 15,3 МДж.

Борошно з цих вичавок вводиться до складу кормосуміші в кількості 15–20% і використовується, як і з виноградних, для годівлі товарного коропа.

Протеїновий концентрат м'ясопереробних підприємств. Вміст протеїну в концентраті різних підприємств становить 74,9–84,0%, жиру — 6,4%, сума амінокислот — 450–708,5 г/кг, у тому числі незамінних — 220–320 г/кг; кількість енергії — 4330 ккал/кг, або 18,1 МДж. В кормосуміші і комбікорми для вирощування молоді і товарного коропа вводити його необхідно замість рибного борошна — замінювати його повністю або частково, тобто в залежності від потреби в кількості протеїну різновікових груп коропа. Такі комбікорми можна гранулювати і екструдувати.

Корм кукурудзяний сухий одержують від переробки кукурудзи на крохмаль. В ньому міститься: протеїну — 16–23,8%, жиру — 0,7–4,3%, сума амінокислот — 198 г/кг, у тому числі незамінних — 82 г/кг, метіоніну — 4,8 і лізину — 4,0 г/кг, кількість енергії — 4532 ккал/кг, або 18,9 МДж. В цьому кормі недостатньо лізину та багато енергії, яку необхідно використовувати для вирощування якісного рибопосадкового матеріалу і вводити до складу стартових комбікормів в кількості не менше 10%, а також за 30 днів до посадки цюголіток на зимівлю.

Кормовий коефіцієнт корму становить 6–7 кг/кг приросту маси риб.

Сирий кукурудзяний корм. Це суміш великої і дрібної м'язги та кукурудзяного зародку. Цей корм містить не менше 40% сухої речовини, перетравного білка — 11,8, фосфору — 0,34, кальцію — 0,17%.

Зародок містить (%): білка — 17–27, жиру 6–11, крохмалю—31–57, золи — 1,3–1,5. Кількість енергії 13,0–19,0 МДж/кг корму.

Його необхідно використовувати для вирощування якісного рибопосадкового матеріалу і вводити до складу стартових комбікормів в кількості не менше 10%, а для продукційних кормів — 20–30%.

Кормовий коефіцієнт — 3–4 кг/кг приросту маси риб.

Глютен кукурудзяний рідкий — це жовта рідина, яка є білковою частиною крохмального молока, і містить 6–10% сухих речовин. Хімічний склад глютену (у %): протеїн — 40–65, жир — 5–8, крохмаль — 20–45, клітковина — 2–4, зола — 0,8–1,5, розчинні вуглеводи — 0,5–2,0, інші речовини — 4–6. Кількість енергії — 8,0–14,0 МДж/кг.

Його необхідно використовувати для вирощування якісного рибопосадкового матеріалу і вводити до складу стартових комбікормів в кількості не менше 20–30%, а для продукційних кормів — 10–20%. Кормовий коефіцієнт — 3–4 кг/кг приросту маси риб.

Кукурудзяні качани без зерна. В них міститься (%): протеїну — 3,5; жиру — 1,1; клітковини — 31,4; енергії — 3894 ккал/кг, або 16,3 МДж.

При вирощуванні товарного коропа рекомендовано згодовувати в складі кормосуміші в подрібненому вигляді в кількості до 15%.

Кукурудза в качанах містить (%): протеїну — 9,8; жиру — 4,2 клітковини — 3,4; енергії — 3854 ккал/кг, або 16,1 МДж.

Згодовувати рибі необхідно в залежності від кількості в качанах зерна кукурудзи і в подрібненому вигляді до 10%.

ВИСНОВКИ

Підвищення продуктивності ставових рибних господарств здійснюється шляхом найбільш повного використання природних кормових ресурсів ставів, у поєднанні їх зі згодовуванням високоякісних збалансованих за поживними речовинами штучно виготовлених кормів. У зв'язку з подорожчанням традиційних кормових компонентів, заміна їх у складі комбікормів нетрадиційною місцевою сировиною, рівноцінною за вмістом в ній основних поживних речовин і енергії, дає змогу підвищувати ефективність та продуктивність рибних господарств з одночасним зниженням витрат на кормову сировину.

ЛІТЕРАТУРА

1. Грициняк І. І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб / Грициняк І. І. — К. : Рибка моя, 2007. — 306 с.
2. Желтов Ю. А. Кормление племенных карпов разных возрастов в прудовых хозяйствах / Ю. А. Желтов, А. А. Алексеенко — К. : Фирма ИНКОС, 2006. — 169 с.
3. Рекомендації з використання місцевих та нетрадиційних кормів для годівлі коропа у ставах / [Желтов Ю. О., Гринжевський М. В., Демченко І. Т. та ін.]. — К. : ІРГ УААН, 1999. — 41 с.
4. Кузема А. И. Украинские породы карпа / А. И. Кузема // Труды совещания по вопросам прудового рыбоводства. — М. : Издат. АН СССР, 1952. — С. 65—70.
5. Мартышев Ф. Г. Прудовое рыбоводство / Мартышев Ф. Г. — М. : Высшая школа, 1973. — 423 с.
6. Годівля риб / [Шерман І. М., Гринжевський М. В., Желтов Ю. О. та ін.]. — К. : Вища освіта, 2001. — 269 с.

REFERENCES

1. Hrytsyniak, I. I. (2007). *Naukovo-praktychni osnovy ratsionalnoi hodivli ryb*. Kyiv : Rybka moia.
2. Zheltov, Yu. A., & Alekseenko, A. A. (2006). *Kormlenie plemennykh karpov raznykh vozrastov v prudovykh khozyaystvakh*. Kyiv : Firma INKOS.
3. Zheltov, Iu. O., Hrynzhhevskiy, M. V., & Demchenko I. T. et al. (1999). *Rekomendatsii z vykorystannia mistsevykh ta netradytsiinykh kormiv dlia hodivli koropa u stavakh*. Kyiv : IRH UAAN.
4. Kuzema, A. I. (1952). Ukrainskie породы карпа. *Trudy soveshchaniya po voprosam prudovogo rybovodstva*. Moskva : Izdat. AN SSSR, 65-70.
5. Martyshev, F. G. (1973). *Prudovoe rybovodstvo*. Moskva : Vysshaya shkola.
6. Sherman, I. M., Hrynzhhevskiy, M. V., & Zheltov, Iu. O. et al. (2001). *Hodivlia ryb*. Kyiv : Vyshcha osvita.

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 106-126
DOI: <http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.01.106>
УДК: [639.3.043:639.3.06]:639.371.2

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ РАННЬОЇ МОЛОДІ ОСЕТРОВИХ РИБ (ACIPENSERIDAE) НА ГОДІВЛЮ ШТУЧНИМИ КОРМАМИ В УЗВ (ОГЛЯД)

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати наукові джерела щодо морфологічних та еколого-фізіологічних особливостей процесу переходу ранньої молоді осетрових видів риб (Acipenseridae) на годівлю штучними кормами. Висвітлити основні біотехнологічні засади застосування штучних кормів в умовах установки замкненого водопостачання (УЗВ).

Результати. Перехід ранньої молоді осетрових риб на годівлю штучними кормами є одним з найскладніших етапів її вирощування, навіть за умов проходження в контрольованих умовах УЗВ. Описано особливості постембріогенезу осетрових риб, їх поведінку та морфофізіологічні зміни на даному етапі розвитку. Викладено основні вимоги до вирощування личинок осетрових видів риб в УЗВ. Показано, що остаточна відмова від природних (живих або заморожених) кормових організмів неможлива, оптимальним є їх поєднання зі штучними кормами, з поступовим переважанням останніх. Наведено приклади схеми годівлі на підставі поєднання природних та штучних кормів. Розглянуто найпоширеніші біологічно-активні добавки, які сприяють кращому засвоєнню кормів в період переходу на екзогенне живлення. Висвітлено вплив згодовування науплій артемії, збагачених поліненасиченими жирними кислотами на ріст та розвиток ранньої молоді осетрових риб.

Практична значимість. Масив узагальненої інформації буде важливим для науковців, які досліджують особливості переходу ранньої молоді осетрових видів риб на годівлю штучними кормами в умовах УЗВ. Дані щодо біотехнології раціональної годівлі ранньої молоді осетрових в УЗВ в цей період є актуальним в умовах постійного пошуку найбільш ефективної заміни живих кормових організмів та зменшення елімінації молоді риб у постембріогенезі.

Ключові слова: осетрові види риб (Acipenseridae), УЗВ, годівля ранньої молоді, штучні корми, природні кормові організми, постембріогенез осетрових видів риб, перехід на екзогенне живлення, підвищення виживання личинок, біологічно-активні препарати.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Годівля риби в індустріальній аквакультурі є одним з найважливіших технологічних елементів. Якість комбікормів, їх склад, особливості технології годівлі впливають на рибницько-біологічні показники — виживаність риби за період вирощування, швидкість росту, фізіологічний стан організму [1]. Підрощування личинок та їх перехід на живлення штучними кормами є складним етапом технологічного циклу вирощування осетрових риб в установках замкненого водопостачання (УЗВ). Від якості отриманих мальків залежить виживання, темп росту товарної риби, ефективність використання кормів, а

© М. Ю. Симон, 2016

отже, ефективність виробництва товарної риби [2]. Метою даної роботи був аналіз масиву інформації щодо особливостей переходу ранньої молоді осетрових риб на годівлю штучними кормами в умовах УЗВ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ. ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Ефективність вирощування ранньої молоді осетрових риб завжди залежить від її забезпеченості відповідними живими кормами, тому культивування останніх в сучасних умовах найчастіше є економічно невигідним, особливо при використанні УЗВ. Адже розведення живих кормів стає у 8–10 разів дорожчим, ніж придбання або приготування кормових сумішей [3]. Насамперед, це зумовлено тим, що культивування живих кормових організмів потребує використання додаткових площ, працемістке і не завжди дає передбачуваний результат. Саме тому все більш гостро виокремлюється проблема ефективної заміни живих кормових організмів штучними кормами в раціоні ранньої молоді осетрових риб [4].

З точки зору еволюційного розвитку, будова травної системи осетрових риб займає проміжне положення між такою хрящових та костистих. Осетрові (за виключенням веслоноса) є хижаками-бентофагами. Вільні ембріони осетрових риб мають великий жовтковий мішок, непропорційно збільшену голову та слаборозвинуті внутрішні органи. Їх очі відзначені тільки пігментними плямами. Личинки реагують на світло, рухаються в товщі води і опускаються на дно, де часто утворюють скупчення — рої [5]. Рухова поведінка різних видів осетрових риб подібна, однак деякі відмінності все ж існують. Наприклад, личинки російського осетра (*Acipenser gueldenstaedtii*) і білуги (*Huso huso*) схильні триматись переважно біля дна, а личинки шипа (*Acipenser nudiiventris*) і севрюги (*Acipenser stellatus*) — в товщі води [6].

Вимоги до кормів та біотехнологія годівлі молоді осетрових риб залежать від особливостей їх постембріогенезу. Він налічує п'ять основних етапів, які були вперше описані І. А. Садовим, М. Ф. Вернидуб, М. А. Штурбіною, І. В. Яковлевою, Б. С. Матвєєвим [7]. Тривалість перших чотирьох етапів становить близько 3 діб, а останнього — набагато довше. Перший етап характеризується жовтковим диханням, ендогенним живленням за рахунок жовткового міхура, вкритого складною мережею кровоносних судин, жовто-червоним кольором крові. На цьому етапі завершується формування ротового та зябрових отворів, передличинки здатні лише до пасивного руху, досягаючи довжини близько 13 мм. Другий етап також триває близько 3 діб, довжина особин може сягати 16 мм, дихання стає змішаним (жовтковим і зябровим), з'являються грудні плавці, формуються зовнішні зябра, промені спинного та анального плавців. У задньому відділі кишківника накопичуються сильно пігментовані, завдяки високому вмісту меланіну, продукти розпаду жовтка — так званий меланіновий корок [7]. Ці два етапи об'єднує переважання мембранного травлення, оскільки травна система ще недостатньо сформована. Третій етап починається з появою дихання за допомогою зовнішніх зябер, з'являються зачатки черевних плавців, живлення стає змішаним, ротовий отвір — рухомим. За кілька днів до початку активного живлення у личинок з'являються щелепні зуби (через 2 тижні вони редукуються), які слугують для захоплення і утримування їжі.

На четвертому етапі довжина личинок становить близько 21 мм. Він супроводжується утворенням спірального клапана, накриттям зовнішніх зябрових пелюсток зябровими кришками, екзогенним живленням. Третій та четвертий етапи є особливо важливими за звикання осетрових риб до штучних кормів, тому що саме в цей період відбувається перехід до екзогенного живлення. На його початку у передличинок розсмоктується клітинна перетинка, яка закриває прохід з ротової порожнини в стравохід. Цей процес супроводжується викидом меланінового корку з анального отвору і може тривати 3–4 доби в залежності від навколишніх умов. Зазвичай, годівлю починають при викиді меланінового корку у 20–40% личинок. Заковтнутий корм здатний прискорювати вихід меланінового корку, а нестача кормів на даному етапі призводить до каннібалізму [5, 8–10]. Під час п'ятого етапу відбувається остаточний перехід личинок на годівлю штучними кормами, в них розвиваються кісткові фулькри, а ротовий отвір стає висувним. Травному тракту осетрових риб притаманна змінна концентрація водневих іонів (рН): від кислої (шлунок) до слабко-кислої (передній відділ середньої кишки) та нейтральної (кишківник). Співвідношення відносної довжини травного тракту та довжини тулуба у осетрових риб становить 0,8–1,0 до 1. Короткий травний тракт зумовлений тим, що осетрові риби — хижі бентофаги [7, 11].

При розробленні рецептів стартових кормів для осетрових риб обов'язково враховують фізіологічні та еколого-морфологічні особливості, розвиток їх організму як послідовності якісно різних етапів, кожен з яких характеризується певними взаємовідносинами з навколишнім середовищем. Згідно з теорією етапності розвитку В. В. Васнецова, на кожній стадії розвитку відбуваються кількісні та якісні зміни: ріст організму нерозривно пов'язано з поступовим та одночасно стрибкоподібним розвитком. Тривалість цих етапів, або періодів, залежить від абіотичних та біотичних чинників [12]. В 40-х роках ХХ ст. було розроблено вчення про критичні періоди розвитку та встановлено, що періоди підвищеної чутливості до впливу несприятливих чинників середовища змінюються періодами зі зниженою чутливістю або підвищеною стійкістю до цих чинників. Причому, періоди підвищеної чутливості збігаються з періодами диференціювання, тобто якісними змінами, а періоди зниженої чутливості з періодами росту або кількісними змінами [13]. Особливості морфологічної будови передличинок осетра на різних стадіях розвитку, описані Т. А. Детлаф, А. С. Гінзбургом, О. І. Шмальгаузенем [8], дають змогу відрізняти ознаки, що лежать в межах норми, від патологічних змін. При підрощуванні передличинок особливу увагу слід звернути на наступні стадії постембріонального розвитку: перехід на зяброве дихання, диференціація шлунку на відділи, закінчення гістогенезу печінки та формування жовткового мішка, перехід на екзогенне живлення. Вони супроводжуються масовим відходом риби, в першу чергу, через загибель особин з вадами розвитку перерахованих систем і функцій [8].

В європейських країнах технологія підрощування молоді осетрових риб в УЗВ зазвичай розподіляється на 4 біологічно обґрунтовані етапи:

- ✓ витримування передличинок до початку змішаного живлення;
- ✓ перехід личинок на годівлю штучними кормами;
- ✓ вирощування молоді масою до 3 г;
- ✓ вирощування молоді масою до 10 г [14].

Технологія вирощування осетра на ювенільних стадіях розвитку передбачає поєднання живих кормових організмів зі штучними кормами, з поступовим

переходом на останні [2, 16]. Тривалість вилуплення російського осетра або білуги в УЗВ становить близько 3 діб. Маса тіла одностадійних передличинок російського осетра варіює в межах від 18 до 27 мг (за середнього значення 21 мг), а білуги — від 18 до 30 мг (за середнього значення 25 мг). Одностадійні личинки, залежно від їх видової приналежності та температури води, через 7–13 діб переходять спочатку на змішане (3–5 днів), а потім і на активне живлення [17]. Перехід на активне живлення у личинок російського осетра починається приблизно на 10 добу після вилуплення, за досягнення середньої маси 30 мг. Витримування личинок російського осетра в УЗВ дозволяє досягти густоти посадки 5,0 тис. екз./м², а білуги — 4,0 тис. екз./м². Витрата води в басейнах з молоддю масою до 100 мг становить 0,8 л/хв., до 1000 мг — 1,0–1,4 л/хв., до 1500 мг — 1,6 л/хв., для риб масою 3000 мг — 2 л/хв. [18]. Виживання личинок російського осетра в УЗВ, за умов дотримання всіх рибницько-біологічних рекомендацій, в період від початку витримування до переходу на активне живлення може становити 81%. Російський осетер в умовах УЗВ досягає маси понад 3 г приблизно за 39 діб, а його виживаність з моменту переходу на активне живлення та до досягнення цієї маси становить в середньому 66,3% [19].

Перехід на живлення штучними кормами є одним з найбільш складних технологічних процесів в період підрощування молоді осетрових риб. У зв'язку з цим, виникають труднощі як в годівлі молоді при переході з живих кормів на штучні, так і в отриманні життєстійких личинок, зберігаючи високі показники їх виживання. На практиці звикання до годівлі штучними кормами часто супроводжується високим відходом риб. Зокрема, втрати личинок в період переходу на активне живлення можуть становити від 20 до 45%. До цієї частки відходу варто додати масовий відхід в період ранньої адаптації осетрових риб до стартового комбікорму [23]. Успіх переходу личинок на активне живлення багато в чому залежить від їх якості, тому що зміна способу живлення тісно пов'язана зі зміною фізіологічного стану, і ослаблені особини елімінують. В цей час відсутність відповідного корму послаблює личинок, готових до активного живлення і може спровокувати їх масовий відхід. Період переходу на активне живлення у личинок різних видів осетрових риб відрізняється і залежить від температури води (чим вона вища, тим менше часу він займає) [24]. Наприклад, перші 10 діб після вилуплення оптимальні температури витримування передличинок відповідають оптимальним нерестовим температурам, а саме: для білуги — 10–14°C, російського осетра — 15–20°C, севрюги — 18–22°C, стерляді — 13–17°C. Різкі коливання температури води можуть спровокувати відмову личинок від корму, викликану уповільненням процесу резорбції жиру в травній системі, що добре помітно під час зовнішнього огляду їх черевця [8]. Зміна температурного режиму впливає на інтенсивність споживання кисню, швидкість росту і розвитку, а також розвиток пошукової поведінки, споживання та перетравлення корму. Встановлено, що підвищення температури води на 4°C приводить до прискореного зниження вмісту в ній амонію (NH₄⁺) на 50% і нітритів (NO₂⁻) на 12% в порівнянні з вихідним рівнем. При зниженні температури води швидкість окиснення амонію зменшується [21].

Витримування передличинок зумовлене наявністю інтервалу від вилуплення вільних ембріонів до переходу личинок на екзогенне живлення і триває приблизно 10 діб за температури 18°C, тобто 150–200 градусо-днів (допустимі межі зміни температури становлять від 17 до 20°C). Зазвичай, використовується

густота посадки 3–5 тис. екз./м², а бажана глибина води в басейнах становить близько 0,2 м [25]. Історично, сама думка про необхідність витримування передличинок осетрових риб за наявності кормових організмів виникла в 50-х роках ХХ ст. Вона спиралась на те, що у присутності корму активізуються структури центральної нервової системи (ЦНС) та поява секреторних гранул в клітинах ацинусів підшлункової залози, що сприяє значно ранішому переходу на екзогенне живлення. Останнім часом вченими остаточно доведено, що для успішного переходу на годівлю штучними кормами передличинки повинні бути попередньо адаптовані до запаху та виду корму. Раннє внесення пилоподібних штучних кормів підвищує середньодобові прирости і зменшує варіабельність розмірно-вагових параметрів протягом 19 діб після переходу на екзогенне живлення. Внесення корму на третю добу після вилуплення передличинок дозволяє підвищити їх виживання в процесі подальшого переходу на активне живлення на 10–20% та прискорити темпи росту молоді під час подальшого вирощування майже вдвічі. Наявність моїни (*Moina*) та дрібних дафній (*Daphnia*) у воді на 3–5 добу після вилуплення передличинок прискорює процеси розсмоктування жовтка на 1–2 добу, що прямо впливає на швидкість диференціювання травної системи [26]. Також, привчання до корму не лише прискорює перехід на екзогенне живлення, а й сприяє його масовості, що дуже зручно в умовах УЗВ [27, 28]. Нещодавно виявлено, що розчин вітаміну В₁₂ (в концентрації 2 мг/л), препарату «Гідролакт» та бурштинової кислоти (в концентрації 2 мг/л) має добре виражену позитивну дію на личинок під час їх витримування до переходу на екзогенне живлення. Так, його застосування підвищує показники виживання, маси (в середньому на 4,0%) та довжини тіла (в середньому на 7%). Знижуються органо-соматичні індекси серця, печінки та нирок. Спостерігається поліпшення гематологічних показників [29].

Під час витримування передличинок необхідно регулярно приділяти увагу стану їх жовткового мішка, оскільки він є наочним показником для оцінки їх фізіологічного стану та прогнозування виживання, а, отже, і здатності сприймати пилоподібний штучний корм. В нормі показник його деформації становить 0,55–0,69, за менших розмірів ендогенні ресурси не забезпечують подальший ріст та нормальний розвиток в процесі переходу личинок на змішане живлення, спричиняючи їх підвищений відхід. Втім, надмірно великі розміри жовткового мішка на стадіях диференціювання відділів травної системи здатні затримати розвиток секреторної функції епітелію шлунку та кишківника, оскільки розвиток залоз шлунку зростає в міру витрачання запасів жовтка [14, 30]. В перші дні переходу на активне живлення в шлунках личинок разом з кормом можуть спостерігатись і залишки жовтка, це не є відхиленням [24].

Оскільки поведінка в ранньому онтогенезі осетрових риб змінюється швидко, ретельне спостереження за нею дає змогу прослідкувати стадії їх розвитку, а, отже, визначитись, коли почати раннє внесення корму. Загальновідомо, що час настання тієї чи іншої стадії розвитку залежить від температури води, однак останні дослідження виявили взаємозв'язок між стадією розвитку осетрових риб та станом поверхні води у ємкостях для їх вирощування, який змінюється в залежності від рухової активності передличинок. Наприклад, з 36 до 39 стадії розвитку передличинок, поверхня води в басейнах залишається практично спокійною, оскільки риби не виявляють рухової активності і не підіймаються до поверхні води. Для 36 стадії розвитку передличинок характерні «свічки» — періодичні підйоми та спуски риб у товщі води. На цьому етапі розвитку можлива

масова елімінація, викликана як низькою якістю заплідненої ікри, так і несприятливими умовами вирощування. Зазвичай, гинуть ті особини, які мають морфофізіологічні дефекти та відхилення розвитку органів дихання, травлення або ферментної системи [8]. Рухова поведінка на 37 і 38 стадіях практично збігається — передличинки майже весь час спливають спіралеподібно, найбільший діаметр спіралі спостерігається на початку підйому. 39 стадія розвитку передличинок вирізняється плавними колами в товщі води [31]. Від моменту вилуплення до початку ритмічних дихальних рухів (тобто на 40 стадії розвитку) в організмі передличинок відбуваються суттєві зміни, зокрема в очах диференціюються дефінітивні рецепторні клітини, формуються шари сітківки (зовнішній ядерний, зовнішній сітчастий, внутрішній ядерний, внутрішній сітчастий, шар гангліозних клітин, шар нервових волокон), починається пігментація рогівки [32]. На 40 стадії розвитку спостерігаються значні морфологічні та поведінкові зміни, зокрема, починає рости роstrум і передличинки активно піднімаюся до поверхні водної товщі, простежується світлочутливість. На 41 стадії розвитку їм властивий S-подібний рух, біля поверхні води вони описують кола, на дно опускаються повільно, а піднімаються швидко, іноді лежать на дні, плавно рухаючись. Прояви рухової активності на 42 і 43 стадії подібні — передличинки описують великі (діаметром до 10 см) кола у поверхневому шарі води, на дні лежать, змієподібно згинаючись, різко змінюють швидкість і напрямок руху [31]. 45 стадія відзначається переходом на екзогенне живлення, спостерігається активна кормова поведінка — швидко рухаючись у воді, переважно по горизонталі, передличинки активно захоплюють корм. Вони мають довжину близько 18 мм, інтенсивно пігментовані, розмір голови збільшений, внаслідок значного подовження роstrumu, середні вусики відсунуті від ротової порожнини, а бічні вусики розташовані майже на її передньому краї. Видно розділені зачатки кісткових жучок в спинній плавцевій складці, завершується викид меланінових корків, з'являється здатність до захоплення й утримування їжі. Бічна лінія сейсмочувствової системи заходить за середню частину спинного плавця, додатковий ряд майже досягає рівня переднього краю черевного плавця, спинний ряд заходить за рівень заднього краю грудного плавця [27, 28, 32]. За традиційною методикою, описаною Т. А. Детлаф у 80-х роках ХХ сторіччя і поглибленою Р. П. Ходоревською, відсутність у 20% досліджених особин меланінового корку свідчить про початок активного живлення і відповідає 44 стадії розвитку передличинок або початку його IV етапу. Але завжди є ризик того, що за несприятливих умов розвитку передличинок викид пігментних пробок може статись передчасно. Останніми дослідженнями доведена висока ефективність раннього внесення штучних пилоподібних кормів на 40 стадії розвитку, або початку III етапу [31].

Більшістю вчених рекомендовано застосовувати пилоподібні фракції штучних кормів відразу в період переходу риб на активне живлення з поступовим підвищенням їх частки в загальному раціоні. Зокрема, згідно з дослідженнями М. А. Чепуркіної та Т. А. Голубкової, встановлено, що перехід на годівлю стартовим штучним кормом варто починати з восьмої доби годівлі у російського осетра та з одинадцятої доби у стерляді. Зміну штучного та природного кормів необхідно робити, виходячи з розрахункових таблиць, через рівні проміжки часу. Є сенс вносити штучний корм в басейни з передличинками до викиду меланінового корку, використовуючи живі та штучні корми по чергові, щогодини. Норма внесення кормів в цей період має бути не менше 0,25% від норми годівлі личинок на 45 стадії розвитку [26]. Період переходу личинок осетрових риб на годівлю

виключно штучними кормами становить в середньому 13 діб. За правильного виконаного переходу на годівлю штучним кормом, відхід у молоді може бути мінімальним (у межах 1–5%). Після повного переходу на штучний корм його задають щогодинно, 24 рази на добу [23]. Протягом першого тижня підрощування личинок (севрюги і стерляді до 60–75 мг, російського осетра до 80–100 мг) частка штучних кормів у загальному раціоні повинна становити 70–80%, в подальшому (за маси 1,5–2,5 г і віку 40–45 діб) — не менше 90–95% [33].

Явище поліфагії, притаманне осетровим риbam на ранніх стадіях ембріогенезу, вперше детально описане М. Л. Гербильським. Воно зумовлює необхідність поєднання різних кормових організмів (живих чи заморожених), оскільки окремий вид не відповідає всім потребам ранньої молоді риб, зокрема в різних структурних елементах живлення. Наприклад, в природних умовах, на перший день екзогенного живлення личинки надають перевагу коловерткам (*Rotifera*), а на другий — дрібним дафніям (*Daphnia*), на третій — личинкам хірономід (*Chironomidae*) довжиною до 4 мм. Після п'ятої доби вони вже активно споживають невелику молодь дафній та дрібних личинок хірономід, майже не цікавлячись копеподами та коловертками [30]. Найбільш яскраво явище поліфагії, а, отже, і його наслідки, виявлено у личинок російського осетра, а найменше — у личинок білуги [4, 24]. Саме тому одночасне використання декількох видів живих кормів є більш сприятливим для подальшого споживання молоддю штучних кормів, ніж використання одного певного виду [33]. Важливим моментом в процесі годівлі живими кормами є висока видова специфічність інтенсивності перетравлення кормових об'єктів. Наприклад, за однакової температури, швидкість перетравлення олігохет і науплій артемії (*Artemia*) у російського осетра в півтора рази нижча, ніж у севрюги [34].

Тривале використання в умовах УЗВ лише однотипних живих кормових організмів здатне не лише унеможливити подальший перехід молоді риб на штучні корми, а й викликати патофізіологічні зміни. Наприклад, тривале використання науплій артемії у годівлі ранньої молоді осетрових риб призводить до затримки їх розвитку та зниження темпів росту [23]. Кормовий коефіцієнт показує, яку кількість природного корму потрібно витратити для отримання одиниці приросту маси риб, і залежить від смакових якостей корму; для олігохет він дорівнює 2, а для науплій артемії — 4, для дафній — 6. Хоча олігохети за своїм хімічним складом є багатшими на білки та жири, ніж дафнії, але мінеральних речовин вони містять менше [35]. Споживання олігохет сприяє більшому темпу росту личинкам осетрових риб, ніж споживання дафній, але сприяє виникненню анемії — вміст гемоглобіну знижується до 10%, за нормативного значення 25%. Загалом, олігохети є не бажаним живим кормом для личинок осетрових риб, зокрема, збільшення їх відносного вмісту у раціоні останніх призводить до суттєвого погіршення загальних рибогосподарських показників, виникнення порушень обміну речовин, а частка в раціоні понад 30% може призвести до відходу близько 47% [36].

Пошук оптимального рецепту штучних стартових кормів для осетрових риб на теренах колишнього Радянського Союзу був розпочатий у 40-х роках ХХ ст. такими відомими вченими як В. В. Мільштейн, Г. С. Карзинкін, О. Л. Гордієнко, Р. В. Афонич, Е. В. Солдатова та багато інших [4, 37]. Вони виходили з того, що організму, який швидко росте і розвивається, необхідні нуклеїнові кислоти для внутрішньоклітинного біосинтезу білка. На ранніх стадіях розвитку потреба в

нуклеїнових кислотах задовольняється організмами зоопланктону (природні корми) або продуктами мікробного синтезу (в штучних кормах). Харчова цінність для риб як природних, так і штучних компонентів кормів визначається не тільки наявністю поживних речовин в достатній кількості, але й доступністю цих речовин для травної системи, тобто можливістю їх перетравлення і всмоктування. Згодом було доведено, що для годівлі молоді осетрових риб є сенс використовувати корми з вмістом білка не менше 48–55% та жиру 8–12%. Оскільки фізіологічна повноцінність і ефективність комбікормів визначається доступністю протеїну для перетравлення власними ферментами риб в ранньому постембріогенезі, то при використанні стартового комбікорму для осетрових риб головним завданням є вибір зі збалансованим загальним складом поживних речовин: фракційного складу білків, ліпідів, незамінних жирних кислот, доступних для засвоєння вуглеводів, вітамінів [38–40]. В наш час найбільш ефективними збалансованими повноцінними стартовими кормами для даного виду риб є продукція НТЦ «Аквакорм» (Російська Федерація), «Tetra Werke Company» або «Panto Forellengold Brutt» (Федеративна Республіка Німеччина), «BioMar Group» (Королівство Данія), «Aller Aqua» (Республіка Польща), «Corpens International B.V.» (Королівство Нідерланди), «Skretting» (Французька Республіка). В крайньому випадку, на нетривалий час ці комбікорми можуть бути замінені форелевим комбікормом РГМ-6М або корошовим РК-С чи «Еквізо» [9]. На відміну від комбікормів для форелі та лосося, корми для осетрових риб містять меншу кількість ліпідів за оптимального співвідношення лінолевої ($C_{18}H_{32}O_2$) і ліноленової ($C_{18}H_{30}O_2$) жирних кислот, що визначається специфікою метаболічних процесів [7]. Вважається, що чим різноманітніший склад комбікорму, тим вища його поживність. Встановлено, що найбільшу ефективність має кормовий білок, який являє собою суму протеїнів тваринного і рослинного походження. Доведено, що для оптимального розвитку личинок осетрових риб рівень розчинних білків у штучних кормах повинен становити не менше 33–37%, за вмісту в них поліпептидів 41–43% і олігопептидів 14%. Для регулювання в комбікормах рівня розчинних білків, полі- та олігопептидів можна використовувати препарат «Суберкон» — концентрований рибний бульйон, в якому рівень розчинного білка та поліпептидів вищий у 6 разів, порівняно з їх вмістом у рибному борошні [41]. Загальновизнано, що найефективніші рецепти рибних комбікормів містять 5–10 основних компонентів різної природи, не враховуючи добавок вітамінів, мінеральних солей та інших біологічно активних речовин [42].

Так, для збагачення стартових кормів вітаміном Е (токоферолом), каротиноїдами доречно застосовувати препарат «Вітатон рибний». Він є натуральним джерелом β -каротину, на відміну від традиційно застосовуваних каротиноїдів штучного походження (астаксантину та кантоксантину), оскільки являє собою інактивовану біомасу гриба *Blakeslea trispora*, отриману за спеціальною технологією з використанням продуктів переробки кукурудзи. Він містить у своєму складі 90–92% сухої речовини, 25–30% протеїну (у зв'язаних та вільних амінокислотах), 55–60% ліпідів (переважають фосфоліпіди, дигліцериди, тригліцериди), 8–9% золи, 8% β -каротину. Рекомендоване введення до комбікорму в кількості 400 мг/кг [43].

На підставі виробничого досвіду, багатьма вченими рекомендовано за використання стартових комбікормів російського виробництва для осетрових риб, включати до їх рецептур гідролізати рибного білка із середнім ступенем гідролізу

в кількості не більше 10% для насичення низькомолекулярними протеїнами. Зокрема, розроблений препарат «Амінок» може застосовуватись у складі стартового комбікорму ОСТ-6. Він є продуктом гідролізу рибного протеїну, і його введення до складу раціону риб дозволяє збільшити ефективність їх вирощування, зменшити кормові витрати (з 1,9 од. до 1,1 од.), підвищити виживання (в середньому на 12%), збільшити темп росту молоді в 2,27 рази [44]. Розроблений спеціальний полівітамінний премікс ПО-5 і вітамінно-мінеральний премікс ВМП ПО-5 містять необхідні для реалізації потенцій росту і розвитку осетрових риб вітаміни і мікроелементи. Так, їх склад характеризується підвищеним вмістом аскорбінової кислоти, вітаміну Е (10 г/кг), рутину (0,05 г/кг) та фітину (0,01 г/кг) [21]. Норма введення цього преміксу в кормосуміш становить 1%. Використання преміксу ПО-5 в комбікормах для ранньої молоді осетрових риб збільшує темп їх росту в 1,7 рази та знижує кормові витрати до 1,0–1,2 од. [45, 46]. Дослідженнями встановлено, що додавання до раціону личинок осетрових риб вітаміну Е підвищує активність їх живлення та збільшує індекс наповнення шлунково-кишкового тракту приблизно вдвічі [47].

Однією з головних вимог до штучного корму є рівноцінність його білкового складу живим кормовим організмам, а саме представленість у ньому простих сполук білка. В першу чергу, це зумовлено тим, що кислі протеїнази (рН<5) шлунково-кишкового тракту осетрових риб відрізняються низькою активністю. Наприклад, активність трипсину, який виділяється в спіральному відділі кишечника у перші дні після вилуплення, зростає лише за остаточного переходу на екзогенне живлення. В свою чергу, така особливість ферментів пов'язана з тим, що функціонування травної системи осетрових риб починається з її задніх відділів, хоча формування травного тракту і печінки починається під час ембріонального періоду. Зазвичай, остаточне завершення розвитку всіх відділів шлунково-кишкового тракту відбувається на 40–50 добу після вилуплення ембріонів, за середньої довжини тіла у севрюги 8 см, у російського осетра — 10 см [30]. Згідно з теорією О. М. Уголева, на наступних етапах годівлі риб для нормального їх розвитку виникає необхідність у кормі з полімерними сполуками білка все більшої молекулярної маси [48]. Для нормалізації травлення та підвищення темпу росту завдяки стимуляції вироблення ферментів (амілаз, ліпаз та пектинів) застосовується «Субтіліс» — пробіотичний препарат, виготовлений з бактерій *Bacillus subtilis* та *Bacillus licheniformis*. В складі стартових комбікормів при вирощуванні ранньої молоді осетрових риб він має найбільш позитивний ефект за тривалого використання, до набуття рибами маси 3 г. Його фармакокінетика спрямована на заселення кишківника конкурентоспроможними штамами бактерій-пробіотів, які здійснюють неспецифічний контроль над чисельністю умовно-патогенної мікрофлори шляхом витіснення її зі складу кишкового мікробіоценозу [48].

Іншою суттєвою вимогою до штучних кормів є їх висока сенсорна привабливість, що зумовлено керівною роллю фази попереднього контролю якості корму зовнішніми смаковими рецепторами у харчовій поведінці ранньої молоді осетрових риб. Смакова чутливість є єдиною сенсорною системою, яка регулює фінальну фазу харчової поведінки, коли визначається якість захопленого кормового об'єкту, його відповідність харчовим вимогам особини та приймається остаточне рішення щодо ковтання чи відторгнення їжі. Заковтування корму відбувається лише після того, як об'єкт, що потрапив до ротової порожнини буде обстежений за допомогою внутрішньоротової рецепції — смакової та механо-

сенсорної. Лише після цієї завершальної фази харчової поведінки, якщо підтверджується відповідність смакових якостей об'єкта харчовим потребам осетрових риб, та якщо він за своєю структурою є прийнятним для них, відбувається заковтування. Оскільки формування хемосенсорних систем в онтогенезі осетрових риб розпочинається на стадії передличинок, цілком можливо видається необхідність використання харчових хімічних стимуляторів при вирощуванні ранньої молоді осетрових риб [26].

Дослідження темпів росту личинок стерляді виявили, що застосування під час переходу на активне живлення виключно штучних кормів не є ефективним, оскільки вони уповільнюють приріст маси тіла риб та провокують підвищення їх відходу до 14,5% [2, 49, 50]. Встановлено, що остаточне виключення живих кормових організмів з раціону ранньої молоді осетрових риб доцільно проводити за їх маси не менше 2 г. Зокрема, годівля наупліями артемії протягом 12 годин після вилуплення забезпечує збільшення їхньої маси личинок осетрових риб приблизно на 30% [23]. Окрім цього, європейські препарати «Selco-Experimental» та «Selco-DHA» застосовують для підвищення поживної цінності науплій артемії за допомогою біоінкапсуляції. Вони являють собою дрібнодисперсний комплекс екстрагованих жирів та вітамінів, після збагачення емульсією якого науплії артемії містять високий рівень докозагексаєнової ($C_{22}H_{32}O_2$) і ейкозапентаєнової ($C_{20}H_{30}O_2$) поліненасичених жирних кислот (ПНЖК). Використання збагачених таким чином науплій артемії в годівлі осетрових риб дозволяє підвищити темп лінійно-вагового росту: збільшити довжину особин на 12,86% та їх масу в півтора рази (за 14 діб використання) [49, 50]. Крім того, використання науплій артемії, збагачених ПНЖК, позитивно впливає на метаболізм личинок осетрових риб, зменшуючи їх відхід майже на 5% та прискорюючи ріст на 15% [2]. Тим не менш, за використання живих кормів необхідно враховувати, що фізіологічна потреба в амінокислотах ранньої молоді осетра, розрахована за ікрою, становить (у % від сухої речовини корму): лейцину — 4,6–5,1; ізолейцину 3,4–3,7; валіну — 3,1–3,5; фенілаланіну — 2,5–2,8; треоніну — 2,8–3,1; лізину — 4,0–4,4, метіоніну — 1,0–1,1; аргініну — 3,0–3,3; гістидину — 0,6–0,7. Баланс незамінних амінокислот у живих кормових організмах досить близький до співвідношення їх у білку ікри та тіла мальків осетра, однак, щодо відношення до лізину рівень метіоніну в них нижчий у 5–6 разів, а гістидину вищий у 1,5–3 рази [41]. Крім того, виявлено, що різноякісність корму прямо пропорційно впливає на фізіологічний стан ранньої молоді. Так, в осетрових риб її плавальна здатність підвищується при внесенні живих кормових організмів (здатних до активного руху) та штучних кормів (рухаються лише пасивно). Поєднання живих кормових організмів та штучних кормів дозволяє також забезпечити надходження максимально повнішої інформації для риб про навколишнє середовище, що впливає на формування і розвиток їх специфічних органів нюху та бічної лінії [28].

Низька ефективність повної відмови від використання живих кормових організмів зумовила широке застосування комбінованої схеми годівлі ранньої молоді осетрових риб, яка базується на поєднанні живих кормових організмів та штучних кормів. У зв'язку з цим, вченими розроблена схема поєднання сухого комбікорму ОСТ-6 та живих кормових організмів — дафній і каліфорнійського черв'яка (*Eisenia foetida*). Вона передбачає годівлю молоді осетрових видів риб у такій відповідності: до маси 0,3 г — 30% дафній + 30% ОСТ-6; до маси 0,5 г — 10% дафній + 10% каліфорнійського хробака + 20% ОСТ-6; до маси 1,5 г — 15% каліфорнійського черв'яка + 10% ОСТ-6; до маси 2 г — 10% каліфорнійського

черв'яка + 8% ОСТ-6. За використання лише комбікорму ОСТ-6, без організмів зоопланктону, норми годівлі ранньої молоді осетрових риб такі: до маси 0,3 г — 35–37%, до маси 0,5 г — 25–27%, до маси 1,5 г — 12–15%, та до маси 3,0 г — 8% [44]. Одним з кращих поєднань для переходу личинок російського осетра на годівлю штучними кормами є застосування науплій артемії та стартового корму фірми «Coppens International B.V.». За поступового заміщення живого корму штучним, цей етап займає близько 15 діб [51]. Згодовування личинкам після переходу на активне живлення поєднання природних кормових організмів та штучних кормів позитивно відображається на висоті складок, розмірах епітеліальних клітин та розвитку рельєфу слизової оболонки шлунку і кишківника [26]. Кияноюю О. В. та іншими науковцями виявлено, що в перші 15 діб вирощування є сенс додавати до штучного корму препарат «Анфелан» — антиоксидант штучної природи, що перешкоджає окисненню ліпідів та вітамінів, тим самим підвищуючи ефективність використання протеїну і енергії, зниженню інтенсивності перекисного окиснення ліпідів, вмісту малонового діальдегіду, дієнових кон'югатів та основ Шиффа в печінці [52].

Якщо звикання до штучного корму починається зі згодовування його пилоподібних фракцій, то згодом вони збільшуються залежно від маси молоді. Таким чином, фракція (розмір крупки) стартових кормів варіює від 0,3 мм до 2,0 мм. Під час переходу до більшої за розміром фракції рекомендовано змішувати її з крупкою попереднього розміру [9, 33]. При вирощуванні личинок осетрових риб до маси 100 мг добова кількість стартового корму не нормується, годівля проводиться в міру споживання корму. Однак, орієнтовне значення добового раціону для риб цієї категорії становить 20–25% від маси тіла. Добова норма корму для риб масою від 100 до 500 мг знаходиться на рівні 12–18% від маси тіла, масою від 0,5 до 3 г — 6–12% [7, 26, 30]. Добові норми годівлі комбінованими кормами розраховуються на період 5–10 днів (залежно від віку риби) з урахуванням температури води, середньої маси молоді та її кількості. Визначення середньої маси риб проводять один раз на п'ять діб, починаючи з моменту її переходу на активне живлення. Чисельність риб визначається з урахуванням загиблості [8, 33].

У процесі підрощування необхідно контролювати густоту посадки та розмірну структуру осетрових риб в кожному басейні. За досягнення маси риб 0,2–0,3 г, кожні 10 днів слід проводити сортування молоді, виділяти три розмірні групи: велику, середню і дрібну. Необхідність сортування пояснюється харчовою конкуренцією в період інтенсивного росту молоді і неможливістю точного визначення кількості згодовуваного корму за умов, коли індивідуальна маса окремих риб в одному басейні відрізняється більш ніж на 50% [8, 33]. На початку переходу личинок на екзогенне живлення дуже важливо дотримуватися правильного способу внесення корму — задати його в місця їх скупчення. Рівень води в цей час бажано знижувати до 10–15 см, а після годівлі знову підвищувати. Корм (крупку) необхідно вносити по стінці басейну, щоб привчити личинок брати корм спочатку з поверхні стінок, а потім з дна басейну. Це зумовлено тим, що личинки, які не звикли живитися з твердої поверхні, в подальшому не зможуть живитися взагалі, тому що будова їх органів захоплення і заковтування їжі не пристосовується до живлення з дна. Порушення цього правила може призвести до підвищеної смертності риб. Після адаптації молоді до споживання корму з дна його можна вносити в зоні водоподачі, де з потоком води він буде розподілятися по дну басейна [7]. Незважаючи на те, що дотримання нормативів внесення

живих кормових організмів та штучних кормів в процесі підрощування ювенільних стадій осетрових риб в УЗВ, забезпечує більшу технологічність і контрольованість процесу годівлі, в першу чергу необхідно орієнтуватись на ступінь інтенсивності їх споживання [54]. Слід зазначити, що хоч застосування автоматичних кормороздавачів для сухих кормів є ефективним на всіх етапах вирощування осетрових риб і дозволяє підвищити їх виживання в середньому на 5–7%, однак у не великих за об'ємом УЗВ воно є економічно не вигідним [44]. Крім того, ручне внесення кормів на ранніх стадіях їх розвитку, хоча й досить працемістке, проте необхідне, оскільки забезпечує не лише доступність та свіжість корму, а й додатковий нагляд за поведінкою риби [28]. В період переходу на живлення штучними кормами осетрові риби високочутливі до якості води та корму. А, отже, у цей період варто приділяти увагу техніці роздання корму та проводити вручну очищення дна та стінок басейнів або лотків перед кожною годівлею. Також, важливим є очищення чи заміна фільтруючих решіток на стоці води з басейнів, а розмір вічка їх сіток має змінюватись від 1 мм (під час витримування передличинок) до 2 мм (в процесі переходу на активне живлення) і далі поступово до 7 мм (в період вирощування молоді масою понад 10 г). В міру росту осетрових риб, вічко сітки, осередок зливного екрану на «ліхтарях», «склянках» повинно збільшуватись від 1 мм [8, 15, 33]. Накопичення залишків корму може призвести не лише до зниження якості води, а й до гострого отруєння особин під час заковтування зіпсованого корму. Крім того, бажано кожні три доби проводити тератологічний аналіз кількох живих та більшої частини загиблених особин. Це забезпечить вчасне виявлення аномалій (найчастіше — грудних плавців, форми голови, нюхових органів, форми тіла, зябрових кришок, травної системи), повноту оцінки їх розвитку і рибницьких якостей [8, 14]. Однією з ознак отруєння кормами є роздуте черевце або невеликі гематоми ближче до анального отвору. В цих випадках є сенс зменшити кратність годівлі та провести ретельний гідрохімічний аналіз; інколи короткотривалий період голодування допомагає знизити відхід риб [53].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Формування ремонтно-маточних стад різних видів осетрових риб на сучасному етапі розвитку осетрівництва в Україні визначається успішністю підрощування їх ювенільних стадій. В останні десятиріччя найбільш ефективною зарекомендувала себе біотехнологія вирощування осетрових риб з використанням УЗВ. Традиційна технологія годівлі молоді осетрових риб живими кормовими організмами є недостатньо ефективною через низку причин різноманітної природи, тому актуальності набуває оптимізація переходу личинок на годівлю штучними кормами. Личинки осетрових риб мають досить розвинену систему травлення. Для них характерний низький ступінь продукування ферментів, насамперед протеолітичних, що розщеплюють білки. Внесення кормів до переходу на активне живлення осетрових риб дозволяє створити оптимальні умови розвитку і сприяє підвищенню рибницько-біологічних показників під час витримування личинок та за наступного їх вирощування. Перехід ранньої молоді на активне живлення з додаванням до кормового раціону штучних кормів є складним та відповідальним моментом в біотехніці вирощування осетрових риб. Хоча ювенільні стадії різних видів осетрових риб можуть реалізувати свої високі потенційні можливості росту лише після їх переходу на високоенергетичні,

фізіологічно збалансовані штучні корми, необхідно використовувати й живі кормові організми під час переходу риб на екзогенне живлення. Саме тому перспективними є дослідження, спрямовані на створення інноваційних рішень для підвищення ефективності підрощування ювенільних стадій осетрових риб з поступовим переходом на годівлю штучними кормами.

ЛІТЕРАТУРА

1. Сравнительная оценка применения сухих полнорационных комбикормов европейского производства при выращивании осетровых рыб / В. Г. Чипинов, А. А. Красильникова, М. В. Коваленко [и др.] // Вестник АГТУ. — 2012. — № 2. — С. 99—103.
2. Интенсивное выращивания ранних стадий развития осетровых рыб / Р. Кольман, М. Прусинска, М. Чепуркина [и др.] // Аквакультура Центральной и Восточной Европы: настоящее и будущее : II съезд NACEE : тезисы докл. — Кишинев, 2011. — С. 118—120.
3. Технологии выращивания и кормления объектов аквакультуры юга России (справочное, учебное пособие) / [Пономарев С. В., Гамыгин Е. А., Никоноров С. И. и др.]. — Астрахань : Нова плюс, 2002. — 264 с.
4. Абросимова Н. А. Корма и кормление молоди осетровых рыб в индустриальной аквакультуре : автореферат дис. на соискание уч. степени докт. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология» / Абросимова Н. А. — М., 1997. — 76 с.
5. Васильева Л. М. Кормление осетровых рыб в индустриальной аквакультуре / Васильева Л. М., Пономарев С. В., Судакова Н. В. — Астрахань : НПЦ по осетроводству «БИОС» ; ГУП «Издательско-полиграфический комплекс «Волга», 2000. — 87 с.
6. Моя Библиотека. Выдерживание предличинок и подращивание личинок рыб [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://mybiblioteka.ru/2-18247.html>.
7. Югра-агро. Кормление осетровых рыб [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://ugra-agro.ru/fish_feed_main/vostok-agro/293-kormlenie-osetrovyh.html.
8. Чебанов М. С. Руководство по искусственному воспроизводству осетровых рыб / Чебанов М. С., Галич Е. В., Чмырь Ю. Н. — М. : ФГНУ Росинформагротех, 2004. — 148 с.
9. Портал о фермерском хозяйстве. Кормление осетровых рыб [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://pro-fermu.ru/kormlenie-osetrovyih-ryib>.
10. Развитие личинок осетровых рыб [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.activestudy.info/razvitie-lichinok-osetrovyx-ryb>.
11. Желтов Ю. А. Кормление разновозрастных ценных видов рыб в фермерских рыбных хозяйствах / Желтов Ю. А. — К. : ИНКОС, 2006. — 221 с.
12. Пономарёв С. В. Физиологические основы создания полноценных комбинированных кормов с учетом этапности развития организма лососевых и осетровых видов рыб / С. В. Пономарёв, Е. А. Гамыгин, А. Н. Канидьев // Вестник АГТУ. — 2010. — № 1. — С. 132—139.
13. Теория критических периодов [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://mydocx.ru/1-133678.html>.
14. Кончиц В. В. Технологические особенности выдерживания предличинок ленского осетра до перехода на активное питание в условиях Республики Беларусь / В. В. Кончиц, О. В. Усова // Аквакультура Центральной и

- Восточной Европы: настоящее и будущее : II съезд NACEE : тезисы докл. — Кишинев, 2011. — С. 120—125.
15. Кольман Р. Применение установок с замкнутым водоснабжением (УЗВ) в осетроводстве Польши / Р. Кольман, Б. Здановски // Рециркуляционные технологии в крытых и открытых системах : руководство : AQUARED POT, г. Вильнюс (Литва), 13–14 мая 2013 г. : тезисы докл. семинара. — Институт рыболовства, аквакультуры и ирригации, 2013. — С. 32—47.
 16. Васильева Т. В. Рыбохозяйственные и экологические аспекты эффективности искусственного воспроизводства осетровых рыб Волго-Каспийского бассейна : дис. ... канд. биол. наук : спец. 03.02.06 «Ихтиология» / Васильева Т. В. — Астрахань, 2010. — 165 с.
 17. Мильштейн В. В. Осетроводство / Мильштейн В. В. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1982. — 152 с.
 18. Биотехника воспроизводства осетровых [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://geolike.ru/page/gl_118.htm.
 19. Коваленко М. В. Особенности организации исследований по аквакультуре осетровых рыб в аквакомплексе научно-экспериментальной базы «Кагальник» / М. В. Коваленко, В. Г. Чипинов // Актуальные проблемы обеспечения продовольственной безопасности юга России: инновационные технологии для сохранения биоресурсов, плодородия почв, мелиорации и водоснабжения : Междунар. науч. конф., Ростов-на-Дону, 27–30 сент. 2011 г. : матер. — Ростов н/Д. : ЮНЦ РАН, 2011. — С. 60—62.
 20. Магомаев Ф. М. Товарное рыбоводство / Магомаев Ф. М. — Астрахань: Изд-во КспНИРХ, 2007. — С. 418—421.
 21. Опыт выращивания осетровых рыб в условиях замкнутой системы водообеспечения для фермерских хозяйств / [Матишов Г. Г., Матишов Д. Г., Пономарева Е. Н. и др.] — Ростов н/Д. : ЮНЦ РАН, 2006. — 72 с.
 22. Гуркина О. А. Выращивание ленского осетра до массы 1 кг в условиях установки замкнутого водоснабжения / О. А. Гуркина, П. А. Грищенко, Е. В. Пономарёва // Современные способы повышения продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы в свете импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны : Междунар. науч.-практ. конф., Саратов, 14–16 мая 2015 г. — Саратов, 2015. — С. 25—28.
 23. Чепуркина М. А. Оптимизация методов кормления осетровых рыб в период раннего онтогенеза [Электронный ресурс] / М. А. Чепуркина, Т. А. Голубкова — Режим доступа : <http://dspace.vniro.ru/handle/123456789/2396>.
 24. Киселев А. Ю. Установки с замкнутым циклом водоиспользования и технологии выращивания в них объектов аквакультуры / А. Ю. Киселев // Рыбное хозяйство : обзорная информация. — 1997. — Вып. 1. — 80 с. — (Серия Аквакультура).
 25. Разведение осетров [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://kursak.net/razvedenie-osetrov>.
 26. Васильева Л. М. Влияние раннего внесения корма на выживаемость личинок севрюги и веслоноса / Л. М. Васильева, С. О. Некрасова // Естественные науки. — 2010. — № 4(33). — С. 59—63.
 27. Некрасова С. О. Повышение эффективности выращивания молоди севрюги (*Acipenser stellatus* Pallas) и веслоноса (*Polyodon spathula* Walbaum) на основе

- особенностей их поведения в раннем онтогенезе : дис. ... канд. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология» / Некрасова С. О. — Астрахань, 2006. — 175 с.
28. Никитина С. М. Внесение кормов для осетровых рыб до перехода на активное питание [Электронный ресурс] / С. М. Никитина, Н. В. Чибисова. — Режим доступа : <http://www.microbik.ru/dostc/Тезисы+докладов+19-23+апреля+2010+гс/shk-10.html>.
29. Агеец В. Ю. Влияние биологически активных веществ на морфо-физиологические характеристики молоди ленского осетра при подрачивании / В. Ю. Агеец, С. И. Докучаева, В. Д. Сенникова // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2014. — Вып. 30. — С. 111—120.
30. Судакова Н. В. Сравнительная эффективность продуктов микробного синтеза в составе стартовых комбикормов для молоди осетровых рыб : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология» / Судакова Н. В. — М., 1998. — 29 с.
31. Некрасова С. О. Определение начала кормления предличинок осетровых рыб по особенностям их поведения / С. О. Некрасова, Л. М. Васильева // Поведение рыб : IV Всеросс. конф. с международным участием, Борок, Россия, 19–21 окт. 2010 г. : мат. докл. — М. : АКВАРОС, 2010. — С. 292—297.
32. Пат. 2363153 Российская Федерация. Способ выращивания молоди осетровых рыб [Электронный ресурс] / [Каренгина Т. В., Самотеева В. В., Яковлев С. В. и др.]. — Режим доступа : <http://www.findpatent.ru/patent/236/2363153.html>.
33. Кормление молоди осетровых искусственными кормами [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://rosagroportal.ru/article/current/535/kormlenie_molodi_osetrovyh_iskusstvennyimi_kormami.
34. Технология разведения осетров. Часть 1. Кормление молоди [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://forummira.ru/tehnologija/razvedenie-osetra/kormlenie-molodi.html>.
35. Кормление молоди осетровых рыб в бассейнах [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://ribvod.ru/kormlenie-molodi-v-basseynah>.
36. Корнієнко В. О. Оптимізація основних технологічних параметрів при підгощуванні личинок російського осетра : дис. ... канд. біол. наук : спец. 06.02.03 «Рибництво» / Корнієнко В. О. — К., 2004. — 188 с.
37. Карзинкин Г. С. К нормативам кормления молоди осетровых и белорыбицы / Г. С. Карзинкин // Труды ВНИРО. — 1951. — Т. XIX. — С. 25—38.
38. Брайнбалле Я. Руководство по аквакультуре в установках замкнутого водоснабжения / Я. Брайнбалле // Введение в новые экологические и высокопродуктивные замкнутые рыбоводные системы. — Копенгаген : Международная организация «ЕВРОФИШ» при поддержке Субрегионального бюро ФАО по Центральной и Восточной Европе, 2010. — С. 13—32.
39. Пономарев С. В. Осетроводство на интенсивной основе / С. В. Пономарев, Ф. М. Магомаев. — Махачкала : Эко-пресс, 2011. — 352 с.
40. Рекомендации по кормлению осетровых рыб в условиях рыбоводных хозяйств Казахстана / [Койшибаева С. К., Бадрызлова Н. С., Федоров Е. В., и др.]; Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан; АО «Казагроинновация». — Астана : Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, 2011.

41. Саенко Е. М. Биологические основы оптимизации белкового питания молоди осетра при искусственном кормлении : дисс. ... канд. биол. наук : спец. 06.02.05 «Физиология, биохимия и биотехнология сельскохозяйственных животных» / Саенко Е. М. — Ростов н/Д., 1998. — 120 с.
42. Разработка кормления и использования корма [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://refvip.ru/ref_fc15e3c1af432920aa6582629e9426a9.html.
43. Грозеску Ю. Н. Новый каротиносодержащий препарат в составе комбикормов для осетровых рыб / Ю. Н. Грозеску, М. А. Митрофанова // Вестник АГТУ. — 2004. — № 2(21). — С. 81—88.
44. Чипинова Г. М. Технологические особенности кормления молоди осетровых рыб при индустриальном выращивании : дисс. ... канд. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология» / Чипинова Г. М. — Астрахань, 2006. — 149 с.
45. Абросимова К. С. Проблемы выращивания личинок и мальков осетровых рыб в интенсивной аквакультуре и пути их решения / К. С. Абросимова, Н. А. Абросимова, Л. М. Васильева // Фундаментальные исследования. — 2015. — № 2(9). — С. 1882—1886.
46. Пономарева Е. Н. Оптимизация методов выращивания объектов индустриальной аквакультуры на ранних этапах онтогенеза : дис. ... докт. биол. наук : спец.: 03.00.10 «Ихтиология» / Пономарева Е. Н. — Астрахань, 2003. — 336 с.
47. Опыт подращивания личинок ленского осетра, полученных от впервые созревших самок в условиях ОАО «Рыбхоз «Селец» / В. В. Кончиц, А. Л. Савочкин, В. Г. Федорова // Аквакультура Центральной и Восточной Европы: настоящее и будущее : II съезд NACEE : тезисы. докл. — Кишинев, 2011. — С. 125—130.
48. Грозеску Ю. Н. Биологическая эффективность применения пробиотика «Субтилис» в составе стартовых комбикормов для осетровых рыб / Ю. Н. Грозеску, А. А. Бахарева, Е. А. Шульга // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2009. — Т. 11, № 1(2). — С. 42—45.
49. Чепуркина М. А. Сохранение биоресурсов осетровых видов рыб Обь-Иртышского бассейна путем искусственного воспроизводства с использованием геотермальных вод : дисс. ... канд. биол. наук : спец. : 03.02.14 «Биологические ресурсы» / Чепуркина М. А. — Новосибирск, 2010. — 220 с.
50. Effects of *Artemia* sp. with Essential Fatty Acids on Functional and Morfological Aspects of the Digestive System in *Acipenser gueldenstaedtii* Larvae / M. Kamaszewski, T. Ostaszewska, M. Prusinska [et al.] // Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. — 2014. — Vol. 14. — P. 1—2.
51. Алымов Ю. В. Морфофизиологическая оценка молоди русского осетра, выращенной на комбинированных кормах для формирования продукционных стад : дисс. ... канд. с.-х. наук : спец. : 06.04.01 «Рыбное хозяйство и аквакультура» / Алымов Ю. В. — Астрахань, 2013. — 122 с.
52. Киянова Е. В. Физиолого-биохимическая характеристика молоди русского осетра при введении в рацион кормовых антибиотиков, эубиотиков и антиоксидантов : дисс. ... канд. биол. наук : спец. : 06.02.05 «Физиология, биохимия и биотехнология сельскохозяйственных животных» / Киянова Е. В. — Ростов н/Д., 1998. — 131 с.

53. Кончиц В. В. Ленский осетр (*Acipenser baeri* Brandt) — перспективный объект рыборазведения в Беларуси / В. В. Кончиц, А. Л. Савончик // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. — 2010. — Вып. 13. — С. 366—371.
54. Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб : довідково-навчальний посібник / [Шерман І. М., Гринжевський М. В., Желтов Ю. О. та ін.]. — К. : Вища освіта, 2002. — 128 с.

REFERENCES

1. Chipinov, V. G. (2012). Srovnitel'naya otsenka primeneniya sukhikh polnoratsionnykh kombikormov evropeyskogo proizvodstva pri vyrashchivani osetrovykh ryb. *Vestnik AGTU*, 2, 99-103.
2. Kol'man, R., Prusinska, M., & Chepurkina, M. et al. (2011). Intensivnoe vyrashchivaniya rannikh stadiy razvitiya osetrovykh ryb. *Akvakul'tura Central'noj i Vostochnoj Evropy: nastojashhee i budushhee: II s'ezd NACEE*. Kishinev, 72-75.
3. Ponomarev, S. V., Gamygin, E. A., Nikonorov, S. I., Ponomareva, E. N., Grozesku, Ju. N., & Bahareva, A. A. (2002). *Tehnologii vyrashhivaniya i kormleniya ob'ektov akvakul'tury juga Rossii (spravochnoe, uchebnoe posobie)*. Astrahan' : Nova plus.
4. Abrosimova, N. A. (1997). Korma i kormlenie molodi osetrovykh ryb v industrial'noy akvakul'ture. *Extended abstract of doctor's thesis*. Moskva.
5. Vasil'eva, L. M., Ponomarev, S. V., & Sudakova, N. V. (2000). *Kormlenie osetrovykh ryb v industrial'noy akvakul'ture*. Astrahan' : NPC po osetrovodstvu BIOS ; GUP Izdatel'sko-poligraficheskij kompleks Volga.
6. Vyderzhivanie predlichinok i podrashchivanie lichinok ryb. *mybiblioteka.ru*. Retrieved from <http://mybiblioteka.ru/2-18247.html>.
7. Kormlenie osetrovykh ryb. *ugra-agro.ru*. Retrieved from http://ugra-agro.ru/fish_feed_main/vostok-agro/293-kormlenie-osetrovykh.html.
8. Chebanov, M. S., Galich, E. V., & Chmyr', Yu. N. (2004). *Rukovodstvo po iskusstvennomu vosпроизводstvu osetrovykh ryb*. Moskva : FGNU Rosinformagrotekh.
9. Kormlenie osetrovykh ryb. *pro-fermu.ru*. Retrieved from <http://pro-fermu.ru/kormlenie-osetrovykh-ryb>.
10. Razvitie lichinok osetrovykh ryb. *activestudy.info*. Retrieved from: <http://www.activestudy.info/razvitie-lichinok-osetrovykh-ryb>.
11. Zheltov, Ju. A. (2006). *Kormlenie raznovozrastnykh cennykh vidov ryb v fermerskikh rybnykh hozjajstvakh*. Kiev : INKOS.
12. Ponomarev, S. V., Gamygin E. A., & Kanid'ev, A. N. (2010). Fiziologicheskie osnovy sozdaniya polnotsennykh kombinirovannykh kormov s uchetom etapnosti razvitiya organizma lososevykh i osetrovykh vidov ryb. *Vestnik AGTU*, 1, 132-139.
13. Teoriya kriticheskikh periodov. *mydocx.ru*. Retrieved from: <http://mydocx.ru/1-133678.html>.
14. Konchits, V. V., & Usova, O. V. (2011). Tekhnologicheskie osobennosti vyderzhivaniya predlichinok lenskogo osetra do perekhoda na aktivnoe pitanie v usloviyakh Respubliki Belarus'. *Akvakul'tura Central'noj i Vostochnoj Evropy: nastojashhee i budushhee: II s'ezd NACEE*. Kishinev, 72-75.
15. Kol'man R., & Zdanovski, B. (2013). Primenenie ustanovok s zamknutym vodosnabzheniem (UZV) v osetrovodstve Pol'shi. *Retsirkulyatsionnye tekhnologii v*

- krytykh i otkrytykh sistemakh : rukovodstvo : AQUAREDPOT, Vil'nyus (Litva), 13-14 maya 2013 g. Sarvash : Institut rybolovstva, akvakul'tury i irrigatsii, 32-47.*
16. Vasil'eva, T. V. (2010). Rybokhozyaystvennye i ekologicheskie aspekty effektivnosti iskusstvennogo vosproizvodstva osetrovyykh ryb volgo-kaspiyskogo basseyna. *Candidate's thesis*. Astrakhan'.
 17. Mil'shteyn, V. V. (1982). *Osetrovodstvo*. Moskva : Legkaya i pishchevaya promyshlennost'.
 18. Biotekhnika vosproizvodstva osetrovyykh. *geolike.ru*. Retrieved from: http://geolike.ru/page/gl_118.htm.
 19. Kovalenko, M. V., & Chipinov, V. G. (2011). Osobennosti organizatsii issledovaniy po akvakul'ture osetrovyykh ryb v akvakomplekse nauchno-eksperimental'noy bazy Kagal'nik. *Aktual'nye problemy obespecheniya prodovol'stvennoy bezopasnosti yuga Rossii: innovatsionnye tekhnologii dlya sokhraneniya bioresursov, plodorodiya pochv, melioratsii i vodosnabzheniya: materialy Mezhdunar. nauch. konf., 27–30 sentyabrya 2011 g. Rostov-na-Donu : Izd-vo YuNTs RAN, 60-62.*
 20. Magomae, F. M. (2007). *Tovarnoe rybovodstvo*. Astrakhan' : Izd-vo KspNIRKh, 418-421.
 21. Matishov, G. G., Matishov, D. G., Ponomareva, E. H., Luzhnyak, V. A., & Chipinov, V. G. et al. (2006). *Opyt vyrashchivaniya osetrovyykh ryb v usloviyakh zamknutoy sistemy vodoobespecheniya dlya fermerskikh khozyaystv*. Rostov-na-Donu: Izd-vo YuNTs RAN.
 22. Gurkina, O. A. Grishchenko, P. A., & Ponomareva, E. V. (2015). Vyrashchivanie lenskogo osetra do massy 1 kg v usloviyakh ustanovki zamknutogo vodosnabzheniya. *Sovremennye sposoby povysheniya produktivnykh kachestv sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh, ptitsy i ryby v svete importozameshcheniya i obespecheniya prodovol'stvennoy bezopasnosti strany : Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Saratov, 14-16 maya 2015. Saratov, 25-28.*
 23. Chepurkina, M. A., & Golubkova, T. A. Optimizatsiya metodov kormleniya osetrovyykh ryb v period rannego ontogeneza. *dspace.vniro.ru*. Retrieved from: <http://dspace.vniro.ru/handle/123456789/2396>
 24. Kiselev, A. Yu. (1997). Ustanovki s zamknutym tsiklom vodoispol'zovaniya i tekhnologii vyrashchivaniya v nikh ob'ektov akvakul'tury. *Rybnoe khozyaistvo. Ser. Akvakul'tura: obzornaya informatsiya, 1.*
 25. Razvedenie osetrov. *kursak.net*. Retrieved from: <http://kursak.net/razvedenie-osetrov/>.
 26. Vasil'eva, L. M., & Nekrasova, S. O. (2010). Vliyanie rannego vneseniya korma na vyzhivaemost' lichinok sevryugi i veslonosa. *Estestvennye nauki, 4(33), 59-63.*
 27. Nekrasova, S. O. (2006). Povyshenie effektivnosti vyrashchivaniya molodi sevryugi (*Acipenser stellatus* Pallas) i veslonosa (*Polyodon spathula* Walbaum) na osnove osobennostey ikh povedeniya v rannem ontogeneze. *Candidate's thesis*. Astrakhan'.
 28. Nikitina, S. M., & Chibisova, N. V. Vnesenie kormov dlya osetrovyykh ryb do perekhoda na aktivnoe pitanie. *microbik.ru*. Retrieved from: <http://www.microbik.ru/dostc/Тезисы+докладов+19-23+апреля+2010+rc/shk-10.html>.
 29. Ageets, V. Yu., Dokuchaeva, S. I., Sennikova, V. D., & Ageets, V. Yu. (Ed.) (2014). Vliyanie biologicheskii aktivnykh veshchestv na morfo-fiziologicheskie

- kharakteristiki molodi lenskogo osetra pri podrashchivanii. *Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi*, 30, 111-120.
30. Sudakova, N. V. (1998). Sravnitel'naya effektivnost' produktov mikrobnogo sinteza v sostave startovykh kombikormov dlya molodi osetrovykh ryb. *Candidate's thesis*. Moskva.
31. Nekrasova, S. O., & Vasil'eva, L. M. (2010). Opredelenie nachala kormleniya predlichinok osetrovykh ryb po osobennostyam ikh povedeniya. *Povedenie ryb: IV Vseross. konf. s mezhdunarodnym uchastiem, 19-21 oktyabrya 2010 g., Borok, Rossiya*. Moskva : AKVAROS, 292-297.
32. Karengina, T. V., Samoteeva, V. V., Yakovlev, S. V., Ivanov, D. I., & Vekhov, S. V. Patent (RU 2363153): Sposob vyrashchivaniya molodi osetrovykh ryb. *findpatent.ru*. Retrieved from: <http://www.findpatent.ru/patent/236/2363153.html>.
33. Kormlenie molodi osetrovykh iskusstvennymi kormami. *rosagroportal.ru*. Retrieved from: http://rosagroportal.ru/article/current/535/kormlenie_molodi_osetrovykh_iskusstvennymi_kormami.
34. Tekhnologiya razvedeniya osetrov. Chast' 1. Kormlenie molodi. *forummira.ru*. Retrieved from: <http://forummira.ru/tehnologija/razvedenie-osetra/kormlenie-molodi.html>.
35. Kormlenie molodi osetrovykh ryb v basseynakh. *ribvod.ru*. Retrieved from: <http://ribvod.ru/kormlenie-molodi-v-basseynah/>.
36. Kornienko, V. O. (2004). Optimizatsiya osnovnykh tekhnologicheskikh parametriv pri pidroshchuvanni lichinok rosiys'kogo osetra. *Candidate's thesis*. Kyiv.
37. Karzinkin, G. S. (1951). K normativam kormleniya molodi osetrovykh i belorybitsy. *Trudy VNIRO, XIX*, 25-38.
38. Braynballe, Ya. (2010). Rukovodstvo po akvakul'ture v ustanovkakh zamknutogo vodosnabzheniya. *Vvedenie v novye ekologicheskie i vysokoproduktivnye zamknuty rybovodnye sistemy*. Kopenhagen : Izd-vo Mezhdunarodnaya organizatsiya «EVROFISH» pri podderzhke Sub-regional'nogo byuro FAO po Tsentral'noy i Vostochnoy Evrope, 13-32.
39. Ponomarev, S. V., & Magomae, F. M. (2011). *Osetrovodstvo na intensivnoy osnove*. Makhachkala : Eko-press.
40. Koyshibaeva, S. K., Badryzlova, N. S., Fedorov, E. V., Mukhramova, A. A., & Bulavina, N. (2011). *Rekomendatsii po kormleniyu osetrovykh ryb v usloviyakh rybovodnykh khozyaystv Kazakhstana*. Astana : Kazakhskiy nauchno-issledovatel'skiy institut rybnogo khozyaystva.
41. Saenko, E. M. (1998). Biologicheskie osnovy optimizatsii belkovogo pitaniya molodi osetra pri iskusstvennom kormlenii. *Candidate's thesis*. Rostov-na-Donu.
42. Razrabotka kormleniya i ispol'zovaniya korma. *refvip.ru*. Retrieved from: http://refvip.ru/ref_fc15e3c1af432920aa6582629e9426a9.html.
43. Grozesku, Yu. N., & Mitrofanova, M. A. (2004). Novyy karotinosoderzhashchiy preparat v sostave kombikormov dlya osetrovykh ryb. *Vestnik AGTU. 2(21)*, 81-88.
44. Chipinova, G. M. (2006.) Tekhnologicheskie osobennosti kormleniya molodi osetrovykh ryb pri industrial'nom vyrashchivanii. *Candidate's thesis*. Astrahan'.
45. Abrosimova, K. S., Abrosimova, N. A., & Vasil'eva, L. M. (2015). Problemy vyrashchivaniya lichinok i mal'kov osetrovykh ryb v intensivnoy akvakul'ture i puti ikh resheniya. *Fundamental'nye issledovaniya*, 2(9), 1882-1886.

46. Ponomareva, E. N. (2003). Optimizatsiya metodov vyrashchivaniya ob"ektov industrial'noy akvakul'tury na rannikh etapakh ontogeneza. *Doctor's thesis*. Astrakhan'.
47. Konchits, V. V., Savochkin, A. L., & Fedorova, V. G. (2011). Opyt podrashchivaniya lichinok lenskogo osetra poluchennykh ot vperve sozrevshikh samok v usloviyakh OAO «Rybkhoz «Selets» *Akvakul'tura Central'noj i Vostochnoj Evropy: nastojashhee i budushhee: II s'ezd NACEE*. Kishinev, 125-130.
48. Grozesku, Yu. N., Bakhareva, A. A. & Shul'ga, E. A. (2009). Biologicheskaya effektivnost' primeneniya probiotika «Subtilis» v sostave startovykh kombikormov dlya osetrovyykh ryb. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk*, 11, 1(2), 42-45.
49. Chepurkina, M. A. (2010). Sokhranenie bioresursov osetrovyykh vidov ryb Ob'-Irtyskского бассейна путем искусственного воспроизводства с использованием геотермальных вод. *Candidate's thesis*. Novosibirsk.
50. Kamaszewski, M., Ostaszewska, T., Prusinska, M., Kolman, R., Chojanacki, M., Zabytivskij, J., Jankowska, B., & Kasprzak, R. (2014). Effects of *Artemia* sp. with Essential Fatty Acids on Functional and Morphological Aspects of the Digestive System in *Acipenser gueldenstaedtii* Larvae. *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 14, 1-2.
51. Alymov, Yu. V. (2013). Morfoфизиологическая отсепка молоди русского осетра, выращенной на комбинированных кормах для формирования продукционных стад. *Candidate's thesis*. Astrakhan'.
52. Kiyanova, E. V. (1998). Физиолого-биохимическая характеристика молоди русского осетра при введении в рацион кормовых антибиотиков, еубиотиков и антиоксидантов. *Candidate's thesis*. Rostov-na-Donu.
53. Konchits, V. V., & Savonchik, A. L. (2010). Lenskiy osetr (*Acipenser baeri* Brandt) - perspektivnyy ob"ekt ryborazvedeniya v Belarusi. *Aktual'nye problemy intensivnogo razvitiya zhivotnovodstva*, 13, 2, 366-371.
54. Sherman, I. M., Hrynzhhevskiy, M. V., Zheltov, Yu. O., Pylypenko, Yu. V., Volichenko, M. I., & Hrytsyniak, I. I. (2001). *Hodivlia ryb*. Kyiv : Vyshecha osvita.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА РАННЕЙ МОЛОДИ ОСЕТРОВЫХ (ACIPENSERIDAE) РЫБ НА КОРМЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫМИ КОРМАМИ В УЗВ (ОБЗОР)

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Проанализировать данные научных источников касательно морфологических и эколого-физиологических особенностей процесса перехода ранней молоди осетровых видов рыб (*Acipenseridae*) на кормление искусственными кормами. Кратко изложить биотехнологические основы применения искусственных кормов в условиях установки замкнутого водоснабжения (УЗВ).

Результаты. Обзор научных работ показал, что переход ранней молоди осетровых рыб на кормление искусственными кормами является одним из самых сложных этапов, даже в условиях его прохождения в контролируемых условиях УЗВ. Описаны особенности постэмбриогенеза осетровых рыб, их поведение и морфофизиологические изменения во время него. Изложены основные требования к выращиванию личинок осетровых рыб в УЗВ. Показано, что окончательный отказ от природных (живых или замороженных) кормовых организмов невозможен, оптимальным является их сочетание с искусственным кормом, с постепенным преобладанием последнего. Приведены примеры схемы кормления на основе сочетания природных и искусственных кормов. Рассмотрены наиболее распространенные

биологически активные добавки, которые способствуют лучшему усвоению кормов при переходе на экзогенное питание. Освещено влияние обогащенных полиненасыщенными жирными кислотами науплий артемии (*Artemia*).

Практическая значимость. Массив обобщенной информации будет интересен для ученых, исследующих особенности перехода ранней молоди осетровых видов рыб на кормление искусственными кормами в условиях УЗВ. Данные по биотехнологии рационального кормления ранней молоди осетровых в УЗВ в этот период являются актуальными в условиях постоянного поиска наиболее эффективной замены живых кормовых организмов и уменьшения элиминации молоди рыб в постэмбриогенезе.

Ключевые слова: осетровые виды рыб (*Acipenseridae*), УЗВ, кормление ранней молоди, искусственные корма, природные кормовые организмы, постэмбриогенез осетровых видов рыб, переход на экзогенное питание, повышение выживаемости личинок, биологически активные препараты.

PECULIARITIES OF THE TRANSITION OF EARLY STURGEON (*ACIPENSERIDAE*) FRY TO ARTIFICIAL FORMULATED FEEDS IN RAS (A REVIEW)

M. Simon, seemann_sm@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To review scientific sources on the morphological and ecophysiological peculiarities of the transition of early sturgeon fry (*Acipenseridae*) to artificial formulated feeds. To summarize the biotechnological fundamentals of the use of artificial formulated feeds in the conditions of recirculating aquaculture systems (RAS).

Findings. The transition of early sturgeon fry to artificial formulated feeds is one of the most difficult stages of their rearing, even under controlled conditions of RAS. The review contains the description of the peculiarities of sturgeon embryogenesis, their behavior and morpho-physiological changes at this stage of their development. It contains main requirements for the rearing of sturgeon larvae in RAS. We showed that the ultimate refuse from natural (live or frozen) forage organisms is not advisable; the optimum is their combination with artificial feeds with gradual predominance of the latter. We provided the schemes of their feeding based on the combination of natural and artificial feeds. We reviewed the most common biologically active supplements, which contributed to better feed digestion during the periods of the transition to exogenous feeding. We highlighted the effect of feeding with brine shrimp nauplii enriched with polyunsaturated fatty acids on the growth and development of early sturgeon fry.

Practical value. The array of the summarized information will be important for scientists who study the peculiarities of the transition of early sturgeon fry to artificial formulated feeds in RAS. The data on the biotechnologies of rational feeding of early sturgeon fry in RAS in this period are important in the conditions of continuous search for the most effective replacement of live forage organisms and reduction of fish fry mortality in postembryogenesis.

Keywords: sturgeon species (*Acipenseridae*), recirculating aquaculture system (RAS), feeding of early fry, artificial formulated feeds, natural forage organisms, postembryonic life of sturgeon species, transition to exogenous feeding, increase of larvae survivability, biologically active preparations.

ДО 85-РІЧЧЯ ІНСТИТУТУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

О. О. Олексієнко, osipenko59@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

Н. Л. Колесник, kolesnik@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

2015 року виповнилося 85 років з часу заснування Інституту рибного господарства НААН.

Розвиток ставового рибицтва, зокрема коропівництва розпочався в Україні з XIV–XV сторіч, з побудовою спеціальних ставів для утримання і вирощування риби.

У 20-х роках минулого сторіччя постало питання раціонального використання наявного в державі рибогосподарського фонду, а також створення нових рибних господарств для забезпечення потреб населення у повноцінних високобілкових продуктах.

Однак, як показала практика, без науково обґрунтованої системи їх господарювання, використовувались вони малоефективно, тому нагальною потребою було створення в рибній галузі наукової установи.

1 лютого 1930 р. у м. Києві була заснована дослідна станція рибицтва, яка, на підставі Постанови Ради Народних Комісарів УСРР від 3 квітня 1930 р. № 11/664 арт. «Зд» «Про утворення науково-дослідного інституту рибного господарства», була реорганізована з 1 грудня 1930 р. в Київський науково-дослідний інститут рибного господарства.

Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України (ІРГ НААН) — один з найдавніших рибогосподарських науково-дослідних закладів колишнього Радянського Союзу.

До завдань Інституту входило розроблення раціональних методів ведення рибного господарства.

З часу заснування завданнями Інституту було розроблення нових методів ведення рибного господарства, підготовка кадрів, організація державного і кооперативного рибицтва. Діяльність Інституту була спрямована на:

- вивчення стану рибного господарства у ставах, дрібних річках України та торфових кар'єрах для організації рибгоспів в окремих регіонах;
- розроблення питання годівлі риб та використання різних добрив у рибному господарстві;
- організацію та ведення селекційно-племінної роботи з коропом;
- розроблення питань штучного риборозведення;
- розвиток рибогосподарської гідротехніки та меліорації;
- вивчення питань економіки та організації рибного господарства;

© Олексієнко О. О., Колесник Н. Л., 2016

- дослідження проблем профілактики та боротьби з хворобами риб;
- акліматизацію нових видів риб у водоймах України.

В результаті пропаганди завдань рибництва, підготовки кадрів рибоводів, розроблення заходів щодо відтворення рибних запасів у розвитку рибного господарства в довоєнний час було досягнуто значних успіхів.

У роки, які передували Другій світовій війні, Інститут своїми роботами комплексно впливав на весь процес вирощування риби. Завдяки цьому, у багатьох рибних господарствах були досягнуті максимальні виходи риби з гектара ставу.

В результаті підготовки рибоводних кадрів і впровадження розробок Інституту, заходи з відтворення рибних запасів уже в довоєнний час набули значних розмахів.

Друга світова війна перервала роботу Інституту, який був евакуйований на Урал, призвела до руйнування значної кількості ставів, загибелі цінних племінних стад коропа, розповсюдження захворювань риб.

Діяльність Інституту відновилась на початку 1944 р., відповідно до Постанови Раднаркому УСРР від 25 лютого 1944 р., якою йому було присвоєно найменування «Київський науково-дослідний інститут ставового і озерно-річкового рибного господарства».

Напрямок діяльності Інституту протягом 1944–1945 рр. характеризувався відновленням зруйнованого війною ставового господарства: досліджувалися рибницько-технічний та епізоотичний стани ставових господарств, здійснювалося розроблення заходів щодо зміцнення та поліпшення господарств, надавалась практична допомога виробництву у справі налагодження експлуатації ставового фонду та підготовки кадрів.

У цей час до структури Інституту, яка не набула змін порівняно з 1944 р., входили: Львівська рибогосподарська лабораторія, дослідне рибне господарство-лабораторія «Пуца-Водиця» та Київська станція риборозведення.

Протягом п'ятирічки 1946–1950 рр. Інститут проводив дослідження, спрямовані на підвищення продуктивності рибницьких ставів, повніше використання кормових ресурсів рибогосподарських водойм, підняття культури виробництва, селекційно-племінну роботу, спрямовану на виведення кращих порід і видів риб для розведення у ставах, вивчення захворювань риб та розроблення заходів боротьби з ними, раціональне використання сировинної бази внутрішніх водойм.

У подальші роки науково-дослідні роботи Інституту значною мірою сприяли освоєнню рибних багатств Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця. Особливе значення роботи Інституту мали для поліпшення рибного господарства водосховищ дніпровського каскаду. На цих водосховищах були організовані рибні господарства нового типу, що відрізнялися від річкового. Багато уваги приділяв Інститут підвищенню рибопродуктивності найбільш значних водосховищ на Дніпрі — Київського і Кременчуцького.

Вивчаючи і узагальнюючи досягнення вітчизняної і зарубіжної науки, техніки, передового досвіду організації і ведення рибного господарства у

внутрішніх водоймах, Інститут надавав практичну допомогу виробництву в розробленні перспектив розвитку рибного господарства.

Інститутом розроблено та впроваджено метод комплексної інтенсифікації у ставовому рибництві, а також методи застосування у ставах мінеральних добрив і вапна, що дало змогу одержувати рибопродуктивність 2,5–4,5 т/га.

Ученими-селекціонерами Інституту у 50-х роках виведені українська рамчата та українська луската породи коропа, наприкінці 90-х — три їх високопродуктивних внутрішньопорідних типи: нивківський лускатий, любінський лускатий та любінський рамчастий коропа, а в останні роки — малолускатий тип коропа, які збагатили генофонд коропівництва України, Білорусі, Росії тощо. На даний час ведуться роботи з їх удосконалення, а також підготовка до апробації антонінсько-зозуленецьких та несвицьких зональних типів (лускатих і рамчастих форм) з метою затвердження їх у статусі внутрішньопорідних типів.

Інститутом розроблені та впроваджені наукові основи інтродукції у внутрішні водойми України рослиноїдних риб далекосхідного комплексу (білий та строкатий товстолобики, білий амур), а також представників північноамериканської іхтіофауни (веслоніс, буфало, каналний сом); технології вирощування їх у ставах, водоймах-охолоджувачах енергетичних об'єктів та нагулу у великих рівнинних водних об'єктах, що дало змогу довести частку цих об'єктів рибництва у загальному вилові риби до 40%.

Відпрацьована ефективна ресурсоощадна система вирощування рибосадкового матеріалу та товарної риби за різних форм ведення рибництва (випасна, напівінтенсивна, інтенсивна) для господарств різного типу в зональному аспекті з оптимальним набором полікультури риб, а також ефективні рецепти комбікормів для риб, методи їх використання та застосування нетрадиційної сировини для їх виготовлення, рекомендації з раціональної годівлі риб при вирощуванні цюголіток та товарного коропа в умовах промислового рибництва, що широко використовуються виробництвом.

Розроблені технології товарного вирощування веслоноса в ставах різних фізико-географічних зон та рекомендації з його відтворення, технології з відтворення та вирощування цінних безхребетних, промислового культивування річкових раків, методи підвищення біопродукційного потенціалу ставів, товарного осетрівництва та форелівництва, відпрацьовано «модель» одержання потомства піленгаса та технологію його вирощування у полікультурі, рекомендації з формування маточних стад лососевих риб з поліпшеними репродуктивними ознаками.

Виконано дослідження з питань біології, видового різноманіття та поширення річкових раків, а також розроблена біотехніка промислового культивування раків.

Важливу роль відіграють наукові дослідження з питань удосконалення методів рибогосподарського освоєння великих рівнинних водних об'єктів з урахуванням їх сучасного екологічного стану. З метою раціонального використання їх біогеоценозів Інститутом розробляються щорічні прогнози і ліміти вилову риби, які результативно впроваджуються рибогосподарськими організаціями.

Значне місце ученими-екологами Інституту рибного господарства приділяється вивченню екологічного стану і розробленню наукових основ охорони рибогосподарських водойм від забруднення радіонуклідами, важкими металами, токсикантами та органічними забруднювачами, на підставі чого для галузі розроблені нормативи показників якості води, методи її очищення від забруднювачів, технології ведення рибництва у господарствах, що зазнали радіоактивного забруднення. Розроблені науково обґрунтовані методи очищення рибницьких водойм від забруднювачів, спрямовані на одержання екологічно безпечної рибної продукції. Відпрацьовані методи діагностики, профілактики та боротьби з хворобами риб з використанням екологічно безпечних методів, спрямованих на підвищення імунного статусу організму риб та розроблені рекомендації щодо використання в рибництві найбільш ефективних біологічно активних препаратів, щодо застосування оптимальних доз мікроелементів (йоду, кобальту, селену); методи детекції вірусу некрозу зябер з використанням ПЛР-аналізу.

Розроблені науково обґрунтовані методи раціонального використання іхтіофауни дніпровських водосховищ, режими ведення в них рибальства, шляхи підвищення складу іхтіофауни.

Наукові розробки Інституту є промислово застосовними, вони мають широке впровадження в галузі.

Інститут співпрацює з науковими установами 17 країн, є співзасновником Міжнародної ради з водних біоресурсів і аквакультури, з 2004 р. став членом Мережі наукових центрів з аквакультури в країнах Східної та Центральної Європи.

Ученими Інституту розроблені: концепція розвитку рибного господарства України, шляхи підвищення його економічної ефективності, пропозиції щодо реформування галузі у ринковому середовищі, а також низка програм, спрямованих на доведення обсягу вирощування риби у внутрішніх водоймах України до 340 тис. т.

Наукові розробки Інституту знайшли широке застосування у вітчизняному рибництві, а також країнах близького та далекого зарубіжжя, зокрема з селекції, комплексної інтенсифікації у ставовому рибництві, акліматизації нових об'єктів рибництва, екології тощо, ефективно впроваджуючись у рибних господарствах держави, а також зарубіжжя.

Підготовка наукових кадрів в Інституті рибного господарства НААН здійснюється через аспірантуру, яка функціонує з 1959 р. Навчання аспірантів, відповідно до перереєстрації аспірантури Інституту Міністерством освіти і науки України (протокол від 28.02.03 № 112), здійснюється за такими спеціальностями: 03.00.10 — іхтіологія; 06.02.03 — рибництво; 06.02.01 — розведення та селекція тварин.

Щороку в Інституті навчається 17–20 аспірантів. Обсяги набору аспірантів становлять 4–5 чоловік у рік, з них до 50% — з відривом від виробництва.

На базі Інституту щорічно проводиться підготовка не менше 10 дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів вищих закладів освіти аграрного напрямку. Студенти цих навчальних закладів проходять виробничу та

переддипломну практику на базі наукових та виробничих підрозділів Інституту; випускники, які виявили нахил до наукових досліджень, направляються на роботу та до аспірантури Інституту.

Тематика наукових досліджень. Інститутом рибного господарства наукові дослідження виконуються за програмою НААН «Рибництво», низка завдань — за госпугодами з рибогосподарськими та іншими установами. Також Інститут здійснює наукове забезпечення рибогосподарської галузі України у двох основних напрямках, пов'язаних з розробленням науково обґрунтованої системи ведення аквакультури у внутрішніх прісноводних і солонуватоводних водоймах та методів сталого розвитку і раціонального використання біоресурсів водосховищ дніпровського каскаду. Тематика наукових досліджень Інституту рибного господарства є актуальною відповідно до потреб рибогосподарської галузі.

На перспективу пошукові дослідження ведуться за пріоритетними для рибогосподарської галузі напрямками, пов'язаними з розробленням теоретичних основ ведення аквакультури у водоймах України на основі вивчення їх біопродукційного потенціалу; розроблення селекційно-генетичних основ поліпшення господарсько цінних ознак генофонду об'єктів розведення з використанням молекулярно-генетичних методів та сучасних кріобіотехнологій, методики збереження на поліпшення генофонду цінних об'єктів рибництва, рідкісних та зникаючих видів риб; екологічно та економічно доцільних методів поліпшення стану біоценозів внутрішніх водойм, а також ранньої діагностики, профілактики та боротьби з хворобами риб на молекулярно-генетичному рівні; методів забезпечення сталого використання біоресурсів та збереження біорізноманіття басейну Дніпра; нових економічних моделей господарювання у рибних господарствах різних форм власності.

Дослідні господарства Інституту є основною експериментальною базою установи та місцем виробничої перевірки результатів наукових експериментів з питань профілактики та боротьби із захворюваннями риб, відпрацювання заходів поліпшення екологічного стану ставів, випробовування селекційних досягнень, нових рецептів рибних комбікормів та методів стимулювання інтенсивності перебігу біопродукційних процесів в екосистемах водойм.

ЛЮБІ ЖІНКИ!

Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового
весняного свята — 8 березня!

*Все найсвітліше, що є у нашому житті — весна,
радість, щастя, кохання, пов'язане з Жінкою —
берегинею роду людського.*

*Бажаємо вам міцного здоров'я, великого жіночого
щастя, добра, любові. Нехай у вашому домі панують
спокій та добробут, а ваші серця будуть зігріті
теплом та повагою рідних і близьких.*

Зі святом Весни вас!

FISHERIES SCIENCE OF UKRAINE

"Fisheries Science of Ukraine" – a scientific journal, has been published in Ukraine since 2007. "Fisheries Science of Ukraine" included in the List of Specialized Publications of Ukraine, which can be used for publishing results of doctor's and candidate's thesis (biological and agricultural sciences), was approved in 08.07.2009, recertification of 06.11.2014 (Ministry of Education and Science of Ukraine №1279)

Founder and publisher of the journal – Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

State registration certificate KB № 20934-10734 PR of 18.08.2014

EDITOR-IN-CHIEF

Ihor Hrytsyniak, Doctor of Sciences, Professor, Academician of the NAAS of Ukraine, Director, Institute of Fisheries of the NAAS

DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF

Oleksandr Tretiak, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Deputy Director in scientific works, Institute of Fisheries of the NAAS

Natalia Kolesnyk, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Department of International Scientific and Technical Collaboration and Intellectual Property, Institute of Fisheries of the NAAS

EDITORIAL BOARD

BIOLOGICAL SCIENCES

Vasyl Sondak, Doctor of Sciences, Head of "Water Bioresources", National University of Water Management and Natural Resources, UKRAINE

Oleksandr Litvinenko, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director General, Federal State Unitary Enterprise "Gosrybtsentr", RUSSIA

Oleksandr Potrokhov, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Biology of reproduction of fish, Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, UKRAINE

Leonid Buchatskyi, Doctor of Sciences, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Leading Research Scientist of the Laboratory of Biotechnologies in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Ihor Buzevych, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Division of Reservoir Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Valentyna Solomatina, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Leading research scientist of the department of feeds and fish feeding, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

AGRICULTURAL SCIENCES

Jedrzey Krupinski, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director, National Research Institute of Animal Production, POLAND

Mykhailo Efymenko, Doctor of Sciences, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head Research Scientist, Institute of Animal Breeding and Genetics of the NAAS, UKRAINE

Serhiy Tarasiuk, Doctor of Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head of the Molecular-Genetic Research Department, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Ryszard Kolman, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Ichthyology Department, The Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute in Olsztyn, POLAND

Vitaliy Bekh, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Fish Selection Department, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Isaak Sherman, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Aquaculture Department, Kherson State Agrarian University, UKRAINE

Oleksandr Kostenko, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Veterinary Medicine and Zootechnics Department, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, UKRAINE

SCIENTIFIC EDITORS OF SECTIONS

are staff employees of the Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine: **Natalia Tushnyska**, PhD, Senior Research Scientist, Academic Secretary of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Deren**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Fish Feed and Feeding Department of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yaroslav Tuchapskyi**, PhD, Head of the Carp Breeding Laboratory of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Zaloilo**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Molecular-Genetic Research Laboratory of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Zabytivskyi**, PhD, Deputy Director of Lviv Research Station of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Anatoliy Melnyk**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Ecological Research Laboratory of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Antonina Mruk**, Head of the Salmon Culture and Endangered Fish Propagation Laboratory of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Tetiana Hryhorenko**, PhD, Head of the Laboratory of Hydrobiology and Valuable Invertebrate Cultivation Technologies of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Rud'**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Biotechnologies in Aquaculture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Natalia Matvienko**, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Ichthyopathology Department of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Oleksandr Didenko**, PhD, Senior Research Scientist of the Division of Reservoir Bioresources of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Viktor Chernik**, Head of the Laboratory of Management in Aquaculture of the Institute of Fisheries of the NAAS

Editorial board of the Journal "Fisheries Science of Ukraine", Institute of Fisheries NAAS, 135, Obukhivska St, Kiev-164, Ukraine, 03164; tel.: +38 (044) 223-84-34; tel/fax: +38 (044) 423-74-62

<http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Layout design: Natalia Kolesnik, Serhiy Shinkar, Oleksandr Bezusyi; **Making-up:** Maria Simon, Yevheniy Arkhanhelskyi;

Literature editing: Oleksandr Oleksiienko, Tetiana Shvets; **Correctors:** Inna Liutkevych; **Typing:** Hanna Kovalchuk

ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НААН
вул. Обухівська, 135 м. Київ-164, 03164, Україна
тел.: +38(044) 223-84-34, тел./факс: +38(044) 423-74-62

<http://fsu.ua>

info@fsu.ua