ISSN 2312-9581 (Online)

ISSN 2075-1508 (Print)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

4 / 2016

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські науки), переатестація від 06.11.2014 (наказ Міністерства освіти і науки України №1279)

Засновник та видавник — Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20934-10734 ПР від 18.08.2014

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ГРИЦІНЯК Ігор Іванович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, директор Інституту рибного господарства НААН

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ТРЕТЯК Олександр Михайлович, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН

КОЛЕСНИК Наталія Леонідівна, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності, Інститут рибного господарства НААН

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Гомельський Борис, доктор біол. наук, професор, Державний Університет Кентуккі, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Патрік Даніель, доктор біол. наук, Голова департаменту біології Лабораторії Піренеїв, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА

Зодапе Гаутам В., доктор біол. наук, професор, декан факультету зоології Державного Університету Шиваджи в Колхатурі, РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ

Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, зав. кафедрою водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА

Литвиненко Олександр Іванович, доктор біол. наук, іноземний член Національної академії аграрних наук України, генеральний директор, Федеральне державне унітарне підприємство «Госрыбцентр», Росія

Потрохов Олександр Спиридонович, доктор біол. наук, с.н.с., керівник лабораторії біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, УКРАЇНА

Бучацький Леонід Петрович, доктор біол. наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), провідний науковий співробітник лабораторії біотехнологій в рибицтві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Бұзевіч Ігор Юрійович, доктор біол. наук, с.н.с., завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Соломатіна Валентина Дмитрівна, доктор біол. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник відділу кормів та годівлі риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Ху Пао, доктор наук, професор, директор Центру прісноводного рибного господарства, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

Крупінський Єджей, доктор наук, професор, іноземний член Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут зоотехнії Польщі, ПОЛЬЩА

Єфименко Михайло Якович, доктор с.-г. наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник, Інститут розведення і генетики тварин НААН, УКРАЇНА

Тарасюк Сергій Іванович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, зав. відділу молекулярно-генетичних досліджень, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Кольман Ришард, доктор наук, професор, зав. відділу іхтіології, Інститут прісноводного рибного господарства ім. Станіслава Саковича, ПОЛЬЩА

Бех Віталій Валерійович, доктор с.-г. наук, професор, зав. відділу селекції риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Шерман Ісаак Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедри рибицтва, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

Костенко Олександр Іванович, канд. с.-г. наук, с.н.с., нач. відділу ветеринарної медицини та зоотехнії, Національна академія аграрних наук України, УКРАЇНА

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

є штатними працівниками Інституту рибного господарства НААН України: **Тушницька Наталія Йосифівна**, канд. ветерин. наук, с.н.с., вчений секретар ІРГ НААН; **Дерень Ольга Володимирівна**, канд. с.-г. наук, с.н.с., зав. лабораторії кормів і годівлі риб ІРГ НААН; **Тучапський Ярослав Васильович**, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу селекції риб ІРГ НААН; **Залоїло Ольга Василівна**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ІРГ НААН; **Забитівський Юрій Михайлович**, канд. біол. наук, старший науковий співробітник сектору осетрівництва ІРГ НААН; **Мельник Анатолій Пилипович**, канд. хім. наук, с.н.с., зав. лабораторії екологічних досліджень ІРГ НААН; **Мрук Антоніна Іванівна**, зав. лабораторії лососівництва ІРГ НААН; **Григоренко Тетяна Володимирівна**, канд. с.-г. наук, зав. лабораторії гідробіології та технологій культивування цінних безхребетних ІРГ НААН; **Рудь Юрій Петрович**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії біотехнологій в рибицтві ІРГ НААН; **Матвієнко Наталія Миколаївна**, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу іхтіопатології ІРГ НААН; **Діденко Олександр Володимирович**, канд. біол. наук, с.н.с., старший науковий співробітник відділу вивчення біоресурсів водосховищ; **Чернік Віктор Васильович**, зав. лабораторії менеджменту в рибицтві ІРГ НААН

Редакція журналу «Рибогосподарська наука України», вул. Обухівська, 135, м. Київ-164, 03164

тел.: +38 (044) 223-84-34, тел./факс: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Підписано до друку 05.12.2016 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 7,1. Наклад 500 прим.

Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту рибного господарства НААН (Протокол від 06.12.2016 р. № 10)

Дизайн макету: Колесник Н. Л., Шинкар С. В., Безусий О. Л. **Верстка:** Симон М. Ю., Архангельський Є. Ю. **Літературне редагування:** Олексієнко О. О., Швець Т. М. **Коректори:** Люткевич І. С. **Комп'ютерний набір:** Ковальчук Г. В.

Друкарня «Спектр Друк», вул. М. Раскової, 23 А, Київ-002, 02002, тел.: +38 (044) 331-14-38

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

4/2016(38)

Заснований у 2007 р.
Виходить 4 рази на рік

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 1-156
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04>

З М І С Т

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 7-15
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.007>

- І. Л. Захарченко, В. О. Литвиненко, С. В. Курганський*
Біологічна характеристика плоскирки (*Blicca bjoerkna*) як об'єкта
промислового рибальства у Київському водосховищі 7

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 16-24
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.016>

- Л. П. Драган, Н. Г. Михайленко А. М. Базаєва,
К. Є. Королюк, Ю. П. Рудь, Л. П. Бучацький*
Корекція альгоценозу препаратом «Комплезим» у ставках
дослідного господарства «Нивка» 16

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 25-34
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.025>

- О. А. Бузевич, С. М. Прокопенко*
Структурні показники популяції судака (*Sander lucioperca*)
Київського водосховища 25

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 35-41
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.035>

- М. В. Старко*
Розрахунок екологічної місткості водойм-охолоджувачів
для садкового рибництва 35

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 42-51
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.042>

- Н. І. Цьонь, О. М. Ковальчук, Н. Й. Тушиницька,
О. Я. Думич, Б. Г. Сярий, Р. І. Пірус*
Дослідження гострої токсичності нового добрива «Rost-концентрат»
на гідробіонтів *Cyprinus carpio* L. і *Daphnia magna* Straus 42

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 52-63
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.052>

- С. М. Снігірьов*
Динаміка та структура уловів оселедця чорноморсько-азовського (*Alosa
immaculata* Bennett, 1835) в Дністровському лимані за 1994–2016 рр. 52

© Інститут рибного господарства НААН України, 2016

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 64-75 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.064	
К. М. Гейна Морфологічні особливості, вікова структура та темп росту краснопірки (<i>Scardinius erythrophthalmus</i> L., 1758) Дніпровсько-Бузької гирлової системи.	64
Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 76-94 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.076	
С. В. Кружиліна, О. В. Діденко, І. Й. Великопольський Кормова база та особливості живлення струмкової, райдужної форелей та харіуса на різних біотопах річки Шипіт Закарпатського регіону	76
ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ	
Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 95-102 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.095	
В. В. Гурбик Зимостійкість цьоголіток галицького коропа у ставових умовах Прикарпаття	95
СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ	
Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 103-112 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.103	
А. Ю. Пуговкін, Є. Ф. Копецька, К. Б. Міксон, В. О. Черепнін, І. І. Грициняк Дослідження осмотичної чутливості сперматозоїдів щуки (<i>Esox lucius</i> L., 1758) для оптимізації їх кріоконсервування	103
Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 113-122 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.113	
А. Е. Маріуца, С. І. Тарасюк, І. І. Грициняк Аналіз генетичної структури окремих типів українського лускатого коропа	113
Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 123-130 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.123	
О. О. Малишева, К. І. Мошнягул, Л. М. Шинкаренко, І. В. Андрєєв, В. Г. Спиридонов Внутрішньовидовий поліморфізм мікросателітної ДНК російського осетра (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i> Brandt)	123
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО	
Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 131-153 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.131	
М. Ю. Симон Особливості окисних процесів у осетрових видів риб (<i>Acipenseridae</i>) (огляд)	131
ХРОНІКА	
Вчений, фахівець рибної галузі. До 115-ї річниці від дня народження Хомчука Андрія Якимовича	154

СОДЕРЖАНИЕ

БИОРЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ ВОДОЕМОВ

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 7-15
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.007>

- И. Л. Захарченко, В. А. Литвиненко, С. В. Курганский
Биологическая характеристика густеры (*Blicca bjoerkna*)
как объекта промыслового рыболовства в Киевском водохранилище 7

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 16-24
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.016>

- Л. П. Драган, Н. Г. Михайленко, А. Н. Базаева,
К. Е. Королюк, Ю. П. Рудь, Л. П. Бучацкий
Коррекция альгоценоза препаратом «Комплезим»
в прудах опытного хозяйства «Нивка» 16

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 25-34
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.025>

- О. А. Бузевич, С. Н. Прокопенко
Структурные показатели популяции судака (*Sander lucioperca*)
Киевского водохранилища 25

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 35-41
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.035>

- Н. В. Старко
Расчет экологической емкости водоемов-охладителей для садкового рыбоводства 35

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 42-51
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.042>

- Н. И. Цюнь, А. Н. Ковальчук, Н. И. Тушницкая,
О. Я. Думич, Б. Г. Сярый, Р. И. Пирус
Исследование острой токсичности нового удобрения «Rost-концентрат»
на гидробионтов *Cyprinus carpio* L. и *Daphnia magna* Straus 42

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 52-63
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.052>

- С. М. Снугирев
Динамика и структура уловов сельди черноморско-азовской (*Alosa immaculata* Bennett, 1835) в Днестровском лимане за 1994–2016 гг. 52

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 64-75
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.064>

- К. Н. Гейна
Морфологические особенности, возрастная структура и темп роста красноперки
(*Scardinius erythrophthalmus* L., 1758) Днепровско-Бугской устьевой системы 64

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 76-94
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.076>

- С. В. Кружилина, А. В. Диденко, И. И. Великопольский
Кормовая база и особенности питания ручьевой и радужной форелей
и хариуса на разных биотопах реки Шипот Закарпатского региона 76

ТЕХНОЛОГИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ

Ribogospod. Nauka Ukr., 2016; 4(38): 95-102
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.095>

- В. В. Гурбик
Зимостойкость сеголеток галицийского карпа в прудовых условиях Прикарпатья 95

СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 103-112

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.103>А. Ю. Пуговкин, Е. Ф. Копейка, К. Б. Миксон,
В. А. Черепнин, И. И. ГрицинякИсследование осмотической чувствительности сперматозоидов щуки
(*Esox lucius* L., 1758) для оптимизации их криоконсервирования..... 103

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 113-122

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.113>

А. Э. Мариуца, С. И. Тарасюк, И. И. Грициняк

Анализ генетической структуры отдельных типов украинского
чешуйчатого карпа..... 113

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 123-130

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.123>О. А. Малышева, К. И. Мошнягул, Л. Н. Шинкаренко,
И. В. Андреев, В. Г. СпиридоновВнутривидовой полиморфизм микросателлитной ДНК
русского осетра (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt)..... 123

СТРАНИЦА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 131-153

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.131>

М. Ю. Симон

Особенности окислительных процессов у осетровых видов рыб
(*Acipenseridae*) (обзор)..... 131

ХРОНИКА

Ученый, специалист рыбной отрасли.

К 115-й годовщине со дня рождения Хомчука Андрея Якимовича..... 154

CONTENTS

BIORESOURCES AND ECOLOGY OF WATER BODIES

- Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 7-15
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.007>
I. Zakharchenko, V. Lytvynenko, S. Kurganskiy
Biological characteristics of silver bream (*Blicca bjoerkna*) in commercial fishery in the Kyiv reservoir..... 7
- Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 16-24
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.016>
L. Dragan, N. Mikhaylenko, A. Bazaeva, K. Korolyuk, Yu. Rud, L. Buchatsky
Correction of algocenosis by the preparation of komplezim in experimental ponds of fish-farm Nyvka..... 16
- Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 25-34
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.025>
O. Buzevych, S. Prokopenko
Structural parameters of pikeperch (*Sander lucioperca*) population of the Kyiv reservoir..... 25
- Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 35-41
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.035>
N. Starco
Calculation of the environmental capacity of cooling ponds for cage fish farming..... 35
- Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 42-51
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.042>
N. Tson, A. Kovalchuk, N. Tushnytska, O. Dumych, B. Syaryy, R. Pirus
Research of acute influence of new fertilizer «Rost-concentrate» on the hydrobionts *Cyprinus carpio* L. and *Daphnia magna* Straus 42
- Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 52-63
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.052>
S. Snigirov
Dynamics and structure of the herring (*Alosa immaculata*) catches in the Dniester estuary during the 1994–2016 years 52
- Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 64-75
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.064>
K. Heina
Morphological peculiarities, age structure and growth rate of rudd (*Scardinius erythrophthalmus* L., 1758) of the Dnieper-Bug estuary system..... 64
- Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 76-94
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.076>
S. Kruzhylina, O. Didenko, I. Velykopolskyi
Food resources and trophic relationships of brown, rainbow trout and european grayling in different habitats of Shypit river of the Transcarpathian region..... 76
- TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE**
- Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 95-102
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.095>
V. Gurbyk
Winter hardiness of galician carp fingerlings in pond conditions of Subcarpathia..... 95

SELECTION, GENETICS AND BIOTECHNOLOGY

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 103-112

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.103>

- A. Puhovkin, E. Kopeika, K. Mikson, V. Cherepnin, I. Hrytsyniak*
A study of the osmotic sensitivity of pike (*Esox lucius*, L., 1758) spermatozoa
for the optimization of their cryopreservation **103**

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 113-122

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.113>

- A. Mariutsa, S. Tarasjuk, I. Hrytsyniak*
Analysis of the genetic structure of certain types of scaled carp **113**

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 123-130

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.123>

- O. Malysheva, K. Moshnjagul, L. Shynkarenko, I. Andrieiev, V. Spyrydonov*
Intraspecific polymorphism of microsatellite DNA of russian sturgeon
(*Acipenser gueldenstaedtii*, Brandt) **123**

YOUNG SCIENTIST PAGE

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 131-153

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.131>

- M. Simon*
Features digestion of sturgeon species (acipenseridae) (review) **131**

CHRONICLE

- Scientist, specialist of fishing industry. To the 115th anniversary of Khomchuk
Andrii Yakymovych **154**

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 7-15
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.007>
UDK 597.554.3:639.215.43(282.247.323)

BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SILVER BREAM (*BLICCA BJOERKNA*) IN COMMERCIAL FISHERY IN THE KYIV RESERVOIR

I. Zakharchenko, ari_z@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

V. Lytvynenko, darg@darg.gov.ua, State Agency of Fisheries of Ukraine, Kyiv

S. Kurganskiy, skurgansky@yandex.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. The determination and analysis of main biological characteristics of silver bream from the point of view of the formation and exploitation of its commercial stock in the Kyiv reservoir.

Methodology. The work is based the results of monitoring field studies carried out on the Kyiv reservoir during 2012–2014. Ichthyological materials were collected from standard commercial gill nets with mesh sizes of 30–80 mm, which were set in different habitats and depths of the reservoir. Collection and processing of samples was carried out using conventional ichthyological methods adapted for the Dnieper reservoirs.

Findings. According to the data of monitoring gill nets, silver bream population in 2014 was composed of 10 age groups. The majority of their population (70.8%) in catches was composed of age-5 to age-7 fish, i.e. the number of modal classes increased due to the right wing of the older age groups. The frequency distribution of silver bream had a shape of a curve with wide, however broken (due to the reduction in age-5 fish) peak and gradual decrease. Age-length properties, fatness parameters and condition factor of silver bream in the Kiev reservoir during last years remained on the stable high level indicating on favorable fattening conditions and forming the ichthyomass of this species.

At the present time, silver bream of the Kyiv reservoir formed a commercial stock with such qualitative and quantitative characteristics, which allow exploiting it in the mode of traditional commercial harvest and specialized harvest of silver bream concentrations with the use of gill nets with mesh sizes of 50, 60 mm.

Originality. We obtained and analyzed the new data on the current state of silver bream (*Blicca bjoerkna*) in Kyiv reservoir as an important element of commercial fish production.

Practical value. The results of the work allows increasing qualitative and quantitative characteristics of silver bream catches and will be used for the preparation of commercial fishery regime for the Kyiv reservoir.

Keywords: Kyiv reservoir, Silver bream (*Blicca bjoerkna*), age structure, fish stock, commercial harvest.

PROBLEM STATEMENT AND ANALYSIS OF LAST ACHIEVEMENTS AND PUBLICATIONS

Ukraine has a significant fund of inland fishery water bodies with developed fish fauna, quantitative and qualitative parameters of which indicate on the possibility of their rational fishery exploitation [1, 2]. According to current legal and regulatory framework, all inland water bodies of Ukraine of national importance belong to the category of commercial areas of fishery water bodies that supposes their special status

© I. Zakharchenko, V. Lytvynenko, S. Kurganskiy, 2016

regarding the provision of favorable conditions for forming resources for commercial fishery. At the same time, large reservoirs were in fact multi-purpose water bodies, the diversified fishery exploitation of which is a potent factor defining the direction and intensity of successive processes in them. In this context, the conditions for forming the population of commercial valuable species (which are characterized by increased requirements to the quality of environment) can be estimated as unfavorable that can significantly affect the qualitative and quantitative parameters of commercial catches [2–4].

During a sufficiently long period, fishery regulations in the Dnieper reservoirs were aimed at ensuring the restoration and maintenance of the stocks of major, the most valuable commercial species. However, current conditions of the reorganization of commercial fishery due to political and socioeconomic changes in Ukraine against the background of the stress state of the stocks of traditional species of commercial fishery requires the development of a multi-species commercial fishery with the involvement of the entire fish fauna to commercial fish harvest. Intensification of the exploitation of the stocks of alternative species, except ensuring the maximum yield, allows partially reducing the fishery press on fish populations, which are in non-stable state [5, 6].

Fisheries management including such strategies as commercial fishery, recreational fishery, and fish stocking can have effects on the processes of species succession by selective harvest of abundant cyprinids in the combination with intensive stocking with piscivorous fishes and implementation of measures on their protection for creating more stable multiple-species ichthyocenoses [2, 7].

Fishery exploitation of the Kyiv reservoir has been carried out practically during the entire period of its existence according the standard scheme: rare stockings, local amelioration activities and large-scale commercial fish harvest [7, 8]. In this case, the commercial harvest in the Kyiv reservoir is based on natural reproduction in a higher degree than in other reservoirs of the cascade, i.e. native fish populations are characterized by an increased level of elimination [2]. This situation becomes complicated for silver bream because its commercial harvest depends in a high degree from the use of partially allowed fishing gears that results in an additional necessity in the detailed study of commercial and biological characteristics of this species.

HIGHLIGHT OF THE EARLIER UNRESOLVED PARTS OF THE GENERAL PROBLEM. AIM OF THE STUDY

Last years, studies of fish fauna of the Kyiv reservoir have been carried out mainly in general resource aspect without taking into account individual species [9, 10]. Purely ichthyological works regarding the Kyiv reservoir have not been defended for more than a 30-year period, while the majority of studies were focused on radioecological and hydrobiological characteristics of this water body. An analysis of available publications indicates on the absence of special studies on the biological state of silver bream populations in the Kyiv reservoir, i.e. the state of knowledge on this species is currently insufficient.

Accordingly, there is a need in the studies of silver bream populations of the Kyiv reservoir from the point of view of its current biological state and conditions of the

formation of its commercial stock as well as scientific justification of measures aimed at its rational exploitation within the concept of balanced natural resource use.

MATERIALS AND METHODS

The work is based the results of monitoring field studies carried out on the Kyiv reservoir during 2012–2014. Ichthyological materials were collected from standard commercial gill nets with mesh sizes of 30, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 mm, lengths of 70 m, heights of 1–4 m, which were set in different habitats and depths of the reservoir. In total, during the study period, catches from 3.05 thousand net-days and 42.7 thousand fish of different species were analyzed. Amounts of commercial catches were determined based on the data of official fishery statistics of the State Agency of Fisheries of Ukraine. Collection and processing of samples was carried out using conventional ichthyological methods adapted for the Dnieper reservoirs [10, 11]. Statistical data processing was carried in MS Excel.

STUDY RESULTS AND THEIR DISCUSSION

The commercial catch dynamics in the Kyiv reservoir during last 10 years was characterized by a stable growth (with some decrease in 2013) (Fig. 1). In 2014, commercial landings reached 900 tons that was significantly higher of the average annual value for 2001–2010 (550 tons). This 15% increase in catches was due to silver bream (*Blicca bjoerkna*), which is currently the first most abundant species in commercial fishery in the Kyiv reservoir by weight. The total share of valuable large size fish species in the increase in commercial fish productivity was 13.4% that taking into account their specific stock is a high enough value.

Figure 1. Commercial catch dynamics in the Kyiv reservoir

Fish productivity in the Kyiv reservoir during last years increased to the level, which corresponded to the mean level for all Dnieper reservoirs. However, it is necessary to note that the technical intensity of fish harvest in the Kiev reservoir is characterized by certain stability — the number of officially allowed commercial gill nets ranged within 4.2–5.0 thousand nets during last 10 years.

Currently, 15 fish species have commercial value in the Kyiv reservoir and seven of them are considered highly valuable. The majority of 30–40 mm gill net catches in 2014 was composed of silver bream (28.3% by number and 26.9% by weight), roach (*Rutilus rutilus*) (22.2% and 22.0%, respectively), and blue bream (*Abramis ballerus*) (24.7% and 18.5%, respectively). In 50–60 mm gill nets, the most abundant were roach (18.8% by number and 26.3% by weight), silver bream (16.8% and 11.6%, respectively) and bream (*Abramis brama*) (14.6% and 18.0%, respectively). The majority of catches in large mesh gill nets was composed of bream (53.5% by number and 54.4% by weight), pikeperch (*Sander lucioperca*) (22.2% and 22.0%, respectively) and European catfish (*Silurus glanis*) (4.8% and 17.7%, respectively).

Thus, silver bream form a significant segment of fishery resources, which is accessible for effective fish harvest with 50 mm mesh gill nets and which can be considered as optimal for harvesting small sized fish in the Kyiv reservoir. A decrease in the fishing pressure on middle age groups (due to the limitation of the use of gill nets with mesh sizes below 50 mm) will ensure a more complete filling of the right wing of the frequency distribution for silver bream that will create prerequisites for harvesting this species with gill nets with a mesh size of 60 mm. E.g., mean length of silver bream in gill nets with a mesh size of 40 mm is 20.0 ± 1.3 cm, in 50 mm gill nets – 23.1 ± 1.5 cm; in 60 mm gill nets — 25.3 ± 1.5 cm.

According to the data of monitoring gill nets, silver bream population in 2014 was composed of 10 age groups with maximum age of 12 years. The majority of their population (70.8%) in catches was composed of age-5 to age-7 fish with the length of 17–24 cm, i.e. the number of modal classes increased due to the right wing of the frequency distribution.

A positive trend of the optimization of the age structure of silver bream population, which was noted in 2012–2013, is also observed in the current year — the frequency distribution of silver bream had a shape of a curve with wide, however broken (due to the reduction in age-5 fish) peak and gradual decrease (Fig. 2).

Figure 2. Catches of silver bream in monitoring gill nets in the Kyiv reservoir, 2014

The share of older age groups was high enough — 11.9% that taking into account a sharp increase in gill net catches per unit effort indicates on normal conditions for forming and exploiting the most productive age-length groups. The share of younger age groups in 2014 composed 17.3% that caused a certain increase in the average weighted age to 6.0 years (versus 3.9 years in 2012), i.e. the structural parameters of silver bream population became typical for this species in the Kyiv reservoir.

Age-length properties, fatness parameters and condition factor of silver bream in the Kyiv reservoir during last years remained on the stable high level indicating on favorable fattening conditions and forming the ichthyomass of this species (Table 1).

Table 1. Age-length parameters of modal age groups of silver bream in the Kyiv reservoir (average for 2012–2014)

Parameter	Age classes, years				
	4	5	6	7	8
Length, cm	17.3±0.6	19.4±0.9	20.9±1.1	22.3±0.8	24.2±0.5
Weight, g	132±19	180±21	219±37	284±41	351±32
Fulton's condition factor	2.59	2.45	2.40	2.57	2.49

The absolute catch of silver bream per unit effort in monitoring gill nets in 2014 increased compared to previous years up to 5169 fish (1300 kg) versus 2517 fish (809 kg) mainly due to gill nets with mesh size of 40 mm that also indicates on an increase in the number of the generations, which entered the commercial stock.

The majority of silver bream by number (68.2%) and by weight (65.2%) in 2014 were caught by 36–40 mm gill nets, i.e. the majority of ichthyomass was formed by age-length groups, which will be fully accessible for commercial harvest in 2015. High absolute parameters of catches in this gill nets indicate on the possibility (if maintained during 2014) of forming the sufficient stock of average age groups of this species, which can be effectively harvested with the traditional scheme of commercial fishery. High enough parameters of specific catch in gill nets with mesh size of 50 mm and higher (19.5% in 2014 of the total catch weight) indicate on the presence of certain reserves for fish harvest by large mesh size gill nets, however, the same as in previous years, silver bream were not recorded at all in gill nets with mesh sizes larger than 70 mm. Taking into account the characteristics of fishing gears allowed for fish harvest in the Kyiv reservoir (gill nets with mesh sizes of 36–48 mm and >70 mm), a conclusion on high selectivity of middle age groups (age-5–6) can be drawn. This cannot be considered as rational from the point of view of the rational use of aquatic living resources because the maximum yield per recruit (with average natural mortality $M=0.27$) corresponds to the beginning of intensive commercial exploitation of silver bream starting from the age-7–8. Accordingly, for increasing the efficiency of silver bream harvest, it is advisable to use locally the gill nets with mesh size of 50–60 mm, which can catch older age groups of this species. In the conditions of fixed fishing limit it will contribute to a reduction in the number of fish caught with significant improvement of qualitative characteristics of fish catches (average weight of silver bream in 36–40 mm gill net catches is 210 g, in 50–60 mm gill net catches — 377 g). In addition, the actual average number of spawnings of silver bream is 2.1, while if the fishing pressure is shifted to age-7–9, this number can increase to 4.0.

Thus, at the present time, silver bream of the Kyiv reservoir formed a commercial stock with such qualitative and quantitative characteristics, which allow exploiting it in the mode of traditional commercial harvest of small sized species. At the same time, for ensuring the maximum efficiency of commercial harvest it is necessary to provide the possibility for implementing (upon condition of preventing the negative effect on younger age groups of other species) the specialized harvest of silver bream concentrations with the use of gill nets with mesh sizes of 50, 60 mm.

CONCLUSION AND PERSPECTIVES OF FURTHER DEVELOPMENT

Silver bream is currently the main commercial species on the Kyiv reservoir, which ensures 20.9% of the total annual catch.

According to the data of monitoring gill nets, silver bream population in 2014 was composed of 10 age groups. The structural population indices of the silver bream of the Kyiv reservoir are characterized by significant improvement, in particular by an increase in the share of middle and elder age groups against the background of their stably high total number.

Age-length properties, fatness parameters and condition factor of silver bream in the Kyiv reservoir during last years remained on the stable high level indicating on favorable fattening conditions and forming the ichthyomass of this species.

Currently, silver bream of the Kyiv reservoir formed a commercial stock with qualitative and quantitative characteristics, which allow exploiting it in the mode of traditional commercial harvest and specialized harvest of silver bream concentrations with the use of gill nets with mesh sizes of 50, 60 mm.

In the conditions of the reorganization of commercial fish harvest on the Kyiv reservoir with further limitation of the application of small mesh size gill nets, a promising trend in the studies is an analysis of the reaction of silver bream population on the transfer of fishing pressure to the right wing of the frequency distribution with the determination of biological and fishery aspects of such type of harvest regime.

BIBLIOGRAPHY

1. Гринжевський М. В. Аквакультура України (організаційно-економічні аспекти) / Гринжевський М. В. — Львів : Вільна Україна, 1998. — 365 с.
2. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи рибогосподарського використання промислової іхтіофауни великих рівнинних водосховищ України: дис. ... доктора біол. Наук : 03.00.10 / Бузевич Ігор Юрійович. — К., 2012. — 297 с.
3. Козлов В. И. Экологическое прогнозирование ихтиофауны пресных вод / Козлов В. И. — М., 1993. — 251 с.
4. Многолетние изменения и проблемы сохранения видового разнообразия рыб бассейна Днепра на примере Каховского водохранилища / А. Я. Щербуха, П. Г. Шевченко, Н. В. Коваль [и др.] // Вестник зоологии. — 1995. — № 1. — С. 22—32.
5. Тюрин П. В. Биологические обоснования регулирования рыболовства на внутренних водоемах / Тюрин П. В. — М. : Пищепромиздат, 1963. — 119 с.
6. Haynes D. B. Natural lakes and large impoundments / Haynes D. B., Taylor W. W., Soranno P. A. // Inland Fisheries management in North America. — [2nd edition]. — American Fisheries Society, Bethesda, Maryland, 1999. — P. 589—621.

7. Вятчанина Л. И. Рыбохозяйственное освоение каскада днепровских водохранилищ и пути повышения их рыбопродуктивности / Л. И. Вятчанина // Рыбное хозяйство. — 1980. — Вып. 31. — С. 3—9.
8. Вивчити механізми функціонування біогеоценозів внутрішніх водних об'єктів України загальнодержавного значення : звіт по НДР (заключний 2006–2010 рр.) : № ДР 0110U002811 / ІРГ УААН. — К., 2010. — 368 с.
9. Курганський С. В. Сучасний стан промислової іхтіофауни Київського водосховища та оцінка наслідків екстремальної зими 2010 року / С. В. Курганський, О. А. Бузевич // Рибогосподарська наука України. — 2010. — № 4. — С. 58—65.
10. Курганський С. В. Стан запасів другорядних промислових видів риб Київського водосховища / С. В. Курганський, О. А. Бузевич, Н. Я. Рудик-Леуська // Наукові доповіді НУБіПУ. — 2014. — № 7 (49). — С. 1—15.
11. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України, № 166 від 15.12.98. — К. : ІРГ УААН, 1998. — 47 с.
12. Юдович Ю. Б. Методика прогнозирования вылова рыбы в озерах, реках и водохранилищах / Юдович Ю. Б., Доценко Б. Н., Антонюк А. В. — М. : ВНИИПРХ, 1982. — 46 с.

REFERENCES

1. Hrynzhhevskyi, M. V. (1998). *Akvakultura Ukrainy (orhanizatsiino-ekonomichni aspekty)*. Lviv : Vilna Ukraina.
2. Buzevych, I. Iu. (2012). Stan ta perspektyvy rybohospodarskoho vykorystannia promyslovoi ikhtiofauny velykykh rivnyynykh vodoshkovysshch Ukrainy. *Doctor's thesis*. Kyiv.
3. Kozlov, V. I. (1993). *Ekologicheskoe prognozirovanie ikhtiofauny presnykh vod*. Moskva.
4. Shcherbukha, A. Ya., Shevchenko, P. G., Koval', N. V., Dyachuk, I. E., & Kolesnikov, V. N. (1995). Mnogoletnie izmeneniya i problemy sokhraneniya vidovogo raznoobraziya ryb basseyna Dnepra na primere Kakhovskogo vodokhranilishcha. *Vestnik zoologii*, 1, 22-32.
5. Tyurin, P. V. (1963). *Biologicheskie obosnovaniya regulirovaniya rybolovstva na vnutrennikh vodoemakh*. Moskva : Pishchepromizdat.
6. Haynes, D. B., Taylor, W. W., & Soranno, P. A. (1999). Natural lakes and large impoundments. Kohler, C. C., & Hubert, W. A. (Eds.). *Inland Fisheries management in North America*. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland, 589-621.
7. Vyatchanina, L. I. (1980). Rybokhozyaystvennoe osvoenie kaskada dneprovskikh vodokhranilishch i puti povysheniya ikh ryboproduktivnosti. *Rybnoe khozyaystvo*, 31, 3-9.
8. IRH UAAN. (2010). *Vyvchyty mekhanizmy funktsionuvannia bioheotsenoziv vnutrishnikh vodnykh obiektiv Ukrainy zahalnodержavnogo znachennia: Zvit po NDR (zakliuchnyi 2006–2010 rr.)*. № DR 0110U002811. Kyiv.

9. Kurhanskyi, S. V., & Buzevych, O. A. (2010). Suchasnyi stan promyslovoi ikhtiofauny Kyivskoho vodoskhovysheha ta otsinka naslidkiv ekstremalnoi zymivli 2010 roku. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 58-65.
10. Kurhanskyi, S. V., Buzevych, O. A., & Rudyk-Leuska, N. Ia. (2014). Stan zapasiv druhoriadnykh promyslovykh vydiv ryb Kyivskoho vodoskhovysheha. *Naukovi dopovidi NUBiPU*, 7 (49), 1-15.
11. *Metodyka zboru i obrobky ikhtiologichnykh i hidrobiologichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoskhovysheh i lymaniv Ukrainy*: Zatv. nakazom Derzhkomrybhospu Ukrainy № 166 vid 15.12.98. (1998). Kyiv.
12. Yudovich, Yu. B., Dotsenko, B. N., & Antonyuk, A. V. (1982). *Metodika prognozirovaniya vylova ryby v ozerakh, rekakh i vodokhranilishchakh*. Moskva : VNIIPRKh.

БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОСКІРКИ (BLICCA BJOERKNA) ЯК ОБ'ЄКТА ПРОМИСЛОВОГО РИБАЛЬСТВА У КИЇВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ

І. Л. Захарченко, ari_z@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. О. Литвиненко, darg@darg.gov.ua, Державне агентство рибного господарства України, м. Київ
С. В. Курганський, skurgansky@yandex.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначення та аналіз основних біологічних характеристик плоскирки з точки зору формування та експлуатації її промислового запасу в Київському водосховищі.

Методика. В основу роботи покладені результати польових досліджень, які здійснювались на Київському водосховищі протягом 2012–2014 рр. Іхтіологічний матеріал відбирався з уловів контрольного порядку сіток з кроком вічка $a=30-120$ мм та стандартних промислових сіток, які використовуються на Київському водосховищі. Відбір та обробка проб здійснювались за загальноприйнятими при проведенні іхтіологічних досліджень на дніпровських водосховищах методиками.

Результати. Плоскирка на сьогодні є основним промисловим видом Київського водосховища, за рахунок якого забезпечується 20,9% загального річного улову. Популяція цього виду в уловах представлена 10 віковими групами, її основу (70,8%) складали п'яти–семирічні особини. Розмірно-вагові характеристики плоскирки протягом останніх років залишаються на стабільно високому рівні. Структурно-функціональні показники популяції плоскирки вказують на сприятливі умови існування даного виду у Київському водосховищі і свідчать про можливість здійснення його ефективного промислового вилову як в звичайному режимі, так і режимі спеціалізованого лову сітками з кроком вічка 50, 60 мм.

Наукова новизна. Отримані і проаналізовані нові дані щодо сучасного стану плоскирки Київського водосховища як важливого елементу формування промислової рибопродукції.

Практична значимість. Результати роботи дозволяють підвищити якісні і кількісні характеристики уловів плоскирки, і будуть використані при підготовці режиму промислового рибальства в Київському водосховищі.

Ключові слова: Київське водосховище, плоскирка (*Blicca bjoerkna*), вікова структура, промисловий запас, рибальство.

**БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГУСТЕРЫ (*Blicca bjoerkna*)
КАК ОБЪЕКТА ПРОМЫСЛОВОГО РЫБОЛОВСТВА
В КИЕВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ**

И. Л. Захарченко, ari_z@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

В. А. Литвиненко, darg@darg.gov.ua, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины, г. Киев

С. В. Курганский, skurgansky@yandex.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. *Определение и анализ основных биологических характеристик густеры с точки зрения формирования и эксплуатации ее промыслового запаса в Киевском водохранилище.*

Методика. *В основу работы положены результаты полевых исследований, которые осуществлялись на Киевском водохранилище в течение 2012–2014 гг. Ихтиологический материал отбирался из уловов контрольного порядка сетей с шагом ячеи $a=30\text{--}120$ мм и стандартных промысловых сетей, которые используются на Киевском водохранилище. Отбор и обработка проб осуществлялись по общепринятым при проведении ихтиологических исследований на днепровских водохранилищах методикам.*

Результаты. *Густера на сегодня является основным промысловым видом Киевского водохранилища, за счет которого обеспечивается 20,9% общего годового улова. Популяция этого вида в уловах представлена 10 возрастными группами, ее основу (70,8%) составляли пяти-семигодовалые особи. Размерно-весовые характеристики густеры в течение последних лет остаются на стабильно высоком уровне. Структурно-функциональные показатели популяции густеры указывают на благоприятные условия существования данного вида в Киевском водохранилище и свидетельствуют о возможности осуществления его эффективного промыслового изъятия как в обычном режиме, так и режиме специализированного лова сетями с шагом ячеи 50, 60 мм.*

Научная новизна. *Получены и проанализированы новые данные относительно современного состояния густеры Киевского водохранилища, как важного элемента формирования промысловой рыбопродукции.*

Практическая значимость. *Результаты работы позволяют повысить качественные и количественные характеристики уловов густеры и будут использованы при подготовке режима промыслового рыболовства в Киевском водохранилище.*

Ключевые слова: *Киевское водохранилище, густера (*Blicca bjoerkna*), возрастная структура, промысловый запас, рыболовство.*

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 16-24
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.016>
УДК 574.68

КОРРЕКЦИЯ АЛЬГОЦЕНОЗА ПРЕПАРАТОМ «КОМПЛЕЗИМ» В ПРУДАХ ОПЫТНОГО ХОЗЯЙСТВА «НИВКА»

Л. П. Драган, dragan_l@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
Н. Г. Михайленко, ecology@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
А. Н. Базаева, a.bazaeva@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
К. Е. Королук, k.k@online.ua, Завод био- и ферментных препаратов «Энзим»,
г. Ладыжин, Винницкая обл.
Ю. П. Рудь, rud_yuriy@ifr.com.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
Л. П. Бучацкий, irido1@bigmir.ru, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Изучить влияние бактериального препарата «Комплезим», рекомендуемого для предотвращения массового размножения синезеленых водорослей путем коррекции альгоценоза, использования очистки и восстановления санитарного режима, биологического баланса и самоочищения естественных и искусственных водоемов любых размеров, подвергающихся искусственному или естественному загрязнению.

Методика. Исследования проводились на протяжении 30 дней в пруду площадью 0,01 га, глубиной 1,0–1,5 м. Дозу бактериального препарата «Комплезим», согласно рекомендациям завода-производителя, вносили по поверхности водного зеркала исследуемого пруда в виде раствора. Для выполнения гидроэкологических исследований были использованы общепринятые в гидрохимии и гидробиологии методики.

Результаты. Проведенные исследования показали, что под воздействием биопрепарата «Комплезим» величина pH и уровень окисления воды находились в пределах допустимой нормы. Перманганатная и бихроматная окисляемость одинаково снижались в середине и конце опыта по сравнению с начальными показателями. Уровень кальция, магния и сульфатов был ниже значений контрольных показателей. Данный эффект может быть объяснен тем, что бактерии из состава этого препарата в водной среде начинают интенсивно перерабатывать продукты органического распада, которые обогащены кальцием, магнием и сульфатами. Следствием применения препарата «Комплезим» является повышение концентрации хлоридов органического происхождения, одновременно с нитритами. Полученные результаты свидетельствуют о том, что штаммы бактерий, входящие в состав препарата «Комплезим», подавляют процессы размножения синезеленых водорослей путем коррекции альгоценоза и способствуют оптимизации гидрохимических условий для выращивания прудовой рыбы.

Научная новизна. Впервые проведена оценка влияния бактериального препарата «Комплезим» на размножение синезеленых водорослей и гидрохимический режим прудов.

Практическая значимость. Использование бактериального препарата «Комплезим» приводит к сбалансированному развитию синезеленых водорослей, которые массово развиваются в интактных водоемах, что в значительной степени разрешает производственные и экологические проблемы и позволяет достигать ускоренных процессов очистки водоемов.

Ключевые слова: бактериальный препарат «Комплезим», фитопланктон, «цветение» воды, альгоценоз.

© Л. П. Драган, Н. Г. Михайленко, А. Н. Базаева, К. Е. Королук, Ю. П. Рудь,
Л. П. Бучацкий, 2016

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Создание большого количества водохранилищ и искусственных водоемов в Украине существенно изменило комплекс гидрологических, гидрохимических и гидробиологических характеристик экосистем. Отсутствие проточности и оптимального водообмена, снижение прозрачности, особенности прогрева толщи воды и т. д., обусловили развитие процессов эвтрофикации, что, в свою очередь, способствует быстрому развитию фитопланктона, в том числе ускоренному размножению синезеленых водорослей (цианобактерий) [1–4].

В результате длительного воздействия процессов обогащения водоемов биогенными элементами (эвтрофикации) и интенсивного размножения цианобактерий формируются неблагоприятные условия для естественного обитания гидробионтов, а именно: зарастание и обмеление прибрежных акваторий, что приводит к сокращению литоральной зоны водоема, ухудшению нерестовых угодий ценных промысловых рыб, изменениям в структуре водных биоценозов, снижению численности популяции кормовой базы ценных пород рыб, появлению в структуре ихтиоценозов малоценных видов рыб, расширению площади заморных зон. Все перечисленные факторы наносят значительный ущерб рыбному хозяйству и приводят к снижению производства рыбной продукции.

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕРЕШЕННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Одним из методов предотвращения массового размножения синезеленых водорослей является биологическая реабилитация путем коррекции альгоценоза [3]. В числе средств такой биологической реабилитации представлен бактериальный препарат «Комплезим», который рекомендуется для очистки и восстановления санитарного режима, биологического баланса и самоочищения естественных и искусственных водоемов любых размеров, подвергающихся искусственному или естественному загрязнению. Данный препарат содержит ассоциации непатогенных штаммов бактерий *Bacillus subtilis* и *Bacillus licheniformis*, полученные методом глубинного культивирования с добавлением питательных веществ и минералов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в июле 2015 г. на базе опытного рыбного хозяйства «Нивка», в пруду № 113а площадью 0,01 га и глубиной 1,0–1,5 м. По химическому составу вода в пруду в начале опыта соответствовала нормам рыбопродоведения (СОУ-05.01.-37-385:2006). Дозу бактериального препарата «Комплезим» в экспериментах определяли согласно рекомендациям завода производителя (Ладыжинский завод био- и ферментных препаратов «Энзим», Винницкая обл.). Рассчитанное количество препарата в виде раствора вносили по поверхности водного зеркала исследуемого пруда. Отбор и обработку гидрохимических и гидробиологических проб проводили согласно общепринятым методикам [5–10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Нормативные значения и показатели качества воды под влиянием биопрепарата «Комплезим» представлены в таблице.

В начале опыта величина водородного показателя достигала верхних границ нормы — 8,2. Такое значение рН воды объясняется тем, что в этот период создаются условия для активного вегетативного роста водорослей, в результате чего происходит ускоренное потребление ими свободной углекислоты из воды, что приводит к уменьшению ее содержания и, как следствие, к сдвигу реакций среды в щелочную сторону.

При использовании биопрепарата «Комплезим» в середине и в конце эксперимента величина рН воды пруда находилась в пределах допустимой нормы, и это значение является наиболее благоприятным для выращивания прудовой рыбы.

Таблица. Влияние биопрепарата «Комплезим» на гидрохимический режим пруда № 113а

Показатели качества воды	Нормативные значения для рыбоводных прудов	Периоды взятия проб на протяжении месяца		
		начало	середина	конец
Водородный показатель (рН) воды	6,5–8,5	8,2	7,6	7,9
Свободный аммиак, NH_3 , мгN/дм ³	до 0,05	0,13	0,04	0,03
Перманганатная окисляемость, мгО/дм ³	до 15,0	16,5	9,5	12,3
Бихроматная окисляемость, мгО/дм ³	до 50,0	41,4	23,7	30,8
Аммонийный азот, NH_4^+ , мгN/дм ³	до 2,00	1,95	1,77	1,13
Нитриты, NO_2^- , мгN/дм ³	до 0,10	0,10	0,08	0,13
Нитраты, NO_3^- , мгN/дм ³	до 2,00	0,05	0,25	0,23
Минеральный фосфор, PO_4^{3-} , мгP/дм ³	до 0,70	0,31	0,22	0,33
Общее железо Fe^{2+3+} , мгFe/дм ³	до 1,00	1,73	1,96	1,78
Кальций, Ca^{2+} , мг/дм ³	до 70,0	76,2	–	60,1
Магний, Mg^{2+} , мг/дм ³	до 30,0	25,5	–	24,3
Натрий + Калий, $\text{Na}^+ + \text{K}^+$, мг/дм ³	до 50,0	53,0	–	62,3
Гидрокарбонаты, HCO_3^- , мг/дм ³	до 300,0	268,5	–	244,1
Хлориды, Cl^- , мг/дм ³	до 70,0	93,1	–	97,2
Сульфаты, SO_4^{2-} , мг/дм ³	до 60,0	49,0	–	36,2
Общая жёсткость, мг экв./дм ³	5,0–7,0	5,9	–	5,0
Минерализация, мг/дм ³	до 1000,0	565,0	–	524,2

Как правило, преимущественно в водоемах рН среды находится в пределах 6,5–8,5. В летний период при интенсивном фотосинтезе, значение водородного показателя воды увеличивается до 9,0 и более [11]. Рыбы в указанном диапазоне рН способны существовать, однако наиболее оптимальная для рыбоводных прудов реакция — от нейтральной до слабощелочной. Кислая реакция воды негативно сказывается на дыхании и обмене веществ рыб, в результате чего в их организме нарушается азотный обмен, они не способны нормально питаться, что ведет к задержке их роста [11].

Важным показателем при санитарной оценке воды является содержание растворенного кислорода, поскольку его наличие в этой среде является обязательным условием для существования большинства организмов, населяющих водоемы, в том числе и рыб [12, 13]. Сравнивая количество растворимого в воде кислорода с нормой, и при добавлении в водоем бактериального препарата «Комплезим», можно констатировать позитивное влияние последнего на уровень окисления воды в исследуемом пруду, который близок к оптимальному для выращивания рыбы. Так, перманганатная и бихроматная окисляемость одинаково снижалась в середине опыта на 43%, а в конце — на 26% по сравнению с показателями в начале опыта. Такие изменения связаны, с одной стороны, с тем, что в начале лета, когда происходит накопление первичной продукции водоема, основную роль на поверхности воды играет фотосинтез, который приводит к обогащению её кислородом, а во второй половине лета наибольшее значение приобретают окислительные процессы, снижающие уровень растворенного в воде кислорода. Закономерности изменений окисления воды, вероятно, связаны также с ее жесткостью и зависят от содержания слабых кислот, главным образом — угольной, связанных с щелочно-земельными металлами [14–18].

Довольно существенным и разнообразным оказалось влияние биопрепарата «Комплезим» на солевой состав воды пруда № 113а. Так, уровень кальция в ней при добавлении препарата «Комплезим» был ниже на 21%, магния — на 5%, сульфатов — на 27% в сравнении с контрольными показателями. Данный эффект может быть объяснен тем, что бактерии, входящие в состав этого препарата в водной среде начинают интенсивно перерабатывать продукты органического распада, которые обогащены кальцием, магнием и сульфатами. Впрочем, уровень фосфатов в воде исследуемого пруда несколько увеличивается по сравнению с контролем, содержание хлоридов также оказывается выше нормативных значений. Следствием применения препарата «Комплезим» является незначительное повышение концентрации хлоридов органического происхождения, одновременно с нитритами и нитратами. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что под воздействием биопрепарата «Комплезим» происходит интенсивная минерализация органических хлорид- и азотсодержащих веществ.

Хлорид-, азот- и, особенно, фосфорсодержащие химические соединения провоцируют интенсификацию процессов деградации экосистемы, способствуют развитию фитопланктона, в частности — синезеленых водорослей, что, в свою очередь, приводит к «цветению» пресных водоемов, независимо от их размеров,

типов или географического расположения [12]. В большинстве случаев во время «цветения» воды доминируют представители следующих родов синезеленых водорослей: *Microcystis*, *Anabaena*, *Gloetrichia*, *Coelosphaerium*, *Aphanizomenon*, *Woronichinia*, *Oscillatoria*, *Rhabdoderm*, *Lyngbya*, *Dactylococcopsis* [11].

Что касается качественного состава фитопланктона в исследуемом водоеме, после внесения бактериального препарата «Комплезим» доминирующую роль в формировании видового состава фитопланктона играли зеленые и диатомовые водоросли — соответственно 61 и 19% от общего количества видов. Синезеленые выступали субдоминантами. Доминирующими считали виды водорослей, численность или биомасса которых составляла не менее 10% от общей величины пробы, принятой за 100%.

Развитие фитопланктона в водоеме было незначительным. Показатели численности и биомассы его в опытном варианте составляли 25,075 млн кл./дм³ и 4,74 мг/дм³.

Наибольшей величиной биомассы в исследуемом пруду, составлявшей 40,3% от суммарной, характеризовались зеленые водоросли, наиболее ценные в кормовом отношении для рыб и зоопланктона. Синезеленые водоросли в период экспериментов находились на довольно низком уровне развития: их биомасса была равной 0,25 мг/дм³, что составляло 5,2%.

Исследования показали тесные взаимосвязи и взаимозависимости между трофическим и гидрохимическим состоянием водоема № 113а. Применение препарата «Комплезим» приводит к смещению состава биомассы планктона в сторону представителей зеленых, что может способствовать противостоянию между синезелеными и зелеными водорослями в пользу последних. А штаммы бактерий, входящих в состав бактериального препарата «Комплезим» корректируют процессы размножения синезеленых водорослей, снижая интенсивность «цветения» воды путем коррекции альгоценоза.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Использование бактериального препарата «Комплезим» приводит к сбалансированному развитию синезеленых водорослей, которые массово развиваются в интактных водоемах, что в значительной степени разрешает производственные и экологические проблемы и позволяет достигать ускоренных процессов очистки водоемов.

Гидрохимический режим при разведении пресноводной рыбы в водоеме опытного хозяйства «Нивка» с применением бактериального препарата «Комплезим» соответствует нормативным показателям, принятым в рыбоводстве.

В дальнейшем необходимо провести мониторинговые исследования в весенний, летний и осенний периоды развития фитопланктона при внесении в водоём бактериального препарата «Комплезим», поскольку динамика развития фитопланктона нестабильна, и зависит как от сезона, так и метеорологических условий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Водоросли, вызывающие «цветение» водоемов Северо-Запада России / [Белякова Р. Н., Волошко Л. Н., Гаврилова О. В. и др.]. — М. : Т-во науч. изд. КМК, 2006. — 367 с.
2. Гольд З. Г. Словарь терминов и понятий по водным экосистемам (биологическая структура, качество вод, охрана) : уч.-метод. пособие / З. Г. Гольд, И. И. Морозова. — Красноярск : Краснояр. гос. ун-т, 2004. — 94 с.
3. Биломар Е. Е. Биологическая реабилитация Белоярского водохранилища методом коррекции альгоценоза / Е. Е. Биломар, В. В. Кульнев // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. — 2014. — Т. 23, № 2. — С. 22—32.
4. Сезонные особенности развития фитопланктона водоема-охладителя тепловой станции (Березовская ГРЭС-1, Красноярский край) / С. М. Чупров, В. А. Набатова, Н. А. Гаевский [и др.] // Водоросли: проблемы таксономии, экологии и использование в мониторинге : II Всерос. конф. Сыктывкар, 5-9 окт. 2009 г. : матер. [Электронный ресурс]. — Сыктывкар : Институт биологии Коми НЦ УРО РАН, 2009. — Режим доступа : http://ib.komisc.ru/add/conf/algo_2009/.
5. Водоросли. Справочник / [Вассер С. П., Кондратьева Н. В., Масюк Н. П. и др.] — К. : Наук. думка, 1989. — 608 с.
6. Киселев И. А. Методы исследования планктона / И. А. Киселев // Жизнь пресных вод. Т. 4, Ч. 1. — М. : АН СССР, 1956. — С. 183—265.
7. Кондратьева Н. В. Визначник прісноводних водоростей Української РСР / Кондратьева Н. В. — К. : АН СРСР, 1968. — 523 с.
8. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [О. М. Арсан, О. А. Давидов, Т. М. Дьяченко та ін.] ; ред. В. Д. Романенко. — К. : ЛОГОС, 2006. — 408 с.
9. Усачев Г. Н. Количественная методика сбора и обработки фитопланктона / Г. Н. Усачев // Тр. ВГБО. — 1961. — Т. XI. — С. 411—415.
10. Коршиков С. А. Визначник прісноводних водоростей УРСР / Коршиков С. А. — К. : АН УРСР, 1953. — 437 с.
11. О токсичных водорослях / А. К. Жамангара, Ш. А. Тулегенов, Р. М. Муратов, [и др.] // Вестник КазНУ. — 2013. — № 2/2 (38). — С. 131—136. — (Серия экологическая).
12. Богданов Н. И. Прудовое рыбоводство / Н. И. Богданов, А. Ю. Асанов. — [3-е изд., доп.]. — Пенза, 2011. — 89 с.
13. Захарченко М. О. Санітарія і гігієна у рибництві : методичний посібник / Захарченко М. О., Поляковський В. М., Шевченко Л. В. — К. : Друкарня Державного управління справами, 2007. — 175 с.
14. Глубоков А. И. Рост трех видов рыб в ранние периоды онтогенеза в норме и в условиях токсического действия / А. И. Глубоков // Вопросы ихтиологии. — 1990. — Т. 30, № 1. — С. 137—143.
15. Гидрология и гидрохимия Днепра и его водохранилищ / [Денисова А. И., Тимченко В. М., Нахшина Е. П. и др.]. — К. : Наук. думка, 1989. — 216 с.
16. Дзюбан А. Н. Микробиологические процессы в донных отложениях Рыбинского водохранилища и озера Плещеево как факторы формирования качества водной среды / А. Н. Дзюбан, Д. Б. Косолапов, И. А. Кузнецова // Гидробиол. журн. — 2005. — Т. 41, № 4. — С. 82—88.

17. Винберг Г. Г. Первичная продукция водоемов / Винберг Г. Г. — Минск : АН БССР, 1960. — 329 с.
18. Бреховских В. Ф. Гидрофизические факторы формирования кислородного режима водоемов / Бреховских В. Ф. — М. : Наука, 1988. — 168 с.
19. Приймаченко А. Д. Фитопланктон и первичная продукция Днепра и днепровских водохранилищ / Приймаченко А. Д. — К. : Наукова думка, 1981. — 278 с.

REFERENCES

1. Belyakova, R. N., Voloshko, L. N., & Gavrilova, O. V. et al. (2006). *Vodorosli, vyzyvayushchie "tsvetenie" vodoemov Severo-Zapada Rossii*. Moskva : T-vo nauch. izd. KMK.
2. Gol'd, Z. G., Morozova, I. I. (2004). *Slovar' terminov i ponyatiy po vodnym ekosistemam (biologicheskaya struktura, kachestvo vod, okhrana): Uch.-metod. posobie*. Krasnoyarsk : Krasnoyar. gos. un-t.
3. Bilomar, E. E., & Kul'nev, V. V. (2014). Biologicheskaya reabilitatsiya Beloyarskogo vodokhranilishcha metodom korrektsii al'gotsezoza. *Samarskaya Luka: problemy regional'noy i global'noy ekologii*, 23, 2, 22-32.
4. Chuprov, S. M., Nabatova, V. A., Gaevskiy, N. A., & Kolmakov, V. I. (2009). Sezonnye osobennosti razvitiya fitoplanktona vodoema okhladitelya teplovoy stantsii (Berezovskaya GRES-1, Krasnoyarskiy kray). *Vodorosli: problemy taksonomii, ekologii i ispol'zovanie v monitoringe: II vseros. konf. (pech Syktyvkar, 5-9 oktyabrya 2009 g.)*. *ib.komisc.ru*. Syktyvkar : Institut biologii Komi NTs URO RAN. Retrieved from http://ib.komisc.ru/add/conf/algo_2009/.
5. Vasser, S. P., Kondrat'eva, N. V., & Masyuk, N. P. et al. (1989). *Vodorosli. Spravochnik*. Kiev : Nauk. dumka.
6. Kiselev, I. A. (1956). Metody issledovaniya planktona. *Zhizn' presnykh vod*, 4, 1. Moskva : AN SSSR, 183-265.
7. Kondratyeva, N. V. (1968). *Viznachnik prysnovodnykh vodorostey Ukrayinskoyi RSR*. Kiev : AN SRSR.
8. Arsan, O. M., Davydov, O. A., & Dyachenko, T. M. et al. (2006). *Metody hidroekologichnykh doslidzhen poverkhnevyykh vod*. Romanenko, V. D. (Ed.). Kyiv : LOHOS.
9. Usachev, G. N. (1961). Kolichestvennaya metodika sbora i obrabotki fitoplanktona. *Tr. VGBO*, XI, 411-415.
10. Korshykov, S. A. (1953). *Viznachnik prysnovodnykh vodorostey URSS*. Kyiv : AN URSS.
11. Zhamangara, A. K., Tulegenov, Sh. A., & Muratov, R. M. et al. (2013). O toksichnykh vodoroslyakh. *Vestnik KazNU*, 2/2 (38), 131-136.
12. Bogdanov, N. I., & Asanov, A. Yu. (2011). *Prudovoe rybovodstvo*. Penza.
13. Zakharchenko, M. O., Polyakovskiy, V. M., & Shevchenko, L. V. (2007). *Sanitariya y hihiyena u ribnitstvi. Metodychnyy posibnyk*. Kyiv : Drukarnya Derzhavnoho upravlinnya spravamy.
14. Glubokov, A. I. (1990). Rost trekh vidov ryb v rannie periody ontogeneza v norme i v usloviyakh toksicheskogo deystviya. *Voprosy ikhtiologii*, 30, 1, 137-143.
15. Denisova, A. I., Timchenko, V. M., & Nakhshina, E. P. et al. (1989). *Gidrologiya i gidrokhimiya Dnepra i ego vodokhranilishch*. Kiev : Nauk. dumka.
16. Dzyuban, A. N., Kosolapov, D. B., & Kuznetsova, I. A. (2005). Mikrobiologicheskie protsessy v donnykh otlozheniyakh Rybinskogo

- vodokhranilishcha i ozero Pleshcheevo kak faktory formirovaniya kachestva vodnoy sredy. *Gidrobiol. zhurn.*, 41, 4, 82-88.
17. Vinberg, G. G. (1960). *Pervichnaya produktsiya vodoemov*. Minsk : Izd-vo AN BSSR.
18. Brekhovskikh, V. F. (1988). *Gidrofizicheskie faktory formirovaniya kislorodnogo rezhima vodoemov*. Moskva : Nauka.
19. Priymachenko, A. D. (1981). *Fitoplankton i pervichnaya produktsiya Dnepra i dneprovskikh vodokhranilishch*. Kiev : Naukova dumka.

КОРЕКЦІЯ АЛЬГОЦЕНОЗУ ПРЕПАРАТОМ «КОМПЛЕЗИМ» У СТАВАХ ДОСЛІДНОГО ГОСПОДАРСТВА «НИВКА»

Л. П. Драган, dragan_l@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Г. Михайленко, ecology@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. М. Базаєва, a.bazaeva@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
К. Є. Королук, k.k@online.ua, Завод біо- і ферментних препаратів «Ензим», м. Ладижин, Вінницька обл.
Ю. П. Рудь, rud_yuriy@ifr.com.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Л. П. Бучацький, irido1@bigmir.ru, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Вивчити вплив бактеріального препарату «Комплезим», рекомендованого для запобігання масовому розмноженню синьозелених водоростей шляхом корекції альгоценозу, очищення і відновлення санітарного режиму, біологічного балансу і самоочищення природних і штучних водойм будь-яких розмірів, що піддаються штучному або природному забрудненню.

Методика. Дослідження проводилися протягом 30 днів у ставу площею 0,01 га, глибиною 1,0–1,5 м. Дозу бактеріального препарату «Комплезим», відповідно до рекомендацій заводу-виробника, вносили по поверхні водного дзеркала досліджуваного ставу у вигляді розчину. Для виконання гідроекологічних досліджень були використані загальноприйняті методики в гідрохімії та гідробіології.

Результати. Проведені дослідження показали, що під впливом біопрепарату «Комплезим» значення рН і рівня окиснення води знаходилися в межах допустимої норми. Перманганатна і біхроматна окислюваність однаково знижувалися в середині і наприкінці досліду в порівнянні з початковими показниками. Рівень кальцію, магнію і сульфатів був нижчим відносно контрольних показників. Даний ефект може бути пояснений тим, що бактерії, які входять до складу цього препарату, у водному середовищі починають інтенсивно переробляти продукти органічного розпаду, які збагачені кальцієм, магнієм і сульфатами. Наслідком застосування препарату «Комплезим» є підвищення концентрації хлоридів органічного походження, одночасно з нітритами. Отримані результати свідчать про те, що штами бактерій, які входять до складу препарату «Комплезим», пригнічують процеси розмноження синьозелених водоростей шляхом корекції альгоценозу, сприяючи оптимізації гідрохімічних умов для вирощування ставової риби.

Наукова новизна. Вперше проведена оцінка впливу бактеріального препарату «Комплезим» на розмноження синьозелених водоростей і хімічний склад води.

Практична значимість. Використання бактеріального препарату «Комплезим» приводить до збалансованого розвитку синьозелених водоростей, які масово розвиваються в інтактних водоймах, що значною мірою вирішує виробничі та екологічні проблеми і дозволяє досягати прискорених процесів очищення водойм.

Ключові слова: бактеріальний препарат «Комплезим», фітопланктон, «цвітіння» води, альгоценоз.

**CORRECTION OF ALGOCENOSIS BY THE PREPARATION
OF KOMPLEZIM IN EXPERIMENTAL PONDS OF FISH-FARM NYVKA**

L. Dragan, dragan_l@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

N. Mikhaylenko, ecology@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

A. Bazaeva, a.bazaeva@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

K. Korolyuk, k.k@online.ua, Plant of bio- and enzyme preparations "Enzyme", Ladizhin, Vinnitsa region.

Yu. Rud, rud_yuriy@ifr.com.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

L. Buchatsky, irido1@bigmir.ru, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To investigate the effect of the bacterial preparation "Komplezim", which is recommended for the prevention of mass reproduction of blue-green algae through algocenos correction, water cleaning and sanitary regime restoration, for the biological balance and self-purification of natural and farmed fish ponds of all sizes exposed to artificial or natural pollution.

Methodology. The studies were carried out during 30 days in a 0.01 hectare pond with a depth of 1.0–1.5 m. The doses of the bacterial preparation "Komplezim" in the form of a solution were applied over the water surface of the experimental pond. The conventional techniques of hydrochemistry and hydrobiology were used to perform hydroecological studies.

Findings. The study results showed that after the exposure of the bacterial preparation "Komplezim", pH level of water and oxidation rates were within the acceptable limits. Permanganate and dichromate oxidation decreased in the same manner in the middle and end of the experiment compared to initial values. Calcium, magnesium, and sulfate levels were lower compared to control values. This effect can be explained by the fact that bacteria from the "Komplezim" composition in aquatic medium started intensive metabolizing the products of organic decomposition enriched in calcium, magnesium and sulfates. The consequence of the application of "Komplezim" was an increase in the concentration of organic chlorides simultaneously with nitrites. The obtained results indicate that bacteria strains included in the "Komplezim" composition inhibit the processes of cyanobacteria reproduction by algocenos correction and contributes to the optimization of hydrochemical conditions for pond fish rearing.

Originality. The effect of the bacterial preparation "Komplezim" on the reproduction of blue-green algae and hydro-chemical composition of the water has been investigated for the first time.

Practical value. Application of the bacterial preparation "Komplezim" results in the balanced development of blue-green bacteria, which are developed in large amounts in intact water bodies that largely resolves operational and environmental problems and allows achieving accelerated processes of the purification of water bodies.

Keywords: bacterial preparation "Komplezim", phytoplankton, water "blooms", algocenos.

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 25-34
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.025>
УДК 597.583.1(282.247.323)

СТРУКТУРНІ ПОКАЗНИКИ ПОПУЛЯЦІЇ СУДАКА (*SANDER LUCIOPERCA*) КИЇВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

О. А. Бузевич, busevitch@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. М. Прокопенко, morehod3000@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

Мета. Аналіз динаміки структурних показників як інтегральної характеристики процесів поповнення та елімінації репродуктивного і промислового ядра популяції судака Київського водосховища.

Методика. Іхтіологічний матеріал відбирався у весняно-літній період 2015–2016 рр. з уловів контрольного порядку ставних сіток з кроком вічка 30–120 мм. Збір та опрацювання польових матеріалів здійснювали за загальноприйнятими методиками. Всього за період досліджень було перевірено улови 3,5 тис. сіткодів контрольних сіток, з яких проаналізовано 1031 екз. судака. Коефіцієнт загальної смертності (Z) визначався графічним методом на підставі динаміки натуральних логарифмів чисельності вікових класів. Статистичне опрацювання даних здійснювалось в електронних таблицях MS Excel.

Результати. Промисловий вилов судака в останні 10 років має чітко виражену тенденцію до зростання: з 20–25 т до 80–100 т. Вилов судака на зусилля контрольного порядку сіток в міжрічному аспекті також має тенденцію до зростання. При цьому спостерігається певне покращення структурних показників популяції судака, зокрема збільшення граничного віку та розширення модального ряду. Основу популяції (71,6%) в уловах 2015 р. складали три–чотирирічні особини, достатньо високою (10,8%) була також частка п'яти–шестирічок. Це спричинило зростання середньовиваженого віку популяції до 4,5 років. Для 2016 р. відмічене помітне зсування моди варіаційного ряду у бік його лівого крила — основу популяції (64,7%) складали дво–чотирирічні особини. Середньовиважений вік у 2016 р. зменшився до 2,6 років, що насамперед пов'язане з чисельним поповненням та посиленою елімінацією середніх вікових груп. Загальна смертність судака (Z) у 2015–2016 рр. склала 0,53...0,56, що відповідає нормальним умовам формування промислового запасу цього виду та середньому рівню його експлуатації.

Основний улов судака контрольним порядком у 2016 р. як за чисельністю (61,5% від загальної), так і масою (54,9%), забезпечувався за рахунок сіток з кроком вічка 40–60 мм (у 2015 р. — сіток з $a=60-70$ мм). Розподіл уловів судака за кроком вічка контрольних сіток свідчить про необхідність запровадження спеціального режиму промислу цього виду.

Наукова новизна. Отримані нові дані для теоретичного обґрунтування принципів підтримання оптимальних структурних показників популяції судака в умовах рибпромислової водойми.

Практична значимість. Результати досліджень будуть використані при підготовці порядку експлуатації іхтіофауни Київського водосховища, зокрема, в частині регламентації розміру вічка в промислових знаряддях лову.

Ключові слова: Київське водосховище, судак (*Sander lucioperca*), структура популяції, вилов на зусилля, смертність.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Київське водосховище характеризується високим рівнем розвиненості водогосподарського комплексу, одним з важливих складників якого є рибний промисел. Це водосховище має ряд відмінностей від інших водосховищ каскаду, а саме: наявність розвиненої річкової частини, інтенсивне заростання мілководних ділянок, зокрема, водяним горіхом, наявність радіаційного забруднення, високий рівень інтенсивності лову [1, 2]. Все це створює специфічні умови для відтворення іхтіофауни, формування популяційних показників окремих видів та впливає на кількісний і якісний склад промислових уловів. В свою чергу, вплив промислу на іхтіофауну може простежуватися в кількох аспектах: зміна видового складу та видів-домінантів, зміна чисельності та просторового розподілу представників промислової іхтіофауни, зміна структурних характеристик іхтіопопуляцій [2–4]. Своєчасне відстеження всіх зазначених змін, зокрема, як реакції на зовнішній вплив, є одним з основних завдань прикладної іхтіології, без вирішення якого неможливо запровадити систему збалансованого використання сировинної бази промислу.

Судак є основним хижим видом дніпровських водосховищ, який відіграє важливу роль не тільки у формуванні промислового запасу, а й у підтриманні біологічного різноманіття та забезпеченні збалансованої структури іхтіоценозів. Популяція судака Київського водосховища характеризується найвищими для дніпровських водосховищ значеннями питомої іхтіомаси, зокрема, фактична рибопродуктивність за цим видом в останні роки майже вдвічі перевищує середній показник по каскаду. Враховуючи високу товарну цінність цього виду, він є одним з основних промислових видів Київського водосховища. Судак також є основним об'єктом аматорського рибальства [5], тобто антропогенне навантаження на цей вид може бути визначене як дуже високе.

Таким чином, визначення та аналіз основних популяційних та індивідуальних біологічних показників, які характеризують біологічний стан судака та його роль у формуванні структури водної екосистеми Київського водосховища і сировинної бази промислу може вважатися актуальною та важливою науково-прикладною проблемою.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Основна увага при проведенні іхтіологічних досліджень на дніпровських водосховищах приділяється кількісним характеристикам промислового запасу, насамперед, для визначення допустимих обсягів вилову. В той же час, в останні роки все більшої актуальності набуває питання щодо оцінки розподілу промислового навантаження за розмірно-віковими групами об'єктів лову, зокрема, в частині регулювання кількісних характеристик промислового зусилля [2]. Особливу увагу слід приділяти стенобіонтним видам з нестабільною розмірно-віковою структурою популяції, до яких належить судак всіх дніпровських водосховищ [6]. Окремих робіт, присвячених судаку Київського водосховища, в останні роки не відмічалось, цей вид розглядався або в контексті загальної оцінки стану сировинної бази, або як маркер при відстежуванні реакції іхтіоценозу на несприятливий зовнішній вплив [6].

Метою роботи є аналіз динаміки структурних показників як інтегральної характеристики процесів поповнення та елімінації репродуктивного і промислового ядра популяції судака Київського водосховища.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Іхтіологічний матеріал відбирався на контрольно-спостережних пунктах ІРГ НААН на Київському водосховищі у весняно-літній період 2015–2016 рр. з уловів контрольного порядку ставних сіток з кроком вічка 30–120 мм. Збір та опрацювання польових матеріалів здійснювали за загальноприйнятими методиками [7, 8]. Всього за період досліджень було перевірено улови 3,5 тис. сіткодів контрольних сіток, з яких проаналізовано 1031 екз. судака. Коефіцієнт загальної смертності (Z) визначався графічним методом на підставі динаміки натуральних логарифмів чисельності вікових класів [9]. Статистичне опрацювання даних здійснювалось в електронних таблицях MS Excel [10].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Судак є одним з найбільш цінних об'єктів промислу на Київському водосховищі, улови якого після тривалого періоду стабільності (на рівні 20–30 т), в останні роки характеризуються суттєвим збільшенням — до 80 т. У 2016 р. вилов перевищив 100 т (що складає 9,2% загального улову та 60,6% улову хижих видів риб), що є найбільшим показником за весь період рибпромислової експлуатації Київського водосховища.

Популяція судака в контрольних уловах 2015 р. була представлена 11 віковими групами, граничний вік склав 12 років (табл. 1), тобто спостерігалось значне покращення структурних показників популяції цього виду: у 2009–2014 рр. граничний вік популяції судака складав 8–10 років [2, 11]. Звичайно, розширення вікового ряду на 4 групи значною мірою пов'язане з умовами проведення контрольних відловів та випадковим (внаслідок їх малочисельності) потраплянням до знарядь лову представників граничних вікових класів, проте динаміка всіх структурних показників свідчить про достовірний характер позитивних тенденцій.

Таблиця 1. Структурні показники популяції судака Київського водосховища в уловах контрольних сіток (весна–літо)

Рік	Граничний вік, років	Загальна смертність (Z)	Переважаюча вікова група, років	Середньовиважені			Співвідношення ♀:♂
				вік, років	довжина, см	маса, г	
2015	12	0,53	3–4	4,5	43,5	1414	1:2,3
2016	12	0,56	2–4	2,6	25,2	654	1:3,0

Основу популяції (71,6%) в уловах 2015 р. складали три–чотирирічні особини довжиною 38–46 см; достатньо високою (10,8%) була також частка п'яти–шестирічок, тобто спостерігається певне розширення модального ряду за рахунок його правого крила. Частка поповнення у порівнянні з минулими роками суттєво зменшилась — до 50,2% проти 70,0%, однак, враховуючи показники вилову на

зусилля контрольного порядку, це насамперед пов'язане зі зростанням питокої чисельності середніх вікових груп, в основному чотирирічок, частка яких збільшилася з 19,4% до 45,8%. Таким чином, генерація 2011 р. народження, яка домінувала в уловах 2014 р. [11], зберегла свою високу чисельність і сформувала значне поповнення промислового ядра популяції, яке забезпечує збільшення уловів у 2015 р. і, особливо, у 2016 р. Частка старших вікових груп в уловах 2015 р. різко збільшилась (до 10,1%), що привело до зростання популяційних показників в уловах у порівнянні з даними попередніх досліджень. Зокрема, середньовиважений вік збільшився до 4,5 років, маса судака зросла до 1,4 кг (проти відповідно 3,9 років та 0,9 кг [11]). При цьому стабільно високі показники улову на зусилля контрольного порядку сіток свідчать, що елімінація внаслідок природної та промислової смертності повністю компенсується поповненням. Враховуючи високі показники улову на зусилля контрольного порядку та достатньо високу частку рекрутів, можна зробити висновок, що основним чинником, який визначав вікову структуру популяції судака в 2015 р., було перенесення промислового навантаження на старші вікові групи на тлі досить численного поповнення. В результаті варіаційний ряд популяції в уловах 2015 р. набув вигляду гостровершинної кривої з різкими підйомом та спадом, модальні розмірні групи самців відповідали діапазону 38–43 см, самиць — 41–46 см (рис. 1).

Рис. 1. Структура варіаційного ряду судака в контрольних уловах 2015 р.

Збільшення середньопопуляційних показників позначилось на розподілі улову за роком вічка контрольного порядку. Основний улов судака контрольним порядком у 2015 р. як за чисельністю (55,1% від загальної), так і масою (52,9%), забезпечувався за рахунок сіток з кроком вічка 60–70 мм (рис. 2). Судак фіксувався у всьому наборі контрольних сіток, причому на частку крупновічкових сіток припало 44,9% загальної кількості виловлених контрольним порядком особин.

За даними аналізу кривої улову судака, коефіцієнт миттєвої загальної смертності у 2015 р. склав 0,53, що відповідає показникам, отриманим попередніми дослідниками для інших водосховищ каскаду [12].

У 2016 р. промисел базувався на достатньо численних (52,9% від загальної маси улову; середня маса в уловах — 1,6 кг) середніх та старших вікових групах, які виловлюються сітками з кроком вічка 60–70 мм, що дає можливість знизити промислове навантаження на генерації, які щойно вступили до промислового ядра, і забезпечити зростання за їх рахунок уловів у 2016 р.

Рис. 2. Розподіл улову судака за кроком вічка контрольного порядку сіток (за чисельністю)

Слід також зазначити, що у водосховищі був сформований певний запас і для промислу крупновічковими сітками ($a=75-120$), частка яких в загальному улові контрольного порядку у 2015 р. склала 25,8% за чисельністю та 31,6% за масою; при цьому абсолютний улов цих сіток у порівнянні з минулими роком збільшився у 2,7 разів (за масою). Питомий вилов сітками з $a=36-40$ мм у 2015 р. знизився до 10,1% за кількістю, проте насамперед це пов'язане зі збільшенням улову крупновічкових сіток. На це, зокрема, вказують показники абсолютного вилову судака контрольним порядком, які у 2015 р. склали 721 екз. (1212 кг) проти 466 екз. (471 кг) у 2014 р. та 399 екз. (352 кг) у 2010–2011 рр. [11].

В контрольних уловах 2016 р. популяція судака була представлена 12 віковими групами, граничний вік склав 12 років, тобто зберігаються відмічені вище тенденції до покращення структурних показників популяції цього виду (зокрема, в частині стабільної фіксації в уловах граничних вікових груп). Основу популяції (64,7%) в уловах 2016 р. складали дво–чотирирічні особини довжиною 20–40 см, тобто у порівнянні з минулим роком мода варіаційного ряду помітно зсунулась у бік його лівого крила (рис. 3). В основному це відбулось за рахунок чисельної генерації 2014 р. народження (частка дворічок склала 45,7%). При цьому, враховуючи показники вилову на зусилля контрольного порядку, питома чисельність промислового ядра популяції може бути оцінена як середня.

Рис. 3. Структура варіаційного ряду судака в контрольних уловах 2016 р.

Разом з тим, генерація 2011 р. народження, яка домінувала в уловах 2014–2015 рр., у 2016 р. простежується слабо — частка п'ятирічок склала лише 1,5%, тобто відмічене раніше збільшення уловів було зумовлене посиленою експлуатацією середніх вікових груп, що не може вважатися раціональним (втім, розрахункові коефіцієнти промислової смертності в модальних вікових групах не виходять за межі нормативних). Частка старших вікових груп в уловах 2016 р. значно зменшилась у порівнянні з минулим роком (до 5,1%), тобто промисел у 2016 р. також буде базуватися переважно на чотири–п'ятилітках. Збільшення частки поповнення та елімінація середніх і старших вікових груп призвели до закономірного зниження середньовіваженого віку судака в уловах — до 2,6 років. Крива улову набула вигляду лівоасиметричної параболи з гострою вершиною та достатньо великим кутом нахилу правого крила до осі абсцис. Разом з тим, достатньо чисельний залишок три–чотирирічок свідчить про потенціальну можливість формування у 2017 р. запасу, який буде доступний для ефективного промислу сітками з кроком вічка $a=50\text{--}60$ мм, тобто певні резерви для підтримання уловів цього виду на високому рівні (навіть деякого їх збільшення) є в наявності. На це вказує і аналіз кількісних та якісних показників уловів контрольного порядку.

Основний улов судака контрольним порядком у 2016 р. як за чисельністю (61,5% від загальної), так і масою (54,9%), забезпечувався за рахунок сіток з кроком вічка 40–60 мм (у 2015 р. — сітки з $a=60\text{--}70$ мм). Разом з тим, на частку крупновічкових сіток у 2016 р. припало 41,6% загальної маси улову, що свідчить про сприятливі передумови для ефективного облову найбільш продуктивних розмірно-вікових груп цього виду за сучасною організацією промислу. У 2016 р. промисел буде базуватися на достатньо численних (66,7% від загальної маси улову) промислових контингентах судака, які виловлюються сітками з кроком вічка 50–60 та 80–90 мм, що дає можливість знизити промислове навантаження на генерації, які щойно вступили до промислового ядра, і забезпечити зростання за їх рахунок уловів у 2017 р. Питомий вилов сітками з $a=30\text{--}40$ мм у 2016 р. збільшився до 21,2% за кількістю, що підтверджує висновок про надходження

численного поповнення до промислового ядра популяції. На це, зокрема, вказує показник вилову судака на зусилля контрольного порядку сіток, який у 2016 р. склав 937 екз. (788 кг).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Показники вилову судака Київського водосховища промисловими і контрольними знаряддями лову в останні роки мають тенденцію до зростання. При цьому спостерігається певне покращення структурних показників популяції судака, зокрема збільшення граничного віку та розширення модального ряду.

Основу популяції в уловах 2015 р. складали три–чотирирічні особини, у 2016 р. — дво–чотирирічні особини. Середньовиважений вік 2016 р. зменшився до 2,6 років, що насамперед пов'язане з численним поповненням та посиленою елімінацією середніх вікових груп. Загальна смертність судака (Z) у 2015–2016 рр. склала 0,53...0,56, що відповідає нормальним умовам формування промислового запасу цього виду та середньому рівню його експлуатації.

Основний улов судака контрольним порядком у 2016 р. як за чисельністю (61,5% від загальної), так і масою (54,9%), формувався за рахунок сіток з кроком вічка 40–60 мм (у 2015 р. — сіток з $a=60\text{--}70$ мм). Розподіл уловів судака за кроком вічка контрольних сіток свідчить про необхідність запровадження спеціального режиму промислу цього виду.

Перспективним напрямом подальших досліджень є наукове обґрунтування спеціалізованого режиму вилову судака з перенесенням основного промислового навантаження на його середні (п'яти–семилітні) вікові групи.

ЛІТЕРАТУРА

1. Курганський С. В. Вплив розвитку водяного горіха (*Trapa natans*) на умови нагулу молоді риб Київського водосховища / С. В. Курганський, О. А. Бузевич // Рибогосподарська наука України. — 2014. — № 2. — С. 5—13.
2. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи рибогосподарського використання промислової іхтіофауни великих рівнинних водосховищ України: дис. ... доктора біол. наук : 03.00.10 / Бузевич Ігор Юрійович. — К., 2012. — 297 с.
3. Курганський С. В. Сучасний стан промислової іхтіофауни Київського водосховища та оцінка наслідків екстремальної зими 2010 року / С. В. Курганський, О. А. Бузевич // Рибогосподарська наука України. — 2010. — № 4. — С. 58—65.
4. Відновна іхтіоекологія (реабілітація аборигенної іхтіофауни природних водойм України) / [Гриб Й. В., Сондак В. В., Гончаренко Н. І. та ін.]. — Рівне : Волинські обереги, 2007. — 630 с.
5. Дудник С. В. Оцінка впливу різних способів рибальства на стан іхтіофауни внутрішніх водойм України / С. В. Дудник, Ю. А. Глебова // Рибогосподарська наука України. — 2010. — № 4. — С. 65—69.
6. Захарченко И. Л. Биологическая характеристика популяции судака (*Stizostedion lucioperca* (L.)) Каховского водохранилища и его промысловое значение : дис. ... кандидата биол. наук : 03.00.10 / Захарченко Ирина Леонидовна. — К., 2006. — 143 с.

7. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилову риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України; № 166 від 15.12.98. — К., 1998. — 47 с.
8. Методи гідроecологічних досліджень поверхневих вод / [Арсан О. М., Давидов О. А., Дьяченко Т. М. та ін.] ; ред. Романенко В. Д. — К. : ЛОГОС, 2006. — 408 с.
9. Katsanevakis S. Modelling fish growth: Model selection, multi-model inference and model selection uncertainty / S. Katsanevakis // Fisheries Research. — 2006. — Vol. 81, iss. 2–3. — P. 229–235.
10. Лапач С. Н. Статистика в науке и бизнесе / Лапач С. Н., Чубенок А. В., Бабиц П. Н. — К. : МОРИОН, 2002. — 640 с.
11. Визначити закономірності формування основних структурно-функціональних характеристик іхтіоценозів внутрішніх водойм з урахуванням зовнішніх чинників та розробити систему сталої їх рибогосподарської експлуатації і збереження біологічного різноманіття : звіт по НДР (заключний 2011–2015 рр.) : № ДР 0111U008328 / ІРГ УААН. — К., 2016. — 264 с.
12. Бузевич І. Ю. Динаміка загальної смертності основних промислових риб дніпровських водосховищ / І. Ю. Бузевич // V Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф., присвячена пам'яті І. Д. Шнаревича, 13-16 вер. 2012 р. : матер. — Чернівці : Книги-XXI, 2012. — С. 36–37.

REFERENCES

1. Kurhanskyi, S. V., & Buzevych, O. A. (2014). Vplyv rozvytku vodianoho horikha (*Trapa natans*) na umovy nahulu molodi ryb Kyivskoho vodoshovyscha. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 5-13.
2. Buzevych, I. Iu. (2012). Stan ta perspektyvy rybohospodarskoho vykorystannia promyslovoi ikhtiofauny velykykh rivnyynykh vodoshovysch Ukrainy. *Doctor's thesis*. Kyiv.
3. Kurhanskyi, S. V., & Buzevych, O. A. (2010). Suchasnyi stan promyslovoi ikhtiofauny Kyivskoho vodoshovyscha ta otsinka naslidkiv ekstremalnoi zymivli 2010 roku. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 58-65.
4. Hryb, I. V., Sondak, V. V., & Honcharenko, N. I. et al. (2007). *Vidnovna ikhtioekolohiia (reabilitatsiia aboryhennoi ikhtiofauny pryrodnykh vodoim Ukrainy)*. Rivne : Volynski oberehy.
5. Dudnyk, S. V., & Hliebova, Iu. A. (2010). Otsinka vplyvu riznykh sposobiv rybalstva na stan ikhtiofauny vnutrishnykh vodoim Ukrainy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 65-69.
6. Zakharchenko, I. L. (2006). Biologicheskaya kharakteristika populyatsii sudaka (*Stizostedion lucioperca* (L.)) Kakhovskogo vodokhranilishcha i ego promyslovoe znachenie. *Candidate's thesis*. Kyiv.
7. *Metodyka zboru i obrobky ikhtiolohichnykh i hidrobiolohichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoshovysch i lymaniv Ukrainy*: Zatv. nakazom Derzhkomrybhospu Ukrainy № 166 vid 15.12.98. (1998). Kyiv.
8. Arsan, O. M., Davydov, O. A., & Diachenko, T. M. et al. (2006). *Metody hidroekolohichnykh doslidzen poverkhnevyykh vod*. Romanenko, V. D. (Ed). Kyiv : LOHOS.

9. Katsanevakis, S. (2006). Modelling fish growth: Model selection, multi-model inference and model selection uncertainty. *Fisheries Research*, 81, 2-3, 229-235.
10. Lapach, S. N., Chubenok, A. V., & Babich, P. N. (2002). *Statistika v nauke i biznese*. Kyiv : MORION.
11. IRH UAAN. (2016). *Vyznachyty zakonomirnosti formuvannia osnovnykh strukturno-funktsionalnykh kharakterystyk ikhtiotsenoziv vnutrishnikh vodoim z urakhuvanniam zovnishnikh chynnykiv ta rozrobyty systemu staloi yikh rybohospodarskoi ekspluatatsii i zberezhenia biolohichnoho riznomanittia* : Zvit po NDR (zakliuchnyi 2011-2015 rr.). № DR 0111U008328. Kyiv.
12. Buzevych, I. Iu. (2012). Dynamika zahalnoi smertnosti osnovnykh promyslovykh ryb dniproviskykh vodoshkovyshch. *V Mizhnarodna ikhtiologichna naukovopraktychna konf., prysviachena pamiaty I. D. Shnarevycha 13-16 veresnia 2012 r.* Chernivtsi: Knyha-XXI, 36-37.

СТРУКТУРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОПУЛЯЦИИ СУДАКА (*SANDER LUCIOPERCA*) КИЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

О. А. Бузевич, busevitch@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
С. Н. Прокопенко, morehod3000@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН,
 г. Киев

Цель. Анализ динамики структурных показателей как интегральной характеристики процессов пополнения и элиминации репродуктивного и промыслового ядра популяции судака Киевского водохранилища.

Методика. Ихтиологический материал отбирался в весенне–летний период 2015–2016 гг. из уловов контрольного порядка ставных сетей с шагом ячеи 30–120 мм Сбор и обработку полевых материалов осуществляли по общепринятым методикам. Всего за период исследований было проверено уловы 3,5 тыс. сетесуток контрольных сетей, из которых проанализирован 1031 экз. судака. Коэффициент общей смертности (Z) определялся графическим методом на основании динамики натуральных логарифмов численности возрастных классов. Статистическая обработка данных осуществлялась в электронных таблицах MS Excel.

Результаты. Промысловый вылов судака в последние 10 лет имеет четко выраженную тенденцию к росту: от 20–25 т до 80–100 т. Вылов судака на усилии контрольного порядка сетей в межгодовом аспекте также имеет тенденцию к росту. При этом наблюдается определенное улучшение структурных показателей популяции судака, в частности увеличение предельного возраста и расширение модального ряда. Основу популяции (71,6%) в уловах в 2015 г. составляли трех–четырёхгодовалые особи, достаточно высокой (10,8%) была также доля пяти–шестигодовиков. Это повлекло увеличение средневзвешенного возраста популяции до 4,5 лет. Для 2016 г. отмечено заметное сдвигание моды вариационного ряда в сторону его левого крыла: основу популяции (64,7%) составляли двух–четырёхгодовалые особи. Средневзвешенный возраст в 2016 г. уменьшился до 2,6 лет, что в первую очередь связано с многочисленным пополнением и усиленной элиминацией средних возрастных групп. Общая смертность судака (Z) в 2015–2016 гг. составила 0,53...0,56, что отвечает нормальным условиям формирования промыслового запаса этого вида и среднему уровню его эксплуатации.

Основной улов судака контрольным порядком в 2016 г. как по численности (61,5% от общей), так и по массе (54,9%), обеспечивался за счет сетей с шагом ячеи $a=40-60$ мм (в 2015 г. — сетей с $a=60-70$ мм). Распределение уловов судака по шагу ячеи контрольных сетей свидетельствует о необходимости внедрения специального режима промысла этого вида.

Научная новизна. Получены новые данные для теоретического обоснования принципов поддержания оптимальных структурных показателей популяции судака в условиях рыбопромыслового водоема.

Практическая значимость. Результаты исследований будут использованы при подготовке порядка эксплуатации икhtiофауны Киевского водохранилища, в частности, в части регламентации размера ячеи промысловых орудий лова.

Ключевые слова. Киевское водохранилище, судак (*Sander lucioperca*), структура популяции, вылов на усилие, смертность.

STRUCTURAL PARAMETERS OF PIKEPERCH (*SANDER LUCIOPERCA*) POPULATION OF THE KYIV RESERVOIR

O. Buzevych, busevitch@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

S. Prokopenko, morehod3000@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Analysis of the dynamics of structural parameters as an integral property of the processes of recruitment and elimination of the reproductive and commercial population nuclei of pikeperch of the Kyiv reservoir.

Methodology. Ichthyological material was collected during spring-summer period of 2015-2016 from survey catches done with gill nets with mesh sizes of 30-120 mm. Collection and processing of the field materials were carried out using conventional methods. In total, catches of 3.5 thousand net-days were processed during the study period and 1031 individual pikeperch were analyzed. Total mortality coefficient (Z) was determined by graphic method based on the dynamics of the natural logarithms of the abundances of different age groups. Statistical processing of data was done in MS Excel.

Findings. Commercial landings of pikeperch during last 10 years has a clear trend for a growth: from 20-25 to 80-100 tons. The catch of pikeperch per unit effort of survey gill nets in an interannual aspect is also characterized by a growth. At the same time, there is a certain improvement of the structural parameters of pikeperch population, e.g. an increase in the maximum age and extension of the modal frequency distribution. Age-3 and age-4 fish represented the major part of the population (71.6%) in the catches of 2015, while the share of age-5-6 fish was also relatively high (10.8%). It resulted in an increase in the weighed mean age of the pikeperch population to 4.5 years. For 2016, there is a significant shift of the frequency distribution to its left wing – the major part of the population (64.7%) was composed of age-2 to age-4 fish. The weighed mean age in 2016 decreased to 2.6 years that was due first of all to abundant recruitment and intensive elimination of middle age groups. Total mortality (Z) of pikeperch in 2015-2016 was 0.53-0.56 that corresponded to normal conditions of the formation of the commercial stock of this species and moderate level of its exploitation.

The major part of pikeperch catches in 2016, both by number (61.5% of the total catch) and biomass (54.9%) was done by gill nets of 40-60 mm mesh size (in 2015 – $a=60-70$ mm). The distribution of pikeperch catches according to the mesh sizes indicate on the necessity for the implementation of a special regime for the exploitation of this species.

Originality. We obtained new data for the theoretical justification of the principles of the maintenance of optimum structural parameters of pikeperch population in the condition of a commercially fished water body.

Practical value. The study results will be used for the preparation of the procedure of the fisheries exploitation of ichthyofauna in the Kyiv reservoir, which include, in particular, the regulation of mesh sizes in commercial fishing gears.

Keywords: Kyiv reservoir, pikeperch (*Sander lucioperca*), population structure, catch per unit effort, mortality.

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 35-41
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.035>
УДК 504.455:639.3

РАСЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ ВОДОЕМОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ ДЛЯ САДКОВОГО РЫБОВОДСТВА

Н. В. Старко, nikolaj.starko@gmail.com, Научно-исследовательское учреждение
«Украинский НИИ экологических проблем», г. Харьков

Цель. Установление ежегодного объема выращивания рыбы в садках, не приводящего к ухудшению экологического состояния водоемов-охладителей Змиевской ТЭС и Курской АЭС.

Методика. Необходимое для расчетов удельное (на 1 т выращенной рыбы) поступление биогенных веществ определялось по данным собственных исследований. Для этого на действующих садковых линиях проводилось определение поступления в водоемы-охладители взвешенных веществ. Расчет, основанный на данных рыбхозов, среднего прироста рыбы за период экспозиции ловушек позволил рассчитать удельное поступление взвешенных веществ от садков. Влияние на качество воды применяемых в рыбхозах искусственных кормосмесей и смеси остатков кормов и фекалий рыб, собранной под садками, оценивалось в условиях лабораторных экспериментов. Влияние на качество воды метаболитов рыб учитывалось по данным литературы.

Результаты. В специфических условиях исследованных водоемов-охладителей в качестве лимитирующего экологического фактора нами определен минеральный азот. На основании экологически допустимых концентраций минерального азота в воде рассчитано возможное повышение содержания биогенных элементов в результате поступления отходов рыбоводства. С учетом собственных данных по удельному выносу азота при интенсивном ведении садковой аквакультуры, определена экологическая емкость водоемов-охладителей, которая составила: для Змиевской ТЭС – 281,7 т, для Курской АЭС – 625,5 т.

Научная новизна. Впервые рассчитана экологическая емкость водоемов-охладителей (ВО) Змиевской ТЭС и Курской АЭС I–II очереди для садкового рыбоводства.

Практическая значимость. Применение изложенных в статье результатов позволит создавать и развивать садковые рыбные хозяйства без нарушения экологического состояния водоемов-охладителей электростанций, на базе которых они создаются.

Ключевые слова: садковые рыбные хозяйства, водоемы-охладители, экологическая емкость водоема для садкового рыбоводства.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Особенностью садкового рыбоводства является поступление отходов, накапливающихся при выращивании рыб непосредственно в водном объекте, что затрудняет их удаление. Поэтому важнейшей предпосылкой успешной работы и развития садковых рыбных хозяйств (СРХ) является установление экологической емкости конкретного водоема для выращивания рыбы в садках. В то же время, анализ научной, нормативной и ведомственной информации показывает, что большинство исследований посвящено вопросам организации и отдельным элементам технологии выращивания рыбы в СРХ. Особенно остро вопросы экологического состояния водного объекта стоят при функционировании СРХ на базе водоемов-охладителей (ВО), где поступление из садков большого количества

© Н. В. Старко, 2016

органических веществ при повышенных температурах и создаваемой агрегатами электростанций проточности многократно ускоряют ход внутриводоемных процессов, может приводить к заморам рыбы в самих садках. Подобное отмечалось на ВО Черепетской ГРЭС и Змиевской ТЭС [1–3]. Эти обстоятельства делают вопросы сохранения качества водной среды особенно острыми.

Анализ литературы показывает, что разработка экологических нормативов размеров СРХ на базе ВО в последние годы не проводилась. До настоящего времени используется временные рыбоводно-биологические нормативы (1979 г.). В данном документе максимальную площадь СРХ предлагается рассчитывать, исходя из соотношения площадей садков и конкретного ВО как 1:1000 [4]. Названный критерий определения экологической емкости водоема для СРХ рекомендуется к применению и в настоящее время [5]. В то же время, такой подход является формальным, так как не учитывает специфические особенности каждого водоема (трофический уровень, антропогенную нагрузку, проточность и др.), хотя они во многом определяют способность водоемов к самоочищению. Кроме того, здесь не принимаются во внимание производственные показатели рыбного хозяйства, также влияющие на степень воздействия СРХ на водоем.

Оптимальным является расчет допустимой мощности СРХ по допустимому поступлению от садков загрязнений — чаще всего биогенных элементов — фосфора или азота.

Имеется опыт подобных расчетов для водных объектов с естественной температурой воды, где СРХ получили большое развитие. Из последних исследований можно отметить работы по расчету экологической емкости для СРХ оз. Кариба в Африке [6], озер Карелии [7] и Турции [8].

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕРЕШЕННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Данные литературы и опыт работы на многих ТЭС и АЭС показывают, что при введении в эксплуатацию энергообъекта на базе его ВО стихийно возникает водохозяйственный комплекс (ВХК), включающий ряд отраслей. При этом работа всего комплекса зависит от качества воды в ВО. Особенностью СРХ является попадание отходов рыбоводства сразу в ВО. Поэтому функционирование СРХ часто влечет возникновение противоречий между рыбоводами и энергетиками. Это неоднократно наблюдалось на Змиевской ТЭС и Курской АЭС. Подобные факты приводятся и для Кармановской ГРЭС [9] и ГРЭС в Свердловской области [10]. Поэтому необходима регламентация создания и развития СРХ, для чего нужен расчет экологической емкости водоемов-охладителей для таких хозяйств.

Целью настоящей работы является установление максимального ежегодного объема выращивания рыбы в садках, не приводящего к ухудшению экологического состояния ВО на Змиевской ТЭС и Курской АЭС I–II очереди.

Целью работы было решение следующих задач:

1. Определить удельное (на 1 т выращенной в садках рыбы) поступление в ВО загрязняющих веществ. Для этого на ВО Змиевской ТЭС и Курской АЭС I–II очереди проводились натурные и лабораторные исследования.
2. Собрать информацию (результаты натурных исследований, анализ научной литературы и ведомственных данных) по величине выбранного для расчетов

гидрохимического показателя в разные годы функционирования ВО.

3. Провести непосредственные расчеты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Оценку влияния на качество водной среды рыбных комбикормов и собранной под садками смеси остатков кормов и фекалий рыб проводили по принципам, применяемым в исследованиях А. Ф. Антипчук [11].

Определение поступления из рыбоводных садков взвешенных веществ проводилось путем установки ловушек оригинальной конструкции. Полученные данные использовались для расчетов поступления отходов на 1 т прироста рыбы (с учетом веществ, выносимых с биомассой выращенной рыбы).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Экологическая емкость ВО Змиевской ТЭС и Курской АЭС I–II очереди определялась по принципам Beveridge Malcolm С. М. [12]. В то же время, автор проводил исследования на водных объектах, где основным соединением, лимитирующим элементом, был неорганический (фосфатный) фосфор.

В отличие от этих водоемов, в рассматриваемых ВО основным элементом, лимитирующим развитие водной экосистемы, является азот. Об этом свидетельствует регулярное отсутствие в воде рассматриваемых водоемов-охладителей в летний период соединений минерального азота и постоянно высокое содержание фосфора. Поэтому в качестве лимитирующего показателя мы было взято не фосфор, а сумму неорганического азота.

Расчет проводился по формуле: $W = (N_{\text{возм}} - N_{\text{до р/х}}) / N_{\text{р/х}}$, где

W — экологическая емкость ВО для СРХ, т/год;

$N_{\text{возм}}$ — допустимая среднегодовая концентрация минерального азота в воде ВО, мг/дм³ — принималась по предлагаемым М. Оуэнсом [13] критическим величинам с учетом морфометрических характеристик ВО;

$N_{\text{до р/х}}$ — среднегодовая концентрация минерального азота в воде ВО до появления на его акватории СРХ, мг/дм³;

$N_{\text{р/х}}$ — поступление в воду минерального азота при выращивании в садках 1 тонны рыбы.

На акватории ВО Змиевской ТЭС выращивание рыбы в садках проводится с 1969 года. Однако, ввиду отсутствия данных по содержанию в воде ВО ЗмТЭС минерального азота в досадковый период, были использованы данные Змиевской ТЭС в первые годы выращивания рыбы в садках (1971–1972 гг.), когда производство было незначительным (41,5–42,8 т). Среднегодовая сумма азота минерального составляла тогда 0,460 мгN/дм³.

Экологически допустимая концентрация азота в воде ВО Змиевской ТЭС составляет, с учетом его морфометрических характеристик, по данным М. Оуэнса, [13], 1,000 мгN/дм³. Отсюда экологически допустимый прирост концентрации азота составляет:

$$1,000 - 0,460 = 0,540 \text{ мгN/дм}^3.$$

При среднем объеме ВО ЗмТЭС в 2000–2008 гг. 40,5 млн м³ (данные Змиевской ТЭС) среднее общее количество азота минерального, которое можно внести с отходами садкового рыбоводства, равно $40,5 \cdot 0,540 = 21,87$ т. По нашим данным при выращивании в садках 1 т рыбы в ВО попадает 91,3 кг минерального азота [14]. Таким образом, экологическая емкость ВО Змиевской ТЭС для СРХ составляет $21,87/0,0913 + 42,2$ (выращено в садках в 1971–1972 гг.) = 281,7 т.

Аналогично проведены расчеты для ВО Курской АЭС I–II очереди (за период 1983–1987 гг.). Допустимый объем производства рыбы СРХ, с учетом содержания $N_{\text{мин}}$ в начальный период работы СРХ 0,406 мгN/дм³, объема ВО 90 млн м³, составляет, с учетом выращенной в 1983–1984 гг. в садках рыбы, 625,5 т.

Следует отметить, что полученная цифра относится только к продукции рыбы, выращенной с использованием искусственных кормосмесей. Общее количество рыбы, выращенной в садках, может быть гораздо большим за счет толстолобиков, питающихся естественной пищей из ВО. При этом фекалии растительноядных рыб, по сведениям рыбоводов и нашим наблюдениям, ВО не загрязняют, так как потребляются выращиваемым с ними карпом.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о возможности определения экологической емкости ВО. Дальнейшее развитие предлагаемого метода должно идти как по линии более тщательной отработки отдельных положений, так и подготовки соответствующего нормативного документа, регламентирующего выращивание рыбы в садках на теплых водах. Подобный документ позволит не допускать ухудшения экологического состояния отдельных ВО (или их участков), а также, предотвращать наблюдающуюся на отдельных ВО локальную гибель содержащейся в садках рыбы, что улучшит экономические показатели самих рыбхозов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Авинский В. А. Выделение и оценка факторов определяющих кислородный режим садковых рыбоводных хозяйств (на примере Черепетского рыбхоза) / В. А. Авинский // Сб. науч. тр. ГосНИОРХ. — 1990. — Вып. 309. — С. 92—104.
2. Старко Н. В. Формирование кислородного режима водоемов-охладителей в районах размещения садковых рыбных хозяйств / Н. В. Старко // Всес. конф. мол. уч. : матер. — К. : Институт гидробиологии АН УССР, 1990. — С. 150—151.
3. Старко Н. В. Влияние садкового рыбоводства на экологическое состояние водоемов-охладителей / Н. В. Старко // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення : IV Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. статей. — Т. 1. — Харків, 2008. — С. 368—373.
4. Временные рыбоводно-биологические нормативы для корректировки генеральной схемы рыбохозяйственного использования сбросных теплых вод атомных электростанций и ГРЭС — М. : ВНИИПРХ, 1979. — 42 с.
5. Григорьев С. С. Индустриальное рыбоводство : [в 2 ч.] Ч. 1 / С. С. Григорьев, Н. А. Седова. — Петропавловск-Камчатский : КамчатГТУ, 2008. — 186 с.

6. Mhlanga Lindah. The application of a phosphorus mass balance model for estimating the carrying capacity of Lake Kariba / Lindah Mhlanga, Wilson Mhlanga, Paul Mwera // *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences*. — 2013. — № 37. — P. 316—319.
7. Стерлигова О. П. Состояние некоторых водоемов Северной Карелии и их использование для товарного выращивания радужной форели / О. П. Стерлигова, С. П. Китаев, Н. В. Ильмаст // *Прикладная экология Севера: труды Кольского научного центра РАН*. — 2012. — 3/2012 (10), вып. 2. — С. 40—46.
8. Ordal Beril. Using of the computer software for the sustainable rainbow trout cage culture: A case study in Gokcekaya Dam Lake (Ankara, Turkey) / Beril Ordal, Serap Pulatsu // *Ege J Fish Aqua Sci*. — 2012. — № 29(1). — P. 49—54.
9. Постановление от 2 июля 2007 г. по делу № А07-88/2007 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : sudact.ru/arbitral/doc/kbhKpmyoFfWJ.
10. Литвиненко А. И. Фермерское рыбоводство на Урале и в Сибири. Современное состояние и проблемы развития / А. И. Литвиненко, В. Р. Крохалевский // *Аквакультура центральной и восточной Европы: настоящее и будущее : II съезд NACEE (Сети Центров по аквакультуре в Центральной и Восточной Европе) и семинар о роли аквакультуры в развитии села, Кишинев, 17-19 окт. 2011 г. : матер.* — Кишинев : Pontos, 2011. — С. 145—147.
11. Антипчук А. Ф. Микробиология рыбоводных прудов / Адель Федоровна Антипчук. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1983. — 145 с.
12. Beveridge Malcolm C. M. Cage and pen farming. Carrying capacity models and environmental impact / C. M. Beveridge Malcolm // *FAO. Fish. Techn. Rap.* — 1984. — № 255. — 131 p.
13. Оуэнс М. Биогенные элементы, их источники и роль в речных системах / М. Оуэнс // *Научные основы контроля качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям*. — Л. : Гидрометеиздат, 1977. — С. 54—64.
14. Старко Н. В. Удельные величины загрязнения водоемов-охладителей при выращивании рыбы в садках / Н. В. Старко // *Биоразнообразие и роль животных в экосистемах : VII Междунар. науч. конф. : матер.* — Днепропетровск : Адверта, 2013. — С. 111—113.

REFERENCES

1. Avinskiy, V. A. (1990). Vydelenie i otsenka faktorov opredelyayushchikh kislorodnyy rezhim sadkovykh rybovodnykh khozyaystv (na primere Cherepetskogo rybkhoza). *Sb. nauch. tr. GosNIORKh*, 309, 92-104.
2. Starko, N. V. (1990). Formirovanie kislorodnogo rezhima vodoemov-okhladiteley v rayonakh razmeshcheniya sadkovykh rybnykh khozyaystv. *Vses. konf. mol. uch.* Kiev : Institut gidrobiologii AN USSR, 150-151.
3. Starko, N. V. (2008). Vliyanie sadkovogo rybovodstva na ekologicheskoe sostoyanie vodoemov-okhladiteley. *Ekologichna bezpeka: problemi i shlyakhi virishennya. IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf : zb. nauk. st. (Vol. 1)*. Kharkov, 368-373.

4. VNIIPRKh. (1979). *Vremennye rybovodno-biologicheskie normativy dlya korrektyrovki general'noy skhemy rybokhozyaystvennogo ispol'zovaniya sbrosnykh teplykh vod atomnykh elektrostantsiy i GRES*. Moskva : VNIIPRKh.
5. Grigor'ev, S. S., & Sedova N. A. (2008). *Industrial'noe rybovodstvo (Part 1-2)*. Petropavlovsk-Kamchatskiy : KamchatGTU.
6. Mhlanga, Lindah, Mhlanga, Wilson, & Mwera, Paul. (2013). The application of a phosphorus mass balance model for estimating the carrying capacity of Lake Kariba. *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences*, 37, 316-319.
7. Sterligova, O. P., Kitaev, S. P., & Il'mast, N. V. (2012). Sostoyanie nekotorykh vodoemov Severnoy Karelii i ikh ispol'zovanie dlya tovarnogo vyrashchivaniya raduzhnoy foreli. *Prikladnaya ekologiya Severa: trudy Kol'skogo nauchnogo tsentra RAN*, 3 (10), 2, 40-46.
8. Ordal, Beril, & Pulatsu, Serap. (2012). Using of the computer software for the sustainable rainbow trout cage culture: A case study in Goksekaya Dam Lake (Ankara, Turkey). *Ege J Fish Aqua Sci.*, 29(1), 49-54.
9. Postanovlenie ot 2 iyulya 2007 g. po delu № A07-88/2007. *sudact.ru*. Retrieved from sudact.ru/arbitral/doc/kbhKpmyoFfWJ.
10. Litvinenko, A. I., & Krokhaevskiy, V. R. (2011). *Fermerskoe rybovodstvo na Urale i v Sibiri. Sovremennoe sostoyanie i problemy razvitiya. Akvakul'tura tsentral'noy i vostochnoy Evropy: nastoyashchee i budushchee : II s'ezd NACEE (Seti Tsentrov po akvakul'ture v Tsentral'noy i Vostochnoy Evrope) i seminar o roli akvakul'tury v razvitii sela, Kishinev, 17-19 oktyabrya 2011 g.* Kishinev : Pontos, 145-147.
11. Antipchuk, A. F. (1983). *Mikrobiologiya rybovodnykh prudov*. Moskva : Legkaya i pishchevaya promyshlennost'. 145 p.
12. Beveridge Malcolm C. M. (1984). Sage and pen farming. Carrying capacity models and environmental impact. *FAO. Fish. Techn. Rap.*, 255.
13. Ouens, M. (1977). Biogennyye elementy, ikh istochniki i rol' v rechnykh sistemakh. *Nauchnye osnovy kontrolya kachestva poverkhnostnykh vod po gidrobiologicheskim pokazatelyam*. Leningrad : Gidrometeoizdat, 54-64.
14. Starko, N. V. (2013). Udel'nye velichiny zagryazneniya vodoemov-okhladiteley pri vyrashchivanii ryby v sadkakh. *Bioraznoobrazie i rol' zhivotnykh v ekosistemakh : VII Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya*. Dnepropetrovsk : Adverta, 111-113.

РОЗРАХУНОК ЕКОЛОГІЧНОЇ МІСТКОСТІ ВОДОЙМ-ОХОЛОДЖУВАЧІВ ДЛЯ САДКОВОГО РИБНИЦТВА

Н. В. Старко, nikolaj.starko@gmail.com, Науково-дослідна установа «Український НДІ екологічних проблем», м. Харків

Мета. Встановлення щорічного обсягу вирощування риби в садках, що не призводить до погіршення екологічного стану водойм-охолоджувачів Зміївської ТЕС та Курської АЕС.

Методика. Необхідний для розрахунків питомий (на 1 т вирощеної риби) обсяг внесення біогенних речовин визначався за даними власних досліджень. Для цього на діючих лініях садків проводилося визначення внесення у водойми-охолоджувачі завислих речовин. Розрахунок, проведений за даними рибгоспів, середнього приросту риби за період експозиції пасток дозволив розрахувати питоме надходження завислих речовин від садків. Вплив на якість води штучних кормосумішей які використовуються у рибгоспах, і суміші залишків кормів і фекалій риб, зібраної під садками, оцінювався в умовах лабораторних експериментів. Вплив на якість води метаболітів риб визначався за даними літератури.

Результати. В специфічних умовах досліджених водойм-охолоджувачів у якості лімітуючого екологічного чинника нами визначено мінеральний азот. На підставі екологічно допустимих концентрацій мінерального азоту у воді розраховано можливе зростання вмісту біогенних елементів внаслідок надходження відходів рибиництва. З урахуванням власних даних щодо питомого виносу азоту при інтенсивному веденні садкової аквакультури визначена екологічна місткість водойм-охолоджувачів, яка склала: для Зміївської ТЕС — 281,7 т, для Курської АЕС — 625,5 т.

Наукова новизна. Уперше розрахована екологічна місткість водойм-охолоджувачів Зміївської ТЕС та Курської АЕС I–II черги для садкового рибиництва.

Практична значимість. Застосування викладених у статті результатів дозволить створювати і розвивати садкові рибні господарства без порушення екологічного стану водойм-охолоджувачів електростанцій, на базі яких вони створюються.

Ключові слова: садкові рибні господарства, водойми-охолоджувачі, екологічна місткість водойми для садкового рибиництва.

CALCULATION OF THE ENVIRONMENTAL CAPACITY OF COOLING PONDS FOR CAGE FISH FARMING

N. Starco, nikolaj.starko@gmail.com, Research institution “Ukrainian scientific research institute of ecological problems”, Kharkov

Purpose. The determination of a maximum annual amount of fish reared in cagesm which does not result in the deterioration of the ecological state of water cooling ponds of the Zmiev Thermal Power Plant and Kursk Nuclear Power Plant series I and II.

Methodology. The specific (per 1 ton of farmed fish) nutrient intake necessary for calculations was determined according to the data of own studies. For this purpose, we performed the determination of the input of suspended solids into cooling ponds from cage lines. The calculation of mean fish weight increase during the period of trap exposition based on fish farm data allowed calculating the specific input of suspended solids from cages. The effect of artificial feeds and a mixture of feed residue and fish of fishes collected under cages on water quality were evaluated in the conditions of laboratory experiments. The effect of fish metabolites on water quality was taken into account according to literature data.

Findings. In the specific conditions of the investigated cooling ponds, the environmentally allowable concentrations of biogenic elements are established based on the mineral nitrogen content. With the mean volume of the Zmiev Thermal Power Plant of 40.5 million m³, the total amount of mineral nitrogen, which can be introduced with cage aquaculture residues, is 21.87 tons. When rearing one ton of fish in cages, 91.3 kg of mineral nitrogen get into the cooling pond. Thus, the environmental capacity of the Zmiev Thermal Power Plant cooling pond for cage fish farming is 281.7 tons. Accordingly, the allowable amounts of the production of cage fish farming for the Kursk NPP taking into account N content of 0.406 mgN/dm³ and volume of the cooling pond is 625.5 tons.

Originality. For the first time, we calculated the ecological capacity of cooling ponds of the Zmiev TPP and Kursk NPP, series I–II.

Practical value. Application of the results presented in the paper will allow creating and developing cage fish farms without disturbing the ecological state of cooling ponds of power plant, on the base of which they are created.

Keywords: cages fish farms, water cooling ponds, environmental capacity of water body for fish farming.

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 42-51
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.042>
УДК 639:574.64:57.04

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ НОВОГО ДОБРИВА «ROST-КОНЦЕНТРАТ» НА ГІДРОБІОНТІВ *CYPRINUS CARPIO* L. І *DAPHNIA MAGNA STRAUS*

Н. І. Цьонь, nattcon@ukr.net, Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь
О. М. Ковальчук, koshaom@gmail.com, Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь
Н. Й. Тушницька, n-tushnitska@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. Я. Думич, oks_dum@ukr.net, Львівський державний університет ім. І. Франка, м. Львів
Б. Г. Сярий, rybalyubin@ukr.net, Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь
Р. І. Пірус, rybalyubin@ukr.net, Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь

Мета. Встановити та оцінити параметри гострої токсичності препарату «ROST-концентрат (10+7+7)» для планктонних гіллястовусих ракоподібних *Daphnia magna* Straus та мальків коропа *Cyprinus carpio* L.

Методика. Препарат «ROST-концентрат (10+7+7)» містить цінні для ставової екосистеми макроелементи (азот, фосфор, калій), а також мікроелементи в екологічно безпечній хелатній формі.

Визначали вітальну (LC_{50}), абсолютно летальну (LC_{100}) і медіанну (LC_{50}) концентрації препарату на тест-організмах: ракоподібних *Daphnia magna* і мальках коропа *Cyprinus carpio*. Визначення гострої летальної токсичності препарату на дафнії *D. magna* проводили за стандартизованою методикою ДСТУ 4173:2003, що відповідає міжнародному стандарту ISO 6341:2012, MOD [7]. Температура води під час експерименту становила $20 \pm 0,5^\circ\text{C}$, тривалість — 96 год. Дафній не годували. Випробовували такі концентрації препарату «ROST-концентрат (10+7+7)»: 100; 75; 50; 25; 10; 1; 0,5; 0,1; 0,05; 0,01; 0,005; 0,001 мл/дм³.

Проводили також визначення гострої летальної токсичності препарату для мальків коропа *C. carpio* середньою масою $6,78 \pm 0,63$ г за стандартизованою методикою [8]. Для експерименту використовували ставову воду. В акваріуми об'ємом 40 дм³ було поміщено по 10 екз. риб. Досліджували такі концентрації препарату «ROST-концентрат (10+7+7)»: 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 30; 40 мг/дм³. Тривалість експозиції — 24 год. Температура води — $19 \pm 1^\circ\text{C}$. Медіанну летальну концентрацію LC_{50} препарату розраховували згідно з методикою Г. Кербера.

Результати. У процесі дослідження встановили параметри інтегральної гострої токсичності препарату «ROST-концентрат (10+7+7)» для типових організмів екосистеми рибницьких ставів.

За експозиції 96 год для молоді гіллястовусих ракоподібних *D. magna* летальна концентрація становить $LC_{100} = 5,00$ мл/дм³, медіанна летальна концентрація — $LC_{50} = 0,15$ мл/дм³, вітальна концентрація — $LC_0 = 0,01$ мл/дм³. Препарат «ROST-концентрат (10+7+7)» для молоді гіллястовусих ракоподібних *D. magna*, за шкалою токсичності речовин [11], є слабботоксичним.

© Н. І. Цьонь, О. М. Ковальчук, Н. Й. Тушницька, О. Я. Думич, Б. Г. Сярий,
Р. І. Пірус, 2016

За експозиції 24 год для мальків коропа *C. carpio* летальна концентрація становить $LC_{100} = 40,0$ мл/дм³, медіанна концентрація — $LC_{50} = 18,6$ мл/дм³ (обчислена згідно з методом Г. Кербера), вітальна концентрація — $LC_0 = 7,0$ мл/дм³. Препарат «ROST-концентрат (10+7+7)» для мальків коропа *C. carpio* масою $6,78 \pm 0,63$ г, згідно зі шкалою токсичності речовин [11], є практично нетоксичним.

Наукова новизна. У статті вперше вивчено гостру токсичну дію органо-мінерального препарату «ROST-концентрат (10+7+7)» на планктонних гіллястовусих ракоподібних *D. magna* та мальків коропа *C. carpio*.

Практична значимість. Отримані результати досліджень виявляють дуже незначний рівень токсичності даного препарату для організмів екосистеми рібницьких ставів при його використанні.

Ключові слова: органо-мінеральне добриво, летальна, медіанна, вітальна концентрації, токсична дія, *D. magna*, *C. carpio*.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Важливою умовою для ефективного ведення ставового рибництва є стимулювання природної кормової бази даних водойм. Традиційно з цією метою застосовують органічні і мінеральні добрива. Застосування органічних добрив дозволяє отримати органічну продукцію. Саме цей напрям сільського господарства в теперішній час вважається одним з пріоритетних в Україні і в світі [1, 2].

Сьогодні у процесі роботи дрібні та великі рибогосподарські підприємства стикаються з проблемою нестачі традиційних органічних добрив (гноївка, перегній, посліду сільськогосподарських тварин і птиці, зелені добрива, компости), високої їх вартості або незадовільної якості. Саме тому останнім часом спостерігається зростання інтересу до застосування нових екологічно безпечних добрив [3–6].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Кількість нових екологічно безпечних добрив, що застосовуються в рибних господарствах з метою підвищення рівня розвитку природної кормової бази є незначною. Тому, необхідно вимогою сьогодення є продовження пошуку ефективних альтернативних добрив для рибництва. Найскладнішим моментом у таких розробках є втримання балансу між екологічною безпечністю та підвищенням продуктивності.

З огляду на це, нашу увагу привернув препарат «ROST-концентрат» — новинка в галузі професійних добрив на основі гуматів. Препарат концентрований, тому необхідно було встановити параметри його токсичності для організмів ставової екосистеми для запобігання у майбутньому летальних наслідків від передозування.

Метою роботи було встановлення та оцінка параметрів гострої токсичності препарату «ROST-концентрат (10+7+7)» для планктонних гіллястовусих ракоподібних *Daphnia magna* та мальків коропа.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Об'єктом досліджень були однодобові ракоподібні *Daphnia magna* та мальки коропа.

Визначали вітальну (LC_0), абсолютно летальну (LC_{100}) і медіанну летальну (LC_{50}) концентрації препарату для тест-об'єктів.

У дослідженнях застосовували препарат «ROST-концентрат (10+7+7)» (реєстраційне посвідчення: А03470; дата реєстрації: 18.01.2013; термін реєстрації до 31.12.2022). Даний препарат — це рідина коричневого кольору, що являє собою комплексне органіно-мінеральне добриво. В основу його входить гумат калію. Добриво збагачене макроелементами: азотом (NH_4+NO_3), фосфором (P_2O_5), калієм (K_2O), а також комплексом мікроелементів (S, Mg, Fe, Cu, Mn, B, Zn, Mo, Co) у хелатній формі. Показник рН препарату — 8,0–10,0.

Визначення гострої летальної токсичності препарату проводили за стандартизованою методикою ДСТУ 4173:2003, що відповідає міжнародному стандарту ISO 6341:2012, MOD [7]. Як тест-об'єкт було використано представників ракоподібних — *Daphnia magna* Straus (*Cladocera*). Для цього використовували молоді дафнії віком до 24 год. Для приготування дослідних розчинів брали відстояну водопровідну воду, попередньо збагачену киснем. У скляні посудини наливали по 100 мл досліджуваних розчинів та поміщали по 10 екз. молодих дафній. Повторність — п'ятиразова. Тривалість експозиції за оптимальних умов (при сталій температурі $20\pm0,5^\circ C$) складала 96 год. Дафній не годували. Облік дафній, що вижили, проводили через 24, 48, 96 год. Вода вважається гостротоксичною, якщо загибель тест-організмів за 96 годин становить 50% і більше. Методика базується на встановленні різниці між кількістю загинувших дафній в аналізованій пробі (досліді) і у контролі. Критерієм гострої летальної токсичності у досліді є загибель 50% дафній і більше протягом 96 год. Випробовували такі концентрації препарату «ROST-концентрат (10+7+7)»: 100; 75; 50; 25; 10; 1; 0,5; 0,1; 0,05; 0,01; 0,005; 0,001 мл/дм³.

Проводили також визначення гострої летальної токсичності препарату для мальків коропа *Cyprinus carpio* Linnaeus із середньою масою $6,78\pm0,63$ г за стандартизованою методикою [8]. Перед початком дослідів здійснювали паразитологічне обстеження кожної групи риб. Для дослідів відбирали риб вільних від паразитів. Використовували ставову воду. У акваріуми об'ємом 40 дм³ було поміщено по 10 риб. Досліджували такі концентрації препарату «ROST-концентрат (10+7+7)»: 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 30; 40 мг/дм³. Час експозиції — 24 год. Температура води складала $19\pm1^\circ C$.

Медіанну летальну концентрацію LC_{50} досліджуваного препарату розраховували згідно з методом Г. Кербера [9, 10] за формулою:

$$LC_{50} = LC_{100} - (\Sigma(zd) / m), \text{ де}$$

LC_{100} — доза речовини, яка вивчається, і спричиняє загибель усіх риб у групі;

z — середнє арифметичне з кількості риб, які загинули, або в яких спостерігалася врахована реакція під впливом кожних двох суміжних доз;

d — інтервал між кожними двома суміжними дозами;

m — кількість риб у кожній групі.

Оцінку результатів досліджень здійснювали за шкалою [11] для показника медіанної концентрації LC_{50} :

якщо концентрації $LC_{50} = 1 \text{ мг/дм}^3$ — речовина вважається високотоксичною,

1–10 мг/дм^3 — сильно токсичною,

10–100 мг/дм^3 — помірно токсичною,

>100 мг/дм^3 — слаботоксичною,

> 1000 мг/дм^3 — практично нетоксичною речовиною.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Біотестування на однокішечних гіллястувисих ракоподібних *D. magna* проводили у діапазоні концентрацій від 0,005 до 100 мл/дм^3 .

Результати досліджень показали, що при зниженні дози препарату та тривалості його дії летальний ефект знижувався. На рисунку 1 представлено динаміку зменшення чисельності живих дафній у залежності від зміни умов експерименту.

Рис. 1. Абсолютні показники виживання однокішечних ракоподібних *D. magna* у контролі та за дії різних концентрацій препарату «ROST-концентрат 10+7+7»), %

За експозиції 24 год у серії спадаючих концентрацій препарату «ROST-концентрат (10+7+7)» абсолютно летальна концентрація склала $LC_{100}^{24} = 100 \text{ мл/дм}^3$. Медіанна летальна концентрація становила $LC_{50}^{24} = 50,0 \text{ мл/дм}^3$. Найменшу кількість живих дафній (12%) зафіксовано за концентрації 75 мл/дм^3 . Живі особини зрідка рухали антенами, ковзаючи по дну посудини. Кількісні показники виживання молодих дафній поступово зростали в міру зниження концентрації до вітальної $LC_0^{24} = 0,1 \text{ мл/дм}^3$ (рис. 1).

За умови збільшення тривалості експозиції вдвічі — 48 год. — абсолютно летальна концентрація знизилась до $LC_{100}^{48} = 75 \text{ мл/дм}^3$; медіанна летальна концентрація — у п'ять разів — $LC_{50}^{48} = 10,0 \text{ мл/дм}^3$; вітальна концентрація — у 10 разів — $LC_0^{48} = 0,01 \text{ мл/дм}^3$.

Упродовж 96 год досліджень за концентрації 5,0 мл/дм³ загинули усі тест-організми (LC₁₀₀⁹⁶). За концентрації 0,01 мл/дм³ препарат «ROST-концентрат (10+7+7)» не виявляв гострої летальної дії на ракоподібних *D. magna* (LC₀⁹⁶=0,01 мл/дм³); окрім того чисельність живих дафній на 2% перевищувала таку у контролі. За концентрацій 0,005 та 0,001 мл/дм³ чисельність дафній залишилась початковою, і в середньому на 8,7% перевищувала контрольні показники. У контролі смертність склала 8,0±2,24%, що є у межах допустимої норми [12]. Такі результати вказують на кращі умови середовища у концентраціях 0,01; 0,005; 0,001 мл/дм³, ніж у контролі. Статистичне опрацювання результатів досліджень дозволило отримати графічне їх зображення у вигляді пробіт-аналізу (рис. 2).

Рис. 2. Графічне представлення залежності «пробіт-ефекту» та логарифму концентрації препарату «ROST-концентрат (10+7+7)» для *D. magna*

Згідно з графіком, 5-ти пробітам на осі ординат відповідає логарифмічне значення $\log_{10} = -0,83$ на осі абсцис. За антилогарифмом медіанна концентрація: $LC_{50}^{96} = 0,15 \pm 0,02$ мл/дм³, що у перерахунку складає $0,15$ мл/дм³ = $0,15$ г/дм³ = 150 мг/дм³ (отриманий показник >100 мг/дм³). Отже, згідно класифікації токсичних речовин [11] препарат «ROST-концентрат (10+7+7)» є слаботоксичним.

Результати впливу препарату на виживання мальків коропа представлені у таблиці 1. Також у таблиці подано значення показників (z, d, zd), які необхідні для подальших розрахунків [9, 10].

Таблиця 1. Результати визначення гострої токсичності препарату «ROST-концентрат (10+7+7)» на мальках коропа за експозиції 24 год (n=10)

Показники	Конт- роль	Концентрація препарату, мл/дм ³							
		7	8	9	10	15	20	30	40
Вижило, екз.	10	10	9	9	6	5	4	2	0
Загинуло, екз.	0	0	1	1	4	5	6	8	10
z	-	0,5	1,0	2,5	4,5	5,5	7,0	9,0	-
d	-	1,0	1,0	1,0	5,0	5,0	10,0	10,0	-
zd	-	0,5	1,0	2,5	22,5	27,5	70	90	-

Медіанну летальну концентрацію LC_{50} досліджуваного препарату розраховували згідно з методом Г. Кербера за формулою:

$$LC_{50} = LC_{100} - (\Sigma(zd) / m).$$

Сума добутку вирахованих показників z і d буде дорівнювати:

$$\Sigma(zd) = 0,5 + 1,0 + 2,5 + 22,5 + 27,5 + 70 + 90 = 214,$$

$$LC_{50} = 40,0 - (214,0 : 10) = 18,6 \text{ мл/дм}^3.$$

Таким чином, встановлено, що медіанна летальна доза (LC_{50}) препарату «ROST-концентрат (10+7+7)» для мальків коропа *C. carpio* із масою $6,78 \pm 0,63$ г становить $18,6 \text{ мл/дм}^3$.

За експозиції 24 год препарату «ROST-концентрат (10+7+7)» встановлено, що для мальків коропа *C. carpio* абсолютно летальна концентрація становить $LC_{100}^{24} = 40,0 \text{ мл/дм}^3$, медіанна — $LC_{50}^{24} = 18,6 \text{ мл/дм}^3$, вітальна — $LC_0^{24} = 7,0 \text{ мл/дм}^3$. Показник $LC_{50}^{24} = 18,6 \text{ мл/дм}^3$, що у перерахунку складає $18,6 \text{ г/дм}^3 = 18600 \text{ мг/дм}^3$ (отриманий показник $> 1000 \text{ мг/дм}^3$).

Отже, препарат «ROST-концентрат (10+7+7)» згідно зі шкалою токсичності речовин [11], є практично нетоксичним.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Встановлено параметри інтегральної гострої токсичності препарату «ROST-концентрат (10+7+7)» для типових організмів екосистеми рібницьких ставів.

За експозиції 96 год для молоді гіллястовусих ракоподібних *D. magna* абсолютно летальна концентрація становить $LC_{100} = 5,00 \text{ мл/дм}^3$, медіанна — $LC_{50} = 0,15 \text{ мл/дм}^3$, вітальна — $LC_0 = 0,01 \text{ мл/дм}^3$. Препарат «ROST-концентрат (10+7+7)» для молоді гіллястовусих ракоподібних *D. magna*, згідно зі шкалою токсичності речовин [11], є слаботоксичним.

За експозиції 24 год для мальків коропа *C. carpio* летальна концентрація становить $LC_{100} = 40,0 \text{ мл/дм}^3$, медіанна — $LC_{50} = 18,6 \text{ мл/дм}^3$ (обчислена згідно з методом Г. Кербера), вітальна $LC_0 = 7,0 \text{ мл/дм}^3$. Препарат «ROST-концентрат (10+7+7)» для мальків коропа *C. carpio* масою $6,78 \pm 0,63$ г, згідно зі шкалою токсичності речовин [11], є практично нетоксичним.

Отримані результати досліджень свідчать про дуже незначний рівень токсичності даного препарату для організмів екосистеми при подальшому його використанні у рібницьких ставах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Агробізнес сьогодні. № 10 (281), травень 2014 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://www.agro-business.com.ua/agronomiia-siogodni/2264-prygodni-rezervy.html>.
2. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» № 3421-IV (3421-15) від 09.02.2006 (Із змінами... від 16.10.2012) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3421-15>.
3. Лянзберг О. В. Використання нехарчової риби з метою одержання додаткової рибопродукції / О. В. Лянзберг // Современное состояние рыбного хозяйства: проблемы и пути решения : конф. : матер. — Херсон, 2008. — С. 88—91.

4. Пономаренко Н. М. Відходи пивоварного виробництва у формуванні природної кормової бази аквакультури / Н. М. Пономаренко, В. І. Щербак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. — 2010. — № 2 (43). — С. 405—408. — (Серія : Біологія. Спеціальний випуск : Гідробіологія).
5. Григоренко Т. В. Досвід застосування пивної дробини для удобрення вирощувальних ставів / Т. В. Григоренко // Рибогосподарська наука України. — 2013. — № 4. — С. 24—37.
6. Цьонь Н. І. Підвищення рибопродуктивності ставової екосистеми за рахунок удобрення зерновою бардою / Н. І. Цьонь // Рибогосподарська наука України. — 2015. — № 1 (31). — С. 81—87.
7. Визначення гострої летальної токсичності на *Daphnia magna* Straus та *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg (*Cladocera*, *Crustacea*). ДСТУ 4173:2003. (ISO 6341:2012, MOD) / А. М. Крайнюкова (розроб.). — Офіц. вид. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).
8. Методика визначення гострої летальної токсичності води на рибках *Poecilia reticulates* Peters. КНД 211.1.4.057-97. — К., 1997. — 10 с.
9. Костюкова Н. И. Статистические методы в медицине / Н. И. Костюкова, А. Е. Кудинов // Альманах современной науки и образования [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://scjournal.ru/articles/issn_1993-5552_2011_4_24.pdf (17.09.2014).
10. Коцюмбас І. Я. Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / Коцюмбас І. Я. — Львів : Тріада плюс, 2006. — 360 с.
11. Романенко В. Д. Основы гидроэкологии : ученик / Романенко В. Д. — К. : Генеза, 2004. — 664 с.
12. Коновець І. М. Біотестування токсичності поверхневих вод та донних відкладів за допомогою гіллястовусих ракоподібних *Daphnia magna* Straus та *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg / І. М. Коновець, Л. С. Кіпніс // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод. — К., 2006. — С. 361—385.

REFERENCES

1. Ahrobiznes sohodni (2014). №10 (281), traven 2014. agro-business.com.ua. Retrieved from <http://www.agro-business.com.ua/agronomiia-siogodni/2264-prirodni-rezervy.html>.
2. Zakon Ukrainy Pro priorytetni napriamy rozvytku nauky i tekhniky. Zakon № 3421-IV (3421-15) (2006). Stattia 3. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3421-15>.
3. Lianzberh, O. V. (2008). Vykorystannia nekharchovoi ryby z metoiu oderzhannia dodatkovoi ryboproduktsii. *Sovremennoe sostoianye rybnoho khoziaistva: problemy i puti resheniya*. Kherson, 88-91.
4. Ponomarenko, N. M., & Shcherbak, V. I. (2010). Vidkhody pyvovarnoho vyrobnytstva u formuvanni pryrodnoi kormovoi bazy akvakultury. *Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu*, 2 (43), 405-408.
5. Hryhorenko, T. V. (2013). Dosvid zastosuvannia pyvnoi drobyny dlia udobrennia vyroshchuvalnykh staviv. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 24-37.

6. Tson, N. I. (2015). Pidvyshchennia ryboproduktyvnosti stavovoi ekosystemy za rakhunok udobrennia zemnoiu bardoiu. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1 (31), 81-87.
7. Vyznachannia hostroi letalnoi toksychnosti na *Daphnia magna* Straus ta *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg (*Cladocera*, *Crustacea*). (2004). DSTU 4173:2003. (ISO 6341:2012, MOD) *Natsionalnyi standart Ukrainy*. Kyiv : Derzhspozhyvstandart Ukrainy.
8. Metodyka vyznachennia hostroi letalnoi toksychnosti vody na rybakh *Poecilia reticulata* Peters. (1997). *KND 211.1.4.057-97*. Kyiv.
9. Kostjukova, N. I., & Kudinov, A. E. (2011). Statisticheskie metody v medicine. Al'manah svemennoi nauki i obrazovaniia. *scjournal.ru*. Retrieved from http://scjournal.ru/articles/issn_1993-5552_2011_4_24.pdf (17.09.2014).
10. Kotsiumbas, I. Ya. (2006). *Doklinichni doslidzhennia veterinarynykh likarskykh zasobiv*. Lviv : Triada plus.
11. Romanenko, V. D. (2004) *Osnovy gidroekologii*. Kyiv : Geneza.
12. Konovets, I. M., & Kipnis, L. S. (2006). Biotestuvannia toksychnosti poverkhnevyykh vod ta donnykh vidkladiv za dopomohoiu hilliastovusykh rakopodibnykh *Daphnia magna* Straus ta *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg. *Metody hidroekologichnykh doslidzen poverkhnevyykh vod*. Kyiv : Logos, 361-385.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ НОВОГО УДОБРЕНИЯ «ROST-КОНЦЕНТРАТ» НА ГИДРОБИОНТОВ *CYPRINUS CARPIO* L. И *DAPHNIA MAGNA* STRAUS

Н. И. Цьонь, nattcon@ukr.net, Львовская опытная станция Института рыбного хозяйства НААН, пгт Великий Любень

А. Н. Ковальчук, koshaom@gmail.com, Львовская опытная станция Института рыбного хозяйства НААН, пгт Великий Любень

Н. И. Тушницкая, n-tushnitska@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

О. Я. Думич, oks_dum@ukr.net, Львовский государственный университет им. И. Франко, г. Львов

Б. Г. Сярий, rybalyubin@ukr.net, Львовская опытная станция Института рыбного хозяйства НААН, пгт Великий Любень

Р. И. Пирус, rybalyubin@ukr.net, Львовская опытная станция Института рыбного хозяйства НААН, пгт Великий Любень

Цель. Установить и оценить параметры острой токсичности препарата «ROST-концентрат (10+7+7)» для планктонных ветвистоусых ракообразных *Daphnia magna* Straus и мальков карпа *Cyprinus carpio* L.

Методика. Препарат «ROST-концентрат (10+7+7)» содержит ценные для прудовых экосистем макроэлементы (азот, фосфор, калий), а также микроэлементы в безопасной хелатной форме.

Определяли витальную (LC_{0}), абсолютно летальную (LC_{100}) и медианную летальную (LC_{50}) концентрации препарата на тест-организмах: ракообразных *D. magna* (*Cladocera*) и мальках карпа *C. carpio*. Определение острой летальной токсичности препарата на дафнии *D. magna* проводили по стандартизированной методике ДСТУ 4173:2003, что соответствует международному стандарту ISO 6341:2012, MOD [7]. Температура воды в

течение эксперимента составляла $20 \pm 0,5$ °C, продолжительность экспозиции — 96 ч. Дафний не кормили. Исследовали такие концентрации препарата «ROST-концентрат (10+7+7)»: 100; 75; 50; 25; 10, 1, 0,5; 0,1; 0,05; 0,01; 0,005; 0,001 мл/дм³.

Проводили также определение острой летальной токсичности препарата для мальков карпа *C. carpio* средней массой $6,78 \pm 0,63$ г по стандартизированной методике [8]. Для эксперимента использовали прудовую воду. В аквариумы объемом 40 дм³ было посажено по 10 мальков рыб. Исследовали такие концентрации препарата «ROST-концентрат (10+7+7)»: 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 30; 40 мг/дм³. Продолжительность экспозиции — 24 ч. Температура воды составляла 19 ± 1 °C. Медианную летальную концентрацию LC₅₀ препарата рассчитывали согласно методике Г. Кербера.

Результаты. В процессе исследования установили параметры интегральной острой токсичности препарата «ROST-концентрат (10+7+7)» для типичных организмов экосистемы рыбоводных прудов.

При экспозиции 96 ч для молоди ветвистоусых ракообразных *D. Magna* абсолютно летальная концентрация составляет LC₁₀₀ = 5,00 мл/дм³, медианная — LC₅₀ = 0,15 мл/дм³, витальная — LC₀ = 0,01 мл/дм³. Согласно классификации токсических веществ, препарат «ROST-концентрат (10+7+7)» для молоди ветвистоусых ракообразных *D. magna* является слаботоксичным.

При экспозиции 24 часа для мальков карпа *C. Carpio* абсолютно летальная концентрация составляет LC₁₀₀ = 40,0 мл/дм³, медианная — LC₅₀ = 18,6 мл/дм³ (вычисленная согласно методу Г. Кербера), витальная — LC₀ = 7,0 мл/дм³. Согласно классификации токсических веществ [11], препарат «ROST-концентрат (10+7+7)» для мальков карпа *C. carpio* массой $6,78 \pm 0,63$ г практически нетоксичен.

Научная новизна. В статье впервые изучено острое действие органо-минерального препарата «ROST-концентрат (10+7+7)» на планктонных ветвистоусых ракообразных *D. magna* и мальках карпа *C. carpio*.

Практическая значимость. Полученные результаты исследований обнаруживают очень незначительный уровень токсичности данного препарата и безопасность для организмов экосистемы рыбоводных прудов при его использовании.

Ключевые слова: летальная, медианная, витальная концентрации, токсическое действие, *D. magna*, *C. carpio*, органо-минеральное удобрение.

THE RESEARCH OF ACUTE INFLUENCE OF NEW FERTILIZER «ROST-CONCENTRATE» TO THE HYDROBIONTS *CYPRINUS CARPIO* L. AND *DAPHNIA MAGNA* STRAUS

N. Tson, nattcon@ukr.net, Lviv Research Station of the Institute of Fisheries NAAS, Velykyi Liubin

A. Kovalchuk, koshaom@gmail.com, Lviv Research Station of the Institute of Fisheries NAAS, Velykyi Liubin

N. Tushnytska, n-tushnitska@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

O. Dumych, oks_dum@ukr.net, Lviv State University named after I. Franko, Lviv

B. Syaryy, rybalyubin@ukr.net, Lviv Research Station of the Institute of Fisheries NAAS, Velykyi Liubin

R. Pirus, rybalyubin@ukr.net, Lviv Research Station of the Institute of Fisheries NAAS, Velykyi Liubin

Purpose. To establish and assess acute toxicity parameters of “ROST-concentrate (10+7+7)” acute toxicity for planktonic crustacean *Daphnia magna* Straus and carp fingerlings *Cyprinus carpio* L.

Methodology. “ROST-concentrate (10+7+7)” contains macronutrients (nitrogen, phosphorus, potassium), which are valuable for the pond ecosystem, and trace elements in environmentally safe chelate form.

We determined the vital (LC_0), absolutely lethal (LC_{100}) and median (LC_{50}) drug concentrations on the test organisms such as crustacean *D. magna* (Cladocera) and carp fingerlings *C. carpio*. The determination of acute lethal toxicity on *D. magna* was conducted according to DSTU 4173: 2003 that corresponded to the international standard ISO 6341: 2012, MOD [7]. The temperature of the experiment was 20 ± 0.5 °C. The exposure time – 96 hours. *Daphnia* were not fed. Following “ROST-concentrate (10+7+7)” concentrations were tested: 100; 75; 50; 25; 10; 1; 0.5; 0.1; 0.05; 0.01; 0,005; 0,001 ml/dm³.

We also determined the acute lethal toxicity on carp fingerlings with an average weight of 6.78 ± 0.63 grams following the standardized procedure [8]. Pond water was used in the experiment. Ten fish were placed into a 40 L aquarium. Following concentrations of “ROST-concentrate (10+7+7)” were investigated: 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 30; 40 mg/dm³. The exposure time was 24 hours. Water temperature was 19 ± 1 °C. LC_{50} drug median concentration was calculated according to G. Kerber method.

Findings. The parameters of integral acute toxicity of “ROST-concentrate (10+7+7)” on typical organisms of fish pond ecosystems.

With 96 h exposure on juvenile cladoceran *D. magna*, lethal concentration was $LC_{100} = 5,00$ ml/dm³, median concentration was $LC_{50} = 0,15$ ml/dm³, vital concentration was $LC_0 = 0,01$ ml/dm³. According to the classification of toxic substances, the “ROST-concentrate (10+7+7)” is characterized by low toxicity on juvenile cladoceran *D. magna*.

With 24 h exposure on carp fingerling: lethal concentration was $LC_{100} = 40,0$ ml/dm³, median concentration was $LC_{50} = 18,6$ ml/dm³, vital concentration was $LC_0 = 7,0$ ml/dm³. According to the classification of toxic substances [11], “ROST-concentrate (10+7+7)” was practically nontoxic to 6.78 ± 0.63 g carp juveniles.

Originality. First study of the acute effect of organic-mineral preparation “ROST-concentrate (10+7+7)” on planktonic cladoceran *D. magna* and carp juvenile *C. carpio*.

Practical value. The obtained results show a very low level of toxicity of the drug and safety for organisms of fish-breeding pond ecosystem organisms after its application.

Keywords: lethal, median, vital concentration, toxicity, *D. magna*, *C. carpio*, organic-mineral fertilizer.

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 52–63
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.052>
УДК 639.215(477)(262.05)

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА УЛОВОВ СЕЛЬДИ ЧЕРНОМОРСКО-АЗОВСКОЙ *ALOSA IMMACULATA* BENNETT, 1835 В ДНЕСТРОВСКОМ ЛИМАНЕ ЗА 1994–2016 ГГ.

С. М. Снигирев, snigirev@te.net.ua, Одесский национальный университет имени
И.И. Мечникова, г. Одесса

Цель. Оценить современное состояние сельди черноморско-азовской в Днестровском лимане.

Методика. Отбор ихтиологических проб производили в Днестровском лимане, используя стандартные методики. Для лова рыбы использовали промысловые орудия — жаберные сети с размером ячеи 30–32 мм. При оценке запасов рыб использовали также методические указания: «Методика збору і обробки їхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилову риб з великих водосховищ і лиманів України» (К., 1998); «Методические указания по оценке численности рыб в пресноводных водоемах» (М., 1990). Динамика расхода воды в р. Днестр приведена по наблюдениям на водомерных постах у г. Бендеры и Тирасполь.

Результаты. Представлена динамика вылова, возрастной и половой состав, а также размерно-массовая характеристика сельди черноморско-азовской *Alosa immaculata* Bennett, 1835 в уловах в Днестровском лимане на протяжении 1994–2016 гг. Показана зависимость уловов от величины водности р. Днестр. Установлено, что в современных уловах преобладают 3- (40,5–59,2% общего вылова) и 4-летние (30,7–42,0%) особи. Вследствие интенсивности промысла старшие возрастные группы немногочисленны. Запас сельди, зашедшей в Днестровский лиман в 2016 г., оценен в 221,0 т. Для повышения величины запаса рекомендуется продлить сроки запрета на специализированный промысел сельди в период нерестового хода.

Научная новизна. Представлено современное состояние нерестовой части популяции сельди черноморско-азовской в Днестровском лимане.

Практическая значимость. В работе приведены рекомендации по изменению сроков запрета на специализированный промысел сельди в Днестровском лимане, с целью обеспечения прохода большего числа особей к местам нереста.

Ключевые слова: Днестр, Днестровский лиман, сельдь черноморско-азовская, динамика вылова.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Сельдь черноморско-азовская является традиционным объектом промысла, основанного на вылове производителей в период нерестового хода особей из Черного моря в реки к местам размножения [1, 2, 9]. История исследований биологической структуры популяции этого вида рыб охватывает более чем 50-летний период [3]. Аспекты биологии и экологии сельди, ее нерестовые миграции и связанное с ними рыболовство достаточно изучены в дунайском регионе не только отечественными исследователями, но и ихтиологами Болгарии и Румынии [1, 2, 6, 9, 11]. Район же Нижнего Днестра, объединяющий бассейн реки Днестр от плотины Дубоссарской ГЭС вниз по течению и Днестровский лиман до

© С. М. Снигирев, 2016

Цареградского гирла, где также ежегодно осуществляется добыча сельди, исследован в меньшей степени. Сведения по биологии сельди и особенностям ее нерестового хода в этом районе отрывочны и не дают целостной картины. Между тем, информация о состоянии популяции необходима для достоверной оценки ее запаса, что, в свою очередь, важно для прогнозирования вылова и определения величины предельно допустимого улова при рациональном использовании ресурсов.

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕРЕШЕННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Решение вопросов по оценке запасов сельди черноморско-азовской Дунай-Днестровского междуречья, численность которой подвержена резким циклическим колебаниям в негативно изменяющихся экологических условиях по-прежнему остается актуальным. Не менее актуальным является поиск путей сохранения и увеличения запасов сельди. Это определило цель настоящей работы — оценить современное состояние сельди черноморско-азовской в Днестровском лимане, дать рекомендации, способствующие сохранению и увеличению ее численности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материал собран в Днестровском лимане в ходе комплексных ихтиологических работ на протяжении 1994–2016 гг. Исследования проводили на контрольно-наблюдательном пункте ОдЦ ЮгНИРО, на базе частного рыбодобывающего предприятия «Калкан». Лов рыбы производили стандартными ставными жаберными сетями с шагом ячеи 30–32 мм, длиной 75 м. Биологический анализ выловленной рыбы проводили согласно классическим ихтиологическим методикам [10]. Возраст рыбы определяли по чешуе и отолитам согласно методике [12]. Коэффициенты смертности рыбы рассчитывали по классическим методам [14–16]. При оценке запасов рыб использовали методические указания [4, 5, 17]. Для анализа динамики уловов сельди были использованы архивные и литературные данные, а также статистические материалы, предоставленные Бассейновым управлением «Запчerryбоохрана» [7, 8]. Динамика расхода воды в р. Днестр приведена по наблюдениям на водомерных постах у г. Бендеры и Тирасполь [18]. Статистическую обработку данных производили по общепринятым методикам с использованием программ *Microsoft Excel 2007* и *R*.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Традиционно промысел сельди на украинской части Дунай-Днестровского междуречья ведется в весенний период ее нерестового хода на взморье — приустьевых участках рр. Дунай и Днестр, в основном русле и в рукавах р. Дунай, а также в Днестровском лимане и в русле р. Днестр. На украинской части бассейна Нижнего Днестра основной объем сельди (более 95%) вылавливается в Днестровском лимане. По многолетним наблюдениям Одесского центра ЮгНИРО, объемы вылова сельди в рр. Дунай и Днестр, включая Днестровский лиман, значительно варьируют по годам, обнаруживая относительно схожую динамику (рис. 1).

Согласно данным официальной статистики, годовой вылов сельди в период 1996–2016 гг. в р. Днестр и Днестровском лимане колебался от 1,3 до 62,0 т, в среднем составляя 24,6 т — 9,8% общего вылова сельди в Дунай-Днестровском междуречье (рис. 1).

Рис. 1. Вылов (т) сельди в рр. Дунай и Днестр в 1994–2016 гг. (по данным промысловой статистики)

Ежегодный вылов сельди в р. Дунай, значительно превосходящей р. Днестр по площади водосбора, длине, водности и многим другим гидрологическим параметрам, был на порядок выше и изменялся в пределах от 78,9 до 434,1 т, в среднем составляя 234,7 т (90,2% общего вылова) [7, 8]. Существует распространенное мнение, основанное на данных многолетней динамики промысла предыдущих лет, о том, что численность нерестового стада сельди постоянно испытывает короткие и длинные циклические колебания с различной периодичностью [1]. Так, например, явно выявлен короткий — трехлетний — цикл (два малоурожайных года, один — урожайный) динамики численности нерестового стада и уловов сельди на украинском участке р. Дунай [1]. В результате анализа данных промысловой статистики в период с 1996 по 2016 гг. в р. Дунай выявлены три коротких цикла на протяжении 9 лет — в 2000–2008 гг. и один в 2014–2016 гг. с максимальными уловами в 2002, 2005, 2008 и 2016 гг. соответственно (см. рис. 1). В этот же период промысла сельди в Днестровском лимане и в русле р. Днестр на фоне резких колебаний объемов вылова, с рекордными (более 60 т) уловами в 1997 и 2007 гг. (длинный цикл), отмечен только один подобный трехлетний цикл положительной динамики уловов с 2005 по 2007 гг. с пиком в 2007 г. (см. рис. 1).

Наиболее вероятно, что объемы вылова сельди в этом районе в большей степени зависят от водности р. Днестр. Повышение величины расхода воды в реке в период весеннего половодья в полноводные годы (годовой сток более 10 км³), способно стимулировать заход большего числа половозрелых особей сельди из Черного моря в Днестровский лиман через Цареградское гирло (рис. 2).

Рис. 2. Среднемноголетний вылов сельди (т) в Днестровском лимане и в р. Днестр в зависимости от величины среднегодового стока реки в 1994–2016 гг.

В маловодные годы, при минимальных показателях водности реки, поступление пресной воды в море менее значительно и «вызов» соответственно гораздо слабее. В таких условиях интенсивность преднерестового хода сельди снижается, что очевидно приводит к уменьшению величины ее уловов (см. рис. 2). По многочисленным устным свидетельствам днестровских рыбаков, в такие годы, особенно при сильном устойчивом ветре южного и юго-восточного направлений, сельдь вообще перестает заходить в лиман. Причем прекращение её хода обычно бывает очень резким, в период от 10 до 12 часов. По отдельным наблюдениям, прекращение промысла сельди на Днестровском лимане при продолжительном южном ветре отмечено и в годы средней водности, что затрудняет выявление достоверной зависимости величины уловов сельди от годового стока р. Днестр (Mean Sq — 50,3; F value — 0,139; Pr(>F) — 0,713). Также не позволяют явно выявить такую зависимость и искаженные данные официальной промысловой статистики, которые часто не соответствуют действительности и значительно занижены.

По данным исследований, единичные особи сельди начинают заходить в Днестровский лиман в марте (рис. 3).

Рис. 3. Среднегодовой расход воды ($\text{м}^3/\text{с}$) р. Днестр и вылов сельди (т) по месяцам в Днестровском лимане в 2002–2016 гг.

В отдельные годы ход может продолжаться до II декады мая. Его пик ежегодно приходится на II–III декаду апреля, обычно на несколько (7–12) дней позже, чем в р. Дунай. В это время вылавливается в среднем около 67 кг сельди на одну ставную сеть (длина 75 м, высота 1,2 м, ячея 30–32 мм) в сутки. Отдельные уловы могут достигать до 180 кг сельди на 1 сеть в сутки. Пик хода сельди обычно совпадает с наибольшей величиной расхода воды в период весеннего паводка (см. рис. 3). Как правило, в первой декаде мая вылов сельди значительно снижается. В конце мая, июне и июле в уловах встречаются единичные особи.

В период исследований отмечено, что в Днестровском лимане, как и в р. Дунай, нерестовый ход начинают всегда более крупные особи сельди (модальная группа 26,1–28,0 см). Рыбы меньшего размера (24,1–26,0 см) идут на нерест в р. Днестр в массе позже крупных, и к концу сельдовой путины преобладают в уловах (табл. 1).

Таблица 1. Среднегодовое соотношение размерных групп (%) сельди черноморско-азовской в уловах по декадам в Днестровском лимане в 2011–2016 гг.

Месяц	Декада	Промысловая длина, см													Всего, %
		19,1–20,0	20,1–21,0	21,1–22,0	22,1–23,0	23,1–24,0	24,1–25,0	25,1–26,0	26,1–27,0	27,1–28,0	28,1–29,0	29,1–30,0	30,1–31,0	31,1–32,0	
I	–	–	–	0,9	0,9	2,0	8,5	14,9	27,3	31,0	8,5	3,1	2,0	0,9	100
IV	II	0,7	1,2	1,2	1,2	3,0	11,3	16,0	21,4	22,1	12,3	5,1	3,8	0,7	100
	III	1,3	–	1,3	2,3	5,5	14,2	22	30,5	12,8	5,5	2,3	2,3	–	100
V	I	–	–	1,0	2,2	2,4	30,3	28,0	21,0	8,22	4,7	2,2	–	–	100

Результаты анализа научно-исследовательских и промысловых ловов 2014–2016 гг. показали, что соотношение полов у сельди, выловленной в Днестровском лимане, было не однородно. Самки преобладали в контрольных уловах, составляя 65,4% общего вылова. В отдельных уловах, среди крупных особей (26,1–28,0 см), относительное количество самок достигало 88,0%. Самцы доминировали среди рыб меньшего размера (до 85,0%), что соответствует многолетним наблюдениям не только в районе Нижнего Днестра, но и на р. Дунай.

Средние значения промысловой длины и массы сельди в уловах в Днестровском лимане по возрастным группам в период 2014–2016 гг. изменялись в пределах среднемноголетних значений (табл. 2).

Таблица 2. Средние значения промысловой длины (см) и массы (г) по возрастным группам сельди черноморско-азовской в уловах в Днестровском лимане в 2014–2016 гг.

Год	Показатели	Возрастные группы					
		2	3	4	5	6	7
р. Днестр							
2014	l, см	19,9±2,2	26,5±1,3	28,0±0,9	29,5±1,8	32,0±0,5	—
	m, г	157,6±10,5	220,4±2,5	270,4±12,1	320,4±26,6	370,9±25,4	—
	n, %	5,0	40,5	42,0	10,0	2,5	—
2015	l, см	20,5±1,0	25,4±0,1	27,0±0,3	28,6±0,1	—	—
	m, г	161,9±6,7	212,2±0,2	240,4±2,7	288,0±5,1	—	—
	n, %	6,2	45,9	33,1	14,8	—	—
2016	l, см	22,2±2,9	25,3±0,7	27,2±0,5	28,7±1,7	—	—
	m, г	154,7±4,2	225,1±1,9	269,5±2,2	308,4±7,2	—	—
	n, %	5,2	59,2	30,7	4,9	—	—
ср.зн.*	l, см	20,9±1,2	25,3±1,7	27,1±2,5	29,3±0,5	32,0±0,5	—
	m, г	157,1±3,6	219,8±6,5	255,3±17,1	305,6±16,3	370,9±25,4	—
	n, %	5,7	52,2	31,6	9,7	0,8	—
р. Дунай*							
ср.зн.*	l, см	19,7±2,0	25,7±0,7	28,5±1,0	30,6±0,9	32,0±1,7	31,0±1,2
	m, г	117,1±25,9	227,7±17,4	287,2±21,0	356,1±32,6	424,0±26,9	580,0±25,0
	n, %	2,5	38,2	47,3	9,0	2,5	0,5

Примечание: * — среднемноголетние значения по данным ОдЦ ЮгНИРО [7, 8];

l — промысловая длина, см; m — масса, г; n — количество особей в уловах, %.

Днестровские особи сельди старших возрастных групп (4–6 лет) на всем протяжении исследований были незначительно меньше дунайских (см. табл. 2). Промысел сельди в Днестровском лимане, как и ранее, базировался в основном на вылове 3- (40,5–59,2% общего вылова) и 4-летних (30,7–42,0%) особей (см. табл. 2). Их доля в улове изменялась от 79,0 до 89,9%, что соответствует среднемноголетним данным (83,8%), указанным для этого района и для украинской части р. Дунай (85,5%). Особи старших возрастных групп (5- и 6-

летние) в уловах встречались редко (4,9–12,5%), что свидетельствует о значительной нагрузке промысла, усиление которого в условиях неудовлетворительного водного режима р. Днестр может стать одной из основных причин снижения запасов и уловов сельди в Нижнем Днестре.

Согласно расчетным данным (уравнение Берталанфи [13]), асимптотическая (предельная) длина (L_{∞}); коэффициент замедления скорости роста Брудди (k); теоретический условный возраст, при котором длина рыбы равна нулю (t_0) у сельди, пойманной в Днестровском лимане 2016 г. составляли 34,69 см; 0,41; -0,03 соответственно. Численность и биомасса сельди, зашедшей в Днестровский лиман в 2016 г., оценены в 0,95 млн экз. и 221,0 т при коэффициентах естественной, промысловой (для особей 3 года) и общей смертности 0,48, 0,33 и 0,59 соответственно. В последние 7 лет величина запаса сельди в Днестровском лимане колебалась в значительных пределах — от 17,2 до 235,1 т (рис. 4).

Наиболее вероятно, динамика запаса сельди зависит от ряда факторов, среди которых водность реки и уровень пополнения нерестового стада Дунай-Днестровского междуречья за счет резерва (особей, не принимающих участия в нересте), имеют наибольшее значение. Эта зависимость не позволяет достоверно прогнозировать численность сельди, что, в свою очередь, значительно затрудняет регулирование ее промысла. Очевидно, что слаборегулируемый интенсивный вылов производителей в период нерестового хода может стать основной причиной снижения эффективности нереста, величины пополнения популяции и, в итоге, объемов вылова рыбы.

Рис. 4. Запас сельди (т) в Днестровском лимане и годовая водность р. Днестр в 2010–2016 гг.

В таких условиях возникает необходимость усиления природоохранных мер, в интересах устойчивого рационального использования водных ресурсов

р. Днестр. В связи с этим, а также учитывая международные обязательства Украины в соответствии с п. F 1 Приложения V к Договору между правительством Республики Молдова и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр от 29.11.2012 г., рекомендуется внести поправки в действующие Правила промыслового рыболовства (1998 г.) и продлить сроки запрета на специализированный промысел сельди на украинском участке бассейна Нижнего Днестра:

- в Днестровском лимане, в рукаве Турунчук и в основном русле р. Днестр от устья до с. Паланка (отметка 28 км) — до 10 суток;

- на участке р. Днестр выше с. Паланка — до 14 суток.

Также рекомендуется ввести 10-дневный запрет на специализированный вылов сельди на взморье — в районе, прилегающем к Цареградскому гирлу Днестровского лимана, с целью обеспечить проход большего количества особей сельди к местам нереста.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Годовые уловы сельди в Днестровском лимане ежегодно изменяются в пределах от 1,3 до 62,0 т, в среднем составляя 24,6 т — 9,8% общего вылова сельди в Дунай-Днестровском междуречье. Интенсивность хода и величина улова зависят от водности р. Днестр. Повышение величины расхода воды в реке в полноводные годы стимулирует заход большего числа половозрелых особей сельди, что приводит к увеличению объемов ее вылова. Пик хода сельди приходится на II–III декаду апреля. В уловах преобладают 3- (40,5–59,2% общего вылова) и 4-летние (30,7–42,0%) особи. Старшие возрастные группы (5- и 6-летние) немногочисленны (4,9–12,5% общего вылова), что свидетельствует о значительной нагрузке промысла. Согласно расчетным данным, запас сельди, зашедшей в Днестровский лиман в 2016 г., составил 221,0 т. В целях охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр, а также, учитывая международные обязательства Украины, рекомендуется продлить сроки запрета на специализированный промысел сельди на украинском участке бассейна Нижнего Днестра.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бушуев С. Г. Современные данные о состоянии нерестового стада дунайской сельди *A. kessleri pontica* (Eichwald, 1838) в 1994–95 годах / С. Г. Бушуев // Тр. ЮгНИРО. — Керчь : ЮгНИРО, 1996. — С. 254–258.
2. Кукурадзе А. М. Особенности нерестового хода дунайской сельди *Caspialosa caspia nordmanni* (Antipa) в 1961 г. / А. М. Кукурадзе // Вopr. Ихтиологии. — 1964. — Т. 4, вып. 2 (31). — С. 387–389.
3. Межжерин С. В. Морфологическая структура популяций сельди *Alosa pontica* s.l. (*Clupeiformes*, *Alosiinae*) Дуная и ее изменения за 50-летний период // С. В. Межжерин, Л. В. Федоренко. — Вестник зоологии. — 2007. — Т. 41, № 2. — С. 131–141.

4. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України / ІРГ УААН. — К., 1998. — 47 с.
5. Методические указания по оценке численности рыб в пресноводных водоемах / Науч.-произв. об-ние по рыбоводству, ВНИИ прудового рыб. хоз-ва. — М. : ВНИИПРХ, 1990. — 50 с.
6. Мороз В. Н. Характеристика состояния нерестового стада дунайской сельди *Alosa kessleri pontica* Eichw. в 1963–67 гг. / В. Н. Мороз // Вопр. ихтиологии. — 1969. — Т. 9, вып. 4 (57). — С. 640–650.
7. Оценить состояние промысловых объектов во внутренних водоемах Северо-западного Причерноморья и на прилежащем шельфе Черного моря, изучить динамику их численности для определения возможных лимитов изъятия и регулирования рыболовства, разработать долгосрочные прогнозы промысловой обстановки : отчет по НИР / ГП «ОдЦ ЮгНИРО». — Одесса, 2013. — 105 с.
8. Оценить состояние промысловых объектов во внутренних водоемах Северо-западного Причерноморья и на прилежащем шельфе Черного моря, изучить динамику их численности для определения возможных лимитов изъятия и регулирования рыболовства, разработать долгосрочные прогнозы промысловой обстановки : отчет по НИР / ГП «ОдЦ ЮгНИРО». — Одесса, 2015. — 137 с.
9. Павлов П. И. Биологическая и промысловая характеристика нерестового стада дунайской сельди / П. И. Павлов // Тр. Ин-та гидробиологии АН УССР. — 1953. — № 28. — С. 118–173.
10. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных) / Правдин И. Ф. — М. : Пищ. пром-сть, 1966. — 375 с.
11. Сердюк А. В. Дунайская сельдь (*Alosa kessleri pontica* Eichw.) / А. В. Сердюк // Сырьевые ресурсы Черного моря. — Керчь : АзЧерНИРО, 1979. — С. 215–223.
12. Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб / Чугунова Н. И. — М. : Изд-во АН СССР, 1959. — 164 с.
13. Bertalanffy van L. A quantitative theory of organic growth / van L. Bertalanffy // Hum. Biol. — 1938. — Vol. 10. — P. 181–213.
14. Beverton R. J. H. A review of methods for estimating mortality rates in fish populations, with special reference to sources of bias in catch sampling / R. J. H. Beverton, S. J. Holt // Rapp. P.-V. Reun. CPIEM. — 1956. — Vol. 140. — P. 67–83.
15. Beverton R. J. H. Manual of methods for fish stock assessment. Part II. Tables of yield function / R. J. H. Beverton, S. J. Holt // FAO Fish. Biol. Tech. Pap. — 1966. — Vol. 38. — 67 p.
16. Pauly D. On the interrelationships between natural mortality, growth parameters and mean environmental temperature in 175 fish stocks / D. Pauly // J. Cons. Int. Explor. Mer. — 1980. — Vol. 39. — P. 175–192.
17. Ricker W. E. Computation and interpretation of biological statistics of fish population / W. E. Ricker // Bull. Fish. Res. Bd. Can. — 1975. — Vol. 191. — 382 p.
18. Оценка возможности регулируемого нерестилища на правом берегу Днестра [Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://www.2.unece.org/ehlm/32931845/Feasability_Study_SpawningPlace_rus_print.pdf.

REFERENCES

1. Bushuev, S. G. (1996). Sovremennye dannye o sostoyanii nerestovogo stada dunayskoy sel'di *A. kessleri pontica* (Eichwald, 1838) v 1994–95 godakh. *Tr. YugNIRO*, 254-258.
2. Kukuradze, A. M. (1964). Osobennosti nerestovogo khoda dunayskoy sel'di *Caspialosa caspia nordmanni* (Antipa) v 1961 g. *Vopr. ikhtiologii*, 4, 2 (31), 387-389.
3. Mezhzherin, S. V., & Fedorenko, L. V. (2007). Morfologicheskaya struktura populyatsiy sel'di *Alosa pontica* s.l. (*Clupeiformes, Alosiinae*) Dunaya i ee izmeneniya za 50-letniy period. *Vestnik zoologii*, 41, 2, 131-141.
4. IRH UAAN. (1998). *Metodyka zboru i obrobky ikhtiolohichnykh i hidrobiolohichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoskhovyshch i lymaniv Ukrainy*. Kyiv.
5. Sechin, Ju. T. (Ed.). (1990). *Metodicheskie ukazaniya po ocenke chislennosti ryb v presnovodnykh vodoemakh*. Moskva : VNIIPRH.
6. Moroz, V. N. (1969). Kharakteristika sostoyaniya nerestovogo stada dunayskoy sel'di *Alosa kessleri pontica* Eichw. v 1963-67 gg. *Vopr. ikhtiologii*, 9, 4 (57), 640-650.
7. OdTs YugNIRO. (2013). *Otsenit' sostoyanie promyslovykh ob'ektov vo vnutrennikh vodoemakh Severo-zapadnogo Prichernomor'ya i na prilezhashchem shel'fe Chernogo morya, izuchit' dinamiku ikh chislennosti dlya opredeleniya vozmoznykh limitov iz'yatiya i regulirovaniya rybolovstva, razrabotat' dolgosrochnye prognozy promyslovoy obstanovki* : Otchet po NIR. Bushuev, S. G. (Ed.). Odessa.
8. OdTs YugNIRO. (2015). *Otsenit' sostoyanie promyslovykh ob'ektov vo vnutrennikh vodoemakh Severo-zapadnogo Prichernomor'ya i na prilezhashchem shel'fe Chernogo morya, izuchit' dinamiku ikh chislennosti dlya opredeleniya vozmoznykh limitov iz'yatiya i regulirovaniya rybolovstva, razrabotat' dolgosrochnye prognozy promyslovoy obstanovki* : Otchet po NIR. Bushuev, S. G. (Ed.). Odessa.
9. Pavlov, P. I. (1953). Biologicheskaya i promyslovaya kharakteristika nerestovogo stada dunayskoy sel'di. *Tr. In-ta gidrobiologii AN USSR*, 28, 118-173.
10. Pravdin, I. F. (1966). *Rukovodstvo po izucheniyu ryb (preimushchestvenno presnovodnykh)*. Moskva : Pishch. prom-st'.
11. Serdyuk, A. V. (1979). Dunayskaya sel'd' (*Alosa kessleri pontica* Eichw.). *Syr'evye resursy Chernogo morya*. Kerch': AzCherNIRO, 215-223.
12. Chugunova, N. I. (1959). *Rukovodstvo po izucheniyu vozrasta i rosta ryb*. Moskva : Izd-vo AN SSSR.
13. Bertalanffy van, L. (1938). A quantitative theory of organic growth. *Hum. Biol.*, 10, 181-213.
14. Beverton, R. J .H., & Holt, S. J. (1956). A review of methods for estimating mortality rates in fish populations, with special reference to sources of bias in catch sampling. *Rapp. P.-V. Reun. CPIEM*, 140, 67-83.
15. Beverton, R. J .H., & Holt, S. J. (1966). Manual of methods for fish stock assessment. Part II. Tables of yield function. *FAO Fish. Biol. Tech. Pap.*, 38.
16. Pauly, D. (1980). On the interrelationships between natural mortality, growth parameters and mean environmental temperature in 175 fish stocks. *J. Cons. Int. Explor. Mer.*, 39, 175-192.

17. Ricker, W. E. (1975). Computation and interpretation of biological statistics of fish population. *Bull. Fish. Res. Bd. Can.*, 191.
18. Otsenka vozmozhnosti sozdaniya reguliruemogo nerestilishcha na pravom beregu Dnestra. [2.unece.org](https://www.2.unece.org/ehtml/32931845/Feasability_Study_SpawningPlace_rus_print.pdf). Retrieved from https://www.2.unece.org/ehtml/32931845/Feasability_Study_SpawningPlace_rus_print.pdf.

ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА УЛОВІВ ОСЕЛЕДЦЯ ЧОРНОМОРСЬКО-АЗОВСЬКОГО *ALOSA IMMACULATA* BENNETT, 1835 В ДНІСТРОВСЬКОМУ ЛИМАНІ, ЗА 1994–2016 РР.

С. М. Снігірьов, snigirev@te.net.ua, Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова, м. Одеса

Мета. Оцінити сучасний стан оселедця чорноморсько-азовського в Дністровському лимані.

Методика. Відбір іхтіологічних проб здійснювали у Дністровському лимані, використовуючи стандартні методики. Для лову риби використовували промислові знаряддя — зяброві сітки з розміром вічка 30–32 мм. Оцінку запасів здійснювали за такими методичними вказівками: «Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилову риб з великих водосховищ і лиманів України» (К., 1998); «Методические указания по оценке численности рыб в пресноводных водоемах» (М., 1990). Динаміка витрат води в р. Дністер наведена за спостереженнями на водомірних постах у м. Бендери і Тирасполь.

Результати. Наведено динаміку вилову, віковий та статевий склад, а також розмірно-масову характеристику оселедця чорноморсько-азовського *Alosa immaculata* Bennett, 1835 в уловах у Дністровському лимані протягом 1994–2016 рр. Показана залежність уловів від величини водності р. Дністер. Встановлено, що в сучасних уловах переважають 3- (40,5–59,2% загального вилову) та 4-річні (30,7–42,0%) особини. Внаслідок інтенсивності промислу старші вікові групи малочисленні. Запас оселедця, що зайшов в Дністровський лиман в 2016 р., оцінений у 221,0 т. Для підвищення величини запасу рекомендується збільшити період заборони на спеціалізований промисел оселедця в період нерестового ходу.

Наукова новизна. Представлено сучасний стан нерестової частини популяції оселедця чорноморсько-азовського у Дністровському лимані.

Практична значимість. В роботі наведено рекомендації щодо зміни термінів заборони на спеціалізований промисел оселедця у Дністровському лимані, з метою забезпечення проходження більшого числа особин до місць нересту.

Ключові слова: Дністер, Дністровський лиман, оселедець чорноморсько-азовський, динаміка вилову.

DYNAMICS AND STRUCTURE OF THE HERRING (*ALOSA IMMACULATA*) CATCHES IN THE DNIESTER ESTUARY DURING THE 1994–2016 YEARS

S. Snigirov, snigirev@te.net.ua, Odesa National I. Mechnikov University, Odesa

Purpose. To assess the current state of the Pontic shed in the Dniester estuary.

Methodology. Ichthyological samples has been collected in the Dniester estuary according to standard methods. Fish has been caught using gill nets with 30–32 mm mesh size. The methodical guidelines “Metodiki zboru i obrobki ihtiologichnih i gidrobiologichnih materialiv z metoju viznachennja limitiv promislovogo viluchennja rib z velikih vodoshovishh i limaniv Ukrainy” (Kyiv, 1998) and “Metodicheskie ukazaniya po ocenke chislennosti ryb v presnovodnyh vodoemah” (Moskva,

1990) were used for fish stock assessment. The dynamics of water discharge in the Dniester River was presented based on the observations at gauging stations in Bendery and Tiraspol.

Findings. The data of catch dynamics, age and sex composition, length-weight characteristics of the Pontic shed *Alosa immaculata* Bennett, 1835 in the Dniester estuary 1994–2016 have been presented in the paper. According to official statistics data, the annual catch of the Pontic shed in the Dniester River and Dniester estuary in 1996–2016 ranged from 1.3 to 62.0 tons, with an average of 24.6 tons — 9.8% of the total catch of the Pontic shed in the Danube-Dniester interfluvies.

A dependence of catch amounts on the water regime of the Dniester River has been observed. An increase in the water flow rate in the river during the spring flood in full-flowing years (annual flow of more than 10 km^3), contributes to an increase in the Pontic shed catch in the Dniester estuary. Currently, catches are dominated by age-3 (40.5–59.2% of the total catch) and age-4 (30.7–42.0%) fish. Older age groups are not numerous. Sex ratio was unequal. Females predominated in the control catches, accounting for 65.4% of the total catch. The stock of the Pontic shed entering the Dniester estuary in 2016 was estimated to be 221.0 tones. We recommended to extend the ban of the specialized Pontic shed fishing during the spawning period.

Originality. The current state of the spawning stock of the Pontic shed population in the Dniester estuary is presented.

Practical value. It is recommended to change the timing of the ban on the specialized Pontic shed fishing in the Dniester estuary, to ensure the passage of a greater number of individuals to the spawning grounds.

Keywords: Dniester, Dniester estuary, Pontic shed, catch dynamics.

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 64-75
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.064>
УДК 597.554.3 (282.247.322.171)

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ВІКОВА СТРУКТУРА ТА ТЕМП РОСТУ КРАСНОПІРКИ (*SCARDINIUS ERYTHROPHthalmus* L., 1758) ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКОЇ ГИРЛОВОЇ СИСТЕМИ

К. М. Гейна, Geina_k@mail.ru, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати основні біологічні характеристики промислового стада краснопірки *Scardinius erythrophthalmus* (Linnaeus, 1758) Дніпровсько-Бузької гирлової системи в умовах зарегульованого стоку Дніпра.

Методика. Морфологічні особливості визначені на підставі аналізу меристичних та пластичних ознак. При оцінці біологічного стану промислового стада краснопірки основна увага приділялася віковій, статевій структурі, плодючості, характеристикам лінійно-вагового росту та вгодованості. Іхтіологічний матеріал відібрано в процесі роботи контрольно-спостережних пунктів Інституту рибного господарства НААН, діяльність яких була регламентована протокольними рішеннями науково-промислової ради Держрибагенства України. Польова та камеральна обробка зібраних матеріалів проведена за загальновизнаними в практиці іхтіологічних досліджень методиками та керівництвами.

Результати. Аналіз меристичних ознак краснопірки Дніпровсько-Бузької гирлової системи показав, що формули плавців є наступними: D — III 7-9 (10) ($M=8,19\pm0,14$); A — III 10-12 ($M=10,81\pm0,17$); P — I (12) 13-15 (16) ($M=14,26\pm0,18$); V — II 7-8 ($M=7,78\pm0,08$). У бічній лінії нараховується від 38 до 47 лусочок ($M=42,63\pm0,65$). Над лінією розташовано 7–8 ($M=7,67\pm0,09$), а під нею — 5–6 ($M=5,26\pm0,09$) поперечних рядів.

Особливістю сучасного біологічного стану стада є стабільність вікової структури з домінуванням молодших вікових груп. Зростання частки граничних груп правого крила вікового ряду на фоні незначної тенденції зниження частки п'ятирічок вказує на посилений тиск (як промисловий, так і аматорський) на чисельність поповнення. Відповідним підтвердженням цьому є і зростання середнього вираженого віку промислового стада з 4,16–4,17 р. до 4,26–4,31 р.

Статева структура є характерною для більшості коропових риб. Відмічена тенденція домінування самиць у молодших вікових групах, самиць — у старших. Загалом по стаду статеве співвідношення було практично рівним (1:0,96), але з незначним переважанням самиць.

Темп лінійно-вагового росту є достатньо інтенсивним. Найбільш мінливі характеристики росту відмічалися у чотирирічок, що пов'язувалося зі статевим дозріванням. Абсолютна індивідуальна плодючість змінювалася від $11,02\pm0,26$ тис. ікр. у трирічок до $132,56\pm1,48$ тис. ікр. у семирічок. При цьому варіабельність (Cv) поступово знижувалася від 5,27% до 2,50% відповідно до вказаних вікових груп.

Вгодованість краснопірки є задовільною. В залежності від віку вона змінювалася в межах від ($K_{ф\text{у\text{л}т}}$) $2,27\pm0,02$ до $2,58\pm0,03$ при варіабельності показників $Cv=1,46\text{--}2,49\%$.

Наукова новизна. Суттєво поновлені дані щодо морфологічної будови краснопірки басейну р. Дніпро, особливо його нижньої течії, в умовах трансформованого стоку. Також доповнена існуюча інформація щодо вікової, статеві структури, плодючості та темпу лінійно-вагового росту.

Практична значимість. Отримані в процесі досліджень сучасні дані мають стати науковим підґрунтям оптимізації промислового навантаження на аборигенну іхтіофауну Дніпровсько-Бузької гирлової системи, що безсумнівно набуває актуальності в сенсі природоохоронних заходів щодо збереження біорізноманіття трансформованих акваторій України.

Ключові слова. Дніпровсько-Бузька гирлова система, краснопірка, меристичні, пластичні ознаки, вікова, статева структура, плодючість, темп росту, вгодованість.

© К. М. Гейна, 2016

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Початок досліджень приморських лиманів північно-західної частини Чорного моря припадає на другу половину XIX ст. Проте роботи того часу більшою мірою мали флористичну та фауністичну спрямованість.

Іхтіологічні дослідження розпочалися вже у XX ст. Перша найбільш повна промислово-біологічна характеристика іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової системи представлена у відомій монографії О. І. Амброза [1], де було охоплено період 30–40-х р. XX ст. Подальші дослідження інших авторів стосувалися впливу гідробудівництва на Дніпрі, на стан запасів промислових риб Дніпровсько-Бузької гирлової системи [2–4], та висвітленню основних біологічних показників представників промислової іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової системи на перших етапах зарегулювання стоку Дніпра.

Достатньо повна характеристика біологічних особливостей краснопірки природних водойм України представлена у публікації Ю. В. Мовчана та А. І. Смірнова [5]. У цитованій роботі надана морфо-біологічна характеристика краснопірки за матеріалами кінця 60-х – початку 70-х років минулого століття. Сучасні дослідження стосувалися більшою мірою екології живлення та трофічних взаємовідносин краснопірки Дніпровського лиману [6–7].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

За нашого часу Дніпровсько-Бузька гирлова система, до складу якої входять пониззя Дніпра, Південного Бугу, Дніпровський та Бузький лимани, є цілісною рибогосподарською водоймою загальнодержавного значення. На даній акваторії здійснюються комплексні дослідження з вивчення біологічного стану іхтіофауни, де більша увага приділяється цінним видам, які займають провідні позиції у промислі.

В той же час питанням вивчення представників промислової іхтіофауни аборигенів, які не здійснюють суттєвих переміщень по акваторії гирлової системи, приділяється менше уваги. Існуюча на сьогодні доступна інформація є доволі обмеженою, що обумовлює актуальну необхідність проведення досліджень, орієнтованих на вивчення сучасного стану промислового стада краснопірки Дніпровсько-Бузької гирлової системи.

Головною метою дослідження є вивчення основних рис біології краснопірки (*Scardinius erythrophthalmus* (Linnaeus, 1758)) Дніпровсько-Бузької гирлової системи в трансформованих умовах стоку Дніпра.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Іхтіологічні дослідження проводилися на акваторії Дніпровсько-Бузької гирлової системи протягом 2011–2015 рр. Матеріал зібрано на стаціонарних контрольно-спостережних пунктах Інституту рибного господарства НААН, діяльність яких регламентувалася рішеннями науково-промислової ради Держрибгенства України у відповідності до чинного законодавства.

Збір матеріалів здійснено за загальноновизнаними в практиці рибогосподарських досліджень методиками та керівництвами. Іхтіологічний моніторинг базувався на контрольних (включаючи заборонний період) та промислових ловах. Лінійно-вагова структура та морфологічні особливості промислового стада краснопірки встановлені за схемою, яка надана у методиці І. Ф. Правдіна [8]. Вікову структуру стада визначали за методичними розробками В. Л. Брюзгіна [9] та Н. І. Чугунової [10]. Математична обробка отриманих результатів виконана за З. М. Аксютіною [11] з використанням електронних таблиць редактора Microsoft Office Excel 2003.

Аналіз меристичних та пластичних ознак здійснено на 64 екз. краснопірки. При цьому на неповний біологічний аналіз оброблено 675 екз., а плодючість визначена у 80 екз. Проаналізований іхтіологічний матеріал дав змогу з певною мірою достовірності оцінити сучасний стан промислового стада краснопірки Дніпровсько-Бузької гирлової системи.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Краснопірка у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі розповсюджена переважно у заплавах систем Дніпра, Південного Бугу та на прибережних ділянках Дніпровського лиману вздовж Кінбурської коси. Встановлено, що значних переміщень вона не здійснює.

Аналіз меристичних ознак сучасного стада краснопірки вказує на те, що у дорсальному та анальному плавцях нараховується по 3 жорстких променя, а у грудних та черевних — відповідно 1 та 2. Кількість розгалужених променів плавців є наступною: D — 7-9 ($M=8,19\pm0,14$); A — 10-12 ($M=10,81\pm0,17$); P — 13-15 ($M=14,26\pm0,18$); V — 7-8 ($M=7,78\pm0,08$). У бічній лінії нараховується від 38 до 47 ($M=42,63\pm0,65$) лусочок. При цьому над лінією (S_{gu1}) розташовано 7-8 ($M=7,67\pm0,09$), а під нею (S_{gu2}) — 5-6 ($M=5,26\pm0,09$) поперечних рядів.

Аналіз пластичних ознак показав, що тіло у краснопірки високе, дещо видовжене. Найбільша висота становить $H=31,75\pm0,36\%$ промислової довжини. За варіабельності ознаки $C_v=5,9\%$ мінімальні та максимальні показники дорівнюють відповідно 28,6 та 33,7%.

Хвостове стебло відносно довге — $pl=19,56\pm0,20\%$ ($lim=17,4-21,3\%$), але невисоке — $iH=8,62\pm0,11\%$. Голова займає приблизно 1/5 частину промислової довжини ($lc=21,26\pm0,26\%$; $lim=18,2-23,3\%$).

Грудні плавці розташовані дещо позаду дистального краю зябрової кришки — $aP=23,21\pm0,36\%$. Черевні плавці розміщені не доходячи до вертикалі через початок основи дорсального плавця — $aV=48,19\pm0,54\%$. При цьому спинний плавець розміщений позаду середньої вертикалі тіла — $aD=56,41\pm0,59\%$ при $lim=18,2-23,3\%$.

Анальний плавець знаходиться далеко позаду від кінця основи спинного плавця — $aA=72,56\pm0,90\%$. Відстані між грудними, черевними і анальним плавцями майже не відрізняються і становлять $PV=25,62$ та $VA=25,88\%$ промислової довжини тіла. При цьому грудні плавці дещо довші, ніж черевні — відповідно 18,32 та 16,05% (табл. 1).

Таблиця 1. Пластичні ознаки краснопірки Дніпровсько-Бузької гирлової системи, n=64 екз.

Ознака	M	$\pm m$	Cv, %	min	max
l, см	21,41	0,76	18,5	15,0	25,8
У % до l					
l cor	79,17	0,50	3,3	75,9	86,4
H	31,75	0,36	5,9	28,6	33,7
h	8,62	0,11	6,4	7,8	9,4
iH	12,91	0,12	4,7	12,2	14,0
aD	56,41	0,59	5,5	50,6	60,0
pD	34,23	0,46	5,5	29,9	39,1
aP	23,21	0,36	10,3	19,8	26,7
aV	48,19	0,54	5,8	42,6	52,7
aA	72,56	0,90	6,4	65,1	83,3
PV	25,62	0,23	4,7	24,2	27,9
VA	25,88	0,28	5,7	22,8	27,3
l-D	12,78	0,21	8,3	11,2	15,3
h-D	16,35	0,40	12,9	13,2	20,4
l-A	14,35	0,28	10,3	11,6	16,1
h-A	13,69	0,30	11,2	10,5	16,0
l-P	18,32	0,29	8,4	14,9	20,7
l-V	16,05	0,30	9,6	14,0	19,3
p-l	19,56	0,20	5,3	17,4	21,3
lc	21,26	0,26	6,5	18,2	23,3
У % до lc					
ar	26,04	0,71	14,1	20,8	32,5
do	25,56	0,43	8,7	22,0	29,4
pc	49,61	0,35	3,6	47,1	52,5
hc	87,14	0,79	4,7	80,0	93,6
io	42,19	1,10	13,5	37,7	60,0

Голова у краснопірки є досить високою — $hc=87,14\pm0,79\%$ ($lim=80,0-93,6\%$). Довжина рила і діаметр ока значно не відрізняються і дорівнюють в середньому $26,04\pm0,71\%$ та $25,56\pm0,43\%$ відповідно. При цьому позаоковий простір є майже вдвічі більшим, ніж діаметр ока, і становить $ro=49,61\pm0,35\%$ довжини голови.

Вікова структура краснопірки Дніпровсько-Бузької гирлової системи характеризується певною стабільністю. Віковий ряд протягом 2011–2015 рр. був сталим, а кількість вікових груп дорівнювала п'яти. Наймолодшою групою були трирічки, найстаршою — семирічки.

Домінували постійно дві вікові групи — трирічки та чотирирічки. Їх частка у загальній структурі стада була вирішальною і коливалася по роках спостережень від 64,9% (2013 р.) до 70,8% (2012 р.). При цьому наповнюваність правого крила вікового ряду також була відносно задовільною. Частка граничних груп (шестирічок та семирічок) була стабільно високою, і протягом 2013–2015 рр. становила 19,8–21,0%% загальної чисельності промислового стада. Проте для п'ятирічок було характерним зниження частки від 16,2% у 2011 р. до 12,9% — у 2015 р. (табл. 2).

Таблиця 2. Вікова структура промислового стада краснопірки Дніпровсько-Бузької гирлової системи

Роки	Вік, років					Середня, років	n, екз.
	3	4	5	6	7		
2011	35,9	32,1	16,2	10,4	5,4	4,17	130
2012	32,3	38,5	15,3	8,7	5,2	4,16	145
2013	33,7	31,2	14,1	12,1	8,9	4,31	125
2014	34,6	32,7	13,8	10,4	8,5	4,26	140
2015	32,8	34,5	12,9	12,5	7,3	4,27	135

Лінійний ріст краснопірки є відносно інтенсивним, а крива росту характеризується повільною стабільністю. У трирічному віці довжина тіла змінювалася в межах від 10,8 до 11,8 см, а середній показник склав $11,32 \pm 0,17$ см. Найбільш суттєві відхилення від середньої довжини відмічені у чотирирічок — за $M=14,48 \pm 0,31$ см та $lim=13,6-15,2$ см варіабельність становила $Cv=4,77\%$, що є найвищим показником серед зареєстрованих вікових груп.

Зі збільшенням віку мінливість середньої довжини тіла знижувалася, була відносно стабільною і коливалася в межах $Cv=1,98-2,1\%$, з певною тенденцією до зниження у граничній групі правого крила вікового ряду. При цьому відхилення за абсолютними величинами також були несуттєвими (рис. 1).

Темп росту маси тіла у дослідженій частині стада краснопірки був достатньо високим. Найбільш мінливою ця характеристика росту спостерігалася також у чотирирічок. За проаналізованими роками в цій групі маса краснопірки змінювалася в межах від 58 до 83 г, що обумовлювалося масовим дозріванням самиць.

Варіабельність була найвищою по стаду, і становила $Cv=15,56\%$ за середньої маси чотирирічок $M=72,0 \pm 5,0$ г. Зі збільшенням віку мінливість маси тіла у краснопірки закономірно знижувалася ($Cv=5,90-7,34\%$), проте за абсолютними величинами відхилення залишалися суттєвими.

Рис. 1. Динаміка вікових змін лінійних розмірів та маси тіла краснопірки (усереднені показники)

Означена динаміка змін лінійно-вагової структури обумовлювалася характером дозрівання плідників краснопірки та відповідною статеву структурою. Спостереження показали, що у віці чотирьох років відмічається практично стовідсоткова статева зрілість стада (табл. 3).

Таблиця 3. Статеву структуру стада краснопірки Дніпровсько-Бузької гирлової системи (усереднені дані 2011–2015 рр., %)

Вік, років	Самиці		Самці		Співвідношення ♀:♂
	екз.	%	екз.	%	
3	89	39,0	139	61,0	1:1,56
4	110	48,0	119	52,0	1:1,08
5	55	56,1	43	43,9	1:0,78
6	52	71,2	21	28,8	1:0,40
7	39	83,0	8	17,0	1:0,21
Загалом	345	51,1	330	48,9	1:0,96

Статеве співвідношення у стаді є досить характерним для більшості корокових з динамікою домінування у молодших групах самців, а у старших — самиць. У трирічок статеве співвідношення становило 1:1,56, що обумовлювалося повним дозріванням самців і неповним — самиць. Проте у чотирирічок воно вирівнялося і частка самців і самиць наблизилася майже до однакових показників — відповідно 52,0 та 48,0%. Зі збільшенням віку кількість самців знижувалася, домінували самиці і у семирічок їх частка дорівнювала 83%.

Така закономірна динаміка статевої структури краснопірки обумовила оптимальне статеве співвідношення загалом по стаду, коли частка самиць склала 51,1%, а самців — 48,9%.

Абсолютна індивідуальна плодючість краснопірки змінювалася в залежності від віку самиць у досить широких межах: від $11,02 \pm 0,26$ тис. ікр. у трирічок до $132,56 \pm 1,48$ тис. ікр. у семирічок. При цьому варіабельність C_v поступово знижувалася від 5,27 до 2,50% відповідно до вказаних вікових груп (рис. 2).

Рис. 2. Абсолютна індивідуальна плодючість самиць краснопірки (усереднені дані)

Таким чином, сучасна структура промислового стада краснопірки є стабільною, а поступове підвищення середнього вираженого віку вказує на задовільний стан стада в цілому. Динаміка розмірно-вагових характеристик свідчить про задовільну харчову забезпеченість, де важливе місце займають умови нагулу молодших вікових груп, які формують поповнення промислової частини стада.

Відносно стабільна та висока інтенсивність живлення молодших вікових краснопірки обумовила високі показники вгодованості, вікова динаміка яких представлена на рисунку 3.

Рис. 3. Динаміка вікових змін вгодованості краснопірки Дніпровсько-Бузької гірлової системи (усереднені дані за 2011–2015 рр.)

Як свідчать наведені дані, вгодованість краснопірки Дніпровсько-Бузької гірлової системи є досить високою. В залежності від віку, вона змінювалася в межах від $2,27 \pm 0,02$ до $2,58 \pm 0,03$. Найвищою мінливістю вгодованість відрізнялася у трирічок та шестирічок — відповідно $Cv=2,41\%$ та $Cv=2,49\%$, що пов'язувалося зі статевою структурою стада. Проте, у семирічок, де спостерігалось суттєве домінування самиць, цей показник знижувався до $Cv=1,46\%$.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Таким чином, аналіз основних біологічних показників краснопірки Дніпровсько-Бузької гірлової системи свідчить про задовільний стан стада в цілому. Проте відмічене збільшення середнього вираженого віку стада є певним свідченням посиленого тиску на ліве крило вікового ряду, коли при незначних обсягах промислового вилову і кількості хижаків, головним регулятором чисельності молодших вікових груп в умовах сучасності постає аматорське рибальство.

ЛІТЕРАТУРА

1. Амброз А. Н. Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепроовско-Бугского лимана / Амброз А. Н. — К. : Издательство АН УССР, 1952. — 405 с.
2. Павлов П. И. Современное состояние запасов промысловых рыб нижнего Днепра и Днепроовско-Бугского лимана и их охрана / Павлов П. И. — К., 1964. — 298 с. — [Рукопись деп. в ВИНТИ, № 27-64].
3. Брюзгін В. Л. Структура нерестових стад і стан запасів основних промислових риб у пониззі Дніпра / В. Л. Брюзгін // Вплив зарегульованого стоку на біологію та чисельність промислових видів риб. — К. : Наукова думка, 1967. — С. 91—128.
4. Щербуха А. Я. Сучасний стан запасів промислових риб пониззя Південного Бугу та прогноз змін у його іхтіофауні у зв'язку з подальшим скороченням стоку / А. Я. Щербуха // Вплив зарегульованого стоку на біологію та чисельність промислових видів риб. — К. : Наукова думка, 1967. — С. 150—169.
5. Мовчан Ю. В. Плітка, ялець, гольян, краснопірка, амур, білізна, верховка, лин, чебачок амурський, підуст, пічкур, марена / Ю. В. Мовчан, А. І. Смирнов. — К. : Наук. думка, 1981. — 428 с. — (Фауна України. Т. 8, вип. 2 : Риби. Ч. 1 : Коропові).
6. Шерман І. М. Екологія живлення і харчові взаємовідносини промислових коропових Дніпровського лиману : наукова монографія / І. М. Шерман, П. С. Кутіщев. — Херсон : Гринь Д.С., 2013. — 248 с.
7. Шерман І. М. Живлення і трофічні взаємовідносини краснопірки (*Scardinius erythrophthalmus* L.) Дніпровського лиману / І. М. Шерман, П. С. Кутіщев, К. М. Гейна // Таврійський науковий вісник. — 2014. — Вип. 89. — С. 206—212.
8. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб / Правдин И. Ф. — М. : Пищевая промышленность, 1966. — 376 с.
9. Брюзгин В. Л. Методы изучения роста рыб по чешуе, костям и отолитам / Брюзгин В. Л. — К. : Наукова думка, 1969. — 187 с.
10. Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб / Чугунова Н. И. — М. : АН СССР, 1959. — 164 с.
11. Аксютин З. М. Элементы математической оценки результатов наблюдений в биологических и рыбохозяйственных исследованиях / Аксютин З. М. — М. : Пищевая промышленность, 1968. — 289 с.

REFERENCES

1. Ambroz, A. N. (1952). *Ryby Dnepra, Yuzhnogo Buga i Dneprovsko-Bugskogo limana*. Kiev : Izdatel'stvo AN USSR.
2. Pavlov, P. I. (1964). *Sovremennoe sostoyanie zapasov promyslovykh ryb nizhnego Dnepra i Dneprovsko-Bugskogo limana i ikh okhrana* : Rukopis' dep. v VINITI, № 27-64. Kiev.
3. Briuzghin, V. L. (1967). *Struktura nerestovykh stad i stan zapasiv osnovnykh promyslovykh ryb u ponyzzi Dnipro. Vplyv zarehulovanoho stoku na biolohiiu ta chyselnist promyslovykh vydiv ryb*. Kyiv : Naukova dumka, 91-128.
4. Shcherbukha, A. Ia. (1967). *Suchasnyi sta zapasiv promyslovykh ryb ponyzzia Pivdennoho Buhu ta prohnnoz zmin u yoho ikhtiofauni u zv'iazku z podalshym*

- skorochenniam stoku. *Vplyv zarehulovanoho stoku na biolohiiu ta chyselnist promyslovykh vydiv ryb*. Kyiv : Naukova dumka, 150-169.
5. Movchan, Iu. V., & Smyrnov, A. I. (1981). *Plitka, yalets, holian, krasnopirka, amur, bilyzna, verkhovka, lyn, chebachok amurskyi, pidust, pichkur, marena*. Kyiv : Nauk. dumka (Fauna Ukrainy. Ryby, 8, 2. Koropovi, 1).
 6. Sherman, I. M., & Kutishchev, P. S. (2013). *Ekolohiia zhyvlennia i kharchovi vzaiemovidnosyny promyslovykh koropovykh Dniprovskoho lymanu: naukova monohrafiia*. Kherson : Hrin D.S.
 7. Sherman, I. M., Kutishchev, P. S., & Heina, K. M. (2014). *Zhyvlennia i trofichni vzaiemovidnosyny krasnopirky (Scardinius erythrophthalmus L.) Dniprovskoho lymanu. Tavriiskyi naukovyi visnyk*, 89, 206-212.
 8. Pravdin, I. F. (1966). *Rukovodstvo po izucheniyu ryb*. Moskva : Pishchevaya promyshlennost'.
 9. Bryuzgin, V. L. (1969). *Metody izucheniya rosta ryb po cheshue, kostyam i otolitam*. Kiev : Naukova dumka.
 10. Chugunova, N. I. (1959). *Rukovodstvo po izucheniyu vozrasta i rosta ryb*. Moskva : AN SSSR.
 11. Aksyutina, Z. M. (1968). *Elementy matematicheskoy otsenki rezul'tatov nablyudeniy v biologicheskikh i rybokhozyaystvennykh issledovaniyakh*. Moskva : Pishchevaya promyshlennost'.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА И ТЕМП РОСТА КРАСНОПЕРКИ (*SCARDINIUS ERYTHROPHthalmus* L., 1758) ДНЕПРОВСКО-БУГСКОЙ УСТЬЕВОЙ СИСТЕМЫ

К. Н. Гейна, Geina_k@mail.ru, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Проанализировать основные биологические характеристики промыслового стада красноперки *Scardinius erythrophthalmus* (Linnaeus, 1758) Днепроовско-Бугской устьевой системы в условиях зарегулированного стока Днепра.

Методика. Морфологические особенности определены на основании анализа меристических и пластических признаков. При оценке биологического состояния промыслового стада красноперки основное внимание отводилось возрастной, половой структуре, плодовитости, характеристикам линейно-весового роста и упитанности. Ихтиологический материал отобран в процессе работы контрольно-наблюдательных пунктов Института рыбного хозяйства НААН Украины, деятельность которых была регламентирована протокольными решениями научно-промыслового совета Госрыбгагенства. Полевая и камеральная обработка собранных материалов проведена по общепризнанным в практике ихтиологических исследований методикам и руководствам.

Результаты. Анализ меристических признаков красноперки Днепроовско-Бугской устьевой системы показал, что формулы плавников являются следующими: D — III 7-9 (10) ($M=8,19\pm0,14$); A — III 10-12 ($M=10,81\pm0,17$); P — I (12) 13-15 (16) ($M=14,26\pm0,18$); V — II 7-8 ($M=7,78\pm0,08$). В боковой линии насчитывается от 38 до 47 чешуек ($M=42,63\pm0,65$). Над линией расположено 7–8 ($M=7,67\pm0,09$), а под ней — 5–6 ($M=5,26\pm0,09$) поперечных рядов.

Особенностью современного биологического состояния стада является стабильность возрастной структуры с доминированием младших возрастных групп. Рост удельного веса граничных групп правого крыла возрастного ряда, на фоне незначительной тенденции снижению доли пятигодовиков, указывает на усиленную нагрузку (как промысловую, так и любительскую) на численность пополнения. Соответствующим подтверждением этому

является и увеличение среднего взвешенного возраста промыслового стада с 4,16–4,17 до 4,26–4,31 лет.

Половая структура является характерной для большинства карповых рыб. Отмечена тенденция доминирования самцов в младших возрастных группах, самок — в старших. В общем по стаду соотношение полов было практически равным (1:0,96), но с незначительным преобладанием самок.

Темп линейно-весового роста отличался интенсивностью. Наиболее изменчивые характеристики роста наблюдались у четырехгодовиков, что обуславливалось половым созреванием. Абсолютная индивидуальная плодовитость колебалась от 11,02±0,26 тыс. икр. у трехгодовиков до 132,56±1,48 тыс. икр. у семигодовиков. При этом вариабельность (Cv) постепенно снижалась от 5,27 до 2,50%.

Упитанность ($K_{\text{Фулт.}}$) красноперки была удовлетворительной. В зависимости от возраста она изменялась в пределах от 2,27±0,02 до 2,58±0,03 при вариабельности показателей $Cv=1,46-2,49\%$.

Научная новизна. Существенно обновлены данные по морфологическим особенностям красноперки бассейна р. Днепр, особенно её нижнего течения в условиях трансформированного стока. Также дополнена существующая информация относительно возрастной, половой структуры, плодовитости и темпа линейно-весового роста.

Практическая значимость. Полученные в процессе исследований современные данные должны стать научной основой оптимизации промысловой нагрузки на аборигенную ихтиофауну Днепро-Бугской устьевой системы, что, несомненно, приобретает актуальность в свете природоохранных мероприятий по сохранению биразнообразия трансформированных акваторий Украины.

Ключевые слова: Днепро-Бугская устьевая система, красноперка, меристические, пластические признаки, возрастная, половая структура, плодовитость, темп роста, упитанность.

MORPHOLOGICAL PECULIARITIES, AGE STRUCTURE AND GROWTH RATE OF RUDD (SCARDINIUS ERYTHROPHthalmus L., 1758) OF THE DNIEPER-BUG ESTUARY SYSTEM

K. Heina, Geina k@mail.ru, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To analyze basic biological characteristics of the commercial stock of rudd. *Scardinius erythrophthalmus* (Linnaeus, 1758) of the Dnieper-Bug estuary system in the conditions of the regulated flow of the Dnieper River.

Methodology. Morphological peculiarities were determined based on the analysis of meristic and plastic features. When assessing the biological state of the commercial stock rudd, the main attention was given to the age, sex structure, fecundity, characteristics of length-weight growth and condition factor. The ichthyological material was collected during the work of monitoring stations of the Institute of Fisheries NAAS of Ukraine, the operation of which was regulated by protocol decisions of the Scientific and Commercial Council of the State Agency of Fisheries. Field and laboratory processing of collected data was carried out using conventional ichthyological methods and guidelines.

Findings. The analysis of meristic features of rudd of the Dnieper-Bug estuary system showed that fin formulas were as follow: D – III 7-9 (10) ($M=8.19\pm0.14$); A – III 10-12 ($M=10.81\pm0.17$); P – I (12) 13-15 (16) ($M=14.26\pm0.18$); V – II 7-8 ($M=7.78\pm0.08$). The lateral line had from 38 to 47 scales ($M=42.63\pm0.65$). 7-8 ($M=7.67\pm0.09$) transverse rows of scales were located above lateral line, while 5-6 ($M=5.6\pm0.9$) under it.

A peculiarity of the current biological state of rudd stock is stable age structure with the domination of young age groups. An increase in the ratio of the maximum age groups against the background of an insignificant trend for the decrease of the ratio of age-5 fish indicates on an increased pressure (both commercial and recreational) on rudd recruitment. A confirmation of it is an

increase of the mean weighed age of the commercial stock from 4.16-4.17 to 4.26-4.31 years.

The sex structure is typical for cyprinids. A trend of the domination of males in younger age groups and females in older age groups is observed. In total, sex ratio was practically equal (1:0.96) but with insignificant predominance of females.

The length-weight growth rate is intensive enough. The most variable growth features were observed in age-4 fish that was related to sexual maturation. The absolute individual fecundity varied from 11.02 ± 0.26 thousand eggs in age-3 fish to 132.56 ± 1.48 thousand eggs in age-7 fish. At the same time, the variability (Cv) gradually decreased from 5.27% to 2.50%, respectively, in the indicated age groups.

The condition factor of rudd is satisfactory. Depending on the age, it varied from 2.27 ± 0.02 to 2.58 ± 0.03 with Cv=1.46-2.49%.

Originality. The data of the morphological structure of the rudd of the Dnieper basin have been significantly improved, especially in the lower reach in the conditions of the transformed flow. The existing information on the age, sexual structure, fecundity and length-weight growth has been supplemented.

Practical value. Current data obtained during the study have to become a scientific justification of the optimization of commercial pressure on native fish fauna of the Dnieper-Bug estuary system that becomes important in the aspect of nature protection measures aimed at preserving biodiversity of the transformed water bodies of Ukraine.

Keywords: Dnieper-Bug estuary system, rudd, meristic, plastic features, age, sex structure, fecundity, growth rate, condition factor.

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 76-94
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.076>
УДК 597.553.2+597-113(282.243.742)

КОРМОВА БАЗА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ СТРУМКОВОЇ, РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛЕЙ ТА ХАРИУСА НА РІЗНИХ БІОТОПАХ РІЧКИ ШИПІТ ЗАКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

С. В. Кружиліна, Sveta_kru@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. В. Діденко, al_didenko@yahoo.com, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ
І. Й. Великопольський, vely@meta.ua, Рибне господарство «Равнінг та
Сілерупвелд», м. Рандбол, Данія

Мета. Дослідження кормової бази, умов живлення та харчових взаємовідносин струмкової форелі, райдужної форелі та хариуса в річках Закарпатського регіону.

Методика. Матеріал щодо кормової бази риб та живлення струмкової, райдужної форелі та хариуса збирали в літній період 2012 р. на річці Шипіт. Дослідження проводили на двох різних за розташуванням ділянках річки: перша розміщена на середній передгірській ділянці течії, друга — на гірській ділянці річки, на типових біотопах: I — з валунами та перекатами зі швидкою течією; II — з камінням середнього розміру, невисокими перекатами і помірною швидкістю течії; III — з дрібним камінням, піском та повільною течією. Матеріал було зібрано та оброблено згідно загальноновизнаних та уніфікованих гідробіологічних, іхтіологічних та трофологічних методик.

Результати. Вивчено рівень розвитку макрозообентосу, а також живлення та трофічні взаємовідносини між струмковою (*Salmo trutta*) і райдужною (*Oncorhynchus mykiss*) форелями, а також між райдужною фореллю і хариусом (*Thymallus thymallus*) на різних біотопах в гірській та передгірській ділянках річки Шипіт. Чисельність «м'якого» макрозообентосу у річці на різних біотопах коливалось від 972 до 2576 екз./м² при біомасі 6,3 до 121,8 г/м². Загальний індекс подібності поживи (ІПП) між струмковою та райдужною форелями на біотопі з валунами і швидкою течією в передгір'ї складав 32,4% за чисельністю і 20,3% за біомасою, а в гірській частині річки — 49,6% і 52,9%, відповідно. На біотопі з камінням середнього розміру і помірною течією ІПП між райдужною фореллю і хариусом в передгір'ї становив 19,0% за чисельністю і 27,9% за біомасою.

Наукова новизна. Вперше досліджено живлення струмкової та райдужної форелі та хариуса на різних біотопах р. Шипіт.

Практична значимість. Результати даної роботи можуть використовуватися при розрахунках об'ємів зариблення річок Закарпатського регіону райдужною фореллю та хариусом.

Ключові слова: *Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Thymallus thymallus*, річка Шипіт, зообентос, гірські річки, біотопи, кормова база, біомаса, живлення, трофічна конкуренція, індекс елективності, індекс подібності поживи.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Видовий склад та чисельність зообентосу знаходяться в тісній залежності від фізичних характеристик водного об'єкта. Визначальну роль у розвитку та розповсюдженні зообентосу річок відіграє субстрат [1]. Іншими важливими чинниками, що впливають на видовий склад і чисельність донних угруповань

© С. В. Кружиліна, О. В. Діденко, І. Й. Великопольський, 2016

безхребетних, є висота над рівнем моря, і пов'язаний з цим температурний режим, а також швидкість течії [2–5]. У гірських водотоках спостерігається ефект градієнтного розподілу угруповань безхребетних, що пов'язано зі зміною умов їх існування від верхніх ділянок річок до нижніх [6]. Вивчення кількісних та якісних показників розвитку угруповань безхребетних на різних ділянках гірських річок необхідно для розуміння закономірностей розподілу іхтіофауни і формування рибопродуктивності, оскільки безхребетні складають основу живлення риб, в першу чергу молоді [7]. Бентосні безхребетні є невід'ємною складовою екосистем гірських річок та ланкою в харчовому ланцюзі між органічною речовиною і рибами [8].

Невеликі гірські водотоки складають основу гідрографічної мережі Карпатського регіону. Стікаючи з гір, вони формують численні біотопи типу перекатів, плес, водоспадів та ін., які можуть характеризуватися різними фізичними умовами існування для безхребетних і риб. Основу іхтіофауни гірських водотоків Закарпатського регіону складають струмкова форель і європейський харіус, які відповідно є домінуючими видами на «форелевих» і «харіусових» ділянках річок [9].

В гірських річках вивченням живлення струмкової та райдужної форелей і європейського харіуса займалися деякі вчені [10–24]. За даними авторів, основу живлення цих риб складають личинки і лялечки комах та повітряні комахи. Влітку, в період вильоту імаго, їх харчові потреби в значній мірі задовольняються за рахунок повітряних комах. В осінній період, коли відбувається зменшення активності або припинення вильоту комах, спостерігається зниження інтенсивності живлення риб, а значну роль в цьому для струмкової форелі та харіуса починають відігравати личинки комах як з товщі води (дрифт) [7, 25–28], так і з поверхні ґрунту (зообентос), з яких найбільш суттєве значення набувають личинки *Trichoptera*, *Ephemeroptera*, *Simuliidae*, *Coleoptera*, *Plecoptera*, *Chironomidae*. Таким чином, спостерігається значне перекривання спектрів живлення зазначених риб, що при незначних біомасах кормових організмів може спричиняти напруженість у трофічних взаємовідносинах між ними.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

У зв'язку з тим, що основні дослідження умов та характеру живлення зазначених видів риб проводились для річок загалом, не враховуючи особливості їх існування на різних біотопах, важливими аспектами, які потребують детального вивчення, є рівень розвитку безхребетних, характер живлення та харчові взаємовідносини струмкової і райдужної форелей та харіуса на різних біотопах закарпатських річок. Особливої актуальності дані дослідження набувають у зв'язку з прийняттям та реалізацією програми «Наукові дослідження природних популяцій струмкової форелі в малих ріках західного регіону та науково-біологічне обґрунтування заходів та методичні рекомендації з її відтворення» (№ д. р. 0108U007838)». Метою даної роботи було дослідження стану кормової бази лососевих видів риб, забезпеченості їх їжею та вивчення міжвидових трофічних відносин струмкової і райдужної форелей та харіуса на різних біотопах в річках Закарпатського регіону.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Матеріал щодо розвитку кормової бази риб та живлення струмкової, райдужної форелей та хариуса збирався в літній період 2012 р. на річці Шипіт. Дослідження проводили на двох різних за розташуванням ділянках річки:

- 1-а розташована на середній передгірській ділянці течії річки (вище ГЕС);
- 2-га — на гірській ділянці річки (р-н турбази).

Проби відбирали на обох ділянках річки на типових для зазначених риб біотопах:

- I — з валунами та перекатами з швидкою течією;
- II — з камінням середнього розміру, невисокими перекатами і помірною швидкістю течії;
- III — з дрібним камінням, піском та повільною течією.

I

II

III

Відбір проб зообентосу проводили сіткою Surber (25 × 25 см) [13] в місцях відлову досліджуваних риб. Рибу відловлювали нахлистом. Хариус на передгірській ділянці річки на біотопах з камінням середнього розміру з метою дослідження його живлення був вилучений з браконьєрських уловів інспекторами Закарпатської держрибоохорони.

Проби фіксували 4%-м розчином формаліну [29, 30]. Потенційну продукцію зообентосу розраховували за загальновизнаною методикою [31].

Збір матеріалу з живлення риб, обробку проб і розрахунки проводили відповідно загальновідомих методик [29, 30, 32]. Індекси подібності поживи (ПП) розраховували за О. О. Шоригінім [33].

$$\text{ПП} = \sum \min(p_{ij}; p_{jk}), \text{ де:}$$

p — частка i із n видів (за масою) в двох порівнюваних колекціях (різних видів риб) — j і k .

Схожість спектрів живлення вважали значимим при $\text{ПП} \geq 40\%$ [13].

Індекси елективності (E) розраховували за В. С. Івлевим [34].

$$E = \frac{r_1\% - P_1\%}{r_1\% + P_1\%},$$

де $r_1\%$ — відносне значення компонента в складі харчової грудки;

$P_1\%$ — відносне значення компонента в кормовій базі річки.

З метою визначення подібності видового складу макрозообентосних організмів на різних біотопах розраховували коефіцієнт подібності за Т. А. Серенсенем [35]. Розрахунок проводили за формулою:

$$S = 2 \times C / 4 (A + B),$$

де S — коефіцієнт подібності видового складу;

A — число видів у першому біотопі;

B — число видів у другому біотопі;

C — число видів, спільних для обох біотопів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Чисельність «м'якого» макрозообентосу в річці Шипіт на різних біотопах коливались від 972 до 2576 екз./м² при біомасі 6,3 до 121,8 г/м². Найвищі біомаси спостерігались на передгірській ділянці річки на біотопах з камінням середнього розміру з невисокими перекатами і помірною швидкістю течії (121,79 г/м²) за рахунок значного розвитку личинок волохокрильців роду *Stenophylax* (80,8% від загальної біомаси) та *Hydropsyche pellucidula* (6,0%), та дещо нижчі — на біотопі з валунами на швидкій течії (68,77 г/м²) при значному розвитку личинок волохокрильців роду *Grammotaulius* (52,4%), *Hydropsyche pellucidula* (5,4%) та одноденок роду *Ecdyonurus* (5,2%). Найменші біомаси (52,37 г/м²) були зафіксовані на біотопі з дрібним камінням, піском та повільною течією при домінуванні личинок волохокрильців родів *Grammotaulius* (80,8%) та *Rhyacophila* (3,8%) (табл. 1).

На гірській ділянці річки значення біомаси зообентосу були значно нижчі, але спостерігалась та ж тенденція щодо біомас. Так, на камінні середнього розміру з невисокими перекатами і помірною швидкістю течії біомаси була вищою (9,43 г/м²), при переважанні *Gammaridae* (39,5%) та личинок веснянок родів *Protonemura* (12,7%), *Capnia* (5,4%), ніж на валунах з перекатами (6,29 г/м²), при переважанні *Gammaridae* (27,0%) та личинок волохокрильців роду *Sericostoma* (47,2%) (табл. 1).

Найбільш схожий видовий склад макрозообентосу спостерігався на біотопі з валунами та на біотопі з камінням середнього розміру на передгірській ділянці річки, а суттєво відрізнялись за видовим складом біотоп з валунами та біотоп з камінням середнього розміру на гірській ділянці річки (табл. 2).

На біотопі з валунами та перекатами зі швидкою течією на обох ділянках річки нами було зафіксовано наявність струмкової та райдужної форелей. На передгірській ділянці річки струмкова форель живилась переважно личинками одноденок, які складали 94,8% від загальної чисельності та 90,8% від біомаси спожитих кормових організмів, які вона активно вибирала (E=0,82). Також в складі її харчової грудки в незначній кількості зустрічались личинки хірономід, мошок, волохокрильців та бокоплати і повітряні комахи. На відміну від струмкової, райдужна форель живилась переважно личинками хірономід (59,6% за чисельністю; 45,2% за біомасою (E=0,93)); другорядну роль у її живленні відігравали личинки одноденок (28,3%; 12,3% (E=0,51)) та волохокрильців (11,2%; 37,4% (E=-0,42)). Личинки мошок, веснянок та бокоплати в її живленні великого значення не набували.

Таблиця 1. Кількісні та якісні показники розвитку макрозообентосу
р. Шипіт в літній період 2012 р. на різних біотопах, $\frac{\text{г/м}^3}{\text{екз/м}^3}$

Організми	Ділянки річки				
	Передгірська			Гірська	
	Біотопи				
	1 *	2 *	3 *	1 *	2 *
<i>Dugesia</i>	<u>640</u> 10,000	<u>57</u> 1,200	<u>57</u> 2,940	<u>0,0</u> 0,0	<u>0,0</u> 0,0
<i>Oligochaeta</i>	<u>0,0</u> 0,0	<u>0,0</u> 0,0	<u>0,0</u> 0,0	<u>0,0</u> 0,0	<u>29</u> 0,086
<i>Insecta larvae:</i>	<u>1000</u> 48,330	<u>1319</u> 109,061	<u>400</u> 45,943	<u>1600</u> 3,805	<u>429</u> 6,801
<i>Ephemeroptera larvae</i>	<u>200</u> 3,560	<u>173</u> 1,729	<u>29</u> 0,600	<u>600</u> 1,714	<u>114</u> 2,086
<i>Plecoptera larvae</i>	<u>0,0</u> 0,0	<u>29</u> 0,314	<u>0,0</u> 0,0	<u>715</u> 1,314	<u>0,0</u> 0,0
<i>Coleoptera larvae</i>	<u>0,0</u> 0,0	<u>29</u> 2,857	<u>0,0</u> 0,0	<u>0,0</u> 0,0	<u>29</u> 0,029
<i>Trichoptera larvae</i>	<u>600</u> 43,170	<u>516</u> 103,504	<u>371</u> 45,343	<u>114</u> 0,514	<u>86</u> 4,457
<i>Simuliidae larvae</i>	<u>160</u> 1,560	<u>29</u> 0,257	<u>0,0</u> 0,0	<u>114</u> 0,257	<u>29</u> 0,086
<i>Chironomidae larvae</i>	<u>40</u> 0,040	<u>543</u> 0,400	<u>0,0</u> 0,0	<u>57</u> 0,006	<u>171</u> 0,143
<i>Crustacea (Gammaridae)</i>	<u>560</u> 10,444	<u>1200</u> 11,526	<u>286</u> 3,486	<u>228</u> 2,486	<u>514</u> 2,543
Разом	<u>2200</u> 68,774	<u>2576</u> 121,787	<u>743</u> 52,369	<u>1828</u> 6,291	<u>972</u> 9,430

Примітка. Тут і надалі

1* — з валунами та перекатами зі швидкою течією;

2* — з камінням середнього розміру, невисокими перекатами і помірною течією;

3* — з дрібним камінням, піском та повільною течією.

Слід зауважити, що як струмкова, так і райдужна форелі серед личинок одноденок найбільш активно споживали представників одних і тих самих родів *Centroptilum* (93%; 27% від загальної чисельності відповідно) та меншою мірою *Ecdyonurus* (1,0% та 0,4%) і *Torleya* (0,1%; 0,1%), а також серед личинок двокрилих — мошок роду *Simulium* (0,8%; 0,1%). Серед личинок волохокрильців перетинання спектру живлення між двома зазначеними видами спостерігалось лише за видом *Rhyacophila septentrionis* (0,7%; 2,5%). Крім цього виду, райдужна форель ще споживала *Hydropsyche pellucidula*, *Sericostoma personatum* та представників роду *Potamophylax*.

Таблиця 2. Схожість видового складу макрозообентосу р. Шипіт в літній період 2012 р. на різних біотопах

Біотопи	Ділянки річки				
	Передгірська			Гірська	
	1*	2*	3*	1*	2*
1*	-	0,60	0,57	0,38	0,50
2*	0,6	-	0,53	0,38	0,48
3*	0,57	0,53	-	0,35	0,50
1*	0,38	0,38	0,35	-	0,32

На гірській ділянці річки основу живлення струмкової форелі складали бокоплави (51,2%; 43,0% ($E=0,63$)) та личинки волохокрильців (22,0%; 38,0% ($E=0,67$)). Суттєво збільшилось (порівняно з передгірською ділянкою) значення в її живленні повітряних комах (10,0%; 12,3%). Личинки мошок, веснянок та одноденок у складі її харчової грудки зустрічалися в незначній кількості. Райдужна форель також живилась переважно личинками волохокрильців (37,0%; 55,0% ($E=0,74$)) та бокоплавами (21,0%; 5,8% ($E=0,29$)). Повітряні комахи (13,0%; 20,7%) та личинки одноденок (13,0%; 6,6% ($E=0,79$)) мали другорядне значення. Крім того, в складі її харчової грудки зустрічались личинки мошок, веснянок, жуків та хірономід (табл. 3).

Таблиця 3. Живлення риб р. Шипіт в літній період 2012 р. на різних біотопах, % за чисельністю / за біомасою

Кормові організми	Ділянки річки						
	Передгірська					Гірська	
	Біотопи						
	1*		2*		3*	1*	
	Види риб						
	Райдуж-на форель	Струм-кова форель	Райдуж-на форель	Харіус	Струм-кова форель	Райдуж-на форель	Струм-кова форель
1	2	3	4	5	6	7	8
Довжина риб, см	23,0–25,0	16,5–19,0	17,0–22,0	16,0–17,0	12,0–20,4	12,0–14,0	15,5–19,5
<i>Insecta larvae:</i>	99,5/95,0	99,2/94,7	46,9/36,1	92,1/90,8	22,3/37,6	66,0/62,6	34,2/40,7
<i>Ephemeroptera larv.</i>	28,3/12,3	94,8/90,8	18,4/14,8	84,9/74,7	7,3/9,5	13,0/6,6	4,3/1,5
<i>Plecoptera larvae</i>	0,3/0,1	0,0/0,0	1,3/0,2	0,0/0,0	0,0/0,0	4,0/0,2	6,0/1,0
<i>Coleoptera larvae</i>	0,0/0,0	0,0/0,0	3,0/1,5	0,0/0,0	0,5/0,5	4,0/0,2	0,0/0,0
<i>Trichoptera larvae</i>	11,2/37,4	0,7/1,3	10,1/16,7	5,2/15,8	10,8/27,0	37,0/55,0	22,0/38,0
<i>Simuliidae larvae</i>	0,1/0,0	0,8/0,3	4,6/0,9	2,0/0,3	1,6/0,2	4,0/0,2	1,9/0,2
<i>Chironomidae larv.</i>	59,6/45,2	2,9/2,3	8,3/1,8	0,0/0,0	2,1/0,4	4,0/0,4	0,0/0,0
<i>Agriotypinae larvae</i>	0,0/0,0	0,0/0,0	0,7/0,02	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0
<i>Dixidae larvae</i>	0,0/0,0	0,0/0,0	0,5/0,2	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0

**КОРМОВА БАЗА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ СТРУМКОВОЇ, РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛЕЙ
ТА ХАРИУСА НА РІЗНИХ БІОТОПАХ РІЧКИ ШИПІТ ЗАКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ**

Продовження табл. 3

1	2	3	4	5	6	7	8
Hydroporus sp.	0,1/0,0	0,0/0,0	1,9/0,3	0,0/0,0	0,3/0,2	0,0/0,0	4,1/1,3
Insecta imago	/4,4	-4,1	20,8/34,1	5,9/7,4	51,4/42,2	13,0/20,7	10,0/12,3
<i>Ephemeroptera</i>	0,0/0,0	0,0/0,0	7,4/2,9	2,0/2,2	7,0/5,7	0,0/0,0	1,2/1,2
<i>Plecoptera</i>	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	1,2/2,0	4,5/0,6	2,8/1,2
<i>Coleoptera</i>	0,0/0,0	0,0/0,0	1,0/1,4	0,0/0,0	0,9/1,9	0,0/0,0	0,2/0,2
<i>Trichoptera</i>	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	1,5/1,2	0,0/0,0	3,6/1,6
<i>Hymenoptera</i>	0,0/0,0	0,0/0,0	4,5/1,5	3,9/5,2	10,1/10,0	8,5/0,8	1,2/0,7
<i>Simuliidae</i>	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0
<i>Muscidae</i>	0,0/0,0	0,0/0,0	1,7/3,5	0,0/0,0	23,2/13,1	0,0/0,0	1,0/0,4
<i>Tettigoniidae</i>	0,0/0,0	0,0/0,0	0,8/2,9	0,0/0,0	0,5/1,6	0,0/0,0	0,0/0,0
Перетравл. залишки	-4,4	-4,1	5,4/21,9	0,0/0,0	7,0/6,6	-19,3	-7,0
Наземні:	0,0/0,0	0,0/0,0	5,5/2,8	0,0/0,0	1,1/1,0	0,0/0,0	0,0/0,0
<i>Formicidae</i>	0,0/0,0	0,0/0,0	1,9/1,1	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0
<i>Araneae</i>	0,0/0,0	0,0/0,0	3,6/1,7	0,0/0,0	0,9/0,9	0,0/0,0	0,0/0,0
<i>Oniscidea</i>	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,2/0,1	0,0/0,0	0,0/0,0
Mollusca:	0,0/0,0	0,0/0,0	2,0/2,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0
<i>Bithynia sp.</i>	0,0/0,0	0,0/0,0	0,3/1,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0
<i>Pisidium sp.</i>	0,0/0,0	0,0/0,0	1,7/1,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0
Gammaridae	0,4/0,5	0,8/1,2	11,8/6,9	2,0/1,8	21,3/15,0	21,0/5,8	51,2/43,0
Decapoda	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,3/0,1	0,0/0,0	0,0/0,0
Hydrachnidae	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	3,3/0,1	0,0/0,0	0,0/0,0
Молодь риб	0,0/0,0	0,0/0,0	11,1/17,8	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0
Перетравл. залишки	-0,1	-0,0	-0,0	0,0/0,0	-3,9	-0,3	0,5/0,01
Пісок	-0,0	-0,0	-0,0	0,0/0,0	-0,0	-10,6	-2,7
Разом	100	100	100	100/100	100	100	100
З них:							
Insecta	99,6/99,4	99,2/98,8	71,5/71,6	98,0/98,2	73,9/79,9	79,0/83,4	48,3/54,3
Макрозообентос	99,9/95,5	100/95,9	60,7/45,0	0,0/0,0	43,9/52,7	87,0/68,4	85,4/83,7
Insecta larvae	0,0/0,0	99,2/94,7	0,0/0,0	0,0/0,0	22,3/37,6	0,0/0,0	34,2/40,7

Струмкова та райдужна форелі на гірській ділянці річки споживали однакові види личинок волохокрильців. Так, основною за чисельністю складовою харчової грудки у обох видів форелей були представники роду *Potamophylax* (17,9%; 20,0% відповідно) і меншою мірою *Rhyacophila septentrionis* (3,0%; 12,0%) та *Sericostoma personatum* (0,9%; 4,0%). Спектр живлення струмкової та райдужної форелей за іншими невідоміючими у складі харчової грудки кормовими організмами перетинався не суттєво. Так, спільною складовою в їх живленні серед личинок веснянок був вид *Protonemura meyeri*. Крім нього в живленні струмкової форелі також зустрічались представники родів *Perloides*,

Leuctra, *Nemourella*. Серед одноденок спільною поживою для обох видів форелей були представники родів *Ecdyonurus* та *Baetis*, крім яких струмкова форель споживала також *Acentrella* sp. і мошок роду *Simulium*.

На біотопах з камінням середнього розміру, невисокими перекатами і помірною швидкістю течії на передгірській ділянці річки зустрічалась райдужна форель і харіус, а на гірській ділянці наявність досліджуваних риб не було зафіксовано. На передгірській ділянці річки райдужна форель живилась переважно личинками одноденок (18,4%; 14,8%), волохокрильців (10,1%; 16,7%) та бокоплавами (11,8%; 6,9%). Також в складі її харчової грудки була наявна молодь риб (бабечь строкатоплавцевий, форель, коропові), складаючи 11,1% за чисельністю і 17,8% за біомасою. Досить суттєво (порівняно з біотопом з валунами) у живленні райдужної форелі зросла роль повітряних комах (20,8%; 34,1%), а також збільшилось різноманіття спожитих кормових організмів. Так, крім личинок хірономід (8,3%; 1,8%), мошок (4,6%; 0,9%) та веснянок (1,3%; 0,2%), у складі харчової грудки в незначній кількості зустрічались личинки жуків, комарів, а також водяні жуки, наїзники, молюски (*Pisidium* sp., *Bithynia* sp.) наземні мурахи та павуки. Основу живлення харіуса складали личинки одноденок (84,9%; 74,7% ($E=0,86$)). Другорядне значення для його живлення мали личинки волохокрильців (5,2%; 15,8% ($E=-0,56$)) та повітряні комахи (5,9%; 7,4%) представлені одноденками та перетинчастокрилими. Також в складі його харчової грудки зустрічались личинки мошок та бокоплавів.

Серед домінуючих у живленні радужної форелі та харіуса одноденок однаковими для обох видів риб були представники родів *Ecdyonurus* (11,5%; 0,6% від загальної чисельності відповідно) та *Centroptilum* (5,4%; 78,9%). Крім них, в складі харчової грудки райдужної форелі зустрічались представники родів *Chitonophora* та *Torleya*, а у харіуса — *Epeorus* та *Baetis*. Серед представників волохокрильців в складі харчової грудки обох видів риб зустрічались *Sericostoma personatum* (0,6%; 1,3% від загальної чисельності відповідно), *Potamophylax* sp. (2,2%; 2,6%) та *Grammotaulius* sp. (0,6%; 1,3%), а у райдужної форелі — ще *Hydropsyche pellucidula* (1,9%) і *Rhyacophila septentrionis* (4,7%). Личинки веснянок були зафіксовані лише в живленні радужної форелі, та були представлені родиною *Perloides* (1,3%). Двокрилі в складі харчових грудок обох видів риб були представлені личинками *Simulium* (1,6%; 1,9% від загальної чисельності), а у райдужної форелі зустрічались *Blepharicera similans* (0,6%), лялечки мошок (2,0%) та *Deuterophlebia* sp. (0,3% від загальної чисельності).

На біотопах з дрібним камінням, піском та повільною течією на передгірській ділянці річки нами було зафіксовано наявність лише струмкової форелі яка живилась переважно повітряними комахами (51,4%; 42,2%), бокоплавами (21,3%; 15,0%) і личинками волохокрильців (10,8%; 27,0%). Личинки одноденок, жуків, мошок та хірономід значної роль в її живленні не відігравали. Загалом, харчування струмкової форелі на даному біотопі було найбільш різноманітним порівняно з іншими. Комахи в складі харчової грудки в основному були представлені мухами (23,2%; 13,1%) і перетинчастокрилими (10,1%; 10,0%), і меншою мірою — одноденками, веснянками, жуками та волохокрильцями. Також в складі її харчової грудки зустрічались раки (*Decapoda*), кліщі та наземні павуки, мурахи, мокриці. Личинки волохокрильців в живленні струмкової форелі були представлені *Hydropsyche pellucidula* (5,3%; 7,7%) *Sericostoma personatum* (2,8%;

9,1%), *Grammotaulius* sp. (0,5%; 0,7%), *Rhyacophila septentrionis* (0,2%; 1,1%), *Potamophylax* sp. (1,8%; 5,4%).

Інтенсивність живлення досліджуваних риб коливалась в значних межах на різних біотопах річки. Вищі індекси інтенсивності живлення спостерігались на біотопах з валунами та швидкою течією на передгірській ділянці річки, а на гірській ділянці вони були у 1,7–2,8 рази нижчі. Причому райдужна форель живилась в 1,0–1,7 рази інтенсивніше, ніж струмкова. Найнижча інтенсивність живлення спостерігалась у хариуса на біотопах з камінням середнього розміру, невисокими перекатами і помірною швидкістю течії. Вгодованість також була найвищою на біотопах з валунами та швидкою течією на передгірській ділянці річки (табл. 4).

Таблиця 4. Показники інтенсивності живлення риб р. Шипіт в літній період 2012 р. на різних біотопах

Показники	Ділянки річки						
	Передгірська					Гірська	
	Біотопи						
	1*		2*		3*	1*	
	Види риб						
	Райдуж-на форель	Струм-кова форель	Райдуж-на форель	Харіус	Струм-кова форель	Райдужна форель	Струм-кова форель
Маса харчової грудки, мг	9,4±0,7	3,5±0,5	1,9±0,9	595,8 ± 36,0	1,2±0,2	0,8±0,1	1,1±0,4
Вгодованість за Фультонном	2,0±0,08	1,8±0,05	1,7±0,05	1,5 ± 0,02	1,7±0,07	1,5±0,04	1,6±0,05
Індекс наповнення шлунку, ‰	337,2 ±23,6	333,8 ±22,5	125,6 ±42,1	87,5 ±21,2	145,0 ±21,7	202,5 ±25,0	120,0 ±27,8
Маса риби, г	280,0 ±20,1	104,0 ±5,4	134,3 ±18,5	68,1 ± 11,6	91,2 ±19,1	37,5 ±2,8	80,4 ±12,4
Довжина риби, (l) см	24±1,2	17,9±0,5	19,6±0,9	16,5±0,2	17,2±1,6	13,5±0,2	17,0±0,8
n	5	5	4	5	4	5	4

Розраховані індекси елективності свідчать, що на біотопі з валунами та перекатами зі швидкою течією на передгірській ділянці річки струмкова форель активно вибирала личинок одноденок ($E=0,82$), які складали основу її живлення та уникала личинок двокрилих, волохокрильців та дрібних личинок хірономід. На відміну від струмкової, райдужна форель, крім личинок одноденок ($E=0,51$), активно вибирала личинок хірономід ($E=0,93$), які були основною її їжею. Серед волохокрильців вона віддавала незначну перевагу лише *Rhyacophila septentrionis* ($E=0,17$), а загалом уникала личинок волохокрильців ($E=-0,42$), бокоплавів та личинок двокрилих (табл. 5).

Таблиця 5. Індекси харчової елективності риб р. Шипіт в літній період 2012 р. на різних біотопах, %, за чисельністю / за біомасою

Кормові організми	Ділянки річки						
	Передгірська					Гірська	
	Біотопи						
	1*		2*		3*	1*	
	Види риб						
	Райдуж-на форель	Струм-кова форель	Райдуж-на форель	Харіус	Струм-кова форель	Райдуж-на форель	Струм-кова форель
Довжина риб, см	23–25	16,5–19	17–22	16–17	12–20,4	12–14,0	15,5–19,5
<i>Insecta larvae</i>	0,37/0,15	0,37/0,17	0,21/-0,05	0,31/0,05	0,00/-0,10	-0,09/0,20	-0,33/-0,08
<i>Diptera larvae</i>	-0,97/-0,96	-0,80/-0,77	0,75/0,82	0,30/0,26	-	-0,16/-0,87	-0,53/-0,88
<i>Chironomidae larvae</i>	0,93/1,0	-0,05/0,87	-0,41/0,43	-	-	0,19/0,72	-
<i>Ephemeroptera larvae</i>	0,51/0,41	0,82/0,90	0,64/0,92	0,86/0,97	0,39/0,84	-0,41/-0,48	-0,76/ 0,89
<i>Plecoptera larvae</i>	-	-	0,23/0,04	-	-	-0,79/-0,96	-0,73/-0,90
<i>Coleoptera larvae</i>	-	-	0,65/0,20	-	-	-	-
<i>Trichoptera larvae</i>	-0,42/-0,25	-0,95/-0,96	-0,06/-0,38	-0,56/-0,67	-0,31/-0,23	0,74/0,81	0,67/0,71
<i>Hydropsyche pellucidula</i>	-0,56/-0,14	-	-0,22/0,12	-	-	-	-
<i>Sericostoma personatum</i>	-	-	-0,60/-0,03	-0,60/-0,77	0,37/0,82	-	-
<i>Grammotaulius</i>	-	-	-0,57/-0,08	-0,41/-0,41	-0,93/-0,96	-	-
<i>Rhyacophila septentrionis</i>	0,17/0,91	-0,45/0,58	0,73/0,57	-	-0,55/-0,21	0,63/0,75	0,15/0,21
<i>Potamophylax</i>	-	-	0,02/-0,56	-0,23/-0,66	-	-	-
<i>Gammaridae</i>	-0,97/-0,94	-0,94/-0,84	-0,37/0,34	-0,91/-0,65	0,03/0,62	0,29/-0,65	0,63/0,10

На гірській ділянці річки як струмкова, так і радужна форелі вибирали бокоплавів ($E=0,63$ і $E=0,29$ відповідно) та личинок волохокрильців ($E=0,67$ і $E=0,74$), які складали основу їх живлення, відаючи перевагу *Rhyacophila septentrionis* ($E=0,15$ і $E=0,63$), та уникали личинок двокрилих, веснянок і дрібних одноденок.

На біотопах з камінням середнього розміру, невисокими перекатами і помірною швидкістю течії на передгірській ділянці річки радужна форель вибирала личинок одноденок ($E=0,64$), веснянок роду *Perloides* ($E=0,23$), личинок двокрилих ($E=0,75$), личинок волохокрильців виду *Rhyacophila septentrionis* ($E=0,74$) і личинок жуків ($E=0,65$), а уникала дрібних бокоплавів та хірономід. Причому, основу її живлення (10–20% за чисельністю і 7–34% за біомасою) складали личинки одноденок, волохокрильців, повітряні комахи і бокоплави. Харіус віддавав перевагу личинкам одноденок ($E=0,86$) та уникав дрібних личинок волохокрильців, вибираючи крупних, які були основою його поживи

($E=-0,56$ за чисельністю та $0,67$ за біомасою). Крім зазначених кормових організмів, харіус вибирав личинок двокрилих ($E=0,30$) та унікав дрібних бокоплавів ($E=-0,91$; $0,65$) (табл. 5).

На біотопах з дрібним камінням, піском та повільною течією на передгірській ділянці річки струмкова форель, яка жила переважно повітряними комахами, серед бентосних організмів вибирала личинок волохокрильців роду *Sericostoma personatum* ($E=0,37$; $0,82$) одноденок ($E=0,39$; $0,84$) та крупних бокоплавів ($E=0,003$; $0,62$) (табл. 5).

Харчові взаємовідносини між дослідженими рибами.

На біотопі з валунами та перекатами зі швидкою течією на передгірській ділянці річки індекси подібності поживи між струмковою та райдужною форелями склали $32,4\%$ за чисельністю і $20,3\%$ за біомасою. Найбільш суттєво спектри живлення перетинались за личинками одноденок роду *Centroptilum* ($27,7\%$; $11,3\%$).

На гірській ділянці річки загальний ІПП між струмковою та райдужною форелями становив $49,6\%$ за чисельністю і $52,9\%$ за біомасою. Найбільш суттєво спектри живлення перетинались за личинками волохокрильців роду *Potamophylax* ($17,9\%$; $35,4\%$) та *Gammaridae* ($20,0\%$; $5,8\%$) (табл. 6).

Таблиця 6. Індекси подібності поживи між райдужною, струмковою форелями та харіусом на різних біотопах р. Шипіт в літній період в 2012 р., %, за чисельністю / за біомасою

Кормові організми	Ділянки річки		
	Передгірська		Гірська
	Біотопи		
	1*	2*	1*
	Види риб		
	Струмкова × райдужна форель	Райдужна форель × харіус	Струмкова × райдужна форель
Загальний індекс ПП	32,4/20,3	19,0/27,9	49,6/52,9
Найбільш суттєві ІПП:			
<i>Ephemeroptera larvae</i>	28,3/12,1	6,1/11,3	1,0/0,7
з них:			
<i>Ecdyonurus</i> sp.	0,4/0,8	0,7/10,2	0,5/0,4
<i>Centroptilum</i> sp.	27,7/11,3	5,4/1,1	0,0/0,0
<i>Trichoptera larvae</i>	0,7/1,3	3,4/10,9	22,0/37,8
з них:			
<i>Rhyacophila septentrionis</i>	0,7/1,3	0,0/0,0	3,2/1,2
<i>Potamophylax</i> sp.	0,0/0,0	2,2/8,4	17,9/35,4
<i>Gammaridae</i>	0,4/0,5	2,0/1,8	20,0/5,8
<i>Insecta imago</i>	-/4,1	6,0/3,7	4,0/8,3
Загальний ІПП за макрозообентосом	32,4/16,3	13,1/24,2	45,6/44,6

На біотопах з камінням середнього розміру, невисокими перекатами і помірною швидкістю течії на передгірській ділянці річки загальний ППІ між райдужною фореллю та харіусом становив 19,0% за чисельністю і 27,9% за біомасою. Найбільш суттєвою спектри живлення перетинались за личинками одноденок родів *Centroptilum* (5,4%; 1,1%), *Ecdyonurus* (0,7%; 10,2%), личинками волохокрильців роду *Potamophylax* (2,2%; 8,4%) та Gammaridae (2,2%; 8,4%) (табл. 6).

На біотопах з дрібним камінням, піском та повільною течією на передгірській ділянці річки зустрічалась лише струмкова форель, тому її потенційних харчових конкурентів серед досліджених риб на донному біотопі не виявлено.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Чисельність «м'якого» макрозообентосу в річці Шипіт на різних біотопах коливались від 972 до 2576 екз./м² за біомаси 6,3 до 121,8 г/м². Найвищі значення біомаси спостерігались на передгірській ділянці річки на біотопах з камінням середнього розміру (121,79 г/м²) за рахунок значного розвитку личинок волохокрильців роду *Stenophylax* (80,8% від загальної біомаси) та *Hydropsyche pellucidula* (6,0%). Найменші показники біомаси були зафіксовані на гірській ділянці річки на біотопі з валунами та перекатами (6,29 г/м²) при переважанні Gammaridae (27,0%) та личинок волохокрильців роду *Sericostoma* (47,2%).

Найбільш схожий видовий склад макрозообентосу спостерігався на біотопі з валунами та на біотопі з камінням середнього розміру (0,60) на передгірській ділянці річки, а найбільш суттєво відрізнялись між собою за видовим складом біотоп з валунами та біотоп з камінням середнього розміру (0,32) на гірській ділянці річки.

Склад харчової грудки досліджених риб певною мірою залежить від наявності тих чи інших кормових організмів. На біотопах з валунами основу живлення струмкової форелі складали одноденки (передгір'я) або бокоплавці і волохокрильці (гірська частина), а райдужної форелі — хірономіди і одноденки (передгір'я) або волохокрильці і комахи (гірська частина). Спектри живлення струмкової та райдужної форелей найбільш щільно перетинались за личинками одноденок роду *Centroptilum*, складаючи 27,7% за чисельністю та 11,3% за біомасою (передгір'я), та за личинками волохокрильців роду *Potamophylax* (17,9% та 35,4%, відповідно) і бокоплавами (20,0 та 5,8% відповідно) (гірська частина).

На біотопі з камінням середнього розміру (передгір'я) живлення радужної форелі було більш різноманітним: його основу складали повітряні комахи, одноденки, волохокрильці, а харіуса — одноденки і волохокрильці. Найбільш суттєво спектри живлення райдужної форелі і харіуса перетинались за личинками одноденок родів *Centroptilum* (5,4 та 1,1%), *Ecdyonurus* (0,7 та 10,2%), личинками волохокрильців роду *Potamophylax* (2,2 та 8,4%) і Gammaridae (2,0 та 1,8% відповідно).

Наявність харчової конкуренції можлива лише на гірській ділянці річки між струмковою та райдужною форелями за личинками волохокрильців роду *Potamophylax* (17,9% та 35,4% відповідно), враховуючи їх незначну біомасу в

річці та на передгірській ділянці річки на валунах, а також за одноденками роду *Centroptilum* за умови низької чисельності та біомаси представників даного роду у складі кормової бази річки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Minshall G. W. Aquatic insect-substratum relationships / G. W. Minshall // The ecology of aquatic insects. — New York : Praeger Publishers, 1984. — P. 358—400.
2. Culp J. M. Analysis of longitudinal zonation and the River Continuum Concept in the Oldman-South Saskatchewan River system / J. M. Culp, R. W. Davis // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. — 1982. — Vol. 29. — P. 1258—1266.
3. Gowns I. O. Longitudinal changes in near-bed flow and macroinvertebrate communities in a Western Australian stream / I. O. Gowns, J. A. Davis // Journal of the North American Benthological Society. — 1994. — Vol. 13. — P. 417—438.
4. Grubaugh J. W. Longitudinal changes of macroinvertebrate communities along an Appalachian stream continuum / J. W. Grubaugh, J. B. Wallace, E. S. Houston // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. — 1996. — Vol. 53. — P. 896—909.
5. Younes-Baraille Y. Impact of longitudinal and seasonal changes of water quality on the benthic macro-invertebrate assemblages of the Andorran streams / B. Y. Younes, X. F. Garcia, J. Gagneur // C. R. Biologies. — 2005. — Vol. 328. — P. 963—976.
6. The river continuum concept / R. L. Vannote, G. W. Minshall, K. W. Cummins [et al.] // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. — 1980. — Vol. 37. — P. 130—137.
7. Френкель С. В. Дрифт беспозвоночных как кормовая база молоди лососей в типичной малой реке Сахалина : дис. ... кандидата биол. наук : 03.03.10 / Френкель Светлана Эдуардовна. — М., 2011. — 226 с.
8. Hauer F. R. Methods in stream ecology / F. R. Hauer, G. A. Lamberti. — London : Academic Press, 1996. — 673 p.
9. Harka A. Fish fauna of the Upper Tisza / A. Harka, P. Bănărescu // Tisza monograph series The Upper Tisza Valley. — Szolnok-Szeged-Tirgu Mures : Tisza Klub, 1999. — P. 439—454.
10. Задорина В. М. Значение взрослых насекомых в питании молоди лососевых / В. М. Задорина // Вопр. ихтиологии. — 1988. — Т. 28, № 2. — С. 259—265.
11. Опалатенко Л. К. Форели и хариус бассейна верхнего Днестра / Л. К. Опалатенко // Биологические основы реконструкции, рационального использования и охраны фауны южной зоны Европейской части СССР: зоологическое совещание : матер. — Кишинев, 1965. — С. 224—229.
12. Sastav prehrane lipljena *Thymallus thymallus* L., iz rijeke Krušnice / A. Bećiraj, A. Ivanc, M. Piria, R. Dekić // Ribarstvo. — 2008. — № 66. — P. 105—118.
13. Çetinkaya O. Investigations of some biological properties of brown trout (*Salmo trutta* Dum., (1858) living the Çatak Stream (Tigris River, Turkey) / O. Çetinkaya //

- Istanbul University Journal of Aquatic Products. — 1999. — № 13. — P. 111—122.
14. Kara S. Feeding habits and diet composition of brown trout (*Salmo trutta*) in the upper streams of River Ceyhan and River Euphrates in Turkey / S. Kara, A. Alp // Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. — 2005. — № 29. — P. 417—428.
15. Kruzhylina S. V. Autumn diet and trophic relations of juvenile brown trout (*Salmo trutta*), rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) and European grayling (*Thymallus thymallus*) in the Shipot river, Ukraine / S. Kruzhylina, A. Didenko // Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research The Upper Tisa River Basin. — 2011. — Vol. 11. — P. 169—182.
16. Kukula K. Struktura pokarmu pstrąga potokowego *Salmo trutta* m. *fario* L. w potoku Wołosaty (bieszczadzkie) / K. Kukula, A. Bylak // Roczniki Bieszczadzkie. — 2007. — № 15. — P. 231—241.
17. Diel and seasonal variations in brown trout (*Salmo trutta*) feeding patterns and relationship with invertebrate drift under natural and hydropeaking conditions in a mountain stream / T. Lagarrigue, R. Cereghino, P. Lim [et al.] // Aquatic Living Resources. — 2002. — № 15. — P. 129—137.
18. Steingrímsson S. Ó. Body size, diet and growth of landlocked brown trout *Salmo trutta* in the subarctic river Laxá / S. Ó. Steingrímsson, G. M. Gislason // North-East Iceland. Environmental Biology of Fishes. — 2002. — № 63. — P. 417—426.
19. Власова Е. К. Материалы по форелям Закарпаття / Е. К. Власова // Научные записки Ужгородского гос. университета. — 1958. — Т. XXXI. — С. 33—61.
20. Шнаревич И. Д. Основы освоения и воспроизводства рыбных ресурсов рек Украинских Карпат : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. биол. наук : спец. 06.02.03 / И. Д. Шнаревич. — Черновцы, 1969. — 39 с.
21. De la Noue J. Apparent digestibility of invertebrate biomasses by rainbow trout / J. De la Noue, G. Choubert // Aquaculture. — 1985. — Vol. 50. — P. 103—112.
22. Temporal variations in the diet of the exotic rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) in an Andean-Patagonian canopied stream Revista / L. M. Buria, R. J. Albariño, B. E. Modenutti [et al.] // Chilena de Historia Natural. — 2009. — № 82. — P. 3—15.
23. Elliott J. M. The food of brown trout and rainbow trout (*Salmo trutta* and *S. gairdneri*) in relation to the abundance of drifting invertebrates in a mountain stream / J. M. Elliott // Oecologia. — 1973. — № 12. — P. 329—347.
24. Живлення та трофічні взаємовідносини європейського хариуса та струмкової форелі у річках Закарпатського регіону / С. В. Кружиліна, О. В. Діденко, І. В. Великопольський [та ін.] // Гидробиологический журнал. — 2013. — Т. 49, № 2. — С. 67—78.
25. Roussel J. M. Microhabitats of brown trout when feeding on drift and when resting in a lowland salmonid brook: effects on Weighted Usable Area / J. M. Roussel, A. Bardonnnet, A. Claude // Archiv fur Hydrobiologie. — 1999. — № 146. — P. 413—429.
26. Hughes N. F. Position choice by three drift-feeding salmonids: model and test for Arctic grayling (*Thymallus arcticus*) in subarctic mountain streams, interior Alaska

- / N. F. Hughes, L. M. Dill // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. — 1990. — № 47. — P. 2039—2048.
27. Allan J. D. Stream ecology: structure and function of running waters / Allan J. D. — New York : Chapman & Hall. — 1995. — 388 p.
28. Bridcut E. E. A study of terrestrial and aerial macroinvertebrates on river banks and their contribution to drifting fauna and salmonid diets in a Scottish catchment / E. E. Bridcut // Hydrobiologia. — 2000. — Vol. 427. — P. 83—100.
29. Murphy B. R. Fisheries techniques / B. R. Murphy, D. W. Willis: [2nd edition.]. — Bethesda, Maryland : American Fisheries Society, 1996. — 521 p.
30. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [Арсан О. М., Давидов О. А., Дьяченко Т. М. та ін.]; ред. В. Д. Романенко. — К. : ЛОГОС, 2006. — 406 с.
31. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция / Гос. НИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, АН СССР, Зоол. ин-т ; [Сост. А. А. Салазкин и др.]. — Л. : ГосНИОРХ, 1984. — 51 с.
32. Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях. — М. : Наука, 1974. — 254 с.
33. Шорыгин А. А. Питание и пищевые взаимоотношения рыб Каспийского моря / Шорыгин А. А. — М. : Пищепромиздат, 1952. — 268 с.
34. Ивлев В. С. Экспериментальная экология питания рыб / Ивлев В. С. — М. : Пищепромиздат, 1953. — 250 с.
35. Sørensen T. A. Method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content / T. A. Sørensen // Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Biol. skrifter. Bd V. — 1948. — № 4. — P. 1—34.

REFERENCES

1. Minshall, G. W. (1984). Aquatic insect-substratum relationships. *The ecology of aquatic insects*. New York : Praeger Publishers, 358-400.
2. Culp, J. M., & Davis, R. W. (1982). Analysis of longitudinal zonation and the River Continuum Concept in the Oldman-South Saskatchewan River system. *Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 29, 1258-1266.
3. Gowns, I. O., & Davis, J. A. (1994). Longitudinal changes in near-bed flow and macroinvertebrate communities in a Western Australian stream. *Journal of the North American Benthological Society*, 13, 417-438.
4. Grubaugh, J. W., Wallace, J. B., & Houston, E. S. (1996). Longitudinal changes of macroinvertebrate communities along an Appalachian stream continuum. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 53, 896-909.
5. Younes-Baraille, Y., Garcia, X. F., & Gagneur, J. (2005). Impact of longitudinal and seasonal changes of water quality on the benthic macro-invertebrate assemblages of the Andorran streams. *C. R. Biologies*, 328, 963-976.
6. Vannote, R. L., Minshall, G. W., Cummins, K. W., Sedell, J. R., & Cushing, C. E. (1980). The river continuum concept. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 37, 130-137.
7. Frenkel', S. V. (2011). Drift bespozvonochnykh kak kormovaya baza molodi lososey v tipichnoy maloy reke Sakhalina, *Candidate's thesis*. Moskva.

8. Hauer, F. R., & Lamperti, G. A. (1996). *Methods in stream ecology*. London : Academic Press.
9. Harka, A., & Bănărescu, P. (1999). Fish fauna of the Upper Tisza. *Tiscia monograph series. The Upper Tisa Valley*. Szolnok–Szeged–Tirgu Mures : Tisza Klub, 439-454.
10. Zadorina, V. M. (1988). Znachenie vzroslykh nasekomykh v pitanii molodi losesevykh. *Voprosy ikhtiologii*, 28, 2, 259-265.
11. Opalatenko, L. K. (1965). Foreli i kharius basseyna verkhnego Dnestra. *Biologicheskie osnovy rekonstruktsii, ratsional'nogo ispol'zovaniya i okhrany fauny yuzhnoy zony Evropeyskoy chasti SSSR: zoologicheskoe soveshchaniye*. Kishinev, 224-229.
12. Bećiraj, A., Ivanc, A., Piria, M., & Dekić, R. (2008). *Sastav prehrane lipljena Thymallus thymallus* L., iz rijeke Krušnice. *Ribarstvo*, 66, 105-118.
13. Çetinkaya, O. (1999). Investigations of some biological properties of brown trout (*Salmo trutta* Dum. (1858) living the Çatak Stream (Tigris River, Turkey). *Istanbul University Journal of Aquatic Products*, 13, 111-122.
14. Kara, S., & Alp, A. (2005). Feeding habits and diet composition of brown trout (*Salmo trutta*) in the upper streams of River Ceyhan and River Euphrates in Turkey. *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences*, 29, 417-428.
15. Kruzhylina, S., & Didenko, A. (2011). Autumn diet and trophic relations of juvenile brown trout (*Salmo trutta*), rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) and European grayling (*Thymallus thymallus*) in the Shipot river, Ukraine. *Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research*, 11, 169-182.
16. Kukuła, K., & Bylak, A. (2007). Struktura pokarmu pstrąga potokowego *Salmo trutta m. fario* L. w potoku Wołosaty (bieszczady zachodnie). *Roczniki Bieszczadzkie*, 15, 231-241.
17. Lagarrigue, T., Cereghino, R., Lim, P., Reyes-Marchant, P., Chappaz, R., Lavandier, P., & Belaud, A. (2002). Diel and seasonal variations in brown trout (*Salmo trutta*) feeding patterns and relationship with invertebrate drift under natural and hydropeaking conditions in a mountain stream. *Aquatic Living Resources*, 15, 129-137.
18. Steingrímsson, S. Ó., & Gíslason, G. M. (2002). Body size, diet and growth of landlocked brown trout *Salmo trutta* in the subarctic river Laxá, North-East Iceland. *Environmental Biology of Fishes*, 63, 417-426.
19. Vlasova, E. K. (1958). Materialy po forelyam Zakarpat'ya. *Nauchnye zapiski Uzhgorodskogo gos. universiteta*, XXXI, 33-61.
20. Shnarevich, I. D. (1969). Osnovy osvoeniya i vosproizvodstva rybnykh resursov rek Ukrainykh Karpat. *Extended abstract of Doctor's thesis*. Chernovtsy.
21. De la Noue, J., & Choubert, G. (1985). Apparent digestibility of invertebrate biomasses by rainbow trout. *Aquaculture*, 50, 103-112.
22. Buria, L. M., Albariño, R. J., Modenutti, B. E., & Balseiro, E. G. (2009). Temporal variations in the diet of the exotic rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) in an Andean-Patagonian canopied stream. *Revista Chilena de Historia Natural*, 82, 3-15.
23. Elliott, J. M. (1973). The food of brown trout and rainbow trout (*Salmo trutta* and *S. gairdneri*) in relation to the abundance of drifting invertebrates in a mountain stream. *Oecologia*, 12, 329-347.

24. Kruzhilina, S. V., Didenko, O. V., Velikopol'skiy, I. V., & Mruk, A. I. (2013). Zhivlennya ta trofichni vzaemovidnosini evropeys'kogo khariusa ta strumkovoi foreli u richkakh Zakarpats'kogo regionu. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 49, 2, 67-78.
25. Roussel, J. M., Bardonnnet, A., & Claude, A. (1999). Microhabitats of brown trout when feeding on drift and when resting in a lowland salmonid brook: effects on Weighted Usable Area. *Archiv fur Hydrobiologie*, 146, 413-429.
26. Hughes, N. F., & Dill, L. M. (1990). Position choice by three drift-feeding salmonids: model and test for Arctic grayling (*Thymallus arcticus*) in subarctic mountain streams, interior Alaska. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 47, 2039-2048.
27. Allan, J. D. (1995). Stream ecology: structure and function of running waters. New York : Chapman & Hall.
28. Bridcut, E. E. (2000). A study of terrestrial and aerial macroinvertebrates on river banks and their contribution to drifting fauna and salmonid diets in a Scottish catchment. *Hydrobiologia*, 427, 83-100.
29. Murphy, B. R., & Willis, D. W. (1996). *Fisheries techniques*. Bethesda, Maryland : American Fisheries Society.
30. *Metodyka hidroekologichnykh doslidzhen poverkhnevyykh vod* (2006). Romanenko, V. D. (Ed.). Kyiv : Lohos.
31. *Metodicheskie rekomendatsii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskikh issledovaniyakh na presnovodnykh vodoemakh. Zoobentos i ego produktsiya* (1984). Salazkin, A. A. et al. (Comp.) Leningrad : GosNIORKh.
32. *Metodicheskoe posobie po izucheniyu pitaniya i pishchevyykh otnosheniy ryb v estestvennykh usloviyakh*. (1974). Moskva : Nauka.
33. Shorygin, A. A. (1952). *Pitanie i pishchevye vzaimootnosheniya ryb Kaspiyskogo morya*. Moskva : Pishchepromizdat.
34. Ivlev, V. S. (1953). *Eksperimental'naya ekologiya pitaniya ryb*. Moskva : Pishchepromizdat.
35. Sörensen, T. A. (1948). Method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content. *Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Biol. krifter. Bd*, 4, 1-34.

**КОРМОВАЯ БАЗА И ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ РУЧЬЕВОЙ
И РАДУЖНОЙ ФОРЕЛЕЙ И ХАРИУСА НА РАЗНЫХ БИОТОПАХ
РЕКИ ШИПОТ ЗАКАРПАТСКОГО РЕГИОНА**

С. В. Кружилина, Sveta_kru@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
А. В. Диденко, al_didenko@yahoo.com, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
И. И. Великопольский, vely@meta.ua, Рыбное хозяйство «Равнинг и Силлерупвелд», г. Рандбол, Дания

Цель. Исследование кормовой базы, условий питания и пищевых взаимоотношений ручьевой, радужной форелей и хариуса в реках Закарпатского региона.

Методика. Материал по кормовой базе рыб и питанию ручьевой, радужной форелей и хариуса собирали в летний период 2012 г. на реке Шипот. Исследования проводились на двух

разных по расположению участках реки: первая расположена на среднем предгорном участке течения реки (выше ГЭС); вторая — на горном участке реки (р-н турбазы) на типичных биотопах: I — с валунами и перекатами с быстрым течением; II — с камнями среднего размера, невысокими перекатами и умеренной скоростью течения; III — с мелкими камнями, песком и медленным течением. Материал собирали, обрабатывали и интерпретировали согласно общеизвестным, гидробиологическим, ихтиологическим и трофологическим методикам.

Результаты. Изучены уровень развития макрозообентоса, а также питание и трофические взаимоотношения между ручьевой (*Salmo trutta*) и радужной (*Oncorhynchus mykiss*) форелями, а также между радужной форелью и хариусом (*Thymallus thymallus*) на различных биотопах горного и предгорного участков реки Шипот. Численность «мягкого» макрозообентоса в реке на различных биотопах колебалась от 972 до 2576 экз./м² при биомассе от 6,3 до 121,8 г/м². Общий индекс пищевого сходства (ИПС) между ручьевой и радужной форелями на биотопе с валунами и быстрым течением в предгорье составлял 32,4% по численности и 20,3% по биомассе, а в горной части реки — 49,6% и 52,9%, соответственно. На биотопе с камнями среднего размера и умеренным течением ИПС между радужной форелью и хариусом в предгорье составил 19,0% по численности и 27,9% по биомассе.

Научная новизна. Впервые исследовано питание ручьевой и радужной форелей и хариуса на различных биотопах р. Шипот.

Практическая значимость. Результаты данной работы могут использоваться при расчетах объемов зарыбления рек Закарпатского региона радужной форелью и хариусом.

Ключевые слова: *Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Thymallus thymallus*, река Шипот, зообентос, горные реки, биотопы, кормовая база, биомасса, питание, трофическая конкуренция, индекс элективности, индекс пищевого сходства.

FOOD RESOURCES AND TROPHIC RELATIONSHIPS OF BROWN, RAINBOW TROUT AND EUROPEAN GRAYLING IN DIFFERENT HABITATS OF SHYPIT RIVER OF THE TRANSCARPATHIAN REGION

S. Kruzhylina, Sveta_kru@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

O. Didenko, al_didenko@yahoo.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

I. Velykopolsky, vely@meta.ua, Ravning & Sillerupvold fish farm, Randbol, Denmark

Purpose. To study food resources, feeding conditions and trophic relationships of the brown trout (*Salmo trutta morpha fario*), rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*), and European grayling (*Thymallus thymallus*) in a Transcarpatian river.

Methodology. The material on the food resources and feeding of the brown trout, rainbow trout, and European grayling was collected in summer period of 2012 on the Shypit river. The study was performed on two different sites of the river: the first one was located on the middle pre-mountain reach of the river (upstream of the Hydroelectric power plant), the second one — on the mountain reach of the river (near tourist base) on typical biotopes: I — with boulders and riffles with fast current; II — with medium size stones and low riffles with moderate current; III — with small stones, sand and slow current. The material was collected and processed according to standard and unified hydrological, ichthyological, and trophological methods.

Findings. We studied the level of macrozoobenthos development and obtained data on feeding and trophic relationships among brown trout, rainbow trout, and European grayling on different biotopes on pre-mountain and mountain reaches of the Shypit river. The number of “soft” macrozoobenthos on different biotopes varied from 972 to 2576 ind./m² with biomasses from 6.3 to

121.8 g/m². Total diet overlap index (DOI) between brown trout and rainbow trout on the biotope with boulders and fast current in the pre-mountain reach was 32.4% by number and 20.3% by biomass, while that on the mountain reach was 49.6% and 52.9%, respectively. On the biotope with medium size stones and moderate current, the diet overlap index between rainbow trout and European grayling in the pre-mountain reach was 19.0% by number and 27.9% by biomass.

Originality. First study of the diet and trophic relationships of the brown trout, rainbow trout, and European grayling on different reaches of the Shypit river.

Practical value. The results of this work can be used when calculating the amounts of brown trout, rainbow trout, and European grayling to be stocked into rivers of the Transcarpathian region.

Keywords: *Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Thymallus thymallus*, Shypit river, zoobenthos, mountain rivers, biotopes, food resources, biomass, feeding, trophic competition, electivity index, diet overlap index.

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 95-102
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.095>
УДК 639.371.52:639.311.045.3"324"(1-924.51/.54)

ЗИМОСТІЙКІСТЬ ЦЬОГОЛІТОК ГАЛИЦЬКОГО КОРОПА У СТАВОВИХ УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ

В. В. Гурбик, dukavv@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Аналіз та оцінка зимівлі цьоголіток галицького коропа у ставах Прикарпаття.

Методика. Дослідження проводилися на базі фермерського господарства «Короп», що знаходиться в селищі Рава-Руська Львівської області. Об'єктом досліджень були вирощені за умов напівінтенсивної форми ставової аквакультури цьоголітки галицького коропа. Основні рибницько-біологічні показники рибопосадкового матеріалу досліджували під час осінніх обловів та після весняної інвентаризації за загальноприйнятими в рибництві методами. Визначення біохімічного складу скелетних м'язів проводили на підставі зоотехнічного аналізу.

Результати. Цьоголітки галицького коропа під час посадки на зимівлю у стави фермерського господарства «Короп» в середньому мали масу $104,0 \pm 7,5$ г, коефіцієнт вгодованості знаходився на рівні $3,1 \pm 0,3$, в той час як після зимівлі він становив $2,6 \pm 0,3$. Біохімічний склад м'язів галицького коропа знаходився в межах нормативних показників, що засвідчує задовільний фізіологічний стан цьоголіток перед зимовим утриманням.

Екологічні умови зимового утримання риб були в межах рибницьких вимог. Термічний режим ставу під час зимівлі цьоголіток галицького коропа знаходився в діапазоні $1-6^{\circ}\text{C}$. За критичні межі не виходив і вміст розчиненого у воді кисню.

Після інвентуризації зимувальних ставів були виловлені цьоголітки середньою масою $92,0 \pm 7,7$ г. Вихід з зимівлі знаходився в межах 86%. Абсолютна втрата маси в кінці зимового періоду не перевищувала 12 г, що у відносному вимірі становить 11,5%.

З отриманих даних під час зимівлі посадкового матеріалу галицького коропа можна зробити висновок, що даний процес ставового рибництва був проведений з мінімальними втратами для промислового вирощування в цілому.

Наукова новизна. Вперше здійснено оцінку зимівлі галицького коропа на першому році життя в ставах Прикарпаття.

Практична значимість. Результати роботи будуть використані при плануванні та промисловому вирощуванні галицького коропа.

Ключові слова: галицький короп, посадковий матеріал, зимівля, коефіцієнт вгодованості.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Риби належать до пойкилотермних тварин — всі їх фізіологічні процеси залежать від абіотичних чинників середовища. Передвісником підготовки до зимівлі є зниження температурного режиму води ставу до 9°C [1, 2].

© В. В. Гурбик, 2016

Від рівня виживання посадкового матеріалу в зимовий період залежить рентабельність виробництва, а також забезпеченість посадковим матеріалом на наступний вегетаційний період. Іноді втрати під час цього технологічного процесу можуть сягати близько половини від посаджених на зимівлю цьоголіток. Існує велика кількість досліджень, які висвітлюють залежність успішної зимівлі від фізіологічного стану цьоголіток коропа та організації спостережень за абіотичними чинниками середовища [3].

Встановлено, що вплив термічного режиму має вагоме значення у формуванні сприятливих умов для зимового утримання посадкового матеріалу. Наслідком теплих умов та різких перепадів температури води в період зимівлі є високий відсоток відходу майбутніх однорічок [4, 5, 6].

В період зимівлі в організмі коропа відбуваються складні біохімічні процеси, зокрема змінюється амінокислотний склад скелетних м'язів. Основною причиною загибелі риб в означений період є втрата незамінних амінокислот [7].

Згідно з рибоводно-біологічними нормами, для з'ясування фізіологічного стану рибопосадкового матеріалу окрім коефіцієнта вгодованості, визначають хімічний склад скелетних м'язів [8, 9].

Отже, для оцінки фізіологічної підготовленості до зимівлі посадкового матеріалу необхідне визначення та використання всього комплексу показників, вказаних вище.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

В процесі вирощування коропових риб у ставах велике значення має зимівля риб. Під час цього технологічного процесу на цьоголіток риб впливає низка абіотичних чинників, від яких залежить рівень виживання майбутнього рибопосадкового матеріалу. Також на посадковий матеріал впливає і фізіологічна підготовленість риби [10].

З метою підвищення рибопродуктивності ставів застосовується збільшена, порівняно з нормативною, густота посадки цьоголіток, що справляє негативний вплив на кормність водойми, а саме забезпеченість риби природними кормами впродовж вегетаційного сезону. Для подолання наслідків цього впливу проводиться низка інтенсифікаційних заходів, зокрема удобрення ставів та підгодівля риб штучно виготовленими кормами, що сприяє їх підготовленості до зимового утримання. Від успішності зимівлі цьоголіток та отримання високоякісного посадкового матеріалу залежить подальше вирощування товарної риби.

Тому метою нашого дослідження було вивчення абіотичних чинників ставів Прикарпаття в зимовий період та аналіз зимостійкості рибопосадкового матеріалу галицького коропа на першому році життя.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проводились у 2015–2016 рр. на базі фермерського господарства «Короп» в селищі Рава-Руська Львівської області. Джерелом водопостачання цього господарства є р. Рата. Зимівля проходила у ставу площею

2,5 га. Гідрохімічні показники визначали за допомогою загального хімічного аналізу [11]. Температурний та кисневий режими води у ставах визначали термооксиметром. Матеріалом дослідження були цьоголітки та однорічки галицького коропа. Визначення рибогосподарських показників галицького коропа на першому році життя проводилося згідно з інструкцією щодо організації зимівлі рибопосадкового матеріалу в ставах [12]. Для визначення біохімічних показників скелетних м'язів застосовували методику зоотехнічного аналізу [13]. З метою оцінки успішності зимового утримання галицького коропа визначали такі біохімічні показники як жир, протеїн та суха речовина. Опрацювання отриманих експериментальних даних проводили за комп'ютерною програмою MS Excel.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Зимувальний став фермерського господарства «Короп» протягом літнього періоду використовувався як вирощувальний I порядку. Тому було проведено необхідні рибницько-меліоративні профілактичні заходи з підготовки ставу до процесу зимівлі в ньому риб, які в подальшому забезпечують деструкцію кумулятивних органічних речовин. На початку жовтня, після вилову вирощуваних протягом літа риб, ложе ставу осушували протягом 21 дня, продезінфікували шляхом внесення хлорного вапна з розрахунку 250 кг/га.

Стабілізація гідрохімічного стану досягалась шляхом заливки зимувальних ставів за 12 діб до посадки цьоголіток галицького коропа. В кінці жовтня у підготовлений для зимівлі риб став площею 4 га було посаджено 36 тис. екз. цьоголіток галицького коропа, середньою масою 104 г. Густота посадки риб на зимівлю становила 9,3 т/га.

Перед посадкою на зимівлю коефіцієнт вгодованності риб за Фультоном, знаходився на рівні 3,1, що відповідає нормативним значенням [12]. Це зумовлено підгодовлює штучними кормами в кінці вегетаційного сезону для кращої підготовки цьоголіток до зимового технологічного процесу. Найменший показник вгодованності у цьоголіток галицького коропа становив 2,1, а найбільший — 3,6.

Одним із важливих аспектів оцінки зимівлі цьоголіток риб є біохімічна характеристика їх скелетних м'язів. Хімічний склад м'яса-філе цьоголіток галицького коропа під час посадки на зимівлю знаходився в межах нормативних показників (табл. 1).

Таблиця 1. Загальний хімічний склад скелетних м'язів цьоголіток галицького коропа

Показник	Галицький короп	Нормативні показники, % [16]
Волога, %	77,4 ± 1,6	72–76
Суха речовина, %	22,5 ± 1,6	28–24
Жир, %	6,9 ± 0,5	6–8
Протеїн, %	16,5 ± 0,8	16–17

Інші значення показників хімічного складу скелетних м'язів цьоголіток галицького коропа не виходили за межі нормативних значень, що засвідчує задовільний фізіологічний стан організму [14, 15].

Екологічні умови зимового утримання риб перебували в межах рибницьких вимог. Термічний режим ставу під час зимівлі цьоголіток галицького коропа знаходився в межах 1–6°C (рис. 1).

Рис. 1. Термічний режим води зимувального ставу

Найнижчою спостерігалась температура води у січні 2016 р., найвищою — у листопаді 2015 р. та березні 2016 р., що, в свою чергу зумовлено кінцем та початком вегетаційного сезону. В період зимового утримання цьоголіток галицького коропа вміст розчиненого у воді кисню знаходився в межах від 4 до 9 мг/л (рис. 2).

Рис. 2. Кисневий режим зимувального ставу

Найнижчим цей показник спостерігався в березні, найвищим — у січні 2016 р. Вміст розчиненого у воді кисню в період зимівлі не виходив за критичні межі. Інші гідрохімічні показники відповідали рибогосподарським вимогам.

У квітні зимувальний став було обловлено і отримано 31,0 тис. екз. однорічок галицького коропа середньою масою 92 г. Загальний вихід становив 86%. Незважаючи на те, що температура води зимувального ставу була дещо підвищеною, як для зимівлі риб (0,5–2,0°C), і становила в період льодоставу 2,0–3,0°C, що спричиняло підвищену рухливість риб і негативно відбивалося на їхніх енергетичних ресурсах, втрати маси риб за зимівлю не перевищили нормативних показників. Абсолютна втрата маси після зимівлі цьоголіток галицького коропа в середньому становила 12 г, що у відносному виразі становить 11,5%. Після

зимівлі найбільша величина коефіцієнта вгодованності становила 3,1, найменша — 1,9. В середньому коефіцієнт вгодованності склав 2,6 (табл. 2).

Таблиця 2. Результати зимівлі цьоголіток галицького коропа

Посаджено	Кількість, тис. екз.	36,0
	Середня маса, г	104,0±7,5
	Загальна маса, кг	3 744
	Коефіцієнт вгодованності	3,1±0,3
Вивлено	Кількість, тис. екз.	31,0
	Вихід з зимівлі, %	86
	Середня маса, г	92,0±7,7
	Загальна маса, кг	2 601
	Коефіцієнт вгодованності	2,6±0,3
Втрата маси	Абсолютна, г	12
	Відносна, %	11,5

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Цьоголітки галицького коропа за вирощування в умовах ставів Прикарпаття відзначаються високою зимостійкістю, яка за кількісними показниками перевищує нормативні для цієї зони рибництва. Втрати їх маси за період зимівлі були в межах нормативних показників.

Визначення зимостійкості цьоголіток галицького коропа є одним з важливих показників для подальшого детального вивчення рибогосподарської характеристики дволіток.

ЛІТЕРАТУРА

1. Технологія зимівлі рибопосадкового матеріалу цінних об'єктів аквакультури / Гринжевський М. В., Андрищенко А. І., Олексієнко О. О. — К. : Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук, 1998. — 31 с.
2. Лобченко В. Рыбоводство: Справочная книга рыбовода-фермера / Лобченко В. — Кишинев : Vitalis, 2004. — 104 с.
3. Методические указания по организации зимовки сеголетков карпа в условиях центральной зоны РСФСР/ сост. Щербина М. А. — М. : Всесоюзный научно-исследовательский институт прудового рыбного хозяйства, 1976. — 67 с.
4. Лянзберг О. В. Вплив термічного режиму на результативність зимівлі рибопосадкового матеріалу коропових риб в умовах півдня України / О. В. Лянзберг // Таврійський науковий вісник. — 2008. — Вип. 56. — С. 172—176.
5. Морузи И. В. Продолжительное влияние низких температур во время зимовки на состояние сеголетков карпа / И. В. Морузи, Е. В. Пищенко // Рыбоводство и рыбное хозяйство. — 2007. — № 12. — С. 36—39.

6. Таразевич Е. В. Сравнительная характеристика результатов зимовки годовиков двухпородных кросов карпа / Е. В. Таразевич // Рыбогосподарська наука України. — 2011. — № 3. — С. 84—90.
7. Желтов Ю. А. Влияние зимовки на физиологическое состояние организма карпа в зависимости от типа кормления / Ю. А. Желтов, Л. Д. Проценко // Рыбное хозяйство. — 1972. — Вып. 15. — С. 13—15.
8. Демченко І. Ф. Інструкція з організації зимівлі риб / Демченко І. Ф., Харитонова Н. М., Довбенко Л. І. // Інтенсивне рибництво. — К. : Аграрна наука, 1995. — С. 178—185.
9. Куровский Е. А. Повышение выхода рыбопосадочного материала из зимовки в условиях интенсивного карповодства УССР : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 097 «Зоология» / Е. А. Куровский. — Чернигов, 1969. — 23 с.
10. Канаев А. И. Новая технология зимовки рыб / Канаев А. И. — М. : Колос, 1976. — 127 с.
11. Алекин О. А. Основы гидрохимии / Алекин О. А. — Л. : Гидрометеоиздат, 1970. — 480 с.
12. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству : [в 2-х т.]. Т. 1. — М. : Агропромиздат, 1986. — С. 201—222.
13. Инструкция по физиолого-биохимическим анализам рыбы / сост. Лиманский В. В., Яржомбек А. А., Белина Е. Н. — М. : ВНИИПРХ, 1984. — 60 с.
14. Шульман Г. Е. Физиолого-биохимические особенности годовых циклов рыб / Шульман Г. Е. — М. : Пищевая промышленность, 1972. — С. 323—368.
15. Маслова Н. И. Биохимические признаки – индикаторы при оценке сезонной изменчивости обмена веществ у карпов / Н. И. Маслова // Сельскохозяйственное рыбоводство: возможности развития и научное обеспечение инновационных технологий : Междунар. науч.-практ. конф. : доклады. — М., 2012. — С. 92—106.

REFERENCES

1. Hrynzhhevskiy, M. V., Andriushchenko, A. I., & Oleksijenko, O. O. (1998). *Tekhnolohiia zymivli ryboposadkovoho materialu tsinnykh ob'ektiv akvakultury*. Kyiv : Instytut rybnoho hospodarstva Ukrainskoi akademii ahrarykh nauk.
2. Lobchenko, V. (2004). *Rybovodstvo: Spravochnaja kniga rybovoda fermera*. Kishinev : Vitalis.
3. Shherbina, M. A. (1976). *Metodicheskie ukazaniya po organizacii zimovki segoletkov karpa v uslovijah central'noj zony RSFSR*. Moskva. Vsesojuznyj nauchno-issledovatel'skij institut prudovogo rybnogo hozjajstva.
4. Lianzberh, O. V. (2008). Vplyv termichnoho rezhymu na rezultatyvnist zymivli ryboposadkovoho materialu koropovykh ryb v umovakh pivdnia Ukrainy. *Tavriiskiyi naukovyi visnyk*, 56, 172-176.
5. Moruzi, I. V., & Pishhenko, E. V. (2007). Prodolzhitelnoe vliyanie nizkikh temperatur vo vremya zimovki na sostojanie segoletkov karpa. *Rybovodstvo i rybnoe hozjajstvo*, 12, 36-39.

6. Arazevich, E. V. (2011). Sravnitel'naya kharakteristika rezul'tatov zimovki godovikov dvukhporodnykh krosov karpa. *Rybohospodarska nauka Ukrayiny*, 3, 84-90.
7. Zheltov, Yu. A., & Protsenko, L. D. (1972). Vliyanie zimovki na fiziologicheskoe sostoyanie organizma karpa v zavisimosti ot tipa kormleniya. *Rybnoe khozyaystvo*, 15, 13-15.
8. Demchenko, I. F., Kharytonova, N. M., & Dovbenko, L. I. (1995). Instruksiiia z orhanizatsii zymivli ryb. *Intensyvne rybnytstvo*. Kyiv : Ahrarna nauka, 178-185.
9. Kurovskiy, E. A. (1969). Povyshenie vykhoda ryboposadochnogo materiala iz zimovki v usloviyakh intensivnogo karpovodstva USSR. *Extended abstract of candidate's thesis*. Chernigov.
10. Kanaev, A. I. (1976). *Novaya tekhnologiya zimovki ryb*. Moskva : Kolos.
11. Alekin, O. A. (1970). *Osnovy gidrokhimii*. Leningrad : Gidrometizdat.
12. *Sbornik normativno-tekhnologicheskoy dokumentatsii po tovarnomu rybovodstvu*. (1986). (Vol. 1-2). Moskva : Agropromizdat, 201-222.
13. Limanskiy, V. V., Yarzombek, A. A., & Belina, E. N. (Comp.) (1984). *Instruktsiya po fiziologo-biokhimicheskim analizam ryby*. Moskva : VNIIPRKh.
14. Shulman, G. E. (1972). *Fiziologo-biokhimicheskie osobennosti godovykh tsiklov ryb*. Moskva : Pishchevaya promyshlennost.
15. Maslova, N. I. (2012). Biokhimicheskie priznaki – indikatory pri otsenki sezonnoy izmenchivosti obmena veshchestv u karpov. *Sel'skokhozyaystvennoe rybovodstvo : vozmozhnosti razvitiya i nauchnoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologiy : Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya: doklad*. Moskva, 92-106.

ЗИМОСТОЙКОСТЬ СЕГОЛЕТОВ ГАЛИЦИЙСКОГО КАРПА В ПРУДОВЫХ УСЛОВИЯХ ПРИКАРПАТЬЯ

В. В. Гурбик, dukavv@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Анализ и оценка зимовки сеголеток галицийского карпа в прудах Прикарпатья.

Методика. Исследования проводились на базе фермерского хозяйства «Короп», расположенного в поселке Рава-Русская Львовской области. Объектом исследований были выращенные в условиях полунтенсивной формы прудовой аквакультуры сеголетки галицийского карпа. Основные рыбоводно-биологические показатели рыбopосaдoчнoгo мaтepиaлa иccлeдoвaли вo вpeмя oceннeиx oблoвoв и пocлe вeceннeй инвeнтapизaции пo oбщeпpинятым в рыбоводстве методам. Определение биохимического состава скелетных мышц проводили на основании зоотехнического анализа.

Результаты. Сеголетки галицийского карпа во время посадки на зимовку в пруды фермерского хозяйства «Короп» в среднем имели навеску $104,0 \pm 7,5$ г, коэффициент упитанности находился на уровне $3,1 \pm 0,3$, в то время как после зимовки он составлял $2,6 \pm 0,3$. Биохимический состав мышц галицийского карпа находился в пределах нормативных показателей, являясь индикатором удовлетворительного физиологического состояния сеголеток перед зимним содержанием.

Экологические условия зимнего содержания рыб находились в пределах рыбохозяйственных нормативов. Термический режим пруда во время зимовки сеголеток галицийского карпа находился в диапазоне от 1 до 6°C. За критические пределы не выходило и содержание растворенного в воде кислорода.

После инвентаризации выловленные из зимовальных прудов сеголетки имели среднюю массу $92,0 \pm 7,7$ г. Выход их из зимовки составлял 86%. Абсолютная потеря массы в конце зимнего периода не превышала 12 г, что в относительном выражении составляет 11,5%.

Из полученных данных во время зимовки посадочного материала галицийского карпа можно сделать вывод, что указанный рыбоводный процесс был проведен с минимальными потерями для промышленного выращивания в целом.

Научная новизна. Впервые дана оценка зимовки галицийского карпа на первом году жизни в прудах Прикарпаття.

Практическая значимость. Результаты работы будут использованы при планировании и промышленном выращивании галицийского карпа.

Ключевые слова: галицийский карп, посадочный материал, зимовка, коэффициент упитанности.

WINTER HARDINESS OF GALICIAN CARP FINGERLINGS IN POND CONDITIONS OF SUBCARPATHIA

V. Gurbyk, dukavv@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. The analysis and evaluation of wintering of galician carp fingerlings in pond conditions of Subcarpathia

Methodology. Study was conducted at the farm "Korop", located in Rawa-Ruska, Lviv region. The objects of research were fingerlings of Galician carp, growing under semi-intensive conditions. The main fish-breeding and biological indexes were examined during the autumn catches and after spring inventory using conventional fish farming methods. Determination of the biochemical composition of skeletal muscles was conducted under zootechnical analysis.

Findings. The weight of fingerlings of Galician carp during the wintering in ponds of fish-farm "Korop" was an average $104,0 \pm 7,5$ g, nutritional ratio was at $3.1 \pm 0,3$ while after the following winter it was $2.6 \pm 0,3$. The biochemical composition of muscles in Galician carp was within legal parameters, confirming satisfactory physiological state of fish before winter maintenance.

Environmental conditions of winter incubation of fish corresponded to fish breeding requirements. Thermal regime of pond during the winter of Galician carp age 0+ was in the range 1–6°C. The quantity of dissolved oxygen also does not exceed the critical limits. Other hydro-chemical parameters also correspond to the fisheries requirements.

After inventory of wintering ponds the average weight of caught fingerlings was $92,0 \pm 7,7$ g. The out of fish wintering was within 86%. The absolute weight loss at the end of the winter period was not exceeded 12 g, consequently the relative ratio was 11.5%.

From the obtained data, it could be concluded that the process of the wintering of Galician carp fingerlings, was carried with minimal losses for industrial breeding in general.

Originality. For the first time the Galician carp fingerlings were assessed for wintering in ponds of Subcarpathia.

Practical value. The results of current research will be used in planning and industrial breeding of Galician carp.

Keywords: Galician carp, seeding, wintering, the coefficient of fatness.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСМОТИЧНОЇ ЧУТЛИВОСТІ СПЕРМАТОЗОЇДІВ ЩУКИ (*ESOX LUCIUS* L., 1758) ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ

А. Ю. Пуговкін, antonpuhovkin@gmail.com, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

Є. Ф. Копейка, cryo@online.kharkov.ua, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

К. Б. Міксон, cryo@online.kharkov.ua, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

В. О. Черепнін, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

І. І. Грициняк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Вивчення осмотичної чутливості сперматозоїдів щуки (*Esox lucius* L., 1758).

Методика. Осмотичні реакції сперматозоїдів досліджували методом спектрофотометрії на підставі даних про кінетику світлопропускання суспензій клітин, додаванням у дистильовану воду або розчини NaCl осмолярністю 10–200 мОсм/кг. Вимірювання зміни світлопропускання проводили за допомогою фотоелектроколориметра КФ-77 (Польща), обладнаного магнітним перемішувачем і термостатованим кюветним відділенням. Коефіцієнт проникності плазматичних мембран сперматозоїдів для молекул води (L_p) визначали, апроксимуючи експериментальні залежності відносних об'ємів клітин від часу розв'язуванням рівнянь теоретичної моделі. Енергію активації (E_a) процесу перенесення речовин через мембрани клітин розраховували із залежностей $\ln L_p$ від зворотної температури.

Результати. Характерний час проникнення води складає 40–50 с в діапазоні осмолярності 100–200 мОсмоль/кг (12°C). Проникність мембран сперматозоїдів щуки до води дорівнює $5,43 \pm 1,15 \times 10^{-15} \text{ м}^3/\text{Н} \cdot \text{с}$ (12°C). Енергія активації перенесення води через мембрани клітин становить $64 \pm 5 \text{ кДж/моль}$, що свідчить про проникнення води всередину сперматозоїдів шляхом пасивної дифузії через ліпідний бішар. Осмотична резистентність сперматозоїдів щуки може бути визначена за допомогою фотометричного аналізу. Розроблені підходи є простими і швидкими тестами функціонального стану клітинних мембран.

Наукова новизна. Вперше визначений коефіцієнт проникності плазматичних мембран сперматозоїдів щуки та його температурна залежність.

Практична значимість. Результати роботи використовуються при розробленні середовищ і режимів кріоконсервування сперматозоїдів щуки.

Ключові слова: сперматозоїди, щука (*Esox lucius*, L. 1758), осмотична чутливість, проникність мембран, Арреніусові залежності.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Перевагами кріоконсервування сперми є: синхронізація наявності гамет обох статей (сперма може бути збережена і використана, коли отримана ікра), економія сперми (дозволяє використовувати загальний об'єм наявної сперми, що особливо важливо, коли важко її отримати або є можливість отримати лише малі об'єми), спрощення управління племінним стадом (нерест поза сезоном може бути викликаний лише у самиць, і при цьому використовується кріоконсервована сперма), транспортування гамет між різними рибними господарствами (без перевезення тварин для запобігання інфікуванню) та можливість збереження генофонду рідкісних і цінних видів [1, 2].

Характеристики сперматозоїдів варіюють серед видів, в межах одного виду і навіть у зразках від однієї тварини в залежності від періоду збору протягом репродуктивного сезону [3]. Тому аналіз якості сперми та розроблення нових інструментів для її характеризувати вважається пріоритетним напрямом. Також, добре відомо, що зразки сперми мають різну чутливість до заморожування відповідно до їх якості [4, 5]. Таким чином, оцінка сперми відіграє вирішальне значення для того, щоб відібрати кращі за якістю зразки до заморожування або для використання при заплідненні [6].

Збереження клітинної структури і функціональності залежить від протоколу кріоконсервування. Для того, щоб запліднити ікру, сперматозоїди мають зберігати цілісність плазматичних мембран і підтримувати осмотичну рівновагу. Крім того, сперматозоїди повинні активуватись та зберігати свою рухову здатність при потраплянні у воду, щоб досягти яйцеклітини. Рухливість сперматозоїдів має вирішальне значення і залежить від різних характеристик клітин, таких як мітохондріальний статус, біосинтез АТФ, активність каналів плазматичної мембрани, будова флагели. Рухливість є найбільш поширеним параметром для характеризувати якості сперми [7].

Безсумнівно, одним з найпростіших способів перевірки успішності протоколу кріоконсервування сперми є аналіз цілісності і проникності клітинної мембрани. Цілісність і проникність плазматичної мембрани в першу чергу необхідні для функціонування клітини.

Кріоконсервування, як відомо, викликає значні зміни осмоларності середовища, які істотно відрізняються від фізіологічного діапазону клітин прісноводних видів. Сперматозоїди прісноводних риб, які не піддавалися широкому діапазону осмотичних коливань протягом розвитку, не здатні до збереження критичного об'єму клітини, і тому мають нижчу кріорезистентність, ніж клітини морських видів [5, 8].

Процес кріоконсервування веде до морфологічних та функціональних пошкоджень клітин, оскільки він асоціюється зі значними осмотичними змінами: в процесі заморожування клітини стають дегідратованими, а при розморожуванні, вони піддаються гіпотонічним впливам, оскільки вода в результаті еквілібрації займає своє місце. Фаза переходу води в лід — один з найважливіших критичних чинників, що впливають на виживання клітин. Існує критична межа температур, за якої клітини можуть незворотно пошкоджуватися [8].

Стиснення і набухання клітин обмежені їхньою фізичною здатністю протистояти таким змінам. Пошкодження відбувається поза певних рівнів стиснення або набухання (повний діапазон між цими рівнями відомий як максимальна зміна об'єму клітини). Оптимальна рівноважна швидкість заморожування, знайдена для даного типу клітини, передбачає допустимі зміни об'єму, тобто діапазони набухання і стиснення, які не призводять до втрати цілісності мембран й ослаблення функцій клітини (наприклад, рухливості сперматозоїдів та їх запліднювальної здатності). Допустимі варіації об'єму видоспецифічні, залежать від типу клітини, температури нересту та інших чинників [5, 9].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Проникність мембран і енергія активації процесу перенесення речовин через мембрани сперматозоїдів риб досі залишаються маловивченими параметрами, незважаючи на те, що їх необхідно враховувати для обґрунтованого вибору режимів і середовищ кріоконсервування, і, отже, для ефективного збереження генетичного матеріалу риб [10–12].

Метою даної роботи є вивчення осмотичної чутливості сперматозоїдів шуки (*Esox lucius* L., 1758). Для цього були поставлені такі завдання: визначити осмотичну резистентність сперматозоїдів шуки, коефіцієнт проникності мембран для молекул води і енергію активації процесу переносу молекул води через мембрани клітин.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Сперма була отримана від самців шуки (*Esox lucius* L., 1758) масою 1,0–1,5 кг протягом нерестового періоду.

Осмотичні реакції сперматозоїдів досліджували методом спектрофотометрії [13, 14] на підставі даних про кінетику світлопропускання суспензій клітин, додаванням у дистильовану воду або розчини NaCl осмолярністю від 10 до 200 мОсм/кг.

Вимірювання зміни світлопропускання проводили за допомогою фотоелектроколориметра KF-77 (Польща), обладнаного магнітним перемішувачем і термостатованим кюветним відділенням, за довжини хвилі світла 610 нм. Сперму шуки додавали в кювету, заповнену дистилатом або водним розчином NaCl, швидко розмішували вміст струшуванням, ставили кювету у кюветне відділення і фіксували динаміку світлопропускання за допомогою самописця.

Коефіцієнт проникності плазматичних мембран сперматозоїдів для молекул води (L_p) визначали, апроксимуючи експериментальні залежності відносних об'ємів клітин від часу, розв'язуванням рівнянь теоретичної моделі. Енергію активації (E_a) процесу перенесення речовин через мембрани клітин розраховували із залежностей $\ln L_p$ ($1/T$), нахил яких згідно з рівнянням Арреніуса дорівнює E_a/R , де R — універсальна газова стала.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Відомо, що швидкість і тривалість руху, а також відносне число рухливих сперматозоїдів залежить від осмолярності, іонного складу та рН середовища активзації [15]. У цьому контексті, підтримання осмотичної рівноваги є однією з найбільш важливих функцій мембран сперматозоїдів, оскільки в процесі кріоконсервування виникають значні перепади осмотичного тиску на мембрані.

Осмотичність розчину для проведення дослідження розробленим способом зазвичай визначається такою, щоб у цих розчинах не відбувалося пошкодження клітин, але зміна об'єму була достатньою для його реєстрації.

За допомогою спектрофотометрії (нефелометрії) можна визначити кінетику об'єму сперматозоїдів у розчинах будь-якої осмолярності з високою чутливістю до незначних змін об'єму. Дані, що отримані цим методом, як правило, добре корелюють з даними світлової мікроскопії; використання спектрофотометрії дозволяє кількісно описати зміну об'єму сперматозоїдів. Однак, те, що спектрофотометрія дає інформацію про загальну зміну клітинного об'єму, має як свої переваги, так і недоліки [16].

Відносна зміна об'єму клітини з часом після переміщення її в гіпо- або гіпертонічний розчин описується наступним співвідношенням [17]:

$$\frac{V - V_0}{V_0} = \frac{1 - \alpha}{\pi^{out}} (\pi_0^{in} - \pi^{out}) \left[1 - \exp(-\gamma L_p \pi^{out} t) \right],$$

де V — поточне значення об'єму клітини в момент часу (t);

π_0^{in} — осмотичний тиск спермальної плазми (внутрішньоклітинний осмотичний тиск);

π^{out} — осмотичний тиск розчину, в якому знаходиться клітина;

α — частина осмотично неактивного об'єму клітини;

γ — поверхнево-об'ємне відношення клітини;

L_p — проникність клітинної мембрани для молекул води (коефіцієнт фільтрації клітинної мембрани).

При цьому вираз $\frac{1 - \alpha}{\pi^{out}} (\pi_0^{in} - \pi^{out})$ характеризує величину зміни об'єму (закон Вант-Гоффа), а експоненціальне значення $1 - \exp(-\gamma L_p \pi^{out} t)$ визначає, як швидко ця зміна відбудеться, тобто описує швидкість зміни об'єму клітини.

Таким чином, відносна зміна клітинного об'єму описується залежністю виду $1 - \exp(-t/\tau)$, де $\tau = \gamma L_p \pi^{out}$ — характерний час проникнення молекул води у клітину.

Залежність характерного часу проникнення молекул води до сперматозоїдів щуки від осмолярності позаклітинного середовища представлена на рисунку 1.

Експериментально встановлено (див. рис. 1), що характерний час проникнення води до сперматозоїдів щуки складає близько 40–50 с за інкубації клітин в гіпотонічному розчині непроникної речовини осмолярністю 100–200 мОсмоль/кг (за температури +12°C). При зниженні осмолярності середовища інкубації характерний час проникнення молекул води до сперматозоїдів

збільшується, тобто в цих умовах клітина зазнає більшої зміни об'єму. Відповідна залежність характерного часу проникнення води в клітину від осмолярності середовища інкубації вказує на те, що сперматозоїди шуки за реакцією на середовища різної осмолярності близькі до «ідеальних осмометрів» [13].

Рис. 1. Залежність характерного часу проникнення молекул води в сперматозоїди шуки від осмолярності позаклітинного середовища (за температури +12°C)

Застосування модифікованої фізико-математичної моделі Кедем-Качальського [17] дозволяє розрахувати коефіцієнт проникності мембран (L_p) сперматозоїдів для молекул води. Якщо відома кінетика відносного об'єму клітини (характерний час проникнення води до клітини в середовищі певної осмолярності), то для розрахунку L_p необхідне врахування морфометричних характеристик клітин. Припускаючи форму голівки сперматозоїда шуки сферичною та враховуючи середній радіус 0,7 мкм [15], поверхнево-об'ємне відношення клітини γ складає $4,2 \pm 0,2 \text{ мкм}^{-1}$.

Розрахована згідно з цією моделлю проникність мембран сперматозоїдів шуки для молекул води становить $5,43 \pm 1,15 \times 10^{-15} \text{ м}^3/\text{Н} \cdot \text{с}$ (12°C). Як відомо, проникність мембран є функцією від температури [17], тому, варіюючи температуру середовища інкубації сперматозоїдів при фіксованій осмолярності, отримуємо температурну залежність проникності мембран сперматозоїдів шуки для молекул води. Зниження L_p в діапазоні температур 25–10°C характеризується енергією активації переносу води, що дорівнює $64 \pm 5 \text{ кДж/моль}$ (рис. 2). Таке значення E_a свідчить про проникнення води в клітину шляхом пасивної дифузії через ліпідний бішар.

Гіпоосмотична резистентність, яку визначали як час лізису 50% інкубованих в дистилаті сперматозоїдів, становить 70–110 с (12°C).

Розроблені нами підходи дозволяють досліджувати осмотичну толерантність сперматозоїдів деяких прісноводних риб [18–20], можуть бути використані як

прості і швидкі тести функціонального стану клітинних мембран. Отримані результати сприяють теоретично обґрунтованому вибору кріозахисних середовищ і режимів кріоконсервування сперматозоїдів шляхом залучення визначених параметрів сперматозоїдів до фізико-математичних моделей охолодження-відігріву.

Рис. 2. Арреніусова залежність коефіцієнта проникності плазматичних мембран сперматозоїдів щуки

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Осмотична резистентність сперматозоїдів щуки може бути визначена за допомогою фотометричного аналізу. Розроблені підходи є простими і швидкими тестами функціонального стану клітинних мембран.

Досліджено характерний час проникнення води, що складає 40–50 с в діапазоні осмолярності 100–200 мОсоль/кг (12°C). Коефіцієнт проникності мембран для води дорівнює $5,43 \pm 1,15 \times 10^{-15} \text{ м}^3/\text{Н} \cdot \text{с}$.

Встановлена енергія активації перенесення води через мембрани сперматозоїдів щуки, яка дорівнює $64 \pm 5 \text{ кДж/моль}$, свідчить про проникнення води всередину клітини шляхом пасивної дифузії через ліпідний бішар.

Подальше вивчення осмотичної чутливості сперматозоїдів риб сприятиме підвищенню ефективності кріоконсервування сперми.

ЛІТЕРАТУРА

1. Fuller B. J. Life in the frozen stage / Fuller B. J., Lane N., Benson E. E. — CRC Press, 2004. — 663 p.
2. Cryopreservation of fish sperm: applications and perspectives / E. Cabrita, C. Sarasquete, S. Martínez-Páramo [et al.] // J. Appl. Ichthyol. — 2010. — Vol. 26. — P. 623—635.
3. Williot P. Influence of testis state, temperature and delay in semen collection on spermatozoa motility in the cultured Siberian sturgeon (*Acipenser baeri* Brandt) /

- P. Williot, E. F. Kopeika, B. F. Gontcharov // *Aquaculture*. — 2000. — Vol. 189. — P. 53—61.
4. The hypoosmotic swelling test performed with coulter counter: a method to assay functional integrity of sperm membrane in rainbow trout / E. Cabrita, R. Alvarez, E. Anel [et al.] // *Animal Reproduction Science*. — 1999. — Vol. 55. — P. 279—287.
5. Kopeika E. F. Variability of sperm quality after cryopreservation in fish / E. F. Kopeika, J. E. Kopeika // *Fish spermatology* / [eds. S. H. M. Alavi, J. Cosson, K. Coward et al.]. — Oxford : Alpha Science International Ltd., 2007. — P. 347—396.
6. Fauvel C. Evaluation of fish sperm quality / C. Fauvel, M. Suquet, J. Cosson // *Appl. Ichthyol.* — 2010. — Vol. 26. — P. 636—643.
7. Billard R. Some problems related to the assessment of sperm motility in freshwater fish / R. Billard, M. P. Cosson // *Journal of Experimental Zoology*. — 1992. — Vol. 261. — P. 122—131.
8. Kopeika E. Cryopreservation of fish sperm / E. Kopeika, J. Kopeika, T. Zhang // *Cryopreservation and freeze-drying protocols*. Eds. J. G. Day, G. N. Stacey. New Jersey : Humana Press, Totowa, 2007. — P. 203—217.
9. Копейка Е. Ф. Екологічна ніша як фактор, що визначає криорезистентність сперматозоїдів риб / *Проблеми криобіології та криомедицини*. — 2014. — Т. 24, № 4. — С. 302—311.
10. Petrunkina A. M. Fundamental aspects of gamete cryobiology / A. M. Petrunkina // *Journal of Reproductive Medicine and Endocrinology*. — 2007. — Vol. 4. — P. 78—91.
11. Subzero water permeability parameters and optimal freezing rates for sperm cells of the southern platyfish, *Xiphophorus maculatus* / D. Pinisetty, C. Huang, Q. Dong [et al.] // *Cryobiology*. — 2005. — Vol. 50. — P. 250—263.
12. Biophysics of zebrafish (*Danio rerio*) sperm / M. Hagedorn, J. Ricker, M. McCarthy [et al.] // *Cryobiology*. — 2009. — Vol. 58. — P. 12—19.
13. Исследование проницаемости мембран сперматозоидов карпа для молекул воды / А. Ю. Пуговкин, Е. Ф. Копейка, О. А. Нардид [и др.] // *Биофизика*. — 2014. — Т. 59, № 3. — С. 481—487.
14. Пат. № 104809, Україна, МПК G01N 33/48, G01N 15/00 (2006.01) Спосіб визначення проникності мембран сперматозоїдів коропа до молекул води / А. Ю. Пуговкін, Є. Ф. Копейка, Є. О. Гордієнко, О. А. Нардід ; заявл. 27.12.2012 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.
15. Effects of osmolality on sperm morphology, motility and flagellar wave parameters in Northern pike (*Esox lucius*) / S. M. H. Alavi, M. Rodina, T. M. Viveiros [et al.] // *Theriogenology*. — 2009. — Vol. 72. — P. 32—43.
16. Volume changes during the motility period of fish spermatozoa: Interspecies differences / O. Bondarenko, B. Dzyuba, J. Cosson [et al.] // *Theriogenology*. — 2013. — Vol. 79. — P. 872—881.
17. Гордієнко Є. О. Фізика біомембран / Є. О. Гордієнко, В. В. Товстяк. — К. : Наук. думка, 2009. — 272 с.
18. Пуговкин А.Ю. Осмотическая толерантность сперматозоидов некоторых пресноводных рыб / А. Ю. Пуговкин, К. И. Буцкий, Е. Ф. Копейка // *Биофизика живой клетки*. — 2014. — № 10. — С. 149—151.

19. Проникність мембран сперматозоїдів стерляді (*Acipenser ruthenus*, L., 1758) для молекул води / А. Ю. Пуговкін, І. С. Кононенко, В. О. Черепнін [та ін.] // Рибогосподарська наука України. — 2016. — № 1. — С. 70—77.
20. Puhovkin A. Y. Investigation of water and cryoprotectants molecules transfer through common carp (*Cyprinus carpio*, L.) spermatozoa membranes / A. Y. Puhovkin, E. F. Kopeika // Cryobiology. — 2015. — Vol. 71, № 3. — P. 567.

REFERENCES

1. Fuller, B. J., Lane, N., & Benson, E. E. (2004). *Life in the frozen stage*. CRC Press.
2. Cabrita, E., Sarasquete, C., Martínez-Páramo, S., Robles, V., Beirão, J., Pérez-Cerezales, S., & Herráez, M. P. (2010). Cryopreservation of fish sperm: applications and perspectives. *J. Appl. Ichthyol.*, 26, 623-635.
3. Williot, P., Kopeika, E. F., & Gontcharov, B. F. (2000). Influence of testis state, temperature and delay in semen collection on spermatozoa motility in the cultured Siberian sturgeon (*Acipenser baeri* Brandt). *Aquaculture*, 189, 53-61.
4. Cabrita, E., Alvarez, R., Anel, E., & Herraez, M. P. (1999) The hypoosmotic swelling test performed with coulter counter: a method to assay functional integrity of sperm membrane in rainbow trout. *Animal Reproduction Science*, 55, 279-287.
5. Kopeika, E. F., & Kopeika, J. E. (2007). Variability of sperm quality after cryopreservation in fish. *Fish spermatology*. Oxford : Alpha Science International Ltd.
6. Fauvel, C., Suquet, M., & Cosson, J. (2010). Evaluation of fish sperm quality. *Appl. Ichthyol.*, 26, 636-643.
7. Billard, R., & Cosson, M. P. (1992). Some problems related to the assessment of sperm motility in freshwater fish. *Journal of Experimental Zoology*, 261, 122-131.
8. Kopeika, E., Kopeika, J., & Zhang, T. (2007). Cryopreservation of fish sperm *Cryopreservation and freeze-drying protocols*. Totowa, New Jersey : Humana Press.
9. Kopeika, E. (2014). Ekologicheskaya nisha kak faktor, opredelyayushchiy kriorezistentnost' spermatozoidov ryb. *Problemy kriobiologii i kriomeditsiny*, 24, 4, 302-311.
10. Petrunkina, A. M. (2007). Fundamental aspects of gamete cryobiology. *Journal of Reproductive Medicine and Endocrinology*, 4, 78-91.
11. Pinisetty, D., Huang, C., & Dong, Q. et al. (2005). Subzero water permeability parameters and optimal freezing rates for sperm cells of the southern platyfish, *Xiphophorus maculatus*. *Cryobiology*, 50, 250-263.
12. Hagedorn, M., Ricker, J., & McCarthy, M. et al. (2009). Biophysics of zebrafish (*Danio rerio*) sperm. *Cryobiology*, 58, 12-19.
13. Puhovkin, A. Yu., Kopeika, E. F., Nardid, O. A., & Cherkashyna, Ya. O. (2014). Issledovanie pronitsaemosti membran spermatozoidov carpa dlia molekul vody. *Biofizika*, 59, 3, 481-487.
14. Puhovkin, A. Yu., Kopieika, Ye. F., Hordiienko, Ye. O. et al. *Sposib vyznachennia pronyknosti membran spermatozoidiv koropa do molekul vody*. ;Patent of Ukraine № 104809.
15. Alavi, S. M. H., Rodina, M., Viveiros, T. M., & Cosson, J. et al. (2009). Effects of osmolality on sperm morphology, motility and flagellar wave parameters in Northern pike (*Esox lucius*). *Theriogenology*, 72, 32-43.

16. Bondarenko, O., Dzyuba, B., & Cosson, J. et al. (2013). Volume changes during the motility period of fish spermatozoa: Interspecies differences. *Theriogenology*, 79, 872-881.
17. Hordiienko, Ye. O., & Tovstiyak, V. V. (2009). *Fizyka biomembran*. Kyiv : Nauk. dumka.
18. Puhovkin, A. Yu., Butskiy, K. I., & Kopeika, E. F. (2014). Osmoticheskaia tolerantnost spermatozoidov nekotorykh presnovodnykh ryb. *Byofizyka zhyvoi kletki*, 10, 149-151.
19. Puhovkin, A. Yu., Kononenko, I. S., Cherepnin, V. O., Hrytsyniak, I. I., & Kopeika Ye. F. (2016). Pronyknist membran spermatozoidiv sterliadi (*Acipenser ruthenus*, L., 1758) dlia molekul vody. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 70-77.
20. Puhovkin, A. Y., & Kopeika, E. F. (2015). Investigation of water and cryoprotectants molecules transfer through common carp (*Cyprinus carpio*, L.) spermatozoa membranes. *Cryobiology*, 71, 3, 567.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСМОТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СПЕРМАТОЗОИДОВ ЩУКИ (*ESOX LUCIUS* L., 1758) ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИХ КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЯ

А. Ю. Пуговкин, antonpuhovkin@gmail.com, Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

Е. Ф. Копейка, cryo@online.kharkov.ua, Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

К. Б. Миксон, cryo@online.kharkov.ua, Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

В. А. Черепнин, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

И. И. Грициняк, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Изучение осмотической чувствительности сперматозоидов щуки (*Esox lucius* L., 1758).

Методика. Осмотические реакции сперматозоидов исследовали методом спектрофотометрии на основании данных о кинетике светопропускания суспензий клеток, помещенных в дистиллированную воду или растворы NaCl осмолярностью 10–200 мОсм/кг. Измерения изменений светопропускания проводили с помощью фотоэлектроколориметра КФ-77 (Польша), оборудованного магнитной мешалкой и термостатированным кюветным отделением. Коэффициент проницаемости плазматических мембран сперматозоидов для молекул воды (L_p) определяли, аппроксимируя экспериментальные зависимости относительных объемов клеток от времени решениями уравнений теоретической модели. Энергию активации (E_a) процесса переноса веществ через мембраны клеток рассчитывали из зависимостей $\ln L_p$ от обратной температуры.

Результаты. Характерное время проникновения воды составляет 40–50 с в диапазоне осмолярности 100–200 мОсмоль/кг (12°C). Проницаемость мембран сперматозоидов щуки для воды составляет $5,43 \pm 1,15 \times 10^{-15} \text{ м}^3/\text{Н} \cdot \text{с}$.

Энергия активации переноса воды через мембраны клеток составляет $64 \pm 5 \text{ кДж/моль}$, что свидетельствует о проникновении воды внутрь сперматозоидов путем пассивной диффузии через липидный бислой. Осмотическая резистентность сперматозоидов щуки может быть определена с помощью фотометрического анализа. Разработанные подходы являются простыми и быстрыми тестами функционального состояния клеточных мембран.

Научная новизна. Впервые определен коэффициент проницаемости плазматических мембран сперматозоидов щуки и его температурная зависимость.

Практическая значимость. Результаты работы используются при разработке сред и режимов криоконсервирования сперматозоидов щуки.

Ключевые слова: сперматозоиды, щука (*Esox lucius* L., 1758), осмотическая чувствительность, проницаемость мембран, Аррениусовы зависимости.

A STUDY OF THE OSMOTIC SENSITIVITY OF PIKE (*ESOX LUCIUS* L., 1758) SPERMATOZOA FOR THE OPTIMIZATION OF THEIR CRYOPRESERVATION

A. Puhovkin, antonpuhovkin@gmail.com, Institute for problems of cryobiology and cryomedicine NAS, Kharkiv

E. Kopeika, cryo@online.kharkov.ua, Institute for problems of cryobiology and cryomedicine NAS, Kharkiv

K. Mikson, cryo@online.kharkov.ua, Institute for problems of cryobiology and cryomedicine NAS, Kharkiv

V. Cherepnin, info@ifr.com.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

I. Hrytsyniak, info@ifr.com.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. The study of the osmotic sensitivity of pike (*Esox lucius* L., 1758) spermatozoa.

Methodology. The osmotic response of pike spermatozoa was investigated by spectrophotometry method based on the kinetics of light transmission of cells suspensions, which were placed in distilled water and 10–200 mOsm/kg solutions of NaCl.

Measurements of light transmittance were carried out using photoelectrocolorimeter KF-77 (ZALIMP, Poland), equipped with a magnetic stirrer and thermostatted sample compartment. The coefficient of permeability of spermatozoa plasma membrane for water molecules (L_p) was determined by approximation of the experimental time dependences of the relative volume by solutions of the equations of modified Kedem-Kachalsky physical-mathematical model of transmembrane mass transport. The activation energy (E_a) of the substances transfer across the cell membrane was calculated taking into account $\ln L_p(1/T)$ dependencies.

Findings. The characteristic time of water penetration is about 40–50 s within 100–200 mOsm/kg range (12 °C). Membrane permeability coefficient of pike spermatozoa for water molecules is $5.43 \pm 1.15 \times 10^{-15} \text{ m}^3/\text{N}\cdot\text{s}$. The decline in coefficient of membrane permeability for water molecules in the range of 25–10 °C is characterized by the activation energy of water transfer, which is $64 \pm 5 \text{ kJ/mol}$, that indicates about water molecules penetration into spermatozoa via a passive diffusion through the lipid bilayer. Hypoosmotic resistance of pike spermatozoa, estimated as time before lysis of 50% cells incubated in distilled water, is 70–110 s (12 °C).

Developed approaches also can be used as simple and quick tests of the functional state of cell membranes.

Originality. The coefficient of plasma membranes permeability of pike spermatozoa and its temperature dependence were defined for the first time.

Practical value. The results are used in the design of media and modes of pike sperm cryopreservation.

Keywords: sperm, pike (*Esox lucius* L., 1758), osmotic sensitivity, membrane permeability, Arrhenius dependencies.

АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ОКРЕМИХ ТИПІВ УКРАЇНСЬКОГО ЛУСКАТОГО КОРОПА

А. Е. Маріуца, mariutsa@list.ru, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. І. Тарасюк, tarasjuk@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І. Грициняк, hrytsyniak@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Вивчення специфіки генетичної структури, рівня внутрішньо- та міжпопуляційної генетичної мінливості стад українського лускатого коропа різних господарств України за використання ДНК-маркерів (ISSR-PCR).

Методика. Для дослідження специфіки генетичної структури на підставі ПЛР використовували ISSR-PCR-методику з відповідно підібраними праймерами.

Результати. На підставі виконаних досліджень за використання трьох мікросателітних локусів ДНК — (AGC)₆G, (ACC)₆G, (AGC)₆C — проведено аналіз генетичної структури українських лускатих коропів. Сумарно за всіма праймерами виявлено 55 ампліконів. При використанні праймеру (AGC)₆G виявлено 15, (ACC)₆G — 17, (AGC)₆C — 23 амплікони. Молекулярна маса на електрофореграмах була максимальною при використанні праймеру (ACC)₆G (500 п.н.—3500 п.н. у нивківського коропа). Виявлені специфічні особливості між досліджуваними популяціями лускатих коропів залежать від їх генетичного походження. Варіацій виявлених ампліконів достатньо, щоб відокремлювати особин, або, якщо робота проводиться з групою плідників, підбирати батьківські пари для підвищення генетичного розмаїття.

Наукова новизна. За використання ISSR-маркерів встановлено особливості генетичної структури, рівень генетичної мінливості українських лускатих коропів.

Вперше отримано нові дані про специфіку генетичної структури за використання методів ПЛР, які сприяють виявленню специфіки механізмів підтримки відносної стабільності генофонду українського лускатого коропа і дозволяють контролювати та зберігати специфічність його генетичної структури.

Практична значимість. Запропоновано метод генетичного контролю стад, який дає можливість за використання вказаних праймерів провести аналіз генетичної структури племінних стад і реалізувати генетичну інформацію на різних стадіях селекційного процесу.

Ключові слова: ISSR-PCR, ДНК-маркери, український лускатий короп, генотип, амплікон.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Популяційно-генетичні дослідження у галузі сучасного рибництва набувають пріоритетного значення в процесі ведення племінної роботи в господарствах. Їх метою є вивчення структури та динаміки генофонду; процесів, які виникають у цих популяціях; генетичних наслідків різних типів схрещувань; впливу штучного відбору на спадкові ознаки організму; значення чинників довкілля для розвитку ознак тощо. Молекулярно-генетичні маркери відіграють провідну роль у сучасних дослідженнях, реально допомагаючи вирішувати багато важливих як актуальних теоретичних, так і практичних проблем селекції та генетики.

© А. Е. Маріуца, С. І. Тарасюк, І. І. Грициняк, 2016

У сучасних дослідженнях генетичної структури здебільшого використовують підходи ідентифікації поліморфізму на рівні ДНК [1–3]. В процесі ведення селекційно-плеємної роботи в рибництві для встановлення особливостей генетичної структури груп риб все частіше використовують високополіморфні молекулярно-генетичні маркерні системи на підставі ПЛР [4]. Популярність цих методів зумовлена, насамперед, можливістю проведення адекватного оцінювання як між-, так і внутрішньопопуляційної мінливості досліджуваних тварин. Саме застосування у дослідженнях значної кількості маркерів, за жорсткого відбору особин з унікальним поєднанням ознак, є основним шляхом для вивчення можливих взаємозв'язків між різними морфологічними системами на рівні ДНК [5, 6].

Одним із методів, який дозволяє в певній мірі провести аналіз генетичної структури, оцінку генетичної різноманітності популяцій, ступеня їхньої інбредності та генетичних відстаней між лініями, породами і популяціями тварин, а також філогенетичних взаємовідносин між ними, є метод за використання ISSR-PCR-аналізу [7, 8].

За допомогою такого підходу можна ампліфікувати фрагменти ДНК, що знаходяться між двома близько розташованими послідовностями, які вважаються унікальними. В результаті одержують значну кількість видоспецифічних ПЛР-продуктів, представлених дискретними смугами на електрофореграмі. Враховуючи те, що ISSR-метод має високу відтворюваність, його можна з успіхом застосовувати для виявлення внутрішньовидової генетичної мінливості та ідентифікації популяцій чи ліній [9–11].

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Проведений порівняльний аналіз генетичної структури коропа української лускатої породи: нивківського внутрішньопорідного типу — «Лебединська РМС», Сумська обл. (n=15); антонінсько-зозуленецького — ВАТ «Хмельницькрибгосп», Хмельницька обл. (n=15); несвицьких зональних типів — господарство «Несвич», Волинська обл. (n=15). Зразки крові відібрано з хвостової вени відповідно до методики з наступною консервацією.

ДНК виділяли з еритроцитів за використання набору реагентів «Diatom DNA Prep 100» згідно з рекомендаціями виробника. ПЛР проводили за використання набору для проведення полімеразної ланцюгової реакції «GenePak PCR Core». Для ПЛР використовували ампліфікатор «Mastercycler» (Eppendorf). У пробірки з ліофілізованою сумішшю, що містила 1 од. Taq-полімерази, 200 мкМ дезоксинуклеозидтрифосфатів, 2,5 мМ MgCl₂, вносили 20 нг геномної ДНК, 5 мкл 0,2 мМ праймеру, 10 мкл ПЛР-розчину. Ампліфікацію проводили в такому режимі: денатурація ДНК — 2 хв. за 95°C; наступні 35 циклів: денатурація — 30 с за 94°C; відпал — 30 с за 58°C, синтез — 2 хв. за 72°C, охолодження за 4°C. Продукти ПЛР аналізували методом електрофорезу у 2%-ому агарозному гелі. Візуалізацію фрагментів ДНК проводили в ультрафіолетовому випромінюванні на транслюмінаторі Caution (Франція) за використання барвника бромистого етидію (0,5 мкг/мл гелю) з фіксуванням електрофореграм цифровою камерою Canon EOS 450D (Японія). Визначення генотипів здійснювали за використання маркеру молекулярних мас 1-kb DNA Ladder (Gibco BRL) (Україна).

Для визначення алельних частот на підставі опрацьованих профілів вибірки створювали матрицю вихідних даних за відсутності (0) смуги або присутності (1) в стані профілю за результатами виконаних ампліфікацій для кожної проби ДНК.

Виконаний підрахунок алельних частот, обрахунок рівня гетерозиготності для всіх досліджуваних локусів окремо і середньої гетерозиготності на локус, генетичних дистанцій, проведено кластерний аналіз з використанням пакету комп'ютерної програми Gelstat та Nei [12, 13].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Породоспецифічні особливості генетичної структури українських лускатих коропів досліджували за використання ISSR-PCR-маркерів. У роботі використано праймери з тринуклеотидною короною частиною і якірною з одного нуклеотиду: (AGC)₆G, (ACC)₆G, (AGC)₆C.

Сумарно під час дослідження коропів української лускатої породи в трьох господарствах виявили доволі високий рівень генетичного поліморфізму. Так, сумарна кількість ідентифікованих алельних варіантів з обраними праймерами склала 55: за використання праймера (AGC)₆G — 15 ампліконів, (ACC)₆G — 17 ампліконів, (AGC)₆C — 23 амплікони. Молекулярна маса на електрофореграмах коливалася в значних межах і була максимальною за використання праймера (ACC)₆G, (500 п.н.–3500 п.н.) у нивківського лускатого коропа. За використання праймера (ACC)₆G молекулярна маса на електрофореграмах коливалася в значних межах (500 п.н.–1700 п.н.) у лускатого коропа антонінсько-зозуленецького зонального типу. При використанні праймера (ACC)₆G молекулярна маса на електрофореграмах коливалася в значних межах (700 п.н.–2000 п.н.) у коропів несвицького зонального типу.

У групі нивківського лускатого коропа за використання праймера (AGC)₆G сумарно виявлено 35 ампліконів (7 алельних варіантів), розмір яких знаходився у межах 450–2500 п.н. Частота алельних варіантів довжиною 450 п.н. і 2500 п.н. становила 11,4%. Частота алельних варіантів довжиною 500 п.н. та 2000 п.н. становила 5,7%.

За використання праймера (ACC)₆G у групі нивківського лускатого коропа сумарно виявлено 24 амплікони (9 алельних варіантів), розмір яких знаходився у межах 800–3500 п.н. Частота алельних варіантів довжиною 2000 п.н. і 3500 п.н. становила 4,17%; 800 п.н., 1600 п.н., 2500 п.н. та 3000 п.н. — становила 8,3%; 1300 п.н. та 1400 п.н. — 16,7%.

У групі нивківського лускатого коропа за використання праймера (AGC)₆C сумарно виявлено 43 амплікони (13 алельних варіантів), розмір яких знаходився у межах 300–2500 п.н. Індивідуальні спектри нараховували від одного до шести ампліконів. Частота алельних варіантів ампліконів довжиною 300 п.н., 450 п.н., 1000 п.н. і 2000 п.н. становила 9,3%; 1500 п.н. та 2500 п.н. — 6,9%; 550 п.н., 700 п.н. та 900 п.н. — 2,3%; 400 п.н. та 750 п.н. — 11,7%.

За генетичними відстанями [13] є відмінності у досліджуваних груп українського лускатого коропа. Найнижчі значення генетичних відстаней виявлено у коропів несвицького зонального типу (0,109) відповідно до коропів нивківського внутрішньопорідного типу, найвищий індекс ідентичності у

антонінсько-зозуленецького (0,325) відповідно до коропів несвицького зонального типу, тобто групи коропів розділилися за генетичним походженням (табл. 1).

Таблиця 1. Генетичні відстані (вище діагоналі) та індекс ідентичності (нижче діагоналі) між коропами різного походження, розраховані за ISSR-PCR-системою, за використання праймеру (AGC)₆G

Типи українського лускатого коропа	Показники		
	нивківський	антонінсько-зозуленецький	несвицький
нивківський	****	0,199	0,109
антонінсько-зозуленецький	0,208	****	0,291
несвицький	0,166	0,325	****

За використання праймеру (AGC)₆G сумарно виявлено 35 ампліконів, індивідуальні спектри нараховували вісім алельних варіантів, розмір яких знаходився у межах 450–1500 п.н. Частота алельних варіантів довжиною 1500 п.н. і 1200 п.н. становила 11,4%; 1000 п.н. та 800 п.н. — 17,1%; 1400 п.н. та 500 п.н. — 14,3%.

За використання праймера (ACC)₆G у групі антонінсько-зозуленецьких коропів сумарно в спектрі виявлено 30 ампліконів, індивідуальні спектри нараховували вісім алельних варіантів. Частота алельних варіантів довжиною 1200 п.н. і 500 п.н. становила 16,7%; 1700 п.н. й 800 п.н. — 10%.

За використання праймера (AGC)₆C у групі антонінсько-зозуленецьких коропів сумарно виявлено в спектрі 46 ампліконів, індивідуальні спектри нараховували чотирнадцять алельних варіантів.

Частота алельних варіантів довжиною 1500 п.н., 900 п.н. та 600 п.н. становила 10,9%; 1400 п.н., 800 п.н. та 550 п.н. 6,5%; 1350 п.н., 400 п.н. і 200 п.н. — 4,3%.

Таблиця 2. Генетичні відстані (вище діагоналі) та індекс ідентичності (нижче діагоналі) між коропами різного походження, розраховані за ISSR-PCR-системою за використання праймеру (ACC)₆G

Типи українського лускатого коропа	Показники		
	нивківський	антонінсько-зозуленецький	несвицький
нивківський лускатий	****	0,433	0,027
антонінсько-зозуленецький	0,125	****	0,024
несвицький	0,159	0,409	****

Найвищі значення генетичних відстаней виявлено у антонінсько-зозуленецького коропа (0,433) по відношенню до нивківського, найнижчий індекс ідентичності виявлено у нивківського коропа (0,125) відносно антонінсько-зозуленецького (табл. 2).

У групі несвицького зонального типу українського лускатого коропа за використання праймеру (AGC)₆G сумарно виявлено 41 амплікон, розмір яких знаходився у межах від 750 до 1500 п.н. Індивідуальні спектри нараховували одинадцять алейних варіантів. Частота алейних варіантів довжиною 1400 п.н., 1300 п.н., 1000 п.н. та 800 п.н. становила 9,8%; 1200 п.н., і 700 п.н. — 12,1%.

За використання праймеру (ACC)₆G у групі несвицького коропа індивідуально виявлено шістнадцять алейних варіантів. Сумарна кількість ампліконів в спектрі становила 49, розмір яких знаходився у межах від 700 до 2000 п.н. Частота алейних варіантів довжиною 2000 п.н., 1800 п.н. та 800 п.н. становила 8,16%; 1600 п.н., 1400 п.н. та 1200 п.н. — 16,7%.

За використання праймеру (AGC)₆C у групі несвицького коропа індивідуально виявлено тринадцять алейних варіантів. Сумарна кількість ампліконів в спектрі становила 45, розмір яких перебував у межах від 450 до 2000 п.н. Частота алейних варіантів довжиною 2000 п.н., 1500 п.н. та 1000 п.н. становила 11,1%; 1600 п.н. і 700 п.н. — 8,9%.

Таблиця 3. Генетичні відстані (вище діагоналі) та індекс ідентичності (нижче діагоналі) між коропами різного походження, розраховані за ISSR-PCR-системою за використання праймеру (AGC)₆G

Типи українського лускатого коропа	Показники		
	нивківський	антонінсько- зозуленецький	несвицький
нивківський	****	0,496	0,178
антонінсько-зозуленецький	0,214	****	0,200
несвицький	0,339	0,232	****

Між генетичними відстанями досліджених груп коропа [13] за праймером (AGC)₆C спостерігаються відмінності. Найвищі значення генетичних відстаней виявлено у антонінсько-зозуленецьких коропів (0,496) по відношенню до нивківських, найнижчий індекс ідентичності (0,214) серед досліджуваних груп виявлено у нивківського лускатого коропа відносно антонінсько-зозуленецького, що залежить від генетичного походження коропів.

На підставі індексу ідентичності побудовано дендрограму, яка дозволяє оцінити генетичну спорідненість досліджуваних груп коропів (рис. 1). Слід відзначити, що українські лускаті коропи різного походження розподілились за досліджуваними системами, утворюючи відповідні кластери. Кластерний аналіз, розрахунок якого ґрунтується на алейних частотах поліморфних локусів, дав змогу отримати два кластери — один сформували групи коропів нивківського внутрішньопорідного типу та несвицького зонального типу. Антонінсько-зозуленецький тип коропа займає автономне положення на дендрограмі, що, як видно, свідчить про її специфічну генетичну структуру.

На моделі порівняльного аналізу досліджуваних груп коропів чітко видно, що їх генетична структура за досліджуваними ISSR-маркерами залежить від генетичного походження риб.

АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ОКРЕМИХ ТИПІВ УКРАЇНСЬКОГО ЛУСКАТОГО КОРОПА

Рис. 1. Дендрограма генетичних взаємовідношень між окремими типами українського лускатого коропа

Таблиця 4. Показники генетичної мінливості у досліджуваних груп українського лускатого коропа за використання ДНК-маркерів (ISSR-PCR) (n=45)

Праймер	Ефективне число алелей	Нивківський лускатий короп (n=15)	Антонінсько-зозуленецький лускатий короп (n=15)	Несвицький лускатий короп (n=15)	Сумарна гетерозиготність
Гетерозиготність					
(AGC) ₆ G	1,560	0,557	0,674	0,693	0,641
(ACC) ₆ G	1,340	0,811	0,637	0,789	0,746
(AGC) ₆ C	1,305	0,801	0,763	0,765	0,776
Середнє	1,402	0,723	0,691	0,749	0,721

Ефективне число алелей у досліджуваних популяціях генотипів варіює від 1,305 (AGC)₆C до 1,560 (AGC)₆G. Середнє ефективне число алелей на локус склало 1,402. За розрахунками алельних частот визначені основні показники генетичної мінливості. Максимальний сумарний рівень гетерозиготності зафіксований за локусом (AGC)₆C — 0,721, низький — за локусом (AGC)₆G — 0,641. Для нивківського лускатого коропа рівень очікуваної гетерозиготності за ISSR-системою мав найвище значення показника за праймером (ACC)₆G — 0,811. Найнижчий рівень очікуваної гетерозиготності за праймером (AGC)₆G становив 0,557. Антонінсько-зозуленецький лускатий короп (0,763) та несвицький лускатий короп (0,765) за праймером (AGC)₆G займали проміжне значення даного показника.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Результати проведених досліджень з використанням методики на підставі поліморфізму ДНК-маркерів показали, що для індивідуального генотипування необхідно підбирати високоспецифічні маркери, поліморфізм за якими можна виявляти на рівні особин. Даний метод придатний для аналізу популяцій коропа і доцільний для порідного маркування на рівні міжпорідних груп коропа. На підставі результатів досліджень можна стверджувати, що даний метод аналізу

часто повторюваних послідовностей ядерної ДНК цілком придатний для популяційного генотипування і аналізу філогенетичних відносин порід коропа. В цілому, результати аналізу з використанням ISSR-маркерів узгоджуються з даними проведеного дослідження із застосуванням генетико-біохімічних систем. Використання мікросателітної панелі ISSR-маркерів для генотипування коропів, а саме, виявлення міжпорідних відмінностей між лускатою та рамчастою породами надає додаткові можливості для проведення комплексної оцінки коропових риб, які вирощуються в рибницьких господарствах України.

ЛІТЕРАТУРА

1. Wallace R. B. DNA recombinant technology / Wallace R. B. — Boca Raton (Fla.) : CRC press, 1983. — 212 p.
2. Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase / R. K. Saiki, D. H. Gelfand, S. Stoffel [et al.] // Science. — 1988. — Vol. 239. — № 2. — P. 487—491.
3. ISSR-PCR маркеры и мобильные генетические элементы в геномах сельскохозяйственных видов млекопитающих / В. И. Глазко, Е. А. Гладырь, А. В. Феофилов [и др.] // Сельскохозяйственная биология. — 2013. — № 2. — С. 71—76.
4. Schlotterer C. Evolutionary dynamics of microsatellite DNA / C. Schlotterer // Chromosoma. — 2000. — Vol. 109. — P. 365—371.
5. Сулимова Г. И. ДНК-маркеры в генетических исследованиях: типы маркеров, их свойства и области применения / Г. И. Сулимова // Генетика. — 1995. — Т. 31, № 9. — С. 1294—1299.
6. Comparative Analysis of Using Isozyme and ISSR-PCR Markers for Population Differentiation of Cyprinid Fish / O. N. Zhigileva, O. G. Baranova, V. V. Pozhidaev [et al.] // Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. — 2013. — Vol. 13. — 159—168.
7. Genetic diversity and structure of natural *Dactylis glomerata* L. populations revealed by morphological and microsatellite-based (SSR/ISSR) markers / P. Madesis, E. M. Abraham, A. I. Kalivas [et al.] // Genet. Mol. Res. — 2014. — Vol. 13(2). — P. 4226—4240.
8. Тарасюк С. І. Молекулярно-генетичні методи в рибництві : монографія / С. І. Тарасюк, І. І. Грициняк. — К. : Аграр. наука, 2013. — 312 с.
9. Фермерське рибництво / [Грициняк І. І., Гринжевський М. В., Третьак О. М. та ін.]. — К. : Герб, 2008. — 560 с.
10. Шерман І. М. Розведення і селекція риб / Шерман І. М., Гринжевський М. В., Грициняк І. І. — К. : БМТ, 1999. — 238 с.
11. Rogstad S. Gelstat : a computer program for population genetics analyses using VNTR multilocus probe data / S. Rogstad, S. Pelisan // Bio Techniques. — 1996. — Vol. 21, № 6. — P. 187—196.
12. Zietkiewicz E. Genome fingerprinting by simple sequence repeat (SSR)-anchored polymerase chain reaction amplification / E. Zietkiewicz, A. Rafalski, D. Labuda // Genomics. — 1994. — Vol. 20, № 2. — P. 176—183.
13. Nei M. Estimatiuon of average heterozygosity and genetic distance from a small number of individualus / M. Nei // Genetics. — 1978. — Vol. 89. — P. 583—590.

REFERENCES

1. Wallace, R. B. (1983). *DNA recombinant technology*. Boca Raton (Fla.) : CRC press.
2. Saiki, R. K., Gelfand, D. H., Stoffel, S., & Higuchi, R. (1988). Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase. *Science*, 239, 2, 487-491.
3. Glazko, V. I., Gladyr', E. A., Feofilov A. V., Bardukov, N. V., & Glazko, T. T. (2013). ISSR-PCR markery i mobil'nye geneticheskie jelementy v genomah sel's'kohozejajstvennyh vidov mlekopitajushhih. *Sel'skohozejajstvennaja biologija*, 2, 71-76.
4. Schlotterer, C. (2000). Evolutionary dynamics of microsatellite DNA. *Chromosoma*, 109, 365-371.
5. Sulimova, G. I. (1995). DNK-markery v geneticheskikh issledovanijah: tipy markerov, ih svojstva i oblasti primenenija. *Genetika*, 31, 9, 1294-1299.
6. Zhigileva, O. N., Baranova, O. G., Pozhidaev, V. V., Brol, I. S., & Moiseenko, T. I. (2013). Comparative analysis of using isozyme and ISSR-PCR markers for population differentiation of cyprinid fish. *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 13, 159-168.
7. Madesis, P., Abraham, E. M., & Kalivas, A. I. et al. (2014). Genetic diversity and structure of natural *Dactylis glomerata* L. populations revealed by morphological and microsatellite-based (SSR/ISSR) markers. *Genet. Mol. Res.*, 13(2), 4226-4240.
8. Tarasiuk, S. I., & Hrytsyniak, I. I. (2013). *Molekuliarno-henetychni metody v rybnytstvi: monohrafiia*. Kyiv : Ahrar. nauka.
9. Hrytsyniak, I. I., Hrynzhovskyi, M. V., Tretiak, O. M., Kiva, M. S., & Mruk, A. I. (2008). *Fermerske rybnytstvo*. Kyiv : Herb.
10. Sherman, I. M., Hrynzhovskyi, M. V., & Hrytsyniak, I. I. (1999). *Rozvedennia i selektsiia ryb*. Kyiv : BMT.
11. Rogstad, S., & Pelisan, S. (1996). Gelstat : a computer program for population genetics analyses using VNTR multilocus probe data. *Bio Techniques*, 21, 6, 187-196.
12. Zietkiewicz, E., Rafalski, A., & Labuda, D. (1994). Genome fingerprinting by simple sequence repeat (SSR)-anchored polymerase chain reaction amplification. *Genomics*, 20, 2, 176-183.
13. Nei, M. (1978). Estimatiuon of average heterozygosity and genetic distance from a small number of individualus. *Genetics*, 89, 583-590.

АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ УКРАИНСКОГО ЧЕШУЙЧАТОГО КАРПА

А. Э. Мариуца, mariutsa@list.ru, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
С. И. Тарасюк, tarasjuk@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
И. И. Грициняк, hrytsyniak@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Изучение специфики генетической структуры, уровня внутри- и межпопуляционной генетической изменчивости племенных стад украинского чешуйчатого карпа разных хозяйств Украины с использованием ДНК-маркеров (ISSR-PCR).

Методика. Для изучения специфики генетической структуры на основе ПЦР использовали ISSR-PCR-методику с соответственно подобранными праймерами.

Результаты. На основе проведенных исследований был осуществлен анализ генетической структуры украинских чешуйчатых карпов с использованием трех микросателлитных локусов ДНК: (AGC)₆G, (ACC)₆G, (AGC)₆C. Суммарно по всем праймерам выявлено 55 ампликонов. При использовании праймера (AGC)₆G выявлено 15, (ACC)₆G — 17, (AGC)₆C — 23 ампликона. Молекулярная масса на электрофореграммах была максимальной при использовании праймера (ACC)₆G (500 п.н.–3500 п.н.) у нивчанского карпа. Обнаружены специфические отличия между исследованными популяциями чешуйчатых карпов, зависящие от их генетического происхождения. Вариаций выявленных ампликонов достаточно, чтобы отделять особей племенных стад, или, если работа проводится с группой производителей, подбирать родительские пары для повышения генетического разнообразия.

Научная новизна. При использовании ISSR-маркеров установлены особенности генетической структуры, уровень генетической изменчивости племенных стад украинских чешуйчатых карпов.

Впервые получены новые данные о специфике генетической структуры на основе использования ПЦР, способствующие выявлению специфических механизмов поддержания относительной стабильности генофонда стад украинских чешуйчатых карпов и позволяющие контролировать и сохранять специфичность их генетической структуры.

Практическая значимость. Предложен метод генетического контроля стад украинского чешуйчатого карпа на основе использования ПЦР, позволяющий провести анализ генетической структуры стад и реализовать генетическую информацию на ранних стадиях селекционного процесса.

Ключевые слова: ISSR-PCR, украинский чешуйчатый карп, ДНК-маркеры, генотип, генетическая структура, ПЦР, ампликон.

ANALYSIS OF THE GENETIC STRUCTURE OF CERTAIN TYPES OF SCALED CARP

A. Mariutsa, mariutsa@list.ru, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

S. Tarasjuk, tarasjuk@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

I. Hrytsyniak, hrytsyniak@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Study of the genetic structure specificity, intra- and interpopulation genetic variation of the brood stocks of Ukrainian scaled carp from different fish farms of Ukraine using DNA markers (ISSR-PCR).

Methodology. A PCR (ISSR-PCR) method with appropriately selected primers has been used to investigate the genetic structure specificity.

Findings. The genetic structure analysis of Ukrainian scaled carp has been carried out using three microsatellite DNA loci: (AGC)₆G, (ACC)₆G, (AGC)₆C. In total, 55 amplicons were detected for all primers. Fifteen primers were detected when using (AGC)₆G primer, 17 for (ACC)₆G primer and 23 for (AGC)₆C primer. The molecular weight on electropherograms had maximum values when using (ACC)₆G primer (500 n.p. – 3500 n.p.) in Nyvky carp. The detected specific differences between the examined populations of scaled carp depend on their genetic origin. Variations of the detected amplicons are sufficient for separating individual fish or, if works are carried out with a group of broodfish, for selecting parental pairs for increasing genetic diversity.

Described changeability of genetic structure after a concrete area a genome and distributing of markers in herds testifies to the substantial level of genetic changeability which is subsoil for determination of level of their adjusted in the process of rogueing in the economies of different patterns of ownership.

Originality. *The use of ISSR-markers allowed detecting the peculiarities of the genetic structure, level of genetic variability of the brood stocks of Ukrainian scaled carp.*

For the first time, we obtained new data on the specificity of the genetic structure when using PCR techniques, which allow detecting specific mechanisms of the maintenance of the relative stability of the genetic material of Ukrainian scaled carps and allow controlling and preserving the specificity of their genetic structure.

Practical value. *Proposition of a method for the genetic control of Ukrainian scaled carp stocks based on the application of PCR techniques, which allows performing an analysis of the genetic structure of fish stocks and using the genetic information at early stages of breeding selection process.*

Keywords: *ISSR-PCR, Ukrainian scaled carp, DNA-loci, genotype, genetic structure, PCR, amplicon.*

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 123-130
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.123>
УДК 597-115:597.442

ВНУТРІШНЬОВИДОВИЙ ПОЛІМОРФІЗМ МІКРОСАТЕЛІТНОЇ ДНК РОСІЙСЬКОГО ОСЕТРА (*ACIPENSER GUELLENSTAEDTII* BRANDT)

О. О. Малишева, malisheva.sirota@gmail.com, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

К. І. Мошнягул, Moshnjagul@mail.ru, Дніпровський осетровий рибовідтворювальний з-д ім. академіка С. Т. Артющика, с. Дніпровське, Білозерський р-н, Херсонська обл.

Л. М. Шинкаренко, IBK_line@mail.ru, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

І. В. Андреев, ymdd1@ukr.net, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

В. Г. Спиридонов, spyrydonov@ukr.net, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Мета. Визначення особливостей внутрішньовидового генетичного поліморфізму російського осетра за мікросателітними ДНК-маркерами.

Методика. Для визначення внутрішньовидового поліморфізму мікросателітної ДНК російського осетра використовували метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з детекцією результатів за методом капілярного електрофорезу.

Результати. За мікросателітними маркерами ДНК проведено дослідження генетичного поліморфізму диких особин російського осетра (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt) чорноморсько-дніпровської популяції. Було ідентифіковано 56 алельних варіантів за такими ДНК-маркерами, як LS-19, LS-68, LS-39, LS-54, Aox-27 та Aox-45. Найбільш поліморфним виявився локус LS-68, а найменш поліморфним — локус Aox-27. За досліджуваними ДНК-маркерами було встановлено тетраплоїдність генетичної структури цього виду осетрових риб.

Наукова новизна. Вперше отримано нові дані щодо особливостей внутрішньовидового генетичного поліморфізму російського осетра з використанням видоспецифічних мікросателітних ДНК-маркерів.

Практична значимість. Отримані дані можуть бути застосовані для контролю генетичних процесів у популяціях російського осетра, а також для розроблення комплексу заходів щодо підвищення ефективності розведення та збереження структури і видового різноманіття цього виду осетрових риб.

Ключові слова: російський осетер, мікросателітні ДНК-маркери, полімеразна ланцюгова реакція, локус, алельний варіант, поліморфізм.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Осетрові риби є не лише цінними об'єктами вітчизняної і світової аквакультури, але й являють собою важливу складову біосфери. У зв'язку з погіршенням екологічних умов існування та неконтрольованим виловом, за

© О. О. Малишева, К. І. Мошнягул, Л. М. Шинкаренко, І. В. Андреев,
В. Г. Спиридонов, 2016

останні півстоліття осетрові види риб опинилися на межі майже повного зникнення. Тому виникає особливий інтерес щодо їх відтворення та збереження як у природі, так і в штучних умовах [1, 2].

Одним із цінних представників осетрових риб є російський осетр (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt) — важливий об'єкт промислу та один з основних об'єктів сучасного товарного осетрівництва. Збереження цього виду та підтримання його нормальної чисельності передбачають відтворення генетичного різноманіття з урахуванням його популяційної структури [3, 4].

Сучасні розробки в галузі молекулярної генетики дозволяють використовувати ефективні маркери в генетичних дослідженнях осетрових, а саме — мікросателітні локуси ДНК, які дозволяють оцінити внутрішньовидовий генетичний поліморфізм та надають можливість відмічати різницю між популяціями через високий рівень алельних варіацій [5, 6]. Встановлення генетичної різноманітності російського осетра дасть змогу розроблення планів відновлення його запасів та управління структурою популяцій в природних та штучних умовах існування.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

У вирішенні питань забезпечення ефективності відтворення та збереження осетрових риб, все більшого розповсюдження набуває використання сучасних методів молекулярно-генетичних досліджень із застосуванням мікросателітних ДНК-маркерів. Використання цих маркерів дозволяє оцінити генетичний поліморфізм популяцій, здійснити видову або ж індивідуальну ідентифікацію та генетичну паспортизацію, підтвердити достовірність походження отриманих нащадків [7, 8].

Метою роботи було визначення внутрішньовидового генетичного поліморфізму російського осетра (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt) за мікросателітними ДНК-маркерами.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Матеріалом для досліджень була ДНК, виділена з фрагментів грудних плавців від диких плідників російського осетра, які були виловлені у пониззях Дніпра у період нерестового ходу для робіт зі штучного відтворення на базі виробничо-експериментального Дніпровського осетрового рибовідтворювального заводу ім. академіка С.Т. Артющика.

Біологічний матеріал для ДНК-досліджень відбирали зажиттєво шляхом акуратного відтинання фрагменту грудного чи хвостового плавця за допомогою стерильних інструментів. Відібраний біологічний матеріал фіксували 96%-им етанолом у спеціально промаркованих стерильних пробірках індивідуально для кожної особини. Виділення геномної ДНК проводили згідно з інструкцією виробника, використовуючи набір «ДНК-сорб-В» («Амплі-Сенс», Росія) [9].

Для визначення внутрішньовидового генетичного поліморфізму було використано шість мікросателітних ДНК-маркерів — LS-19, LS-68, LS-39, LS-54, Aox-27 та Aox-45, нуклеотидні послідовності яких знаходяться в міжнародній генетичній базі даних Gen Bank [10, 11].

Полімеразну ланцюгову реакцію здійснювали на ампліфікаторі Veriti 96 Well (Applied Biosystems, США). Фрагментний аналіз проводили на генетичному аналізаторі ABI Prism «3130 Genetic Analyzer» (Applied Biosystems, США). Розміри алелів визначали за допомогою програми «Gene Mapper 3.7» (Applied Biosystems, США) з використанням розмірного стандарту S-450 (Синтол, Росія).

Ідентифіковані алелі позначалися буквами латинської абетки згідно з попередньо розробленою номенклатурою для даних мікросателітних ДНК-маркерів [12].

Визначення спектру частот ідентифікованих алелів проводили за методом підрахунку та аналізу отриманих генотипів досліджуваних особин із застосуванням програми Power Stats V12 (Promega) [13].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

В результаті мікросателітного аналізу внутрішньовидового поліморфізму російського осетра були отримані дані щодо особливостей генетичної структури цього виду та ідентифіковано від 7 алелів для локусу Aox-27 до 21 алеля для локусу LS-68 (рис. 1).

Рис. 1. Генетичний профіль російського осетра (*Acipenser gueldenstadtii* Brandt) за мікросателітними ДНК-маркерами, n=22

За локусом LS-19 було ідентифіковано 9 алельних варіантів, серед яких найчастіше (31,7%) траплявся алельний варіант E, тоді як алельні варіанти A1 та G виявлялися найрідше (1,6%).

Локус LS-68 був найбільш поліморфним і містив 21 алель. Найчастіше траплявся алельний варіант D з частотою 13,2%, а найменше — алельні варіанти A1, I, J, V, Y та Z6 з однаковою частотою — 1,6% (рис. 2).

Для локуса LS-39 було ідентифіковано 11 алельних варіантів, серед яких варіант T траплявся з найбільшою частотою — 27,8%, тоді як варіанти L, M та Z виявлялися з однаковою найменшою частотою — 1,9%.

Рис. 2. Генетична структура російського осетра (*Acipenser giuldenstadti* Brandt), n=22

За локусом LS-54 було ідентифіковано 16 алельних варіантів, серед яких найчастіше виявлявся алельний варіант N з частотою 21,7%, тоді як алельні варіанти H, K, V, Y траплялися найрідше, з однаковою частотою — 1,7%.

Локус Aox-27 був найменш поліморфним серед досліджуваних маркерів і становив 7 алельних варіантів, серед яких алель M виявлявся найчастіше (28,85%), а алель J, навпаки, траплявся найрідше (1,9%).

За локусом Aox-45 було ідентифіковано 16 алельних варіантів, серед яких найчастіше виявлявся варіант O (14,1%), а найменше — варіанти F та X (1,6%).

Вивчення генетичної структури російського осетра не було проведено в повному обсязі і зводилося лише до оцінювання за кількістю визначених алельних варіантів та відносною частотою алелів. Розрахунки параметрів гетерозиготності для російського осетра ускладнювалися встановленням тетраплоїдної генетичної структури цього виду риб за досліджуваними ДНК-маркерами, що узгоджується з літературними даними інших закордонних і вітчизняних науковців [7, 14].

Таким чином, мікросателітний аналіз ДНК дозволив визначити особливості генетичної структури та виявити різницю між алельними варіантами за кожним з досліджуваних мікросателітних ДНК-маркерів для російського осетра чорноморсько-дніпровської популяції.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Проведені дослідження свідчать про ефективність використання мікросателітних локусів ДНК для ідентифікації алельних варіантів та популяційно-генетичного аналізу російського осетра. За обраною панеллю з 6 мікросателітних маркерів було ідентифіковано 56 алельних варіантів. Найбільш поліморфним виявився локус LS-68 (21 алельний варіант), локус Aox-27 був найменш поліморфними (7 алельних варіантів). За досліджуваними ДНК-маркерами було встановлено тетраплоїдність генетичної структури російського осетра.

Дослідження подібного плану є важливою складовою ланкою в подальших роботах щодо збереження генетичного різноманіття осетрових риб, що дасть можливість здійснення державою контролю відтворення і збереження запасів цінних та зникаючих видів риб в умовах посиленого антропогенного тиску на природні водойми.

ЛІТЕРАТУРА

1. Birstein V. J. The threatened status of acipenseriform species: a summary / V. J. Birstein, W. E. Bemis, J. Waldman // *Developments in Environmental Biology of Fishes*. — 2002. — P. 427—435. doi: 10.1007/0-306-46854-9_33.
2. Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні / О. М. Третяк, Б. О. Ганкевич, О. М. Колос [та ін.] // *Рибогосподарська наука України*. — 2010. — № 4. — С. 4—22.
3. Birstein V. J. Phylogeny of the Acipenseriformes: Cytogenetic and molecular approaches / V. J. Birstein, R. Hanne, R. DeSalle // *Sturgeon Biodiversity and Conservation*. — Dordrecht : Kluwer Acad. Publ., 1997. — P. 127—155.
4. Применение молекулярно-генетических исследований в аквакультуре осетровых рыб / Н. В. Козлова, Н. Н. Базелюк, Д. Р. Файзулина [и др.] // *Вестник АГТУ*. — 2013. — № 3. — С. 113—117. — (Серия : Рыбное хозяйство).
5. Тимошкина Н. Н. Молекулярно-генетические маркеры в исследовании внутри- и межвидового полиморфизма осетровых рыб (*Acipenseriformes*) / Н. Н. Тимошкина // *Генетика популяций и эволюция*. — 2010. — Т. 8, № 1. — С. 12—25.
6. Барминцева А. Е. Использование микросателлитных локусов для установления видовой принадлежности осетровых (*Acipenseridae*) и выявление особей гибридного происхождения / А. Е. Барминцева, Н. С. Мюге // *Генетика животных*. — 2013. — Т. 49, № 9. — С. 1093—1105.
7. Nuclear Markers of Danube Sturgeons Hybridization / A. Dudu, R. Suciu, M. Parashiv [at al.] // *Molecular Sciences*. — 2011. — Vol. 12. — P. 6796—6809.
8. Войнова Н. В. Генетическая паспортизация осетровых: практические и теоретические аспекты / Войнова Н. В. — М. : ВНИРО, 2004. — 189 с.
9. Carter M. J. An inexpensive and simple method for DNA purifications on silica particles / M. J. Carter, I. D. Milton // *Nucleic Acids Res.* — 1993. — Vol. 21. — P. 1044—1046.

10. May B. Genetic variability at microsatellite loci in sturgeon: primer sequence homology in *Acipenser* and *Scaphirinchus* / B. May, C. C. Krueger, H. L. Kincaid // *Can. J. Fish. AquatSci.* — 1997. — Vol. 54. — P. 1542—1547.
11. King T. L. Microsatellite DNA variation in Atlantic sturgeon (*Acipenser oxyrinchus oxyrinchus*) and crossamplification in the *Acipenseridae* / T. L. King, B. A. Lubinski, A. P. Spidle // *Conservation Genetics.* — 2001. — Vol. 2. — P. 103—119.
12. Малишева О. О. Генетична структура популяції стерляді (*Acipenser ruthenus*) за мікросателітними маркерами ДНК / О. О. Малишева, В. Г. Спиридонов, С. Д. Мельничук // *Вісник сумського національного аграрного університету.* — 2014. — Вип. 2/1 (24). — С. 212—215. — (Серія : Тваринництво).
13. Marshall T. C. Statistical confidence for likelihood-based paternity inference in natural populations / T. C. Marshall [et al.] // *Mol. ecol.* — 1998. — P. 639—655.
14. Chromosomal location and evolution of a satellite DNA family in seven sturgeon species / M. Lanfredi, L. Congiu, M. Garrido-Ramos [et al.] // *Chromosome Research.* — 2001. — № 9. — P. 47—52.

REFERENCES

1. Birstein, V. J., Bemis, W. E., & Waldman, J. (2002). The threatened status of acipenseriform species: a summary. *Developments in Environmental Biology of Fishes*, 427-435. doi: 10.1007/0-306-46854-9_33.
2. Tretiak, O. M., Hankevych B. O., Kolos O. M., & Yakovlieva, T. V. (2010). Stan zapasiv osetrovkyh ryb ta rozvytok osetrovoi akvakultury v Ukraini. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 4-22.
3. Birstein, V. J., Hanne, R., & DeSalle, R. (1997). Phylogeny of the *Acipenseriformes*: Cytogenetic and molecular approaches. *Sturgeon Biodiversity and Conservation*. Dordrecht : Kluwer Acad. Publ., 127-155.
4. Kozlova, N. V., Bazelyuk, N. N., Fayzulina, D. R., & Stonogina, E. V. (2013). Primenenie molekulyarno-geneticheskikh issledovaniy v akvakul'ture osetrovkyh ryb. *Vestnik AGTU*, 3, *Seriya: Rybnoe khozyaystvo*, 113-117.
5. Timoshkina, N. N. (2010). Molekulyarno-geneticheskie markery v issledovanii vnutri- i mezhvidovogo polimorfizma osetrovkyh ryb (*Acipenseriformes*). *Genetika populyatsiy i evolyutsiya*, 8, 1, 12-25.
6. Barmintseva, A. E., & Myuge, N. S. (2013). Ispol'zovanie mikrosatelitnykh lokusov dlya ustanovleniya vidovoy prinallezhnosti osetrovkyh (*Acipenseridae*) i vyyavlenie osobey gibridnogo proiskhozhdeniya. *Genetika zhivotnykh*, 49, 9, 1093-1105.
7. Dudu, A., Suciu, R., & Parashiv, M., et al. (2011). Nuklear Markers of Danube Sturgeons Hibridization. *Molecular Sciences*, 12, 6796-6809.
8. Voynova, N.V. (2004). *Geneticheskaya pasportizatsiya osetrovkyh: prakticheskie i teoreticheskie aspekty*. Moskva : VNIRO.
9. Carter, M. J., & Milton, I. D. (1993). An inexpensive and simple method for DNA purifications on silica particles. *Nucleic Acids Res.*, 21, 1044-1046.
10. May, B., Krueger, C. C., & Kincaid, H. L. (1997). Genetic variability at microsatellite loci in sturgeon: primer sequence homology in *Acipenser* and *Scaphirinchus*. *Can. J. Fish. AquatSci*, 54, 1542-1547.

11. King, T. L., Lubinski, B. A., & Spidle, A. P. (2001). Microsatellite DNA variation in Atlantic sturgeon (*Acipenser oxyrinchus oxyrinchus*) and crossamplification in the *Acipenseridae*. *Conservation Genetics*, 2, 103-119.
12. Malysheva, O. O., Spyrydonov V. H., & Melnychuk, S. D. (2014). Hnetychna struktura populiatsii sterliadi (*Acipenser ruthenus*) za mikrosatelitnymi markerami DNK. *Visnyk sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: Seriya Tvarynyystvo*, 2/1 (24), 212-215.
13. Marshall, T. C. et al. (1998). Statistical confidence for likelihood-based paternity inference in natural populations. *Mol. ecol.*, 639-655.
14. Lanfredi, M., Congiu, L., Garrido-Ramos, M. et al. (2001). Chromosomal location and evolution of a satellite DNA family in seven sturgeon species. *Chromosome Research*, 9, 47-52.

ВНУТРИВИДОВОЙ ПОЛИМОРФИЗМ МИКРОСАТЕЛЛИТНОЙ ДНК РУССКОГО ОСЕТРА (*ACIPENSER GUELLENSTAEDTII* BRANDT)

О. А. Малышева, malisheva.sirota@gmail.com, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

К. И. Мошнягул, Moshniagul@mail.ru, Днепропетровский осетровый рыбо-производительный завод им. академика С. Т. Артющика, с. Днепропетровское, Белозерский р-н, Херсонская обл.

Л. Н. Шинкаренко, IBK_line@mail.ru, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

И. В. Андреев, yddd1@ukr.net, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

В. Г. Спиридонов, spyrydonov@ukr.net, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

Цель. Определение особенностей внутривидового генетического полиморфизма русского осетра по микросателлитным ДНК-маркерам.

Методика. Для определения внутривидового полиморфизма микросателлитной ДНК русского осетра использовали метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией результатов по методу капиллярного электрофореза.

Результаты. По микросателлитным маркерам ДНК проведены исследования генетического полиморфизма русского осетра (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt) черноморско-днепровской популяции. Было идентифицировано 56 аллельных вариантов по таким исследуемым ДНК-маркерам, как LS-19, LS-68, LS-39, Aox-27, LS-54 и Aox-45. Наиболее полиморфным оказался локус LS-68, а наименее полиморфным — локус Aox-27. По всем исследуемым ДНК-маркерам была установлена тетраплоидность генетической структуры данного вида осетровых рыб.

Научная новизна. Впервые получены новые данные относительно особенностей внутривидового генетического полиморфизма русского осетра с использованием видоспецифических микросателлитных ДНК-маркеров.

Практическая значимость. Полученные данные могут быть использованы для контроля генетических процессов в популяциях русского осетра, а также для разработки комплекса мер по повышению эффективности разведения и сохранения структуры и видового разнообразия этого вида осетровых рыб.

Ключевые слова: русский осетр, микросателлитные ДНК-маркеры, полимеразная цепная реакция, локус, аллельный вариант, полиморфизм.

INTRASPECIFIC POLYMORPHISM OF MICROSATELLITE DNA
OF RUSSIAN STURGEON (*ACIPENSER GUELLENSTAEDTII* BRANDT)

O. Malysheva, malisheva.sirota@gmail.com, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

K. Moshnjagul, Moshnjagul@mail.ru, Dnieper sturgeon fish-reproductive plant named after academician S. T. Artyushchika, vill. Dneprovskoe, Belozersky district, Kherson region

L. Shynkarenko, IBK_line@mail.ru, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

I. Andrieiev, vmdd1@ukr.net, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

V. Spyrydonov, spyrydonov@ukr.net, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Purpose. Determination of the peculiarities of intraspecific genetic polymorphism of Russian sturgeon based on microsatellite DNA markers.

Methodology. The polymerase chain reaction (PCR) with the detection of results based on capillary electrophoresis was used for the determination of intraspecific polymorphism of microsatellite DNA Russian sturgeon.

Findings. On microsatellite DNA markers was investigated genetic polymorphism of Russian sturgeon (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt) Black Sea and Dnieper population. It was identified of 56 allelic variants of such DNA-markers investigated as LS-19, LS-68, LS-39, Aox-27, LS-54 and Aox-45. On locus LS-19 allelic variants have been identified, the locus LS-68 was the most polymorphic and consisted of 21 alleles, 11 allelic variants have been identified by the LS-39 locus, and 16 allelic variants have been identified for the LS-54 locus. Aox-27 locus was the least polymorphic microsatellite markers among the study and consisted of 7 allelic variants. For Aox-45 locus 16 allelic variants have been identified. A study of the genetic structure of the Russian Black Sea-Dnieper sturgeon population is not currently been carried out in full and reduced only to the evaluation of the number of identified allelic variants and relative frequency of alleles. Calculations of heterozygosity parameters for Russian sturgeon became complicated definition tetraploid genetic structure of this species on the studied DNA markers. Such studies are an important component in the further work on the conservation of genetic diversity of sturgeon, which will provide an opportunity to carry out the state control over reproduction and preservation of valuable and endangered species under increased anthropogenic impact on natural populations.

Originality. For the first time, new data of the peculiarities of the intraspecific genetic polymorphism of Russian sturgeon was obtained using species-specific microsatellite DNA markers.

Practical value. The data obtained can be used to control the genetic processes in the populations of Russian sturgeon, as well as to develop a complex of measures to improve the efficiency of breeding and conservation of the structure and species diversity of this sturgeon species.

Keywords: Russian sturgeon, microsatellite DNA markers, polymerase chain reaction, locus, allelic variant, polymorphism.

ОСОБЛИВОСТІ ОКИСНИХ ПРОЦЕСІВ У ОСЕТРОВИХ ВИДІВ РИБ (ACIPENSERIDAE) (ОГЛЯД)

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати наукові джерела щодо фізіолого-біохімічних особливостей окисно-відновних процесів, зокрема пероксидного окиснення ліпідів та роботи системи антиоксидантного захисту, у осетрових видів риб (Acipenseridae). Висвітлити ініціацію та перебіг оксидативного стресу. Розглянути основні продукти пероксидного окиснення ліпідів, антиоксиданти природного і штучного походження, органи та тканини для дослідження окисно-відновних процесів.

Результати. У роботі описано процеси пероксидного окиснення ліпідів та дію системи антиоксидантного захисту у осетрових видів риб. Стисло представлено механізм дії основних антиоксидантних ферментів. Показано особливості роботи печінки та її участі в ліпідному обміні і системі антиоксидантного захисту. Висвітлено основні антиоксиданти, що застосовуються в годівлі осетрових видів риб. Розглянуто органи та тканини, які найефективніше використовувати для досліджень процесів пероксидного окиснення ліпідів у осетрових видів риб.

Практична значимість. Систематизовані дані стосовно пероксидного окиснення ліпідів, оксидативного стресу та функціонування системи антиоксидантного захисту дозволяють знаходити баланс між цими процесами. Дані щодо антиоксидантів, які застосовуються в кормах для осетрових риб, будуть корисними рибоводам-осетроводам. Масив узагальненої інформації буде важливим для науковців, які досліджують особливості перебігу процесів пероксидного окиснення ліпідів та роботи системи антиоксидантного захисту у осетрових видів риб.

Ключові слова: осетрові види риб (Acipenseridae), окисні процеси, пероксидне окиснення, ліпіди, оксидативний стрес, система антиоксидантного захисту, антиоксиданти, метаболізм.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Осетрівництво з використанням установок замкненого водопостачання (УЗВ) є однією з найбільш рентабельних, а, отже, таких, що швидко розповсюджуються, галузей рибництва. Втім, за збільшення масштабів керованого відтворення рибних ресурсів збалансована годівля і оптимізація умов утримання риби стають першорядними завданнями рибницьких підприємств. У зв'язку з цим, стан здоров'я риби і якість комбікормів є вирішальними чинниками рентабельності індустріального рибництва. Це зумовлює актуальність досліджень перебігу процесів пероксидного окиснення ліпідів та дії системи антиоксидантного захисту, оскільки порушення балансу між ними є першою ознакою технологічних порушень при вирощуванні осетрових видів риб. Метою даної роботи є аналіз масиву інформації щодо процесів пероксидного окиснення ліпідів, особливостей

© М. Ю. Симон, 2016

окисного стресу та дії системи антиоксидантного захисту у осетрових видів риб, а також антиоксидантів, що застосовуються в осетрівництві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ. ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проблема вирощування фізіологічно повноцінної життєздатної молоді осетрових видів риб в індустріальній аквакультурі, незважаючи на численні наукові розробки, залишається актуальною. Це, в першу чергу, зумовлено її специфікою, коли об'єкти культивуються у вкрай відмінних від природних умовах. Внаслідок цього вони піддаються стресам різної етіології, що негативно впливають на фізіологічний стан риб та, відповідно, здоров'я. Більшість дослідників наголошують, що за різних патологій трофічного, інфекційного або токсичного характеру у осетрових видів риб активуються процеси вільнорадикального окиснення, зокрема пероксидного окиснення ліпідів. Найчастіше подібні процеси супроводжуються порушеннями, що перевищують можливості захисної антиоксидантної системи і клітини не витримують окиснювальну вільнорадикальну атаку, починаючи накопичувати продукти окисної деградації ліпідів [1]. Актуальність досліджень процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) пояснюється двома його особливостями: здатністю до утворення великої кількості надзвичайно реакційноздатних вільних радикалів, які справляють руйнівну дію на біологічні структури та здатністю до неконтрольованого розвитку за типом ланцюгової реакції [2].

Ліпіди — основні компоненти біологічних мембран різного ступеня спеціалізації — являють собою легкоокиснювальні сполуки [3]. Вони визначають проникність і плинність (здатність молекул швидко переміщуватися в площині) мембран, що, в свою чергу, є визначальним чинником в модифікації активності більшості ферментних комплексів у відповідь на різноманітні екологічні навантаження [4]. Оскільки ліпіди є основними компонентами біомембран, посилення ПОЛ викликає зміни структурної і функціональної організації клітинних мембран, порушення їхньої проникності, а також іонний дисбаланс [5].

Пероксидне окиснення ліпідів — окиснювальна деградація ліпідів, що відбувається, в основному, під впливом вільних радикалів. ПОЛ — це ланцюгова реакція, яка протікає в біомембранах та ліпопротеїнових комплексах, що супроводжується деградацією поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) фосфоліпідів з утворенням вільнорадикальних і молекулярних продуктів. Взагалі, ПОЛ постійно відбувається в усіх живих організмах, головним чином, у ліпідному бішарі мембран, за наявності молекулярного кисню (O_2) та активаторів процесу — супероксидного (O_2^-) і гідроксильного ($\bullet OH$) радикалів, синглетного кисню, пероксидів і т.п. побічних продуктів функціонування електронно-транспортних ланцюгів. Таким чином, найбільша кількість цих продуктів трапляється в біологічних системах з високою інтенсивністю обмінних процесів [6–8]. Біологічний сенс ПОЛ можна розглядати як [9]:

а) нормальний процес біологічного окиснення перекисного типу, який протікає паралельно вільному окисненню (мікросомальному або пероксисомальному) та АТФ-пов'язаному окисненню (під час фосфорилування);

б) процес утворення вільних радикалів, пероксидів, гідропероксидів, дієнових кон'югатів, альдегідів та кетонів як проміжних метаболітів і фізіологічно активних інтермедіатів;

в) захисний механізм організму, на фізіолого-біохімічному рівні, у відповідь на дію стресових та інших неспецифічних чинників.

У нормальних умовах процеси ПОЛ протікають в живих системах збалансовано, в суворо визначених межах, сприяючи внутрішньоклітинному травленню, фагоцитозу, окисній деструкції чужорідних та шкідливих речовин або застарілих мембранних структур. Його активація є універсальною відповіддю на будь-який стрес як фізіологічної, так і патологічної природи [6]. Воно є важливим компонентом «пускового механізму» перебудови метаболізму в несприятливих умовах [10].

В ембріогенезі осетрових видів риб підвищення вмісту первинних продуктів ПОЛ є наслідком інтенсивного витрачання трофічного матеріалу на забезпечення морфогенетичних процесів [11]. Зокрема, на стадіях розподілу та органогенезу збільшується (в 2–5 разів) кількість ліпоперексидів та малонового діальдегіду (МДА). Одночасно з цим змінюється гемолітична активність ліпідів та зменшується кількість антиоксидантів, а, отже, і антиоксидантна активність ліпідів ікри. Роль цих реакцій полягає в гальмуванні проліферації і стимулюванні диференціювання ембріональних тканин. Таким чином, активація пероксидазної реакції на ранніх стадіях ембріогенезу осетрових видів риб є цілком закономірним явищем [9, 12].

У той же час, якщо процеси ПОЛ не обмежується локальним спалахом, то вони набувають деструктивних рис. Їх тривалий перебіг супроводжується підвищенням інтенсивності ПОЛ з закономірним зниженням концентрації антиоксидантів через виснаження системи антиоксидантного захисту (САЗ) [13]. Основними причинами підвищення інтенсивності ПОЛ є посилення активності ферментів, відповідальних за утворення пероксидів (пероксидаз), та зниження активності ферментів САЗ (супероксиддисмутази, каталази, глутатіон-пероксидази), які запобігають утворенню пероксидів або руйнують їх [14–16]. Стрімке зростання інтенсивності процесів ПОЛ також є ознакою стрес-реакції — неспецифічних змін загального адаптаційного синдрому, що супроводжуються підвищеним споживанням енергії [17, 18]. Наприклад, в організмі хворих риб воно пов'язане з поступовим зниженням в ході розвитку патологічних процесів здатності організму пригнічувати вільнорадикальні реакції за рахунок виснаження пулу антиоксидантів та протікання імунопатологічних реакцій [1, 6, 9]. Підвищення інтенсивності ПОЛ супроводжується деструкцією клітинних мембран та викликає ряд патологічних станів. Так, пошкодженню мембранних структур гепатоцитів сприяє наявність в них значної кількості ферментів, які продукують активні форми кисню — пероксидаз (КФ 1.11.1.1). Також, інтенсивність ПОЛ посилюється вторинними реакціями – утворенням з ліпідів високореакційноздатних і легко дифундуючих пероксидних радикалів та продуктів їх розпаду — карбонільних сполук, що зумовлюють розвиток патологічних процесів [7, 8, 20].

Характер процесів ПОЛ визначають за рівнем гідропероксидів (МДА, дієнових кон'югатів та основ Шиффа), активності ферментів супероксидисмутази (СОД) та каталази (КАТ), а також кількості α -токоферолу в печінці і м'язах [21, 23]. Кінетичні параметри ПОЛ визначають за: швидкість спонтанного (ферментативного) пероксидного окиснення ліпідів (СППОЛ), швидкість неферментативного аскорбатзалежного пероксидного окиснення ліпідів (АСПОЛ) та вихідний рівень продуктів, що реагують з тіобарбітуровою кислотою (ТБК-активних) [24, 25]. Кінетика ПОЛ у риб залежить від наявності активних форм кисню, її визначає наявність в клітині відновника. Ним може бути аскорбінова кислота (неферментний шлях), НАД або НАДФ (ферментний шлях). Слід зазначити, що чинники зовнішнього середовища можуть впливати на швидкість генерації активних форм кисню (іони кисню, вільні радикали та пероксиди). Це зумовлює відмінності кінетики ПОЛ у риб та ссавців [7, 8, 9].

Рівень ПОЛ відноситься до одного з основних кількісних показників якості рибного корму і визначається за вмістом у ньому пероксидів. При цьому деякі автори відзначають також значне зростання рівня вільних жирних кислот в крові, що може служити підтвердженням нашим припущенням про взаємозв'язок рівня гептанрозчинних ліпопероксидів з інтенсивністю мобілізації нейтральних ліпідів з жирових депо і утилізації їх як джерела енергії. Оптимальний раціон дозволяє знизити рівень ПОЛ, про що свідчить зменшене накопичення проміжних (дієнових кон'югатів) і кінцевих (МДА) продуктів ліпопероксидації. Це, в свою чергу, призводить до підвищення рівня САЗ.

Продукти ПОЛ (пероксиди, кетони та ін.) є сполуками з неоднозначним впливом на організм риб. Зокрема, за певної концентрації вони здатні викликати зупинку росту та токсикози риб. Наприклад, пероксиди, що виникають в процесі самоокиснення жирів, є сильними окиснювальними сполуками, які викликають деструкцію жиророзчинних вітамінів (β -каротину, А, Е, К) [27]. У той же час, через стадію пероксидних похідних ПНЖК здійснюється біосинтез простагландинів (Pg) і лейкотрієнів, а тромбоксани (ТХА), які справляють потужний вплив на адгезивно-агрегаційну властивість формених елементів крові та її мікроциркуляцію, самі є гідропероксидами. Також, утворення гідропероксидів холестерину ($C_{27}H_{46}O$) є важливою ланкою в синтезі деяких стероїдних гормонів, зокрема, прогестерону ($C_{21}H_{30}O_2$) [28]. З позитивних функцій продуктів ПОЛ також варто зазначити їх участь в проведенні нервового імпульсу та регуляції поділу клітин [6]. Продукти ПОЛ можуть накопичуватись в м'язах риб, навіть за їх тривалого зберігання в замороженому стані (від -10 до -40 °C) [9]. Рівень їх вмісту в харчових частинах риб істотно впливає на смакові і кулінарні якості останніх [27]. Продукти ПОЛ прийнято групувати залежно від його стадії – первинні, проміжні, вторинні, кінцеві. Для з'ясування кінетики накопичення кінцевих продуктів ПОЛ важливо встановити співвідношення швидкості їх утворення зі швидкістю їх знешкодження САЗ [9]. Нижче розглянемо основні продукти ПОЛ — дієнові кон'югати і дієнкетони, а також МДА.

Дієнові кон'югати (ДК) відносять до первинних продуктів ПОЛ, їх вміст у тканинах характеризує ранню стадію ПОЛ. Через нижчу енергію розриву C–H

зв'язку, вони, переважно, окиснюють ω -3-поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) з великою кількістю подвійних зв'язків: арахідонову ($C_{20}H_{32}O_2$), ейкозапентаєнову ($C_{20}H_{30}O_2$) та докозагексаєнову ($C_{22}H_{34}O_2$). Олейнова ($C_{18}H_{34}O_2$) та лінолева ($C_{18}H_{32}O_2$) окиснюються значно повільніше [29]. Таким чином, оскільки вміст ПНЖК у складі ліпідів (особливо фосфоліпідів, екстрагованих з мікросом) риб вищий, ніж у ссавців, вони більш чутливі до ПОЛ та більш залежні від антиоксидантного статусу організму [10].

Малоновий діальдегід (МДА) — альдегід з формулою $CH_2(CHO)_2$. Виникає в організмі осетрових видів риб при деградації поліненасичених жирів активними формами кисню, слугує маркером оксидативного стресу. Є кінцевим продуктом ПОЛ, вміст якого вимірюється в нмоль [13, 20]. Крім того, нещодавно виявлено, що він здатний взаємодіяти з ДНК утворюючи ДНК-аддукти, в тому числі і мутагенний M1G. Реагує з тіобарбітуровою кислотою ($C_4H_4N_2O_2S$), утворюючи червоний флуоресцентний склад, що дозволяє проводити приблизний спектроморфометричний аналіз його вмісту [21, 24]. Рівень накопичення МДА в тканинах свідчить про ступінь інтенсивності ПОЛ [29].

З 90-х років XX століття прийнято вважати продукти ПОЛ первинними і вторинними медіаторами оксидативного стресу, оскільки інтенсифікація ПОЛ мобілізує стрес-реалізуючі системи і підвищує антиоксидантний потенціал клітин. Виснаження цього потенціалу свідчить про вторинний спалах інтенсивності процесів ПОЛ. Первинна інтенсивність процесів ПОЛ відповідає першій фазі стресу (тривога), посилення відповіді САЗ — другій (резистентність), а вторинний спалах інтенсивності — третій (виснаження) [19, 20, 29].

Оксидативний стрес — стрімке та тривале посилення інтенсивності процесів ПОЛ — є наслідком порушення окисно-відновного балансу організму, викликаного утворенням вільних радикалів [3, 13]. Стрес (або загальний адаптаційний синдром) становить необхідну ланку неспецифічної реактивності організму, елемент та етап його адаптації до умов життя, чинник збереження гомеостазу [19]. Симптоматика окисного стресу включає ряд біологічних і біохімічних чинників, зумовлених утворенням в клітині вільних радикалів — вкрай реактивних сполук, які здатні завдати організму непоправної шкоди [6, 18].

Вільні радикали — частки (молекули), які мають на зовнішній валентній орбіталі неспарені електрони, що зумовлює їх високу хімічну активність [30]. Вони утворюються в організмі осетрових видів риб як в процесі нормального метаболізму клітин, так і під час впливу несприятливих чинників навколишнього середовища [8]. В нормальних умовах організм самостійно нейтралізує їх дію, за рахунок природних речовин, що мають антиоксидантний ефект [3]. Зростання їх вмісту і пов'язане з цим підвищення інтенсивності процесів ПОЛ, призводить до зміни фізико-хімічних властивостей мембранних білків і ліпідів, зниження активності мембранно-пов'язаних ферментів, порушення проникності мембран і транспорту іонів (Ca^{2+}) крізь них, зменшення електричної стабільності ліпідного бішару мембран [7, 28]. Реактивність вільних радикалів вища у гідрофобній фазі, ніж у водній. Таким чином, супероксидний аніон-радикал та гідроксильний радикал особливо небезпечні у гідрофобних зонах мембранних структур, викликаючи ПОЛ [6, 15]. Розглянемо їх детальніше нижче.

Аніон-радикал кисню здатний перетворюватися в синглетний кисень і гідроксильний радикал. Супероксидний радикал зазвичай утворюється при спонтанному самоокисненні хімічних речовин за наявності в їх складі металів змінної валентності. Наприклад, утворення супероксидного аніон-радикалу викликає перетворення гемоглобіну та міоглобіну в мет-форми [15]. Також, за патологічних змін в клітинах (гіпоксії, гіпероксії, стресових явищах) його вміст може підвищитися внаслідок надмірного утворення або порушення процесів подальшого використання субстратів в процесі окиснення [7–9, 18, 19].

При дії різних ендогенних і екзогенних чинників, які є причиною оксидативного стресу, баланс між САЗ та активними формами кисню в клітинах порушується або в результаті зниження рівня антиоксидантів, або внаслідок гіперпродукції активних форм кисню. Під час оксидативного стресу активні форми кисню не встигають бути нейтралізованими САЗ через їх надмірне утворення [18, 19, 30]. Останнє може збільшуватись в клітинах як наслідок дії фізіологічних (гормонів, цитокінів тощо) та нефізіологічних стимулів (іонізуючого випромінювання, ксенобіотиків тощо). Серед активних форм кисню найбільш значущими є: супероксидний радикал, пероксид водню, гідроксильний радикал, синглетний кисень, пероксид [8, 15, 31].

На ранніх стадіях онтогенезу осетрових видів риб оксидативний стрес виникає через зміну енергетичних субстратів, наростання споживання кисню, підготовку до моменту вилуплення [12, 30]. В постембріональному розвитку найбільш поширеною причиною оксидативного стресу є антропогенний чинник [18].

Одним з показників оксидативного стресу є інтенсифікація ПОЛ, яка характеризується фазними змінами вмісту малонового діальдегіду (МДА), рівня активності ферментів КАТ та СОД і сумарної антиоксидантної активності (САА), що свідчать про активацію захисних механізмів в певні періоди інтоксикації. Зокрема, збільшується кількість МДА і знижується рівень САА [16, 33, 34].

Оксидативний стрес супроводжується складними перетвореннями в функціонуванні енергетичної системи, зокрема активність цитохромоксидази (КФ 1.9.3.1) — ключового ферменту аеробного обміну — зменшується в печінці та посилюється у м'язах. Подібний рівень її активності не є притаманним енергетичному обміну цих органів, оскільки печінці властивий переважно аеробний шлях отримання енергії, а м'язам — анаеробний [19, 35]. В цьому випадку в осетрових видів риб розпочинається лізис міофібрил та м'язів в цілому як адаптаційно-компенсаційний процес, в результаті якого їх білки розкладаються до амінокислот. Останні використовуються організмом для отримання енергії в анаеробних умовах з метою посилення САЗ, а отже — запобігання подальшому розвитку оксидативного стресу [36]. Оскільки під час оксидативного стресу САЗ інгібуються прооксидантними силами, він опосередковано сприяє запальним та канцерогенетичним процесам, що зазвичай закінчуються летально [18, 37].

Постійне утворення прооксидантів в організмі врівноважено їх дезактивацією САЗ. Як наслідок її дії можна розглядати безперервну регенерацію антиоксидантів, необхідну для постійного підтримання гомеостазу [30, 31]. САЗ

це складний комплекс тканинно-специфічних інгібіторів вільнорадикального окиснення, який при взаємодії з вільними радикалами утворює хімічно інертні сполуки, тим самим припиняючи ланцюгову реакцію. САЗ містить низько- та високомолекулярні сполуки, здатні «перехоплювати» вільні радикали або нейтралізувати джерело їх виникнення [26, 31]. До її складу входять гідрофільні і гідрофобні органічні речовини з відновними властивостями, ферменти, що підтримують гомеостаз цих речовин, антипероксидні ферменти тощо. В нормі вона активується за досягнення концентрацією вільних радикалів певного кількісного порогу [6, 38, 39]. САЗ у риб залежить від видової приналежності, статі, фази розмноження, особливостей живлення в конкретний проміжок часу. Так, у осетрових видів риб спостерігається сезонна варіабельність концентрації глутатіону, вітаміну Е, каротиноїдів, ПОЛ, активності СОД і КАТ, пов'язана зі зміною метаболічного статусу [6, 15, 26]. Дія САЗ проявляється з перших етапів онтогенезу, в результаті чого встановлюється чіткий баланс між інтенсивністю вільнорадикальних процесів, включно з перекисним окисненням ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантною активністю (АОА) [12, 39]. Цей баланс відображає адаптаційні можливості організму до мінливих умов зовнішнього середовища, а, отже, і його стійкість до дії несприятливих чинників, у тому числі до антропогенного забруднення. Антиоксидантний статус організму риб залежить, як мінімум, від чотирьох чинників [32]:

- чітко визначеної структурної організації ліпідів;
- активності антиоксидантних ферментів;
- активності ферментів, що регулюють обмін фосfolіпідів клітинних мембран;
- вмісту низькомолекулярних антиоксидантів.

В цілому, риbam притаманний відносно високий рівень САЗ у порівнянні з такими ендотермними тваринами, як птахи та ссавці [38, 40]. Однак, багато в чому вона залежить від генетично закріпленого розшарування видів риб за характером переживання впливу різних токсикантів. Наприклад, у осетрових видів риб, в порівнянні з коропами, оксидативний стрес починається раніше та проявляється гостріше [10, 29].

Незважаючи на те, що організму російського осетра властива порівняно активна САЗ, при тривалому посиленні токсичного впливу чинників навколишнього середовища вона знижує рівень своєї активності, тим самим втрачаючи свою ефективність [12, 20]. У той же час, її рівень підвищується при зниженні інтенсивності процесів ПОЛ, ознакою чого є зменшення накопичення проміжних (ДК) і кінцевих (МДА) продуктів ліпопероксидації [38, 41]. Зниження вмісту основ Шиффа при підвищенні активності СОД та α -токоферолу також свідчать про нормалізацію роботи САЗ [15, 43]. Загалом, основними показниками стану останньої є: вміст МДА ($\text{CH}_2(\text{CHO})_2$), рівень активності КАТ (КФ 1.11.1.6) та сумарна антиоксидантна активність (САА) [29, 33]. Наприклад, підвищення активності САЗ супроводжується зростанням рівня активності КАТ в плазмі крові риб [16, 22, 39].

Антиоксиданти (АТ) запобігають вільнорадикальному окисненню [26].

Механізм дії найбільш поширених АТ полягає в розриві ланцюга окиснювальних реакцій — їх молекули при взаємодії з вільними радикалами утворюють малоактивні радикали. Таким чином, процес окиснення припиняється або сповільнюється, а сам АТ витрачається на реакцію [25, 38]. До АТ належить широкий клас речовин, до яких відносять сполуки, що знижують активність радикальних окиснювальних процесів та знаходяться в динамічній рівновазі з активованими кисневими метаболітами. Порушення цієї рівноваги і є причиною оксидативного стресу. Кількість сполук, які належать до АТ, постійно зростає, однак їх універсальної класифікації на сьогодні не існує [6, 18, 39]. Зокрема, їх можна умовно розподілити: за місцем дії (внутрішньо- та зовнішньоклітинні), особливостями будови (ферментативні та неферментативні), молекулярною масою (високо- та низькомолекулярні) [31]. Найпоширеніша класифікація АТ наведена в таблиці 1 [6].

Класифікація антиоксидантів (за О. А. Шахматовою) [6]

Високомолекулярні	Низькомолекулярні	
	Жиророзчинні	Водорозчинні
Супероксиддисмутаза (СОД) Каталаза (КАТ), АТФ-аза	Вітаміни А, Е, К	Тіоловмісні сполуки (молекули з SH-групами)
Пероксидаза Глутатіонпероксидаза	Флавоноїди, поліфеноли	Вітаміни С, В ₆ , РР
Глутатіонтрансфєрраза Глутатіонредуктаза	Убіхінон, стерини, коензим Q	Біогенні аміни
Альбумін Феритин	Фосфоліпіди	Глутатіон
Трансферин Церулоплазмін тощо.	Каротиноїди	Деякі амінокислоти

Високомолекулярні АТ — мембранопов'язані та цитозольні ферменти (СОД, КАТ, глутатіонзалежні пероксидази та трансфєрази), а також білки, здатні зв'язувати іони заліза і міді, які є каталізаторами вільнорадикальних процесів [6, 15, 31].

Антиоксидантні ферменти (АОФ) — попереджають або усувають шкоду, спричинену окисненням, регулюючи вміст активних форм кисню, тим самим оберігаючи організм від токсичної дії продуктів ПОЛ [5, 38]. Вони відносяться до групи «house-keeping» — їхня м-РНК перебуває в незаплідненій ікрі осетрових видів риб, починаючи синтезуватися після запліднення [12, 32]. Індукція АОФ, тобто абсолютне збільшення їх кількості та активності, залежить від наявності

специфічних кочинників — металів (Cu, Zn, Fe, Mn, Se), що входять в активний центр ферменту. У свою чергу, фізіологічний вплив мікроелементів на метаболічні процеси посилюється, якщо вони входять до складу металоорганічних сполук [4, 33]. У разі дефіциту цих металів у риб може виникнути ферментативна недостатність [31]. Крім того, на активність АОФ впливає сезонність — вона залежить від пори року [95]. Зокрема, одним з чинників впливу на неї є температура води. Таким чином, температура навколишнього середовища впливає як на інтенсивність ПОЛ, так і на активність САЗ [9, 38]. Загалом, існування АОФ є найдавнішою захисною адаптацією, що підтверджується їх присутністю у всіх нині існуючих організмах. Кожен з АОФ спрямований на усунення одного з небезпечних ініціаторів або продуктів перекисного окиснення [6, 39]. Далі розглянемо основні високомолекулярні та низькомолекулярні АТ.

Супероксиддисмутаза (СОД, КФ 1.15.1.1) захищає організм від високотоксичних вільних радикалів, що постійно утворюються, та каталізує дисмутацію (диспропорціонування) супероксиду в кисень і пероксид водню [15, 41]. Міститься у всіх тканинах риб, «працюючи в парі» з КАТ [16, 29]. Зниження її вмісту в тканинах є типовим проявом реакції організму на окиснювальну вільнорадикальну атаку, оскільки вона є своєрідним внутрішньоклітинним буфером, підтримуючи рівень активованого кисню в певній концентрації, в залежності від того чи іншого метаболічного стану клітин. За С. І. Богословською зі співавторами [5], зниження концентрацій СОД служить діагностичним маркером на стрес-синдром в клінічних і експериментальних умовах [1].

КАТ (КФ 1.11.1.6) — геміновий фермент, що містить Fe^{3+} і бере участь в тканинному диханні. В особливо великих кількостях міститься в еритроцитах, для захисту гема гемоглобіну від окиснення [24, 26]. Вона каталізує розкладання утвореного в процесі біологічного окиснення токсичного пероксиду водню ($\text{C}_{15}\text{H}_{24}\text{O}$) на воду та молекулярний кисень, а також окиснює в його присутності низькомолекулярних спиртів і нітритів [16, 44]. Підвищення рівня її активності є захисно-адаптаційною реакцією, спрямованою на стримування ПОЛ клітинних мембран [29]. Зниження — зумовлене пошкодженням структури ферменту вільними радикалами, концентрація яких значно зростає за розвитку оксидативного стресу [14, 17].

Глутатіонпероксидази (КФ 1.11.1.9) — гемінові ферменти, які каталізують відновлення пероксидів ліпідів у відповідні спирти та відновлення пероксиду водню до води. Структурно, ферменти даної родини належать до селеновмісних тетрамірних глікопротеїнів. Це пояснює вплив кількості вмісту селену (Se) на цілісність клітинних і внутрішньоклітинних мембран [16, 26]. Основним метаболітом глутатіонпероксидази є трипептид глутатіон (GSH) — він має власну антиоксидантну активність, виступаючи як кофактор АОФ, донор водню, метаболіт і субстрат для ферментів. Глутатіон бере участь в синтезі білків і нуклеїнових кислот; захищає від активних форм кисню; відновлює і ізомеризує дисульфідні зв'язки; впливає на активність ферментів та інших білків; підтримує функції мембран; бере участь в обміні ейкозаноїдів; є резервом цистеїну; бере участь в метаболізмі ксенобіотиків; підвищує резистентність клітин до шкідливих

впливів; впливає на проліферацію. Глутатіон постійно синтезується в печінці та виділяється в кров, звідки надходить до всіх тканин [30, 31, 38].

Низькомолекулярні АТ викликають припинення ланцюгів вільнорадикального окиснення в результаті взаємодії з перекисними радикалами та умовно поділяються на:

1) жиророзчинні безазотисті сполуки, в першу чергу, представлені вітамінами Е (токоферол) і А (ретинол), убіхіноном, каротиноїдами [30, 31];

2) водорозчинні азотовмісні сполуки, представлені метаболітом сечової кислоти алантоїном ($C_4H_6N_4O_3$), аскорбіновою кислотою, білірубінном та амінокислотами — аланіном ($C_3H_7NO_2$), валіном ($C_5H_{11}NO_2$), ізолейцином ($C_6H_{13}O_2N$), метіоніном ($C_5H_{11}NO_2Se$), цистеїном ($C_3H_7NO_2S$), лізіном ($C_6H_{14}N_2O_2$), гістидином ($C_6H_9N_3O_2$), треоніном ($C_4H_9NO_3$), аспарагіном ($C_4H_8N_2O_3$) та глутаміном ($C_5H_{10}N_2O_3$) [31, 45].

Речовини, що містять сульфгідрильні групи, також відносяться до групи низькомолекулярних АТ. Розрізняють дві категорії толових, або SH-груп: розчинні (входять до складу глутатіону та вільних амінокислот) і ті, що належать зафіксованим в органелах клітини структурним або функціональним білкам. Цей поділ є умовним, оскільки більшість тіолових ферментів та інших тіоловмісних сполук розчиняються у воді [6].

В ембріогенезі риб відбувається поступове наростання активності АОФ за одночасного виснаження запасів низькомолекулярних АТ, які досягають мінімальних величин до моменту викуплення [12]. Зокрема, у личинок їх вміст мінімальний до переходу на екзогенне живлення, після чого він знову підвищується в результаті надходження з їжею. Після досягнення рибами статевої зрілості вони беруть участь в процесі гаметогенезу, оскільки розвиток гонад стимулює гонадотропін. Останній безпосередньо взаємодіє з катехоламінами та стероїдними гормонами і їх рецепторами, регулюючи механізм поглинання антиоксидантів (аскорбата), їх транспорт і метаболізм (деградацію і синтез) в репродуктивній системі [31, 38, 39].

Значення низькомолекулярних антиоксидантів в організмі риб визначається [32]:

- захисною антиоксидантною функцією щодо ДНК, що міститься в гаметах, проти шкідливої дії природних метаболітів і екзогенних речовин;
- поглинанням з їжі у дорослих особин і транспортом в гамети для успішного забезпечення репродуктивної функції;
- участю в ендокринній регуляції нейрогуморальних та гуморальних шляхів репродукції;
- участю в регуляції дозрівання і (або) стерильності гамет за високих доз УФ-радіації, гіпоксії і гіпероксії.

АТ в осетрівництві традиційно вводяться до складу кормів, проте останнім часом використовуються і у вигляді препаратів. В корми для осетрових видів риб додають як штучні (синтетичні), так і натуральні (природні) антиоксидантні

речовини. Натуральні АТ в рівній мірі містяться в продуктах рослинного і тваринного походження, зокрема в жирах (особливо в риб'ячому), кукурудзяному та соєвому борошні, лляному і соєвому шроті, зернах злаків, олії. До них відносяться токоферолі, лецитин, кефаліни, оксифлавоїни, кавава і дегідрокавава кислоти, похідні галової кислоти, госсипол, рутин і т.д. [32]. Крім того, все більш актуальним стає поділ АТ, що застосовуються в осетрівництві, на нетоксичні і токсичні, з поступовою відмовою від використання останніх.

Найпоширеніші нетоксичні антиоксиданти:

1) Вітамін Е (токоферол) — природний АТ, що повсюдно додається в корми з метою запобігання їх окисненню, в процесі якого утворюються токсичні продукти, що негативно впливають на ріст риб [24];

2) Іонол ($C_{15}H_{24}O$) — синтетичний аналог вітаміну Е, маркується як Е 321. Принцип його дії базується на тому, що маючи в своєму складі функціональні групи різної хімічної природи, він має множинний механізм інгібування окисного процесу, а, отже, високу ефективність антиоксидантної дії [24];

3) Серотонін-модульований антиконсолідаційний білок (СМАБ) — використовується для внутрішньом'язового введення осетровим з метою нормалізації ПОЛ. Дія СМАБ зумовлена тим, що штучна активація серотонінергічної системи сприяє корекції оксидативного стресу. СМАБ позбавлений видової специфічності і складається з двох субодиниць з молекулярними масами 60 і 120 кДа. Він знаходиться в прямій залежності від рівня серотоніну та характеризується високою швидкістю обміну в нервових клітинах [46];

4) Порфірини — детоксиканти з множинним механізмом дії. Ефективність їхньої антиоксидантної дії залежить від хімічної природи, а також від тривалості процесу окиснення [12]. Вони входять до складу великої кількості гемових ферментів, відзначаючись ліпофільними властивостями [20, 47];

5) Тіофан — поліфункціональний сірковмісний антиоксидант, який не є стимулятором росту. Застосовується в осетрівництві як кормова добавка (близько 90 мг/кг маси тіла) або під час знеклеювання ікри (у вигляді 1%-го олійного розчину) [11, 48];

6) Селеновісні мінеральні препарати — використовуються як кормові добавки, що знижують рівень гідропероксидів та активують АТ [42]. Принцип дії базується на тому, що у тканинах риб під впливом селену зростає активність каталази і глутатіонпероксидази, а вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ знижується [16, 27].

Основні токсичні антиоксиданти [25]:

1) Сантохін — основний антиоксидант в рибництві, використовується для захисту каротину. Випускається у вигляді маслянистої рідини з 93% діючої речовини;

2) Дилудин — дозволений для широкого застосування, малорозчинний в

рослинних оліях. Випускається у вигляді кристалічного порошку зелено-жовтого кольору;

3) Бутилоокситолуол (БОТ) та бутилооксианізол (БОА) — належать до малотоксичних речовин, їх застосування дозволено в дозуванні, що не перевищує 0,02%. Випускаються у вигляді порошку зі світлих кристалів.

Абіотичні (температура, аерація, солоність води, гідростатичний тиск) та біотичні (інфікування, інтоксикація продуктами метаболізму мікроорганізмів) чинники суттєво впливають на ПОЛ і САЗ. Важливий вплив має антропогенний чинник, в якому виділяють технологічні чинники. До них належить: інтенсифікація рибництва та інтоксикація солями важких металів, фенолом, пестицидами та ін. [9, 39].

Більшість осетрових належать до анадромних видів риб, вони нагулюються в морях та йдуть на нерест у прісні води. Їх адаптації до зміни солоності води пов'язані зі структурно-функціональною перебудовою мембран зябрових клітин. Власне солоність води є одним з основних ініціаторів і регуляторів ПОЛ. Зокрема, САЗ активізується в тих органах, які реалізують процеси підтримки осмотичної рівноваги — в зябрах та шкірі [38]. Найбільш контрастні зміни, аж до зростання токсичності ліпідів при коливаннях солоності води, спостерігаються в зябрах, осморегуляційний механізм яких здатний до перебудови [41]. Наприклад, у прісній воді хлоридні клітини зябер поглинають іони натрію з середовища, а в солоній — навпаки, виводять їх з організму [1]. Такі зміни функцій клітин зябер пов'язані з перебудовою мембран, що, в свою чергу, викликає зміни активності САЗ і рівня ПОЛ [9].

Найбільш показовими, з точки зору дослідження окисно-відновних процесів, є печінка, еритроцити, мозок, м'язи і сперма. В зябрах антиоксидантні процеси найбільш інтенсивно протікають при зміні температури, аерації, солоності води; в селезінці — при інфікуванні та імунних реакціях; в печінці — при інтоксикаціях [9, 37].

Печінка у вигляді гомогенату є класичною моделлю для вивчення ПОЛ, оскільки в клітинах даного органу концентруються білки САЗ, які запобігають токсичній дії як ендо-, так і екзогенних агентів [20]. В ній активність САЗ значно вища, ніж в тканинах шкіри і м'язів, але нижча, ніж в еритроцитах [4]. Крім того, в ній присутня певна кількість ендогенного α -токоферолу, який впливає на інтенсивність перекисних окиснювальних процесів [2]. Функція детоксикації, притаманна печінці, зумовлює вищий рівень пероксидації та накопичення МДА, ніж у м'язах [17, 35]. Оскільки вона є центральним органом метаболізму ксенобіотиків, система монооксигеназ гепатоцитів має найбільшу активність. Дослідження морфологічних та біохімічних характеристик гепатоцитів використовують в екотоксикологічних методах діагностики екосистем під дією інтенсивного антропогенного впливу. Також, для оцінки стану організму та ступеня впливу на нього різних зовнішніх чинників, в тому числі несприятливих, застосовуються як біомаркери ферменти САЗ. Вони здатні розкладати, тим самим детоксикуючи активні форми кисню, які утворюються в результаті

біотрансформації ксенобіотиків в печінці. Таким чином, аналіз стану печінки і активності АОФ в ній здатний надати адекватну інформацію про відгуки організму на надходження ксенобіотиків та його резистентність до різноманітних чинників зовнішнього середовища [49, 50].

М'язи, в порівнянні з печінкою, набагато бідніші на такі антиоксиданти як СОД та α -токоферол. Це пов'язано з тим, що саме в печінці зосереджені антиоксидантні системи і системи детоксикації перекисного окиснення ліпідів [51].

Спермі притаманна висока концентрація ПНЖК та низька концентрація ферментів САЗ. Тому навіть незначне підвищення рівня ПОЛ сперми призводить до пошкодження мембран, зниження зволоженості сперматозоїдів і, внаслідок цього, до зменшення їх рухливості, аномальної будови та втрати життєздатності [12].

Мозку (ЦНС) притаманна висока чутливість тканин до зовнішніх впливів. Це зумовлено наявністю в структурі плазматичної мембрани нейронів з високим вмістом ПНЖК, здатних залучатися до процесу вільнорадикального перекисного окиснення ліпідів (ВПОЛ) при розвитку загального або місцевого адаптаційного синдрому [4]. В умовах дії стрес-чинника підтримання гомеостазу здійснюється шляхом зміни синтетичних процесів в нейронах і визначається їх здатністю до внутрішньоклітинної реорганізації, які забезпечують адаптацію клітин даної тканини до середовища існування за рахунок зміни інформаційного потоку та оптимізації нейронних мереж (нейропластичності). Найпершими ознаками вільнорадикального ушкодження нейронів осетрових видів риб є:

- 1) порушення водно-іонного гомеостазу в клітинах;
- 2) демієлінізація провідних шляхів нейронів;
- 3) розширення цистерн ендоплазматичної мережі в перикаріоні;
- 4) зниження щільності рибосом на поверхні ендоплазматичної мережі перикаріону;
- 5) зниження кількості мітохондрій внаслідок їх деструкції (набрякання, нерівномірного розширення міжмембранного простору, деструкції крист та просвітління матриксу) [52].

ВИСНОВКИ

В організмі риб постійно відбуваються процеси за участю кисню. До них, зокрема, належить вільнорадикальне перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ). Ці процеси, за нормальних умов, стабільно відбуваються в організмі та є необхідними для здійснення таких фізіологічних функцій, як піноцитоз, фагоцитоз, регуляція проникності мембран, проведення нервового збудження тощо. За умов, що виходять за межі норми, спостерігається інтенсифікація процесів ПОЛ. Регуляція ПОЛ та нейтралізація його продуктів здійснюється за допомогою системи антиоксидантного захисту (САЗ), зокрема антиоксидантів. До них відносять ферменти системи САЗ та низько- і високомолекулярні сполуки, що містять тіольні та селеногрупи, насамперед: супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіонредуктаза, цистеїн та багато інших. Система

антиоксидантного захисту відіграє одну із ключових ролей в життєдіяльності організму осетрів за рахунок регуляції нею ряду метаболічних процесів. Використання оцінки стану системи антиоксидантного захисту дає можливість отримувати кількісну інформацію про перебіг цих процесів. Отже, рівень активності системи антиоксидантного захисту в організмі осетрових видів риб в результаті впливу ендогенного та екзогенного характеру може виступати важливим чинником адаптації їхнього організму до змін навколишнього середовища. Продукти вільнорадикального перекисного окиснення також можуть виступати своєрідними біомаркерами ушкодження тканин, оскільки за їх вмістом можна судити про інтенсивність перебігу вільнорадикальних процесів у різних системах організму.

ЛІТЕРАТУРА

1. Абросимова Н. А. Активность дегидрогеназ в процессе развития тимпании у молоди стерляди *Acipenser ruthenus* L. / Н. А. Абросимова, К. С. Абросимова // Юг России: экология, развитие. — 2012. — № 1. — С. 59—63.
2. Токсичное действие соединений ртути и олова на молодь осетровых рыб / Ю. Т. Пименов, Н. Т. Берберова, В. П. Осипова [и др.] // Вестник ЮНЦ РАН. — 2005. — Т. 1, № 1. — С. 33—40.
3. Определение скорости пероксидного окисления липидов в печени русского осетра (*Acipenser gueldenstaedti* Brandt) *in vitro* в присутствии соединений ртути и порфиринов / Ю. Т. Пименов, В. П. Осипова, Л. А. Дьякова [и др.] // Вестник АГТУ. — 2004. — № 4 (23). — С. 46—51.
4. Ліпіди як компонент адаптації риб до екологічного стресу / Е. М. Попова, І. В. Кошій // Рибогосподарська наука України. — 2007. — № 1. — С. 49—56.
5. Определение скорости пероксидного окисления липидов в печени русского осетра в присутствии соединений ртути, олова, кадмия и порфиринов *in vitro* / Н. А. Антонова, В. П. Осипова, М. Н. Коляда [и др.] // Вестник АГТУ. — 2007. — № 3 (38). — С. 150—154.
6. Шахматова О. А. Использование показателей антиоксидантной системы гидробионтов в экологическом мониторинге (аналитический обзор) / О. А. Шахматова // Рибне господарство України. — 2009. — № 1. — С. 6—11.
7. Fridovich I. Oxygen toxicity: A radical explanation / I. Fridovich // J. Exp. Biol. — 1998. — Vol. 201. — P. 1203—1209.
8. Halliwell B. Free Radicals in Biology and Medicine / B. Halliwell, J. M. C. Gutteridge — Oxford : Oxford University Press, 1999. — 944 p.
9. Грубинко В. В. Перекисное окисление липидов и антиоксидантная защита у рыб (обзор) / В. В. Грубинко, Ю. В. Леус // Гидробиологический журнал. — 2001. — Т. 37, № 3. — С. 64—78.
10. Черкесова Д. У. Сравнительное изучение показателей окислительно-антиоксидантной системы в мышечной ткани русского осетра (*Acipenser gueldenstaedti* Brandt) и карпа (*Cyprinus carpio* L.) при воздействии свинца / Д. У. Черкесова, А. И. Рабаданова, Г. Р. Мурадова // Успехи современного естествознания. — 2012. — № 12. — С. 50—53.

11. Инновационная технология управления процессами свободнорадикальной защиты рыб на ранних этапах онтогенеза / О. В. Кеберлайн, А. В. Сахаров, А. А. Макеев [и др.] // Вестник КрасГАУ. — 2012. — № 9. — С. 112—117.
12. Mommsen T. P. Vitellogenesis and oocyte assembly / T. P. Mommsen, P. J. Walsh // Fish Physiology: The Physiology of Developing Fish. Part A. Eggs and Larvae — San Diego : Academic Press, 1988. — Vol. XI. — P. 347—406.
13. Исследование антиоксидантных свойств порфиринов в модельной системе пероксидного окисления спермы осетровых в присутствии тяжелых металлов / Н. А. Антонова, В. П. Осипова, М. Н. Коляда [и др.] // Вестник АГТУ. — 2008. — № 6(47). — С. 37—41.
14. Влияние оловоорганических соединений на рост, скорость перекисного окисления липидов печени и активность каталазы эритроцитов крови молоди стерляди / О. И. Есина, М. Н. Коляда, Ю. Т. Пименов [и др.] // Фундаментальные исследования. — 2005. — № 9. — С. 30—31.
15. Kono Yasuhira. Generation of Superoxid radical during Antioxidation of Hydroxylamine and assay for SOD / Yasuhira Kono // Biochemistry and Bio-phys. — 1983. — Vol. 186, № 6. — P. 119—195.
16. Comparative studies on superoxide dismutase, catalase and peroxidase levels in erythrocytes and livers of different freshwater and marine fish species / J. Wdrieczak, G. Zalesna, E. Wujcc [et al.] // Comp. Biochem. and Physiol. — 1982. — Vol. 73, № 2. — P. 316—365.
17. Гераскин П. П. Реакции организма каспийских осетровых (*Acipenseridae*) на загрязнение среды обитания : дис. ... доктора биол. наук : спец. 03.03.01 «Физиология» / Гераскин П. П. — М., 2013. — 34 с.
18. Thomas P. Molecular and biochemical responses of fish to stresses and their potential use in environmental monitoring / P. Thomas // Biological indicators of stress in fish. Bethesda : American Fisheries Society, 1990. — P. 9—28.
19. Ahmad R. G. Is there a balance between oxidative stress and antioxidant defense system during development? / R. G. Ahmad // Medical J. of Islamic World Academy of Sciences. — 2005. — № 1(2). — P. 55—63.
20. Исследование антиоксидантных свойств порфиринов и их комплексов с металлами / Н. А. Антонова, В. П. Осипова, М. Н. Коляда [и др.] // Макрогетероциклы. — 2010. — № 3(2-3). — С. 139—144.
21. Абросимова Н. А. Изменение липидного статуса и процессов перекисного окисления липидов производителей стерляди при заводском содержании / Н. А. Абросимова, С. С. Абросимов // Юг России: экология, развитие. — 2012. — № 2. — С. 21—25.
22. Процессы перекисного окисления липидов у осетровых рыб при кормлении различными кормами / Ш. К. Бахтиярова, Б. А. Джулипбекова, Б. И. Жаксымов [и др.] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2016. — № 5. — С. 595—598.
23. Влияние производных ионола на основные показатели жизнедеятельности сеголеток русского осетра / И. М. Чернушкина, Н. А. Антонова, Н. О. Мовчан [и др.] // Известия Самарского научного центра РАН. — 2010. — Т. 12, № 1(5). — С. 1363—1366.

24. Исследование совместного влияния сырой нефти и диметилловых хлорида на скорость пероксидного окисления липидов гомогената печени русского осетра *in vitro* / И. М. Чернушкина, М. Н. Коляда, В. П. Осипова [и др.] // Вестник АГТУ. — 2007. — № 6(41). — С. 19—23.
25. Скляр В. Я. Корма и кормление рыб в аквакультуре / Скляр В. Я. — М. : ВНИРО, 2008. — 150 с.
26. Vertuani S. The antioxidants and pro-antioxidants network: an overview / S. Vertuani, A. Angusti, S. Manfredini // Current pharmaceutical design. — 2004. — Vol. 10, № 14. — P. 1677—1694.
27. Ярмолюк В. А. Функціональний стан системи антиоксидантного захисту за дії цинку і сполук селену / В. А. Ярмолюк, С. І. Крась, С. І. Тарасюк // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. праць Біло-церк. держ. аграр. ун-ту. — 2010. — № 2(70). — С. 96—101.
28. Липидный состав и некоторые показатели перекисного окисления липидов в печени рыб в условиях антропогенной нагрузки / О. Б. Васильева, М. А. Назарова, П. О. Рипатти [и др.] // Физиологические, биохимические и молекулярно-генетические механизмы адаптаций гидробионтов : Всеросс. конф. с междунар. участием, 22-27 сент. 2012 г. : матер. — Борок, 2012. — С. 60—66.
29. Черкесова Д. У. Сравнительное изучение показателей окислительно-антиоксидантной систем молоди русского осетра и кутума в условиях нитритной интоксикации / Д. У. Черкесова, А. Б. Шахназарова, А. Р. Исуев // Вопросы ихтиологии. — 2010. — Т. 50, № 2. — С. 285—288.
30. Sies H. Oxidative stress: oxidants and antioxidants / H. Sies // Experimental physiology. — 1997. — Vol. 82, № 2. — P. 291—295.
31. Антиоксидантная система [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://belki.com.ua/antioxidanti-antioxidant-system.html>.
32. Руднева И. И. Механизмы адаптации ранних онтогенетических стадий рыб к окислительному стрессу / И. И. Руднева, В. Г. Шайда // Физиологические, биохимические и молекулярно-генетические механизмы адаптаций гидробионтов : Всеросс. конф. с междунар. участием, 22-27 сент. 2012 г. : матер. — Борок, 2012. — С. 312—316.
33. Дозо- и хронозависимое влияние свинца на выживаемость и состояние окислительно-антиоксидантной системы молоди русского осетра (*Acipenser gueldenstaedti* Brandt) / Д. У. Черкесова, А. И. Рабаданова, Г. Р. Мурадова [и др.] // Известия Самарского научного центра РАН. — 2012. — Т. 14, № 1(8). — С. 1937—1940.
34. Применение витамина Е в качестве антидота при токсическом воздействии хлорида кадмия / В. П. Осипова, С. А. Ильина, О. И. Есина [и др.] // Вестник АГТУ. — 2005. — № 6 (29). — С. 53—59.
35. Влияние загрязнения северного Каспия на интенсивность перекисного окисления липидов и активность цитохромооксидазы печени и мышц осетровых рыб / П. П. Гераскин, Г. Ф. Металлов, В. П. Аксёнов [и др.] // Вестник АГТУ. — 2010. — № 2. — С. 88—97. — (Серия : Рыбное хозяйство).
36. Нефтяное загрязнение Каспийского моря как один из факторов инициирования оксидативного стресса у осетровых / П. П. Гераскин,

- Е. Н. Пономарёва, Г. Ф. Металлов [и др.] // Известия Самарского научного центра РАН. — 2012. — Т. 14, № 5. — С. 209—216.
37. Козлова Н. В. Перекисное окисление липидов в мышцах осетровых рыб под влиянием химических веществ / Н. В. Козлова, Н. А. Каниева // Фундаментальные исследования. — 2006. — № 9. — С. 43.
 38. Martinez-Alvares R. M. Antioxidant defenses in fish: biotic and abiotic factors / R. M. Martinez-Alvares A. E. Morales, A. Sanz // Rev. Fish Biol. Fish. — 2005. — Vol. 15, № 1. — P. 75—88.
 39. Winston G. W. Oxidant and antioxidant in aquatic animals / G. W. Winston // Ibid. — 1991. — Vol. 100, № 1. — P. 173—176.
 40. Изменение активности каталазы гемолизата эритроцитов крови в присутствии соединений ртути, олова и порфиринов / М. Н. Коляда, В. П. Осипова, Е. М. Лагутина [и др.] // Фундаментальные исследования. — 2005. — № 9. — С. 31—32.
 41. Влияние различных кормов на состояние про- и антиоксидантной системы крови рыб / Ш. К. Бахтиярова, Б. А. Джусипбекова, Б. И. Жаксымов [и др.] // Вестник КазНМУ. — 2015. — № 2. — С. 496—499.
 42. Абросимов С. С. Роль минеральных препаратов в функционировании системы антиоксидантной защиты организма (на примере молоди русского осетра) / С. С. Абросимов // Естественные науки. — 2010. — № 4(33). — С. 80—87.
 43. SOD [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.worthington-biochem.com/SODBE/default.html>.
 44. Каталаза [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/14012/Каталаза.
 45. Чистяков В. А. Биохимические механизмы неспецифической защиты клетки от окислительного стресса : дис. ... доктора биол. наук : спец. 03.01.04 «Биохимия» / Чистяков В. А. — Ростов н/Д., 2011. — 44 с.
 46. Бахшалиева Р. Р. Участие серотонинмодулируемого антиконсалидационного белка в опосредовании воздействия неблагоприятных факторов на уровень перекисного окисления липидов в тканях молоди осетра *Acipenser gueldenstaedtii persicus* / Р. Р. Бахшалиева, А. А. Мехтиев, Р. Ю. Касимов // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. — 2010. — Т. 46, № 5. — С. 370—374.
 47. Perez M. J. Antioxidant and pro-oxidant effects of a manganese porphyrin complex against CYP2E1-dependent toxicity / M. J. Perez, A. I. Cederbaum // Free Radical Biology & Medicine. — 2002. — Vol. 33, № 1. — P. 111—127.
 48. Роль свободнорадикального механизма в реализации адаптивных реакций сибирского осетра (*Acipenser baerii*) при моделировании колебаний гидротермического режима / В. И. Лошенко, А. В. Сахаров, А. Е. Просенко [и др.] // Вестник ТвГУ. — 2016. — № 1. — С. 7—14. — (Серия : Биология и экология).
 49. Новоселова Ю. В. Морфофизиологические и биохимические особенности печени рыб как индикатора их состояния в условиях антропогенного загрязнения / Ю. В. Новоселова, И. И. Дорохова // Водні біоресурси і аквакультура / [ред. І. І. Грициняк, М. В. Гринжевський, О. М. Третяк]. — К. : ДІА, 2010. — С. 287—290.

50. Семенкова Т. Б. Эколого-гистофизиологический анализ печени и некоторые аспекты регуляции липидного обмена у сибирского осетра : дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология» / Семенкова Т. Б. — Л., 1987. — 21 с.
51. Абросимов С. С. Липидная, жирнокислотная и антиоксидантная характеристика печени и мышц годовиков стерляди после зимовки / С. С. Абросимов, Е. Б. Абросимова // Актуальные вопросы рыбного хозяйства и аквакультуры бассейнов южных морей России : Междунар. науч. конф., 1-3 окт. 2014 г. : матер. — Ростов н/Д. : ЮНЦ РАН, 2014. — С. 291—295.
52. Адаптационная пластичность нейронов головного мозга сибирского осетра в условиях колебаний температурного режима среды обитания / В. И. Лошенко, А. В. Сахаров, А. Е. Просенко [и др.] // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. — 2016. — № 2(90). — С. 17—25.

REFERENCES

1. Abrosimova, N. A., & Abrosimova, K. S. (2012). Aktivnost' degidrogenaz v protsesse razvitiya timpanii u molodi sterlyadi *Acipenser ruthenus* L. *Yug Rossii: ekologiya, razvitie*, 1, 59-63.
2. Pimenov, Yu. T., Berberova, N. T., Osipova, V. P., Kolyada, M. N., & Milaeva, E. R. (2005). Toksichnoe deystvie soedineniy rtuti i olova na molod' osetrovyykh ryb. *Vestnik YuNTs RAN*, 1, 33-40.
3. Pimenov, Yu. T., Osipova, V. P., D'yakova, L. A., Berberova, N. T., Milaeva, E. R., Filippova, L. A., & Brotsman, I. V. (2004). Opredelenie skorosti peroksidnogo okisleniya lipidov v pecheni russkogo osetra (*Acipenser gueldenstaedti* Brandt) *in vitro* v prisutstvii soedineniy rtuti i porfirinov. *Vestnik AGTU*, 4 (23), 46-51.
4. Popova, E. M., & Koshchii, I. V. (2007). Lipidy yak komponent adaptatsii ryb do ekologichnoho stressu. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 49-56.
5. Antonova, N. A., Osipova, V. P., Kolyada, M. N., Movchan, N. O., Pimenov, Yu. T., & Milaeva, E. R. (2007). Opredelenie skorosti peroksidnogo okisleniya lipidov v pecheni russkogo osetra v prisutstvii soedineniy rtuti, olova, kadmiya i porfirinov *in vitro*. *Vestnik AGTU*, 3 (38), 150-154.
6. Shakhmatova, O. A. (2009). Ispol'zovanie pokazateley antioksidantnoy sistemy gidrobiontov v ekologicheskoy monitoringe (analiticheskiy obzor). *Rybne hospodarstvo Ukrainy*, 1, 6-11.
7. Fridovich, I. (1998). Oxygen toxicity: A radical explanation. *J. Exp. Biol.*, 201, 1203-1209.
8. Halliwell, B., & Gutteridge, J. M. C. (1999). *Free Radicals in Biology and Medicine*. Oxford : OxfordUniversity Press.
9. Grubinko, V. V., & Leus, Yu. V. (2001). Perekisnoe okislenie lipidov i antioksidantnayazashchita u ryb (obzor). *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 37, 3, 64-78.
10. Cherkesova, D. U., Rabadanova, A. I., & Muradova, G. R. (2012). Sravnitel'noe izuchenie pokazateley okislitel'no-antioksidantnoy sistemy v myshechnoy tkani russkogo osetra (*Acipenser gueldenstaedti* Brandt) i karpa (*Cyprinus carpio* L.) pri vozdeystvii svintsa. *Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya*, 12, 50-53.

11. Keberlayn, O. V., Sakharov, A. V., Makeev, A. A., Prosenko, A. E., & Saf'yanov, Yu. V. (2012). Innovatsionnaya tekhnologiya upravleniya protsessami svobodnoradikal'noy zashchity ryb na rannikh etapakh ontogeneza. *Vestnik KrasGAU*, 9, 112-117.
12. Mommsen, T. P., & Walsh, P. J. (1988). Vitellogenesis and oocyte assembly. *Fish Physiology: The Physiology of Developing Fish. Part A. Eggs and Larvae*, XI, 347-406.
13. Antonova, N. A., Osipova, V. P., Kolyada, M. N., Movchan, N. O., & Pimenov, Yu. T. (2008). Issledovanie antioksidantnykh svoystv porfirinov v model'noy sisteme peroksidnogo okisleniya spermy osetrovyykh v prisutstvii tyazhelykh metallov. *Vestnik AGTU*, 6(47), 37-41.
14. Esina, O. I., Kolyada, M. N., Pimenov, Yu. T., Berberova, N. T., & Milaeva, E. R. (2005). Vliyaniye olovoorganicheskikh soedineniy na rost, skorost' perekisnogo okisleniya lipidov pecheni i aktivnost' katalazy eritrotsitov krovi molodi sterlyadi. *Fundamental'nye issledovaniya*, 9, 30-31.
15. Kono, Yasuhira. (1983). Generation of Superoxid radical during antiooxidation of Hydroxylamine and assay for SOD. *Biochemistry and Bio-phys.*, 186, 6, 119-195.
16. Wdrieczak, J., Zalesna, G., Wujcc, E., & Peres, G. (1982). Comparative studes on superoxide dismutase, catalase and peroxidase levels in erythrocytes and livers of different freshwater and marine fish species. *Comp. Biochem. and Physiol.*, 73, 2, 316-365.
17. Geraskin, P. P. (2013). Reaktsii organizma kaspiskikh osetrovyykh (*Acipenseridae*) na zagryaznenie sredy obitaniya. *Doctor's thesis*. Moskva.
18. Thomas, P. (1990). Molecular and biochemical responses of fish to stresses and their potential use in environmental monitoring. *Biological indicators of stress in fish*. Bethesda : American Fisheries Society, 9-28.
19. Ahmad, R. G. (2005). Is there a balance between oxidative stress and antioxidant defense system during development? *Medical J. of Islamic World Academy of Sciences*, 1(2), 55-63.
20. Antonova, N. A., Osipova, V. P., Kolyada, M. N., Movchan, N. O., Milaeva, E. R., & Pimenov, Yu. T. (2010). Issledovanie antioksidantnykh svoystv porfirinov i ikh kompleksov s metallami. *Makroeterotsikly*, 3(2-3), 139-144.
21. Abrosimova, N. A., & Abrosimov, S. S. (2012). Izmeneniye lipidnogo statusa i protsessov perekisnogo okisleniya lipidov proizvoditeley sterlyadi pri zavodskom soderzhanii. *Yug Rossii: ekologiya, razvitie*, 2, 21-25.
22. Bakhtiyarova, Sh. K., Dzhusipbekova, B. A., Zhaksymov, B. I., Makashev, E. K., Erlan, A. E., Alpysbaeva, K. K., & Khasenova, Kh. Kh. (2016). Protssesy perekisnogo okisleniya lipidov u osetrovyykh ryb pri kormlenii razlichnymi kormami. *Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh issledovaniy*, 5, 595-598.
23. Chernushkina, I. M., Antonova, N. A., Movchan, N. O., Osipova, V. P., Kolyada, M. N., & Pimenov, Yu. T. (2010). Vliyaniye proizvodnykh ionola na osnovnye pokazateli zhiznedeyatel'nosti segoletok russkogo osetra. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN*, 12, 1(5), 1363-1366.
24. Chernushkina, I. M., Kolyada, M. N., Osipova, V. P., & Pimenov, Yu. T. (2007). Issledovanie sovместnogo vliyaniya syroy nefti i dimetilolovokhlorida na skorost'

- peroksidnogo okisleniya lipidov gomogeneata pecheni russkogo osetra *in vitro*. *Vestnik AGTU*, 6 (41), 19-23.
25. Sklyarov, V. Ya. (2008). *Korma i kormlenie ryb v akvakul'ture*. Moskva : VNIRO.
26. Vertuani, S., Angusti, A., & Manfredini, S. (2004). The antioxidants and pro-antioxidants network: an overview. *Current pharmaceutical design*, 10, 14, 1677-1694.
27. Yarmoliuk, V. A., Kras, S. I., & Tarasiuk, S. I. (2010). Funktsionalnyi stan systemy antyoksydantnoho zakhystu za dii tsynku i spoluk selenu. *Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnystva: zb. nauk. prats Bilotserk. derzh. ahrar. un-tu*, 2(70), 96-101.
28. Vasil'eva O. V., Nazarova M. A., Ripatti P. O., & Nemova N. N. (2012). Lipidnyy sostav i nekotorye pokazateli perekisnogo okisleniya lipidov v pecheni ryb v usloviyakh antropogennoy nagruzki. *Fiziologicheskie, biokhimicheskie i molekulyarno-geneticheskie mekhanizmy adaptatsiy gidrobiontov: Vserossiyskaya konferentsiya s mezhdunarod. uchastiem (Borok, 22-27 sentyabrya 2012 g.)*. Borok, 60-66.
29. Cherkesova, D. U., Shakhnazarova, A. B., & Isuev, A. R. (2010). Sravnitel'noe izuchenie pokazateley okislitel'no-antioksidantnoy sistem molodi russkogo osetra i kutuma v usloviyakh nitritnoy intoksikatsii. *Voprosy ikhtiologii*, 50, 2, 285-288.
30. Sies, H. (1997). Oxidative stress: oxidants and antioxidants. *Experimental physiology*, 82, 2, 291-295.
31. Antioksidantnaya sistema. *belki.com.ua*. Retrieved from <http://belki.com.ua/antioxidanti-antioxidant-system.html>.
32. Rudneva, I. I., & Shayda, V. G. (2012). Mekhanizmy adaptatsii rannikh ontogeneticheskikh stadiy ryb k okislitel'nomu stressu. *Fiziologicheskie, biokhimicheskie i molekulyarno-geneticheskie mekhanizmy adaptatsiy gidrobiontov: Vserossiysk. konferentsiya s mezhdunarodnym uchastiem (Borok, 22-27 sentyabrya 2012 g.)*. Borok, 312-316.
33. Cherkesova, D. U., Rabadanova, A. I., Muradova, G. R., & Gabibov, M. M. (2012). Dozo- i khronozavisimoe vliyanie svintsa na vyzhivaemost' i sostoyanie okislitel'no-antioksidantnoy sistemy molodi russkogo osetra (*Acipenser Gueldenstaedti* Brant). *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN*, 14, 1(8), 1937-1940.
34. Osipova, V. P., Il'ina, S. A., Esina, O. I., Pimenov, Yu. T., Berberova, N. T., & Milaeva, E. R. (2005). Primenenie vitamina E v kachestve antidota pri toksicheskom vozhdeystvii khlorida kadmiya. *Vestnik AGTU*, 6 (29), 53-59.
35. Geraskin, P. P., Metallov, G. F., Aksenov, V. P., & Galaktionova, M. L. (2010). Vliyanie zagryazneniya severnogo Kaspiya na intensivnost' perekisnogo okisleniya lipidov i aktivnost' tsitokhromooksidazy pecheni i myshts osetrovykh ryb. *Vestnik AGTU*, 2, 88-97.
36. Geraskin, P. P., Ponomareva E. N., Metallov G. F., & Galaktionova, M. L. (2012). Neftyanoie zagryaznenie Kaspiyskogo morya kak odin iz faktorov initsirovaniya oksidativnogo stressa u osetrovykh. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN*, 14, 5, 209-216.

37. Kozlova N. V., & Kanieva N. A. (2006). Perekisnoe okislenie lipidov v myshtsakh osetrovyykh ryb pod vliyaniem khimicheskikh veshchestv. *Fundamental'nye issledovaniya*, 9, 43.
38. Martinez-Alvares, R. M., Morales, A. E., & Sanz, A. (2005). Antioxidant defenses in fish: biotic and abiotic factors. *Rev. Fish Biol. Fish.*, 15, 1, 75-88.
39. Winston, G. W. (1991). Oxidant and antioxidant in aquatic animals. *Ibid.*, 100, 1, 173-176.
40. Kolyada, M. N., Osipova, V. P., Lagutina, E. M., Pipiya, N. T., Berberova, N. T., Pimenov, Yu. T., & Milaeva, E. R. (2005). Izmenenie aktivnosti katalazy gemolizata eritrotsitov krovi v prisutstvii soedineniy rtuti, olova i porfirinov. *Fundamental'nye issledovaniya*, 9, 31-32.
41. Bakhtiyarova, Sh. K., Dzhusipbekova, B. A., Zhaksymov, B. I., & Makashev, E. K. (2015). Vliyanie razlichnykh kormov na sostoyanie pro- i antioksidantnoy sistemy krovi ryb. *Vestnik KazNMU*, 2, 496-499.
42. Abrosimov, S. S. (2010). Rol' mineral'nykh preparatov v funktsionirovanii sistemy antioksidantnoy zashchity organizma (na primere molodi russkogo osetra). *Estestvennye nauki*, 4(33), 80-87.
43. SOD. *worthington-biochem.com*. Retrieved from <http://www.worthington-biochem.com/SODBE/default.html>.
44. Katalaza. *dic.academic.ru*. Retrieved from http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/14012/Katalaza.
45. Chistyakov, V. A. (2011). Biokhimicheskie mekhanizmy nespetsificheskoy zashchity kletki ot okislitel'nogo stressa. *Doctor's thesis*. Rostov-na-Donu.
46. Bakhshalieva, R. R., Mekhtiev, A. A., & Kasimov, R. Yu. (2010). Uchastie serotoninmoduliruemogo antikonsolidatsionnogo belka v oposredovanii vozdeystviya neblagopriyatnykh faktorov na uroven' perekisnogo okisleniya lipidov v tkanyakh molodi osetra *Acipenser guldenstadti persicus*. *Zhurnal evolyutsionnoy biokhimii i fiziologii*, 46, 5, 370-374.
47. Perez, M. J., & Cederbaum, A. I. (2002). Antioxidant and pro-oxidant effects of a manganese porphyrin complex against CYP2E1-dependent toxicity. *Free Radical Biology & Medicine*, 33, 1, 111-127.
48. Loshenko, V. I., Sakharov, A. V., Prosenko, A. E., & Ostapenko, V. A. (2016). Rol' svobodnoradikal'nogo mekhanizma v realizatsii adaptivnykh reaktsiy sibirskogo osetra (*Acipenser baerii*) pri modelirovanii kolebaniy gidrotermicheskogo rezhima. *Vestnik TvGU*, 1, 7-14.
49. Novoselova, Yu. V., & Dorokhova, I. I. (2010). Morfofiziologicheskie i biokhimicheskie osobennosti pecheni ryb kak indikatora ikh sostoyaniya v usloviyakh antropogennogo zagryazneniya. *Vodni bioresursy i akvakul'tura*. Hrytsyniak, I. I., Hrynzhevs'kyi, M. V., & Tretyak, O. M. (Eds.), 287-290.
50. Semenkova, T. B. (1987). Ekologo-gistofiziologicheskii analiz pecheni i nekotorye aspekty regulyatsii lipidnogo obmena u sibirskogo osetra. *Candidate's thesis*. Leningrad.
51. Abrosimov, S. S., & Abrosimova, E. B. (2014). Lipidnaya, zhirnokislottaya i antioksidantnaya kharakteristika pecheni i myshts godovikov sterlyadi posle zimovki. *Aktual'nye voprosy rybnogo khozyaystva i akvakul'tury basseynov*

yuzhnykh morey Rossii: Mezhdunarod. nauchnaya konferentsiya (Rostov-na-Donu, 1-3 oktyabrya 2014 g. Rostov-na-Donu : YuNTs RAN, 291-295.

52. Loshenko, V. I., Sakharov, A. V., Prosenko, A. E., & Sivokhina, L. N. (2016). Adaptatsionnaya plastichnost' neyronov golovnoy mozga sibirskogo osetra v usloviyakh kolebaniy temperaturnogo rezhima sredy obitaniya. *Vestnik ChGPU im. I. Ya. Yakovleva*, 2(90), 17-25.

ОСОБЕННОСТИ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ РЫБ (*ACIPENSERIDAE*) (ОБЗОР)

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Проанализировать научные источники об особенностях окислительно-восстановительных процессов, в частности перекисного окисления липидов у осетровых видов рыб (*Acipenseridae*). Выделить ключевые моменты в инициации и ходе оксидативного стресса. Рассмотреть особенности образования основных продуктов перекисного окисления липидов, антиоксиданты природного и искусственного происхождения, тест-системы для исследования окислительно-восстановительных процессов.

Результаты. В работе описаны процессы перекисного окисления липидов. Кратко обрисован механизм действия основных антиоксидантных ферментов. Показаны особенности работы печени и ее участия в липидном обмене и системе антиоксидантной защиты. Приведены наиболее распространенные антиоксиданты, применяемые в кормлении осетровых видов рыб. Представлены органы и ткани, которые наиболее эффективно используемые для исследований процессов перекисного окисления липидов у осетровых видов рыб.

Практическая значимость. Систематизированные данные о перекисном окислении липидов, в частности, его острой форме — оксидативном стрессе, позволяют понимать положительные и отрицательные последствия окислительных реакций в организме рыб и принимать соответствующие меры для их коррекции. Данные по антиоксидантам, которые применяются в кормах для осетровых рыб будут полезными рыбоводам-осетроводам. Массив обобщенной информации будет интересным для ученых, исследующих особенности протекания процессов перекисного окисления липидов у осетровых видов рыб.

Ключевые слова: осетровые виды рыб (*Acipenseridae*), окислительные процессы, перекисное окисление, липиды, оксидативный стресс, система антиоксидантной защиты, антиоксиданты.

FEATURES OXIDATIVE PROCESSES IN STURGEONS FISH (*ACIPENSERIDAE*) (REVIEW)

М. Symon, seemann.sm@gmail.com, NAAS Institute of Fisheries, Kyiv

Purpose. To analyze scientific sources on physiological-biochemical peculiarities of reducing-oxidizing processes, including peroxide oxidation of lipids and work of the system of antioxidant protection system in sturgeon species (*Acipenseridae*). The initiation and process of the oxidative stress have been described. The main products of peroxide oxidation of lipids, antioxidants of natural and artificial origin, organs and tissues for the studies of reducing-oxidizing processes have been examined.

Findings. The work generalizes the processes of lipid peroxidation. Briefly outlined the main mechanism of action of antioxidant enzymes. Antioxidant defense system plays one of key role in the life of organism due regulating its series of metabolic processes, use of assessing of its state gives an

opportunity obtain quantitative information on the progress of these processes. The products of free radical peroxidation (dien conjugates and malonic dialdehyde) can also act as a sort of biomarkers of tissue damage, because their content can judge about the intensity of the flow of free radical processes in the various systems in organism. The review contains a description of the peculiarities of the liver and its involvement in lipid metabolism and antioxidant defense system. It is shown the most common antioxidants used in the feeding of sturgeon. Organs and tissues, which should be used for studying the processes of peroxide oxidation of lipids in sturgeon species, have been examined.

Practical value. *The systematized data regarding peroxide oxidation of lipids, oxidative stress and antioxidant protection system allow finding a balance between these processes. The data on antioxidants, which are used in feeds for sturgeon species, will be useful for sturgeon culturists. The array of the generalized information will be important for scientists who study the peculiarities of the processes of peroxide oxidation of lipids and antioxidant protection system in sturgeon species.*

Keywords: *sturgeon species (Acipenseridae), oxidative processes, peroxide oxidation, oxidative stress, antioxidant protection system, antioxidants, metabolism.*

ХРОНІКА

ВЧЕНИЙ, ФАХІВЕЦЬ РИБНОЇ ГАЛУЗІ. ДО 115-Ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ХОМЧУКА АНДРІЯ ЯКИМОВИЧА

Народився Хомчук А. Я. 30 жовтня 1901 року в с. Василиця Черкаської області.

У 1925 році він закінчив Черкаський педагогічний технікум, і з 1925 по 1930 рік працював учителем, завпедом, директором школи.

У 1930 році Хомчук А. Я. вступив до Херсонського інституту рибної промисловості, а в 1931 році був переведений до Московського інституту рибної промисловості, який закінчив у 1934 році з присудженням кваліфікації рибовод-біолог.

З березня 1933 по січень 1944 року він працював у галузі рибного господарства на посадах старшого рибовода, директора рибгоспів Мосрибтресту.

З 1936 року проводив науково-дослідну роботу, склав кандмінімум при Мосрибвтузі, написав дисертаційну роботу на тему: «Рибницько-біологічна ефективність засіву вирощувальних ставів вико-вівсяною сумішшю», яку 29 січня 1943 року захистив, отримавши вчений ступінь кандидата біологічних наук.

У січні 1944 року Народним Комісаріатом рибної промисловості СРСР Хомчук А. Я. був переведений директором Українського науково-дослідного інституту рибного господарства для відновлення рибної промисловості України.

Хомчук А. Я. — перший післявоєнний, другий директор в історії Інституту рибного господарства.

З 1944 по 1953 рік, будучи директором Українського науково-дослідного інституту рибного господарства, брав безпосередню участь в розробленні актуальних питань відбудови та розвитку ставового рибництва як керівник окремих науково-дослідних завдань, а також у підготовці кадрів для рибного господарства, консультуванні працівників рибгоспів з питань ставового рибництва.

З часу заснування завданнями Інституту було розроблення нових методів ведення рибного господарства, підготовка кадрів, організація державного і кооперативного рибництва.

У результаті пропаганди завдань рибництва, підготовки кадрів рибоводів, розроблення заходів щодо відтворення рибних запасів у розвитку рибного господарства в довоєнний час було досягнуто значних успіхів.

У роки, які передували Другій світовій війні, Інститут своїми роботами комплексно впливав на весь процес вирощування риби.

Друга світова війна перервала роботу Інституту, який був евакуйований на Урал, та призвела до руйнування значної кількості ставів, загибелі цінних племінних стад коропа, розповсюдження захворювань риб. Діяльність Інституту відновилась на початку 1944 р., відповідно до Постанови Раднаркому УСРР від 25 лютого 1944 р.

Напрямок діяльності Інституту протягом 1944–1945 рр. характеризувався відновленням зруйнованого війною ставового господарства: досліджувалися рибницько-технічний та епізоотичний стани ставових господарств, здійснювалось розроблення заходів щодо зміцнення та поліпшення господарств, надавалась практична допомога виробництву у справі налагодження експлуатації ставового фонду та підготовки кадрів.

Протягом п'ятиріччя 1946–1951 рр. Інститут проводив дослідження, спрямовані на підвищення продуктивності рибницьких ставів, повніше використання кормових ресурсів рибогосподарських водойм, підняття культури виробництва, розроблення методів комплексної інтенсифікації у ставовому рибництві, селекційно-племінну роботу щодо виведення кращих порід і видів риб для розведення у ставах, вивчення захворювань риб та розроблення заходів боротьби з ними, раціональне використання сировинної бази внутрішніх водойм.

У подальші роки науково-дослідні роботи Інституту значною мірою сприяли освоєнню рибних багатств Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця.

У всіх процесах відбудови зруйнованого війною рибного господарства України брав безпосередню участь Хомчук А. Я. як керівник Інституту рибного господарства.

У 1947 році ВАК Всесоюзного комітету у справах вищої школи при РНК СРСР Хомчуку А. Я. було присуджено вчене звання старшого наукового співробітника.

У квітні 1953 року на підставі рішення Міністерства легкої і харчової промисловості СРСР від 20 квітня 1953 року № 1707 Хомчук А. Я. був направлений в розпорядження Всесоюзного науково-дослідного інституту озерного і річкового рибного господарства для роботи у Білоруському відділенні цього інституту.

Науковим доробком Хомчука А. Я. є понад 20 наукових опублікованих праць, на підставі яких він підготував і здав до захисту дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук, яку через передчасну смерть не встиг захистити.

Науково-виробнича діяльність Хомчука А. Я. була належним чином оцінена державою. Він був нагороджений медалями: «За доблесну працю під час Великої Вітчизняної війни», «За оборону Москви», «У пам'ять 800-річчя Москви», «За трудову відзнаку», малою срібною медаллю Всесоюзної сільськогосподарської виставки.

Помер Хомчук А. Я. у 1953 році. Похований у м. П'ятигорську.

Грициняк І. І., директор Інституту рибного господарства НААН,
докт. с.-г. наук, професор, академік НААН
Олексієнко О. О., канд. с.-г. наук, с.н.с.

З Новим Роком та Різдвом Христовим!

FISHERIES SCIENCE OF UKRAINE

"Fisheries Science of Ukraine" — a scientific journal, has been published in Ukraine since 2007. "Fisheries Science of Ukraine" included in the List of Specialized Publications of Ukraine, which can be used for publishing results of doctor's and candidate's thesis (biological and agricultural sciences), was approved in 08.07.2009, recertification of 06.11.2014 (Ministry of Education and Science of Ukraine №1279)

Founder and publisher of the journal — Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

State registration certificate KB № 20934-10734 PR of 18.08.2014

EDITOR-IN-CHIEF

Ihor Hrytsyniak, Doctor of Sciences, Professor, Academician of the NAAS of Ukraine, Director, Institute of Fisheries of the NAAS

DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF

Oleksandr Tretiak, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Deputy Director in scientific works, Institute of Fisheries of the NAAS

Natalia Kolesnyk, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of International Scientific and Technical Cooperation and Intellectual Property, Institute of Fisheries of the NAAS

EDITORIAL BOARD

BIOLOGICAL SCIENCES

Boris Gomelsky, Doctor of Biological Sciences, Professor, Kentucky State University, UNITED STATES OF AMERICA

Daniel Patrick, Doctor of Biological Sciences, Head of Biology Department Laboratories of the Pyrenees and Landes, FRENCH REPUBLIC

Gautam V. Zodape, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Zoology of Shivaji University Kolhapur, REPUBLIC OF INDIA

Vasyl Sondak, Doctor of Sciences, Head of "Water Bioresources", National University of Water Management and Natural Resources, UKRAINE

Oleksandr Litvinenko, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director General, Federal State Unitary Enterprise "Gosrybtsentr", RUSSIA

Oleksandr Potrokhov, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Biology of reproduction of fish, Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, UKRAINE

Leonid Buchatskyi, Doctor of Sciences, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Leading Research Scientist of the Laboratory of Biotechnologies in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Ihor Buzevych, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Valentyna Solomatina, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Leading research scientist of the department of feeds and fish feeding, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

AGRICULTURAL SCIENCES

XU Pao, Doctor, Professor, Director of Freshwater Fisheries Research Center, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Jedrzey Krupinski, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director, National Research Institute of Animal Production, POLAND

Mykhailo Efymenko, Doctor of Sciences, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head Research Scientist, Institute of Animal Breeding and Genetics of the NAAS, UKRAINE

Serhiy Tarasiuk, Doctor of Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head of the Molecular-Genetic Research Department, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Ryszard Kolman, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Ichthyology Department, The Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute in Olsztyn, POLAND

Vitaliy Bekh, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Fish Selection, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Isaak Sherman, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Aquaculture Department, Kherson State Agrarian University, UKRAINE

Oleksandr Kostenko, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Veterinary Medicine and Zootechnics Department, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, UKRAINE

SCIENTIFIC EDITORS OF SECTIONS

are staff employees of the Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine: **Natalia Tushnytska**, PhD, Senior Research Scientist, Scientific Secretary of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Deren**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Feeds and Fish Feeding of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yaroslav Tuchapskyi**, PhD, Head of the Carp Breeding Laboratory of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Zaloilo**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Molecular-Genetic Studies of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Zabytviskyi**, PhD, Senior Research Scientist of Section of Sturgeon of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Anatoliy Melnyk**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Ecological Investigation of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Antonina Mruk**, Head of the Laboratory Salmonids Culture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Tetiana Hryhorenko**, PhD, Head of the Laboratory of Hydrobiology and Technology of Invertebrates Cultivation of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Rud'**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Bio-technology in Aquaculture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Natalia Matvienko**, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Ichthyopathology of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Oleksandr Didenko**, PhD, Senior Research Scientist of the Department of Study Reservoirs Bioresources of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Viktor Chernik**, Head of the Laboratory of Management in Aquaculture of the Institute of Fisheries of the NAAS

Editorial board of the Journal "Fisheries Science of Ukraine", Institute of Fisheries NAAS, 135, Obukhivska St, Kiev-164, Ukraine, 03164; tel.: +38 (044) 223-84-34; tel/fax: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Layout design: Natalia Kolesnik, Serhiy Shinkar, Oleksandr Bezusyi; **Making-up:** Maria Simon, Yevheniy Arkhanhelskyi;

Literature editing: Oleksandr Oleksiienko, Tetiana Shvets; **Correctors:** Inna Liutkevych; **Typing:** Hanna Kovalchuk

ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НААН
вул. Обухівська, 135 м. Київ-164, 03164, Україна
тел.: +38(044) 223-84-34, тел./факс: +38(044) 423-74-62

<http://fsu.ua>

info@fsu.ua