ISSN 2312-9581 (Online)

ISSN 2075-1508 (Print)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

1 / 2017

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські науки), переатестація від 06.11.2014 (наказ Міністерства освіти і науки України №1279)

Засновник та видавник — Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20934-10734 ПР від 18.08.2014

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ГРИЦІНЯК Ігор Іванович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, директор Інституту рибного господарства НААН

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ТРЕТЯК Олександр Михайлович, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН

КОЛЕСНИК Наталія Леонідівна, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності, Інститут рибного господарства НААН

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Гомельський Борис, доктор біол. наук, професор, Державний Університет Кентуккі, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Патрік Даніель, доктор біол. наук, Голова департаменту біології Лабораторії Піренеїв, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА

Зодапе Гаутам В., доктор біол. наук, професор, декан факультету зоології Державного Університету Шиваджи в Колхатурі, РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ

Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, зав. кафедрою водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА

Литвиненко Олександр Іванович, доктор біол. наук, іноземний член Національної академії аграрних наук України, генеральний директор, Федеральне державне унітарне підприємство «Госрыбцентр», Росія

Потрохов Олександр Спиридонович, доктор біол. наук, с.н.с., керівник лабораторії біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, УКРАЇНА

Бучацький Леонід Петрович, доктор біол. наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), провідний науковий співробітник лабораторії біотехнологій в рибицтві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Бұзевіч Ігор Юрійович, доктор біол. наук, с.н.с., завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Соломатіна Валентина Дмитрівна, доктор біол. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник відділу кормів та годівлі риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Ху Пао, доктор наук, професор, директор Центру прісноводного рибного господарства, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

Крупінський Єджей, доктор наук, професор, іноземний член Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут зоотехнії Польщі, ПОЛЬЩА

Єфіменко Михайло Якович, доктор с.-г. наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник, Інститут розведення і генетики тварин НААН, УКРАЇНА

Тарасюк Сергій Іванович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, зав. відділу молекулярно-генетичних досліджень, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Кольман Ришард, доктор наук, професор, зав. відділу іхтіології, Інститут прісноводного рибного господарства ім. Станіслава Саковича, ПОЛЬЩА

Бех Віталій Валерійович, доктор с.-г. наук, професор, зав. відділу селекції риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Шерман Ісаак Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедри рибицтва, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

Костенко Олександр Іванович, канд. с.-г. наук, с.н.с., нач. відділу ветеринарної медицини та зоотехнії, Національна академія аграрних наук України, УКРАЇНА

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

є штатними працівниками Інституту рибного господарства НААН України: **Тушницька Наталія Йосифівна**, канд. ветерин. наук, с.н.с., вчений секретар ІРГ НААН; **Дерень Ольга Володимирівна**, канд. с.-г. наук, с.н.с., зав. лабораторії кормів і годівлі риб ІРГ НААН; **Тучапський Ярослав Васильович**, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу селекції риб ІРГ НААН; **Залоїло Ольга Василівна**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ІРГ НААН; **Забитівський Юрій Михайлович**, канд. біол. наук, старший науковий співробітник сектору осетрівництва ІРГ НААН; **Мельник Анатолій Пилипович**, канд. хім. наук, с.н.с., зав. лабораторії екологічних досліджень ІРГ НААН; **Мрук Антоніна Іванівна**, зав. лабораторії лососівництва ІРГ НААН; **Григоренко Тетяна Володимирівна**, канд. с.-г. наук, зав. лабораторії гідробіології та технологій культивування цінних безхребетних ІРГ НААН; **Рудь Юрій Петрович**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії біотехнологій в рибицтві ІРГ НААН; **Матвієнко Наталія Миколаївна**, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу іхтіопатології ІРГ НААН; **Діденко Олександр Володимирович**, канд. біол. наук, с.н.с., старший науковий співробітник відділу вивчення біоресурсів водосховищ; **Чернік Віктор Васильович**, зав. лабораторії менеджменту в рибицтві ІРГ НААН

Редакція журналу «Рибогосподарська наука України», вул. Обухівська, 135, м. Київ-164, 03164

тел.: +38 (044) 223-84-34, тел./факс: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Підписано до друку 15.03.2017 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 7,1. Наклад 500 прим.

Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту рибного господарства НААН (Протокол від 15.03.2017 р. № 2)

Дизайн макету: Колесник Н. Л., Шинкар С. В., Безусий О. Л. **Верстка:** Симон М. Ю., Архангельський Є. Ю. **Літературне редагування:** Олексієнко О. О., Швець Т. М. **Коректори:** Люткевич І. С. **Комп'ютерний набір:** Ковальчук Г. В.

Друкарня «Спектр Друк», вул. М. Раскової, 23 А, Київ-002, 02002, тел.: +38 (044) 331-14-38

ОГОЛОШЕННЯ

В Інституті рибного господарства НААН працює **ПЛР-лабораторія, діяльність якої спрямована на діагностику інфекційних захворювань риб**. На сьогодні в арсеналі лабораторії є діагностикими для вірусних, бактеріальних та паразитарних захворювань, які за даними Міжнародного Епізоотичного Бюро (OIE) є найбільш небезпечними для об'єктів сучасної аквакультури. При розробленні діагностичних тест-систем зверталась увага на тенденції розвитку вітчизняного рибництва та інфекційні агенти, які циркулюють в Україні або можуть проникнути у вітчизняні рибогосподарські підприємства із сусідніх країн.

Ми пропонуємо молекулярну діагностику вірусних захворювань корошових, лососевих, осетрових та інших видів риб.

Лососеві: вірус інфекційного панкреатичного некрозу IPNV; вірусна геморагічна септицемія VHSV; вірус інфекційного гемопоетичного некрозу IHNV.

Корошові: вірус весняної віремії SVCV; герпесвірус CyHV, герпесвірус Кої KHV.

Осетрові: герпесвірус AcHV; іридовірус AcIV; аденовірус AcAdV.

Іctalурові: герпесвірус каналного сома CCV.

Для бактеріальних хвороб риб підібрані тест-системи для діагностики фурункульозу форелі (*Aeromonas salmonicida*), геморагічної септицемії (*Aeromonas hydrophila*), хвороби нирок лососевих (BKD) (*Renibacterium salmoninarum*), ентиричної хвороби «червоного рота» (*Yersinia ruckeri*), флавобактеріозу (*Flavobacterium columnare* і *Flavobacterium psychrophila* (BCWD) та септицемії сома (*Edwardsiella ictaluri*).

Присутні також тест-системи ідентифікації ендopаразитів *Tetracapsuloides bryosalmonae* (проліферативна хвороба нирок) та *Myxobolus cerebralis*, що інфікують райдужну форель.

Для отримання додаткової інформації можна звертатися за адресою:

Інститут рибного господарства НААН, вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164. Лабораторія біотехнологій у рибництві.

Завідувач лабораторії: к.б.н., с.н.с. Рудь Юрій Петрович

Тел. (097) 953-80-80 або e-mail: rud@if.org.ua.

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

1/2017(39)

Заснований у 2007 р.
Виходить 4 рази на рік

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 1-132
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01>

З М І С Т

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 6-28
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.006>

- Ю. Озиранський, Н. Л. Колесник, С. Д. Щербак, Р. В. Кононенко,
М. О. Федоренко, В. А. Мосницький, С. А. Некрасов*
Сучасний стан рибогосподарської галузі Ізраїлю (огляд) 6

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 29-39
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.029>

- О. М. Маренков, О. В. Федоненко, Є. В. Філіпова*
Біологічне обґрунтування лімітів вилову риби
у Запорізькому (Дніпровському) водосховищі на 2017 рік 29

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 40-51
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.040>

- І. І. Грициняк, В. В. Гурбик, А. М. Базаєва, Н. П. Чужма*
Рибницько-біологічна оцінка цьоголіток галицького коропа
в умовах промислового вирощування у ставах Прикарпаття 40

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 52-63
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.052>

- Є. М. Алхімов, В. Ю. Шевченко*
Сучасний стан вирощування ремонтних цьоголіток осетроподібних риб
(*Acipenseriformes*) в умовах півдня України 52

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 64-72
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.064>

- Л. Л. Галоян, А. І. Мрук, А. І. Кучерук, Л. А. Тертерян*
Продуктивна характеристика 3-річних плідників струмкової форелі (*Salmo trutta*), вирощених в умовах індустральної аквакультури 64

© Інститут рибного господарства НААН України, 2017

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 73-83
 DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.073>

- М. З. Кориляк, І. І. Грициняк, О. В. Дерень, О. П. Добрянська*
 Перебіг окисних процесів в гепатопанкреасі
 дволіток коропа за введення до складу кормів
 насіння розторопші плямистої (*Silybum marianum*) 73

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 84-91
 DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.084>

- Ю. М. Воліченко, С. І. Пентиліук, І. М. Шерман*
 Сезонні зміни морфологічного стану корошових риб,
 вирощених за пасовищної технології в умовах півдня України 84

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 92-117
 DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.092>

- М. Ю. Симон*
 Основні гематологічні показники
 осетрових видів риб (*Acipenseridae*) (огляд)..... 92

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 118-127
 DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.118>

- І. Й. Грициняк, Т. М. Швець*
 Чорний амур (*Mylopharyngodon piceus* Richardson).
 Тематична бібліографія 118

ЮВІЛЕЇ

- Вітаємо ювілярів. Дворецькому Анатолію Івановичу — 80. 128

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 6-28

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.006>Ю. Озиранский, Н. Л. Колесник, С. Д. Щербак, Р. В. Кононенко, М. О. Федоренко,
В. А. Мосницкий, С. А. Некрасов

Современное состояние рыбохозяйственной отрасли Израиля (обзор) 6

БИОРЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ ВОДОЕМОВ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 29-39

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.029>

О. Н. Маренков, Е. В. Федоненко, Е. В. Филиппова

Биологическое обоснование лимитов вылова рыбы
в Запорожском (Днепровском) водохранилище на 2017 год 29

ТЕХНОЛОГИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 40-51

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.040>

И. И. Грициняк, В. В. Гурбик, А. Н. Базаева, Н. П. Чужма

Рыбоводно-биологическая оценка сеголеток галицийского карпа в условиях
промышленного выращивания в прудах Прикарпатья 40

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 53-63

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.052>

Е. Н. Алхимов, В. Ю. Шевченко

Современное состояние выращивания ремонтных сеголетков осетрообразных рыб
(*Acipenseriformes*) в условиях хозяйства юга Украины 52

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 64-72

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.064>

Л. Л. Галоян, А. И. Мрук, А. И. Кучерук, Л. А. Тертерян

Продуктивная характеристика 3-годовых производителей ручьевой форели (*Salmo
trutta*), выращенных в условиях индустриальной аквакультуры 64

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 73-83

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.073>

М. З. Корняк, И. И. Грициняк, О. В. Дерень, О. П. Добрянская

Окислительные процессы в гепатопанкреасе двухлеток карпа при введении в состав
кормов семян расторопши пятнистой (*Silybum marianum*) 73

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 84-91

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.084>

Ю. Н. Воличенко, С. И. Пентелюк, И. М. Шерман

Сезонные и возрастные изменения морфофизиологического состояния карповых рыб
при пастбищной технологии выращивания в условиях юга Украины 84

СТРАНИЦА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 92-117

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.092>

М. Ю. Симон

Основные гематологические показатели осетровых видов рыб (*Acipenseridae*) (обзор)... 92

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 118-127

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.118>

И. И. Грициняк, Т. М. Швец

Черный амур (*Mylopharyngodon piceus* Richardson). Тематическая библиография 118

ЮБИЛЕИ

Поздравляем юбиляров. Дворецкому Анатолию Ивановичу — 80..... 128

C O N T E N T S

ACTUAL PROBLEMS AND PROSPECTS

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(39): 6-28

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.006>Yu. Oziransky, N. Kolesnyk, S. Shcherbak, R. Kononenko, M. Fedorenko,
V. Mosnitsky, S. Nekrasov

Modern state of fishery sectors of Israel (review) 6

BIORESOURCES AND ECOLOGY OF WATER BODIES

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(39): 29-39

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.029>

O. Marenkov, O. Fedonenko, E. Filippova

Biological justification for fish harvest limits in the Zaporizhzhya (Dnipro) reservoir
for 2017 29

TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(39): 40-51

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.040>

I. Hrytsyniak, V. Hurbyk, A. Bazaieva, N. Chuzhma

Technical and biological evaluation of Galician carp young-of-the-year in the conditions of
industrial rearing in the ponds of Subcarpathia 40

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 52-63

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.052>

Ye. M. Alkhimov, V. Yu. Shevchenko

Current state of the rearing of replacement young-of-the-year *Acipenseriformes*
in the conditions of the southern Ukraine 52

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(39): 64-72

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.064>

L. Haloyan, A. Mruk, A. Kucheruk, L. Terteryan

Productive characteristics of age-3 brood brown trout (*Salmo trutta*) reared in the conditions
industrial aquaculture 64

FEEDS AND FEEDING

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(39): 73-83

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.073>

M. Korylyak, I. Hrytsyniak, O. Deren, O. Dobrianska

The course of oxidative processes in the hepatopancreas of age-2 carp after supplementing
the feeds with thistle (*Silybum marianum*) seeds 73

PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(39): 84-91

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.084>

Y. Volichenko, S. Penteluk, I. Sherman

Age and seasonal changes of morpho-physiological state of cyprinids reared by ranching
technology in conditions of the southern Ukraine 84

YOUNG SCIENTIST PAGE

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 92-117

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.092>

M. Simon

Main hematological parameters of sturgeon species (*Acipenseridae*) (review) 92

CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 118-127

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.118>

I. Hrytsyniak, T. Shvets

Black carp (*Mylopharyngodon piceus*, Richardson). Thematic bibliography 118

ANNIVERSARY

Congratulations to the jubilees. Anatoliy Ivanovych Dvoret's'kyi — 80 128

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 6-28
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.006>
УДК: 639.3/.6(569.4)

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ ИЗРАИЛЯ (ОБЗОР)

Ю. Озиранский, yuri@matc.org.il, Агентство по развитию международного сотрудничества при Министерстве Иностранных Дел Государства Израиль (MASHAV), Международный тренинговый центр по сельскому хозяйству, кибуц Шфаим
Н. Л. Колесник, kolesnik@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев
С. Д. Щербак, schek@email.ua, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев
Р. В. Кононенко, ruslan_kononenko@ukr.net, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев
М. О. Федоренко, fedorenkono@ukr.net, Бюджетное предприятие «Методическо-технологический центр по аквакультуре», г. Киев
В. А. Мосницкий, valik_m@meta.ua, ООО «АКВА-АРТИС», г. Ровно
С. А. Некрасов, oleksandrowske@gmail.com, рыбная ферма «Олександровское», Херсонская область

Цель. Государство Израиль является одним из мировых лидеров по разработке современных технологий, в частности в рыбоводной отрасли. Так, 30 рыбоводных хозяйств ежегодно обеспечивают производство свыше 18000 т рыбы, при средней продуктивности более 8 т/га. Рыбоводное оборудование, произведенное в Израиле, поставляется в страны Азии, Африки, Европы, Южной и Северной Америки, Австралии. Специалисты и фирмы из этой страны проектируют, строят и осуществляют инженерно-технологическое сопровождение рыбоводных предприятий в странах ЕС, КНР, Нигерии, Грузии, РФ, Республике Беларусь и др. В то же время, публикации в Украине о состоянии аквакультуры Израиля несут преимущественно статистическую информацию или посвящены отдельным ихтиопатологическим проблемам, генетическим исследованиям и т. д., не позволяя составить целостную картину состояния отрасли в стране. Таким образом, обобщение и анализ существующей информации является актуальным вопросом. Данная статья расширит осведомленность специалистов о специфике рыбохозяйственной отрасли в Израиле, морского и пресноводного рыболовства в этой стране, технологиях ведения аквакультуры, функционировании службы инструктажа.

Результаты. Работа, написанная организатором и участниками учебного курса «Интенсивное прудовое рыбоводство», который состоялся в Израиле в декабре 2016 г. является комплексным обзором современной аквакультуры Израиля. В частности, дается описание особенностей пресноводного и морского рыболовства и рыболовства, применяемых в них технологий и системы государственного управления рыбохозяйственной отраслью.

Практическая значимость. Представленный обзор может быть использован для модернизации управленческих подходов в рыбохозяйственной отрасли Украины, в образовательной и научной деятельности, а также для развития международного сотрудничества.

© Ю. Озиранский, Н. Л. Колесник, С. Д. Щербак, Р. В. Кононенко,
М. О. Федоренко, В. А. Мосницкий, С. А. Некрасов, 2017

Ключевые слова: Израиль, рыбохозяйственная отрасль, аквакультура, марикультура, установки замкнутого водоснабжения (УЗВ), интегрированные системы рыбоводства, рыбоводство, озеро Кинерет, осетроводство Израиля, инструкторская служба.

Благодарность:

Авторы статьи благодарны Агентству по развитию международного сотрудничества при Министерстве Иностранных Дел Государства Израиль (MASHAV) за возможность принять участие в учебном курсе «Интенсивное прудовое рыбоводство». Известные исследователи и сотрудники научных подразделений Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий: Татьяна Зак, Маргарита Смирнова, Шинан Харпаз, Илья Островский, Владимир Драбкин, Цви Сновски, Гай Рубинштейн обеспечили исчерпывающую базу лекций и научную литературу, без которых написание данной статьи было бы не возможным. Многоуважаемый Ицхак Симон из Ассоциации рыбоводов Израиля продемонстрировал методы работы и действенность общественной организации в отстаивании интересов представителей рыбохозяйственной отрасли. Представители сферы бизнеса Борис Бордман, Игаль Маген, Еран Хадас, Леонид Гольдштейн любезно предоставили возможность посетить их предприятия и получить бесценный практический опыт.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Израиль — это одна из наиболее густонаселенных стран мира, что придаёт крайнюю важность интенсивному типу ведения сельского хозяйства. Развитие последнего обусловлено существенными территориальными и климатическими ограничениями [1].

Так, более 50% территории страны составляют пустыни и полупустыни, значительную часть занимает гористая местность с крутыми каменистыми склонами. Лишь 20% земель пригодны для использования в сельскохозяйственных целях, но половина из них нуждается в орошении. Проблемы, связанные с нехваткой водных ресурсов в южной части страны, решаются не только путем переброски туда воды с севера [2]. Эффективное управление водными ресурсами позволило увеличить объем сельскохозяйственного производства за последние полвека в 12 раз практически без дополнительных поставок воды — благодаря постоянному совершенствованию состояния инфраструктуры, поддержанию уровня водоносных слоев аквиферов, установлению соответствующих квот на воду и юридических и финансовых санкций за её перерасход [3]. Еще одно решение проблемы — широкое (до 90%) использование очищенных сточных вод в сельском хозяйстве, на сегодняшний день более 500 млн м³ [4]. Кроме того, опреснительные установки, расположенные в городах на побережье Средиземного и Красного морей, поставляют ежегодно 585 млн м³ воды (по состоянию на 2015 г.) [5]. Из подземных источников ежегодно добывается 200–400 млн м³ (в зависимости от водности года); при этом используются также геотермальные воды, обнаруженные в районе пустыни Негев [6]. Применяется также метод повышения интенсивности осадков из облаков путем засева последних кристаллическим йодом [7]. В борьбе с опустыниванием используется компьютерный анализ прогнозирования мощности поверхностных стоков,

планирование оптимального размещения объектов сельского хозяйства, изменение направления паводковых стоков путем коррекции рельефа местности и т. д. [8].

Субтропический климат обеспечивает жаркий и сухой летний сезон в течение 7 месяцев, а засухи происходят каждые 2–3 года. В осеннее-зимний период выпадает 200–600 мм осадков. Однако они выпадают крайне неравномерно: если на севере страны их уровень может достигать до 700–1000 мм/год, то на юге, в пустыне, он выражается ничтожной цифрой в 25 мм/год [3, 7]. Чтобы сгладить этот региональный дисбаланс была создана национальная сеть водоснабжения, включающая комбинированное использование поверхностных вод из оз. Кинерет, подземных вод аквиферов и опреснённых морских вод [5]. На сегодняшний день водоснабжение в коммунально-бытовом и промышленном секторах Израиля фактически не зависит от дождевых осадков [2].

В то же время, Израиль на сегодняшний день занимает одно из лидирующих мест по разработке и внедрению инновационных технологий для сельского хозяйства, которые находят своё применение во многих странах мира и позволяют добиваться рекордных результатов за кратчайшие сроки [8, 9]. Так, ежегодный экспорт продукции сельскохозяйственного сектора составляет 1,3 млрд долларов США. В то же время, помимо собственно продуктов земледелия, отдельной статьёй экспорта являются средства сельскохозяйственного производства и соответствующие технологии, ежегодно на сумму около 1,2 млрд долларов США [6].

Рыбная отрасль Израиля в ее современном виде начала формироваться в начале XX века, но присущие ей сейчас черты приобрела за последние три десятилетия, продолжая динамично развиваться. Основные направления деятельности отрасли: аквакультура; лов и переработка рыбы; поддержка рыбных запасов оз. Кинерет на оптимальном для экосистемы и достаточном для рыболовства уровне; научно-исследовательское, консультативное и ветеринарное обеспечение [1]. Основные направления деятельности рыбохозяйственной отрасли Израиля представлены на рис. 1.

Рис. 1. Основные направления деятельности рыбохозяйственной отрасли Израиля, %

Дефицит водных ресурсов стимулировал развитие рыбного хозяйства Израиля в наиболее интенсивных его формах [8]. Так, в израильском рыбном хозяйстве широко применяется соленая и морская вода, а передовые технологии делают возможным максимальное использование каждого м³ воды. Рыбоводная отрасль Израиля расходует в год около 100 млн м³ воды, в том числе 75% сточных вод [3, 4].

Сокращение, а в некоторые периоды и полный отказ от субсидирования сельского хозяйства с середины 1990-х годов, а также ограниченный доступ аграриев к кредитным ресурсам, привели к быстрой смене структуры отрасли под влиянием рыночной конъюнктуры [10]. На замену подхода создания специализированных рыбных хозяйств пришла концепция Integrated Aquaculture and Irrigation (Интегрированной аквакультуры и ирригации — ИАИ) — сочетание ведения интенсивной аквакультуры и ирригационных систем [8]. Внедрение этого подхода позволило более эффективно использовать лимитированные водные ресурсы одновременно для полива сельскохозяйственных культур и выращивания рыбы [6].

В наши дни Израиль — это один из мировых лидеров в области аквакультуры, разработки технологий культивирования гидробионтов и производства сопутствующего оборудования [8]. Израильские компании проектируют, строят и осуществляют инженерное сопровождение рыбоводных предприятий в Республике Беларусь, Федеративной Республике Германии, Французской Республике, Республике Казахстан, странах Латинской Америки и развивающихся африканских странах [9].

В украино- и русскоязычных источниках почти отсутствует информация об особенностях рыбохозяйственного комплекса Израиля, что затрудняет доступ отечественных специалистов к современным методологическим наработкам и технологиям ведения аквакультуры израильских специалистов.

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕРЕШЕННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы — обобщить информацию относительно современного состояния рыбохозяйственной отрасли Израиля, применяемых в ней технологий, а также основных направлений прикладных ихтиологических исследований, полученную как «из первых рук» от руководителей и сотрудников научно-исследовательских станций, экспертов консультационной службы, Ассоциации рыбоводов Израиля во время прохождения учебного курса «Intensive pond fish farming» (Интенсивное прудовое рыбоводство) 04–22 декабря 2016 года, так и из открытых источников. Такой обзор будет полезен как рыбоводам-практикам, так и представителям государственных органов управления отраслью, отечественным разработчикам и производителям оборудования для аквакультуры, ученым.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В водоёмах нашей планеты обитает примерно 30 тысяч видов рыб, из которых в Израиле — 586 видов (около 2% мировой ихтиофауны). В частности, 315 из 1151 видов, обитающих в Красном море, распространены у его побережья

[11]. Для Средиземного моря этот показатель — 291 вид из 593 видов рыб. В малочисленных пресных водоёмах Израиля обитают 57 видов рыб, из которых 18 интродуцированы [12]. Количественное сравнение ихтиофауны Израиля с ихтиофауной других стран представлено ниже (табл. 1) [13].

Таблица 1. Ихтиофауна стран мира

Страна	Морских рыб	Пресноводных рыб	Всего
Беларусь	0	39	39
Молдова	0	59	59
Казахстан	7	94	101
Грузия	24	76	100
УКРАИНА	46	116	162
Иордания	207	30	237
Ливан	307	24	331
Великобритания	366	98	464
ИЗРАИЛЬ	537	59	596
Канада	652	211	863
Египет	742	108	850
РФ	573	389	962
США (без Аляски и Гавайских островов)	2137	946	3083
Австралия	4051	338	4389

Стоит отметить, что израильтяне разделяют рыбу на кошерную и некошерную. В Торе указано, что «из всего, что в воде, есть можете всех, у кого есть плавники и чешуя» (Ваикра 11, 9). При этом комментаторы уточняют, что мелкая, невидимая невооруженным глазом чешуя не позволяет отнести рыбу к кошерной (например, не кошерными являются угри и сомы). Также не считается кошерной рыба, чешуя которой вросла в кожу и не может быть счищена без повреждения кожного покрова (осетровые рыбы и их икра) [11].

Тем не менее, потребительскую корзину граждан Израиля невозможно представить без рыбы [11]. Согласно статистике, израильтяне употребляют около 75 тысяч тонн рыбы в год, из которых примерно 60% приходится на импорт, а 40% — местного производства [4]. Их обеспечивает как промысел в Средиземном море или озере Кинерет, так и рыбоводство в интенсивных прудах¹, садках или УЗВ [14]. Объёмы продукции рыбохозяйственной отрасли представлены ниже (рис. 2).

¹ Интенсивные пруды — термин, применяемый в Израиле для прудов, специально построенных для использования в рыбоводстве по интенсивным технологиям.

Рис. 2. Продукция рыбохозяйственной отрасли Израиля

Интенсификация рыбоводства позволяет получать до 500 кг рыбы с 1 м³ воды в год [15]. Объёмы продукции рыбоводства Израиля представлены в табл. 2 и на рис. 3.

Таблица 2. Продукция рыбоводства Израиля, т/год [12]

Вид рыбы	Числовое выражение
Карп	6500
Тилапии	8500
Кефали	1700
Толстолобик	800
Форель	500
Гибридный лаврак (<i>Morone chrysops</i> x <i>Morone saxatilis</i>)	400
Морской лещ	3300
Другие виды	600
Итого:	22300

Рис. 3. Продукция рыбоводства Израиля

Высокий уровень конкуренции за воду между рыбным хозяйством, динамично растущей промышленностью и другими, более прибыльными отраслями сельского хозяйства, обусловил уменьшение площадей прудов с 2950 га в 2010 г. до 2200 га в 2015 г. (табл. 4).

Таблица 4. Производство и продукция пресноводной аквакультуры Израиля в 2010–2015 гг.

Год	Площадь прудов, га	Количество ферм	Вылов, т	Вылов, кг/га	Вылов в денежном измерении, US\$	Средняя стоимость, \$/т
2010	2950	42	19200	6508	57 000 000	2968
2011	2750	39	17500	6363	55 500 000	3171
2012	2550	36	17000	6668	59 000 000	3470
2015	2200	30	18000	8181	64 000 000	3555

За последние пять лет почти на треть сократилась численность рыбных хозяйств, но средняя площадь прудов в одном хозяйстве — выросла. Динамика производства продукции пресноводной аквакультуры за последние 10 лет представлена на рис. 4.

Рис. 4. Производство и продукция основных объектов пресноводной аквакультуры Израиля в 2006–2015 гг.

Можно выделить следующие особенности аквакультуры Израиля: использование оборотных вод, использование слабосоленых и геотермальных вод, внедрение ИАИ-систем, широкое распространение компьютеризированных установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) [6].

С середины 90-х годов прошлого века в проектирование, строительство и систему управления рыбными хозяйствами внедрена концепция ИАИ. Ирригационная система Израиля состоит из источника водоснабжения, распределительной системы и орошаемых площадей [8]. ИАИ достигается благодаря размещению рыбоводных объектов неподалеку от источников (накопителей) воды, или между источником водоснабжения и орошаемыми площадями. В последнем случае вода используется дважды — первый раз для выращивания рыбы, а второй — для орошения [4]. В такой системе могут использоваться любые источники воды: артезианские скважины, поверхностные

(реки, ручьи) или накопители воды (водохранилища, пруды и резервуары) [15]. Использование воды в ИАИ обуславливается максимальной эффективностью, которая может быть достигнута от общего получения продукции рыбоводства и растениеводства. Если предпочтение отдается растениеводству, то вся рыбохозяйственная деятельность подчинена схеме полива [7]. При альтернативном сценарии именно потребности рыбоводства определяют, сколько воды и в какой период будут доступны для ирригации. Схемы управления, и, соответственно, пропорции использования воды могут варьировать из года в год, в соответствии со спросом рынка на продукцию растениеводства или рыбы, количества осадков в зимний период, себестоимости выращивания той или иной продукции. Хорошо спроектированная ИАИ-система позволяет фермеру корректировать планы производства ежесезонно, что увеличивает его конкурентоспособность [2].

ИАИ-систему можно разделить на три модификации, в соответствии с источниками водоснабжения [8].

1) Водохранилища. Образованные путем строительства дамбы на природных водотоках для нужд ирригации, могут быть как частные, так и общественные;

2) Колодцы или непересыхающие источники. Вода подается насосами через сеть водораспределительных каналов на орошаемые площади в соответствии с заранее разработанным графиком. Рыбоводные пруды строят между насосными станциями и полем. В таком случае объемы воды, используемые для орошения, остаются неизменными, а стоимость системы распределяется между рыбоводными и растениеводческими хозяйствами или другими направлениями сельскохозяйственной деятельности. При проектировании системы необходимо учитывать стоимость и доступность дополнительных объемов воды для первичного заполнения прудов и расходов на испарение [15].

3) Сезонные временные источники воды. В районах, где отсутствуют постоянные водоёмы, доступный объем воды является фактором, определяющим продолжительность вегетационного сезона и площадь земельных угодий, которые могут использоваться для растениеводства. Для того, чтобы увеличить орошаемые площади и продолжительность сезона сельскохозяйственного производства, необходимо строительство резервуаров, в которых вода накапливается в течение сезона дождей [3]. Выращивание рыбы происходит непосредственно в таких резервуарах и/или в интенсивных прудах, в которых вода циркулирует между прудом и резервуаром. Резервуар становится источником воды двойного назначения — одновременно для ирригации и выращивания рыбы [4]. Эта модель чаще всего используется в Израиле в комбинации с системой капельного орошения и требует дополнительной очистки воды, подаваемой в трубопроводы. В этой стране построено более 300 резервуаров общим объемом 130 млн м³. Они принадлежат водным кооперативам, частным фермерам или кибуцам — коллективным хозяйствам [15]. Резервуары отличаются площадью (от 3 до 15 га), глубиной (от 3 до 12 м), системой аккумуляции воды и водовыпуска. Рыба в них выращивается не только для коммерческого использования, но и для биомелиорации (предотвращения обростания высшей водной растительностью, уменьшения интенсивности развития фитопланктона, снижения численности популяций моллюсков) [16].

Выделяют следующие преимущества ИАИ-системы над ирригационными проектами, которые обеспечивают только растениеводство:

- 1) Увеличение общей продуктивности системы без сокращения объёмов растениеводства;
- 2) Диверсификация общей продуктивности системы без сокращения объёмов растениеводства;
- 3) Выращивание продуктов на экспорт;
- 4) Импортозамещение (большая часть рыбной продукции Израиля импортируется);
- 5) Уменьшение общих затрат на производство;
- 6) Сокращение сроков окупаемости инвестиций в проектах водонакопления и водораспределения [2].

В наши дни аквакультура, интегрированная в системы сезонного водонакопления и связанная с управлением ирригационными системами, является основой интенсивного растениеводства, садоводства и виноградарства [15].

Другим передовым способом ведения аквакультуры является использование УЗВ, которые позволяют максимально экономить воду и заниматься рыбоводством даже в пустыне, используя минерализованную воду [4]. В связи с высокой эффективностью работы УЗВ, правительство страны всячески поддерживает их строительство [4]. УЗВ предполагает уменьшение запасов воды только вследствие испарения. Один из наиболее распространённых типов УЗВ в Израиле — это несколько бассейнов с рыбой и биологический пруд, который очищает воду за счет культивации в нем микроводорослей, которые в процессе роста очищают воду и насыщают ее кислородом [16]. Вода из биологического пруда подается в бассейны с рыбой, после этого она попадает в барабанный фильтр на механическую очистку, а затем обратно в биологический пруд. Глубина бассейнов — около 1 м, а плотность посадки рыбы — 15–20 кг/м³. Рыба в такой системе размножается естественным путем, быстро набирает массу [8]. Одной из самых основных заслуг израильских разработчиков в области УЗВ является полная автоматизация процесса: компьютеры, контролирующие химический состав воды при необходимости обеспечивающие систему подпиткой свежей водой, специализированные аэраторы, насыщающие воду кислородом и способствующие удалению избытка растворенного в воде CO₂, датчики, постоянно контролирующие, анализирующие состояние рыбы в бассейнах и т.д. Основными преимуществами использования УЗВ в рыбоводстве являются:

- 1) Культивирование различных видов рыбы вне зависимости от природных условий;
- 2) Полная управляемость режимами культивирования рыбы: температурным, гидрохимическим, кормовым и т.д.;
- 3) Ускоренные темпы роста;
- 4) Повышение эффективности выращивания;
- 5) Экономный расход воды;
- 6) Рациональное использование водных, земельных и человеческих ресурсов;
- 7) Упрощение утилизации продуктов жизнедеятельности рыб;
- 8) Улучшение ихтиопатологической ситуации;
- 9) Высокая экологичность производства [2].

Осетроводство. Хотя осетровые виды рыб не являются кошерными, тем не

менее компании Израиля экспортируют пищевую черную икру в страны Европы и США. Коммерческое осетроводство базировалось на передовых технологиях и закупках оплодотворенной икры из Астрахани и других городов, расположенных на побережье Каспийского моря. До недавнего времени Израиль был единственным государством, которое экспортировало осетровую икру, не имея при этом прямого выхода к Каспийскому морю. Более того, за последние 10 лет объёмы экспорта выросли на 1000% (в сравнении с первоначальными показателями). Так, в кибуце Дан в 2012 г. объём производимой деликатесной чёрной икры на экспорт составлял около 3-х тонн, по оптовой цене 2800 дол. за 1 кг, а на рынке розничная цена достигает 10 тыс. дол. США. Таким образом, валовой доход от реализации дефицитного продукта составлял около 8 млн долларов США в год. Такие показатели достигаются благодаря использованию компьютеризированных УЗВ [9].

Форелеводство и лососеводство в Израиле также ориентировано на использование УЗВ. Наибольшее количество ферм, специализирующихся на культивировании этих видов рыб, сосредоточено в бассейне реки Дан — притоке Иордана [6]. Ниже представлена карта крупнейших рыбоводных хозяйств Израиля (рис. 5).

Рис. 5. Карта крупнейших рыбоводных ферм Израиля

Марикультура Израиля, в первую очередь, представлена рыбоводством в садках и сконцентрирована около города Ашдода, на берегу Средиземного моря и города Эйлата, на берегу Красного моря. Его основной задачей является обеспечение максимальной экологической безопасности при помощи компьютеризации всех процессов [8]. Основными объектами культивирования в морских садках являются: золотистоголовый лещ или дорада (*Sparus auratus* Linnaeus, 1758) и морские лещи (*Bramidae*). Морское разведение рыбы в садках обеспечивает более 3000 тонн в год. Например, в 2005 г. рыбоводы Израиля вырастили 3185 тонн товарной дорады и получили более 9 миллионов экз. его молоди, значительная часть которой была продана для выращивания за границей.

Рыбный промысел в Средиземном и Красном морях. По данным известного израильского ихтиолога, доктора биологических наук Александра Черницкого, ежегодный вылов рыбы в Средиземном море составляет около 2756 тонн, а в Красном — 75,2 тонн [17]. Основные кошерные объекты промысла приведены ниже (табл. 5).

Таблица 5. Основные кошерные объекты рыболовного промысла Израиля в Средиземном и Красном морях [12]

Вид рыбы	Улов, т
Морские лещи или спаровые (<i>Sparidae</i>)	383,3
Ставриды или сериолы (<i>Carangidae</i>)	347,9
Султанки или барабульки (<i>Mullidae</i>)	257,0
Сельдевые или сардины (<i>Clupeidae</i>)	168,3
Барракуды или малиты (<i>Sphyrnaeidae</i>)	161,8
Каменные окуни или груперы (<i>Serranidae</i>)	161,4
Ящероголовы или сауриды (<i>Synodontidae</i>)	119,0
Скумбриевые или Тунцы (<i>Scombridae</i>)	88,8
Кефали (<i>Mugilidae</i>)	75,0

Основные рыбопромысловые порты Средиземного моря — это города Акко — примерно 87 судов, Хайфа — около 102 судов, Яффо - Тель Авив — 105. Единственный рыбопромысловый флот Израиля на Красном море расположен в городе Эйлате [17]. Основной состав рыболовецкого флота Израиля представлен ниже (табл. 6).

Таблица 6. Примерный состав рыболовецкого флота Израиля [12]

Размер судна	Количество	
	Средиземное море	Красное море
До 7 м	423	10
7–11 м	123	2
Свыше 11 м	33	0

Рыбный промысел и восстановление рыбных запасов в озере Кинерет. Археологические находки подтверждают, что пресноводное рыболовство на территории современного Израиля было хорошо развито более 2500 лет назад. [18]. И в наше время, хотя вылов рыбы в естественных континентальных водоемах Израиля составляет примерно 4% общей продукции отрасли рыбоводства, этот вид деятельности не теряет важного социального значения [7].

Единственный естественный пресноводный водоём Израиля — оз. Кинерет — расположено на северо-востоке страны. С древних времен сохранились и другие его названия — Генисаретское озеро, Галилейское море или Тивериадское озеро (рис. 6) [19]. В Новом завете упоминается, что именно в нём ловили рыбу Петр и Андрей, ставшие затем Апостолами (Мат. 4,18) и проповедовал Иисус, который провёл там большую часть своей жизни [20].

Рис. 6. География озера Кинерет

В наши дни это самое низкое пресноводное озеро на Земле — его зеркало расположено, в среднем, на отметке -211 м ниже уровня моря. Из-за непостоянства уровня воды, меняются и остальные параметры этого географического объекта [3, 19]. Так, колебания площади зарегистрированы в пределах 6%, а глубины — 20%. Ниже приведены основные лимнологические данные озера (табл. 7).

Таблица 7. Морфометрическая характеристика озера Кинерет (при уровне воды -209 м) [3, 12]

Параметр	Числовое выражение
Площадь, км ²	170
Длина, км	21
Ширина, км	13
Объём, км ³	4
Максимальная глубина, м	45
Средняя глубина, м	25,6
Протяжённость береговой линии, км	53
Площадь водосбора, км ²	2730
Объем воды, приносимой впадающими реками, км ³	0,8
Объем изливаемой из озера воды, км ³	0,547

Максимальный объем воды достигает более 4 км³. Подпитка озера осуществляется за счет 15 рек, стекающих с Голанских высот, самая крупная из

которых — Иордан — продолжает свое течение, вытекая из него на юге; сезонных осадков и геотермальных источников [3, 21]. Если зима дождливая и озеро заполняется водой полностью, то при помощи системы шлюзов излишки воды сливают в Мертвое море [18].

Однако, дожди в Израиле идут не часто, а озеро Кинерет является важным источником пресной воды, поэтому за уровнем воды в нём тщательно следят. Так, до середины 80-х гг. XX века уровень воды –212 м считался «красной чертой» — той минимальной отметкой, при которой качество воды оставалось стабильным, а количество позволяло отвечать нуждам общества [3, 18]. В середине 80-х гг. прошлого века она была опущена на 1 м, хотя это и вызывало возражения некоторых специалистов. Когда уровень воды опускается ниже «красной черты», забор воды из озера прекращается, а экология Израиля претерпевает кризис [19]. Кроме «красной», существует ещё так называемая «черная черта» — если вода опустится ниже неё, забор воды станет физически невозможным, поскольку водозаборные трубы окажутся в воздухе, т. е. над водой.

Система водозаборных труб для нужд страны была построена в 1964 г., достигая 130 км — с тех пор она постоянно усовершенствуется и удлиняется. Сложная инженерная система всеизраильского водопровода переносит воды озера Кинерет в густонаселенную центральную часть страны и на её засушливый и пустынный юг [3]. Питьевая вода проходит дополнительную очистку: по открытому каналу она попадает на очистительную станцию и уже оттуда перераспределяется по всей стране [19].

Другим показателем важного статуса этого озера является наличие сложной системы каналов, которые призваны отводить солёную воду термальных источников из него в нижнее течение реки Иордан. Последние располагаются по берегам озера, несут воды, богатые серой и различными солями, с температурой 40–60°C. Хотя они активно используются в лечебно-профилактических целях, их воды могут поколебать гидрохимический состав озера, что и обуславливает необходимость отвода [19].

Большая часть промыслового рыболовства Израиля сосредоточено в озере Кинерет. Ихтиофауна озера насчитывает 27 видов, из которых 19, принадлежащих к 6 семействам, являются аборигенными [22].

Эндемичными для этого озера являются 3 вида — *Tristamella sacra*, *Tristamella simonis*, *Mirogrex terraesanctae*, или кинеретская верховодка, еще 4 вида — эндемики долины р. Иордан — *Astatitilapia flavijisephi*, *Barbus longiceps*, или длинноголовый усач, *Carasobarbus canis*, или крупночешуйчатый усач, *Acanthobrama lissneri*, или иорданский лещ [13, 17].

Из 8 видов-вселенцев 4 нерестятся в озере: карп (*Cyprinus carpio*), обыкновенная гамбузия (*Gambusia affinis*), золотая тиляпия (*Oreochromis aureus*) и зелёный меченосец (*Xiphophorus hellerii*) [23].

Еще 3 промыслово ценных вида — кефаль лобан (*Mugil cephalus*), кефаль-головач (*Liza ramada*) и белый толстолобик (*Hypophthalmichthys molitrix*) — в условиях озера не размножаются, их численность поддерживается исключительно путем зарыбления [3, 17].

Речной угорь (*Anguilla anguilla*) попадает в водоемы случайно с зарыбком кефали, который вылавливается в приустьевых участках рек и прилегающей акватории Средиземного моря [23].

Промысловые уловы росли с середины 1970-х гг. благодаря совершенствованию рыболовных орудий и техники и достигая максимума в 1600–2000 т рыбы в год (табл. 8).

Таблица 8. Статистика промысловых уловов рыбы в оз. Кинерет в 1992–2005 гг. [12]

Год	Вылов, т
1992	2217
1993	1813
1994	1478
1995	1214
1996	1845
1997	1475
1998	2163
1999	2144
2000	1851
2001	1851
2002	1569
2003	1064
2004	1137
2005	1396

Следует заметить, что большая часть улова — примерно 1000 т — приходилась на зооплактофага *Acanthobrama terraesanctae*, или кинеретскую сардинку. Перелов, а также вылов крупнейших экземпляров привели к критическим изменениям в размерной структуре её популяции и вызвали коллапс промысла этого вида в 1993 г. В 2000-х гг. численность его популяции удвоилась, средняя индивидуальная масса производителей уменьшилась в 15 раз, но мелкая рыба не пользовалась спросом и вид потерял свою коммерческую ценность. Для предотвращения социального напряжения, которое росло в результате вызванного подобными изменениями популяции кинеретской сардинки кризиса в рыболовных хозяйствах, а также поддержания экологического баланса озера, правительство Израиля в течение десяти лет субсидировало программу контроля популяции «Дилюль». Она предусматривала вылов до 1000 т рыб этого вида, не достигших коммерческого размера [23–25].

Традиционными объектами промысла в озере являются три аборигенных вида рыб, отличающиеся спектрами питания: дамасский усач (*Capoeta damascina*) — детритофаг; длинноголовый усач (*Barbus longiceps*) — бентофаг; крупночешуйчатый усач (*Carasobarbus canis*) — хищник. Промысловый вылов этих видов рыб колеблется от 12 до 80 т в год [22]. Ниже приведены данные о видовом составе промысловых уловов из озера Кинерет (табл. 9).

Таблица 9. Видовой состав промысловых уловов рыб озера Кинерет (состоянием на 2005 г.) [12]

Вид рыб	Улов, т	% от общего вылова пресноводных рыб в Государстве Израиль
Сардинка	557,7	39,9
Кефали	250,9	18,0
Тияпии	343,7	24,6
Карп	88,0	6,3
Барбусы	41,9	3,0
Толстолобик	113,8	8,2

Высокая рыбопродуктивность оз. Кинерет поддерживается благодаря системному управлению рыбными ресурсами, главным инструментом которого является зарыбление (табл. 10) [22, 23].

Таблица 10. Зарыбление мальками промысловых рыб озера Кинерет, тыс. экз.

Год	Тияпии	Кефали	Толстолобик
1993	3000	700	200
1994	2800	849	200
1995	3500	1006	200
1996	3500	735	200
1997	4000	929	200
1998	4000	1015	200
1999	6000	698	200
2000	6024	1030	200
2001	6024	1000	200
2002	6000	488	200
2003	4000	1643	200
2004	3000	488	200
2005	2500	1202	400

Целью зарыбления является не только получение коммерчески ценной рыбы но и удаление биогенных элементов, прежде всего фосфора, из экосистемы озера, контроль цветения и биомелиорация, поддержка традиционного вида занятости [26]. Решение о видовом составе, времени и способах зарыбления принимает Межминистерский комитет, в состав которого входят представители местной рыболовной общественности. Статистика зарыбления молодью промыслово ценных видов рыб озера Кинерет за 40 лет — с 1970 по 2010 гг., приведена на рисунке ниже (рис. 7).

Эффективность зарыбления наглядно демонстрируют уловы таких важных промыслово ценных видов озера Кинерет, как галилейская (*Sarotherodon galilaeus*) и золотая (*Oreochromis aureus*) тияпии (рис. 8).

Рис. 7. Статистика зарыбления озера Кинерет молодью промысловых видов рыб

Научное сопровождение и ветеринарная поддержка. В Израиле прекрасно развито научное сопровождение и ветеринарная поддержка рыболовства и рыбоводства всех форм и типов. Она осуществляется, в первую очередь, в рамках деятельности Министерства сельского хозяйства и аграрного развития [26].

Рис. 8. Статистика эффективности зарыбления озера Кинерет галилейской тиляпией

Министерство сельского хозяйства и развития аграрных регионов Израиля — правительственное учреждение, созданное в 1948 г. как Министерство сельского хозяйства Израиля и переименованное в 1992 г. [14]. Согласно своему предназначению, отвечает за развитие сельского хозяйства в Израиле. Одним из его важнейших подразделений является Департамент рыбного хозяйства [1].

Ниже схематически представлена организационная структура государственного управления рыбохозяйственной отраслью в Израиле (рис. 9).

Рис. 9. Организационная структура системы государственного управления рыбохозяйственной отраслью Израиля

Ведущими научными организациями в рыбохозяйственной отрасли являются Научно-исследовательский центр океанологии и лимнологии, а также Сельскохозяйственный научно-исследовательский центр имени Волкани [14]. Основные направления научных исследований в рыбном хозяйстве Израиля — это: оптимизация питания рыб, в частности, повышение эффективности кормов; генетические исследования; биотехнологии; ресурсосохраняющий менеджмент и методики культивирования; экологическая безопасность; интродукция новых видов [26].

Сельскохозяйственный научно-исследовательский центр имени Волкани при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля — крупнейшая в стране структура, занимающаяся новыми технологиями в области сельского хозяйства. Центр основан в 1921 г. и назван в честь известного израильского агронома, писателя и публициста Авигодора Ицхака Элазари-Волкани. В его составе шесть научно-исследовательских институтов, каждый из которых специализируется в определенной области, начиная с растениеводства и разработки новейших методов защиты растений от вредителей, заканчивая исследованиями почвы, водных ресурсов, сельскохозяйственным машиностроением и сохранностью урожая. Среди основных задач центра — проведение научных исследований в области сельского хозяйства, оказание помощи представителям израильского аграрного сектора. Сельскохозяйственный научно-исследовательский центр имени Волкани также руководит четырьмя исследовательскими станциями Минсельхоза, действующими в разных регионах Израиля. Именно эти станции, работающие в полевых условиях, служат испытательным полигоном новейших израильских агротехнологий. В центре работают 200 учёных — обладателей различных научных степеней, 300 инженеров и техников, свыше 220 студентов и аспирантов.

Сразу после образования государства стране было необходимо обеспечить

продовольственную безопасность своих граждан. Специалисты в области сельского хозяйства, живущие в Израиле и работающие в различных хозяйствах, были первыми инструкторами [16]. Большой опыт практической работы в сочетании с одновременной учебой в первых сельскохозяйственных учебных заведениях дал им возможность соединить практику с теорией и продвигать сельское хозяйство Израиля на более высокий уровень развития [1]. Таким образом была сформирована инструкторская служба. Основные направления её деятельности:

- 1) программы повышения квалификации;
- 2) стандартизация;
- 3) предоставление информационной поддержки по всем направлениям рыбоводства и рыболовства.

Инструкторская служба окончательно была сформирована в начале 60-х гг. XX века, обеспечивая передачу и популяризацию технологий и разработок от научно-исследовательских центров к фермерам [26]. Ниже схематически представлена организационная структура службы инструктора (рис. 10).

Рис. 10. Организационная структура инструкторской службы

Ассоциация рыбоводов Израиля — это общественная организация, находящаяся вне системы государственного управления, но активно сотрудничающая как с департаментом рыбного хозяйства, так и с ведущими научными центрами страны [16]. Её целями являются повышение экономического статуса путём улучшения планирования бизнеса, сохранения реалистичных и справедливых цен, обеспечение высокого качества продуктов и здоровой пищи для потребителей, отстаивание интересов рыбоводов в местных и центральных органах власти [26].

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Развитие среднего и малого бизнеса в рыбохозяйственной отрасли Украины сдерживает ряд факторов (сложности с кредитованием и финансированием, малое распространение технических инноваций), в то же время, в отличие от Израиля, нет острой проблемы дефицита воды или территорий. Исходя из этого, на основании полученного при прохождении курсов опыта, весьма перспективным представляется развитие как на государственном, так и на частном уровнях партнерства с ассоциациями рыбоводов и рыболовов. Используя опыт Израиля, можно оптимизировать мониторинг выращенной рыбы, частичное финансирование научных исследований, решить вопросы, актуальные для небольших фермерских хозяйств. Именно ассоциации призваны отстаивать интересы фермеров и являются наиболее действенным механизмом диалога власти и бизнеса. Также, другим полезным заимствованием из опыта организации рыбного хозяйства Израиля является функционирование инструкторской службы. Она призвана популяризировать инновации, проводить обучение и распространять информацию среди рыбоводов, особенно в небольших фермерских хозяйствах, не имеющих доступа к последним технологическим и научным разработкам. В Украине данная служба может быть создана на базе Института рыбного хозяйства НААН и Методическо-технологического центра по аквакультуре при Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины с привлечением ведущих специалистов из других учреждений и рыбоводов-практиков. По мере увеличения числа субъектов хозяйствования в сфере аквакультуры, рынок консалтинговых услуг может стать привлекательным для предпринимателей, что позволит снизить нагрузку на государственный бюджет. Пример динамичного развития рыбохозяйственной отрасли Израиля убедительно демонстрирует, что практика применения инновационных технологий даёт быстро окупаемые результаты в аквакультуре. Однако, эффективность, темпы и масштабы их использования во многом зависят от поддержки государства на первых этапах.

Таким образом, оптимизация механизмов кредитования, создание прозрачной законодательной базы, организация службы инструктажа, создание и поддержка ассоциаций рыболовов и рыбоводов в Украине обеспечит достижение всех критериев (социального, экономического и экологического) устойчивого и динамичного развития рыбохозяйственной отрасли в нашей стране.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дубсон Б. Социальный статус израильского фермера [Электронный ресурс] / Борис Дубсон. — Режим доступа : http://farmgarden.ru/article_info.php?articles_id=98.
2. Израильские технологии [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.j-group-global.com/ru/israeli-technology>.
3. Озиранский Ю. Интегрированное управление ограниченными водными ресурсами в целях устойчивого водообеспечения аридных регионов (опыт государства Израиль) / Ю. Озиранский, Е. Г. Кольмакова, И. Л. Марголина // Аридные экосистемы. — 2014. — Т. 20, № 4 (61). — С. 57—65.
4. Грайвер С. Грани израильской экономики [Электронный ресурс] / Саймон Грайвер. — Режим доступа : <http://web.archive.org/web/20030811053252/http://posolstvo.narod.ru/lib/agro.html>.

5. Water Authority of Israel (официальный сайт) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://water.gov.il>.
6. Сельское хозяйство Израиля [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://guide-israel.ru/country/7349-selskoe-hozyajstvo-izrailya>.
7. Сельское хозяйство в Израиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа : israelguides.ru.
8. Люкимсон П. Как Израиль весь мир рыбой накормит [Электронный ресурс] / Петр Люкимсон. — Режим доступа : <http://www.isrageo.com/2015/12/28/fish>.
9. Инновационные технологии разведения рыбы [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.mvs.tvercenter.ru/breeding.asp?idRazdel=16&IDArticle=340>.
10. Cohen Dan. Integration of aquaculture and irrigation: Rationale, principles and its practice in Israel / D. Cohen // Advanced irrigation conference, AGRITECH. — Israel, 1996.
11. Черницкий А. Вкусные рыбы Израиля / Черницкий А. — [2-е. изд.] — Герцлия : Исрадон, 2009. — 176 с.
12. Рыбы Израиля в цифрах (и марках) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://rybafish.umclidet.com/ryby-izrailya-v-cifraxi-markax>.
13. FishBase [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.fishbase.org>.
14. Ministry of Agriculture and rural development (официальный сайт) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://moag.gov.il>.
15. Israel NewTech (water renewable energy technologies) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://israelnewtech.gov.il>.
16. Забутый А. Сельское хозяйство Израиля / А. Забутый // Sonderdruck aus Hannoversches Jahrbuch. Band 3. — Hannover, 2012. — S. 25.
17. Рыба-фиш по-эйлатски [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://rybafish.umclidet.com/usachi-kinereta.htm>.
18. Генисаретское озеро - Тивериадское озеро [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://geosfera.org/aziya/izrail/658-ozero-kineret-tiveriadskoe-ozero-galileyskoe-more-genisaretskoe-ozero.html>.
19. Озеро Кинерет – Тивериадское озеро – Галилейское море – Генисаретское озеро [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://miroland.blogspot.com/2012/03/blog-post_1583.html.
20. Апостол Петр [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://days.pravoslavie.ru/Life/life6793.htm>.
21. Wolf A. T. Hydropolitics along the Jordan river / Wolf Aaron T. — United Nations University Press, 1995.
22. Biology and management of Lake Kinneret Fisheries // The Israeli Journal of Aquaculture. — Vol. 44. — P. 48—65.
23. «Kinneret – General» (in Hebrew) // Israel Oceanographic & Limnological Research [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://kinneret.ocean.org.il/dc_lake_general.aspx.
24. Ostrovsky I. Multiannual changes in the pelagic fish *Acanthobrama terraesanctae* in Lake Kinneret (Israel) in relation to food sources / I. Ostrovsky, P. Walline // Verhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie. — 2001. — № 27. — P. 2090—2094.

25. Hambright K. D. The 1993 collapse of the Kinneret bleak fishery / K. D. Hambright, J. Shapiro // *Fisheries Management and Ecology*. — 1997. — № 4. — P. 101—109.
26. Aquaculture in Israel [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://aquacultureinisrael.com/en>.

REFERENCES

1. Dubson, Boris. Sotsial'nyy status izrail'skogo fermera. *farmgarden.ru*. Retrieved from : http://farmgarden.ru/article_info.php?articles_id=98.
2. Izrail'skie tekhnologii. *j-group-global.com*. Retrieved from : <http://www.j-group-global.com/ru/israeli-technology>.
3. Oziranskiy, Yu., Kol'makova, E. G., & Margolina, I. L. (2014). Integrirovannoe upravlenie ogranichennymi vodnymi resursami v tselyakh ustoychivogo vodoobespecheniya aridnykh regionov (opyt gosudarstva Izrail'). *Aridnye ekosistemy*, 20, 4(61), 57-65.
4. Grayver, Saymon. Grani izrail'skoy ekonomiki. *web.archive.org*. Retrieved from : <http://web.archive.org/web/20030811053252/http://posolstvo.narod.ru/lib/agro.html>.
5. Water Authority of Israel. *water.gov.il*. Retrieved from : <http://water.gov.il>.
6. Sel'skoe khozyaystvo Izrailya. *guide-israel.ru*. Retrieved from : <http://guide-israel.ru/country/7349-selskoe-xozyaystvo-izrailya>.
7. Sel'skoe khozyaystvo v Izraile. *israelguids.ru*. Retrieved from : israelguids.ru.
8. Lyukimson, Petr. Kak Izrail' ves' mir ryboy nakormit. *isrageo.com*. Retrieved from : <http://www.isrageo.com/2015/12/28/fish>.
9. Innovatsionnye tekhnologii razvedeniya ryby. *mvs.tvercenter.ru*. Retrived from : <http://www.mvs.tvercenter.ru/breeding.asp?idRazdel=16&IDArticle=340>.
10. Cohen, Dan. (1996). Integration of aquaculture and irrigation: Rationale, principles and its practice in Israel. *Advanced irrigation conference, AGRITECH*. Israel.
11. Chernitskiy, A. (2009). *Vkusnye ryby Izrailya. Izd. 2-e*. Gertsliya : Isradon.
12. Ryby Izrailya v tsifrakh (i markakh). *rybafish.umclidet.com*. Retrieved from : <http://rybafish.umclidet.com/ryby-izrailya-v-cifraxi-markax>.
13. FishBase. *fishbase.org*. Retrieved from : <http://www.fishbase.org>.
14. Ministry of Agriculture and rural development. *moag.gov.il*. Retrieved from : <http://moag.gov.il>.
15. Israel NewTech (water renewable energy technologies). *israelnewtech.gov.il*. Retrieved from : <http://israelnewtech.gov.il>.
16. Zabuty, A. (2012). Sel'skoe khozyaystvo Izrailya. *Sonderdruck aus Hannoversches Jahrbuch. Band 3*, Hannover, 25.
17. Ryba-fish po-eylatski. *rybafish.umclidet.com*. Retrieved from : <http://rybafish.umclidet.com/usachi-kinereta.htm>.
18. Genisaretskoe ozero – Tiveriadskoe ozero. *geosfera.org*. Retrieved from : <http://geosfera.org/aziya/izrail/658-ozero-kineret-tiveriadskoe-ozero-galileyskoe-more-genisaretskoe-ozero.html>.
19. Ozero Kineret – Tiveriadskoe ozero – Galileyskoe more – Genisaretskoe ozero. *miroland.blogspot.com*. Retrieved from : http://miroland.blogspot.com/2012/03/blog-post_1583.html.
20. Apostol Petr. *days.pravoslavie.ru*. Retrieved from : <http://days.pravoslavie.ru/Life/life6793.htm>.

21. Wolf, Aaron T. (1995). *Hydropolitics along the Jordan river*. United Nations University Press.
22. Biology and management of Lake Kinneret Fisheries. *The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh*, 44, 48-65.
23. «Kinneret – General» (in Hebrew). Israel Oceanographic & Limnological Research. kinneret.ocean.org.il. Retrieved from : http://kinneret.ocean.org.il/dc_lake_general.aspx.
24. Ostrovsky, I., & Walline, P. (2001) Multiannual changes in the pelagic fish *Acanthobrama terraesanctae* in Lake Kinneret (Israel) in relation to food sources. *Verhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie*, 27, 2090-2094.
25. Hambright, K. D., & Shapiro, J. (1997). The 1993 collapse of the Kinneret bleak fishery. *Fisheries Management and Ecology*, 4, 101-109.
26. Aquaculture in Israel. aquacultureinisrael.com. Retrived from : <https://aquacultureinisrael.com/en>.

СУЧАСНИЙ СТАН РИБОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ІЗРАЇЛЮ (ОГЛЯД)

Ю. Озиранський, yuri@matc.org.il, Агентство з розвитку міжнародного співробітництва при Міністерстві Закордонних Справ Держави Ізраїль (MASHAV), Міжнародний тренінговий центр з сільського господарства, кібуц Шфаїм
Н. Л. Колесник, kolesnik@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
С. Д. Щербак, schek@email.ua, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Р. В. Кононенко, ruslan_kononenko@ukr.net, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ
М. О. Федоренко, fedorenkono@ukr.net, Бюджетна установа «Методично-технологічний центр з аквакультури», м. Київ
В. О. Мосницький, valik_m@meta.ua, ТОВ «АКВА-АРТИС», м. Рівне
С. О. Некрасов, oleksandrovske@gmail.com, рибницька ферма «Олександрівська», Херсонська область

Мета. Держава Ізраїль є одним зі світових лідерів з розробки сучасних технологій, зокрема в рибогосподарській галузі. Так, 30 рибницьких господарств щорічно забезпечують виробництво понад 18000 т риби, при середній продуктивності понад 8 т/га. Рибницьке обладнання з цієї держави постачається до країн Азії, Африки, Європи, Південної та Північної Америки, Австралії. Фахівці та фірми з цієї країни проектують, будують і здійснюють інженерно-технологічний супровід рибницьких підприємств в країнах ЄС, КНР, Нігерії, Грузії, РФ, Республіці Білорусь та ін. У той же час, публікації в Україні про стан аквакультури Ізраїлю несуть переважно статистичну інформацію або присвячені окремим іхтіопатологічним проблемам, генетичним дослідженням тощо, не дозволяють скласти цілісну картину стану галузі в країні. Таким чином, узагальнення та аналіз існуючої інформації є актуальним питанням. Дана стаття розширить обізнаність фахівців про специфіку рибогосподарської галузі в Ізраїлі, морського та прісноводного рибальства в цій країні, технологій ведення аквакультури, функціонування служби інструктажу.

Результати. Робота, написана учасниками і організатором навчального курсу «Інтенсивне ставове рибництво», який відбувся в Ізраїлі в грудні 2016 р., є комплексним оглядом сучасної аквакультури Ізраїлю. Зокрема, дається опис особливостей прісноводного і морського рибництва і рибальства, технологій, що застосовуються в них, та системи державного управління рибогосподарською галуззю.

Практична значимість. Представлений огляд може бути використаний для модернізації управлінських підходів в рибогосподарській галузі України, в освітній та науковій діяльності, а також для розвитку міжнародного співробітництва.

Ключові слова: Ізраїль, рибогосподарська галузь, аквакультура, марикультура, установка замкнутого водопостачання (УЗВ), інтегровані системи рибництва, рибальство, озеро Кінерет, осетрівництво Ізраїлю, служба інструктажу.

MODERN STATE OF FISHERY SECTORS OF ISRAEL (REVIEW)

Yu. Oziransky, yuri@matc.org.il, Agency for the Development of International Cooperation under the Ministry of Foreign Affairs of the State of Israel (MASHAV), International Training Center for Agriculture, Kibbutz Shefaim

N. Kolesnyk, kolesnik@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

S. Shcherbak, schek@email.ua, Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv

R. Kononenko, ruslan_kononenko@ukr.net, National University of Life and Environmental sciences of Ukraine, Kyiv

M. Fedorenko, fedorenkono@ukr.net, Budget Enterprise "Methodological and Technological Center for Aquaculture", Kyiv

V. Mosnitsky, valik_m@meta.ua, "AQUA-ARTIS" Ltd, Rivne

S. Nekrasov, oleksandrovske@gmail.com, Fish farm "Oleksandrovska", Kherson region

Purpose. The State of Israel is one of the world leaders in the development of modern technologies, particularly in fisheries industry. E.g., 30 fish farms annually provide production of over 18,000 tons of fish, with an average yield of more than 8 tons per hectare. The fish equipment manufactured in this country is supplied to the Asia, Africa, Europe, South and North America countries, Australia. Israelis' specialists and companies design, build and implement engineering and technological support of fish-breeding enterprises in the EU, China, Nigeria, Georgia, Russia, Belarus, etc. The ongoing shortage of water in the country has spurred innovation in water conservation techniques, and a substantial agricultural modernization, drip irrigation. Israel is also at the technological forefront of desalination and water recycling. The Sorek desalination plant is the largest seawater reverse osmosis (SWRO) desalination facility in the world. As of 2015, more than 50 percent of water for Israeli households, agriculture and industry is artificially produced. The country hosts an annual Water Technology and Environmental Control Exhibition & Conference (WATEC) that attracts thousands of people from all over the world. In 2011, Israel's water technology industry was worth around \$2 billion a year with annual exports of products and services of dozens of millions of dollars. Due to innovations in reverse osmosis technology, Israel is set to become a net exporter of water in the incoming years. At the same time, publications in Ukraine about the aquaculture branch of Israel concern mainly statistical information, or are devoted to individual ichthyopathological problems, genetic studies, etc. It does not allow analyzing a comprehensive development in this industry of Israel. Thus, the compilation and analysis of existing information is a relevant issue. This article expands the awareness of specialists on the specifics of fisheries industry, marine and freshwater fisheries in Israel, aquaculture technologies, and other fisheries related topics in Israel.

Findings. The work written by the organizer and participants of the training course "Intensive Pond Fish Culture", which was held in Israel in December 2016, is a comprehensive survey of modern aquaculture in Israel. In particular, it describes the characteristics of freshwater and marine fish farming and fishing, the technologies used as well as the state fisheries management system.

Practical value. This review would help to modernize management approaches in fisheries sector of Ukraine, educational and scientific activities, and develop the international cooperation with Israel.

Keywords: Israel, fisheries, aquaculture, mariculture, recirculating aquaculture system (RAS), integrated fish farming systems, fishing, Lake Kinneret, sturgeon breeding in Israel, briefing service.

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 29-39
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.029>
УДК 639.2.03:597.5 (282.247.326.8)

БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІМІТІВ ВИЛОВУ РИБИ У ЗАПОРІЗЬКОМУ (ДНІПРОВСЬКОМУ) ВОДОСХОВИЩІ НА 2017 РІК

О. М. Маренков, gidrobs@yandex.ru, Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

О. В. Федоненко, hydro-dnu@mail.ru, Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Є. В. Філіппова, labor_okbm@ukr.net, Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Мета. Провести аналіз сучасного стану популяцій плітки, ляща, судака та плоскирки Запорізького (Дніпровського) водосховища та визначити величину допустимого промислового вилучення даних видів риб в 2017 р. через встановлення обґрунтованих лімітів.

Методика. В ході роботи використовувалися узагальнені результати іхтіологічних досліджень, що проводилися протягом 2010–2016 рр. Матеріали збирали в Запорізькому (Дніпровському) водосховищі стандартними знаряддями для відбору проб. Для дослідження іхтіофауни використовували набір контрольних знарядь лову (порядок ставних сіток з кроком вічка $a=30\text{--}120$ мм). Молодь риб відловлювали в третій декаді липня — першій декаді серпня мальковою волокушею завдовжки 10 м. Обробка відібраних проб проводилась за загальноприйнятими методиками.

Результати. Визначено сучасний стан популяцій промислових видів риб, вилучення яких лімітується (плітка, лящ, судак, плоскирка). Встановлено основні біологічні показники даних видів риб, визначена вікова та статева структура популяцій та розраховані величини промислового запасу. На підставі отриманих даних визначено коефіцієнти природної, промислової та загальної смертності і розраховано величини лімітів промислового вилучення дослідних видів риб.

При оптимальному вилові плітки в обсязі не вище 25% від розрахованого запасу рекомендуємо встановити ліміт на вилов даного виду в 2017 р. в розмірі 190 т. Ліміт вилову ляща доцільно встановити на рівні не вище 88 т. Через критичний стан запасів судака Запорізького (Дніпровського) водосховища, рекомендований ліміт його вилову в 2017 р. не повинен перевищувати 14 т. Розрахунковий ліміт вилучення плоскирки рекомендуємо встановити в обсязі 70 т. Дотримання запропонованих лімітів дозволить без екологічного збитку здійснювати промислове вилучення даних видів риб.

Наукова новизна. Представлені результати досліджень стану промислових популяцій риб, вилов яких щорічно лімітується. Вказані підходи щодо обсягів промислового вилучення плітки, ляща, судака та плоскирки спрямовані на впровадження та реалізацію наукового обґрунтування ведення промислового рибальства на акваторії Запорізького (Дніпровського) водосховища.

Практична значимість. Встановлення запропонованих лімітів вилову плітки, ляща, судака та плоскирки передбачає раціональне використання водних біоресурсів та збереження чисельності цих промислових видів риб в умовах рибогосподарського навантаження.

© О. М. Маренков, О. В. Федоненко, Є. В. Філіппова, 2017

Ключові слова: ліміти, Запорізьке (Дніпровське) водосховище, промисел риби, судака, пласкирка, плітка, лящ.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Формування промислової іхтіофауни характеризується певною динамікою, що дає підстави для прогнозування майбутніх уловів. Але у водосховищах комплексного призначення, що знаходяться під впливом антропогенного навантаження, відбувається дестабілізація екосистеми і спостерігаються іхтіологічні сукцесії, що призводять до зменшення запасів промислових риб. Одним із способів контролю стану чисельності промислових популяцій є багаторічні сезонні моніторингові іхтіологічні дослідження, які лягають в основу біологічних обґрунтувань промислу на внутрішніх водоймах країни [1, 2, 16].

На сучасному етапі внаслідок неконтрольованої діяльності людини (надмірний селективний лов старших вікових груп риб, недотримання правил промислового та аматорського рибальства тощо), а також зарегулювання стоку річок та глобального потепління (підвищення температури води, зростання рівня мінералізації, збільшення площі мілководь з високим замуленням та заростанням водною рослинністю) у Запорізькому (Дніпровському) водосховищі спостерігається стійка динаміка щодо збільшення чисельності малоцінних короткоциклових видів риб та збіднення видового різноманіття промислових видів [2, 3]. Цьому сприяє й падіння чисельності хижаків, відтворення популяцій яких знаходиться на катастрофічно низькому рівні.

Природокористування на внутрішніх водоймах, яке реалізується через промислове вилучення риби, повинно мати раціональне підґрунтя, яке реалізується через заходи щодо збереження та збільшення промислових запасів риби у Запорізькому (Дніпровському) водосховищі шляхом прогнозування та лімітування вилучення окремих видів риб.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Результати попередніх багаторічних іхтіологічних та гідроекологічних досліджень свідчать, що рибопродуктивний потенціал Запорізького (Дніпровського) водосховища використовується нераціонально, що відображається на низьких показниках промислових уловів [1–4].

У відповідності до вимог діючого законодавства України, обов'язковому лімітуванню підлягають види, стан яких може бути оцінений як незадовільний або які інтенсивно експлуатуються. В Запорізькому (Дніпровському) водосховищі ліміт на вилов встановлюється для чотирьох видів риб: плітки, ляща, судака та пласкирки.

У зв'язку з цим, метою даної наукової роботи було проведення комплексної оцінки стану популяцій промислових видів риб Запорізького (Дніпровського) водосховища, вилов яких лімітується, для подальшої розробки заходів щодо їх раціонального промислового освоєння.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проводилися на замовлення Інституту рибного господарства НААН співробітниками Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара разом зі співвиконавцями: ПП «РІНа», ПП «Форошук В. В.» та ТОВ «Борисфен-2010». Контрольні лови риби здійснювались на підставі дозволів, виданих Управлінням охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Дніпропетровській області. Дослідження проводились на двох контрольно-спостережних пунктах, які розташовані у Самарській затоці та нижній частині Запорізького (Дніпровського) водосховища (с. Військове). Лов здійснювали стандартними ставними сітками з вічком 30–120 мм.

Об'єктом дослідження були чотири види риб, вилов яких в Запорізькому (Дніпровському) водосховищі підлягає встановленню щорічних лімітів на вилов: плітка, лящ, судак та плоскирка.

Біологічний аналіз риб проводився згідно класичних методик в іхтіології [5–8] за такими показниками: стандартна та абсолютна довжина тіла, індивідуальна маса, стать, коефіцієнт вгодованості за Фультоном. Вік риби визначали за стандартними іхтіологічними методиками В. Л. Брюзгіна [9] та Н. І. Чугунової [10]. Параметри рибальства на водоймах визначали за методиками П. В. Тюріна [11].

Молодь риб відловлювали в третій декаді липня — першій декаді серпня на мілководдях за стандартними контрольними точками. Знаряддям лову була малькова тканка — волокуша завдовжки 10 м з кроком вічка 2 мм. За відносну чисельність молоді приймалась кількість цьоголіток на 100 м² площі облову. Видову належність цьоголіток визначали за Г. П. Коблицькою [8, 12, 13].

Статистична обробка матеріалу проводилась за допомогою комп'ютерної програми STATISTICA 6.0.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Рядом дослідників відмічається обов'язкове лімітування вилову окремих ресурсних видів риб, що пов'язано зі ступенем промислового використання та динамікою запасів. Таким чином, на всіх водосховищах Дніпра підлягають обов'язковому лімітуванню лящ, судак, плітка та плоскирка [4, 14–16].

Плітка (*Rutilus rutilus* Linnaeus, 1758). Середньорічний багаторічний вилов плітки з 2006 по 2015 рр. сягав 142,24 т. За останні 10 років мінімальний вилов у кількості 118 т припадав на 2013 р., максимальний — на 2009 р. — 167,9 т.

Віковий склад популяції плітки нараховував 11 вікових груп — від 2 (0,11%) до 12 років (0,12%). За статтю вікові групи розподілялись так: у самиць — 3–12-річні особини, у самців — 2–12-річки. Ядро популяції плітки складали 4–6-річні особини — 83,6%. Середньовиважена довжина промислових особин плітки трималась на рівні 2015 р. та становила 21,3±0,19 см, маса — 213,5±6,4 г, причому, у самиць лінійні та вагові показники були вищими відповідно на 8 і 25%. Як і в попередні роки, відмічається, що особини, вилучені в Самарській затоці Запорізького (Дніпровського) водосховища достовірно відставали в рості

та характеризувалися тугорослістю.

Репродуктивним ядром популяції плітки були особини 4–6 років. У нерестовій популяції серед самиць переважали 5–6-річні особини, серед самців — 4–5-річні особини.

Коефіцієнт вгодованості за Фультоном становив $2,20 \pm 0,02$, тобто вгодованість плітки практично залишилася на рівні попередніх років. Коефіцієнт вгодованості та жирність (3–4 бали) свідчать про сприятливі умови нагулу для даного виду риб.

У 2015 р., в порівнянні з 2014 р., у перерахунку на 100 сіткодіб кількість плітки в уловах сіток контрольного порядку в Запорізькому (Дніпровському) водосховищі підвищилася майже на 20% і становила 8909 екз. (1962 кг). У 2016 р. на 100 сіткодіб контрольних знарядь лову припадало 7788 екз. (1659 кг), що за біомасою риб менше на 15%, ніж показник 2015 р.

У 2017 р. можна очікувати на незначне поповнення чисельності популяції плітки, оскільки генерація 2011 р. була досить врожайною в порівнянні з двома попередніми роками — чисельність цьоголіток сягала 196 екз./100 м². У 2012 р. чисельність цьоголіток у прибережних ділянках становила — 125,85 екз./100 м². У 2013 р. вона в літоралі водосховища сягнула 50,68 екз./100 м², а чисельність дволіток — 177,39 екз./100 м². Таким чином, за результатами аналізу контрольного порядку ставних сіток та результатів малькових обловів, можна зробити припущення щодо помірного вилучення старших вікових груп на фоні достатнього поповнення, яке компенсує промислове вилучення даного виду.

Як і в попередні роки, основний улов плітки спостерігався для сіток з вічком 36–40 мм і становив 72% від загальних обсягів. У крупновічкові сітки плітка потрапляла поодинокі — 2,1%. За показниками вікової та розмірно-вагової структури промислової популяції плітки, величини промислового поповнення, можна вважати, що стан промислової популяції плітки знаходиться на досить стабільному рівні.

Враховуючи коефіцієнт природної (0,28%) та загальної смертності (45,7%), величину поповнення та промзусилля, розраховано запас плітки в Запорізькому (Дніпровському) водосховищі на 2017 р. в обсязі 1014 т. Освоєння лімітів у попередні роки було на рівні 65–72%. При оптимальному вилові близько 25% рекомендуємо встановити ліміт на вилов плітки в розмірі 190 т (табл. 1).

Лящ (*Abramis brama* Linnaeus, 1758). Аналіз динаміки промислових уловів показує, що протягом 2006–2015 рр. вилов ляща є досить стабільним і тримається на рівні 50–67 т. В 2015 р. промислове вилучення ляща сягнуло 61 т, що становить 76,3% встановленого ліміту.

Віковий склад ляща представлений 14 класами, граничний вік в уловах становив 16 років (0,4%). Кількість вікових класів в промислі знаходиться на рівні 12. Ядром популяції ляща були особини віком від 5 до 8 років (80,7% в промислі). Варіаційний ряд ляща мав вигляд кривої з достатньо широкою вершиною, на яку припадали особини віком 4–6 років, та плавним спадом (від 6 до 10 років) з подальшим поступовим зниженням кількості особин старших вікових груп.

Враховуючи динаміку вилову ляща на 100 сіткодів контрольного порядку, зазначений розподіл обумовлений збільшенням чисельності модальних вікових груп, на які припадає основне промислове навантаження.

Мінімальні вікові групи, що брали участь у нересті, були: у самок 4-річки — 5,6%, у самців 3-річки — 2,1%. Репродуктивне ядро популяції складали 5–8-річки.

Промислова довжина особин ляща за даними науково-дослідних ловів становила $36,71 \pm 0,49$ см; середньовиважена маса — $1167,73 \pm 50,09$ г, що майже відповідає показникам 2015 р. Коливання мінімальних та максимальних показників за масою в ляща знаходилися в межах від 320 до 4720 г.

Середньовікові значення коефіцієнта вгодованості за Фультоном протягом десяти років характеризуються стабільністю та становлять в середньому $2,36 \pm 0,04$ одиниць.

У середньому по водосховищу улов ляща на 100 сіткодів контрольного порядку в 2016 р. склав 859 екз. (1003 кг), у 2015 р. — 994,5 екз. (962,9 кг), у 2014 р. цей показник досягнув 1008,3 екз. (1050,6 кг). Останні чотири роки спостерігається незначна варіація даного показника в діапазоні 30–50 кг, що свідчить про досить стабільний стан промислової популяції.

Близько 50% за кількістю та 62% за біомасою уловів ляща припадало на сітки з вічком 75–80 мм. Протягом останніх шести років простежується чітка тенденція до зменшення улову дрібновічкових сіток з кроком вічка $a=30-40$ мм, на частку яких припадало 12,3% загального улову. Вилов ляща сітками з кроком вічка $a=55-70$ мм, тобто тих генерацій, які формуватимуть основу промислу в 2017 р., сягнув 31%, що свідчить про достатнє поповнення промислового ядра.

У 2017 р. запас ляща будуть формувати генерації 2011, 2012 та 2013 р., які відзначались як маловрожайні — 7,7; 2,38 та 0,75 екз./100 м² відповідно.

Освоєння ліміту вилову ляща останні роки тримається на рівні 70–90%, в 2015 р. — 76,3% (табл. 1). Враховуючи коефіцієнт природної смертності (0,15), коефіцієнт вилову (0,22), кількість особин старших вікових груп, розрахунковий запас ляща на сьогодні становить 353 т. Але з огляду на низькі показники поповнення молоддю, доцільно встановити ліміт вилову ляща в 2017 р. не вище за 25% від загального запасу, що становить 88 т.

Судак (*Stizostedion lucioperca* Linnaeus, 1758). Промислові улови судака в Запорізькому (Дніпровському) водосховищі протягом 2006–2015 рр. характеризуються значною нестабільністю та критично низькими показниками. Улови даного виду коливаються в межах від 5,4 т (показник 2014 р.) до 14,2 т (2011 р.).

Для популяції судака Запорізького (Дніпровського) водосховища протягом останніх років спостерігається стала тенденція: низькі показники поповнення, зниження показників репродуктивності та «омолодження» стада, зменшення лінійно-вагових параметрів промислової популяції.

Таблиця 1. Освоєння лімітів вилову риби у Запорізькому (Дніпровському) водосховищі за останні 10 років та встановлення величин лімітів вилову на 2017 р.

Роки	Судак			Ляц			Плітка			Плоскирка		
	ліміт, т	улов, т	%	ліміт, т	улов, т	%	ліміт, т	улов, т	%	ліміт, т	улов, т	%
2007	14	9,5	68,2	70	53	75,5	220	161	73,0	70	41	59,0
2008	14	9,8	70,2	75	55,1	73,4	220	144	65,4	70	40	57,3
2009	17	10,81	63,6	80	56,8	71,0	225	167,9	74,6	75	49,0	65,3
2010	12	10,40	86,7	75	58,80	78,4	210	144,57	68,8	70	45,75	65,4
2011	20	14,21	71,1	75	62,41	83,2	180	143,21	79,6	80	52,27	65,3
2012	18	7,35	40,8	75	65,57	87,4	200	141,53	70,8	75	56,45	75,3
2013	9,5 П	8,69	91,47	70,0 П	67,1	95,95	180,0 П	118,09	65,61	63,0 П	52,63	83,53
2014	10,0 Л	5,39	53,9	75,0 Л	50,7	67,6	190,0 Л	122,04	64,23	58,0 Л	38,8	66,9
2015	12,0 Л	9,743	81,19	80,0 Л	61	76,26	187,0 Л	133,5	71,41	58,0 Л	42,63	73,5
2016	16 Л	13,0	81,25	85 Л	66,58	78,33	200 Л	165,03	82,515	75 Л	64,87	86,49
Ліміт вилову												
2017	14,0 Л			88,0 Л			190,0 Л			70,0 Л		

Примітка. П — прогноз вилову, Л — вилов виду здійснюється в межах встановленого ліміту.

Віковий ряд судака в контрольних уловах нараховував 13 класів (2–14-річки). Ядро промислової популяції складалося з 3–5-річних особин (84,8%). Частка риб старших вікових груп в основному була представлена 7–10-річними особинами і складала 6,9%. В популяції судака спостерігається збільшення частки 2-річних та особливо 3-річних особин, що вказує на її омолодження. Крива варіаційного ряду має пік на чотирирічних особинах, потім в меншій кількості йдуть п'ятирічки та спостерігається різкий спад кривизни вже з шестирічок. У минулому році також простежувалася тенденція до значного омолодження стада судака, яке відбувається за рахунок редукції правого крила варіаційного ряду через низьку чисельність старших вікових особин в уловах. Хоча спостерігається незначне підвищення середньовиваженого віку риб. Так, в 2016 р. цей показник сягнув 4,4 роки, а в 2015 р. він становив 3,85 роки. Таким чином, можна відмітити визначальний вплив природного поповнення на структурні показники популяції судака, яка охоплюється промислом.

Промислова довжина особин судака з контрольних сіток коливалася в межах від 20 до 65 см, а середньовиважений показник промислової довжини сягнув $33,29 \pm 1,31$ см. Мінімальна маса особин, які зустрічалися в знаряддях лову, становила від 190 г у дворічок, максимальна — у 14-річки — 7,38 кг. Середньовиважена маса особин судака майже залишилася на рівні 2015 р. та сягнула $657,3 \pm 70,48$ г. Коефіцієнт вгодованості за Фультоном був на рівні попередніх років, складаючи $1,8 \pm 0,05$.

В 2015 р. на 100 сіткодів контрольного порядку улов судака в середньому по Запорізькому (Дніпровському) водосховищу склав 287,5 кг, що на 37 кг більше,

ніж у 2014 р. В 2016 р. улов на 100 сіткодів контрольного порядку склав 239 кг (364 екз.), що на 16,8% менше, ніж у попередньому році.

Лов судака у 2016 р. за чисельністю та біомасою базувався на сітках з кроком вічка $a=40-50$ мм — 42 та 50,1% відповідно. В сітках з кроком вічка $a=30-36$ мм за кількістю спостерігалось підвищення відсотка з 30,1% (2015 рік) до 34,8 % (2016 рік). В Самарській затоці на сітки з кроком вічка 30 мм припадає близько 48% загального улову судака, що викликано достатньою тугорослістю особин, зумовленою гідроекологічними умовами затоки.

Сучасний запас судака забезпечений генераціями 2012 та 2013 рр. Чисельність цьоголіток в той період становила відповідно 0,44 та 0,54 екз./100 м². Низька чисельність дволіток судака спостерігалась в 2010 та 2011 рр. і складала по 0,10–0,11 екз./100 м² для кожного року, у 2012 та 2013 рр. чисельність дволіток на мілководдях Запорізького (Дніпровського) водосховища сягнула 1,22 та 1,5 екз./100 м².

Таким чином, враховуючи коефіцієнт природної смертності (0,25), коефіцієнт вилову (0,21), низький рівень поповнення, запас судака в Запорізькому (Дніпровському) водосховищі можна оцінити в 98,5 т. Через критичний стан популяцій, рекомендований ліміт вилову судака в 2017 р. не повинен перевищувати 14 т (табл. 1).

Плоскирка (*Blicca bjoerkna* Linnaeus, 1758). Останні 10 років обсяги її вилучення тримаються на рівні 40–55 т (до 10% у загальних уловах). В 2015 р. освоєння квоти склало 73,5%. Промисел плоскирки базується переважно на особинах 4–5-річного віку. В контрольних уловах плоскирка представлена 9 промисловими групами — від 3 (10,4%) до 11 (0,9%) років. Варіаційний ряд вікових показників плоскирки має вигляд несиметричної кривої з вершиною на 4-річних особинах, також спостерігається зміщення ряду в праве крило за рахунок вилову 7–11-річних особин. Збільшення в уловах кількості особин старших вікових груп створило умови до підвищення середньовиваженого віку промислових особин з 4,3 (2015 р.) до 4,7 років (2016 р.).

Середньовиважені лінійно-вагові показники складали: промислова довжина — $19,31 \pm 0,59$ см, маса — $194,59 \pm 37,59$ г. Значення лінійно-вагових показників залишились на рівні минулих років. Середні їх значення для промислових особин протягом 10 років тримаються майже на одному рівні. Самки опереджали в рості самців на 28%.

Коефіцієнт вгодованості був досить високим і становив $2,70 \pm 0,06$. Стабільні лінійно-вагові показники та коефіцієнт вгодованості свідчать про сприятливі умови нагулу для даного виду риб.

В 2016 р. улов плоскирки на 100 сіткодів сягнув 653 екз. (126,8 кг), що на 3% за кількістю та 9,5% за біомасою нижче, ніж у 2015 р. — 670 екз. (140,1 кг). Основний вилов у 2016 р., як і у попередньому, припадав на сітки $a=30-36$ мм (72% за чисельністю та 55,3% за біомасою).

Ядро промислового стада плоскирки складали особини генерації 2012 та 2013 рр. Чисельність цьоголіток цих років була низькою та знаходилася на рівні 0,34 та 0,3 екз./100 м².

Враховуючи коефіцієнт природної (0,26%) та загальної смертності (40,7%), запас плоскирки оцінюється на рівні 380 т, з урахуванням оптимального промислу (25% від запасу) та з огляду на пониження показника уловистості виду на 100 сіткодів контрольного порядку, рекомендуємо встановити ліміт вилову плоскирки в 2017 р. в обсязі 70 т (табл. 1).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Рациональне використання промислової іхтіофауни внутрішніх водойм можливе при реалізації засад прогнозування та лімітування вилову окремих видів риб. Для Запорізького (Дніпровського) водосховища доцільним є встановлення лімітів на вилов чотирьох видів риб: плітки, ляща, судака та плоскирки.

За результатами комплексних іхтіологічних досліджень встановлено ліміти вилову промислових видів риб в Запорізькому (Дніпровському) водосховищі на 2017 р. на рівні: плітка — 190 т, лящ — 88 т, судак — 14 т, плоскирка — 70 т.

Перспективність проведених досліджень полягає в розробці підходів та реалізації засад раціонального природокористування водними біоресурсами зі збереженням репродуктивного потенціалу промислових видів риб в умовах ведення промислу на Запорізькому (Дніпровському) водосховищі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Біолого-екологічна та рибогосподарська оцінка малих водойм Дніпропетровської області / О. В. Федоненко, Н. Б. Єсіпова, О. М. Шмагайло [та ін.] // Вісник Запорізького національного університету. — 2013. — № 1. — С. 68—76.
2. Сучасні проблеми гідроекології: Запорізьке водосховище / [Федоненко О. В., Єсіпова Н. Б., Шарамок Т. С. та ін.]. — Д. : ЛПРА, 2012. — 280 с.
3. Сучасний стан та умови відтворення промислової іхтіофауни Запорізького (Дніпровського) водосховища / О. В. Федоненко, Н. Б. Єсіпова, О. М. Маренков [та ін.] // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2011. — Вип. 160, ч. 1. — С. 92—97. — (Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва).
4. Федоненко О. В. Біологічні показники основних видів риб Запорізького водосховища та інших рибогосподарських водойм Дніпропетровської області / О. В. Федоненко, Н. Б. Єсіпова, О. М. Маренков // Рибогосподарська наука України. — 2014. — № 4. — С. 22—34.
5. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [Арсан О. М., Давидов О. А., Дьяченко Т. М. та ін.] ; ред. В. Д. Романенко. — К. : Логос, 2006. — 408 с.
6. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция. — Л. : ГосНИОРХ, 1984. — 52 с.
7. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных) / Правдин И. Ф. — М. : Пищ. пром-сть, 1966. — 376 с.
8. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилову риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України; № 166 від 15.12.98. — К., 1998. — 47 с.

9. Брюзгин В. Л. Методы изучения роста рыб по чешуе и отолидам / Брюзгин В. Л. — К. : Наукова думка, 1969. — 186 с.
10. Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. (Методическое пособие по ихтиологии) / Чугунова Н. И. — М. : АН СССР, 1959. — 164 с.
11. Тюрин П. В. Биологические обоснования регулирования рыболовства на внутренних водоемах / Тюрин П. В. — М. : Пищепромиздат, 1963. — 119 с.
12. Коблицкая А. Ф. Определитель молоди пресноводных рыб / Коблицкая А. Ф. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. — 208 с.
13. Methods for fish biology / ed. C. B. Schreck, P. B. Moyle. — Bethesda, Maryland, USA, 1990. — 685 p.
14. Бузевич І. Ю. Сучасний стан промислової іхтіофауни Каховського водосховища / І. Ю. Бузевич // Рибогосподарська наука України. — 2008. — № 4. — С. 4—9.
15. Чуклін А. В. Принципи встановлення допустимих обсягів вилову водних біоресурсів у Дніпровських водосховищах / А. В. Чуклін // Рибогосподарська наука України. — 2012. — № 3. — С. 3—8.
16. Бузевич І. Ю. Сучасний стан промислу на дніпровських водосховищах / І. Ю. Бузевич // Рибне господарство. — 2004. — Вип. 63. — С. 16—18.

REFERENCES

1. Fedonenko, O. V., Yesipova, N. B., Shmagaylo M. O., & Sazanova, N. M. (2013). Biolohe-ekolohichna ta rybohospodars'ka otsinka malykh vodoym Dnipropetrovs'koyi oblasti. *Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu*, 1, 68-76.
2. Fedonenko, O. V., Yesipova, N. B., & Sharamok, T. S. et al. (2012). *Suchasni problemy hidroekolohiyi: Zaporiz'ke vodoskhovyshe*. Dnipropetrovs'k : LIRA.
3. Fedonenko, O. V., Yesipova, N. B., & Marenkov, O. M. et al. (2011). Suchasnyy stan ta umovy vidtvorennya promyslovoyi ikhtiofauny Zaporiz'koho (Dniprovs'koho) vodoskhovyscha. *Naukovyy visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrainy. Seriya: Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynyntstva*, 160(1), 92-97.
4. Fedonenko, O. V., Yesipova, N. B., & Marenkov, O. M. (2014). Bioloheichni pokaznyky osnovnykh vydiv ryb Zaporiz'koho vodoskhovyscha ta inshykh rybohospodars'kykh vodoym Dnipropetrovs'koyi oblasti. *Rybohospodars'ka nauka Ukrainy*, 4, 22-34.
5. Arsan, O. M., Davydov, O. A., & Diachenko, T. M. et al. (2006). *Metody hidroekolohichnykh doslidzen poverkhnevyykh vod*. Romanenko, V. D. (Ed.). Kyiv : Lohos.
6. *Metodicheskie rekomendatsii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskikh issledovaniyakh na presnovodnykh vodoemah*. Zoobentos i ego produktsiya (1984). Leningrad: GosNIORKh.
7. Pravdin, I. F. (1966). *Rukovodstvo po izucheniyu ryb (preimushchestvenno presnovodnykh)*. Moskva : Pishhevaya promyshlennost'.
8. *Metody zboru i obrobky ikhtiolohichnykh i hidrobioloheichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoskhovysch i lymaniv Ukrainy: Zatv. nakazom Derzhkomrybhospu Ukrainy № 166 vid 15.12.98*. (1998). Kyiv.
9. Bryuzgin, V. L. (1969). *Metody izucheniya rosta ryb po cheshue i otolitam*. Kiev : Naukova dumka.

10. Chugunova, N. I. (1959). *Rukovodstvo po izucheniyu vozrasta i rosta ryib (Metodicheskoe posobie po ihtologii)*. Moskva : Publishing House of the Acad. Sc. USSR.
11. Tyurin, P. V. (1963). *Biologicheskie obosnovaniya regulirovaniya ryibolovstva na vnutrennih vodoemah*. Moskva : Pischepromizdat.
12. Koblickaja, A. F. (1981). *Opredelitel' molodi presnovodnyh ryb*. Moskva : Legkaja i pishhevaja promyshlennost'.
13. *Methods for fish biology*. (1990). Bethesda, Maryland, USA.
14. Buzevych, I. Yu. (2008). Suchasnyy stan promyslovoyi ikhtiofauny Kakhovs'koho vodoshkovyshcha. *Rybohospodars'ka nauka Ukrainy*, 4, 4-9.
15. Chuklin, A. V. (2012). Pryntsypy vstanovlennya dopustymykh obsyahiv vylovu vodnykh bioresursiv u Dniprov's'kykh vodoshkovyshchakh. *Rybohospodars'ka nauka Ukrainy*, 3, 3-8.
16. Buzevych, I. Yu. (2004). Suchasnyy stan promyslu na dniprov's'kykh vodoshkovyshchakh. *Rybne hospodarstvo*, 63, 16-18.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛИМИТОВ ВЫЛОВА РЫБЫ В ЗАПОРОЖСКОМ (ДНЕПРОВСКОМ) ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА 2017 ГОД

О. Н. Маренков, gidrobs@yandex.ru, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр

Е. В. Федоненко, hydro-dnu@mail.ru, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр

Е. В. Филиппова, labor_okbm@ukr.net, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр

Цель. Провести анализ современного состояния популяций плотвы, леща, судака и густеры Запорожского (Днепровского) водохранилища и определить величину допустимого промыслового изъятия данных видов рыб в 2017 г. путем установления обоснованных лимитов.

Методика. В ходе работы использовались обобщенные результаты ихтиологических исследований, проводившихся в течение 2010–2016 гг. Материалы собирали в Запорожском (Днепровском) водохранилище стандартными орудиями для отбора проб. Для исследования ихтиофауны использовали набор контрольных орудий лова (порядок ставных сетей с шагом ячеи $a = 30\text{--}120$ мм). Молодь рыб отлавливали в третьей декаде июля — первой декаде августа мальковой волокушей длиной 10 м. Обработка отобранных проб проводилась по общепринятым методикам.

Результаты. Определено современное состояние популяций промысловых видов рыб, вылов которых лимитируется (плотва, лещ, судак, густера). Установлены основные биологические показатели данных видов рыб, определена возрастная и половая структура популяций и рассчитаны величины промыслового запаса. На основании полученных данных определены коэффициенты естественной, промысловой и общей смертности и рассчитаны величины лимитов промыслового вылова исследуемых видов рыб.

При оптимальном вылове плотвы в количестве до 25% от рассчитанного запаса рекомендуем установить лимит на вылов данного вида в 2017 году в размере 190 т. В текущем году целесообразно установить лимит вылова леща не выше 88 т. Из-за критического состояния судака Запорожского (Днепровского) водохранилища, рекомендованный лимит его вылова в 2017 г. не должен превышать 14 т. Расчетный лимит вылова густеры рекомендуем установить на уровне 70 т. Вылов данных видов рыб в пределах предложенных лимитов позволит без экологического ущерба осуществлять их промысловое освоение.

Научная новизна. Представлены результаты исследований состояния промысловых популяций рыб, вылов которых ежегодно лимитируется. Указаны объемы промыслового вылова плотвы, леща, судака и густеры, что направлено на внедрение и реализацию научного обоснования ведения промыслового рыболовства на акватории Запорожского (Днепровского) водохранилища.

Практическая значимость. Установление предложенных лимитов вылова плотвы, леща, судака и густеры предусматривает рациональное использование водных биоресурсов и сохранение численности этих промысловых видов рыб в условиях рыбохозяйственной нагрузки.

Ключевые слова: лимиты, Запорожское (Днепровское) водохранилище, промысел рыб, судак, густера, плотва, лещ.

BIOLOGICAL JUSTIFICATION FOR FISH HARVEST LIMITS IN THE ZAPORIZHZHYA (DNIPRO) RESERVOIR FOR 2017

O. Marenkov, gidrobs@yandex.ru, O. Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipro

O. Fedonenko, hydro-dnu@mail.ru, O. Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipro

E. Filippova, labor_okbm@ukr.net, O. Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipro

Purpose. To analyze the current state of the populations of roach, bream, pikeperch and silver bream in the Zaporozhye (Dnipro) reservoir and to determine the acceptable amounts of commercial harvest of these fish species for 2017 by determining scientifically justified limits.

Methodology. The summarized results of ichthyological studies conducted during 2010–2016 years were used during the research. The materials were collected in the Zaporizhzhya (Dnipro) Reservoir using standard fish sampling methods. A set of standard fishing gears (gill nets with mesh sizes of 30–120 mm) was used for studying fish fauna. Juvenile fish were caught in the third decade of July – first decade of August using a beach seine of 10 m in length. The processing of collected samples was conducted by conventional methods.

Findings. We studied the current state of commercial fish populations, the exploitation of which is limited (roach, bream, pikeperch, silver bream). We determined the basic biological parameters of these species, determined the age and sex structure of their populations and assessed their stocks. Based on these data, we determined the rates of natural, fishing and total mortality and calculated the amounts of commercial catches of the investigated fish species.

With an optimum catch of the roach not exceeding 25% of the calculated stock, we recommended to set a limit on the catch of this species for 2017 as 190 tons. Next year, it is advisable to set a limit for the bream catch not higher than 88 tons. Due to a critical state of the pikeperch stock in the Zaporozhye (Dnieper) reservoir, the recommended limit of its catch for 2017 should not exceed 14 tons. The estimated catch limit for the silver bream for the following year is recommend to be 70 tons. The harvest of these fish species within the proposed limits will allow carrying out their commercial exploitation without environmental damage.

Originality. We presented the results of the study of the stat of commercially important fish populations, the harvest of which is limited annually. These approaches to the commercial harvest of the roach, bream, pikeperch and silver bream are aimed at introducing and implementaing the scientific justification of commercial fish exploitation in the Zaporozhye (Dnipro) reservoir.

Practical value. Determination of the proposed commercial harvest limits for the roach, bream, pikeperch and silver bream ensures a rational use of aquatic living resources and conservation of the stocks of the commercial fish species in the conditions of fishing pressure.

Keywords: limits, Zaporozhye (Dnipro) reservoir, commercial fishing, pikeperch, silver bream, roach, bream.

РИБНИЦЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЦЬОГОЛІТОК ГАЛИЦЬКОГО КОРОПА В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОЩУВАННЯ У СТАВАХ ПРИКАРПАТТЯ

І. І. Грициняк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. В. Гурбик, dukavv@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. М. Базаєва, a_bazaeva@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. П. Чужма, n_chuzhma@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Провести аналіз рибницьких та біологічних показників цьоголіток галицького коропа за промислового вирощування у ставах в умовах Прикарпаття.

Методика. Роботи виконувались згідно з загальноприйнятими методиками в рибництві та селекції. В період вирощування цьоголіток галицького коропа проводили контроль абіотичних чинників у дослідному ставу.

Результати. За гідрохімічним аналізом вода вирощувального ставу відносилась до гідрокарбонатного класу групи кальцієвих вод I типу, що є характерним для природних вод даної фізико-географічної зони. Видовий спектр рослинного планктону на початку досліджень був представлений 39 видами та внутрішньовидовими таксонами, в середині досліду — 33, а в кінці дослідного періоду — 36 видами та внутрішньовидовими таксонами. Основу видового складу фітопланктону визначали зелені водорості. Основу біомаси зоопланктону (до 46%) становили веслоногі ракоподібні, чисельності — коловертки (до 49,9%). У вирощувальному ставу I порядку показники розвитку зообентосу коливалися в межах 54–120 екз./м² за чисельністю та 0,5–1,3 г/м² за біомасою. Основу якісного складу зообентосу визначали представники родини Chironomidae (71%) та малощетинкові черви Oligochaeta (29%).

Густота посадки риб у вирощувальний став I порядку становила 10 тис. екз./га; рибопосадковий матеріал представлений личинками галицького коропа. В кінці вегетаційного сезону отримано 27,2 тис. екз. цьоголіток, відсоток виходу з вирощування склав 68%. Середня індивідуальна маса становила $96 \pm 7,5$ г, коефіцієнт варіації знаходився на рівні 12%. При оцінці динаміки вагового росту спостерігався пік у I декаді серпня, в той час як показник питомої швидкості росту за І. І. Шмальгаузенем набув свого найбільшого значення у III декаді липня. Для оцінки породних характеристик використовували показники екстер'єру. Так, цьоголітки в середині вегетаційного сезону мали коефіцієнт вгодованості $2,6 \pm 0,3$, що є достатньо високим показником для даної вікової групи. Перед зимівлею він збільшився до $3,0 \pm 0,2$. Індекс голови на початку вегетаційного сезону знаходився на рівні $4,4 \pm 0,7$, а в кінці вирощування спостерігалась тенденція до зменшення — $3,3 \pm 0,1$. Індекс високоспинності знаходився в межах від $2,5 \pm 0,1$ до $2,6 \pm 0,03$. Індекс обхвату тулуба становив $1,1 \pm 0,1$. Індекс хвостового стебла коливався в межах від $1,9 \pm 0,2$ до $1,4 \pm 0,2$, при цьому коефіцієнт варіації знаходився на рівні від 15 до 18%. Згідно отриманих результатів досліджень встановлено, що рибогосподарські показники цьоголіток галицького коропа були вищими у порівнянні з нормативними значеннями.

Наукова новизна. Вперше розглянуто основні рибницько-біологічні показники цьоголіток галицького коропа. Надано оцінку динаміці екстер'єрних показників об'єкта досліджень протягом сезону вирощування. Проведено характеристику цьоголіток галицького коропа в умовах промислового вирощування у ставах Прикарпаття.

© І. І. Грициняк, В. В. Гурбик, А. М. Базаєва, Н. П. Чужма, 2017

Практична значимість. Промислове вирощування цьоголіток галицького коропа розкриє можливість отримати високоякісний матеріал для подальшого отримання дволіток, а також дозволить підвищити показники рибопродуктивності у ставових господарствах на Прикарпатті.

Ключові слова: галицький короп, промислове вирощування, Прикарпаття, природна кормова база, рибогосподарська характеристика, екстер'єрні показники, питома швидкість росту.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПУБЛІКАЦІЙ

Протягом останнього часу особливого прогресу зазнало коропівництво на території України, адже короп відіграє основну роль як об'єкт промислового вирощування. Саме з цією метою відомі селекціонери працювали в напрямку підвищення рибопродуктивності ставів, вивчення та виведення більш високоцінних порід та внутрішньопорідних типів коропа [1–5].

Для отримання високих показників товарних кондицій при вирощуванні коропа необхідно мати життєстійкий рибопосадковий матеріал, який характеризуватиметься не тільки високим рівнем виживання, але й темпами росту [6]. Лише за цих умов можливо досягти високих показників економічної ефективності ведення рибного господарства [7].

Згідно останніх тенденцій, основу споживчого попиту становлять коропи з рамчастим або голим лусковим покривом; ще одним вирішальним критерієм для споживача є економічна доступність товарної рибної продукції [8]. При цьому перехід на вирощування малолускатих коропів, які користуються підвищеним попитом у населення забезпечує стабільний збут вирощеної продукції.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Для вирішення поставлених проблем необхідно розв'язати ряд ключових завдань. Основна увага при їх визначенні, приділялась конкурентноспроможності та якості товарної продукції. Важливе значення належить і відродженню в Україні цінних аборигенних малопоширених масивів риб, до яких, на жаль, потрапив галицький короп.

Галицького коропа використовували як об'єкт ставового рибицтва ще у 80-х рр. XIX століття [9]. Цей масив набув свого розповсюдження у багатьох рибних господарствах Європи, завдяки своїй високоспинній формі та дзеркальному розміщенню лускового покриву. Адже багато рибоводів хотіли «освіжити кров» та отримати ефект гетерозису при схрещуванні масивів. Цей фактор зумовив змішування рас, які до другої половини XIX століття трималися в географічній чистоті та ізоляції [10]. На даний час представники галицького коропа залишились лише у декількох господарствах Львівської області. Для промислового відтворення масив потребує детального вивчення в умовах його ставового вирощування на Прикарпатті.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Цьоголіток галицького коропа вирощували у 2016 році на базі фермерського господарства «Короп» Львівської області. Протягом вегетаційного періоду

контролювали гідрохімічний стан вирощувального ставу. Гідрохімічний аналіз виконували, використовуючи методичні вказівки, описані О. А. Альокінім [11]. Температуру в дослідних ставах вимірювали щоденно протягом вегетаційного періоду термометром Рутнера [12]. Кормову базу експериментальних ставів досліджували за загальноприйнятими у гідробіології методиками [13].

Основні рибницько-біологічні показники галицького коропа досліджували під час весняної інвентаризації контрольних ловів та осінніх обловів за загальноприйнятими в рибництві методами [14].

Для характеристики темпів росту галицького коропа протягом вегетаційного періоду визначали питому швидкість росту за І. І. Шмальгаузенем [15].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Перед початком вегетаційного сезону по всій площі вирощувальних ставів І порядку проводили профілактичні меліоративні роботи. Перед посадкою рибопосадкового матеріалу галицького коропа на вирощування стави фермерського господарства вапнували по воді в кількості 250 кг/га.

Вирощувальні стави І порядку зарибнювали 3-добовими личинками, які були отриманні від плідників галицького коропа в умовах природного нересту. Подальше вирощування рибопосадкового матеріалу тривало за умов монокультури.

Личинки були посаджені до вирощувальних ставів І порядку за густоти посадки 10 тис. екз./га. Згідно ставової площі, відведеної для отримання восени цьоголіток галицького коропа, загальна кількість посадженого рибопосадкового матеріалу становила 40 тис. екз.

Джерелом водопостачання фермерського господарства «Короп» є річка Рата. За хімічним складом вода у вирощувальному ставу відносилась до гідрокарбонатного класу групи кальцієвих вод І типу, що є характерним для природних вод даної фізико-географічної зони (табл. 1).

Таблиця 1. Хімічні показники якості води у вирощувальному ставу І порядку

Показник якості води	15.07	01.11	Норматив для ставової води
Водневий показник, pH	7,2	7,1	6,5–8,5
Вільний аміак, NH_3 , мгN/дм ³	0,005	0,002	до 0,05
Перманганатна окиснюваність, мгО/дм ³	21,8	10,9	до 15,0
Біхроматна окиснюваність, мгО/дм ³	54,5	27,3	до 50,0
Амонійний азот, NH_4^+ , мгN/дм ³	0,76	0,92	до 1,00
Нітриди, NO_2^- , мгN/дм ³	0,08	0,07	до 0,10
Нітрати, NO_3^- , мгN/дм ³	0,22	0,46	до 2,00
Мінеральний фосфор, PO_4^{3-} , мгP/дм ³	0,52	0,13	до 0,50
Загальне залізо, $\text{Fe}^{2+} + \text{Fe}^{3+}$, мгFe/дм ³	0,22	0,24	до 1,00
Кальцій, Ca^{2+} , мг/дм ³	68,8	81,3	до 70,0
Магній, Mg^{2+} , мг/дм ³	4,9	7,3	до 30,0

Показник якості води	15.07	01.11	Норматив для ставової води
Натрій +калій, $\text{Na}^+ + \text{K}^+$, мг/дм ³	4,5	2,1	до 50,0
Гідрокарбонати, HCO_3^- , мг/дм ³	195,3	244,1	до 400,0
Хлориди, Cl^- , мг/дм ³	13,9	12,4	до 70,0
Сульфати, SO_4^{2-} , мг/дм ³	18,9	25,9	до 60,0
Загальна твердість, мг-екв./дм ³	3,8	4,7	5,0–7,0
Мінералізація, мг/дм ³	306,3	373,1	до 1000,0

Вміст гідрокарбонатів у воді вирощувального ставу I порядку на початку вегетаційного сезону становив 195,3 мг/дм³, в той час як в кінці цей показник зазнав підвищення до 244,1 мг/дм³. Концентрації іонів кальцію впродовж періоду вирощування зазнали свого збільшення з 68,8 до 81,3 мг/дм³. Іони магнію на початку вирощування становили 4,9 мг/дм³, величина загальної твердості води коливалась у межах від 3,8 до 4,7 мг-екв./дм³, що не виходить за межі нормативних значень для ставової води рибогосподарських водойм. Вода є слаболужною, водневий показник не перевищував 7,2.

Впродовж вегетаційного періоду показники температурного режиму вирощувальних ставів коливалися від 7 до 28 °С. Найвищими їх спостерігали в кінці липня та на початку серпня, найнижчими — на початку квітня (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка температурних показників ставової води впродовж вегетаційного сезону

Серед видів та внутрішньовидових таксонів фітопланктону вирощувального ставу були визначені представники 6 відділів: синьозелених (*Cyanophyta*), евгленових (*Euglenophyta*), дінофітових (*Dinophyta*), діатомових (*Bacillariophyta*), зелених (*Chlorophyta*) і золотистих (*Chtyzophyta*) водоростей.

Видовий спектр рослинного планктону на початку досліджень був

представлений 39 видами та внутрішньовидовими таксонами, в середині досліджу — 33, а в кінці дослідного періоду — 36 видами та внутрішньовидовими таксонами. Основу видового складу фітопланктону визначали зелені водорості, частка яких протягом сезону в ставу коливалась від 69 до 82%. Субдомінантами виступали діатомові водорості, до яких відносилось від 9 до 25% видів. Кількісний розвиток фітопланктону вирощувального ставу характеризувався низькими показниками. В середньому за сезон чисельність рослинного планктону становила 13746,0 тис. кл./дм³, біомаса — 4,91 мг/дм³ (табл. 2).

Таблиця 2. Динаміка розвитку фітопланктону вирощувального ставу І фермерського господарства «Короп» 2016 р., $\frac{\text{тис. кл./дм}^3}{\text{мг/дм}^3}$

Систематичні відділи водоростей	Червень	Липень	Серпень	Середнє за дослідний період
<i>Cyanophyta</i>	<u>224,0</u> 0,01	—	<u>300,0</u> 0,01	<u>174,7</u> 0,01
<i>Euglenophyta</i>	<u>60,0</u> 0,04	<u>168,0</u> 0,10	<u>3,0</u> 0,01	<u>77,0</u> 0,05
<i>Bacillariophyta</i>	<u>488,0</u> 0,29	<u>96,0</u> 0,16	<u>11421,0</u> 4,38	<u>4001,7</u> 1,61
<i>Chlorophyta</i>	<u>16336,0</u> 5,62	<u>9360,0</u> 2,72	<u>2742,0</u> 1,31	<u>9479,3</u> 3,22
<i>Dinophyta</i>	<u>28,0</u> 0,07	—	—	<u>9,3</u> 0,02
<i>Chrysophyta</i>	—	—	<u>12,0</u> 0,01	<u>4,0</u> 0,003
Всього	<u>17136,0</u> 6,03	<u>9624,0</u> 2,98	<u>14478,0</u> 5,72	<u>13746,0</u> 4,91

Найвищі показники чисельності та біомаси фітопланктону (17136,0 тис. кл./дм³; 6,03 мг/дм³) були відмічені на початку вегетаційного сезону, за рахунок розвитку зелених водоростей родів *Chlamydomonas*, *Coelastrum* та *Pandorina*. В липні відбувалося різке зниження рівня розвитку планктонних водоростей, їх чисельність та біомаса досягли найнижчих показників і становили відповідно 9624,0 тис. кл./дм³ та 2,98 мг/дм³. До кінця дослідного періоду кількісні показники рослинного планктону зростали. Так, чисельність в цей період становила 14478,0 тис. кл./дм³, біомаса — 5,72 мг/дм³. Видами-домінантами були *Asterionella formosa* та *Scenedesmus quadricauda*.

Проведені протягом вегетаційного сезону дослідження показали, що зоопланктон вирощувального ставу фермерського господарства «Короп» був представлений трьома основними групами: *Rotifera*, *Copepoda*, *Cladocera*. Рівень розвитку зоопланктону як в якісному, так і в кількісному відношенні був невисоким.

Всього у дослідному ставу було виявлено 27 таксонів зоопланктонних організмів. Домінуюче значення серед них мали коловертки (70%), гіллястовусі ракоподібні складали 26%. Веслоногі ракоподібні були представлені родиною

Cyclopidae. Серед організмів інших груп у пробах були відмічені статобласти моховаток, личинки хірономід.

Видами-домінантами серед коловерток були: *Trichocerca longiseta*, *Keratella cochlearis*, *Asplanchna priodonta*; серед гіллястовусих ракоподібних — *Moina rectirostris*, *Bosmina longirostris*, *Ceriodaphnia affinis*, серед веслоногих — *Cyclops* sp., їх наупліальні та копеподитні стадії розвитку.

За середньосезонними показниками розвиток зоопланктону у водоймі був на рівні 504,0 тис. екз./м³ за чисельністю та 2,65 г/м³ за біомасою. При цьому, основу біомаси (до 46%) становили веслоногі ракоподібні, основу чисельності (до 49,9%) складали коловертки. Частка гіллястовусих ракоподібних даного ставу складала за чисельністю 12,4%, за біомасою — 22,2% (табл. 3).

Найнижчі показники розвитку зоопланктону зафіксовані в кінці вегетаційного періоду вирощування риби — 1,07 г/м³, а найвищі — в середині червня — 3,54 г/м³.

Таблиця 3. Розвиток зоопланктону вирощувального ставу I фермерського господарства «Короп», 2016 р. $\frac{\text{тис. екз./м}^3}{\text{г/м}^3}$

Групи	Червень	Липень	Серпень	Середнє за вегет. період	%
<i>Rotifera</i>	<u>21,0</u> 0,05	<u>173,0</u> 0,41	<u>560,0</u> 0,45	<u>251,33</u> 0,30	<u>49,9</u> 11,4
<i>Cladocera</i>	<u>14,0</u> 0,53	<u>108,0</u> 0,72	<u>65,0</u> 0,52	<u>62,33</u> 0,59	<u>12,4</u> 22,2
<i>Copepoda</i>	<u>58,0</u> 1,51	<u>479,0</u> 2,05	<u>5,0</u> 0,1	<u>180,67</u> 1,22	<u>35,8</u> 46,0
Інші	<u>19,0</u> 1,45	<u>10,0</u> 0,17	<u>0</u> 0	<u>9,67</u> 0,54	<u>1,9</u> 20,4
Всього	<u>112,0</u> 3,54	<u>770,0</u> 3,35	<u>630,0</u> 1,07	<u>504,0</u> 2,65	<u>100</u> 100

Макрозообентос був представлений личинками хірономід, жуків та олігохетами. Кількісний розвиток зообентосу впродовж вегетаційного сезону змінювався в межах від 54 до 120 екз./м² за чисельністю та від 0,5 до 1,3 г/м² за біомасою (рис. 2).

Найвищі показники було зафіксовано у серпні: біомаса донних угруповань в цей період становила 1,3 г/м², а чисельність — 200 екз./м². Зниження показників чисельності до 90 екз./м² та біомаси до 0,8 г/м² зафіксовано у липні, що пов'язано з переходом майбутніх цьогоріток галицького коропа на кормову базу такого складу. Найнижчі показники спостерігалися також і у вересні, а саме 54 екз./м² за чисельністю та 0,5 г/м² за біомасою. Основу якісного складу зообентосу визначали представники родини *Chironomidae* (71%) та малощетинкові черви *Oligochaeta* (29%).

Рис. 2. Чисельність та біомаса зообентосу у вирощувальному ставу І порядку фермерського господарства «Короп»

Впродовж вегетаційного сезону для отримання цьоголіток галицького коропа в фермерському господарстві «Короп» проводилась підгодівля риби комбікормом «РГМ-111», з подальшим збільшенням добового раціону в другій половині вегетаційного сезону.

За зниження температури ставової води до 10 °С проводили осінні облови, протягом яких визначали вихід цьоголіток галицького коропа, їх середню масу та рибопродуктивність ставів. В кінці вегетаційного сезону було отримано 6,8 тис. екз. цьоголіток з 1 га ставової площі, середньою масою $96 \pm 7,5$ г. При цьому вихід становив 68%, а рівень загальної рибопродуктивності — 616 кг/га (табл. 4).

Таблиця 4. Ефективність вирощування цьоголіток на базі фермерського господарства «Короп» Львівської області

Показники	Значення
Площа вирощувального ставу, га	4
Густота посадки, тис. екз./га	10
Посаджено личинок, тис. екз.	40
Виловлено цьоголіток, тис. екз.	27,2
Рибопродуктивність, кг/га	652,8
Середня маса цьоголіток, г	$96 \pm 7,5$
Вихід цьоголіток, %	68
Витрати кормів на одиницю приросту маси риб, од.	2,5

Для здійснення контролю темпів росту проводили контрольні лови, під час яких рибу піддавали вимірюванню та зважуванню. Впродовж вегетаційного періоду цьоголітки характеризувалися швидким темпом росту, який у третій декаді липня почав зростати на фоні підвищення інтенсивності розвитку

зоопланктонних угруповань, насамперед, найважливіших за кормовою цінністю для цьоголіток галицького коропа. Спостерігалось уповільнення росту, починаючи з першої декади вересня, що пов'язано зі зниженням температури ставової води та фізіологічною підготовкою цьоголіток до майбутньої зимівлі.

Для оцінки швидкості росту використовували показник питомої швидкості росту за І. І. Шмальгаузенем. У цьоголіток галицького коропа за ставових умов Прикарпаття в період вегетаційного сезону питома швидкість росту характеризувалася певною динамікою. В період з другої декади липня до середини серпня спостерігалось збільшення швидкості росту. Найменша швидкість росту зафіксована на початку та в кінці вегетаційного сезону (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка вагового росту та питома швидкість росту цьоголіток галицького коропа

Для оцінки породних характеристик використовували показники екстер'єру. Так, цьоголітки в середині вегетаційного сезону мали коефіцієнт вгодованості $2,6 \pm 0,3$, що є достатньо високим показником на даному етапі (табл. 5).

Таблиця 5. Екстер'єрні показники цьоголіток галицького коропа, отримані на базі фермерського господарства «Короп» (n=10)

Дата	Маса, г			Квг	Показники екстер'єру			
	max	min	M±m		I/H	I/O	I/C	Iхв/ххв
15.07.2016	10,80	4,96	8,40±2,00	2,6±0,3	2,5±0,1	1,1±0,1	4,4±0,7	1,9±0,2
CV	—	—	27,3	12,7	7,1	9,5	15,9	15,0
σ	—	—	2,3	0,3	0,2	0,1	0,7	0,3
15.10.2016	116,00	70,00	95,50±7,50	3,0±0,2	2,6±0,03	1,1±0,1	3,3±0,1	1,4±0,2
CV	—	—	12,1	7,8	4,0	6,7	4,1	19,0
σ	—	—	11,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3

Перед зимівлею цей показник збільшився до $3,0 \pm 0,2$. Індекс голови на початку вегетаційного сезону знаходився на рівні $4,4 \pm 0,7$, в кінці вирощування спостерігалась динаміка до його зменшення $3,3 \pm 0,1$. Індекс високоспинності знаходився в межах від $2,5 \pm 0,1$ до $2,6 \pm 0,03$. Індекс обхвату тулуба становив $1,1 \pm 0,1$. Індекс хвостового стебла коливався в межах від 1,9 до 1,4, при цьому коефіцієнт варіації знаходився на достатньо високому рівні від 15 до 18%.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

В кінці вегетаційного сезону отримано цьоголіток галицького коропа в кількості 27,2 тис. екз. Вихід цьоголіток становив 68%. Середня маса отриманого рибопосадкового матеріалу складала $96 \pm 7,5$ г, що згідно нормативних значень є достатньо високим показником і зумовлена високим вмістом кормових об'єктів у вирощувальному ставу I порядку за період вегетаційного сезону, а також підгодовлею майбутніх цьоголіток комбікормами. Забезпечення високого рівня вагових кондицій є одним з визначальних чинників для забезпечення на оптимальному рівні зимового утримання рибопосадкового матеріалу коропа.

Згідно отриманих екстер'єрних показників, індекс високоспинності цьоголіток знаходився на рівні $2,60 \pm 0,03$, що свідчить про високоспинне тіло та м'ясну структуру, характерну для даного породного типу.

З метою подальшого вивчення рибогосподарських показників галицького коропа необхідно здійснити рибницько-біологічну оцінку дволіток та тріліток в умовах промислового вирощування у ставах Прикарпаття.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кузема А. И. Выведение новых карповых рыб методом отдаленной гибридизации / А. И. Кузема, В. Г. Томиленко // Рыбное хозяйство. — 1965. — Вып. 2. — С. 3—17.
2. Томиленко В. Г. Основные итоги селекционно-племенной работы по созданию украинского чешуйчатого нивчанского карпа / В. Г. Томиленко, А. П. Кучеренко // Технология производства рыбы : сб. научных трудов ВАСХНИЛ. — М. : Колос, 1974. — С. 105—114.
3. Олексієнко О. О. Внутрішньопорідна структура українських коропів / О. О. Олексієнко, І. І. Грициняк // Рибогосподарська наука України. — 2007. — № 1. — С. 21—27.
4. Томиленко В. Г. Новые внутривидовые типы украинских пород карпа / В. Г. Томиленко // Рыбное хозяйство. — 2000. — Вып. 56—57. — С. 35—45.
5. Кузема А. И. Украинские породы карпа / А. И. Кузема // Тр. совещания по вопросам прудового рыбоводства. — М., 1952. — С. 8—15.
6. Шерман І. М. Технологія виробництва продукції рибництва / І. М. Шерман, В. Г. Гаврилов. — К. : Вища освіта, 2007. — 351 с.
7. Мартышев Ф. Г. Выращивание рыбопосадочного материала / Ф. Г. Мартышев // Рыбоводство и рыболовство. — 1970. — № 6. — С. 12—14.
8. Поддубная А. В. Карп как продукт питания. Ориентиры для селекции / А. В. Поддубная // Генетика, селекция, племенное дело и воспроизводство рыб : Междунар. конф. : мат. — СПб., 2008. — С. 67—68.
9. Дука В. В. Історичні аспекти рибогосподарського використання масиву галицького коропа (огляд) / В. В. Дука, І. І. Грициняк // Рибогосподарська наука України. — 2016. — № 3 — С. 77—87.

10. Włodek J. M. Znaczenie praktyczne i hodowlane systematyki zoologicznej (rasy, odmiany) karpia / Włodek J. M. — Kraków : Olsztyn, 1973. — 16 s.
11. Алекин О. А. Руководство по химическому анализу вод суши / Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. — Л. : Гидрометеиздат, 1973. — 262 с.
12. Сяра Я. И. Методические указания по гидрохимическим исследованиям в прудовых рыбных хозяйствах / Сяра Я. И. — Львов : Вільна Україна, 1978. — 17 с.
13. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция. — Л., 1982. — 51 с.
14. Галасун П. Т. Рыбоводно-биологический контроль в прудовых хозяйствах / Галасун П. Т. — М. : Пищевая промышленность, 1976. — 127 с.
15. Шмальгаузен И. И. Определение основных понятий и методика исследования роста / И. И. Шмальгаузен // Рост животных. — М., 1935. — С. 8—60.

REFERENCES

1. Kuzema, A. I., & Tomilenko, V. G. (1965). Vyvedenie novykh karpovykh ryb metodom otdalennoy gibridizatsii. *Rybnoe khozyaystvo*, 3-17.
2. Tomilenko, V. G., & Kucherenko A. P. (1974). Osnovnye itogi selektsionno-plemennoy raboty po sozdaniyu ukrainskogo cheshuychatogo nivchanskogo karpa. *Tekhnologiya proivodstva ryby : sb. nauchnykh trudov VASKhNIL*, Moskva, 105-114.
3. Oleksiyenko, O. O., & Hrytsynyak I. I. (2007). Vnutrishnoporidna struktura ukrayinskykh koropiv. *Rybohospodarska nauka Ukrayiny*, 1, 21-27.
4. Tomilenko, V. G. (2000). Novye vnutriporodnye tipy ukrainskikh porod karpa. *Ribne gospodarstvo*, 56-57, 35-45.
5. Kuzema, A. I. (1952). Ukrainskie porody karpa. *Tr. soveshchaniya po voprosam prudovogo rybovodstva*. Moskva, 8-15.
6. Sherman, I. M., & Havrylov, V. H. (2007). *Tekhnolohiya vyrobnytstva produktsiyi rybnytstva*. Kyiv : Vyshcha osvita.
7. Martyshev, F. G. (1970). Vyrashchivanie ryboposadochnogo materiala. *Rybovodstvo i rybolovstvo*, 6, 12-14.
8. Poddubnaya, A. V. (2008). Karp kak produkt pitaniya. Orientiry dlya selektsii. *Genetika, selektsiya, plemennoe delo i vosproizvodstvo ryb : Mezhdunar. konf. : mat.*, 67-68.
9. Gurbyk, V. V., & Hrytsynyak, I. I. (2016). Istorychni aspekty rybohospodars'koho vykorystannya masyvu halyts'koho koropa (ohlyad). *Rybohospodarska nauka Ukrayiny*, 3, 77-87.
10. Włodek, J. M. (1973). *Znaczenie praktyczne i hodowlane systematyki zoologicznej (rasy, odmiany) karpia*. Kraków ; Olsztyn.
11. Alekin, O. A., Semenov, A. D., & Skopintsev, B. A. (1973). *Rukovodstvo po khimicheskomu analizu vod sushi*. Leningrad : Gidrometeoizdat.
12. Syara, Ya. I. (1978). *Metodicheskie ukazaniya po gidrokhimicheskim issledovaniyam v prudovykh rybnykh khozyaystvakh*. Lvov: Vil'na Ukraina.
13. *Metodicheskie rekomendatsii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskikh issledovaniyakh na presnovodnykh vodoemakh. Zoobentos i ego produktsiya*. (1982). Leningrad.
14. Galasun, P. T. (1976). *Rybovodno-biologicheskii kontrol' v prudovykh khozyaystvakh*. Moskva: Pishchevaya promyshlennost.
15. Shmalgauzen, I. I. (1935). Opredelenie osnovnykh ponyatiy i metodika issledovaniya rosta. *Rost zhivotnykh*, 8-60.

РЫБОВОДНО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЕГОЛЕТОК ГАЛИЦИЙСКОГО КАРПА В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ В ПРУДАХ ПРИКАРПАТТЯ

И. И. Грициняк, info@ifr.com.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
В. В. Гурбик, dukavv@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
А. Н. Базаева, a_bazaeva@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
Н. П. Чужма, n_chuzhma@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Провести анализ рыбохозяйственных и биологических показателей сеголеток галицийского карпа в условиях промышленного выращивания в прудах Прикарпаття.

Методика. Работы выполнялись в соответствии с общепринятыми методиками в рыбоводстве и селекции. В период выращивания сеголеток галицийского карпа проводили контроль абиотических факторов в опытном пруду.

Результаты. Согласно гидрохимическим исследованиям, вода выростного пруда относилась к гидрокарбонатному классу группы кальциевых вод, что характерно для природных вод данной физико-географической зоны. Видовой спектр растительного планктона в начале исследований был представлен 39 видами и внутривидовыми таксонами, а в конце периода опытов — 36 видами и внутривидовыми таксонами. Основу видового состава фитопланктона определяли зеленые водоросли. Основу биомассы зоопланктона (до 46%) составляли веслоногие ракообразные, численности (до 49,9%) — коловратки. В выростном пруду показатели количественного развития зообентоса находились в пределах 54–120 экз./м² по численности и 0,5–1,3 мг/м² по биомассе. В качественном составе основными представителями были малощетинковые черви и представители рода *Chironomidae*.

Плотность посадки рыб в выростной пруд I порядка составляла 10 тыс. экз./га; рыбопосадочный материал представлен личинками галицийского карпа. В конце вегетационного сезона получено 27,2 тыс. экз. сеголеток, выход которых находился на уровне 68%. Средняя индивидуальная масса составляла $96 \pm 7,5$ г, коэффициент вариации находился на уровне 12%. При оценке динамики весового роста наблюдался пик в I декаде августа, в то время как показатель удельной скорости роста по И. И. Шмальгаузену получил свое наибольшее значение в III декаде июля. Для оценки породных характеристик использовали показатели экстерьера. Так, сеголетки в середине вегетационного сезона имели коэффициент упитанности $2,6 \pm 0,3$, что является достаточно высоким для них показателем. Перед зимовкой он увеличился до $3,0 \pm 0,2$. Индекс головы в начале вегетационного сезона находился на уровне $4,4 \pm 0,7$, в конце выращивания наблюдалась динамика к уменьшению $3,3 \pm 0,1$. Коэффициент вариации этого показателя находился в пределах от 4 до 15%, что свидетельствует о его разнообразии. Индекс высокостинности находился в пределах от $2,5 \pm 0,1$ до $2,6 \pm 0,03$. Индекс обхвата составил $1,1 \pm 0,1$. Индекс хвостового стебля колебался в пределах от 1,9 до 1,4, при этом коэффициент вариации находился на достаточно высоком уровне — от 15 до 18%. Согласно полученным результатам исследований, рыбохозяйственные показатели сеголеток галицийского карпа были выше нормативных значений.

Научная новизна. Впервые рассмотрены основные рыбоводно-биологические показатели сеголеток галицийского карпа. Дана оценка динамике экстерьерных показателей объекта исследований в течение сезона выращивания. Проведена характеристика сеголеток галицийского карпа в условиях промышленного выращивания в прудах Прикарпаття.

Практическая значимость. Промышленное выращивание сеголеток галицийского карпа даст возможность получить высококачественный материал для дальнейшего получения двухлеток, а также позволит повысить показатели рыбопродуктивности в прудовых хозяйствах на Прикарпатье.

Ключевые слова: рыбоводно-биологические показатели, промышленное выращивание, рыбохозяйственная характеристика, удельная скорость роста, галицийский карп.

TECHNICAL AND BIOLOGICAL EVALUATION
OF GALICIAN CARP YOUNG-OF-THE-YEAR IN THE CONDITIONS OF
INDUSTRIAL REARING IN THE PONDS OF SUBCARPATHIA

I. Hrytsyniak, info@if.org.ua, Institute for Fisheries NAAS, Kyiv
V. Hurbyk, dukavv@if.org.ua, Institute for Fisheries NAAS, Kyiv
A. Bazaieva, a_bazaeva@ukr.net, Institute for Fisheries NAAS, Kyiv
N. Chuzhma, n_chuzhma@ukr.net, Institute for Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose To analyze technical and biological parameters of Galician carp young-of-the-year in the conditions of their commercial rearing in Subcarpathia ponds.

Methodology. The works have been performed in accordance with conventional techniques in fish farming and selective breeding. During the rearing of Galician carp yearlings, a monitoring of abiotic factors in the experimental pond has been carried out.

Findings. According to hydrochemical analysis, pond water belonged to hydrocarbonate class of calcium water and a type, which is typical for natural waters of this physical-geographic area. The species composition of phytoplankton at the beginning of the study was represented by 39 species and intraspecific taxa, in the middle of the experiment — 33, and 36 species and intraspecific taxa at the end of the study period. The majority of phytoplankton species composition was represented by green algae. The majority of zooplankton biomass (up 46%) was represented by copepods, while rotifers dominated by abundance (up 49.9%). The parameters of zoobenthos development in the rearing pond ranged within 54–120 ind./m² by abundance and 0.5–1.3 g/m² by biomass. The most abundant zoobenthic organisms were Chironomidae (71%) and Oligochaeta (29%).

Fish stocking density in the rearing pond of the 1st order was 10 thousand fish/ha; fish seeds were represented by Galician carp larvae. At the end of the growing season, 27.2 thousand young-of-the-year were obtained, the survival rate was 68%. Mean individual weight was 96±75 g, coefficient of variation was 12%. When assessing the dynamics of weight growth, its peak was observed in the first week of August, while the specific growth rate had maximum values in the third week of July. Exterior parameters were used to evaluate strain characteristics. In the middle of the growing season, the young-of-the-year had mean condition factor of 2.6±0.3, which was high enough for them. Before wintering, this value increased to 3.0±0.2. The head index at the beginning of the growing season was 4.4±0.7, at the end of the growing season it decreased to 3.3±0.1. The body depth index index ranged from 2.5±0.1 to 2.6±0.03. The body girth index was 1.1±0.1. The caudal peduncle ranged from 1.9±0.2 to 1.4±0.2, while the coefficient of variation was 15% to 18%. According to the obtained results, the technical parameters of Galician carp young-of-the-year were higher than normative values.

Originality. For the first time we evaluated the basic technical and biological parameters of Galician carp young-of-the-year. The assessment of exterior parameters of the study object during the growing season was provided. The evaluation of Galician carp young-of-the-year in the conditions of commercial rearing in Subcarpathiam ponds was performed.

Practical value. Industrial cultivation Galician carp young-of-the-year will provide an opportunity to produce high-quality material for further production of age-2 fish as well as will allow increasing fish productivity parameters in pond fish farms in the Subcarpathiam region.

Keywords: Galician carp, industrial growing, fisheries characteristics, specific growth rate.

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 52-63
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.052>
УДК 639.371.2:639.212.3.03 (477.7)

СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОЩУВАННЯ РЕМОНТНИХ ЦЬОГОЛІТОК ОСЕТРОПОДІБНИХ РИБ (*ACIPENSERIFORMES*) В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Є. М. Алхімов, nikolo777@ukr.net, Херсонський державний аграрний університет,
м. Херсон

В. Ю. Шевченко, shevchencodejerson@gmail.com, Херсонський державний
аграрний університет, м. Херсон

Мета. Вивчити та проаналізувати сучасний стан вирощування ремонтних цьоголіток осетроподібних риб, зокрема стерляді і веслоноса, в умовах Виробничо-експериментального Дніпровського осетрового рибовідтворювального заводу, розташованого на півдні України.

Методика. Поставлені завдання при вирощуванні ремонтних цьоголіток осетроподібних риб у ставах в умовах півдня України вирішувались за загальноприйнятими у гідрохімії, гідробіології та рибицтві методами. Отримані результати за показниками умов середовища дослідних ставів опрацьовані з використанням статистичних методів обробки та аналізу даних, що дає підстави вважати їх достовірними.

Результати. Дослідженнями встановлено, що фізико-хімічні параметри води у ставах господарства відповідали діючим у ставовому рибицтві нормативам; наявний рівень розвитку природної кормової бази був задовільним для вирощування ремонтного матеріалу осетроподібних. Результати вирощування осетроподібних в моно- та полікультурі однозначно свідчать на користь полікультури, що може бути використане в рибицькій практиці.

Наукова новизна. В специфічних умовах півдня України вперше досліджено вплив еколого-технологічних чинників на вирощування ремонтних цьоголіток осетроподібних риб (стерляді та веслоноса). Поглиблено дані щодо особливостей вирощування ремонтного матеріалу осетроподібних риб в умовах моно- та полікультури.

Практична значимість. Отримані результати вирощування можуть бути використані в рибицькій практиці в якості прикладу для оцінки екологічної ситуації в ставах. Вирощування ремонтних цьоголіток осетроподібних у полікультурі дозволяє повніше використовувати природну кормову базу, підвищити продуктивність водойм та ефективно використовувати вирощувальні площі господарств.

Ключові слова: цьоголітки, стерлядь, веслоніс, фізико-хімічний режим, гідробіологічний режим, монокультура, полікультура.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Представники ряду осетроподібних (*Acipenseriformes*), завдяки своїм рибогосподарським та споживчим характеристикам, є незаперечно бажаними компонентами їхтіофауни як природних акваторій, так і штучних водойм різного походження та цільового призначення.

В останній час відбулось різке скорочення запасів осетроподібних в природних водоймах. У зв'язку з цим, діяльність поки що єдиного

© Є. М. Алхімов, В. Ю. Шевченко, 2017

в Україні Виробничо-експериментального Дніпровського осетрового рибовідтворювального заводу (ВЕДОРЗ), що розташований на півдні України, спрямована на виробництво рибопосадкового матеріалу для зарибнення водойм. Таким чином, завдяки діяльності заводу можна забезпечити реконструкцію їхтїофауни та відновлення чисельності осетроподібних у промислових масштабах [1–2]. Ефективне вирішення завдання з отримання необхідної кількості якісного посадкового матеріалу можливе за умов створення високоякісних стад плідників, що, в свою чергу, тісно пов'язане з наявністю якісного ремонтного матеріалу різних вікових груп, та зокрема ремонтних цьоголіток. Початкові етапи вирощування ремонту багато в чому визначають подальшу ефективність процесу. Саме на цих етапах закладаються перспективи реалізації потенційних можливостей росту, дозрівання риб та особливості їх вступу в процес відтворення.

Ефективність вирощування ремонтних цьоголіток веслоноса та стерляді істотним чином залежить від чинників зовнішнього середовища. У цьому зв'язку, одним з важливих моментів при вирощуванні цьоголіток осетроподібних риб є контроль фізико-хімічного та гідробіологічного режимів ставів, особливостей росту риб та накопичення ними маси, від яких залежить їх загальний фізіологічний стан, готовність до зимівлі, стійкість до несприятливих чинників середовища [3–6].

Для того, щоб найповніше використати природну кормову базу і підвищити продуктивність водойм, у рибистві застосовують спільне вирощування різних видів і різних вікових груп риб. Полікультура є одним з найефективніших методів інтенсифікації. Традиційно вирощування осетроподібних в заводських умовах здійснюється в монокультурі [7–9] або в полікультурі з традиційними об'єктами ставової аквакультури, про що є відповідні рекомендації [10–13]. Питання застосування полікультури з використанням осетроподібних різного спектру живлення залишається маловивченим.

На всі ці аспекти свій відбиток накладають особливості конкретних господарств, розташованих у відповідних ґрунтово-кліматичних умовах, що вимагає адаптації наявних рекомендацій та технологій.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Незаперечний інтерес мають особливості вирощування ремонтних цьоголіток осетроподібних риб з різними спектрами живлення в умовах монокультури та полікультури. Важливим аспектом цієї проблеми є вивчення умов конкретного господарства відповідної ґрунтово-кліматичної зони, що було обрано за мету роботи.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проводилися в умовах ВЕДОРЗ впродовж 2013–2015 рр. Експериментальним матеріалом були ремонтні групи цьоголіток стерляді та веслоноса. Вирощування відбувалося в монокультурі та полікультурі. При вирощуванні в монокультурі були задіяні стави: в 2013 р. — №№ 8, 10, 15, 16, в 2014 р. — №№ 14, 15. При вирощуванні в полікультурі були задіяні стави: в 2013 р. — № 9, в 2014 р. — №№ 16, 17, в 2015 р. — №№ 8, 9.

Упродовж вегетаційних сезонів здійснювали контроль фізико-хімічних та гідробіологічних параметрів середовища. Відбір проб для фізико-хімічного та гідробіологічного аналізу проводили за загальноприйнятими методиками [14–16]. Упродовж періоду досліджень кількість відібраних проб на дослідження фізико-хімічного режиму у 2013 р. склала 65 шт., у 2014 р. — 40 шт., у 2015 р. — 24 шт. На дослідження гідробіологічного режиму було відібрано загалом 387 проб, з яких по 129 проб для дослідження фітопланктону, зоопланктону і зообентосу.

У 2015 р. з метою вивчення трофічних взаємовідносин осетроподібних риб у полікультурі вивчали їхній спектр живлення [17–18].

Підсумкова оцінка результатів вирощування ремонтних цьоголіток осетроподібних риб базувалася на таких показниках: рибопродуктивність ставів, вихід з вирощування, середня маса особин, що були отримані за загальновизнаними в рибицтві методиками.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Протягом періоду досліджень температура води експериментальних ставів коливалася в залежності від динаміки температури повітря. Основні середні параметри фізико-хімічного режиму експериментальних ставів при вирощуванні риб в моно- та полікультурі наводяться в табл. 1.

Таблиця 1. Середні фізико-хімічні показники в ставах господарства

Показник	Монокультура		Полікультура		
	Рік досліджень				
	2013	2014	2013	2014	2015
Температура, °C	21,88±0,97	23,05±0,77	21,88±0,97	23,05±0,51	23,76±0,21
Кисень, мгО ₂ /дм ³	7,75±0,09	8,53±0,07	7,83±0,42	8,63±0,098	9,98±0,24
pH	8,18±0,05	7,01±0,04	8,26±0,19	6,75±0,28	6,70±0,05
Перманганатна окиснюваність, мгО/дм ³	16,20±0,29	18,96±0,33	16,59±2,06	20,12±0,88	18,31±0,15
Загальний азот, N, мг/дм ³	1,71±0,10	1,44±0,08	1,46±0,22	1,79±0,07	1,77±0,29
Загальний фосфор, P, мг/дм ³	0,09±0,01	0,13±0,01	0,12±0,04	0,11±0,02	0,11±0,01

З отриманих даних видно, що вміст розчиненого у воді кисню був сприятливим для росту і розвитку осетроподібних риб, коливаючись за роками від 7,75 до 9,98 мгО₂/дм³. Водневий показник загалом також характеризувався прийнятним рівнем за вирощування в моно- та полікультурі; його середньорічні показники перебували у межах 6,75–8,26. Аналізуючи загальну кількість мінерального азоту у воді ставів, слід відмітити, що його середньосезонні показники знаходилися у межах від 1,44 до 1,79 мг/дм³. Середньосезонні значення загального фосфору у ставах були в межах 0,09–0,13 мг/дм³.

Аналіз переважної більшості параметрів, що досліджувались, свідчить про задовільний стан середовища ставів, але концентрація біогенних елементів — азоту та фосфору (N і P) — викликає певну занепокоєність, щодо доцільності підвищення рівня застосування добрив [19].

Дослідження особливостей розвитку фітопланктону показали, що його видовий склад в експериментальних ставах суттєво не відрізнявся і був представлений синьозеленими, зеленими, діатомовими та евгленовими водоростями. Найбільш чисельними були представники родів: *Aphanizomenon*, *Anabaena*, *Oscillatoria*, *Microcystis*, *Merismopedia*, *Scenedesmus*, *Nitzschia*, *Trachelomonas*.

Біомаса фітопланктону в експериментальних ставах при вирощуванні цьоголіток в моно- та полікультурі впродовж сезонів коливалася від 8,2 до 18,2 мг/дм³, а середньосезонні показники перебували в межах 9,29–15,55 мг/дм³ (табл. 2).

Таблиця 2. Середні показники біомаси основних компонентів природної кормової бази в експериментальних ставах

Показники	Монокультура		Полікультура		
	Рік досліджень				
	2013	2014	2013	2014	2015
Фітопланктон, мг/дм ³	9,70±0,82	15,55±2,63	9,29±0,75	13,22±1,80	12,96±0,49
Зоопланктон, г/м ³	7,04±0,82	7,76±0,05	6,45±1,49	12,20±2,09	9,71±0,70
Зообентос, г/м ²	3,13±0,79	0,19±0,15	1,54±0,40	0,26±0,18	4,81±0,27

Слід відмітити, що біомаса фітопланктону в експериментальних ставах мала яскраво виражений максимум, який спостерігався протягом другої декади після їх залиття. Загалом, якісний склад та кількісний розвиток фітопланктону разом з оптимальним газовим режимом у ставах створювали сприятливі умови для життєдіяльності гідробіонтів.

Видовий склад зоопланктону експериментальних ставів був представлений групами *Cladocera*, *Copepoda* та *Rotatoria*, також траплялися в незначній кількості *Branchiopoda* і *Ostracoda*.

Основу біомаси складали представники гіллястовусих ракоподібних, такі як *Daphnia longispina*, *D. pulex*. На початку вегетаційного сезону із гіллястовусих домінували *Ceriodaphnia*. Основними представниками веслоногих ракоподібних були *Cyclops* sp. та їхні науплії. За біомасою провідну роль у всіх ставах відігравали *Cladocera* та *Copepoda*. *Rotatoria* не складала в загальній біомасі зоопланктону істотної частки. Розвиток зоопланктону носив спалахоподібний характер у зв'язку з життєвими циклами домінуючих організмів та рівнем виїдання їх об'єктами культивування — осетроподібними.

Біомаса зоопланктону в експериментальних ставах упродовж сезонів коливалася від 3,18 до 21,00 г/м³, а її середньосезонні показники складали 6,45–12,20 г/м³. Слід відмітити, що в 2014 р., за вирощування в полікультурі, середньосезонна біомаса зоопланктону була майже вдвічі вищою, ніж при вирощуванні в монокультурі, складаючи 12,20 г/м³ проти 7,76 г/м³. Це може пояснюватись сприятливішими умовами, що виникають за наявності у водоймі риб з різним спектром живлення.

Наявний рівень розвитку зоопланктону експериментальних ставів можна вважати задовільним для вирощування ремонтного матеріалу осетроподібних риб. Середньосезонна біомаса зоопланктону перевищувала 5 г/м³, тобто величину, рекомендовану як достатню для забезпечення харчових потреб [20] такого об'єкта як типовий зоопланктофаг — веслоніс.

Дослідження розвитку зообентосу у ставах показали, що видовий склад був представлений в основному личинками *Chironomidae* при незначній кількості дрібних *Oligochaeta*. Останні зустрічалися не в кожній пробі, не створюючи істотної біомаси.

Біомаса зообентосних організмів в експериментальних ставах при вирощуванні ремонтних цьоголіток в моно- та полікультурі упродовж сезонів коливалася від 0,03 до 6,23 г/м², а середньосезонні показники становили 0,19–4,81 г/м².

Отримані дані свідчать про достатньо динамічний характер розвитку компонентів кормової бази в експериментальних ставах при вирощуванні ремонтних цьоголіток осетроподібних в моно- та полікультурі. Так, в розвитку планктонних організмів спостерігається два підйоми — в червні та другій–третьій декадах серпня. В розвитку зообентосу — один підйом — в третій декаді липня. Вочевидь, розвиток фітопланктону стримувався недостатньою концентрацією біогенних елементів. Тим не менше, середньосезонні показники розвитку компонентів кормової бази були на достатньому рівні, аби забезпечити потреби в природних кормах цьоголіток осетроподібних риб. В умовах полікультури спостерігаються кращі показники розвитку кормової бази, про що свідчать показники розвитку зоопланктону.

В процесі вирощування експериментальних груп цьоголіток в ставах проводилося вивчення характеру живлення риб. На рис. 1–2 представлений середній склад харчової грудки цьоголіток стерляді та веслоноса при вирощуванні в полікультурі.

Аналізуючи рис. 1 можна сказати, що харчова грудка цьоголіток стерляді складалась, переважно, з детриту — 47,3%, зоопланктону — 35,1% та зообентосу — 14,3%. Як видно з рис. 2, основу харчової грудки веслоноса складала представники зоопланктону, яким належало близько 85,7% маси, та детрит, який становив до 12,9% маси харчової грудки.

У цьому зв'язку, порівнюючи спектри живлення стерляді та веслоноса у складі полікультури ставів, слід зазначити, що гострої конкуренції у живленні не відмічалось. Індекс харчової схожості склав 49,4, що свідчить про достатньо високу різницю в спектрах живлення.

Рис. 1. Склад харчової грудки цьоголіток стерляді, %

Рис. 2. Склад харчової грудки цьоголіток веслоноса, %

Слід відмітити, що середня маса стерляді при посадці на вирощування в умовах монокультури була вищою, ніж в умовах полікультури, складаючи відповідно $53,8 \pm 2,92$ мг проти $51,3 \pm 0,93$ мг. Середня маса веслоноса при цьому дорівнювала в умовах монокультури $276,5 \pm 2,51$ мг, а за полікультури — $281,3 \pm 2,34$ мг. У результаті вирощування стерляді в умовах монокультури її середня маса була вищою у порівнянні з такою, отриманою в умовах полікультури, складаючи відповідно $0,04 \pm 0,04$ кг проти $0,029 \pm 0,03$ кг. Середня маса веслоноса при цьому також в умовах монокультури була вищою, дорівнюючи $0,103 \pm 0,01$ кг, а в умовах полікультури $0,090 \pm 0,02$ кг. Результати вирощування осетроподібних риб у експериментальних ставах господарства представлені у табл. 3.

Таблиця 3. Результати вирощування цьоголіток осетроподібних риб

№ ставів	Площа, га	Вид риби	Посаджено		Виловлено		Вихід, %	Рибопродуктивність, кг/га
			екз./га	сер. маса, мг	екз./га	сер. маса, кг		
монокультура								
8	2	Ст*	500	47	329,5	0,051	65,90	16,8
10	2	Ст	500	52	356,5	0,049	71,30	17,5
15	2	Ст	12500	55	2922,5	0,034	23,38	99,4
16	2	Вн*	3000	279	1046,0	0,102	34,87	106,7
14	2	Ст	5000	61	2564,0	0,043	51,28	110,3
15	2	Вн	3000	274	1456,0	0,104	48,52	151,4
полікультура								
		Ст	6250	51	1640,5	0,019	26,25	31,2
9	2	Вн	2500	285	748,0	0,088	29,92	65,8
Всього			8750	-	-	-	-	97

Продовження табл. 3

№ ста- вів	Пло- ща, га	Вид риби	Посаджено		Виловлено		Вихід, %	Рибопро- дуктив- ність, кг/га
			екз./га	сер. маса, мг	екз./га	сер. маса, кг		
16	2	Ст	7500	50	2259,0	0,039	30,12	88,10
		Вн	2500	282	821,0	0,095	32,84	78,00
		Всього	10000	-	-	-	-	166,10
17	2	Ст	12500	53	4361,0	0,029	34,88	126,50
		Вн	2500	277	491,0	0,087	19,64	42,70
		Всього	15000	-	-	-	-	169,20
8	2	Ст	3000	55	1923,0	0,039	64,10	75,00
		Вн	1500	302	982,0	0,109	65,47	107,04
		Всього	4500-	-	-	-	-	182,04
9	2	Ст	3500	53	2178,5	0,036	62,24	78,43
		Вн	1500	284	863,0	0,112	57,53	96,66
		Всього	5000	-	-	-	-	175,08

*Примітка. Ст — стерлядь, Вн — веслоніс.

Аналізуючи результати вирощування осетроподібних, можна сказати, що у стерляді нормативний вихід спостерігався тільки в монокультурі при розріджених посадках, складаючи 65,9–71,3%. При високих щільностях посадки (5 000 та 12 500 екз./га), вихід був нижчим, ніж нормативний, та складав 51,28 та 23,38% відповідно. Веслоніс за щільності посадки 3000 екз./га демонстрував високий вихід з вирощування — 34,87 та 48,52%.

За утримання ремонтних цьоголіток у полікультурі оптимальним був варіант, за якого щільність посадки склала 10000 екз./га, при цьому відсоток стерляді у полікультурі становив 75%, а веслоноса — 25%. Рибопроодуктивність у цьому варіанті сягала 166,1 кг/га. Слід зазначити, що у всіх варіантах полікультури вихід з вирощування характеризувався меншим коливанням показників, коливаючись у стерляді в межах 26,25–34,88%, а у веслоноса — 19,64–32,84%.

Середні показники вирощування графічно зображені на рис. 3.

Відсоток виходу з вирощування, середня маса та рибопроодуктивність за окремими видами були вищими в монокультурі, окрім рибопроодуктивності стерляді, яка у монокультурі склала 61,0 кг/га, а у полікультурі — 81,9 кг/га.

Рис. 3. Узагальнені результати вирощування ремонтних цьоголіток стерляді та веслоноса

Слід зазначити, що за більшістю показників за окремими видами риб спостерігається перевага монокультури. Проте при цьому загальна рибопродуктивність вища в умовах полікультури.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Фізико-хімічні параметри води у ставах господарства загалом відповідали існуючим загальноприйнятим у ставовому рибництві нормативам, та були достатньо сприятливим для культивування осетроподібних риб. Нестача біогенних елементів у хімічному складі води ставів дає підстави для використання добрив в процесі вирощування риби.

Наявний рівень розвитку елементів природної кормової бази можна вважати задовільним для вирощування ремонтного молодняку риб. Слід відзначити кращий розвиток зоопланктону за використання полікультури осетроподібних.

Спектри живлення об'єктів культивування вказують на відсутність напруженої конкуренції, що робить використання полікультури перспективним заходом інтенсифікації.

За більшістю рибогосподарських показників за окремими видами спостерігається перевага монокультури. Перевага рибопродуктивності стерляді в умовах полікультури є свідченням позитивного взаємного впливу риб-споживачів різних трофічних рівнів.

В умовах полікультури спостерігається істотна перевага за показником загальної рибопродуктивності, що однозначно вказує на перспективність цього заходу в сенсі істотного підвищення ефективності використання ставових площ для вирощування ремонтних цьоголіток.

Подальші дослідження повинні бути орієнтованими на отримання аналогічних даних в інших умовах культивування та для інших вікових груп

осетрових риб, а також на з'ясування оптимальних щільностей посадок та рівня інтенсифікації для вирощування високоякісного ремонтного матеріалу досліджуваних видів риб.

ЛІТЕРАТУРА

1. Алхімов Є. М. До питання про актуальність ведення селекційно-племінної роботи на базі ВЕДОРЗ / Є. М. Алхімов, В. Ю. Шевченко // Таврійський науковий вісник. — 2013. — Вип. 84. — С. 235—237.
2. Алхімов Є. М. Результати вирощування мальків-покатників осетрових для зариблення Нижнього Дніпра / Є. М. Алхімов, В. Ю. Шевченко // Таврійський науковий вісник. — 2014. — Вип. 89. — С. 155—159.
3. Еколого-технологічні основи відтворення і вирощування молоді осетроподібних : монографія / [Шерман І. М., Шевченко В. Ю., Корнієнко В. О., Ігнатов О. В.]. — Херсон : Олді-плюс, 2009. — 348 с.
4. Онученко О. В. Основи рибогосподарського освоєння веслоноса (*Polyodon spathula* (Walbaum)) / Онученко О. В., Третяк О. М., Кулешов О. В. — К. : Вища освіта, 2003. — 111 с.
5. Біологічна характеристика та технологічні прийоми культивування додаткових і нетрадиційних об'єктів рибицтва / О. М. Третяк, І. І. Грициняк, В. М. Коцюба [та ін.] // Фермерське рибицтво. — К. : Герб, 2008. — С. 333—361.
6. Третяк О. М. Веслоніс / О. М. Третяк // Організація селекційно-племінної роботи в рибицтві. — К. : ІРГ УААН, 2006. — С. 149—185.
7. Шевченко В. Ю. Досвід культивування веслоноса на півдні України / В. Ю. Шевченко, В. О. Корнієнко // Рибе господарство України. — 2002. — № 5. — С. 23—24.
8. К вопросу о культивировании веслоноса на юге Украины / В. Ю. Шевченко, В. А. Корниенко // Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре : II междунар. симп. : матер. докл. — Адлер—Краснодар, 1999. — С. 119—120.
9. К вопросу о формировании ремонтных стад веслоноса в хозяйствах Украины / И. М. Шерман, В. Ю. Шевченко, В. А. Корниенко // Пресноводная аквакультура в Центральной и Восточной Европе: достижения и перспективы : междунар. науч.-практ. конф. : матер. докл. — К., 2000. — С. 58—60.
10. Онученко О. В. Рибицько-біологічні основи відтворення веслоноса в умовах повносистемних ставових господарств України (на прикладі відкритого акціонерного товариства «Черкасирибгосп») : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.03 «Рибицтво» / О. В. Онученко. — К., 2003. — 20 с.
11. Выращивание производителей и разведение веслоноса (предварительные рекомендации) / [Виноградов В. К., Мельченков Е. А., Ерохина Л. В. и др.]. — М. : ВНИИПРХ, 1986. — 21 с.
12. Гринжевський М. В. Оптимізація виробництва продукції аквакультури / М. В. Гринжевський, А. В. Пекарський. — К. : ПоліграфКонсалтинг, 2004. — 328 с.
13. Гринжевський М. В. Ефективність ставової полікультури / М. В. Гринжевський, Й. Є. Янінович, Т. М. Швець // Рибогосподарська наука України. — 2008. — № 2. — С. 41—45.

14. Алекин О. А. Руководство по химическому анализу вод суши / Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. — Л. : Гидрометеиздат, 1973. — 262 с.
15. Кражан С. А. Естественная кормовая база водоемов и методы ее определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства / С. А. Кражан, Л. И. Лупачева. — Львов : Редакционно-издательский отдел областного управления по печати, 1991. — 102 с.
16. Жадин В. И. Изучение донной фауны водоемов / Жадин В. И. — М. : АН СССР, 1950. — 30 с.
17. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб / Правдин И. Ф. — М. : Пищевая промышленность, 1979. — 120 с.
18. Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях. — М. : Наука, 1974. — 254 с.
19. Харитоновна Н. Н. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства / Харитоновна Н. Н. — К. : Наукова думка, 1984. — 196 с.
20. Анализ бассейнового выращивания молоди осетровых рыб на ОРЗ «Донской» в связи с проблемой формирования ремонтно-маточных стад / Э. А. Савельева, Л. Т. Горбачева, В. П. Чихичев [и др.] // Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоемов Азово-Черноморского бассейна : сборник научных трудов АЗНИИРХ (2000–2001 гг.). — М. : Вопросы рыболовства, 2002. — С. 482–491.

REFERENCES

1. Alkhimov, Ye. M., & Shevchenko, V. Yu. (2013). Do pytannia pro aktualnist vedennia selektsiino-pleminnoi roboty na bazi VEDORZ. *Tavriiskyi naukovyi visnyk*, 84, 235-237.
2. Alkhimov, Ye. M., & Shevchenko, V. Yu. (2014). Rezultaty vyroshchuvannia malkiv-pokatnykiv osetrovykh dlia zaryblennia Nyzhnoho Dnipra. *Tavriiskyi naukovyi visnyk*, 89, 155-159.
3. Sherman, I. M., Shevchenko, V. Yu., Korniienko, V. O., & Ihnatov, O. V. (2009). *Ekoloho-tekhnologichni osnovy vidtvorennia i vyroshchuvannia molodi osetropodibnykh: monohrafiia*. Kherson : Oldi-plus.
4. Onuchenko, O. V., Tretiak, O. M., & Kuleshov, O. V. (2003). *Osnovy rybohospodarskoho osvoinnia veslonosa (Polyodon spathula (Walbaum))*. Kyiv : Vyshcha osvita.
5. Tretiak, O. M., Hrytsyniak, I. I., Kotsiuba, V. M., & Hankevych, B. O. (2008). Biologichna kharakterystyka ta tekhnologichni priomy kultyvuvannia dodatkovykh i netradytsiinykh ob'ektiv rybnytstva. *Fermerske rybnytstvo*. Kyiv, 333-361.
6. Tretiak, O. M. (2006). Veslonis. *Orhanizatsiia selektsiino-pleminnoi roboty v rybnytstvi*. Kyiv, 149-185.
7. Shevchenko, V. Yu., & Korniienko, V. O. (2002). Dosvid kultyvuvannia veslonosa na pivdni Ukrainy. *Rybne hospodarstvo Ukrainy*, 5, 23-24.
8. Shevchenko, V. Yu., & Kornienko, V. A. (1999). K voprosu o kul'tivirovanii veslonosa na yuge Ukrainy. *Resursoberegayushchie tekhnologii v akvakul'ture : II mezhdunar. simp.* Adler–Krasnodar, 119-120.
9. Sherman, I. M., Shevchenko, V. Yu., & Kornienko, V. A. (2000). K voprosu o formirovanii remontnykh stad veslonosa v khozyaystvakh Ukrainy. *Presnovodnaya*

- akvakul'tura v Tsentral'noy i Vostochnoy Evrope: dostizheniya i perspektivy : mezhdunar. nauch.-prakt. konf.* Kyiv, 58-60.
10. Onuchenko, O. V. (2003). Rybnytsko-biologichni osnovy vidtvorennia veslonosa v umovakh povnosystemnykh stavovykh hospodarstv Ukrainy (na prykladi vidkrytoho aktsionernoho tovarystva «Cherkasyrybhosp»). *Extended abstract of candidate's thesis.* Kyiv.
 11. Vinogradov, V. K., Mel'chenkov, E. A., Erokhina, L. V., Voropaev, Y. V., & Chertykhyn, V. H. (1986). *Vyrashchivaiie proizvoditeley i razvedeiie veslonosa (predvaritelnye rekomendatsii).* Moskva : VNIIPRKh.
 12. Hrynzhovskyi, M. V., & Pekarskyi, A. V. (2004). *Optymizatsiia vyrobnytsstva produktsii akvakultury.* Kyiv : PolihrafKonsal'tynh.
 13. Hrynzhovskyi, M. V., Yaninovykh, Y. Ye., & Shvets, T. M. (2008). Efektyvnist stavovoi polikultury. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 41-45.
 14. Alekin, O. A., Semenov, A. D., & Skopintsev, B. A. (1973). *Rukovodstvo po khimicheskomu analizu vod sushi.* Leningrad : Gidrometeoizdat.
 15. Krazhan, S. A., & Lupacheva, L. I. (1991). *Estestvennaya kormovaya baza vodoemov i metody ee opredeleniya pri intensivnom vedenii rybnogo khozyaystva.* L'vov : Redaktsionno-izdatel'skiy otdel oblastnogo upravleniya po pechati.
 16. Zhadin, V. I. (1950). *Izuchenie donnoy fauny vodoemov.* Moskva : AN SSSR.
 17. Pravdin, I. F. (1979). *Rukovodstvo po izucheniyu ryb.* Moskva : Pishchevaya promyshlennost'.
 18. *Metodicheskoe posobie po izucheniyu pitaniya i pishchevykh otnosheniy ryb v estestvennykh usloviyakh.* (1974). Moskva : Nauka.
 19. Kharitonova, N. N. (1984). Biologicheskie osnovy intensifikatsii prudovogo rybovodstva. Kiev : Naukova dumka.
 20. Savel'eva, E. A., Gorbacheva, L. T., Chikhichev, V. P., & Vorobeva O. A., et al. (2002). Analiz basseynovogo vyrashchivaniya molodi osetrovykh ryb na ORZ «Donskoy» v svyazi s problemoy formirovaniya remontno-matochnykh stad. *Osnovnye problemy rybnogo khozyaystva i okhrany rybokhozyaystvennykh vodoemov Azovo-Chernomorskogo basseyna: sbornik nauchnykh trudov AzNIIRKh (2000-2001 gg.).* Moskva, 482-491.

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫРАЩИВАНИЯ РЕМОНТНЫХ
СЕГОЛЕТКОВ ОСЕТРООБРАЗНЫХ РЫБ (ACIPENSERIFORMES)
В УСЛОВИЯХ ЮГА УКРАИНЫ**

Е. Н. Алхимов, nikolo777@ukr.net, Херсонский государственный аграрный университет, г. Херсон

В. Ю. Шевченко, shvchencodejerson@gmail.com, Херсонский государственный аграрный университет, г. Херсон

Цель. Изучить и проанализировать современное состояние выращивания ремонтных сеголетков осетрообразных рыб, в частности стерляди и веслоноса в условиях Производственно-экспериментального Днепровского осетрового рыбоводного завода, расположенного на юге Украины.

Методика. Поставленные задачи решались общепринятыми в гидрохимии, гидробиологии и рыбоводстве методами. Полученные результаты обработаны с использованием статистических методов обработки и анализа полученных данных, что дает основания считать их достоверными.

Результаты. Исследованиями установлено, что физико-химические параметры воды в прудах хозяйства соответствовали действующим в прудовом рыбоводстве нормативам; имеющийся уровень развития элементов естественной кормовой базы является удовлетворительным для выращивания ремонтного материала осетрообразных. Результаты выращивания осетрообразных в моно- и поликультуре однозначно свидетельствуют в пользу поликультуры, что может быть использовано в рыбоводной практике.

Научная новизна. В специфических условиях юга Украины впервые исследовано влияние эколого-технологических условий на выращивание ремонтных сеголетков осетрообразных рыб (стерляди и веслоноса). В условиях моно- и поликультуры впервые исследовано выращивание ремонтного материала осетрообразных рыб.

Практическая значимость. Полученные результаты выращивания могут быть использованы в рыбоводной практике в качестве нормы для оценки экологической ситуации в прудах. Выращивание ремонтных сеголетков осетрообразных в поликультуре позволяет полнее использовать естественную кормовую базу, повысить продуктивность водоемов и эффективно использовать выростные площади хозяйств.

Ключевые слова: сеголетки, стерлядь, веслонос, физико-химический режим, гидробиологический режим, монокультура, поликультура.

CURRENT STATE OF THE REARING OF REPLACEMENT YOUNG-OF-THE-YEAR ACIPENSERIFORMES IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN UKRAINE

Ye. Alkhimov, nikolo777@ukr.net, Kherson State Agrarian University, Kherson

V. Shevchenko, shevchencodejerson@gmail.com, Kherson State Agrarian University, Kherson

Purpose. To study and analyze the current state of the rearing of replacement young-of-the-year *Acipenseriformes*, including sturgeon and paddlefish, in the conditions of Industrial-Experimental Dnieper sturgeon fish hatchery located in the southern Ukraine.

Methodology. The problems related to the rearing of replacement young-of-the-year of *Acipenseriformes* in the conditions of the southern Ukraine were solved using conventional hydrochemical, hydrobiological, and aquaculture methods. The obtained results including the environmental conditions of the experimental ponds were processed using statistical methods of the data processing and analysis that suggest their reliability.

Findings. The study showed that physicochemical parameters of water in experimental ponds of the fish farm complied with the norms accepted for fish farming; the actual level of the development of natural food supply components was satisfactory for rearing the replacement young-of-the-year *Acipenseriformes*. The results of the rearing of *Acipenseriformes* in monoculture and polyculture indicate on the benefit of polyculture that may be used in aquaculture practice.

Originality. The effect of environmental and technical conditions on the rearing of young-of-the-year *Acipenseriformes* (starlet and paddlefish) were investigated for the first time in specific conditions of the southern Ukraine. The rearing of replacement young-of-the-year *Acipenseriformes* was studied in the conditions of monoculture and polyculture.

Practical value. The obtained results of fish rearing can be used in fish breeding practice as a norm for assessing the environmental situation evaluation in ponds. Rearing of replacement young-of-the-year *Acipenseriformes* in polyculture allows better usage of the natural food supply, improving productivity in water bodies and efficient usage of pond water areas.

Keywords: young-of-the-year, sterlet, paddlefish, physicochemical regime, hydrobiological regime, monoculture, polyculture, *Acipenseriformes*.

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 64-72
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.064>
УДК 639.371.1

PRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF AGE-3 BROOD BROWN TROUT (*SALMO TRUTTA*) REARED IN THE CONDITIONS INDUSTRIAL AQUACULTURE

L. Haloyan, terteryan2009@mail.ru, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

A. Mruk, amruk@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

A. Kucheruk, anna-kycheryk@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

L. Terteryan, 040169@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Study and analysis of productive and reproductive parameters of brood brown trout reared in the conditions of industrial aquaculture with the use of feeding with specialized artificial feeds.

Methodology. Fish rearing was performed using a technology traditional for rainbow trout. Biological evaluation of fish was performed on live material according to the scheme developed by I. F. Pravdin (1966) for salmonids. Fish were anesthetized with "Propiscin". Metric parameters were measured with the aid of a ruler and caliper. Fish weight was determined on electronic balances. Eggs were preserved in a 4% formalin solution, weight of individual eggs was determined with the aid of torsion balances, egg diameter with a caliper. The duration of spermatozoid motility in males was determined under a microscope under 10x40 magnification with the aid of a stopwatch, sperm concentration was determined in a Goriaev chamber. Multiple regression analysis was performed in JMP IN 4 (SAS Institute). The factor was considered significant if $p < 0.05$.

Findings. Brood brown trout reared on specialized artificial feeds had following productive parameters: mean body weight of age-3 fish was 458 g in males and 453 g in females. Mean working fecundity of age-3 fish as 1847 eggs, mean relative working fecundity was 3971 eggs, the mean qualitative parameters of which were: weight of 61.5 g, diameter of 74.7 mm. The reproductive characteristics of age-3 males was high — mean fecundity was 1391 million sperm cells, their motility was 35 sec.

Originality. For the first time we reared a stock of brood brown trout in industrial conditions with the use of feeding with specialized artificial feeds.

Practical value. The obtained results are a component of the development of a complex technology of salmonid fish rearing with an objective to broad the assortment of valuable gourmet products and to justify the measures on artificial reproduction of brown trout in rivers of the Carpathian region.

Keywords: brood brown trout, working fecundity, relative working fecundity, productivity.

PROBLEM STATEMENT AND ANALYSIS OF LAST ACHIEVEMENTS AND PUBLICATIONS

The share of salmonids in total amounts of the marketable products of Ukrainian aquaculture enterprises is characterized by low values (1500 tons/year); however, it showed some trends for an increase during last years. The main object of salmonid culture is rainbow trout *Oncorhynchus mykiss* W., which composes 99%, a very little amount is brook trout *Salvelinus fontinalis*, however, during last years, fish culturists returned to the rearing of native species such as brown trout *Salmo trutta morfa fario* L.

© L. Haloyan, A. Mruk, A. Kucheruk, L. Terteryan, 2017

The historical facts show that until the middle of the last century, brown trout was the most common fish in mountain rivers of the Carpathian region, Crimea and even upper Dnieper River [1, 2].

According to its biology, the brown trout is demanding for environmental conditions that contributed to a drastic decline of its populations during the second half of the last century due to a number of human-induced factors. The human impacts are manifested not only as the pollution of rivers and excessive harvest of this valuable fish but in the majority of cases as a complete destruction of the reproductive generations, which become the most vulnerable and accessible. However, the most negative effect is manifested as the excessive deforestation, which is done without observing the generally accepted rules, which include the prohibition of log trailing without protective measures, work on rivers during fish spawning run and egg incubation, etc. The negative effects of these works resulted in significant silting of spawning grounds and consequently in the destruction and deterioration of natural rivers bottoms (optimal fraction of which should not be less than 5–10 mm, it allows water to wash fish eggs evenly during their incubation) that brought the natural reproduction to naught. The current state of brown trout is on the edge of survivability and to be listed in the Red Book of Ukraine, the number of its populations dropped by 13.4 times, while the biomass dropped by 42 times according to retrospective information [3, 4].

In particular, the current trend aimed at searching alternate energy sources draw the attention of investors to mountain rivers as the most cost-effective technology for energy production. Although the hydropower industry is a renewable source of energy without carbon dioxide release into the atmosphere, its role in the mitigation of the effects of climate change is limited. However, hydropower plants have a negative effect on aquatic ecosystems: dam construction, withdrawal of significant amounts of water into derivation pipelines, installation of these pipes result in the disturbance of water flow equilibrium and changes of stream channels that in its turn causes soil shears and erosion processes. These effects were confirmed by already existing mini hydro power plants on the Tereblia, Krasna, Tur'ya, Black Cheremosh and other rivers.

The program of the development of hydropower industry on Carpathian rivers planned to build almost 550 small hydropower plants. Thirty four mini hydro power plants are planned only for Verkhovyna district. It means that more than five hundred Carpathian rivers will be placed into pipes and channels for many kilometers and in such a way will be lost for the nature, and as result, their hydrobiocenoses will be destroyed [5, 6]. However, these programs do not envisage mitigation measures aimed at the preservation and restoration of the fauna of these rivers.

The effective replenishment of natural populations is possible only by artificial propagation, the prerequisite of which is the creation of domesticated replacement-brood stocks, the exploitation of which will allow regular release of viable fish seeds into rivers that will ensure the biological diversity of Carpathian rivers [7, 8, 9].

In particular, the diversification of aquaculture species structure due to valuable native salmonids will contribute to the diversification of the assortment of specialty products for domestic consumers.

HIGHLIGHT OF THE EARLIER UNRESOLVED PARTS OF THE GENERAL PROBLEM. AIM OF THE STUDY

Rearing of table brown trout is more developed in France, preserved in Germany, Switzerland, and Italy. In Poland and Slovakia, the brown trout is reared for artificial stocking into local rivers and streams.

The brown trout is reared mainly in natural water bodies. In Western Europe, in particular in France, Czech Republic, Slovakia, and Italy, this fish is artificially reared in rivers and streams for sport fishing and is an object of pond aquaculture. Cultivation and rearing of the brown trout is carried out in pond fish farms of Western Ukraine. Rearing of the brown trout is not sufficiently profitable, however, it is widely recognized that dishes prepared of this fish are tastier and healthier and are recommended for dietetic nutrition not only for adults but also for children [2–4].

Taking into account relatively low fecundity of the brown trout as well as widespread poaching during their spawning run, the restoration of the stocks of this valuable fish by natural way is very slow. In order to increase the number of brown trout stocks in natural water bodies, urgent measures aimed at its protection are necessary, first of all more strict protection and increase in the amounts of artificial propagation.

MATERIALS AND METHODS

The material for the study were brood fish reared from natural brood brown trout from the Cheremosh River. The weight of wild females was from 80 to 190 g, the majority of fish was 4–5 years old. The working fecundity of females fluctuated from 227 to 1012 eggs. The fertilized eggs were incubated at water temperature of 8 °C for 36 days, these parameters in natural conditions are 0.2–3.0 °C and 180 days. The obtained juveniles were grown to sexual maturity in industrial conditions of the tank fish farm “Ishkhan”. Fish were fed with specialized artificial feeds for salmonids manufactured by “Aller Aqua”. The protein content in the feeds was no lower than 42% and fat no lower than 22%. Water temperature during rearing did not fall below 8 °C in the winter and did not exceed 16 °C in the summer. Fish rearing was based on the technology commonly accepted for rainbow trout [10]. Biological evaluation of fish was performed using live material according to the scheme developed by I. F. Pravdin (1966) for salmonids [11]. Fish anesthesia was done using “Propiscine” manufactured in Poland at a concentration of 0.5 ml/l. Metric parameters were measured by a ruler and caliper. Fish weight was determined using electronic balances. Eggs were preserved in a 4% formalin solution, weight of eggs was determined with the aid of torsion balances and their diameter by a caliper. The duration of sperm cell motility in males was determined under a microscope with 10x40 magnification, stop watch, sperm cell concentration was determined in a Goryaev chamber.

For the determination of the significance degree of parameters, which can be used in the evaluation of reproductive quality of brood brown trout as well as for finding relationships between them, we analyzed the entire array of data of fish lengths, working and relative fecundity, largest body depth, largest body circumference, egg weight, egg diameter, total egg weight. A linear regression analysis was used, which was done in JMP (SAS Institute). The factor was considered to be significant if $p < 0.05$ [12].

STUDY RESULTS AND THEIR DISCUSSION

The valuation of the brown trout brood stock was performed at the end of November. On the 2nd December, a technical and biological evaluation of 50 specimens of fish (25 females and 25 males) was done and sexual products were collected for the reproduction purpose, tables 1, 2.

Mean weight of females was relatively high; however, the difference between minimum and maximum body weights was 781 g.

Mean weight of males was very variable and insignificantly higher than that of females, however, the difference between minimum and maximum body weights was lower than that of females: 618 g.

Table 1. Characteristics of age-3 females, n=25

	Fish weight, g	Fish length, cm	Condition factor	Slender-ness index	Circum-ference index	Body depth		Body circumference	
						Min	Max	Min	Max
M	453	34	0.96	4.04	183.2	73.3	78.4	31.4	183.2
m	139.4	3.43	0.20	0.35	24.7	7.4	10.8	3.3	24.7
δ	27.99	0.68	4.03	7.02	4.94	1.47	2.15	0.66	4.94
Cv	30.8	10.0	20.9	8.69	13.5	10.1	13.8	10.6	13.5
Variation range									
Max	824	41	1.5	5.4	0.63	10.0	4.0	24.0	9.0
Min	43	27	0.6	3.7	0.41	6.0	2.8	14.0	55

The obtained results demonstrated that the growth of the brown trout in controlled conditions had significant advantages compared to fish from natural water bodies. One of the main factors, which contributed to it, was balanced regular feeding with specialized artificial feeds. The protein content in the artificial feed was 45%, fat 15%. The feed conversion ratio in first spawned brood fish was 1.6.

Table 2. Characteristics of age-3 males, n=25

	Fish weight, g	Fish length, cm	Condition factor	Slender-ness index	Circum-ference index	Body depth		Body circumference	
						Min	Max	Min	Max
M	458.7	34.27	1.08	4.07	0.50	72.4	34.2	17.3	77.7
m	134.4	3.43	7.07	0.27	4.71	17.6	4.88	245	9.30
δ	26.89	0.68	1.41	3.53	9.42	3.52	0.97	5.34	1.86
Cv	29.3	10.01	6.54	6.78	9.37	24.3	14.2	15.7	11.9
Variation range									
Max	782	38	1.2	5.2	0.54	9	4.5	23	9
Min	164	22	1.0	4.3	0.48	5.5	2.3	12	5.5

The brown trout was grown with the use of artificial feeds had significantly higher results of weight accumulation compared to brown trout from natural water bodies.

E.g., the age-3–4 brown trout from the Irshava River had a mean weight of 135.1 g with a range of 53–279 g [2], while age-3 specimens in our experiment reached the maximum weight of 824 g with a mean weight of 460 g that was 3.4 times more. The monitoring of brown trout growth in industrial conditions was irregular. E.g., on the first year of life, the weight gain did not exceed 11 g and the mean weight was 8.4 g; on the second year of life, weight gain increased and its mean value was 127.3 g [13]. The highest body weight gain was observed on the third year of life (fig. 1), when fish weight increased by 333 g and was on average 460 g.

In our opinion, this is due to the gradual acquisition of the conditioned reflex to artificial conditions of their keeping at high stocking densities (according to norms of industrial rearing — 25–30 kg/m²) and feeding with artificial feeds.

Fig. 1. Body weight gain of brown trout during a year (from the age 2 to 3)

Reproductive characteristics of brown trout.

The studied fish were 3 years old and were used for artificial reproduction for the first time. Their reproductive characteristics are presented in table 3. Working fecundity of females were almost twice higher than that of females from natural populations [1]. The variability of working fecundity was high because the samples were random and it depended on individual peculiarities of the studied females.

Table 3. Reproductive characteristics of age-3 brown trout females, n=25

	Fish weight, g	Egg weight, g	Ls, *cm	Fecundity, eggs		Egg parameters		Fecundity index
				working	relative	P, mg**	D, mm***	
M	453.7	114	34	1847	3971	61.47	4.7	244.4
m	139.4	44	3.43	672.4	513	5.93	3.93	33.00
δ	27.9	8.8	0.68	134.49	102	1.18	0.19	6.7
Cv	30.8	38.4	10.0	36.40	129	9.65	4.14	14.18
min	824	230	41	745	2949	51	4.4	164
max	43	38	27	3918	4977	73	5.1	235.6

Notes.* fish fork length, ** egg weight, *** egg diameter

The reproductive characteristics of age-3 males were also high (table 4). The ejaculate volume was 6.8 cm³ with a range of 3.5–12.2, the mean sperm cell concentration was 206.4 million/ml (97–316). The duration of sperm cell motility was 35.6 sec (19.5–56.4) (table 4).

Table 4. Reproductive characteristics of age-3 brown trout males

	Weight, g n=25	Ejaculate volume n=25, ml	Sperm cell concen- tration, million/ml ³ n=7	Working fecundity of sperm cells n=7	Duration of sperm cell motility, sec n=10
M	458.7	6.8	206.4	1391.7	35.6
m	134.4	2.23	69.2	472.1	14.1
δ	26.89	0.44	26.8	178.4	5.3
Cv	29.31	32.6	33.55	33.9	39.7
<i>Range</i>					
Max	654	11.2	316	1860	56.4
Min	164	3.5	97	542	19.5

Mean working fecundity was high — 1391 sperm cells with a range of 1860–542 million.

Table 5. Linear regression results

Parameters	Linear regression coefficients		F	p
	a	b		
Body length – egg weight	-342.80 ± 41.32	13.32 ± 1.12	123.60	<0.001
Body weight – egg weight	-14.94 ± 13.08	0.29 ± 0.028	107.60	<0.001

The obtained results of linear regressions (table 5) can be used for predictive assessments of reproductive characteristics of brown trout based on their exterior parameters.

CONCLUSION AND PERSPECTIVES OF FURTHER DEVELOPMENT

The results of the study within the given project is a reared and domesticated stock of age-3 brood brown trout.

The analysis of results demonstrated high values of reproductive and productive parameters of the brood brown trout reared in the conditions of industrial technology with the use artificial feeds compared to natural populations. E.g., mean weight of age-3 males and females was 458 g and 453 g, respectively. Mean working fecundity was 1847 eggs, relative working fecundity was 3971 eggs.

The obtained results indicate on the possibility of the artificial reproduction of brown trout in rivers of the Carpathian region not only for the replenishment of their natural populations but also for rearing this species in this region for broadening the assortment of gourmet products.

BIBLIOGRAPHY

1. Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Берг Л. С. — М. : АН СССР, 1949. — Т. 3. — 876 с.
2. Устич В. І. Історичні аспекти та перспективи відродження лососівництва в Закарпатті / В. І. Устич, А. І. Мрук // Рациональное використання водних ресурсів

- необхідний елемент стійкого розвитку : 3-я робоча зустріч Української річкової мережі, с. Осій (Ужгород) 26-29 черв. 2003 р. : матер. — Ужгород : Ліра, 2003. — С. 42—45.
3. Мрук А. І. Сучасний стан та перспективи відтворення цінних лососевих видів риб в Закарпатті / А. І. Мрук, В. І. Устич, І. І. Маслянка // Проблеми воспроизводства аборигенных видов рыб. — К. : Світ рибалки, 2005. — С. 196—200.
 4. Мрук А. І. Склад іхтіофауни річки Іршава / А. І. Мрук, В. І. Устич, І. І. Маслянка // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 1(7). — С. 16—21.
 5. Movement and summer habitat of brown trout (*Salmo trutta*) below a pulsed discharge hydroelectric generating station / C. M. Bunt, S. J. Cooke, C. Katopodis [et al.] // Regulated Rivers-Research & Management. — 1999. — № 15. — P. 395—440.
 6. Мрук А. І. Прогнозований вплив будівництва міні ГЕС на популяції цінних лососевих риб карпатського регіону / А. І. Мрук, А. І. Хандожівська, І. Й. Великопольський // Современные проблемы гидробиологии, перспективы пути и методы решений : III междунар. конф., 17-19 мая 2012 г. : матер. — Херсон, 2012. — С. 289—293.
 7. Didenko A. Challenges to restoration of salmonids in streams of the Ukrainian part of the Carpathians/ A. Didenko, A. Mruk, S. Kruzhylina // International Workshop on the Restoration of Fish Populations, September 1-4, 2009. — Düsseldorf, Germany. — P. 25.
 8. Грициняк И. И. Состояние и перспективы воспроизводства редких и исчезающих пресноводных видов лососевых рыб в Украине / И. И. Грициняк, А. И. Мрук // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб : Межд. конф., 20-22 апр. 2010 г. : тезисы докл. — С-Пб., 2010. — С. 48—50.
 9. Didenko A. Conservation and restoration of nativ salmonids in Ukrainian Carpathians: perspectives and challenges / A. Didenko, A. Mruk // Advances in the population ecology of stream salmonids : International symposium, May 17-23, 2010. — Luarca, Asturias, Spain.
 10. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб / Правдин И. Ф. — М. : Пищевая пром-ть, 1966. — 376 с.
 11. Галасун П. Т. Технологическая инструкция по производству радужной форели в различных типах хозяйств Украины. / Галасун П. Т., Булатович М. А., Борбат М. О. — Львов, 1987. — 17 с.
 12. Ramsey F. L. The statistical sleuth: a course in methods of data analysis / F. L. Ramsey, D. W. Shafer. — Duxbury Press, 1997. — 742 p.
 13. Моніторинг росту струмкової форелі в індустріальних умовах господарства «Ішхан» / А. І. Мрук, Л. Л. Тертерян, А. І. Хандожівська [та ін.] // Рибогосподарська наука України. — 2013. — № 1. — С. 31—38.

REFERENCES

1. Berg L. S. (1949). *Ryby presnykh vod SSSR i sopredel'nykh stran*. Moskva : AN SSR.
2. Ustych, V. I., & Mruk, A. I. (2003). Istorychni aspekty ta perspektyvy vidrozdzhennia lososivnytstva v Zakarpatti. *Ratsionalne vykorystannia vodnykh resursiv — neobkhdnyi element stiikoho rozvytku : 3-ia robocha zustrich Ukrainskoi richkovoї merezhi, s. Osii (Uzhhorod) 26-29 cherv. 2003 r.* Uzhhorod : Lira, 42-45.
3. Mruk, A. I., Ustych, V. I., & Maslianka, I. I. (2005). Suchasnyi stan ta perspektyvy vidtvorennia tsinnykh lososevykh vydiv ryb v Zakarpatti. *Problemy vosproizvodstva aborigennykh vidov ryb*, 196-200.
4. Mruk, A. I., Ustych, V. I., & Maslianka, I. I. (2009). Sklad ikhtiofauny richky Irshava. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1(7), 16-21.
5. Bunt, C. M., Cooke, S. J., Katopodis, C., & McKinley, R. S. (1999). Movement and summer habitat of brown trout (*Salmo trutta*) below a pulsed discharge hydroelectric generating

- station. *Regulated Rivers-Research & Management*, 15, 395-440.
6. Mruk, A. I., Khandozhivska, A. I., & Velykopolskyi, I. I. (2012). Prohnozovanyi vplyv budivnytstva mini HES na populiatsii tsinnykh lososevykh ryb karpatskoho rehionu. *Sovremennye problemy gidrobiologii, perspektivy puti i metody reshenyi : III mezhdunar. konf.*, 17-19 maia 2012 g. Kherson, 289-293.
 7. Didenko, A., Mruk, A., & Kruzhylina, S. (2009). Challenges to restoration of salmonids in streams of the Ukrainian part of the Carpathians. *International Workshop on the Restoration of Fish Populations, September 1-4. Düsseldorf, Germany*, 25.
 8. Gritsinyak, I. I., & Mruk, A. I. (2010). Sostoyanie i perspektivy vosproizvodstva redkikh i ischezayushchikh presnovodnykh vidov lososevykh ryb v Ukraine. *Vosproizvodstvo estestvennykh populyatsiy tsennykh vidov ryb : mezhd. konf.*, 20-22 aprelya 2010. Sankt-Peterburg, 48-50.
 9. Didenko, A. & Mruk, A. (2010). Conservation and restoration of nativ salmonids in Ukrainian Carpathians: perspectives and challenges. *Advances in the Population Ecology of Stream Salmonids : International Symposium, May 17-23, 2010. Luarca, Asturias, Spain*.
 10. Pravdin, I. F. (1966). *Rukovodstvo po izucheniyu ryb*. Moskva : Pishchevaya prom-t'.
 11. Galasun, P. T., Bulatovich, M. A., & Borbat, M. O. (1987). *Tekhnologicheskaya instruksiya po proizvodstvu raduzhnoy foreli v razlichnykh tipakh khozaystv Ukrainy*. L'vov.
 12. Ramsey, F. L., & Shafer, D. W. (1997). *The statistical sleuth: a course in methods of data analysis*. Duxbury Press.
 13. Mruk, A. I., Terterian, L. L., Khandozhivska, A. I., & Terterian, L. A. (2013). Monitorynh rostu strumkovoi foreli v industrialnykh umovakh hospodarstva "Ishkhan". *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 31-38.

ПРОДУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 3-ГODOVЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РУЧЬЕВОЙ ФОРЕЛИ (*SALMO TRUTTA*), ВЫРАЩЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ

Л. Л. Галоян, terteryan2009@mail.ru, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

А. И. Мрук, amruk@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

А. И. Кучерук, anna-kycheryk@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Л. А. Тертерян, 040169@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Исследования и анализ продуктивных и репродуктивных показателей производителей ручьевого форели, выращенных в условиях индустриальной аквакультуры с использованием кормления искусственными специализированными кормами.

Методика. Выращивание рыб проводили по технологии, принятой для радужной форели. Биологическую оценку рыб проводили на живом материале по схеме, разработанной И. Ф. Правдиным (1966) для лососевых рыб. Анестезию рыб проводили препаратом «Прописцин». Метрические показатели измеряли с помощью линейки и штангенциркуля. Массу рыб определяли на электронных весах. Икринки фиксировали в 4% растворе формалина, массу икринок определяли с помощью торсионных весов, диаметр штангенциркулем. Продолжительность подвижности сперматозоидов у самцов определяли под микроскопом при увеличении 10x40, с помощью секундомера, концентрацию спермиев определяли в камере Горяева.

Использовался множественный регрессионный анализ, который выполнялся в программе JMP IN 4 (SAS Institute). Фактор считался значимым при $p < 0,05$.

Результаты. Производители ручьевого форели выращенные на специализированных искусственных кормах имели следующие показатели продуктивности: средняя масса тела 3-летних производителей ручьевого форели составляла 458 г у самцов и 453 г у самок.

Средняя рабочая плодовитость 3-летних самок ручьевой форели была 1847 икринок, средняя относительная рабочая плодовитость — 3971 икринок, средние качественные показатели которых имели следующие значения: масса 61,5 мг, диаметр 74,7 мм. Репродуктивная характеристика трехлетних самцов ручьевой форели была высокой — средняя плодовитость составляла 1391 млн спермиев, их подвижность длилась 35 с.

Научная новизна. Впервые было выращено стадо производителей ручьевой форели в промышленных условиях с использованием кормления искусственными специализированными кормами.

Практическая значимость. Полученные результаты являются составной частью разработки комплексной технологии по выращиванию лососевых рыб, с целью расширения ассортимента ценной деликатесной продукции и обоснование мероприятий по искусственному воспроизводству ручьевой форели в реках Карпатского региона.

Ключевые слова: ручьевая форель, рабочая плодовитость, относительная рабочая плодовитость, производительность.

ПРОДУКТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА 3-РІЧНИХ ПЛІДНИКІВ СТРУМКОВОЇ ФОРЕЛІ (*SALMO TRUTTA*), ВИРОЩЕНИХ В УМОВАХ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ АКВАКУЛЬТУРИ

Л. Л. Галоян, terteryan2009@mail.ru, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

А. І. Мрук, amruk@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

А. І. Кучерук, anna-kycheryk@ukr.net Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Л. А. Тертерян, 040169@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідження та аналіз продуктивних та репродуктивних показників плідників струмкової форелі вирощених в умовах індустріальної аквакультури з використанням годівлі штучними спеціалізованими кормами.

Методика. Вирощування риб проводили за технологію, прийнятою для райдужної форелі. Біологічну оцінку риб проводили на живому матеріалі за схемою, розробленою І. Ф. Правдіним (1966) для лососевих риб. Для анестезії риб використовували препарат «Пропісцин», польського виробництва. Метричні показники вимірювали лінійкою, кравецькою стрічкою та штангенциркулем. Маса плідників визначали на електронних вагах. Ікринки фіксували у 4% розчині формаліну, масу ікринок визначали за допомогою торсійних терезів, діаметр штангенциркулем. Тривалість рухливості спермій у самців визначали секундоміром під мікроскопом за збільшення 10x40, концентрацію спермій визначали у камері Горяєва.

Використовувався множинний регресійний аналіз, який виконувався в програмі JMP IN 4 (SAS Institute).

Результати. Плідники струмкової форелі вирощені на спеціалізованих штучних кормах мали наступні показники продуктивності: середня маса 3-річних плідників струмкової форелі складала 458 г у самців та 453 г у самиць. Середня робоча плодючість 3-річних самиць струмкової форелі становила 1847 ікринок, середня відносна робоча плодючість 3971 ікринку, середні якісні показники яких мали наступні значення: маса 61,5 мг, діаметр 4,7 мм. Репродуктивна характеристика трирічних самців струмкової форелі була високою — середня плодючість складала 1391 млн спермій, їх рухливість тривала 35,6 с.

Наукова новизна. Вперше в Україні було вирощено domestиковане стадо плідників струмкової форелі в індустріальних умовах з використанням годівлі штучними спеціалізованими кормами.

Практична значимість. Отримані результати є складовою частиною розробки комплексної технології з вирощування лососевих риб, з метою розширення асортименту цінної деликатесної продукції та обґрунтування заходів зі штучного відтворення струмкової форелі в річках Карпатського регіону.

Ключові слова: струмкова форель, робоча плодючість, відносна робоча плодючість, продуктивність.

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 73-83

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.073>

УДК [597-1.05:639.371.52]:[639.3.043.13:636.087.73]

ПЕРЕБІГ ОКИСНИХ ПРОЦЕСІВ В ГЕПАТОПАНКРЕАСІ ДВОЛІТОК КОРОПА ЗА ВВЕДЕННЯ ДО СКЛАДУ КОРМІВ НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ (*SILYBUM MARIANUM*)

М. З. Кориляк, stasiv8@gmail.com.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

І. І. Грициняк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

О. В. Дерень, deren@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

О. П. Добрянська, olya_dobryanska@ukr.net, Львівська дослідна станція ІРГ НААН,
м. Львів

Мета. Вивчити вплив насіння розторопші плямистої, введеної до складу основного раціону коропа, на функціональний стан системи антиоксидантного захисту (САЗ) та утворення продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) в гепатопанкреасі риб.

Методика. Дослідження проводились на базі ДП ДГ Львівської дослідної станції ІРГ в двох повторностях. Першу повторність проведено в 2013 р., другу в 2014 р. у виробничих умовах ставів-аналогів за площею з єдиним джерелом водопостачання.

Об'єктом дослідження були дволітки любінського лускатого коропа. Експеримент складався із чотирьох варіантів і тривав 60 днів. У контрольній групі коропа отримували впродовж всього вегетаційного періоду повнораціонний комбікорм без добавок, в дослідних групах 1, 2 і 3 — додатково до складу основного раціону відповідно 1, 5 і 10% розмелених плодів розторопші плямистої. Розторопшу вводили до складу корму методом гранулювання.

По завершенні експерименту в риб дослідних груп було відібрано зразки тканин для проведення біохімічних досліджень. Використовували 10% гомогенати тканин гепатопанкреасу коропа. Досліджували концентрацію дієнових кон'югатів за методом, що ґрунтується на реакції оптичної густини гептанізопропанольного екстракту ліпідів. Визначення концентрації ТБК-активних продуктів проводили спектрофотометрично за кольоровою реакцією з тіобарбітуровою кислотою. Активність супероксиддисмутази (СОД) — за визначенням відсотка гальмування реакції відновлення нітросинового тетразолію в присутності феназинметасульфату. Активність каталази — за зміною концентрації H_2O_2 . Визначення вмісту білка проводили за методом Бредфорд.

Опрацювання експериментальних результатів проводили методом варіаційної статистики. Статистично вірогідну різницю показників оцінювали за *t*-критерієм Стьюдента.

Результати. В результаті проведених експериментальних досліджень у виробничих умовах у двох повторностях відмічено активацію САЗ та зниження інтенсивності процесів ПОЛ в гепатопанкреасі усіх трьох дослідних груп коропів, яким до складу раціону було введено розмелені плоди розторопші плямистої з розрахунку 1, 5 і 10%, відносно контрольної.

Дана тенденція більш виражена за використання 1 і 5% даної добавки в складі корму. Зокрема, в першій повторності достовірно зростає ($P < 0,001$), а в другій виявляється тенденція до зростання вмісту СОД на 13,8–58,2% та зниження концентрації кінцевої ланки продуктів ПОЛ (ТБК) на 19,9–73,7%.

Отже, використання розторопші плямистої справляє позитивну дію на антиоксидантну систему дволіток коропа, що, в свою чергу, матиме сприятливий вплив на функціональний стан їх організму.

© М. З. Кориляк, І. І. Грициняк, О. В. Дерень, О. П. Добрянська, 2017

Наукова новизна. Проблема пошуку засобів подолання впливу стрес-чинників на організм коропа, що виникають в процесі вирощування, є актуальною в умовах сьогодення, оскільки вони негативно відображаються на функціональному стані організму риб в цілому. Дієвим засобом вирішення даної проблеми є використання в годівлі коропа добавок з антиоксидантними властивостями. З огляду на отримані позитивні результати в тваринництві і деякі напрацювання в риборибництві, дослідження ефективності використання розторопші плямистої в годівлі коропа з цією метою та встановлення норм і методів її пролонгованого введення до складу раціону коропа є актуальним завданням, що має як наукове, так і практичне значення.

Практична значимість. Встановлення позитивного впливу застосування в годівлі коропа насіння розторопші плямистої на активність перебігу окисних процесів в організмі надасть змогу виробникам рибної продукції отримати економічно ефективний та екологічно безпечний засіб нівелювання стрес-чинників, які здійснюють негативний вплив на організм риб в процесі вирощування, при цьому безпосередньо впливаючи на рибопродуктивність вирощувальних водойм.

Ключові слова: розторопша плямиста, короп, система антиоксидантного захисту, продукти перексидного окиснення ліпідів.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

В процесі вирощування організм риб постійно піддається впливу стрес-чинників екзогенного та ендогенного походження. Часто вони виникають при недотриманні виробниками технологічних параметрів вирощування та якісного складу раціону. Проте є чинники, які складно виключити, зокрема забруднення водного середовища різними токсикантами. Це призводить до активації вільнорадикального окиснення в організмі риб, що, в свою чергу, провокує зниження продуктивності та резистентності. Ефективним, з економічної та продуктивної точки зору, способом подолання негативного впливу стрес-чинників на організм риб може бути введення до складу їх раціону антиоксидантних добавок рослинного походження, що характеризуються широким спектром біологічно активних властивостей, не справляють негативного впливу на якість вирощеної продукції і мають низьку вартість [1].

В даному контексті заслуговує на увагу розторопша плямиста (*Silybum marianum*) — лікарська рослина, плоди якої є джерелом нутрієнтів, необхідних для повноцінного функціонування організму, що нині набула широкого застосування в медицині і має імуномодуючі, гепатопротекторні, антиоксидантні та антитоксичні властивості [2–3].

Розторопша містить близько 200 різних за дією компонентів, її насіння багате природними антиоксидантами і містить велику кількість вітаміну Е. Зокрема, до її складу входять макро- і мікроелементи та комплекс ліпідів (токофероли, фосфоліпіди, ацилгліцерини), серед яких переважає кварцетин, що має антиоксидантні властивості [4]. Основним компонентом розторопші є силімарин — рідкісна в природі біологічно активна речовина, що містить три ізомери: силібін, силідіанін, силіхрістін [5]. Силімарин в комплексі з вітаміном Е позитивно впливає на обмінні процеси в клітинах печінки та підвищує їх стійкість до руйнівної дії вірусних і бактеріальних інфекцій, важких металів та інших токсинів [6, 7]. Силімарин впливає на підтримання оптимального стану окисно-відновного балансу клітин різними шляхами: прямого поглинання вільних

радикалів; запобігання утворенню вільних радикалів, в результаті пригнічення специфічних ферментів; підтримання цілісності електронно-транспортного ланцюга мітохондрій у стресових умовах; активації низки антиоксидантних ферментів і неензимних антиоксидантів, активізуючи вітагенез відповідальних за синтез захисних молекул, а також забезпечує додатковий захист в умовах стресу [8].

Аналіз наявної літератури свідчить про ефективність використання розторопші плямистої в тваринництві в якості антиоксиданту природного походження, що чинить позитивний вплив на стан гуморальної ланки імунітету індиків [9, 10], забійні якості свиней, зокрема вихід м'яса і вміст у ньому білка [11], збільшення продуктивності та збереженості молодняка свиней [12], підвищення приростів овець, зменшення відкладення внутрішнього жиру, покращення засвоюваності білків в їхньому організмі та збільшення настригів вовни покращеної якості [13, 14].

Останніми дослідженнями встановлено, що введення коропам розторопші плямистої за експериментального ураження сприяє вірогідному зростанню активності СОД і каталази, що знижує активність ПОЛ в тканинах і органах риб [15].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Існує припущення, що антиоксиданти є одними з основних регуляторів багатьох фізіологічних процесів організму, тому окисно-відновний баланс між антиоксидантами і прооксидантами є важливим чинником, що визначає функціональний стан організму загалом [16].

У зв'язку з цим, науково-практичний інтерес становить проблема пошуку засобів подолання впливу стрес-чинників на організм риб, що виникають в процесі вирощування останніх, зокрема шляхом використання рослинної добавки з антиоксидантними властивостями розторопші плямистої. Літературні дані недостатньо висвітлюють питання впливу насіння розторопші плямистої на активність перебігу окисних процесів в організмі коропа при застосуванні його в годівлі. Найбільш показово даний вплив може бути виражений в гепатопанкреасі риб, оскільки розторопша плямиста широко використовується в якості гепатопротектора [17].

Головною метою дослідження було вивчення впливу насіння розторопші плямистої, введеної до складу основного раціону, на стан САЗ та продукти ПОЛ в гепатопанкреасі коропа.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проводились на базі ДП ДГ Львівської дослідної станції ІРГ в двох повторностях. Першу повторність проведено в 2013 р., другу в 2014 р. у виробничих умовах ставів-аналогів за площею з єдиним джерелом водопостачання.

Об'єктом дослідження були дволітки любінського лускатого коропа. Експеримент складався із чотирьох варіантів і тривав 60 днів. В контрольній групі коропа отримували впродовж всього вегетаційного періоду повнораціонний

комбікорм без добавок, в дослідних групах 1, 2 і 3 — додатково до складу основного раціону відповідно 1, 5 і 10% розмелених плодів розторопші плямистої. Розторопшу вводили до складу корму методом гранулювання.

По завершенні експерименту в риб дослідних груп було відібрано зразки тканин для проведення біохімічних досліджень. Використовували 10% гомогенати тканин гепатопанкреасу коропа. Досліджували концентрацію дієнових кон'югатів за методом, що ґрунтується на реакції оптичної густини гептанізопропанольного екстракту ліпідів [18]. Визначення концентрації ТБК-активних продуктів проводили спектрофотометрично за кольоровою реакцією з тіобарбітуровою кислотою [19]. Активність СОД — за визначенням відсотка гальмування реакції відновлення нітросинього тетразолію в присутності феназинметасульфату [20]. Активність каталази — за зміною концентрації H_2O_2 [21]. Визначення вмісту білка проводили за методом Бредфорд [22].

Опрацювання експериментальних результатів проводили методом варіаційної статистики. Статистично вірогідну різницю показників оцінювали за t-критерієм Стьюдента [23].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Впродовж першого року експериментальних досліджень в умовах ставів встановлено, що активність каталази в гепатопанкреасі коропів усіх дослідних груп мала виражену тенденцію до зростання відносно контрольної групи риб (табл. 1). Зокрема, в досліді 1 і досліді 2 даний показник зріс на 12,1–13,2%, в досліді 3 — на 11,6%.

Таблиця 1. Активність антиоксидантних ферментів та вміст продуктів ПОЛ у гепатопанкреасі дворічок коропа за введення до складу корму розмелених плодів розторопші плямистої, перша повторність, 2013 р. ($M \pm m$, $n=3$)

Показник	Контроль	Дослід 1	Дослід 2	Дослід 3
Каталаза, мкмоль H_2O_2 /хв. х мг білка	40,68 $\pm$ 2,035	46,90 $\pm$ 0,236	46,87 $\pm$ 0,460	46,01 $\pm$ 0,581
СОД, ум. од./хв. х мг білка	4,49 $\pm$ 0,567	10,75 $\pm$ 0,304***	9,08 $\pm$ 0,501***	6,15 $\pm$ 0,145
Дієнові кон'югати, нмоль/мг білка	1,16 $\pm$ 0,147	0,36 $\pm$ 0,019*	1,15 $\pm$ 0,380	1,54 $\pm$ 0,162
ТБК, нмоль/мг білка	3,42 $\pm$ 0,157	0,90 $\pm$ 0,140***	1,27 $\pm$ 0,119***	3,15 $\pm$ 0,832

Примітка. Тут і надалі * — $p < 0,05$, ** — $p < 0,01$, *** — $p < 0,001$ — статистично вірогідні різниці між показниками, отриманими в контрольній та дослідних групах риб.

Активність СОД зросла в гепатопанкреасі коропів першої і другої дослідних груп відносно контрольної в 2,4 і 2,0 рази відповідно ($P < 0,001$). В досліді 3 даний показник теж мав тенденцію до збільшення, проте дещо нижчу, порівняно з іншими дослідними групами і зріс відносно контролю в 1,4 рази. Нижчу активність СОД в гепатопанкреасі коропів контрольної групи можна пояснити впливом ряду негативних чинників на організм риб в процесі вирощування в умовах ставів, які в комплексі спричиняють стресові ситуації для організму впродовж усього вегетаційного періоду.

Вміст дієнових кон'югатів, початкової ланки ПОЛ, був вірогідно нижчим відносно контролю ($P<0,05$) лише в досліді 1, за введення до складу корму меленого насіння розторопші плямистої в кількості 1%, а саме на 69,0%. В досліді 2 суттєвих змін відносно контрольної групи не встановлено, а в досліді 3 вміст дієнових кон'югатів навпаки мав тенденцію до зростання.

Щодо кінцевого продукту ПОЛ — ТБК, то в досліді 1 і досліді 2 відмічено вірогідне зниження ($P<0,001$) концентрації даного показника відносно контролю на 73,7 і 62,9% відповідно. В досліді 3 дана тенденція збереглася, але була менш вираженою: різниця склала лише на 7,9%.

Загалом, відмічено, що введення до складу кормів дволіток коропа меленого насіння розторопші плямистої в кількості 1 і 5% позитивно вплинуло на активність антиоксидантних ферментів в гепатопанкреасі дослідних груп коропів та одночасно сприяло зменшенню вмісту продуктів ПОЛ. За збільшення кількості розторопші плямистої в складі раціону до 10% дана тенденція зберігається, проте є менш вираженою.

Виходячи з цього, можна припустити, що в умовах виробництва з метою стимулювання активності САЗ ефективнішим є застосування меленого насіння розторопші з розрахунку 1 і 5% в складі раціону, проте дане твердження вимагає додаткової практичної перевірки. З цією метою нами було проведено аналогічний експеримент у виробничих умовах за описаною вище схемою. Результати другої повторності експериментальних робіт представлені в табл. 2.

Таблиця 2. Активність антиоксидантних ферментів та вміст продуктів ПОЛ у гепатопанкреасі дворічок коропа за введення до складу корму розмелених плодів розторопші плямистої, друга повторність, 2014 р. ($M\pm m$, $n=3$)

Показник	Контроль	Дослід 1	Дослід 2	Дослід 3
Каталаза, ммоль H_2O_2 /хв. х мг білка	36,73 $\pm$ 0,145	46,59 $\pm$ 0,775***	38,34 $\pm$ 1,211	36,92 $\pm$ 0,605
СОД, ум. од./хв. х мг білка	8,97 $\pm$ 0,844	11,76 $\pm$ 1,669	10,41 $\pm$ 1,165	10,54 $\pm$ 0,478
Дієнові кон'югати, нмоль/мг білка	1,64 $\pm$ 0,019	1,11 $\pm$ 0,084**	1,22 $\pm$ 0,115	1,34 $\pm$ 0,0921
ТБК, нмоль/мг білка	3,57 $\pm$ 0,484	2,86 $\pm$ 0,479	2,86 $\pm$ 0,531	3,31 $\pm$ 0,226

По закінченні вегетаційного періоду в коропів експериментальної групи було відібрано зразки гепатопанкреасу з метою встановлення впливу згодовування меленого насіння розторопші плямистої на активність перебігу окисних процесів. Встановлено вірогідне підвищення ($P<0,001$) активності каталази в досліді 1 на 21,2% відносно контролю. В досліді 2 даний показник мав виражену тенденцію до зростання – на 4,2% відносно контролю, в той час, як в досліді 3 був практично на тому ж рівні, що й в контролі.

Активність СОД мала тенденцію до збільшення в усіх дослідних групах відносно контролю з найвищим значенням в досліді 1 — 11,762 $\pm$ 1,669 ум. од./хв. х мг білка, проти 8,970 $\pm$ 0,844 ум. од./хв. х мг білка в контролі, що на 23,7% більше. В досліді 2 і 3 дана різниця склала 13,8 та 14,9% відповідно.

Щодо вмісту продуктів ПОЛ, то вміст дієнових кон'югатів в гепатопанкреасі усіх трьох дослідних груп був нижчим відносно контрольної на 32,3 ($P<0,05$), 25,6 і 18,3% відповідно. При цьому слід зазначити, що зростання даного показника відмічено за збільшення кількості згодовування насіння розторопші плямистої.

Концентрація ТБК-продуктів повторювала відмічену тенденцію щодо вмісту дієнових кон'югатів і була нижчою відносно контролю в дослідях 1, 2 і 3 на 7,3–19,9%.

Вищенаведені дані свідчать про те, що зростання активності ферментної ланки захисту і зниження кількості накопичення кінцевих продуктів ПОЛ в гепатопанкреасі риб залежали від складу раціону.

Отже, використання розторопші плямистої справляє позитивну дію на антиоксидантну систему дволіток коропа, що, в свою чергу, матиме сприятливий вплив на функціональний стан їх організму в цілому.

Це підтверджено проведеними нами дослідженнями впливу насіння розторопші плямистої на рибопродуктивність водойм. Зокрема, встановлено збільшення відсотка виживання та приростів риб в дослідних групах відносно контрольної [24].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

В результаті проведених експериментальних досліджень у виробничих умовах у двох повторностях відмічено активацію САЗ та зниження інтенсивності процесів ПОЛ в гепатопанкреасі усіх трьох дослідних груп коропів, яким до складу раціону було введено розмелені плоди розторопші плямистої з розрахунку 1, 5 і 10%, відносно контрольної.

Дана тенденція більш виражена за використання 1 і 5% даної добавки в складі корму. Зокрема, в першій повторності достовірно зростає ($P<0,001$), а в другій виявляється тенденція до зростання вмісту СОД на 13,8–58,2% та зниження концентрації кінцевої ланки продуктів ПОЛ (ТБК) на 19,9–73,7%.

ЛІТЕРАТУРА

1. Лікарські рослини / відп. ред. А. М. Гродзинський. — К., 1990. — 426 с.
2. Доклиническое изучение безопасности фитопрепаратов, обладающих гепатопротекторными свойствами / Л. В. Крепова, В. В. Бортникова, А. А. Шкаренков [и др.] // Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения : 8 Междунар. съезд «Фитофарм 2004», 21–23 июня 2004 г. : матер. — СПб., 2004. — С. 111–114.
3. Журба О. В. Лекарственные, ядовитые и вредные растения / О. В. Журба, М. Я. Дмитриев. — М. : Колос С, 2005. — 276 с.
4. Цаприлова С. В. Расторопша пятнистая: химический состав, стандартизация, применение / С. В. Цаприлова, Р. А. Родионова // Вісник фармації. — 2008. — № 3 (41). — С. 92–104.
5. Flavonoids as peroxynitrite scavengers: the role of the hydroxyl groups / C. G. M. Heijnen, G. R. M. M. Haenen, F. A. A. Van Acker [et al.] // *Toxicology in Vitro*. — 2001. — Vol. 15, № 1. — P. 3–6.
6. Никиткина А. К. Расторопша пятнистая / А. К. Никиткина, В. А. Гущина, Н. Д. Агапкина. — Пенза : Пензенская гос. с-х. акад., 2003.

7. Milk thistle in liver diseases: past, present, future / L. Abenavoli, R. Capasso, N. Milic et al. // *Phytother. Res.* — 2010. — Vol. 24, № 10. — P. 1423—1432.
8. Cellular stress responses, the hormesis paradigm, and vitagenes: novel targets for therapeutic intervention in neurodegenerative disorders / C. Cornelius, A. T. Dinkova-Kostova, E. J. Calabrese [et al.] // *Antioxid. Redox Signal.* — 2010. — Vol. 13(11). — P. 1763—1811.
9. Харів І. І. Стан гуморальної ланки імунної системи індиків, уражених асоціативною еймеріозо-гістомонозною інвазією та лікованих бровітакокцидом сукупно з плодами розторопші плямистої / І. І. Харів // *Сільський господар.* — 2012. — № 11/12. — С. 8—11.
10. Харів І. І. Показники гуморального імунітету інтактних індиків при застосуванні бровітакокциду та порошку плодів розторопші плямистої / І. І. Харів // *Вісник Сумського національного аграрного університету.* — 2012. — № 7. — С. 94—97. — (Серія : Ветеринарна медицина).
11. Доева И. Г. Хозяйственно-биологические особенности свиней в связи с различными дозами добавок в рационы шрота расторопши : дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.04 / Доева Изета Георгиевна. — Владикавказ, 2009. — 172 с.
12. Новицкий Г. И. Особенности технологии выращивания расторопши пятнистой / Г. И. Новицкий, М. И. Федорчук, Б. К. Ширенко // *Агроном.* — 2011. — № 4. — С. 190—191.
13. Диалло Шериф М. Л. Мясная продуктивность молодняка овец породы ромни-марш при использовании в рационах отходов переработки семян расторопши : дис. ...канд. с.-х. наук : 06.02.02 / Диалло Шериф Мохамед Ламин. — М., 2000. — 98 с.
14. Двалишвили В. Г. Рекомендации по кормлению мясо-шерстных овец при интенсивном ведении отрясли. — Дубровицы, 1995. — 43 с.
15. Опалинський Ю. А. Ефективність застосування розторопші плямистої (*Silybum marianum*) для коректування інтенсивності окисних процесів у коропа за умов навантаження свинцем / Ю. А. Опалинський, О. І. Віщур // *Рибогосподарська наука України.* — 2016. — № 3. — С. 99—110.
16. Surai P. F. Silymarin as a natural antioxidant: an overview of the current evidence and perspectives / P. F. Surai // *Antioxidants (Basel).* — 2015. — Vol., № 1. — P. 204—247.
17. Курило В. Розторопша плямиста у гуманній і ветеринарній медицині / В. Курило, С. Кондратюк // *Тваринництво України.* — 2016. — № 1/2. — С. 38—40.
18. Стальная И. Д. Метод определения диеновой конъюгации ненасыщенных высших жирных кислот / И. Д. Стальная // *Современные методы в биохимии* / ред. В. Н. Орехович. — М. : Медицина, 1977. — С. 63—64.
19. Коробейникова Е. Н. Модификация определения продуктов перекисного окисления липидов в реакции с тиобарбитуровой кислотой / Е. Н. Коробейникова // *Лаб. дело.* — 1989. — № 7. — С. 8—9.
20. Дубинина Е. Е. Активность и изоферментный спектр супероксиддисмутазы эритроцитов и плазмы крови человека / Е. Е. Дубинина, Л. А. Сальникова, Л. Ф. Ефимова // *Лаб. дело.* — 1983. — № 10. — С. 30—33.
21. Корольок М. А. Метод определения активности каталазы / М. А. Корольок, Л. И. Иванова, И. Г. Майорова // *Лабораторное дело.* — 1988. — № 1. — С. 16—19.

22. Bradford M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding // *Anal. Biochem.* — 1976. — Vol. 72. — P. 248—254.
23. Кокунин В. А. Статистическая обработка данных при малом числе опытов / В. А. Кокунин // *Укр. биохим. журн.* — 1975. — Т. 47, № 6. — С. 776—790.
24. Кориляк М. З. Вплив розторопші плямистої на рибопродуктивність та деякі фізіолого-біохімічні показники дволіток коропа / М. З. Кориляк, Г. В. Качай, О. М. Фріштак // *Біологія тварин.* — 2014. — Т. 16, № 4. — С. 192.

REFERENCES

1. Hrodzynskiy, A. M. (Ed.). (1990). *Likarski roslyny*. Kyiv.
2. Krepova, L. V., Bortnikova, V. V., & Shkarenkov, A. A. et al. (2004). Doklinicheskoe izuchenie bezopasnosti fitopreparatov, obladayushchikh gepatoprotekturnymi svoystvami. *Aktual'nye problemy sozdaniya novykh lekarstvennykh preparatov prirodnoho proiskhozhdeniya : 8 Mezhdunar. S'ezda "Fitofarm 2004": mater.* Sankt Peterburg, 111-114.
3. Zhurba, O. V., & Dmitriev, M. Ya. (2005). *Lekarstvennye, yadovitye i vrednye rasteniya*. Moskva : Kolos S.
4. Tsaprilova, S. V. & Rodionova, R. A. (2008). Rastoropsha pyatnistaya: khimicheskiy sostav, standartizatsiya, primenenie. *Visnyk farmatsiyi*, 3 (41), 92-104.
5. Heijnen, C. G. M., Haenen, G. R. M. Van Acker, M. F. A. A., Van Der Vijgh, W. J. F., & Bast, A. (2001). Flavonoids as peroxynitrite scavengers: the role of the hydroxyl groups. *Toxicology in Vitro*, 15, 1, 3-6.
6. Nikitkina, A. K., Gushchina, V. A., & Agapkina, N. D. (2003). *Rastoropsha pyatnistaya*. Penza : Penzenskaya gos. s-kh. akad.
7. Abenavoli, L., Capasso, R., & Milic, N. et al. (2010). Milk thistle in liver diseases: past, present, future. *Phytother. Res.*, 24, 10, 1423-1432.
8. Calabrese, V., Cornelius, C., Dinkova-Kostova, A. T., Calabrese, E. J., & Mattson, M. P. (2010). Cellular stress responses, the hormesis paradigm, and vitagenes: novel targets for therapeutic intervention in neurodegenerative disorders. *Antioxid. Redox Signal.*, 13(11), 1763-1811.
9. Khariv, I. I. (2012). Stan humoralnoi lanky imunnoi systemy indykiv, urazhenykh asotsiatyvnoiu eimeriozo-histomonoznoiu invaziieiu ta likovanykh brovitakoktsydom sukupno z plodamy roztoropshi pliamystoi. *Sil'skyi hospodar*, 11/12, 8-11.
10. Khariv, I. I. (2012). Pokaznyky humoralnoho imunitetu intaktnykh indykiv pry zastosuvanni brovitakoktsydu ta poroshku plodiv roztoropshi pliamystoi. *Visnyk Sum'skoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriya Veterynarna medytsyna*, 7, 94-97.
11. Doeva, I. G. (2009). Khozyaystvenno-biologicheskije osobennosti sviney v svyazi s razlichnymi dozami dobavok v ratsiony shrota rastoropshi. *Candidate's thesis*. Vladikavkaz.
12. Novitskiy, G. I., Fedorchuk, M. I., & Shirenko, B. K. (2011). Osobennosti tekhnologii vyrashchivaniya rastoropshi pyatnistoy. *Agronom*, 4, 190-191.
13. Diallo Sherif, M. L. (2000). Myasnaya produktivnost' molodnyaka ovets porody romni-marsh pri ispol'zovanii v ratsionakh otkhodov pererabotki semyan rastoropshi. *Candidate's thesis*. Moskva.

14. Dvalishvili, V. G. (1995). *Rekomendatsii po kormleniyu myaso-sherstnykh ovets pri intensivnom vedenii otrasyali*. Dubrovitsy.
15. Opalynskiy, Iu. A., & Vishchur, O. I. (2016). Efektyvnist zastosuvannya roztoropshi pliamystoi (*Silybum marianum*) dlia korektuvannya intensyvnosti okysnykh protsesiv u koropa za umov navantazhennia svyntsem. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 3, 99-110.
16. Surai, P. F. (2015). Silymarin as a natural antioxidant: an overview of the current evidence and perspectives. *Antioxidants*, 4, 1, 204-247.
17. Kurylo, V., & Kondratiuk, S. (2016). Roztoropsha pliamysta u humannii i veterynarnii medytsyni. *Tvarynnytstvo Ukrainy*, 1/2, 38-40.
18. Stal'naya, I. D. (1977). Metod opredeleniya dienovoy kon'yugatsii nenasyshchenykh vysshikh zhirnykh kislot. *Sovremennye metody v biokhimii*. Orekhovich, V. N. (Ed.). Moskva : Meditsina, 63-64.
19. Korobeynikova, E. N. (1989). Modifikatsiya opredeleniya produktov perekisnogo okisleniya lipidov v reaktsii s tiobarbiturovoy kislotoy. *Laboratornoe delo*, 7, 8-9.
20. Dubinina, E. E., Sal'nikova, L. A., & Efimova, L. F. (1983). Aktivnost' i izofermentnyy spektr superoksiddismutazy eritrotsitov i plazmy krovi cheloveka. *Laboratornoe delo*, 10, 30-33.
21. Korolyuk, M. A., Ivanova, L. I., & Mayorova, I. G. (1988). Metod opredeleniya aktivnosti katalazy. *Laboratornoe delo*, 1, 16-19.
22. Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Anal. Biochem.*, 72, 248-254.
23. Kokunin, V. A. (1975). Statisticheskaya obrabotka dannykh pri malom chisle opytov. *Ukr. biokhim. zhurn.*, 47, 6, 776-790.
24. Koryliak, M. Z., Kachai, H. V., & Frishtak, O. M. (2014). Vplyv roztoropshi pliamystoi na ryboproduktyvnist ta deiaki fiziolohe-biokhimichni pokaznyky dvolitok koropa. *Bioloheia tvaryn*, 16, 4, 192.

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГЕПАТОПАНКРЕАСЕ ДВУХЛЕТОК КАРПА ПРИ ВВЕДЕНИИ В СОСТАВ КОРМОВ СЕМЯН РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ (*SILYBUM MARIANUM*)

М. З. Кориляк, stasiv8@gmail.com.ua, Інститут рибного господарства НААН, г. Київ

І. І. Грициняк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, г. Київ

О. В. Дерень, deren@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, г. Київ

О. П. Добрянська, olya_dobryanska@ukr.net, Львівська опытная станція ІРХ НААН, г. Львів

Цель. Изучить влияние семян расторопши пятнистой, введенной в основной состав рациона карпа, на функциональное состояние системы антиоксидантной защиты (САЗ) и образование продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в гепатопанкреасе рыб.

Методика. Исследования проводились на базе ГП ОХ Львовской опытной станции ИРХ в двух повторностях. Первую повторность провели в 2013 г., вторую в 2014 г. в производственных условиях прудов-аналогов по площади с единым источником водоснабжения.

Объектом исследования были двухлетки любеньского чешуйчатого карпа. Эксперимент состоял из четырех вариантов и длился 60 дней. В контрольной группе карпы

получали в течение всего вегетационного периода полнорационный комбикорм без добавок, в опытных группах 1, 2 и 3 — дополнительно в состав основного рациона соответственно 1, 5 и 10% измельченных плодов расторопши пятнистой. Расторопшу вводили в состав корма методом гранулирования.

По завершении эксперимента у опытных групп рыб были отобраны образцы тканей для проведения биохимических исследований. Использовали 10% гомогенаты тканей гепатопанкреаса карпа. Исследовали концентрацию диеновых конъюгатов по методу, основанному на реакции оптической плотности гептаизопропанольного экстракта липидов. Определение концентрации ТБК-активных продуктов проводили спектрофотометрически по цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой. Активность супероксиддисмутазы (СОД) — по определению процента торможения реакции восстановления нитросинего тетразолия в присутствии феназинметасульфата. Активность каталазы — по изменению концентрации H_2O_2 . Определение содержания белка проводили по методу Бредфорда.

Обработку экспериментальных результатов проводили методом вариационной статистики. Статистически достоверную разницу показателей оценивали по t-критерию Стьюдента.

Результаты. В результате проведенных экспериментальных исследований в производственных условиях в двух повторностях отмечено активацию САЗ и снижение интенсивности процессов ПОЛ в гепатопанкреасе всех трех опытных групп карпов, которым в состав рациона были введены измельченные плоды расторопши пятнистой из расчета 1, 5 и 10%, относительно контрольной.

Данная тенденция более выражена при использовании 1 и 5% данной добавки в составе корма. В частности в первой повторности достоверно возрастает ($P < 0,001$), а во второй отмечается тенденция к росту содержания СОД на 13,8–58,2% и снижению концентрации конечного звена продуктов ПОЛ (ТБК) на 19,9–73,7%.

Следовательно, использование расторопши пятнистой оказывает положительное действие на антиоксидантную систему двухлесток карпа, что, в свою очередь, позитивно отразится на функциональном состоянии их организма.

Научная новизна. Проблема поиска средств преодоления влияния стресс-факторов на организм карпа, возникающих в процессе выращивания, является актуальной в нынешних условиях, поскольку они негативно сказываются на функциональном состоянии организма рыб в целом. Действенным средством решения данной проблемы является использование в кормлении карпа добавок с антиоксидантными свойствами. Учитывая полученные положительные результаты в животноводстве и некоторые наработки в рыбоводстве, исследование эффективности использования расторопши пятнистой в кормлении карпа с этой целью и установление норм и методов ее пролонгированного введения в состав рациона карпа является актуальной задачей, имеющей как научное, так и практическое значение.

Практическая значимость. Установление положительного влияния применения в кормлении карпа семян расторопши пятнистой на активность течения окислительных процессов в организме предоставит производителям рыбной продукции получить экономически эффективный и экологически безопасный способ нивелирования стресс-факторов, которые оказывают негативное воздействие на организм рыб в процессе выращивания, при этом напрямую влияя на продуктивность водоемов.

Ключевые слова: расторопша пятнистая, карп, система антиоксидантной защиты, продукты перекисного окисления липидов.

THE COURSE OF OXIDATIVE PROCESSES IN THE HEPATOPANCREAS
OF AGE-2 CARP AFTER SUPPLEMENTING THE FEEDS WITH THISTLE
(*SILYBUM MARIANUM*) SEEDS

M. Korylyak, stasiv8@gmail.com.ua, Institute of Fisheries, Kyiv

I. Hrytsyniak, info@if.org.ua, Institute of Fisheries, Kyiv

O. Deren, deren@if.org.ua, Institute of Fisheries, Kyiv

O. Dobrianska, olya_dobryanska@ukr.net, Lviv Research Station, Lviv

Purpose. To study the effect of thistle seeds introduced into the basic diet of carp, the functional state of antioxidant protection (AOP) and the formation of lipid peroxidation products (LPP) in fish hepatopancreas.

Methodology. The study has been carried out at the Lviv Research Station of the Institute of Fisheries in duplicate. The first replication was done in 2013, the second one in 2014 at industrial conditions of ponds with similar areas and with the same source of water supply.

The object of the study were age-2 Lubin scaled carp. The experiment consisted of four variants and lasted 60 days. The control group of carp received a complete combined feed without additives during the entire growing season, while the experimental groups 1, 2 and 3 received feeds supplemented with 1, 5 and 10% of milled thistle. Thistle was introduced into the feed composition by granulation method.

At the end of the experiment, tissue samples of the experimental groups of fish were taken for biochemical analysis. We used 10% tissue homogenates of carp hepatopancreas. We investigated the concentration of diene conjugates using a method based on the reaction of optical density of lipid heptanizopropanol extract. The determination of TBA-active products was carried out spectrophotometrically based on the color reaction with tiobarbitur acid. The activity of superoxide dismutase (SOD) was studied by determining the percentage inhibition of nitroblue tetrazolium reduction reaction in the presence of fenazynmetasulfate. The activity of catalase was analyzed based on the concentration of H_2O_2 . The determination of protein content was performed by Bradford method.

The processing of experimental results was performed by variational statistics. Statistically significant difference was assessed using a Student t-test.

Findings. As a result of experimental studies in industrial conditions in duplicate, we detected AOP activation and reduction in LPO process intensity in hepatopancreas of all three experimental groups of carp, which received the feed supplemented with 1, 5 and 10% of milled thistle as compared to the control.

This trend was more pronounced when using 1 and 5% of this additive in feed composition. In particular, the SOD content significantly increased ($P < 0.001$) in the first replicate and there was a trend for its increase by 13.8–58.2% in the second replicate as well as a reduction in the concentration of the end lipid peroxidation products of LPO (MDA) by 19.9–73.7%.

Thus, the use of thistle has a positive effect on antioxidant system on age-2 carp, which in turn will have a positive effect on the functional state of their organism.

Originality. The problem of finding the means to mitigate the impact of stress factors on carp, which arise during their rearing, is relevant in today's conditions, since they adversely affect the functional state of fish organism as a whole. An effective way to solve this problem is to use feed supplemented with substances with antioxidant properties. Taking into account the positive results in animal husbandry and some experience in fish farming, the studies of the efficiency of the use of thistle in feeding carp and the determination of norms and methods of its prolonged addition to the diet of carp is an urgent task that has both scientific and practical importance.

Practical value. The determination of a positive effect of the use of thistle seeds in carp feeding on the activity of the course of oxidative processes in fish body will allow fish farmers to obtain a cost-effective and environmentally safe mean of levelling the stress factors that have a negative effect on fish during their rearing, at the same time directly influencing on the productivity of fish ponds.

Keywords: thistle, carp, antioxidant system, lipid peroxidation product.

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 84-91
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.084>
УДК 639.3:597.551.2:616.15(477.7)

СЕЗОННІ ЗМІНИ МОРФОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ КОРОПОВИХ РИБ, ВИРОЩЕНИХ ЗА ПАСОВИЩНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Ю. М. Воліченко, wwebneon173@gmail.com, ДВНЗ «Херсонський ДАУ», м. Херсон
С. І. Пентиліук, s-pentilyuk@mail.ru, ДВНЗ «Херсонський ДАУ», м. Херсон
І. М. Шерман, sherman_i.m@mail.ru, ДВНЗ «Херсонський ДАУ», м. Херсон

Мета. Розглянути сезонні зміни гематологічних показників коропових риб в період зимового утримання та встановити певні закономірності тих чи інших параметрів внутрішнього середовища організму дослідної групи цьоголіток та однорічок.

Методика. Дослідження ґрунтуються на польових і лабораторних методах, прийнятих у рибогосподарських, фізіологічних і статистичних дослідженнях.

Результати. Отримані дані фізіологічного стану організму риб після зимового утримання свідчать про зниження вмісту загального білка крові; високу кількість еритроцитів — від 1,7 у коропа до 2,4 млн/мкл у строкатого товстолобика та білого амура, високий еритропоез (8,0–25,0%) еритроцитів; зниження вмісту лейкоцитів з підвищенням частки нейтрофільних гранулоцитів у лейкоцитарній формулі. За біохімічним аналізом сироватки крові, відмічено характерне зниження загального білка в крові, та зниження глюкози в межах від 25,0 до 53,1%. Також відмічається зменшення рівня тригліцеридів та холестеролу на 24,7–59,5%.

Наукова новизна. Здійснено аналіз гематологічних показників цьоголіток та однорічок коропових риб, вирощених за пасовищною технологією в період зимового утримання. Отримані результати свідчать про певні зміни фізіологічного стану рибопосадкового матеріалу та можуть розглядатися як специфічний сигнал для розроблення відповідних профілактичних заходів та оптимізації технологічних параметрів при організації процесу подальшого вирощування.

Практична значимість. Отримані дані дозволяють науково обґрунтовано рекомендувати їх як компонент індикації якості та загального фізіологічного стану рибопосадкового матеріалу.

Ключові слова: коропові види риб, гематологічні показники, зимувальні стави, середня маса, вгодованість, кореляція.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Морфологічний статус коропових риб як сукупність морфологічних, гематологічних та біохімічних показників об'єктивно відображає функціональний стан організму, який залежить від сезону, віку, темпу росту, генетичних особливостей, може ефективно використовуватися для вирішення теоретичних і практичних питань рибогосподарської науки.

© Ю. М. Воліченко, С. І. Пентиліук, І. М. Шерман, 2017

Проблеми аквакультури вимагають подальшого розвитку теорії та практики застосування морфологічних індикаторів для вдосконалення біотехніки вирощування рибосадкового матеріалу [1].

Незважаючи на фундаментальні дослідження в області гематології риб, рівень знань про метод морфологічного аналізу крові і ефективність його практичного використання все ще недостатній, порівнюючи із застосуванням їх в клінічній медицині [2–4].

Існуючі відомості щодо складу, способів ідентифікації, морфологічних особливостей і кількісної динаміки формених елементів крові риб не дозволяють ефективно використовувати ці показники в якості морфологічного індикатора, тому дослідження з гематології риб зберігають актуальність.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

В спеціальній літературі, орієнтованій на вирощування рибосадкового матеріалу корокових риб за пасовищною технологією, практично відсутні дані про клінічні, морфологічні та гематологічні зміни показників крові цього літо в період зимівлі в умовах півдня України.

В зв'язку з цим, досить важливою є ліквідація існуючої прогалини, враховуючи особливості регіону на фоні загальної тенденції глобального підвищення температури.

Поряд з цим, картина крові є об'єктивним та високолабільним показником фізіологічного стану особин і дає уяву відносно зміни тих чи інших параметрів навколишнього середовища при вирощуванні однорічок корокових риб, які формуються у процесі зимівлі. Оптимальні фактичні дані можуть розглядатися як специфічний сигнал для розробки відповідних профілактичних заходів з оптимізації технологічних параметрів при організації процесу подальшого вирощування.

Виходячи з цього, в процесі досліджень було здійснено аналіз морфологічного стану цього літо та однорічок корокових риб, вирощених за пасовищною технологією, у зв'язку з зимовим утриманням.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження мінливості гематологічних показників проводили в умовах зимувальних ставів Херсонського виробничо-експериментального заводу, де здійснюється утримання рибосадкового матеріалу корокових риб для подальшого вселення в пониження Дніпра.

Об'єктом досліджень слугував рибосадковий матеріал корокових риб, вирощених за пасовищною технологією. Предметом досліджень — морфологічні та біохімічні показники крові цього літо та однорічок корокових риб у зв'язку з зимовим утриманням.

Відбір матеріалу проводився методом рендомізації для визначення гематологічних показників протягом 2015–2016 рр. і охоплював осінньо-зимовий період, коли температура води становила 10°C.

Відбір проб крові проводили прижиттєво з хвостової артерії за допомогою шприца. Невелику краплю крові наносили на край предметного скла для виготовлення тонкого мазка. Після висушування мазків проводили їх фіксацію й фарбування препаратів, використовуючи еозин за Май-Грюнвальдом та азур-еозин за Романовським [7]. Фарбування, як і фіксацію препаратів, проводили відразу після виготовлення й просушування мазка. Мікроскопіювання пофарбованих препаратів здійснювали під оптичним мікроскопом Biolar. Для підрахунку лейкоцитарної формули крові використовували одинадцятиклавішний рахунковий прилад. Підрахунок формених елементів крові починали із середини мазка.

Предметне скло пересували поступово: то у вертикальному, то в горизонтальному напрямках. На мазку підраховували двісті клітин білої крові. Формені елементи крові диференціювали залежно від їхньої приналежності до тих або інших груп клітин. Після цього обчислювали відсотковий вміст клітин. Для підрахунку кількості лейкоцитів крові використовували камеру Горяєва [3–9].

Біохімічний аналіз сироватки крові проводили на біохімічному аналізаторі Humalyzer 3000 (Німеччина) за допомогою стандартних уніфікованих наборів від Human GmbH (Німеччина).

Отримані матеріали були піддані варіаційно-статистичному аналізу за загальноприйнятими методиками [10, 11] та оброблені за допомогою статистичного пакету програми STATISTICA 8.0.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Середня маса досліджувальних видів риб становила: короп — $98,8 \pm 17,76$ г, білого товстолобика — $45,4 \pm 12,92$ г, строкатого товстолобика — $80,0 \pm 16,23$ г, білого амура — $56,5 \pm 3,18$ г (табл. 1). Після зимівлі втрати маси були невеликі, оскільки риба протягом вегетаційного періоду була забезпечена кормами, а у ранньовесняний період живлення практично припинялося на фоні тимчасово підвищених температур, що є характерним для господарств півдня України.

Таблиця 1. Вплив зимівлі на лінійні розміри (L, l), масу тіла (p) і вгодованість (Kв) коропових риб ($M \pm m$, $n=120$)

Вид риб	Період	L, см	l, см	p, г	Kв
Короп	До зимівлі	$17,90 \pm 0,322$	$14,80 \pm 0,231$	$98,80 \pm 17,710$	$3,04 \pm 0,080$
	Після зимівлі	$18,50 \pm 0,341$	$15,40 \pm 0,302$	$102,40 \pm 14,304$	$2,80 \pm 0,012$
Білий товстолобик	До зимівлі	$16,20 \pm 0,211$	$15,00 \pm 0,210$	$45,40 \pm 12,911$	$1,34 \pm 0,043$
	Після зимівлі	$15,90 \pm 0,224$	$13,10 \pm 0,114$	$40,20 \pm 14,320$	$1,78 \pm 0,051$
Строкатий товстолобик	До зимівлі	$14,40 \pm 0,311$	$14,20 \pm 0,205$	$80,00 \pm 16,201$	$2,79 \pm 0,032$
	Після зимівлі	$11,20 \pm 0,125$	$13,50 \pm 0,110$	$30,10 \pm 14,503$	$1,22 \pm 0,031$
Білий амур	До зимівлі	$16,50 \pm 0,152$	$14,70 \pm 0,231$	$56,50 \pm 3,115$	$1,77 \pm 0,051$
	Після зимівлі	$14,10 \pm 0,212$	$13,10 \pm 0,204$	$38,40 \pm 5,702$	$1,70 \pm 0,040$

Виходячи з практично прийнятої оцінки якості рибопосадкового матеріалу за лінійними розмірами, середньою індивідуальною масою тіла та вгодованістю, нами була зроблена спроба в порівняльному аспекті оцінити цьоголіток та

однорічок корокових риб, пов'язавши морфологічні показники тіла з певними гематологічними даними [12].

Після закінчення зимового утримання серед однорічок корокових риб дослідної групи було відібрано матеріал для гематологічного аналізу, результати якого наведені в табл. 2.

Таблиця 2. Гематологічні показники крові однорічок корокових (M $\pm$ m, n=60)

Показник	Короп	Білий товстолобик	Строканий товстолобик	Білий амур
Гемоглобін, г/л	89,60 $\pm$ 3,121	98,42 $\pm$ 2,352	65,74 $\pm$ 4,242	93,23 $\pm$ 2,474
Еритроцити, млн/мкл	1,72 $\pm$ 0,040	2,35 $\pm$ 0,140	2,43 $\pm$ 0,252	2,41 $\pm$ 0,030
Лейкоцити, тис./мкл	12,54 $\pm$ 1,421	52,42 $\pm$ 5,715	34,41 $\pm$ 2,275	42,72 $\pm$ 0,451
Нейтрофіли, %	10,41 $\pm$ 1,304	9,26 $\pm$ 0,752	8,74 $\pm$ 1,213	2,14 $\pm$ 0,217
Еозинофіли, %	4,12 $\pm$ 0,021	–	5,12 $\pm$ 0,011	–
Базофіли, %	0,21 $\pm$ 0,100	–	–	–
Піністі клітини, %	2,91 $\pm$ 0,374	–	–	–
Моноцити, %	7,22 $\pm$ 0,418	2,12 $\pm$ 0,040	2,43 $\pm$ 0,151	6,22 $\pm$ 0,243
Лімфоцити, %	79,30 $\pm$ 2,425	82,91 $\pm$ 2,214	69,52 $\pm$ 2,521	93,24 $\pm$ 0,354
Загальний білок, г/л	18,31 $\pm$ 2,050	17,43 $\pm$ 2,081	16,14 $\pm$ 1,872	18,76 $\pm$ 1,143
Креатинін, мг/дл	0,34 $\pm$ 0,108	0,32 $\pm$ 0,024	0,32 $\pm$ 0,027	0,32 $\pm$ 0,021
Кальцій, мг/дл	6,32 $\pm$ 0,421	8,01 $\pm$ 0,412	7,91 $\pm$ 0,395	7,54 $\pm$ 0,421
Фосфор, мг/дл	16,31 $\pm$ 0,402	21,64 $\pm$ 1,631	21,91 $\pm$ 1,735	22,92 $\pm$ 0,773
Тригліцериди, мг/дл	46,94 $\pm$ 18,394	167,32 $\pm$ 19,093	168,62 $\pm$ 19,124	34,56 $\pm$ 16,080
Холестерол, мг/дл	96,35 $\pm$ 8,108	222,01 $\pm$ 28,423	222,34 $\pm$ 28,214	256,62 $\pm$ 14,511
Глюкоза, мг/дл	49,81 $\pm$ 9,070	22,54 $\pm$ 3,991	32,61 $\pm$ 4,154	41,90 $\pm$ 4,324

Порівняння відповідних параметрів цьогоріток з однорічками переконливо свідчить про наявність досить суттєвих змін у гематологічних показниках однорічок корокових риб. Після зимового утримання фізіологічний стан однорічок характеризується сталим вмістом гемоглобіну; тенденцією до зниження вмісту загального білка крові; високою кількістю еритроцитів (від 1,7 млн/мкл у коропа до 2,4 млн/мкл у строкатого товстолобика та білого амура); високим еритропоезом еритроцитів (8,0–25,0%); зниженням вмісту лейкоцитів з підвищенням частки нейтрофільних гранулоцитів в лейкоцитарній формулі. На нашу думку, збільшення частки нейтрофілів може відбуватися за рахунок накопичення в крові зрілих клітин. При цьому еозинофіли, базофіли, піністі клітини та бласти зустрічаються епізодично.

За біохімічним аналізом сироватки крові, спостерігається зниження загального білка, що пояснюється недостатнім надходженням його з їжею в період зимового утримання без проведення годівлі, та зниження глюкози в межах від 25,0 до 53,1% після зимівлі. Також відмічається зниження вмісту тригліцеридів та холестеролу, які виконують функції енергетичного депо на 24,7–59,5%.

Для уточнення закономірностей фізіологічних змін за період зимівлі в організмі коропових риб були проаналізовані кореляційні зв'язки важливих морфофізіологічних індикаторів: вгодованості та маси тіла риб з дослідженими фізіологічними показниками (табл. 3).

Таблиця 3. Коефіцієнти кореляції між морфофізіологічними показниками рибопосадкового матеріалу після зимового утримання, $\Sigma(x_i - y_i)$

Показник	Короп		Білий товстолобик		Строкатий товстолобик		Білий амур	
	р	Кв	р	Кв	р	Кв	р	Кв
Гемоглобін, г/л	0,75*	0,71*	0,75*	0,72*	0,62*	0,59*	0,64*	0,65*
Еритроцити, млн/мкл	0,68*	0,65*	0,71*	0,69*	0,72*	0,63*	0,74*	0,77*
Лейкоцити, тис./мкл	-0,60*	-0,52*	-0,57	-0,43	-0,60*	-0,52*	-0,67*	-0,63*
Нейтрофіли, %	-0,59*	-0,47*	-0,62*	-0,54*	-0,71*	-0,70*	-0,82*	-0,76*
Еозинофіли + псевдоеозинофіли, %	-0,61*	-0,74*	-	-	-0,52*	-0,48*	-	-
Базофіли + псевдобазофіли, %	0,49	4,37	-	-	-	-	-	-
Піністі клітини, %	-0,67	-0,41	-	-	-	-	-	-
Моноцити, %	-0,71*	-0,66*	-0,70*	-0,67*	-0,85*	-0,76*	-0,75*	-0,72*
Лімфоцити, %	0,78*	0,75*	0,62*	0,53*	0,64*	0,52*	0,59*	0,57*
Загальний білок, г/л	0,75	0,41	0,51	0,48	0,41	0,32	0,41	0,21
Креатинін, мг/дл	0,49	0,22	-0,12	-0,12	0,27	0,15	0,40	0,33
Кальцій, мг/дл	0,46	0,10	0,42	0,37	0,35	0,27	0,37	0,22
Фосфор, мг/дл	0,57*	0,44**	0,61*	0,59**	0,68*	0,67**	0,56	0,55
Тригліцериди, мг/дл	0,69*	0,62**	0,72*	0,65**	0,72*	0,68**	0,57	0,51
Холестерол, мг/дл	0,70*	0,68**	0,84*	0,84**	0,78*	0,72**	0,67*	0,57**
Глюкоза, мг/дл	-0,67	-0,52	-0,47	-0,42	-0,21	-0,15	-0,24	-0,12

Примітка. * — $p < 0,05$, ** — $p < 0,01$

Кореляційний аналіз свідчить про достовірні позитивні залежності показників крові за кількістю гемоглобіну, еритроцитів та лімфоцитів всіх досліджуваних видів коропових ($p < 0,05$) від їх середньої маси та вгодованості.

Також встановлено достовірні залежності між вмістом у сироватці крові метаболітів фосфору у білого та строкатого товстолобика, тригліцеридів у коропа та білого товстолобика та холестеролу у коропа та білого товстолобика ($p < 0,01$) (табл. 3).

Певні від'ємні залежності спостерігалися за показниками нейтрофілів, частково еозинофілів та моноцитів у всіх досліджуваних груп риб, де коефіцієнти кореляції для проаналізованих параметрів статистично достовірні.

Встановлені коефіцієнти кореляції надають можливість виявити та суттєво розширити складові низки формених елементів крові, що тісно пов'язані з якістю рибопосадкового матеріалу, який сьогодні переважно оцінюють за

середньою масою та коефіцієнтом вгодованості. Поєднання традиційної оцінки якості рибопосадкового матеріалу з морфологічним аналізом та їх математичної інтерпретації дає можливість здійснити істотний внесок у вдосконалення оцінки якості рибопосадкового матеріалу.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

При проведенні досліджень виявлено, що після зимівлі фізіологічний стан організму корокових характеризується сталим вмістом гемоглобіну; високою кількістю еритроцитів; зниженням вмісту лейкоцитів з підвищенням частки нейтрофільних гранулоцитів в лейкоцитарній формулі.

За біохімічним аналізом сироватки крові, після зимівлі спостерігається зниження вмісту в ній загального білка, а також глюкози, тригліцеридів та холестеролу.

Кореляційний аналіз показав достовірні позитивні залежності параметрів крові за фізіологічними показниками від середньої маси та показника вгодованості у всіх досліджуваних видів корокових риб.

Аналізуючи отримані дані, вважаємо, що вміст та фракційний склад морфологічних показників крові дозволяє рекомендувати їх як додатковий компонент індикації якості та загального фізіологічного стану рибопосадкового матеріалу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Головина Н. А. Гематология прудовых рыб / Н. А. Головина, И. Д. Тромбицкий. — Кишинев : Штиинца, 1989. — 158 с.
2. Иванова Н. Т. Материалы к морфологии крови рыб / Иванова Н. Т. — Ростов-н/Д., 1970. — 138 с.
3. Иванова Н. Т. Система крови / Иванова Н. Т. — Ростов-н/Д., 1995. — 155 с.
4. Иванова Н. Т. Атлас клеток крови рыб / Иванова Н. Т. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1999. — 50 с.
5. Житенева Л. Д. Эколого-гематологические характеристики некоторых видов рыб : справочник / Житенева Л. Д., Рудницкая О. А., Калюжная Т. Н. — Ростов-н/Д. : Молот, 1997. — 152 с.
6. Житенева Л. Д. Атлас нормальных и патологически измененных клеток крови рыб / Житенева Л. Д., Полтавцева Т. Г., Рудницкая О. А. — Ростов-н/Д. : Кн. изд-во, 1989. — 112 с.
7. Методические указания по проведению гематологического обследования рыб / Минсельхозпрод России. — М., 1999. — 16 с.
8. Фізіологія риб: Практикум : навч. посіб. / [Дехтярьов П. А., Шерман І. М., Ю. В. Пилипенко та ін.]. — К. : Вища школа, 2001. — 128 с.
9. Дехтярьов П. А. Фізіологія риб : підручник / Дехтярьов П. А., Євтушенко М. Ю., Шерман І. М. — К. : Аграрна освіта, 2008. — 342 с.
10. Плохинский Н. А. Биометрия / Плохинский Н. А. — Новосибирск : СОАН СССР, 1961. — 364 с.
11. Рокицкий П. Ф. Основы вариационной статистики для биологов / Рокицкий П. Ф. — Минск, 1961. — 217 с.
12. Воліченко Ю. М. Гематологічні показники крові цьоголіток корокових риб (*Cyprinidae*), вирощених за пасовищною технологією в умовах півдня України / Ю. М. Воліченко, С. І. Пентиліук, І. М. Шерман // Рибогосподарська наука України. — 2015. — № 4. — С. 90—98.

REFERENCES

1. Golovina, N. A., & Trombickij, I. D. (1989). *Gematologija prudovyh ryb*. Kishinev : Shtiinca.
2. Ivanova, N. T. (1970). *Materialy k morfologii krovi ryb*. Rostov-na-Donu.
3. Ivanova, N. T. (1995). *Sistema krovi*. Rostov-na-Donu.
4. Ivanova, N. T. (1999). *Atlas kletok krovi ryb*. Moskva : Legkaja i pishhevaja promyshlennost'.
5. Zhiteneva, L. D., Rudnickaja, O. A., & Kaljuzhnaja, T. N. (1997). *Jekologo-gematologicheskie harakteristiki nekotoryh vidov ryb: spravocnik*. Rostov-na-Donu : Molot.
6. Zhiteneva, L. D., Poltavceva, T. G., & Rudnickaja, O. A. (1989). *Atlas normal'nyh i patologicheski izmenennyh kletok krovi ryb*. Rostov-na-Donu : Kn. izd-vo.
7. Minsel'hozprod Rossii. (1999). *Metodicheskie ukazaniya po provedeniju gematologicheskogo obsledovanija ryb*. Moskva.
8. Dekhtyar'ov, P. A., Sherman, I. M., Pylypenko, Yu. V., Yarzhombe, O. O., & Vovchenko, S. H. (2001). *Fiziolohiya ryb: Praktikum: navch. posib*. Kyiv : Vyshcha shkola.
9. Dekhtyar'ov, P. A., Yevtushenko, M. Yu., & Sherman, I. M. (2008). *Fiziolohiya ryb: pidruchnyk*. Kyiv : Ahrarna osvita.
10. Plohinskij, N. A. (1961). *Biometrija*. Novosibirsk : Izd-vo SOAN SSSR.
11. Rokickij, P. F. (1961). *Osnovy variacionnoj statistiki dlja biologov*. Minsk.
12. Volichenko, Yu. M., Pentylyuk, S. I., & Sherman, I. M. (2015). Hematolohichni pokaznyky krovi ts'oholitok koropovykh ryb (*Cyprinidae*), vyroshchennykh za pasovyschnoyu tekhnolohiyeyu v umovakh pivdnya Ukrayiny. *Rybohospodars'ka nauka Ukrayiny*, 4, 90-98.

СЕЗОННЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КАРПОВЫХ РЫБ ПРИ ПАСТБИЩНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЮГА УКРАИНЫ

Ю. Н. Воличенко, wwwebneon173@gmail.com, ГБУЗ «Херсонский ГАУ», г. Херсон
С. И. Пентелюк, s-pentilyuk@mail.ru, ГБУЗ «Херсонский ГАУ», г. Херсон
И. М. Шерман, sherman_i.m@mail.ru, ГБУЗ «Херсонский ГАУ», г. Херсон

Цель. Рассмотреть сезонные изменения гематологических показателей карповых рыб в период зимнего содержания и установить определенные изменения тех или иных параметров внутренней среды опытной группы сеголеток и годовиков.

Методика. Исследования основываются на экспериментальных и лабораторных методах, принятых в рыбохозяйственных, физиологических и статистических исследованиях.

Результаты. Полученные данные физиологического состояния рыб после зимнего содержания свидетельствуют о снижении содержания общего белка крови, высоком количестве эритроцитов — от 1,7 у карпа до 2,4 млн/мкл у пестрого толстолобика и белого амура, высоком эритропозе (8,0–25,0%) эритроцитов; снижении содержания лейкоцитов с повышением доли нейтрофильных гранулоцитов в лейкоцитарной формуле. Биохимический анализ сыворотки крови выявил снижение содержания общего белка и снижение глюкозы в пределах 25,0–53,1%. Также отмечается понижение уровня триглицеридов и холестерина на 24,7–59,5%.

Научная новизна. Впервые осуществлен анализ гематологических показателей крови в связи с зимним содержанием сеголеток и годовиков карпа, белого и пестрого толстолобика,

белого амура, выращенных по пастбищной технологии. Установлено, что изменения гематологических показателей годовиков карповых рыб свидетельствуют об определенных изменениях физиологического состояния рыбопосадочного материала и могут рассматриваться как специфический сигнал для разработки соответствующих профилактических мер и оптимизации технологических параметров при организации процесса выращивания двухлеток.

Ключевые слова: средняя масса, упитанность, гематологические показатели, зимовальные пруды, корреляция.

AGE AND SEASONAL CHANGES OF MORPHO-PHYSIOLOGICAL STATE OF CYPRINIDS REARED BY RANCHING TECHNOLOGY IN CONDATIONS OF THE SOUTHERN UKRAINE

Y. Volichenko, wwwneon173@gmail.com, Kherson State Agrarian University, Kherson

S. Penteluk, s-pentilyuk@mail.ru, Kherson State Agrarian University, Kherson

I. Sherman, sherman_i.m@mail.ru, Kherson State Agrarian University, Kherson

Purpose. To examine the dynamics of hematological parameters of cyprinids during winter and to determine certain relationships of these or other internal parameters of the experimental groups of the young-of-the-year and yearlings.

Methodology. Studies are based on experimental and laboratory methods adopted in the fishery, physiological and statistical studies.

Findings. The obtained data of the physiological state of fish after wintering indicate on the reduced content of total blood protein; high number of red blood cells from 1.7 to 2.4 mil/ml in bighead carp and grass carp, high erythropoiesis (8.0–25.0%) of red blood cells; reduction in the content of white blood cells with an increased share of neutrophil granulocyte in leukocyte formula. The biochemical analysis of blood serum showed a typical reduction in total blood protein and reduction in glucose within 25.0–53.1%. There was a pronounced reduction in triglycerides and cholesterol by 24.7–59.5%. Eosinophils, basophils, foam cells and blasts occur sporadically.

The correlation analysis showed a significant positive relationship between blood physiological indices and mean weight as well as condition factor in all studied carp species.

Originality. The analysis of the hematological parameters of blood parameters in relation to wintering of the young-of-the-year common carp, silver carp, bighead carp, and grass carp reared by fish ranching technology was carried out for the first time. It was found that changes in hematological parameters of carp yearlings indicated on certain changes in the physiological state of fish seeds and could be considered as a specific signal for the development of appropriate preventive measures and optimization of the technological parameters when organizing the process of age-2 fish rearing.

Practical value. These data can be used as a component of quality indication and general physiological condition of fish seeds.

Keywords: mean weight, condtion factor, hematological indices, wintering ponds, correlation.

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 92-117
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.092>
УДК 597-111.12:597.442

ОСНОВНІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОСЕТРОВИХ ВИДІВ РИБ (*ACIPENSERIDAE*) (ОГЛЯД)

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

Мета. Проаналізувати наукові джерела щодо фізіолого-біохімічних, екологічних та генетичних особливостей основних гематологічних показників та закономірностей їх мінливості у осетрових видів риб (*Acipenseridae*). Розглянути загальні моменти ліпідного та білкового обміну в сироватці крові та вплив на них біотичних і абіотичних чинників. Висвітлити загальні риси ферментів сироватки крові.

Результати. Огляд наукових праць виявив, що хоча гематологічні показники осетрових риб в цілому аналогічні таким у костистих риб та ссавців, є низка істотних відмінностей. Крім того, багатьом гематологічним показникам властива видова специфічність навіть в межах родини. Особливої уваги заслуговує мінливість гематологічних показників під впливом чинників як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. У роботі описано вплив статевих та вікових чинників, а також сезонності на склад крові осетрових. Викладено основи використання білків сироватки крові в генетично-популяційних дослідженнях. Показано особливості функціонування гемоглобіну еритроцитів осетрових. Розглянуто основні гематологічні показники при формуванні та дозріванні статевих продуктів, їх вплив на фертильність. Висвітлено іонний склад крові.

Практична значимість. Систематизовані дані стосовно основних гематологічних показників та закономірностей їх мінливості у осетрових видів риб стануть у пригоді як дослідникам, так і фермерам-рибоводам. Це обумовлено тим, що аналіз крові як найбільш лабільної системи організму, не лише чітко відображає фізіологічний стан особини в конкретно заданих умовах існування, а й використовується в генетично-популяційних дослідженнях. Таким чином, знання основних закономірностей формування складу крові осетрових риб є необхідним для подальших досліджень в рибогосподарській науці. Масив узагальненої інформації буде корисним при формуванні ремонтно-маточних стад, оцінці якості молоді, визначенні ступеня готовності плідників до нересту, при іхтіопатологічних ситуаціях на господарствах тощо.

Ключові слова: осетрові види риб (*Acipenseridae*), гематологічні показники, червона кров, гематокрит, гемоглобін, біла кров, лейкоцитарна формула осетрових, ліпопротеїди, лізоцим осетрових, фертильність, білки сироватки крові, альбуміни, глобуліни, глюкоза.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Всеохоплююче дослідження крові осетрових видів риб (*Acipenseridae*) розпочалося в другій половині 60-х років ХХ ст. на теренах колишнього Радянського Союзу і триває донині. Це пояснюється тим, що кров є поліфункціональною системою організму, яка динамічно реагує на всі зміни як навколишнього, так і внутрішнього середовища. Оскільки кров — це постійно

© М. Ю. Симон, 2017

рухома тканина, що складається з клітинних елементів і рідкої плазми, її основною функцією є транспорт різноманітних речовин. Однак, в залежності від природи переміщуваних сполук, вона виконує й інші функції: дихальну, трофічну, екскреторну, гомеостатичну, регуляторну, терморегуляторну та захисну [1–3]. Осетрові види риб належать до хрящових ганоїдів (*Chondrostei*), які за низкою гематологічних показників близькі до пластинозябрових риб (*Elasmobranchii*). Кількість крові в організмі риб в середньому становить 1–2% [4–6]. До її складу в першу чергу входять білки, ліпіди, вуглеводи, ферменти, гормони, макро- і мікроелементи, а також продукти обміну речовин. У природному середовищі для осетрових видів риб прийнято вважати нормою наступні значення фізіологічних показників: гемоглобін (Hb) — 50–80 г/л, білок сироватки крові (БВК) — 28–40 г/л, ліпіди сироватки крові (ЛП) — 3–4 г/л, холестерин (ХС) — 1,0–2, 8 ммоль/л, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) — 2–4 мм/год [7]. Необхідно відзначити, що хімічний склад крові може змінюватися під дією стресових явищ, які викликають накопичення в організмі карбонатної (H_2CO_3) і молочної ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$) кислот, глюкози ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$), кортикоїдних гормонів (стероїдних гормонів кори наднирників) та адреналіну (епінефрину) [3]. Для крові осетрових риб характерні ознаки примітивності: наявність ядра в еритроцитах і тромбоцитах, порівняно невелика кількість еритроцитів та малий вміст гемоглобіну, що зумовлює низький обмін речовин. Втім, їй одночасно властиві і риси високої спеціалізації: велика кількість лейкоцитів та тромбоцитів, що характерно для організмів з підвищеним клітинним імунітетом, і пояснює високу резистентність осетрових до надзвичайно несприятливих умов середовища [8]. Таким чином, за своїм хімічним складом кров осетрових видів риб мало відрізняється від крові інших хребетних тварин, зокрема, костистих риб. Першочергові відмінності полягають в кількості складових її компонентів [9].

Гематологічні показники, характеризуючись високою лабільністю, слугують індикатором патологічних процесів в організмі. Реакція крові на зміну функціонального стану кожної окремої особини у відповідь на той чи інший вплив неспецифічна і використовується в рибоводній практиці як засіб діагностики стану популяції риб, у тому числі й плідників при створенні високопродуктивних маточних стад осетрових [10]. Водночас, гематологічні показники, відображаючи вплив місця існування, фізіологічного стану організму і в цілому видової специфіки, дуже мінливі. У зв'язку з цим, параметри, які встановлюються для того чи іншого виду, не можуть бути єдиними повсюдно навіть для систематичної одиниці, особливо якщо остання вирощується в різних екологічних умовах. Зокрема, для більшості гематологічних показників простежується сезонна залежність та статевий і віковий диморфізм. Тому будь-яку «норму» гематологічних характеристик слід розглядати як умовний показник для певного часового періоду і екологічних умов. Серед гематологічних показників, для яких у осетрових видів риб простежуються загальні принципи формування, основними є: кількість гемоглобіну, гематокрит (НСТ), лейкоцитарна формула крові, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ). Втім, за показниками крові можна об'єктивно судити про стан організму риб в заданому середовищі або умовах утримання, використовуючи мінливість гематологічних показників (в залежності від температури і забрудненості води, гідрохімічного режиму, складу кормів, сезону року, віку та стадії зрілості гонад тощо) в якості

специфічних маркерів для оцінки фізіологічного стану організму та генетичних досліджень [7].

Метою даної роботи є аналіз масиву інформації щодо фізіолого-біохімічних, екологічних та генетичних особливостей основних гематологічних показників та складових крові у осетрових видів риб.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ. ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Червона кров осетрових видів риб представлена еритроцитами (RBC) і тромбоцитами (PLT). На ранніх фазах розвитку структур крові у них зустрічаються поодинокі еритробласти і всі послідовні стадії еритроїдного ряду: нормобласти, базофільні та поліхроматофільні еритроцити. Кінцевою стадією розвитку цього напрямку є поява ортохромних (оксифільних або зрілих) еритроцитів [11]. Основний склад та властивості крові осетрових видів риб наведені в табл. 1.

Таблиця 1. Склад і властивості крові осетрових видів риб [12]

Показник	Білуга	Стерлядь	Російський осетер	Севрюга
Еритроцити, млн/мкл	0,8	1,5	0,8	1,6
Гемоглобін Hb, г%	8,7	10,3	11,5	11,3
Гематокрит НСТ, %	36,0	43,0	47,0	40,0
Співвідношення загальної кількості крові до маси тіла, %	2,8	3,2	2,5	3,0
Кількість лейкоцитів, тис./мкл	—	—	—	40,4
Білок загальний, %	—	—	5,1	5,9

Головна функція еритроцитів — транспорт кисню і, частково, вуглекислого газу. Крім того, вони спроможні транспортувати амінокислоти. Збільшення кількості незрілих еритроцитів, порушення їх морфології є ознакою патологічного процесу в організмі. Тривалість життя еритроцитів може складати більше року, і визначається інтенсивністю їх функціонування. Розміри еритроцитів видоспецифічні, наприклад, у російського осетра (*Acipenser gueldenstaedtii*) — 16,75×14,00 мкм, а у севрюги (*Acipenser stellatus*) — 12,40×11,07 мкм [12].

Молоді форми еритроцитів — базофільні і поліхроматофільні клітини. Їх переважання у еритроїдному ряді властиве молоді та цьоголіткам осетрових видів риб. Зокрема, в останніх частка молодих форм еритроцитів складає 15–25% від загального обсягу клітин еритроїдного ряду. Такий високий рівень еритропоезу молоді вказує на інтенсивне кровотворення. Згодом, вже у дволіток, спостерігається зниження % молодих форм еритроцитів до 2,8, що характерно для фізіологічної норми риб старшого віку, вирощуваних в аквакультурі [11].

Для зрілих або оксифільних еритроцитів осетрових видів риб характерна висока концентрація глутатіону GSH. Співвідношення GSH/HB у них значно вище, ніж у савців. Редокс-система глутатіону (GSHGSSG) слугує буфером, який запобігає деструктивній дії активних форм кисню та забезпечує механізми

детоксикації. Сульфгідрильна (відновлена) GSH форма легко піддається як ферментативному, так і неферментативному окисненню, внаслідок чого утворюється дисульфідна (окиснена) форма. Як ефективний антиоксидант GSH відіграє виняткову роль у підтримці структурної цілісності еритроцитів, SH-захисту груп гемоглобіну (Hb) та інших протеїнів еритроцитів від дії окиснювачів. Таким чином, можливість прямого відновлення метгемоглобіну (MtHb) та антиоксидантні властивості GSH зумовлюють його помітну роль в системі підтримки структури і функцій Hb [13].

Площа поверхні еритроцитів відображає рівень обмінних процесів і функціональний стан організму в певний період життя риб. Наприклад, за даними Л. Д. Житеневої, у стерляді з природних водойм вона в нормі становить 73,14 мкм². В той же час, у риб, вирощених в умовах аквакультури, вона становить — 75,03–121,78 мкм² у риб віком 10–12 місяців та 81,86–100,04 мкм² — особин віком — 20–24 місяці. Це пояснюється більш активним ростом риб, що культивуються при контрольованих умовах [14].

Мінливість концентрацій еритроцитів має сезонний характер, а також залежить від віку та розмірно-вагових показників риб. Це пояснюється тим, що в процесі онтогенезу концентрація Hb в руслі крові змінюється. Крім того, загальна еритропоетична активність завжди підвищена у весняно-літній період. Наприклад, в лютому у стерляді (*Acipenser ruthenus*) молодшої вікової групи вона становить близько 0,96±0,14 г/л, а старшої — 0,87±0,07 г/л. Станом на липень, в обох вікових групах ці показники зростають майже вдвічі, що спричиняє збільшення концентрації Hb. Сезонність червоної крові властива й риbam, які вирощуються в індустріальних умовах за постійної температури води [14, 15].

Сезонні зміни гематологічних показників плідників осетрових видів риб, на прикладі самок російського осетра (*Acipenser gueldenstaedtii*), наведені в табл. 2.

Таблиця 2. Сезонні зміни гематологічних показників самок російського осетра [16]

Показник	♀ весняної заготівлі	♀ осінньої заготівлі	♀, отримані від domestikованих плідників
Маса, кг	11,4±3,0	12,9±2,3	14,3±0,6
Гемоглобін Hb, г/л	54,2±5,60	55,4±4,30	68,4±4,61
Cv, %	25	28	30
Гематокрит НСТ, л/%	26,1±0,15	30,0±0,20	34,1±0,30
Еритроцити, 10 ⁶ мкл	0,53±0,020	0,56±0,018	0,68±0,110
СГЕ (MCH), пг	102,26±21,4	116,70±20,1	100,60±12,23
ШОЕ, мм/ч	4,8±0,30	4,5±0,24	5,1±0,47

Гематокрит відображає частку еритроцитів в загальному об'ємі крові. Цей показник найчастіше використовують для оцінки ступеня вираженості анемії. Його підвищення або зниження відносно норми свідчить про наявність захворювання або стресу [16]. Гематокрит крові осетрових видів риб наведений в табл. 3.

Таблиця 3. Гематокрит крові осетрових видів риб, % [12]

Вид	Гематокрит (НСТ)
Білуґа (<i>Huso huso</i>)	36,0
Російський осетер (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>)	47,0
Севрюґа (<i>Acipenser stellatus</i>)	40,0
Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>)	43,0

ОРЕ (осмотична резистентність еритроцитів) використовується для визначення та оцінки фізіологічного стану осетрових видів риб. ОРЕ характеризує фізико-хімічні властивості мембран еритроцитів та динамічної рівноваги водних компонентів інтерстеціальної рідини. ОРЕ осетрових риб коливається в залежності від їх способу життя — морського чи річкового. Наприклад, для російського осетра (*Acipenser gueldenstaedtii*) ОРЕ у солоній воді становить 0,18–0,20 та 0,28–0,30 (% розчину NaCl) — у прісній. Зниження ОРЕ свідчить про інтоксикацію організму та сприяє гемолізу еритроцитів при стресі [17].

ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) є одним з найбільш уживаних показників, оскільки чітко відображає особливості фізіологічного стану осетрових риб. За його значеннями діагностують захворювання травматичного, запального та гіпоксичного генезу. Слід зазначити, що у domestикованих риб він трохи вище, ніж у заготовлених з природної популяції (і ярових, і озимих рас). Статева приналежність на нього суттєво не впливає [17]. В фізіологічній нормі для осетрових видів риб ШОЕ коливається в межах 1–6 мм/год [14]. ШОЕ притаманні сезонні зміни, зокрема навесні вона становить приблизно $3,7 \pm 0,3$, а восени — $5,1 \pm 0,5$ мм/год. Крім того, оскільки цей показник свідчить про підвищений вміст ліпідів в крові, використовується для визначення функціонального стану плідників [18]. Підвищення ШОЕ при низькому рівні Hb в крові є характерною ознакою часткової резорбції ікри. В той же час, зростання ШОЕ за нормального рівня Hb є стандартною реакцією організму осетрових видів риб на дію гормональних стимулюючих препаратів [16].

Гемоглобін (Hb) — складний дихальний білок з класу хромопротеїнів, що міститься в еритроцитах та надає їм червоного кольору. Він є найважливішим елементом реалізації дихальної функції, здійснюючи транспортну функцію кисню та вуглекислого газу, до тканин і назад. Крім транспортування кисню та вуглекислого газу Hb регулює роботу імунної системи і щитоподібної залози, відповідає за виведення токсинів з організму, бере участь в процесах регенерації клітин [15, 19, 20]. Концентрація Hb в еритроцитах має важливе діагностичне значення. Без цього показника неможлива оцінка інтенсивності обмінних процесів в організмі. Зниження вмісту Hb вказує на пригнічення кровотворення, що найчастіше є несприятливою ознакою, але може служити і показником виключно хороших кисневих умов. При дефіциті або надлишку Hb порушуються метаболічні процеси в організмі риб [20, 21].

Концентрація Hb у молоді осетрових видів риб збільшується з віком. На підставі досліджень Р. В. Афонич представлені зміни його концентрації в процесі онтогенезу осетрових [22].

Таблиця 4. Концентрація Нб у молоді осетрових видів риби, г % [22]

Вид	Маса, г	Концентрація Нб, г %
Білуґа (<i>Huso huso</i>)	2,5–2,8	5,6–5,8
	3,0–5,0	5,9–6,1
Російський осетер (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>)	0,75–1,0	3,8–4,0
	1,0–1,6	4,1–4,6

Концентрація Нб у статевозрілих осетрових значно вища такої у більшості прісноводних і морських риби. Так, вона досягає 15,0 г%, а в середньому дорівнює 11,0–12,0 г%. Оскільки для осетрових видів риби характерна велика кількість крові в організмі, що досягає 3,0% (в середньому — 2,7%), кількість цього білка досягає 3,9 г на 1 кг маси тіла (в середньому — 3,5 г на 1 кг маси тіла) [23]. Для ссавців (*Mammalia*) цей показник дорівнює 5,0–25,0 г на 1 кг маси тіла. Сезонні коливання концентрації Нб не притаманні [12]. Концентрація Нб у статевозрілих особин осетрових видів риби наведена в табл. 5.

Таблиця 5. Гематологічні показники статевозрілих осетрових видів риби [23]

Показник	Російський осетер			Севрюга		
	♀	♂	Е	♀	♂	Е
Довжина, см	145	150	–	142	119	–
Маса, кг	28,2	20,2	–	7,6	4,8	–
Концентрація Нб, г %	11,70	11,40	11,55	10,90	11,60	11,80
Гематокрит НСТ, %	46,0	48,0	47,0	38,7	41,2	40,0
Кількість еритроцитів, млн шт.	0,91	0,90	0,95	1,32	1,64	1,48

Фракційний склад Нб осетрових риби видоспецифічний та розподіляється на «швидкі» і «повільні» компоненти. Наприклад, Нб основного, першого фенотипу (Нб-1), у російського осетра (*Acipenser gueldenstaedtii*) представлений 7 компонентами, у амурського осетра (*Acipenser schrenckii*) — 8, у сахалінського (*Acipenser mikadoi*) — 13 компонентами. Основними параметрами його оцінки є кількість компонентів, їх відносна рухливість та відносний вміст білка, що припадає на окремі компоненти [24]. Фракційний склад Нб риби не залежить від статі, стадії зрілості гонад чи розмірно-вагових показників [25]. Гемоглобінограму осетрових поділяють на 3 зони: швидко рухомих фракцію (ШРФ), середньо рухомих фракцію (СРФ) та повільно рухомих фракцію (ПРФ). У кожній з них відносна рухливість, кількість мікро- та макро компонентів, а також відносний вміст білка в останніх є видоспецифічними [2]. Наприклад, гемоглобін білуґи (*Huso huso*) можна розділити на 7 компонентів, один з яких знаходиться в зоні ШРФ гемоглобінограми, і шість компонентів — в зоні СРФ [24].

Еколого-фізіологічна гетерогенність осетрових видів риби виявляється в наявності в них трьох типів фракційного складу Нб: «прісноводного», «морського» та «перехідного». Характерною особливістю «прісноводного» типу є значне (3–10-кратне) перевищення «повільних» компонентів в СРФ гемоглобінограм над «швидкими» та наявність серед них одного домінантного

компонента. До цього типу належать: стерлядь (*Acipenser ruthenus*), осетер сибірський (*Acipenser baeri*), великий амудар'їнський лопатоніс (*Pseudoscaphirhynchus kaufmanni*), білуга (*Huso huso*) та шип (*Acipenser nudiventris*). Характерною особливістю «морського» типу є значне (2–8-кратне) переважання «швидких» компонентів над «повільними» та локалізація серед «швидких» одного домінантного компонента. Його представниками є: севрюга (*Acipenser stellatus*), калуга (*Huso dauricus*) та амурський осетер (*Acipenser schrenckii*). «Перехідний» тип фракційного складу Hb характеризується вищою (в 1,6–1,8 разів) часткою «повільних» компонентів в порівнянні зі «швидкими» і наявністю 1–2 домінуючих в групі «повільних» компонентів основної СРФ гемоглобінограмм. Він властивий російському (*Acipenser gueldenstaedtii*) та сахалінському (*Acipenser mikadoi*) осетрам [15, 25].

Зміни фракційного складу Hb при міграціях у осетрових видів риб не відбувається. На відміну від костистих риб, при їх переході з моря в річку частка і співвідношення між його компонентами залишаються без змін. Таким чином, стратегія біохімічної адаптації осетрових риб відрізняється від такої костистих, забезпечуючи нормальну життєдіяльність як в морський, так і в річковий період життя одним і тим же набором ізогемоглобінів [21]. Таким чином, тривале (впродовж 5–6 років) вирощування осетрових в умовах аквакультури призводить до формування фракційного складу Hb, ідентичного тому, який спостерігається у одновікових риб, що мешкають в морській воді [24].

Вікові зміни фракційного складу Hb осетрових видів риб спрямовані на зниження частки білка, що припадає на «повільні» компоненти, та її підвищення в «швидких» компонентах гемоглобінограм [2]. Найбільш інтенсивне формування фракційної структури Hb у молоді осетрових протягом першого місяця життя. Із збільшенням віку та маси тіла зростає і вміст Hb, що обумовлено нормалізацією обмінних процесів в організмі [7]. Гемоглобінова буферна система осетрових риб, як і вищих хребетних, займає до 70–75% буферної ємності крові. Існує зв'язок між стійкістю риб до закислення води, ефективністю гемоглобінової буферної системи та величиною ефекту Веріго–Бора. Ефект Веріго–Бора демонструє залежність ступеня дисоціації оксигемоглобіну від величини парціального тиску вуглекислоти в альвеолярному повітрі та крові, при зниженні якого спорідненість кисню до Hb підвищується, що ускладнює перехід кисню з капілярів в тканини. Цей показник відображає зворотне відношення між рН та р50 — величиною напівнасичення Hb киснем, тобто зниження його спорідненості до кисню, що супроводжується зниженням рН крові. Р50 при рН 7,2 знаходиться в межах 19,9–25,9 мм рт. ст. у осетрових риб на противагу 16,3–48,0 мм рт. ст. у костистих риб (*Teleostei*) [25]. Величина ефекту Веріго–Бора використовується для характеристики стійкості організму до закислення води та ефективності гемоглобінової буферної системи. У осетрових риб стійкість до закислення середовища знижується разом із зменшенням ефективності гемоглобінової буферної системи [26, 27].

Білірубін ($C_{33}H_{36}N_4O_6$) є кінцевим продуктом розпаду Hb. Виділяється з жовчю в кишечник. Некон'югований білірубін (непрямий) добре розчиняється в жирах (ліпофільний), але дуже погано — у воді (гідрофобний). Для транспортування кровоносним руслом його зв'язують альбуміни. Визначення кількості білірубину плазми крові (рідка частина крові, що містить розчинені у

воді іони, неорганічні й органічні речовини) використовується для оцінки функцій печінки [28].

Тромбоцити (PLT) осетрових видів риб — це справжні клітини круглої чи овальної форми. Кількість тромбоцитів в 1 мм³ крові може істотно коливатися. Походження та функції цих клітин у осетрових видів риб є дискусійним питанням. Так, оскільки відсутні чіткі морфологічні межі між круглими тромбоцитами і малими лімфоцитами, особливо голоядерними, ряд дослідників вважає, що тромбоцити походять від лімфоцитів. На користь цієї гіпотези свідчать імуногенні властивості тромбоцитів. А. А. Маркосян, Л. Д. Житенева, Є. В. Макаров та О. А. Рудницька з наявності мітохондрій в клітинах тромбоцитів роблять висновок, що останні беруть участь і в процесі дихання [4–6, 29].

Біла кров (WBC) осетрових видів риб представлена лейкоцитарною формулою — відсотковим співвідношенням різних форм лейкоцитів [12]. За якісним складом білої крові принципових відмінностей між видами родини осетрових риб немає, проте за розмірами клітин білої крові простежується видова специфічність. Наприклад, у сибірського осетра (*Acipenser baeri*) вони більші, ніж у російського осетра (*Acipenser gueldenstaedtii*) та стерляді (*Acipenser ruthenus*) [30, 31]. Лейкоцитарна формула осетрових видів риб за фізіологічної норми, на прикладі російського осетра (*Acipenser gueldenstaedtii*) наведена в табл. 6.

Таблиця 6. Лейкоцитарна формула крові російського осетра (*Acipenser gueldenstaedtii*) за фізіологічної норми, % [32]

Форма лейкоцитів		Частка, %
Нейтрофіли	Молоді	1,6
	Зрілі	5,0
	Патологічні	—
Мієлобласти		8,6
Еозинофіли		12,8
Моноцити		—
Лімфоцити		80,6
Індекс зсуву лейкоцитів		0,24

Індекс зсуву лейкоцитів крові (ІЗЛК) є маркером реактивності організму і розраховується за наступною формулою: $\text{ІЗЛК} = (E + B + H(C + П + Ю + М)) / (M + Л)$, де E, B, H, M та Л це відсотковий вміст еозинофілів, базофілів, нейтрофілів, моноцитів та лімфоцитів у лейкоцитарній формулі. Його підвищення (зсув вправо) свідчить про активний запальний процес та порушення імунологічної реактивності. Воно пов'язане із зниженням кількості еозинофілів (еозинопенія) та підвищенням кількості паличкоядерних та сегментоядерних нейтрофілів [33]. Лейкоцитарні клітини осетрових видів риб, крім лімфоцитів (LYM), представлені лейкоцитами мієлоїдного ряду (мієлобластами, промієлоцитами, мієлоцитами і метамієлоцитами), паличко- та сегментоядерними нейтрофілами, а також еозинофілами, моноцитами, макрофагами й базофілами [34, 35]. Лейкоцити виконують функцію захисту організму від проникнення хвороботворних мікроорганізмів. Їх кількість у осетрових залежить від низки факторів, в першу чергу — від виду риб та умов

навколишнього середовища [12]. Середній вміст лейкоцитів в крові, для статевозрілих осетрових риб, за нормального фізіологічного стану, наведений в табл. 7.

Таблиця 7. Середній вміст лейкоцитів в крові статевозрілих осетрових видів риб [12]

Вид	Вміст лейкоцитів, тис./мм ³
Російський осетер	26,0–28,0
Севрюга	38,0–61,0

До гранулоцитів належать клітини мієлоїдного ряду, паличкоядерні і сегментоядерні нейтрофіли, а також еозинофіли. Зростання частки гранулярних лейкоцитів свідчить про погіршення фізіологічного стану риб, що має різну етіологію (запальний процес, інфекційний процес, інвазія, алергічна реакція) [34]. Серед агранулоцитів у осетрових видів риб найбільшу частку становлять моноцити та лімфоцити [14].

Лімфоцити осетрових видів риб невеликих розмірів, округлої або овальної форми з червоно-фіолетовим круглим ядром, в якому хроматин утворює переходи від більш щільних до менш щільних ділянок. Цитоплазма лімфоцитів переривчаста, іноді утворює випуклості на зразок псевдоподій, які надають клітині амебоїдної форми [36]. Основу білої крові осетрових риб складають лімфоцити, формуючи лімфоцитарний профіль. Частка лімфоцитів в загальному пулі лейкоцитів не опускається нижче 65,9% і не перевищує 94% [34]. В середньому, кількість лімфоцитів становить близько 71,3%, а в периферичній крові (циркулюючій по судинах) статевозрілих особин — 32,4–34,1% [30]. Абсолютна більшість лімфоцитів в лейкоцитарній формулі свідчить про високий ступінь розвитку клітинного імунітету [4–6, 14].

Нейтрофіли осетрових видів риб мають велике та розсічене ядро червоно-фіолетового кольору [30]. За даними Л. В. Баденко, фізіологічною нормою для осетрових риб є наступна кількість 3–15% нейтрофілів [14]. Паличкоядерні нейтрофіли особливо поширені у риб, вирощених при регульованому температурному режимі. Втім, надмірне збільшення їх кількості свідчить про високу фагоцитарну активність. Інтенсивне утворення нейтрофілів та збільшення їх кількості є нормальним для плідників осетрових видів риб перед початком нересту. Це зумовлене тим, що нейтрофіли і моноцити виділяють фермент, який сприяє розчиненню міжклітинних речовин [31].

Еозинофіли в циркулюючій крові зустрічаються не у всіх видів риб, однак у осетрових на їх частку припадає до 10%. Основною функцією еозинофілів є участь у формуванні імунітету до гельмінтів, а еозинофілія периферичної крові та тканин є характерною рисою алергічної реакції [35]. Крім цього, як і у вищих хребетних, еозинофілам риб, поряд з нейтрофілами, належить важлива роль в підтримці тканинного гомеостазу, в тому числі регуляції реакції запалення. Різке зростання відносного числа еозинофілів за дії токсикантів різної природи вказує на активну участь цих клітин в реакції на токсичний стрес. Наприклад, збільшення відсотка еозинофілів в периферичному руслі крові осетрових видів риб є характерною ознакою алергічної реакції на короточасне збільшення концентрації нітратного азоту в воді [14]. Таким чином, еозинофілія в цілому

вказує на посилення запальних процесів або патологічне порушення імунітету [37]. Характерною відмінністю еозинофільних елементів осетрових риб на стадії зрілості є великі оранжево-червоні гранули, густо розташовані на тлі слабобазофільної цитоплазми [30]. Гранули часто розташовуються не тільки в цитоплазмі, а й в самому ядрі синьо-фіолетового кольору, неправильної форми [36]. За радіаційного впливу гранули еозинофілів набувають чорного кольору [4–6].

Моноцити в периферичному руслі крові досить рідкісні клітини, і в крові гібридів осетрових зустрічаються частіше, ніж у чистих ліній. Дискусійними є питання стосовно їх походження, життєвого циклу, взаємозв'язків та взаємин з іншими клітинами. Моноцити риб схожі з такими ссавців (*Mammalia*), як своєю ультраструктурою, так і високою фагоцитарною активністю. Моноцитам осетрових видів риб притаманне синьо-фіолетове велике ядро округлої форми та вузька смужка цитоплазми димчастого кольору [36]. Моноцити є активними фагоцитами, що поглинають не стільки бактерії, скільки продукти розпаду клітин і тканин, крім того, вони здатні інактивувати токсини [37]. Моноцити характеризуються значною міграційною здатністю. Продукуючи антитіла, вони беруть участь в регуляції імуногенезу і гранулопоезу. Деструктивні зміни моноцитів виникають за наявності токсичних агентів в організмі, а також за вірусних і паразитарних захворювань. Моноцити здатні впливати на міграційні властивості нейтрофілів, посилюючи їх або послаблюючи. При певних умовах (наприклад, в осередках запалення) вони можуть трансформуватися в макрофагів [4–6, 35].

Макрофаги концентруються в селезінці і здійснюють «відбір» клітин, видаляючи старі еритроцити або цілком, або вилучаючи з них гранули заліза, без руйнування самої клітини (так зване викопування). Таким чином, макрофаги депонують залізо. Крім того, вони впливають на проліферацію і дозрівання клітин еритропоетичного ряду. Також, існує своєрідний контакт між макрофагами і лімфоцитами. Макрофаг, будучи носієм антигена, концентрує навколо себе скупчення лімфоцитів, які утворюють з ним та між собою цитоплазматичні містки. Контакт здійснюється за допомогою одиничного пальцеподібного відростка лімфоцита. Макрофаги при цьому передають антигенну інформацію імунно-компетентних клітин [4–6].

Базофільні лейкоцити осетрових видів риб є дискусійним питанням, оскільки спостерігаються у риб не з усіх ареалів існування. Вперше вони були відзначені в крові білуги, севрюги та осетра [38]. Взагалі, як вказують Б. М. Драбкіна та Л. П. Телкова, у осетрових риб ці клітини зустрічаються надзвичайно рідко. Можливо, це пояснюється тим, що базофіли є клітинами екстремального реагування і з'являються в периферичному руслі в рідкісних випадках [4–6].

Білковий спектр сироватки крові є одним з найважливіших показників при вивченні фізіологічного стану риб. Високий вміст білка в сироватці крові риб в межах встановлених норм — сприятлива ознака, а його зниження пов'язане з втратою життєстійкості і може супроводжуватися загибеллю [31]. Вміст білків у крові осетрових видів риб залежить від великої кількості факторів — віку, статі, фізіологічного стану, пори року, забезпеченості кормами (в першу чергу білковими), наповнення шлунково-кишкового тракту, стану здоров'я тощо [12]. Вміст білків у сироватці крові осетрових видів риб за стану фізіологічної норми наведений в табл. 8.

Таблиця 8. Вміст білків у сироватці крові осетрових видів риб [12]

Вид	Маса риби, г	Масова частка крові, %	Частка білків, %
Білуга	27,0	3,4	5,0
Російський осетер	50,0	4,0	2,4–5,1
Севрюга	30,00	3,00	2,57–5,90

Більшість найтонших біологічних функцій виконується білками або за їх участю. Найважливішою функцією білків сироватки крові є транспорт речовин, що забезпечують клітини організму тварини будівельним матеріалом і енергією. Входячи до складу ферментів, білки забезпечують проходження більшості необхідних для життєдіяльності організму процесів [20]. Білки плазми (сироватки, позбавленої фібриногену) крові відіграють вирішальну роль у регуляції розподілу позаклітинної рідини між внутрішньо- і позасудинним відділами рідкого середовища організму. Фільтраційно-реабсорбційна гіпотеза Ернеста Старлінга пояснює переміщення рідини через стінку капіляра протидією гідростатичного тиску крові і онкотичного тиску, утвореного білками плазми крові. Вона заперечує можливість проникнення білків плазми крові з судинного простору в тканинний. Сучасні моделі, розроблені для вищих хребетних, допускають фільтрацію інтраваскулярних білків в тканинний простір в деяких відділах мікроциркуляторної системи і, як наслідок, — існування функціональної різноякісності капілярів від абсолютної непроникності для білків (капіляри центральної нервової системи) до необмеженої проникності (капіляри печінки) [39]. Тканинні рідини риб містять значні кількості білка, що дозволяє припустити відмінність механізмів трансапілярного обміну білків плазми крові у риб від таких у вищих хребетних. Зокрема, електрофорез зразків позаклітинних рідин стерляді доводить, що всі тканинні рідини останньої є фільтратами плазми крові: фракційний склад їх білків практично збігається з таким у плазмі крові [39].

Загальна концентрація білка в сироватці крові (ВБК) осетрових риб нижче, ніж у костистих (наприклад, у оселедця вона на 25% вище) [9]. Фізіологічна норма осетрових риб передбачає вміст близько 5% ВБК [31]. У одних і тих же вікових груп різних представників родини осетрових риб ВБК в крові ідентична. Однак, для неї характерна сезонність — взимку вміст ВБК трохи вищий. Крім того, вміст білка і його фракцій коливається в залежності від статі, віку, сезону та інших факторів. Поряд із загальною закономірністю змін ВБК, характерних для різних представників родини осетрових риб, для кожного виду характерний певний білковий спектр, за яким його можна відрізнити від іншого виду [9]. Підвищення концентрації ВБК в крові свідчить про поживність корму, що сприяє збільшенню приросту, в результаті нарощування м'язової маси, а, отже, і швидшому росту риб [40]. Також, висока концентрація ВБК є показником оптимізації обмінних процесів і високої неспецифічної резистентності організму. Крім того, вищий рівень ВБК притаманний осетровим видам риб, вирощеним в аквакультурі, у порівнянні з дикими [16].

Фракційний склад білка в сироватці крові осетрових риб використовується в якості тонкого індикатора особливостей стану риб, що визначається як внутрішніми біологічними ритмами, так і впливом різноманітних факторів зовнішнього середовища [21]. Фракційний склад білків сироватки крові осетрових високогетерогенний і містить близько 15–21 компонентів, представлених

преальбумінами, альбумінами, α -, α_2 -, β -, γ -глобулінами [41]. Для кожного виду осетрових риб характерна наявність одного або декількох специфічних антигенів, якими він відрізняється від інших близьких видів. У різних видів риб з родини осетрових імунофоретичні спектри таких антигенів відрізняються, а самі антигени можуть бути представлені всіма численними групами білків сироватки крові, які мають різну рухливість. Найбільш мінливими і, отже, специфічними для різних видів осетрових риб є α_2 -глобуліни — група білків, дуги яких локалізовані безпосередньо поблизу лунки. Меншою мірою це властиво α - і β -глобулінам. Альбуміни, як специфічні антигени, проявляються значно рідше, ніж глобуліни. Крім якісних особливостей, важливу роль відіграють кількісні показники, що відображають число специфічних компонентів та кількість білка, що припадає на них. В цьому відношенні особливим є російський осетер, який володіє свого роду «універсальним» спектром антигенів, по відношенню до якого білки всіх інших видів є малоспецифічними. Так, якщо у нього виявляється від 2 до 7 специфічних до інших видів антигенів, то у них, по відношенню до нього — від 1 до 3. Таким чином, в білках сироватки крові російського осетра зосереджено більшість антигенних характеристик інших видів. Крім того, у нього чітко виражені власні видові відмінності, які в деяких випадках є максимальними при міжвидових порівняннях [42].

Альбуміни — прості глобулярні білки сироватки крові, що складають від 18 до 38%, або, в середньому, — чверть всіх білків крові [42]. Альбуміни відображають субстратну забезпеченість анаболічних процесів організму та напруженість пластичного обміну. Показник частки альбумінів є одним з оціночних критеріїв адаптаційних можливостей і життєстійкості організму [34]. Альбуміни сироватки крові, крім здійснення транспортної функції, беруть участь в підтримці колоїдно-осмотичного (онкотичного) тиску плазматичних білків, що відіграє провідну роль в перерозподілі води та солей між кровоносним руслом і тканинами, впливають на в'язкість крові. Саме онкотичний тиск плазматичних білків у хребетних тварин, в тому числі й у риб, протистоїть фільтруючій силі кров'яного тиску при утворенні первинної сечі. В основі поліфункціональності альбумінів сироватки крові осетрових видів риб лежить їх фізико-хімічна неоднорідність. Альбуміни сироватки крові у осетрових риб гетерогенні і поліморфні, причому рівень гетерогенності (кількості компонентів) і поліморфізму (кількості фенотипів) має виражену міжпопуляційну мінливість. Наприклад, у роді *Acipenser* найбільш висока гетерогенність альбуміну притаманна російському (9 компонентів) та сибірському (5 компонентів) осетрам, а найменша — севрюзі та сибірській стерляді (1–2 компонента). У прохідних осетрових, поряд з генетично контрольованою мінливістю альбумінів, існує модифікаційна, або еколого-фізіологічна, мінливість. Так, при зміні місця існування, тобто при переході з моря в річку під час нерестової міграції, відбувається різке збільшення (в 2–3 рази) частки альбумінів сироватки крові по відношенню до глобулінів. Крім того, у річковий період життя у російського осетра збільшується ступінь гетерогенності альбуміну та фенотипова різноманітність за альбуміновою системою [21].

Глобуліни осетрових видів риб мають 4 основні фракції, вміст кожної з яких варіює, в першу чергу, в залежності від віку, статі і пори року. Наприклад, у севрюги з віком знижується вміст α -глобулінів і підвищується вміст β -глобулінів. У самок севрюги кількість α -глобулінів значно вище, а β -глобулінів нижче, ніж у

самців [9]. На частку фракції α -глобулінів, що складається з 1–4 компонентів, припадає від 6 до 12% білків сироватки крові. β -глобулінова фракція, що має в своєму складі від 3 до 7 компонентів, займає в загальній кількості білків сироватки крові від 9 до 20%. Найпотужнішим компонентом серед α 2-глобулінів є α 2-макроглобулін. Його частка серед усіх сироваткових білків досягає 25,6% або половини всіх глобулінів. На інші компоненти цієї фракції доводиться в середньому 15,6% білків крові, γ -глобулінова фракція в крові російського осетра становить в середньому 5,4% [41]. Глобуліни мають здатність утворювати комплекси з жирними кислотами і стероїдними гормонами [20]. Завдяки цьому глобуліни сироватки крові беруть активну участь в утворенні оваріальної рідини і впливають на фертильність. Так, В. С. Апекін, В. Н. Фадєєва та Р. Ерлег виявили, що оваріальна рідина осетрових видів риб за антигенним складом та біохімічними показниками дуже подібна до їх сироватки крові [43]. Динаміка концентрації сироваткових β -глобулінів залежить як від динаміки холестерину, так і від динаміки β -ліпопротеїдів [20]. Так, між відносним вмістом сироваткових β -глобулінів і β -ліпопротеїдів існує пряма кореляційна залежність. Зокрема, фертильність = F (концентрація β -ліпопротеїдів) $\eta = 0,94$; $P < 0,05$. У практиці іхтіологічних досліджень застосування даного тесту вперше було запропоновано В. М. Кичановою та А. В. Поповим в 1974 р. Ними на прикладі білуги за цим показником був виявлений чіткий статевий диморфізм та його залежність від стадій зрілості статевих залоз. Крива залежності фертильності риб від концентрації сироваткових β -ліпопротеїдів має своєрідний характер. До оптимального значення в 550% мг (фертильність 78,6%) підвищення їх рівня позитивно корелює з фертильністю [43]. Надалі цей зв'язок стає протилежним, що обумовлено функціональними особливостями ооцитів. Таким чином, найбільш ефективним індикатором функціонального стану самок осетрових риб є рівень β -ліпопротеїдів сироватки крові, виміряний турбідиметричним способом, що і рекомендується А. В. Коротенко для прижиттєвого тестування репродуктивного потенціалу та відбору самок [43].

Жири та жироподібні речовини відносяться до ліпідів (ЛП). Серед них особливо важливими є: холестерин (ХС), тригліцериди (або нейтральні жири) та фосфоліпіди. Всі згадані жири і жироподібні речовини знаходяться в плазмі крові не у вільному стані, а в поєднанні з білками — у вигляді так званих білково-ліпідних комплексів, або ліпопротеїдів. Ліпопротеїди, на відміну від ліпідів, добре розчинні у воді і служать транспортною формою ліпідів в організмі будь-якої тварини [20]. Характерною особливістю осетрових риб можна вважати високий вміст загальних ЛП, рівень яких в сироватці крові коливається у осетрів від 1200 до 1500 мг/дл, а у білуги — від 900 до 1300 мг/дл. Фосфоліпіди (ФЛ) та триацилгліцериди (ТГ) є основними компонентами сироватки крові осетрових видів риб, вільного ХС в них дуже мало, а зв'язаний ХС складає лише 1/6 у осетрів і 1/4 у білуги, від загальних ЛП сироватки крові. Якщо порівнювати з людиною або деякими ссавцями, то сироватка крові осетрових «насичена» ТГ і ФЛ, тоді як пул сумарного ХС у цих риб виключно низький [44]. Відповідно до виконуваних функцій, ЛП поділяються на частки низької щільності (ЛП НЩ), відповідальні за транспорт ЛП, головним чином ХС, до клітин, і високої щільності (ЛП ВЩ), які здійснюють видалення таких з організму. ЛП риб, крім тих функцій, які притаманні тваринам і людині, здійснюють транспорт ЛП в гонади, де формуються статеві продукти. Особливо високе навантаження

спостерігається по відношенню до ЛП самок в період формування ікри. У цьому процесі беруть участь обидві групи ЛП, але головну роль виконують ЛП ВЩ, які набагато багатші ФЛ, ТГ і ефірами холестерину (ЕХС), ніж ЛП НЩ. Це обумовлено тим, що для формування ікри в процесі овогенезу потрібно набагато більше енергетичних та пластичних речовин, ніж при сперматогенезі [45]. Для порівняння ліпідного складу крові самок та самців осетрових видів риб наведена табл. 9.

Таблиця 9. Ліпідний склад сироватки крові самок та самців російського осетра, мг/дл [45]

Вид ліпідів	ЛП НЩ		ЛП ВЩ	
	♀	♂	♀	♂
Загальні ліпіди (ЛП)	230,0±12,1	190,1±11,5	1234,1±26,1	1038,1±24,3
Фосфоліпіди (ФЛ)	95,7±8,9	73,6±10,5	475,0±10,5	392,7±19,0
Фосфатидилхолін	76,0±8,0	51,0±6,0	365,0±8,7	313,0±7,8
Тригліцериди (ТГ)	106,7±8,5	82,0±9,5	531,1±14,6	449,0±15,1
Холестерин (ХС)	4,6±0,7	4,6±0,5	37,4±4,3	40,1±3,2
Ефіри холестерину (ЕХС)	23,0± 2, 8	28,0±2,7	191,0±9,4	156,0±7,2
Сумарний холестерин	27,6	32,6	228,4	196,1

Збільшення вмісту ТГ в крові свідчить про порушення ліпідного обміну в організмі або про порушення функції печінкових клітин. Однак, збільшення цього показника в крові у молоді риб пояснюється інтенсивністю росту, оскільки в даний період збільшується їх гідроліз в печінці, забезпечуючи енергією організм [40].

β-ліпопротеїди являють собою транспортну форму ліпідів і переносять переважно ХС та ФЛ [32]. Вони найбільш багаті на холестерин, містячи його до 45%. Фактично, це холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛП НЩ) в комплексі з білком та іншими жирами і жироподібними речовинами [20]. Як і ХС, β-ліпопротеїди тісно пов'язані з рівнем фертильності. Наприклад, на II стадії зрілості гонад (СЗГ) їх середній рівень в нормі — 5,19 г/л [43, 46].

Отже, ХС ($C_{27}H_{46}O$) є складовою частиною спектра загальних ліпідів сироватки крові [46]. У хімічному відношенні ХС — це жировий спирт, тобто сполука, яка поєднує властивості жироподібних речовин і спиртів. Природні воскоподібні властивості ХС дозволяють йому виконувати функцію клітинного «скелету» в організмі тварин. Входячи до складу мембрани клітин, він, разом з ФЛ та білками, забезпечує вибіркову проникність мембрани для речовин, що входять і виходять з неї. Без нього неможливе утворення статевих гормонів та гормонів кори надниркових залоз, а також жовчних кислот. Він необхідний для росту організму та поділу клітин. ХС забезпечує стабільність клітинних мембран в широкому інтервалі температур, що особливо важливо для пойкилотермних організмів, до яких відносяться осетрові види риб [34]. В той же час, його високий вміст в крові перешкоджає активному обміну речовин в організмі, змінюючи в'язкість крові і прохідність судин [40]. ХС надходить в організм двома шляхами: продукується ним, в основному — в печінці, та з їжею [20]. Його

низький відносний вміст в сироватці крові осетрових видів риб, з одного боку, характеризує невисоку активність обміну, а з іншого — інтенсивний перерозподіл загального комплексу ліпідів всередині організму. Наприклад, в крові нерестуючих самок відбувається сплеск відносного та абсолютного вмісту ХС, який є попередником стероїдного гормону 17- β -естрадіолу ($C_{18}H_{24}O_2$), який ініціює синтез печінкою вітелогенінів (VTG — екзогенного жовткового матеріалу білкової природи). Це є необхідною умовою для переходу статевих продуктів самок прохідних видів риб в «текучий» стан та ефективного нересту. В результаті регресійного аналізу виявлено тісний зв'язок між фертильністю і концентрацією ХС сироватки крові. Він описується наступним рівнянням регресії: $n = 2434,82 - 73156 x + 0719 x^2 - 0,00273 x^3$; $\eta = 0,8$; $P < 0,05$, де X — це концентрація ХС сироватки крові (мг%), а Y — рівень фертильності (%), $dy/dx = 0$; x (максимальне) = 125,5; y (максимальне) = 85,3. Таким чином, високий рівень ХС в сироватці крові осетрових видів риб відображає інтенсивність його накопичення в статевих продуктах та ступінь участі в процесах, пов'язаних з переходом в «текучий» стан статевих продуктів нормально дозріваючих риб [43]. Загальний ХС витрачається переважно на формування оболонок яйцеклітин, що принципово важливо при отриманні повноцінної репродуктивної ікри [47]. Середня концентрація ХС сироватки крові у осетрових риб в нормальному діапазоні складає 0,38–1,00 г/л [46].

Вміст глюкози ($C_6H_{12}O_6$) в крові осетрових видів риб є одним з інформативних біохімічних показників їх фізіологічного стану, оскільки вона використовується як безпосереднє джерело енергії, поряд з жирними кислотами [30]. Під впливом адреналіну (епінефрину) глюкоза мобілізується з печінки, як результат розщеплення глікогену ($C_{24}H_{42}O_{21}$). Швидкість її розпаду та окиснення, а також можливість швидкого вилучення з «депо» забезпечують екстрену мобілізацію енергетичних ресурсів в умовах невідповідності наростаючих витрат енергії, наприклад в стресових ситуаціях. Якщо ситуація, яка викликала стрес, не короточасна, як, наприклад, хронічний токсикоз, то виникає необхідність у переході на більш потужну енергетичну базу, що й забезпечується введенням в дію жиромобілізуючих гормонів гіпофізу. В першу чергу — ліпотропіну, адренокортикотропного гормону (кортикотропіну), соматотропіну (гормону росту) та лютеотропного гормону (пролактину). Вони стимулюють виділення з жирових запасів жирних кислот, які забезпечують організму більше енергії, ніж глюкоза [20, 40]. На відміну від вищих хребетних тварин у осетрових риб не виявляється суворої сталості вмісту глюкози в крові та глікогену в печінці. [9] Так, рівень глюкози в крові є м'якою константою гомеостазу у осетрових видів риб. Її підвищений вміст свідчить про інтенсивний розпад глікогену в печінці або про відносно слабе використання глюкози тканинами. Навпаки, знижений вміст — про вичерпання запасів глікогену в печінці або про інтенсивне використання глюкози тканинами організму. За зміною вмісту глюкози в крові судять про швидкість її аеробного окиснення в тканинах організму при м'язевій діяльності та інтенсивності мобілізації глікогену печінки [34]. Слід зазначити, що у осетрових видів риб рівень глюкози в крові з віком не змінюється [30]. В той же час, у самок севрюги і осетра вміст глюкози трохи вище, ніж у самців. Також, в літній період вміст глюкози значно вище, ніж в осінньо-зимовий, що пояснюється зниженням інтенсивності обміну речовин під час зимівлі [9].

Ферменти сироватки крові осетрових видів риб представлені, в першу чергу,

лізоцимом (мурамідазою), α -гідроксибутиратдегідрогеназою (ЛДГ-1), γ -глутаміл-трансферазою (ГГТ), лактатдегідрогеназою (LD), аспартат-амінотрансферазою (АСТ), лужною фосфатазою (ALP) та аланінамінотрансферазою (ALT). Рівень активності того чи іншого ферменту видоспецифічний та схильний до сезонних змін [48]. Нижче розглянемо детальніше декотрі з них, аналіз яких використовується в осетрівництві.

Зокрема, лізоцим (КФ 3.2.1.17) є важливим показником як загального фізіологічного стану організму, так і гуморального імунітету. Він бере участь у регуляції проникності мембран та тканинних бар'єрів. Лізоцим здатний нейтралізувати коккову флору, розчиняючи муреїновий шар клітинної стінки, а також бере активну участь у загальній регуляції імунної відповіді. Так, тільки в присутності лізоциму імунні комплекси здатні активувати систему комплементу та «підключати» її до антимікробного захисту [49]. У осетрових видів риб цей фермент проявляє високу активність в морський період їх життя. Однак характер його розподілу в організмі в залежності від солоності води не змінюється: найбільш багаті лізоцимом тканини нирок, менш — селезінка, печінка та сироватка крові. Рівень активності лізоциму в сироватці крові видоспецифічний. Так, у білуги і російського осетра він вище, ніж у севрюги. Діапазон індивідуальних коливань концентрації ферменту становить 0,9–6,4 мкг/мл у сироватці крові білуги та 0,7–15,5 мкг/мл в сироватці крові російського осетра, при середніх значеннях $2,9 \pm 0,6$ і $3,8 \pm 0,6$ мкг/мл відповідно [42]. Лізоцим важливий для підтримки гомеостазу в період адаптації до різких змін середовища і, таким чином, може служити раннім біомаркером порушення захисних механізмів. За хронічній дії стресорів різноманітної етіології рівень активності лізоциму сироватки крові знижується, однак на початкових етапах негативного впливу їй притаманна досить різкі коливання [49].

АСТ — клітинний фермент, що бере участь в обміні амінокислот, рівень активності якого вище у нормально дозріваючих ремонтно-маточних стад та плідників [28].

ALP каталізує процес відщеплення фосфорорганічного залишку від органічних донорів. Найчастіше її вміст збільшується не за рахунок механічного накопичення та вивільнення в кров, а через нейрогенну або хронічну індукцію синтезу. Рівень активності цього ферменту знаходиться в зворотній кореляції з масою тіла [34]. Збільшення концентрації ALP в крові риб свідчить про порушення цілісності деяких клітин печінки і кишечника, а значне зменшення — про позитивні зміни в фізіологічному стані риб [40].

ALT — фермент печінки, який бере участь в обміні амінокислот. Його вивільнення в кров відбувається при порушеннях внутрішньої структури гепатоцитів та підвищенні проникності клітинних мембран. Тому він вважається індикаторним ферментом або маркером порушень функцій печінки будь-якої природи [28]. Таким чином, рівень активності ALT в сироватці крові ремонтно-маточних стад та плідників осетрових видів риб залежить від їх фізіологічного стану [48].

Іонний склад плазми крові осетрових видів риб зокрема, склад катіонів (позитивно заряджених іонів), змінюється в різні періоди їх життєвого циклу, пов'язані з діадромними міграціями. Концентрація окремих катіонів плазми крові

самок осетрових видів риб IV СЗГ відрізняється від їх концентрації в плазмі самців (табл. 10) [50].

Таблиця 10. Катіони плазми крові різностатевих осетрових видів риб, мекв/л [50]

Катіон	Вид риб			
	Осетер		Севрюга	
	♀	♂	♀	♂
Ca ⁺	4,3	2,2	3,9	2,1
Mg ⁺	1,61	0,80	1,46	0,76
Na ⁺	121,0	119,0	108,0	122,0
K ⁺	2,6	3,4	2,3	3,1

Фотометричний аналіз плазми крові свідчить про близьке співвідношення концентрації натрію, калію, кальцію та магнію у осетра і севрюги, що входять в річку на нерест навесні. Плазма крові білуги відрізняється більшою концентрацією магнію та меншою — калію [50, 51].

ВИСНОВКИ

Оскільки кров — це одна з найбільш лабільних систем організму, то її склад залежить від багатьох біотичних і абіотичних факторів. Патологічні зміни гематологічних показників риб виникають при інвазіях, токсикозах, дефіциті кисню, харчових отруєннях тощо. Показники клітин червоної і білої крові, реагуючи зміною співвідношення між окремими формами клітин і інтенсивністю лімфо-, грануло- та еритропоезу, адекватно відображають функціональний стан осетрових видів риб. Зокрема, підвищення частки лімфоцитів та моноцитів при відносному зниженні гранулоцитів (нейтрофілів та еозинофілів) свідчить про високий імунний статус, а зміщення балансу показників білої крові в бік гранулоцитів, є відображенням несприятливих змін в організмі. Фракційний склад білків сироватки крові використовується в якості тонкого індикатора особливостей стану риб, що визначається як внутрішніми біологічними ритмами, так і впливом різноманітних факторів зовнішнього середовища. Низький рівень ліпідів в сироватці крові може свідчити як про інтенсифікацію їх використання на потреби організму, так і ослабленні функціональної активності печінки. Умови існування накладають відбиток на морфологічний склад і кількісні показники червоної і білої крові риб. Склад крові змінюється в залежності від температури води, її хімічного складу, кількості і якості згодовуваних кормів, віку, статі, СЗГ, щільності посадки і багатьох інших чинників.

Таким чином, кров є одним з основних показників фізіологічного стану організму. У зв'язку з цим, правильна і своєчасна діагностика морфологічних змін крові дозволяє виявити дисбаланс або патологію в організмі риб, оцінити якість їх молоді.

ЛІТЕРАТУРА

1. Лукьяненко В. В. Эколого-физиологические особенности фракционного состава гемоглобина крови осетровых рыб / В. В. Лукьяненко, В. И. Лукьяненко. — Ярославль : ВВО РЭА, 2002. — 260 с.
2. Лукьяненко В. В. Своеобразие фракционного состава гемоглобина сахалинского осетра / В. В. Лукьяненко // Осетровое хозяйство водоёмов

- СССР : Всесоюзное совещание, ноябрь 1989 г., г. Астрахань, Россия : крат. тезисы науч. докл. — Волгоград : Волгоградская правда, 1989. — С. 190—192.
3. Киреева И. Ю. Оценка физиологического состояния производителей русского осетра / И. Ю. Киреева, И. С. Кононенко // Научные ведомости. — 2010. — Вып. 12, № 15(86). — С. 94—97. — (Серия : Естественные науки).
 4. Житенева Л. Д. Эволюция крови [Электронный ресурс] / Житенева Л. Д., Макаров Э. В., Рудницкая О. А. — Режим доступа : <http://bubook.net/book/70-yevoluciya-krovi-ld-zhiteneva-yev-makarov-oa-rudnickaya/20-xryashhevyeganoidy.html>.
 5. Житенева Л. Д. Экологические закономерности ихтиогематологии / Житенева Л. Д. — Ростов н/Д. : АзНИИРХ, 2000. — 56 с.
 6. Житенева Л. Д. Основы ихтиогематологии (в сравнительном аспекте) / Житенева Л. Д., Макаров Э. В., Рудницкая О. А. — Ростов н/Д. : Эверест, 2004. — 312 с.
 7. Опыт выращивания гибрида «Русский осетр × ленский осетр (*Acipenser queldenstqdtii* Brandt et Ratzeburg, 1833 × *Acipenser baerii*, Brandt 1869)» в установке замкнутого водоснабжения / О. А. Левина, И. П. Степанова, Г. Ф. Металлов [и др.] // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания. — 2015. — № 3. — С. 17—25.
 8. Лапухин Ю. А. Сезонная динамика показателей крови у рыб в УЗВ / Ю. А. Лапухин // VI Ежегодная науч. конф. студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН, 19-30 апр. 2010 г., г. Ростов-на-Дону, Россия : тезисы докл. — Ростов н/Д. : Изд-во ЮНЦ РАН, 2011. — С. 29—30.
 9. Дохолян В. К. Динамика биохимических показателей крови некоторых видов рыб Каспия / В. К. Дохолян, Г. С. Битюцкая // Всесоюзная конф. по экологической физиологии рыб, 24-26 янв. 1973 г., г. Москва, Россия : тезисы докл. — М. : Экспериментальная печатно-множительная лаборатория ЦНИИТЭИРХ, 1973. — С. 167—169.
 10. Сенникова В. Д. Динамика гематологических показателей ленского осетра на разных стадиях зрелости / В. Д. Сенникова // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2012. — Вып. 28. — С. 133—142.
 11. Лукьяненко В. И. Влияние экстремальных условий приплотинной зоны реки на осетровых рыб / Лукьяненко В. И., Дубинин В. И., Сухопарова А. Д. — Рыбинск : ИБВВ им. И. Д. Папанина, 1990. — 272 с.
 12. Дехтярьов П. А. Фізіологія риб : підручник / Дехтярьов П. А., Євтушенко М. Ю., Шерман І. М. — К. : Аграрна освіта, 2008. — 341 с.
 13. Худая Л. В. Особенности функционирования системы восстановления метгемоглобина в эритроцитах стерляди при нитритной интоксикации / Л. В. Худая, А. И. Худый, М. М. Марченко // Биология внутренних вод. — 2015. — № 2. — С. 99—104.
 14. Сементина Е. В. Ихтиогематологические показатели как критерий условий выращивания и обитания рыб : дис. ... канд. биол. наук : спец. 03.02.06 «Ихтиология» / Сементина Е. В. — Калининград, 2011. — 241 с.
 15. Лукьяненко В. И. Гетерогенность и полиморфизм гемоглобина рыб / Лукьяненко В. И., Васильев А. С., Лукьяненко В. В. — СПб. : Наука, 1991. — 392 с.

16. Бахарева А. А. Научно-обоснованные методы повышения продуктивности ремонтно-маточных стад осетровых рыб за счет оптимизации технологии кормления и содержания в условиях рыбоводных хозяйств Волго-Каспийского бассейна : дис. ... докт. с-х. наук : спец. 06.02.08 «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов» / Бахарева А. А. — Астрахань, 2016. — 323 с.
17. Васильев А. С. Осмотическая резистентность эритроцитов и концентрация внеэритроцитарного гемоглобина у русского осетра с различной степенью расслоения мышечной ткани / А. С. Васильев // Осетровое хозяйство водоёмов СССР : Всесоюз. совещание, ноябрь 1989 г., г. Астрахань, Россия : тезисы докл. — Волгоград : Волгоградская правда, 1989. — С. 41—42.
18. Кудрявцев А. А. Гематология животных и рыб / Кудрявцев А. А., Кудрявцева Л. А., Привольнев Т. И. — М. : Колос, 1969. — 320 с.
19. Справочник по физиологии рыб / [Яржомбек А. А., Лиманский В. В., Щербина Т. В. и др.] ; ред. Яржомбек А. А. — М. : Агропромиздат, 1986. — 192 с.
20. Многолетний мониторинг физиологического состояния основных видов каспийских осетровых рыб / Г. Ф. Металлов, П. П. Гераскин, В. П. Аксёнов, О. А. Левина [и др.]. — Вестник АГТУ. — 2016. — № 1. — С. 88—98. — (Серия : Рыбное хозяйство).
21. Хабаров М. В. Альбуминовая система сыворотки крови разных по экологии видов осетровых рыб : дис. ... канд. биол. наук : спец. 03.00.16 «Экология» / Хабаров М. В. — Ярославль, 2005. — 247 с.
22. Гистофизиологические и биохимические показатели качества молоди осетровых [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://studbooks.net/1092809/agropromyshlennost/gistofiziologicheskie_biohimicheskie_pokazateli_kachestva_molodi_osetrovyh.
23. Коржуев П. А. Физиолого-биохимическая характеристика крови производителей осетровых рыб / П. А. Коржуев // Осетровое хозяйство в водоёмах СССР. — М. : АН СССР; Рыбное хозяйство. — 1963. — С. 69—74.
24. Рябцева И. П. Идентичность фракционного состава гемоглобина каспийской белуги в морской и речной периоды жизни / И. П. Рябцева, В. В. Лукьяненко // Осетровое хозяйство водоёмов СССР : Всесоюз. совещание, ноябрь 1989 г., г. Астрахань, Россия : тезисы докл. — Волгоград : Волгоградская правда, 1989. — С. 286—288.
25. Васильев А. С. Гетерогенность, полиморфизм и функциональные свойства гемоглобинов рыб : дис. ... докт. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология» / Васильев А. С. — Ярославль, 1999. — 594 с.
26. Камшилов И. М. Эффект Бора в характеристике буферных свойств гемоглобина рыб / И. М. Камшилов, Р. А. Запруднова // Труды Карельского научного центра РАН. — 2013. — № 3. — С. 190—193.
27. Камшилов И. М. Функциональные свойства гемоглобина у разных по экологии групп рыб : дис. ... канд. биол. наук : спец. 03.00.16 «Экология» / Камшилов И. М. — Борок, 1999. — 140 с.
28. Зименс Ю. Н. Влияние повышенных доз йода на рост, развитие и товарные качества ленского осетра при выращивании в установке замкнутого водоснабжения : дис. ... канд. с-х. наук : спец. 06.02.08 «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов» / Зименс Ю. Н. — Саратов, 2014. — 116 с.

29. Житенева Л. Д. Тромбоциты рыб и других групп позвоночных / Житенева Л. Д., Макаров Э. В., Рудницкая О. А. — Ростов н/Д. : СКНЦ ВШ, 2003. — 72 с.
30. Корабельникова О. В. Физиолого-биохимические показатели осетровых рыб (*Acipenseridae* Bonaparte, 1832) при выращивании в индустриальных хозяйствах : дис. ... канд. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология» / Корабельникова О. В. — М., 2009. — 145 с.
31. Сырбулов Д. Н. Гематологические показатели ремонтно-маточного стада стерляди, содержащегося на волгоградском осетровом рыбоводном заводе [Электронный ресурс] / Сырбулов Д. Н. — Режим доступа : <http://splanet.ru/referat9/referat-1490684.php>.
32. Гераскин П. П. Реакции организма каспийских осетровых (*Acipenseridae*) на загрязнение среды обитания : дис. ... докт. биол. наук : спец. 03.03.01 «Физиология» / Гераскин П. П. — М., 2013. — 418 с.
33. Игумнова Л. В. Патологическое состояние производителей и молоди осетровых Нижней Волги [Электронный ресурс] / Игумнова Л. В. — Режим доступа : <http://ribovodstvo.com/books/item/f00/s00/z0000023/st023.shtml>.
34. Пронина Г. И. Референсные значения физиолого-иммунологических показателей гидробионтов разных видов / Г. И. Пронина, Н. Ю. Корягина // Вестник АГТУ. — 2015. — № 4. — С. 103—108. — (СЕРИЯ : Рыбное хозяйство).
35. Давыдов О. Н. Патология крови рыб / Давыдов О. Н., Темниханов Ю. Д., Куровская Л. Я. — К. : ИНКОС, 2006. — 206 с.
36. Абдуллаева Н. М. Изучение физиологического состояния осетровых рыб среднего Каспия / Н. М. Абдуллаева, М. Г. Рамазанова, М. М. Габибов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2016. — Т. 18, № 2. — С. 7—9.
37. Лапирова Т. Б. Влияние перметрина на лейкоцитарную формулу молоди осетра / Т. Б. Лапирова // Токсикологический вестник. — 2009. — № 6(99). — С. 21—25.
38. Сенникова В. Д. Динамика показателей крови разнополых особей ленского осетра в сезонном аспекте / В. Д. Сенникова // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2012. — Вып. 28. — С. 153—161.
39. Федоров Р. А. Особенности трансапиллярного обмена белков плазмы крови у пресноводных костных рыб / Р. А. Федоров, А. М. Андреева // Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов Европейского Севера XXVIII : Междунар. конф., 5-8 окт. 2009 г., г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия : матер. докл. — Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2009. — С. 583—585.
40. Мухрамова А. А. Оценка состояния молоди русского осетра по рыбоводно-биологическим параметрам и биохимическим показателям крови после кормления экспериментальными кормами / А. А. Мухрамова // Вестник КазНУ. — 2012. — № 1(33). — С. 103—106. — (Серия : Экологическая).
41. Баль Н. В. Фракционный состав сывороточных белков русского осетра с признаками миопатии / Н. В. Баль, П. П. Гераскин, Э. А. Мишин // Осетровое хозяйство водоёмов СССР : Всесоюз. совещание, ноябрь 1989 г., г. Астрахань, Россия : тезисы докл. — Волгоград : Волгоградская правда, 1989. — С. 16—20.

42. Субботкин М. Ф. Сравнительный иммунохимический анализ сывороточных белков двух видов осетров Каспийского бассейна / Субботкин М. Ф. // Осетровое хозяйство водоёмов СССР : Всесоюз. совещание, ноябрь 1989 г., г. Астрахань, Россия : тезисы докл. — Волгоград : Волгоградская правда, 1989. — С. 305—310.
43. Коротенко А. В. Самки русского осетра с различными физиолого-рыбоводными характеристиками / А. В. Коротенко // Естественные науки. — 2011. — № 1(34). — С. 157—161.
44. Липопротеиды крови осетровых (*Acipenseridae*) рыб [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.ecologyreality.ru/ecolits-604-4.html>.
45. Регеранд Т. И. Роль различных факторов в формировании липидного состава липопротеидов рыб / Т. И. Регеранд, М. В. Лизенко, Е. И. Лизенко // Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов Европейского Севера : XXVIII Междунар. конф., 5-8 окт. 2009 г., г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия : матер. докл. — Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2009. — С. 465—470.
46. Золотухина В. А. Физиолого-биохимическая характеристика осетровых рыб в различные периоды годового цикла / В. А. Золотухина // VII Ежегодной научн. конф. студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН, 11-25 апр. 2011 г., г. Ростов-на-Дону, Россия : матер. докл. — Ростов н/Д. : ЮНЦ РАН, 2011. — С. 22—23.
47. Садлер Д.-А. А. Качественная оценка продукционных стад русского осетра в зависимости от условий содержания / Д.-А. А. Садлер, А. А. Кокоза, О. Н. Загребина // Вестник АГТУ. — 2012. — № 1. — С. 175—180. — (Серия : Рыбное хозяйство).
48. Барулин Н. В. Активность аминотрансфераз в сыворотке крови осетрообразных рыб в условиях аквакультуры / Н. В. Барулин // Молодёжь и инновации : Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых с международным участием, 29-31 мая 2013 г., г. Горки, Беларусь : матер. докл. — Минск : Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2013. — С. 158—160.
49. Лапирова Т. Б. Реакция иммунофизиологических показателей молоди сибирского осетра (*Acipenser baerii* Brandt) на действие перметрина / Т. Б. Лапирова // Вестник Томского государственного университета. Биология. — 2011. — № 4 (16) — С. 124—135.
50. Краюшкина Л. С. Катионный состав плазмы крови осетровых в период нерестовой миграции и при экспериментальном солевом воздействии / Л. С. Краюшкина // Всесоюз. конф. по экологической физиологии рыб, 24-26 янв. 1973 г., г. Москва, Россия : тезисы докл. — М. : Экспериментальная печатно-множительная лаборатория ЦНИОРХ Москва, 1973. — С. 153—155.
51. Бойко Н. Е. Физиологические механизмы адаптивных функций в раннем онтогенезе русского осетра *Acipenser gueldenstaedtii* Brandt : дис. ... докт. биол. наук : спец. 03.00.13 «Физиология» / Бойко Н. Е. — СПб., 2008. — 224 с.

REFERENCES

1. Luk'yanenko, V. V., & Luk'yanenko, V. I. (2002). *Ekologo-fiziologicheskoe osobennosti fraktsionnogo sostava gemoglobina krovi osetrovyykh ryb*. Yaroslavl' : VVO REA.

2. Luk'yanenko, V. V. (1989). Svoeobrazie fraktsionnogo sostava gemoglobina sakhalinskogo osetra. *Osetrovoe khozyaystvo vodoemov SSSR : Vsesoyuznoe soveshchanieye, noyabr', 1989, Astrakhan', Rossiya*. Volgograd : Volgogradskaya pravda, 190-192.
3. Kireeva, I. Yu., & Kononenko, I. S. (2010). Otsenka fiziologicheskogo sostoyaniya proizvoditeley russkogo osetra. *Nauchnye vedomosti. Seriya Estestvennye nauki*, 12, 15(86), 94-97.
4. Zhiteneva, L. D., Makarov, E. V., & Rudnitskaya, O. A. Evolyutsiya krovi. *bubook.net*. Retrieved from : <http://bubook.net/book/70-yevolyuciya-krovi-ld-zhiteneva-yev-makarov-oa-rudnickaya/20-xryashhevye-ganoidy.html>.
5. Zhiteneva, L. D. (2000). *Ekologicheskie zakonomernosti ikhtiogematologii*. Rostov-na-Donu : AzNIIRKh.
6. Zhiteneva, L. D., Makarov, E. V., & Rudnitskaya, O. A. (2004). *Osnovy ikhtiogematologii (v sravnitel'nom aspekte)*. Rostov-na-Donu : Everest.
7. Levina, O. A., Stepanova, I. P., Metallov, G. F., & Sorokina, M. N. (2015). Opyt vyrashchivaniya gibrida «Russkiy osetr × lenskiy osetr (*Acipenser queldenstqdtii* Brandt et Ratzeburg, 1833 × *Acipenser baerii* Brandt 1869)» v ustanovke zamknutogo vodosnabzheniya. *Tekhnologii pishchevoy i pererabatyvayushchey promyshlennosti APK – produkty zdorovogo pitaniya*, 3, 17-25.
8. Lapukhin, Yu. A. (2011). Sezonnaya dinamika pokazateley krovi u ryb v UZV. *VI Ezhegodnaya nauchnaya konferentsiya studentov i aspirantov bazovykh kafedr Yuzhnogo nauchnogo tsentra RAN, 19-30 aprelya 2010, Rostov-na-Donu, Rossiya*. Rostov-na-Donu : YuNTs RAN, 29-30.
9. Dokholyan, V. K., & Bityutskaya, G. S. (1973) Dinamika biokhimicheskikh pokazateley krovi nekotorykh vidov ryb Kaspiya. *Vsesoyuznaya konferentsiya po ekologicheskoy fiziologii ryb, 24-26 yanvarya 1973, Moskva, Rossiya*. Moskva : Eksperimental'naya pechatno-mnozhitel'naya laboratoriya TsNIITEIRKh, 167-169.
10. Sennikova, V. D. (2012). Dinamika gematologicheskikh pokazateley lenskogo osetra na raznykh stadiyakh zrelosti. Ageets, V. Yu. (Ed.). *Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi*, 28, 133-142.
11. Luk'yanenko, V. I., Dubinin, V. I., & Sukhoparova, A. D. (1990). *Vliyanie ekstremal'nykh usloviy priplotinnoy zony reki na osetrovyykh ryb*. Rybinsk : Institut biologii vnutrennikh vod im. I. D. Papanina.
12. Dekhtiarov, P. A., Yevtushenko, M. Yu., & Sherman, I. M. (2008). *Fiziologhiia ryb: pidruchnyk*. Kyiv : Ahrarna osvita.
13. Khudaya, L. V., Khudyy, A. I., & Marchenko M. M. (2015). Osobennosti funktsionirovaniya sistemy vosstanovleniya metgemoglobina v eritrotsitakh sterlyadi pri nitritnoy intoksikatsii. *Biologiya vnutrennikh vod*, 2, 99-104.
14. Sementina, E. V. (2011). Ikhtiogematologicheskie pokazateli kak kriteriy usloviy vyrashchivaniya i obitaniya ryb. *Candidate's thesis*. Kaliningrad.
15. Luk'yanenko, V. I., Vasil'ev, A. C., & Luk'yanenko, V. V. (1991). *Geterogenost' i polimorfizm gemoglobina ryb*. Sankt-Peterburg : Nauka.
16. Bakhareva, A. A. (2016). Nauchno-obosnovannye metody povysheniya produktivnosti remontno-matochnykh stad osetrovyykh ryb za schet optimizatsii tekhnologii kormleniya i soderzhaniya v usloviyakh rybovodnykh khozyaystv Volgo-Kaspiyskogo basseyna. *Doctor's thesis*. Astrakhan'.
17. Vasil'ev, A. S. (1989). Osmoticheskaya rezistentnost' eritrotsitov i kontsentratsiya vneeritrotsitarnogo gemoglobina u russkogo osetra s razlichnoy stepen'yu rassloeniya myshechnoy tkani. *Osetrovoe khozyaystvo vodoemov SSSR :*

- Vsesoyuznoe soveshchanie, noyabr', 1989, Astrakhan', Rossiya. Volgograd : Volgogradskaya pravda, 41-42.*
18. Kudryavtsev, A. A., Kudryavtseva, L. A., & Privol'nev, T. I. (1969). *Gematologiya zhivotnykh i ryb*. Moskva : Kolos.
 19. Yarzhombek, A. A., Limanskiy, V. V., & Shcherbina, T. V. et al. (1986). *Spravochnik po fiziologii ryb*. Yarzhombek, A. A. (Ed.). Moskva : Agropromizdat.
 20. Metallov, G. F., Geraskin, P. P., Aksenov, V. P., & Levina, O. A. (2016). Mnogoletniy monitoring fiziologicheskogo sostoyaniya osnovnykh vidov kaspiskikh osetrovykh ryb. *Vestnik AGTU, 1*, 88-98.
 21. Khabarov, M. V. (2005). Al'buminovaya sistema syvorotki krovi raznykh po ekologii vidov osetrovykh ryb. *Candidate's thesis*. Yaroslavl'.
 22. Gistofiziologicheskie i biokhimicheskie pokazateli kachestva molodi osetrovykh. *studbooks.net*. Retrieved from : http://studbooks.net/1092809/agropromyshlennost/gistofiziologicheskie_biokhimicheskie_pokazateli_kachestva_molodi_osetrovykh.
 23. Korzhuev, P. A. (1963). Fiziologo-biokhimicheskaya kharakteristika krovi proizvoditeley osetrovykh ryb. *Osetrovoe khozyaystvo v vodoemakh SSSR*. Moskva : AN SSSR ; Rybnoe khozyaystvo, 69-74.
 24. Ryabtseva, I. P., & Luk'yanenko, V. V. (1989). Identichnost' fraktsionnogo sostava gemoglobina kaspiskoy belugi v morskoy i rechnoy periody zhizni. *Osetrovoe khozyaystvo vodoemov SSSR : Vsesoyuznoe soveshchanie, noyabr', 1989, Astrakhan', Rossiya. Volgograd : Volgogradskaya pravda, 286-288.*
 25. Vasil'ev, A. S. (1999). Geterogennost', polimorfizm i funktsional'nye svoystva gemoglobinov ryb. *Doctor's thesis*. Yaroslavl'.
 26. Kamshilov, I. M., & Zaprudnova, R. A. (2013). Effekt Bora v kharakteristike bufernykh svoystv gemoglobina ryb. *Trudy Karel'skogo nauchnogo tsentra RAN, 3*, 190-193.
 27. Kamshilov, I. M. (1999). Funktsional'nye svoystva gemoglobina u raznykh po ekologii grupp ryb. *Candidate's thesis*. Borok.
 28. Zimens, Yu. N. (2014). Vliyanie povyshennykh doz yoda na rost, razvitie i tovarnye kachestva lenskogo osetra pri vyrashchivanii v ustanovke zamknutogo vodosnabzheniya. *Candidate's thesis*. Saratov.
 29. Zhiteneva, L. D., Makarov, E. V., & Rudnitskaya, O. A. (2003). *Trombotsity ryb i drugikh grupp pozvonochnykh*. Rostov-na-Donu : SKNTs VSh.
 30. Korabel'nikova, O. V. (2009). Fiziologo-biokhimicheskie pokazateli osetrovykh ryb (*Acipenseridae* Bonaparte, 1832) pri vyrashchivanii v industrial'nykh khozyaystvakh. *Candidate's thesis*. Moskva.
 31. Syrbulov, D. N. Gematologicheskie pokazateli remontno-matochnogo stada sterlyadi, sodержashchegosya na volgogradskom osetrovom rybovodnom zavode. *splanet.ru*. Retrieved from : <http://splanet.ru/referat9/referat-1490684.php>.
 32. Geraskin, P. P. (2013). Reaktsii organizma kaspiskikh osetrovykh (*Acipenseridae*) na zagryaznenie sredi obitaniya. *Doctor's thesis*. Moskva.
 33. Igumnova, L. V. Patologicheskoe sostoyanie proizvoditeley i molodi osetrovykh Nizhney Volgi. *ribovodstvo.com*. Retrieved from : <http://ribovodstvo.com/books/item/f00/s00/z0000023/st023.shtml>.
 34. Pronina, G. I., & Koryagina, N. Yu. (2015). Referensnye znacheniya fiziologo-immunologicheskikh pokazateley gidrobiontov raznykh vidov. *Vestnik AGTU, 4*, 103-108.
 35. Davydov, O. N., Temnikhanov, Yu. D., & Kurovskaya, L. Ya. (2006). *Patologiya krovi ryb*. Kiev : INKOS.

36. Abdullaeva, N. M., Ramazanova, M. G., & Gabibov, M. M. (2016). Izuchenie fiziologicheskogo sostoyaniya osetrovyykh ryb srednego Kaspiya. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk*, 18, 2, 7-9.
37. Lapirova, T. B. (2009). Vliyanie permetrina na leykotsitarnuyu formulu molodi osetra. *Toksikologicheskiiy vestnik*, 6(99), 21-25.
38. Sennikova, V. D. (2012). Dinamika pokazateley krovi raznopolykh osobey lenskogo osetra v sezonnom aspekte. *Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi*, 153-161.
39. Fedorov, R. A., & Andreeva, A. M. (2009). Osobennosti transkapillyarnogo obmena belkov plazmy krovi u presnovodnykh kostnykh ryb. *Biologicheskie resursy Belogo morya i vnutrennikh vodoemov Evropeyskogo Severa : XXVIII Mezhdunar. konf., 5-8 oktyabrya 2009, Petrozavodsk, Respublika Kareliya, Rossiya*. Petrozavodsk : KarNTs RAN, 583-585.
40. Mukhramova, A. A. (2012). Otsenka sostoyaniya molodi russkogo osetra po rybovodno-biologicheskim parametram i biokhimicheskim pokazatelyam krovi posle kormleniya eksperimental'nymi kormami. *Vestnik KazNU. Seriya ekologicheskaya*, 1(33), 103-106.
41. Bal', N. V., Geraskin, P. P., & Mishin, E. A. (1989). Fraktsionnyy sostav syvorotochnykh belkov russkogo osetra s priznakami miopatii. *Osetrovoe khozyaystvo vodoemov SSSR : Vsesoyuznoe soveshchanie, noyabr', 1989, Astrakhan', Rossiya*. Volgograd : Volgogradskaya pravda, 16-20.
42. Subbotkin, M. F. (1989). Sravnitel'nyy immunokhimicheskiiy analiz syvorotochnykh belkov dvukh vidov osetrov Kaspiyskogo basseyna. *Osetrovoe khozyaystvo vodoemov SSSR : Vsesoyuznoe soveshchanie, noyabr', 1989, Astrakhan', Rossiya*. Volgograd : Volgogradskaya pravda, 305-310.
43. Korotenko, A. V. (2011). Samki russkogo osetra s razlichnymi fiziologor-ybovodnymi kharakteristikami. *Estestvennye nauki*, 1(34), 157-161.
44. Lipoproteidy krovi osetrovyykh (*Acipenseridae*) ryb. *ecologyreality.ru*. Retrieved from : <http://www.ecologyreality.ru/ecolits-604-4.html>.
45. Regerand, T. I., Lizenko, M. V., & Lizenko, E. I. (2009). Rol' razlichnykh faktorov v formirovanii lipidnogo sostava lipoproteidov ryb. *Biologicheskie resursy Belogo morya i vnutrennikh vodoemov Evropeyskogo Severa : XXVIII Mezhdunar. konf., 5-8 oktyabrya 2009, Petrozavodsk, Respublika Kareliya, Rossiya*. Petrozavodsk : KarNTs RAN, 465-470.
46. Zolotukhina, V. A. (2011). Fiziologo-biokhimicheskaya kharakteristika osetrovyykh ryb v razlichnye periody godovogo tsikla. *VII Ezhegodnaya nauchnaya konferentsiya studentov i aspirantov bazovykh kafedr Yuzhnogo nauchnogo tsentra RAN, 11-25 aprelya 2011, Rostov-na-Donu, Rossiya*. Rostov-na-Donu : YuNTs RAN, 22-23.
47. Sadler, D.-A. A., Kokoza, A. A., & Zagrebina, O. N. (2012). Kachestvennaya otsenka produktsionnykh stad russkogo osetra v zavisimosti ot usloviy soderzhaniya. *Vestnik AGTU*, 1, 175-180.
48. Barulin, N. V. (2013). Aktivnost' aminotransferaz v syvorotke krovi osetroobaznykh ryb v usloviyakh akvakul'tury. *Molodezh' i innovatsii : Mezhdunarod. nauchno-prakt. konf. molodykh uchenykh s mezhdunarodnym uchastiem, 29-31 maya 2013., Gorki, Belarus'*. Minsk : Belorusskaya gosudarstvennaya sel'skokhozyaystvennaya akademiya, 158-160.

49. Lapirova, T. B. (2011). Reaktsiya immunofiziologicheskikh pokazateley molodi sibirskogo osetra (*Acipenser baerii* Brandt) na deystvie permetrina. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Biologiya*, 4 (16), 124-135.
50. Krayushkina, L. S. (1973). Kationnyy sostav plazmy krovi osetrovykh v period nerestovoy migratsii i pri eksperimental'nom solevom vozdeystvi. *Vsesoyuz. konf. po ekologicheskoy fiziologii ryb*, 24-26 yanvarya 1973, Moskva, Rossiya. Moskva : Eksperimental'naya pechatno-mnozhitel'naya laboratoriya TsNIORKh, 153-155.
51. Boyko, N. E. (2008). Fiziologicheskie mekhanizmy adaptivnykh funktsiy v rannem ontogeneze russkogo osetra *Acipenser gueldenstaedtii* Brandt. *Doctor's thesis*. Sankt-Peterburg.

ОСНОВНЫЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ РЫБ (ACIPENSERIDAE) (ОБЗОР)

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Проанализировать научные источники по физиолого-биохимическим, экологическим и генетическим особенностям основных гематологических показателей и закономерностей их изменчивости у осетровых видов рыб (*Acipenseridae*). Рассмотреть основополагающие моменты липидного и белкового обмена в сыворотке крови и влияние на них биотических и абиотических факторов. Осветить общие черты ферментов сыворотки крови.

Результаты. Обзор научных работ выявил, что хотя гематологические показатели осетровых рыб в целом аналогичны таковым у костистых рыб и млекопитающих, есть ряд существенных отличий. Кроме того, многим гематологическим показателям свойственна видовая специфичность даже в пределах семейства. Отдельного внимания заслуживает изменчивость гематологических показателей под влиянием факторов как внутренней, так и внешней среды. В работе описано влияние пола и возраста, а также сезонов времени года на состав крови осетровых. Изложены основы использования белков сыворотки крови в генетических и популяционных исследованиях. Показаны особенности функционирования гемоглобина эритроцитов осетровых. Рассмотрены основные гематологические показатели при формировании и созревании половых продуктов, их влияние на фертильность. Описан ионный состав крови.

Практическая значимость. Систематизированные данные по основным гематологическим показателям и закономерностям их изменчивости у осетровых видов рыб будут полезны как для научных исследователей, так и в практике фермеров-рыбоводов. Это обусловлено тем, что анализ крови как наиболее лабильной системы организма, не только четко отражает физиологическое состояние особи в конкретно заданных условиях существования, но и используется в генетических и популяционных исследованиях. Таким образом, знание основных закономерностей формирования состава крови осетровых рыб необходимо для дальнейших исследований в рыбохозяйственной науке. Массив обобщенной информации будет полезным при формировании ремонтно-маточных стад, оценке качества молоди, определении степени готовности производителей к нересту, при ихтиопатологических ситуациях на хозяйствах и т. д.

Ключевые слова: осетровые виды рыб (*Acipenseridae*), гематологические показатели, красная кровь, гематокрит, гемоглобин, белая кровь, лейкоцитарная формула осетровых, липопротеиды, лизоцим осетровых, фертильность, белки сыворотки крови, альбумин, глобулины, глюкоза.

MAIN HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF STURGEON SPECIES (ACIPENSERIDAE) (REVIEW)

M. Simon, seemann_sm@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To analyze scientific sources on the physiological, biochemical, ecological and genetic features of the main hematological parameters and patterns of their variability in sturgeon species (Acipenseridae). To examine the fundamental aspects of lipid and protein metabolism in blood serum and the effect of biotic and abiotic factors on them. To highlight the common features of serum enzymes.

Findings. A review of scientific papers revealed that although hematological parameters of sturgeons are generally similar to those of teleosts and mammals, there are a number of significant differences. In addition, many hematological parameters are characterized by species specificity, even within a family. Special attention is given to the variability of hematological parameters under the effect of factors of both internal and external environment. The paper describes the effects of sex and age, as well as the seasons of the year on the composition of sturgeon blood. The fundamentals of the use of serum proteins in genetic and population studies are outlined. The features of the functioning of hemoglobin in sturgeon's red blood cells are examined. The main hematological parameters involved in the formation and maturation of sexual products, and their effect on fertility are reviewed. For example, the spawners, which hadn't put reproductive product, are characterized by a low rate of hemoglobin, increase in erythrocyte sedimentation speed and also a rise of the level of crude protein in blood and β -lipoprotein serum. The biochemical parameters (total protein and fractions, glucose, creatinine, cholesterol), the activity of some enzymes (alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase, creatine kinase) in serum are examined.

Practical value. The systematized data on the main hematological parameters and patterns of their variability in sturgeon species will be useful for both scientists and fish farmers. This is due to the fact that the analysis of blood as the most labile system of fish organism, not only clearly reflects the physiological state of the individual in specific conditions of existence, but is also used in genetic and population studies. Thus, the knowledge of the basic patterns of the formation of blood composition of sturgeon fish is necessary for further research in fisheries science. An array of the generalized information will be useful for the creation of replacement broodstocks, assessment of the quality of juveniles, determination of the readiness degree of broodfish for spawning, in ichthyopathological situations at fish farms, etc.

Keywords: sturgeon (Acipenseridae), hematologic parameters, red blood (RBC), hematocrit, hemoglobin (Hb), white blood cells (WBC), leucogram, Arneth's curve, high-density lipoprotein, low-density lipoprotein, lysozyme, fertility, blood plasma, blood serum, proteins, glucose.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 118-127

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.118>

УДК 016:[597.554.3:639.371.5]

ЧОРНИЙ АМУР (*MYLOPHARYNGODON PICEUS* RICHARDSON). ТЕМАТИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

І. Й. Грициняк, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Т. М. Швець, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Складання довідкового бібліографічного переліку україно- та російськомовних публікацій з питань екології, біології, селекції та розведення в умовах рибницьких господарств України та близького зарубіжжя представника далекосхідного фауністичного іхтіокомплексу — чорного амурського (*Mylopharyngodon piceus* Richardson), а також можливості його інтродукції до водойм з біомеліоративною метою.

Методика. У процесі підготовки тематичного списку, в ході системного пошуку було застосовано цілісний та вибірковий методи. Бібліографічне ядро складало літературні джерела з фонду наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 67 джерел, що охоплюють часовий інтервал з 1949 по 2011 рр., та включають характеристику представника родини короповіх риб — чорного амурського. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Підготовлений перелік може бути корисним для науковців, практиків, студентів, сфера інтересів яких стосується питань культивування та дослідження біологічних особливостей чорного амурського.

Ключові слова: чорний амур, акліматизація, розведення, живлення, вирощування.

1. Амур черный. Одомашненная форма // Каталог пород, кроссов и одомашненных форм рыб России и СНГ. — М., 2001. — С. 172—176.
2. Балтаджи Р. А. Опыт получения потомства и выращивания сеголетков черного амурського в Мироновском рыбопитомнике / Р. А. Балтаджи, И. Н. Иванов, В. В. Исаевич // Рыбное хозяйство. — 1976. — Вып. 23. — С. 7—10.
3. Балтаджи Р. А. Черный амур (*Mylopharyngodon piceus* (Richardson)) как перспективный объект ихтиофауны Украины / Р. А. Балтаджи, Н. П. Рудь, Л. Н. Шиндер // Рыбное хозяйство. — 2006. — Вып. 65. — С. 31—41.
4. Балтаджи Р. А. Черный амур как перспективный объект рыбоводства во внутренних водоемах Украины / Р. А. Балтаджи // Республиканская конференция по акклиматизации и внедрению новых объектов рыбоводства в водоемах Украины : тезисы докл. — К., 1978. — С. 48—52.
5. Бизяев И. Н. Результаты вселения амурського и толстолобиков в открытые водоемы Азово-Кубанского района / И. Н. Бизяев // Рыбохозяйственное освоение растительноядных рыб. — М. : Наука, 1966. — С. 49—59.

© І. Й. Грициняк, Т. М. Швець, 2016

6. Виноградов В. К. Об использовании черного амурского как биологического мелиоратора водоемов / В. К. Виноградов // Прудовое и озерное рыбководство. — 1993. — Вып. 2—3. — С. 21—22.
7. Воропаев С. Н. Морфо-биологические особенности реципрокных гибридов черного и белого амуров / С. Н. Воропаев // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института прудового рыбного хозяйства. — 1992. — Вып. 67. — С. 69—78.
8. Воропаев С. Н. Опыт получения реципрокных гибридов черного и белого амуров / С. Н. Воропаев // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института прудового рыбного хозяйства. — 1991. — Вып. 61. — С. 86—89.
9. Воропаев С. Н. Особенности оогенеза черного амурского / С. Н. Воропаев, В. А. Ильясова, Е. А. Мельченков // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института прудового рыбного хозяйства. — 1992. — Вып. 66. — С. 155—159.
10. Воропаев С. Н. Особенности сперматогенеза черного амурского / С. Н. Воропаев, В. А. Ильясова, Е. А. Мельченков // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института прудового рыбного хозяйства. — 1992. — Вып. 67. — С. 56—60.
11. Горбач Э. И. Возрастной состав, рост и возраст наступления половой зрелости белого и черного амуров в бассейне реки Амурского / Э. И. Горбач // Вопросы ихтиологии. — 1961. — № 1. — С. 119—126.
12. Гусевич В. В. Черный амур как объект-биомелиоратор для водоемов-охлаждателей энергосистем // Проблемы рационального использования биоресурсов водохранилищ : Междунар. науч. конф., 6-8 сент. 1995 г., г. Киев : материалы. — К., 1995. — С. 100.
13. Демьянко В. Ф. Биологический мелиоратор / В. Ф. Демьянко, А. И. Денисов // Рыбководство и рыболовство. — 1984. — № 2. — С. 3.
14. Демьянко В. Ф. Перспективы использования черного амурского в качестве биологического мелиоратора / В. Ф. Демьянко, А. И. Денисов // IV съезд ВГБО : тезисы докл. — К. : Наукова думка, 1981. — С. 125—126.
15. Денисов Л. И. Проявление хищничества у черного амурского / Л. И. Денисов // Республиканская конференция по акклиматизации и внедрению новых объектов рыбководства в водоемах Украины : тезисы докл. — К., 1978. — С. 47—48.
16. Дударенко Л. С. К вопросу изучения возможности зимовки черного амурского в водоемах Беларуси / Л. С. Дударенко, Е. В. Таразевич, В. Б. Сазанов // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2005. — Вып. 21. — С. 56—59.
17. Евтушенко Н. Ю. Некоторые аспекты разведения черного амурского в водоемах Украины / Н. Ю. Евтушенко, А. С. Потрохов, О. Г. Зиньковский // Таврійський науковий вісник. — 1998. — Вып. 7. — С. 160—167.
18. Евтушенко Н. Ю. Перспективы разведения черного амурского в лесостепной зоне Украины / Н. Ю. Евтушенко, А. С. Потрохов, О. Г. Зиньковский // Гидробиологический журнал. — 1997. — № 2. — С. 33—41.
19. Евтушенко Н. Ю. Черный амур как объект акклиматизации (обзор) / Н. Ю. Евтушенко, А. С. Потрохов, О. Г. Зиньковский // Гидробиологический журнал. — 1993. — № 3. — С. 49—56.
20. Еремеева Е. Ф. Черный амур как объект акклиматизации / Е. Ф. Еремеева // Труды Института морфологии животных им. А. Н. Северцова. — 1951. — Вып. 5. — С. 32.

21. Иванов С. Н. Черный амур и толстолобик в южной части Аральского моря / С. Н. Иванов // Акклиматизация рыб и кормовых организмов в морях СССР : сборник научных трудов ВНИРО. — 1964. — Т. 55, вып. 2. — С. 196—198.
22. Инвазированность черного амура метацеркариями трематод *P. diplostomum* в условиях прудовых хозяйств Беларуси / В. Б. Сазанов, Е. В. Таразевич, А. А. Алексеева [и др.] // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2006. — Вып. 22. — С. 156—160.
23. Конрадт А. Г. Перспективы вселения черного амура в Цимлянское водохранилище / А. Г. Конрадт, А. Ф. Мухамедова // Рыбохозяйственное изучение внутренних водоемов : сборник ГосНИОРХ. — 1974. — № 12. — С. 43—45.
24. Кончиц В. В. Биологические основы выращивания черного амура в условиях Беларуси / В. В. Кончиц, В. Б. Сазанов. — Минск : РУП «Институт рыбного хозяйства», 2010. — 128 с.
25. Кончиц В. В. Влияние двухлетков черного амура на динамику развития моллюсков в прудовых хозяйствах Беларуси / В. В. Кончиц, В. Б. Сазанов // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2010. — Вып. 26. — С. 80—88.
26. Кончиц В. В. Рыбоводно-биологическая характеристика выращивания двухлетков и трехлетков черного амура в условиях Беларуси / В. В. Кончиц, В. Б. Сазанов // Рыбне господарство. — 2009. — Вып. 67. — С. 106—112.
27. Кончиц В. В. Технологические аспекты выращивания сеголеток черного амура в условиях Беларуси / В. В. Кончиц, В. Б. Сазанов // Рыбогосподарська наука України. — 2009. — № 2. — С. 64—69.
28. Кончиц В. В. Технология выращивания черного амура в поликультуре прудового рыбоводства Беларуси / В. В. Кончиц, В. Б. Сазанов // Биологические основы выращивания черного амура в условиях Беларуси / В. В. Кончиц, В. Б. Сазанов. — Минск : РУП «Институт рыбного хозяйства», 2010. — С. 107—125.
29. Кончиц В. В. Характеристика питания двухлетков черного амура, выращиваемого в условиях прудовых хозяйств Беларуси / В. В. Кончиц, В. Б. Сазанов // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2010. — Вып. 26. — С. 71—79.
30. Кончиц В. В. Характеристика питания личинок и сеголетков черного амура, выращиваемого в условиях прудовых хозяйств Беларуси / В. В. Кончиц, В. Б. Сазанов // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2010. — Вып. 26. — С. 57—70.
31. Кончиц В. В. Характеристика питания трехлетков черного амура, выращиваемых в водоемах Беларуси / В. В. Кончиц, В. Б. Сазанов // Аквакультура Европы и Азии: реалии и перспективы развития и сотрудничества : Междунар. науч.-практ. конф., Улан-Удэ, оз. Байкал, 1-7 авг. 2011 г. : матер. / общ. ред. А. И. Литвиненко. — Тюмень : Госрыбцентр, 2011. — С. 86—88.
32. Коренев А. В. К вопросу о перспективности черного амура как биомелиоратора водоемов-охладителей, населенных дрейссеной, и о кормовой ценности этого моллюска / А. В. Коренев // Методы интенсификации прудового рыбоводства : Всесоюз. конф. молодых ученых : тезисы докл. — М., 1984. — С. 34—35.
33. Коренев А. В. О запасах, распределении и размерной характеристике дрейссены в Мироновском водохранилище в связи с предполагаемым вселением в него черного амура / А. В. Коренев // Рыбное хозяйство. — 1985. — Вып. 39. — С. 54—57.

34. Кормовая база и питание сеголетков черного амура при выращивании в поликультуре / Н. П. Жемаева, И. Ю. Бадаева, Л. В. Куликова [и др.] // Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем : Междунар. научно-практ. конф. молодых ученых, 25-28 февр. 2002 г., Киев : матер. — К., 2002. — С. 22—23.
35. Костоусов В. Г. Опыт использования черного амура для подавления очагов шистосомного церкариоза / В. Г. Костоусов, Е. В. Таразевич, В. Б. Сазанов // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2007. — Вып. 23. — С. 20—31.
36. Крепис О. И. Рост и питание черного амура в опытных прудах зоостанции на базе Молдавской ГРЭС / О. И. Крепис, М. М. Михальченко, А. И. Канцур // Комплексное использование водоемов Молдавии. — Кишинев : АН МССР, 1980. — С. 52—55.
37. Кубрак И. Перспективы вселения черного амура водоем-охладитель Молдавской ГРЭС / И. Кубрак, О. Крепис // Итоги и перспективы акклиматизации рыб и беспозвоночных в водоемах СССР. — М., 1980. — С. 64—65.
38. Линдберг Г. У. Черный амур / Г. У. Линдберг // Промысловые рыбы СССР. — М., 1949. — С. 330—331.
39. Мамонтов В. А. Новый стартовый комбикорм для черного амура / В. А. Мамонтов, Е. А. Гамыгин // Первый конгресс ихтиологов России : тезисы докл. — М., 1997. — С. 333.
40. Маркова Е. В. Черный амур в Аральском море / Е. В. Маркова // Рыбоводство и рыболовство. — 1964. — № 1. — С. 15.
41. Методические рекомендации по биотехнике разведения и выращивания черного амура / [Балан А. И., Балтаджи Р. А., Приходько В. А., Иванов И. Н.]. — Херсон : Главное управление рыбного хозяйства внутренних водоемов УССР; Украинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, 1976. — 12 с.
42. Мовчан Ю. В. Чорний амур східноазіатський — *Mylopharyngodon piceus* (Richardson, 1846) / Ю. В. Мовчан // Риби України : визначник-довідник / Мовчан Ю. В. — К. : Зоологічний музей НАНУ, 2011. — С. 125.
43. Мотенкова Л. Г. Питание личинок черного амура / Л. Г. Мотенкова // Сборник научно-исследовательских работ Всесоюзного научно-исследовательского института прудового рыбного хозяйства МРХ СССР. — 1970. — № 3. — С. 205—213.
44. Мухамедова А. Ф. Черный амур в Цимлянском водохранилище / А. Ф. Мухамедова, С. В. Аксенов, Н. П. Шаповалов // Сборник научных трудов Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. — 1989. — Вып. 301. — С. 149—156.
45. Панов Д. А. Опыт подращивания черного амура и гибрида толстолобиков в прудах рыбоводного хозяйства Рязанской ГРЭС / Д. А. Панов, Л. В. Калмыков // Проблемы и перспективы развития аквакультуры в России : науч.-практ. конф., Адлер, 24-27 сент. 2001 г. : матер. докл. — Краснодар : КрасНИИРХ, 2001. — С. 218—219.
46. Паразитофауна черного амура, выращиваемого в прудовых хозяйствах республики Беларусь / В. В. Кончиц, Е. В. Таразевич, В. Б. Сазанов [и др.] // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2005. — Вып. 21. — С. 60—62.
47. Пат. 30097 А Україна, МПК А01К 61/00. Спосіб отримання статевих продуктів чорного амура та рослиноїдних риб / [Потрохов О. С., Зінковський О. Г., Євтушенко М. Ю.] ; заявник і власник Інститут гідробіології НАНУ. — № 97126245 ; заявл. 25.12.1997 ; опубл. 15.11.2000, Бюл. № 6.

48. Пат. 32789 А Україна, МПК А01К 61/00. Спосіб отримання статевих продуктів чорного амура / [Зінковський О. Г., Потрохов О. С., Євтушенко М. Ю.] ; заявник і власник Інститут гідробіології НАНУ. — № у 98041952 ; заявл. 16.04.1998 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1/2001.
49. Приходько В. А. Получение потомства черного амура / В. А. Приходько, В. А. Финько, А. Шмыгин // Рыбоводство и рыболовство. — 1974. — № 6. — С. 17.
50. Разведение и выращивание черного амура в прудах юга Украины / В. А. Приходько, В. А. Финько, И. М. Шерман [и др.] // Рыбное хозяйство. — 1975. — Вып. 20. — С. 13—15.
51. Руководство по биотехнике разведения и выращивания дальневосточных растительноядных рыб. — М., 2000. — 211 с.
52. Савина Р. А. Выращивание черного амура в прудах / Р. А. Савина // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института прудового рыбного хозяйства. — 1975. — Вып. 15. — С. 77—87.
53. Сазанов В. Б. Обоснование технологических элементов выращивания черного амура в поликультуре прудового рыбоводства Беларуси : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук / В. Б. Сазанов. — Жодино, 2008. — 20 с.
54. Сазанов В. Б. Первые результаты акклиматизации черного амура в водоемах Республики Беларусь / В. Б. Сазанов // Рибне господарство. — 2004. — Вип. 63. — С. 194—198.
55. Сазанов В. Б. Черный амур — новый перспективный объект аквакультуры Беларуси / В. Б. Сазанов // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности. — М., 2005. — Т. 1. — С. 326—329.
56. Сазанов В. Б. Черный амур в Беларуси / В. Б. Сазанов // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. — 2006. — № 5. — С. 185—187. — (Серія аграрных навук).
57. Соин С. Г. Сравнительно-морфологический анализ развития белого и черного амуров, белого и пестрого толстолобиков / С. Г. Соин, А. И. Суханова // Вопросы ихтиологии. — 1972. — № 1. — С. 72—83.
58. Суханова А. И. Особенности развития белого и черного амуров, белого и пестрого толстолобиков в связи с их искусственным разведением в Туркмении : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук / А. И. Суханова. — Ашхабад, 1969. — 22 с.
59. Суханова А. И. Развитие черного амура / А. И. Суханова // Вопросы ихтиологии. — 1967. — № 4. — С. 618—625.
60. Технология выращивания черного амура в прудах / С. В. Пономарев, Л. Ю. Лагуткина, Е. Н. Пономарева [и др.] // Технологии фермерского рыбоводства. — Астрахань, 2008. — С. 46—49.
61. Технология производства посадочного материала черного амура // Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре. — М. : ВНИРО, 2001. — С. 70—80.
62. Технология разведения и выращивания черного амура. — М. : ВНИИПРХ, 1990. — 10 с.
63. Технологія відтворення та утримання чорного амура // Технології виробництва об'єктів аквакультури. — К., 2006. — С. 58—73.
64. Технологія відтворення чорного амура в водоймах України / Грусевич В. В., Вовк П. С., Євтушенко М. Ю. — К., 1996. — 16 с.
65. Финько В. А. Зимовка черного амура в прудах / В. А. Финько, Г. А. Черниенко // Комплексное использование водоемов Молдавии. — Кишинев, 1981. — С. 66—69.

66. Черномашенцев А. И. Гибрид черного и белого амурса на ранних этапах развития / А. И. Черномашенцев, Ю. Г. Семин, Г. И. Стрижкова // Рыбное хозяйство. — 1980. — № 10. — С. 37—38.
67. Черный амур как объект рыбного хозяйства и биологический мелиоратор // Руководство по биотехнике разведения и выращивания дальневосточных растительноядных рыб. — М., 2000. — С. 188—194.

REFERENCES

1. Amur chernyy (2001). Odomashnennaya forma. *Katalog porod, krossov i odomashnennykh form ryb Rossii i SNG*. Moskva, 172-176.
2. Baltadzhi, R. A., Ivanov, I. N., & Isaevich, V. V. (1976). Opyt polucheniya potomstva i vyrashchivaniya segoletkov chernogo amura v Mironovskom rybopitomnike. *Rybnoe khozyaystvo*, 23, 7-10.
3. Baltadzhi, R. A., Rud', N. P., & Shinder, L. N. (2006). Chernyy amur (*Mylopharyngodon piceus* (Richardson)) kak perspektivnyy ob'ekt ikhtiofauny Ukrainy. *Rybne hospodarstvo*, 65, 31-41.
4. Baltadzhi, R. A. (1978). Chernyy amur kak perspektivnyy ob'ekt rybovodstva vo vnutrennikh vodoemakh Ukrainy. *Respublikanskaya konferentsiya po akklimatizatsii i vnedreniyu novykh ob'ektov rybovodstva v vodoemakh Ukrainy : tezis dokladov*. Kiev, 48-52.
5. Bizyaev, I. N. (1966). Rezul'taty vseleniya amurov i tolstolobikov v otkrytye vodoemy Azovo-Kubanskogo rayona. *Rybkhozyaystvennoe osvoenie rastitel'noyadnykh ryb*. Moskva : Nauka, 49-59.
6. Vinogradov, V. K. (1993). Ob ispol'zovanii chernogo amura kak biologicheskogo melioratora vodoemov. *Prudovoe i ozernoe rybovodstvo*, 2-3, 21-22.
7. Voropaev, S. N. (1992). Morfo-biologicheskie osobennosti retsiproknykh gibridov chernogo i belogo amurov. *Sbornik nauchnykh trudov Vsesoyuznogo nauchno-issledovatel'skogo instituta prudovogo rybnogo khozyaystva*, 67, 69-78.
8. Voropaev, S. N. (1991). Opyt polucheniya retsiproknykh gibridov chernogo i belogo amurov. *Sbornik nauchnykh trudov Vsesoyuznogo nauchno-issledovatel'skogo instituta prudovogo rybnogo khozyaystva*, 61, 86-89.
9. Voropaev, S. N., Ilyasova, V. A., & Mel'chenkov, E. A. (1992). Osobennosti oogeneza chernogo amura. *Sbornik nauchnykh trudov Vsesoyuznogo nauchno-issledovatel'skogo instituta prudovogo rybnogo khozyaystva*, 66, 155-159.
10. Voropaev, S. N., Ilyasova, V. A., & Mel'chenkov, E. A. (1992). Osobennosti spermatogeneza chernogo amura. *Sbornik nauchnykh trudov Vsesoyuznogo nauchno-issledovatel'skogo instituta prudovogo rybnogo khozyaystva*, 67, 56-60.
11. Gorbach, E. I. (1961). Vozrastnoy sostav, rost i vozrast nastupleniya polovoy zrelosti belogo i chernogo amurov v bassejne reki Amura. *Voprosy ikhtiologii*, 1, 119-126.
12. Grusevich, V. V. (1995). Chernyy amur kak ob'ekt-biomeliorator dlya vodoemov-okhladiteley energosistem. Problemy ratsional'nogo ispol'zovaniya bioresursov vodokhranilishch : Mezhdunar. nauch. konf., 6-8 sent. 1995 g. : materialy. Kyiv, 100.
13. Dem'yanko, V. F., & Denisov, A. I. (1984). Biologicheskii meliorator. *Rybovodstvo i rybolovstvo*, 2, 3.
14. Dem'yanko, V. F., & Denisov, A. I. (1981). Perspektivy ispol'zovaniya chernogo amura v kachestve biologicheskogo. *IV s"ezd VGBO : tezis dokl*. Kyiv : Naukova dumka, 125-126.
15. Denisov, L. I. (1978). Proyavlenie khishchnichestva u chernogo amura. *Respublikanskaya konferentsiya po akklimatizatsii i vnedreniyu novykh ob'ektov rybovodstva v vodoemakh Ukrainy : tezis dokl*. Kiev, 47-48.

16. Dudarenko, L. S., Tarazevich, E. V., & Sazanov, V. B. (2002). K voprosu izucheniya vozmozhnosti zimovki chernogo amura v vodoemakh Belarusi. *Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi*, 21, 56-59.
17. Evtushenko, N. Yu., Potrokhov, A. S., & Zin'kovskiy, O. G. (1998). Nekotorye aspekty razvedeniya chernogo amura v vodoemakh Ukrainy. *Tavriys'kiy naukoviy visnyk*, 7, 160-167.
18. Evtushenko, N. Yu., Potrokhov, A. S., & Zin'kovskiy, O. G. (1997). Perspektivy razvedeniya chernogo amura v lesostepnoy zone Ukrainy. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 2, 33-41.
19. Evtushenko, N. Yu., Potrokhov, A. S., & Zin'kovskiy, O. G. (1993). Chernyy amur kak ob"ekt akklimatizatsii (obzor). *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 3, 49-56.
20. Eremeeva, E. F. (1951). Chernyy amur kak ob"ekt akklimatizatsii. *Trudy Instituta morfologii zhivotnykh im. A. N. Severtsova*, 5, 32.
21. Ivanov, S. N. (1964). Chernyy amur i tolstolobik v yuzhnoy chasti Aral'skogo morya. *Akklimatizatsiya ryb i kormovykh organizmov v moryakh SSSR : sbornik nauchnykh trudov VNIRO*, 55, 2, 196-198.
22. Sazanov, V. B., Tarazevich, E. V., & Alekseeva, A. A. et al. (2006). Invazirovannost' chernogo amura metatserkariyami trematod *P. diplostomum* v usloviyakh prudovykh khozyaystv Belarusi. *Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi*, 22, 156-160.
23. Konradt, A. G., & Mukhamedova, A. F. (1974). Perspektivy vseleniya chernogo amura v Tsimlyanskoe vodokhranilishche. *Rybokhozyaystvennoe izuchenie vnutrennikh vodoemov : sbornik GosNIORKh*, 12, 43-45.
24. Konchits, V. V., & Sazanov, V. B. (2010). *Biologicheskie osnovy vyrashchivaniya chernogo amura v usloviyakh Belarusi*. Minsk : Institut rybnogo khozyaystva.
25. Konchits, V. V., & Sazanov, V. B. (2010). Vliyanie dvukhletkov chernogo amura na dinamiku razvitiya mollyuskov v prudovykh khozyaystvakh Belarusi. *Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi*, 26, 80-88.
26. Konchits, V. V., & Sazanov, V. B. (2009). Rybovodno-biologicheskaya kharakteristika vyrashchivaniya dvukhletkov i trekhletkov chernogo amura v usloviyakh Belarusi. *Rybne hospodarstvo*, 67, 106-112.
27. Konchits, V. V., & Sazanov, V. B. (2009). Tekhnologicheskie aspekty vyrashchivaniya segoletkov chernogo amura v usloviyakh Belarusi. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 64-69.
28. Konchits, V. V., & Sazanov, V. B. (2010). Tekhnologiya vyrashchivaniya chernogo amura v polikul'ture prudovogo rybovodstva Belarusi. *Biologicheskie osnovy vyrashchivaniya chernogo amura v usloviyakh Belarusi*. Minsk : Institut rybnogo khozyaystva, 107-125.
29. Konchits, V. V., & Sazanov, V. B. (2010). Kharakteristika pitaniya dvukhletkov chernogo amura, vyrashchivaemogo v usloviyakh prudovykh khozyaystv Belarusi. *Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi*, 26, 71-79.
30. Konchits, V. V., & Sazanov, V. B. (2010). Kharakteristika pitaniya lichinok i segoletkov chernogo amura, vyrashchivaemogo v usloviyakh prudovykh khozyaystv Belarusi. *Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi*, 26, 57-70.
31. Konchits, V. V., & Sazanov, V. B. (2011). Kharakteristika pitaniya trekhletkov chernogo amura, vyrashchivaemykh v vodoemakh Belarusi. *Akvakul'tura Evropy i Azii: realii i perspektivy razvitiya i sotrudnichestva : Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Ulan-Ude, oz. Baykal, 1-7 avg. 2011 g. : mater. Tyumen' : Gosrybtsentr*, 86-88.
32. Korenev, A. V. (1984). K voprosu o perspektivnosti chernogo amura kak biomelioratora vodoemov-okhladiteley, naselennykh dreysseyon, i o kormovoy

- tsennosti etogo mollyuska. *Metody intensifikatsii prudovogo rybovodstva : Vsesoyuz. konf. molodykh uchenykh : tezisy dokl.* Moskva, 34-35.
33. Korenev, A. V. (1985). O zapasakh, raspredelenii i razmernoy kharakteristike dreyssey v Mironovskom vodokhranilishche v svyazi s predpolagaemym vseleniem v nego chernogo amura. *Rybnoe khozyaystvo*, 39, 54-57.
 34. Zhemaeva, N. P., Badaeva, I. Yu., & Kulikova, L. V. et al. (2002). Kormovaya baza i pitanie segoletkov chernogo amura pri vyrashchivani v polikul'ture. *Problemy akvakul'tury i funktsionirovaniya vodnykh ekosistem : Mezhdunar. nauchno-prakt. konf. molodykh uchenykh*, 25-28 fevr. 2002 g., Kiev : mater. Kiev, 22-23.
 35. Kostousov, V. G., Tarazevich, E. V., & Sazanov, V. B. (2007). Opyt ispol'zovaniya chernogo amura dlya podavleniya ochagov shistosomnogo tserkarioza. *Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi*, 23, 20-31.
 36. Krepis, O. I., Mikhal'chenko, M. M., & Kanchtsur A. I. (1980). Rost i pitanie chernogo amura v opytnykh prudakh zoostantsii na baze Moldavskoy GRES. *Kompleksnoe ispol'zovanie vodoemov Moldavii*. Kishinev : AN MSSR, 52-55.
 37. Kubrak, I., & Krepis O. (1980). Perspektivy vseleniya chernogo amura vodoem-okhladitel' Moldavskoy GRES. *Itogi i perspektivy akklimatizatsii ryb i bespozvonochnykh v vodoemakh SSSR*. Moskva, 64-65.
 38. Lindberg, G. U. (1949). Chernyy amur. *Promyslovye ryby SSSR*. Moskva, 330-331.
 39. Mamontov, V. A., & Gamygin, E. A. (1997). Novyy startovyy kombikorm dlya chernogo amura. *Pervyy kongress ikhtologov Rossii : tezisy dokl.* Moskva, 333.
 40. Markova, E. V. (1964). Chernyy amur v Aral'skom more. *Rybovodstvo i rybolovstvo*, 1, 15.
 41. Balan, A. I., Baltadzhi, R. A., Prihod'ko, V. A., & Ivanov, I. N. (1976). *Metodicheskie rekomendatsii po biotekhnike razvedeniya i vyrashchivaniya chernogo amura*. Kherson : Glavnoe upravlenie rybnogo khozyaystva vnutrennikh vodoemov USSR; Ukrainskiy nauchno-issledovatel'skiy institut rybnogo khozyaystva.
 42. Movchan, Yu. V. (2011). Chornyi amur skhidnoaziatskiy — *Mylopharyngodon piceus* (Richardson, 1846). *Ryby Ukrainy : vyznachnyk-dovidnyk*. Kyiv : Zoolohichnyi muzei NANU, 125.
 43. Motenkova, L. G. (1970). Pitanie lichinok chernogo amura. *Sbornik nauchno-issledovatel'skikh rabot Vsesoyuznogo nauchno-issledovatel'skogo instituta prudovogo rybnogo khozyaystva*, 3, 205-213.
 44. Mukhamedova, A. F., Aksenov, S. V., & Shapovalov, N. P. (1989). Chernyy amur v Tsimlyanskom vodokhranilishche. *Sbornik nauchnykh trudov Gosudarstvennogo nauchno-issledovatel'skogo instituta ozernogo i rechnogo rybnogo khozyaystva*, 301, 149-156.
 45. Panov, D. A., & Kalmykov, L. V. (2001). Opyt podrashchivaniya chernogo amura i gibrida tolstolobikov v prudakh rybovodnogo khozyaystva Ryazanskoy GRES. *Problemy i perspektivy razvitiya akvakul'tury v Rossii : nauch.-prakt. konf.*, Adler, 24-27 sent. 2001 g. : mater. dokl. Krasnodar : KrasNIIRKh, 218-219.
 46. Konchits, V. V., Tarazevich, E. V., & Sazanov V. B. et al. (2005). Parazitofauna chernogo amura, vyrashchivaemogo v prudovykh khozyaystvakh respublik Belarus'. *Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi*, 21, 60-62.
 47. Potrokhov, O. S., Zinkovskiy, O. H., & Yevtushenko, M. Yu. (2000). *Sposib otrymannia statevykh produktiv chornoho amura ta roslynoidnykh ryb*. Patent of Ukraine № 30097.
 48. Zinkovskiy, O. H., Potrokhov, O. S., & Yevtushenko, M. Yu. (2001). *Sposib otrymannia statevykh produktiv chornoho amura*. Patent of Ukraine № 32789.

49. Prikhod'ko, V. A., Fin'ko, V. A., & Shmygin, A. (1974). Poluchenie potomstva chernogo amura. *Rybovodstvo i rybolovstvo*, 6, 17.
50. Prikhod'ko, V. A., Fin'ko, V. A., & Sherman, I. M. et al. (1975). Razvedenie i vyrashchivanie chernogo amura v prudakh yuga Ukrainy. *Rybnoe khozyaystvo*, 20, 13-15.
51. *Rukovodstvo po biotekhnike razvedeniya i vyrashchivaniya dal'nevostochnykh rastitel'noyadnykh ryb* (2000). Moskva.
52. Savina, R. A. (1975). Vyrashchivanie chernogo amura v prudakh. *Sbornik nauchnykh trudov Vsesoyuznogo nauchno-issledovatel'skogo instituta prudovogo rybnogo khozyaystva*, 15, 77-87.
53. Sazanov, V. B. (2008). Obosnovanie tekhnologicheskikh elementov vyrashchivaniya chernogo amura v polikulture prudovogo rybovodstva Belarusi. *Extended abstract of candidate's thesis*. Zhodino.
54. Sazanov, V. B. (2004). Pervye rezul'taty akklimatizatsii chernogo amura v vodoemakh Respubliki Belarus'. *Rybne hospodarstvo*, 63, 194-198.
55. Sazanov, V. B. (2005). Chernyy amur - novyy perspektivnyy ob'ekt akvakul'tury Belarusi. *Akvakul'tura i integrirovannye tekhnologii: problemy i vozmozhnosti*. (Vol. 1-3). Moskva, 326-329.
56. Sazanov, V. B. (2006). Chernyy amur v Belarusi. *Vesti Natsyanal'nay akademii nauk Belarusi*, 5, 185-187.
57. Soin, S. G., & Sukhanova, A. I. (1972). Sravnitel'no-morfologicheskii analiz razvitiya belogo i chernogo amurov, belogo i pestrogo tolstolobikov. *Voprosy ikhtiologii*, 1, 72-83.
58. Sukhanova, A. I. (1969). Osobennosti razvitiya belogo i chernogo amurov, belogo i pestrogo tolstolobikov v svyazi s ikh iskusstvennym razvedeniem v Turkmenii. *Extended abstract of candidate's thesis*. Ashkhabad.
59. Sukhanova, A. I. (1967). Razvitie chernogo amura. *Voprosy ikhtiologii*, 4, 618-625.
60. Ponomarev, S. V., Lagutkina, L. Yu., & Ponomareva, E. N. et al. (2008). Tekhnologiya vyrashchivaniya chernogo amura v prudakh. *Tekhnologii fermerskogo rybovodstva*. Astrakhan', 46-49.
61. Tekhnologiya proizvodstva posadochnogo materiala chernogo amura (2001). *Sbornik nauchno-tekhnologicheskoy i metodicheskoy dokumentatsii po akvakul'ture*. Moskva : VNIRO, 70-80.
62. *Tekhnologiya razvedeniya i vyrashchivaniya chernogo amura* (1990). Moskva : VNIIPRKh.
63. Tekhnolohiia vidtvorennia ta utrymannia chornoho amura (2006). *Tekhnolohii vyrobnytstva ob'ektiv akvakul'tury*. Kyiv, 58-73.
64. Hrusevych, V. V., Vovk, P. S., & Yevtushenko, M. Yu. (1996). *Tekhnolohiia vidtvorennia chornoho amura v vodoimakh Ukrainy*. Kyiv.
65. Fin'ko, V. A., & Chernienko, G. A. (1981). *Zimovka chernogo amura v prudakh. Kompleksnoe ispol'zovanie vodoemov Moldavii*. Kishinev, 66-69.
66. Chernomashentsev, A. I., Semin, Yu. G., & Strizhkova, G. I. (1980). Gibrid chernogo i belogo amura na rannikh etapakh razvitiya. *Rybnoe khozyaystvo*, 10, 37-38.
67. Chernyy amur kak ob'ekt rybnogo khozyaystva i biologicheskii meliorator (2000). *Rukovodstvo po biotekhnike razvedeniya i vyrashchivaniya dal'nevostochnykh rastitel'noyadnykh ryb*. Moskva, 188-194.

**ЧЕРНИЙ АМУР (MYLOPHARYNGODON PICEUS RICHARDSON).
ТЕМАТИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ**

І. Й. Грициняк, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, г. Київ
Т. М. Швець, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, г. Київ

Цель. Составление справочного библиографического перечня украинско- и русскоязычных публикаций по вопросам экологии, биологии, селекции и разведения в условиях рыбоводных хозяйств Украины и ближнего зарубежья представителя дальневосточного фаунистического ихтиокомплекса — черного амура (*Mylopharyngodon piceus* Richardson), а также возможности его интродукции в водоемы с биомелиоративной целью.

Методика. В процессе подготовки тематического списка, в ходе системного поиска были применены целостный и выборочный методы. Библиографическое ядро составляли литературные источники из фонда научной библиотеки Института рыбного хозяйства НААН.

Результаты. Сформирован тематический библиографический перечень публикаций в количестве 67 источников, охватывающих временной интервал с 1949 по 2011 гг., и включающих характеристику представителя семейства карповых рыб — черного амура. Литературные источники размещены в алфавитном порядке по автору или названию, описаны согласно ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», а также в соответствии с требованиями к оформлению списка литературы по международному стандарту APA style.

Практическая значимость. Подготовленный перечень может быть полезным для ученых, практиков, студентов, сфера интересов которых касается вопросов культивирования и исследования биологических особенностей черного амура.

Ключевые слова: черный амур, акклиматизация, разведение, питание, выращивание.

**BLACK CARP (MYLOPHARYNGODON PICEUS, RICHARDSON).
THEMATIC BIBLIOGRAPHY**

I. Hrytsyniak, library@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
T. Shvets, library@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Creating a thematic bibliographic list of publications in Ukrainian and Russian, dedicated to the ecology, biology, selection and cultivation of such Far East fish fauna species as black carp (*Mylopharyngodon piceus* Richardson) in conditions of fish farms of Ukraine and neighboring countries, as well as the possibility of its introduction into water bodies for bioameliorative purpose.

Methodology. The complete and selective methods were applied in the process of the systematic search. The bibliographic core has been formed with the literature from the fund of the scientific library of the Institute of Fisheries NAAS.

Findings. There was composed a thematic list of publications with a total quantity of 67 sources, containing characteristics of black carp as representative of cyprinids, which is very important species from the point of view of aquaculture. This bibliography covers the time period from 1949 till 2011. The literary sources were arranged in alphabetical order by author or title, and described according to DSTU 7.1:2006 «System of standards on information, librarianship and publishing. Bibliographic entry. Bibliographic description. General requirements and rules», as well as in accordance with the requirements of APA style — international standard of references.

Practical value. The list may be useful for scientists, practitioners, students, whose area of interests covers the questions of breeding and study of the biological features of black carp.

Keywords: black carp, acclimatization, cultivation, nutrition, rearing.

ЮВІЛЕЇ

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ. ДВОРЕЦЬКОМУ АНАТОЛІЮ ІВАНОВИЧУ — 80

Анатолій Іванович Дворецький народився 1 січня 1937 р. у квітучому Приоріллі, в старовинному козацькому селі Дмухайлівка Магдалинівського району Дніпропетровської області. У 1954 р., після закінчення середньої школи, він вступив до Харківського ветеринарного інституту, де проявив жвавий інтерес до наукової роботи. Перші його дослідження з вивчення стану артеріальних та венозних судин серця тварин методом рентгенодіагностики були проведені під керівництвом видатного ученого і спеціаліста у галузі діагностики і терапії тварин, завідувача

кафедри клінічної діагностики з рентгенологією проф. Соколовського В. А. Під час проходження виробничої практики, під керівництвом завідувача кафедри патологічної анатомії і патологічної фізіології проф. Толстово-Парійської Н. Г., були проведені дослідження з терапії хвороб очей тварин.

Після закінчення у 1959 р. Харківського ветеринарного інституту, А. І. Дворецький починає працювати на Дніпропетровській біофабриці (завідувачем відділу цеху, завідувачем біохімічної лабораторії), де бере активну участь у розробленні нової біотехнології виробництва ліофільно висушених вакцин для профілактики хвороб тварин. Результати цієї роботи викладені у першій його друкованій роботі «Твёрдая казеиново-кровяная среда для определения концентрации живых пастерелл / А. И. Дворецкий. В. П. Меркулов, А. В. Эпштейн // 2-й сборник работ по вопросам производства и применения биопрепаратов. — М., 1965.

В подальшому, інтерес до наукової діяльності приводить його у 1964 році до аспірантури Дніпропетровського університету. Більш ніж півстоліття діяльність Анатолія Івановича була пов'язана з Дніпропетровським університетом. Тут він виконав і захистив кандидатську (1969 р.), докторську (1987 р.) дисертації; йому було присвоєне вчене звання професора (1989 р). Тут він пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри іхтіології, гідробіології і екології. За значні досягнення у науково-педагогічній діяльності у 1970 році він був нагороджений медаллю «За доблестный труд».

У 1974 році А. І. Дворецького було призначено заступником директора з наукової роботи НДІ біології. У 1977 році керівництво Дніпропетровської області

призначило його головним керівником наукового супроводу створення та функціонування садково-басейнових господарств області. Створення господарств такого типу розпочалося у відповідності до рішення 1976 року про подальший розвиток ставового рибиництва та заснування в області нового напрямку рибиництва індустріального типу і будівництва в області чотирьох індустріальних (садково-басейнових) господарств: на підігрітих водах Придніпровської ДРЕС (Придніпровське господарство), Криворізької ДРЕС-2 (Зеленодольське) та рибиницьких господарств: Дніпродзержинського і Нікопольського. У травні 1977 року А. І. Дворецьким, завідувачкою лабораторії ставкового рибиництва НДІ біології О. М. Чапліною та директором Інституту гідробіології АН УРСР В. Д. Романенком була розроблена комплексна програма науково-дослідних робіт з розвитку рибних господарств індустріального типу у Дніпропетровській області. Для виконання цієї програми, за керівництва А. І. Дворецького, був створений творчий колектив із наукових співробітників, проєктантів, технологів. У червні 1977 р. представниками творчого колективу, у взаємодії з установами АН України, була проведена комплексна науково-дослідна експедиція на водоймах Придніпров'я, результати якої лягли в основу рекомендацій зі створення Придніпровського садково-басейнового господарства. За короткий період (1978 р.) було споруджено унікальне Придніпровське індустріальне тепловodne рибне господарство, де за використання теплої скидної води Придніпровської ДРЕС з весни до осені повинно було вирощуватися 1200 т коропа (360 т — в басейнах і 840 т — в садках); а в зимовий період — 700 т товарної форелі. В 1979 році розпочалась його промислова експлуатація; в басейнах було отримано 61 т товарного коропа. А в 1981 році вже було отримано 416 т риби; тобто проєктний рівень було перевищено на 56 т. Розроблені технології індустріального вирощування риби дозволили довести рибопродуктивність басейнів під час вирощування товарних дволіток коропа до 250 кг/м²; райдужної форелі — до 120 кг/м². Необхідність стабільного забезпечення Придніпровського господарства кормами зумовила звернення А. І. Дворецького до Дніпропетровської обласної ради щодо закупівлі найкращого у світі японського рибного комбікормового заводу та початок виробництва в області повноцінних гранульованих рибних кормів за японською технологією. За результатами комплексних науково-дослідних і науково-практичних робіт науковців Дніпропетровщини та науково-дослідних установ України було створено одне з кращих в Європі Придніпровське тепловodne садково-басейнове господарство, а у рибному господарстві області був створений новий напрям — індустріальне рибиництво, розроблені нові технології вирощування коропа, форелі, канального сома та інші. Підготовлено та захищено 7 кандидатських дисертацій.

Разом зі своїми співробітниками, А. І. Дворецький розробив основи системного підходу до вивчення наслідків радіоактивного і хімічного забруднення водних екосистем, вивчав шляхи надходження радіонуклідів і хімічних полутантів у живі організми і оцінив їх внесок у формування радіаційно-хімічного навантаження, виявив радіобіологічні ефекти на клітинному рівні, що зумовлені порушенням фізико-хімічних особливостей мембран і систем трансмембранного переносу іонів в клітинах, запропонував оригінальні підходи до вивчення хеморецептивних властивостей мембран, вказав на пострадіаційне відновлення їх рецепторних функцій завдяки модуляції енергетики клітини,

запропонував нові підходи у використанні біологічно-активних профілактичних і лікувальних препаратів.

Дворецький А. І. бере активну участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації, є науковим керівником та консультантом аспірантів та докторантів. За його керівництва була виконана і виконується зараз значна кількість кандидатських та докторських дисертацій. Він систематично виступає офіційним опонентом при захисті кандидатських і докторських дисертацій.

Вагомий внесок у підготовці рибогосподарських кадрів зробив він, будучи членом спецрад: Московського державного університету (Росія) Д.053.74, Інституту гідробіології НАН України Д.26.213.01, Інституту рибного господарства НААН К.26.364.01, а також членом редколегій: журналу «Рибне господарство України», «Рибогосподарська наука України», Вісника ДНУ (Біологія. Екологія), наукового збірника «Рибне господарство» Інституту рибного господарства УААН.

Від 1991 р. — віце-президент Радіобіологічного товариства України. Від 1993 р. — академік УЕАН. У 1994 р. отримав почесне звання «Соросівський професор».

У 1988 р. за наукову роботу «Изучение действия ионизирующей радиации на энергетические и регуляторно-транспортные функции биомембран» йому присуджена Премія Державного комітету СРСР з народної освіти. У 1996 р. — за серію праць «Вивчення механізмів променевого порушення іонного гомеостазу в клітинах тваринного організму» Президія Національної академії наук України присудила премію ім. О. В. Палладіна.

В 1998 році за вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців, плідну наукову і педагогічну діяльність Указом Президента України присвоєно почесне звання — «Заслужений діяч науки і техніки України». Є керівником обласних відділень Гідробіологічного та Радіобіологічного товариств, міжрегіональної неурядової екологічної організації «Світ води». Організатор проведення на базі Дніпропетровського державного університету 1-го та 2-го радіобіологічних з'їздів України.

У 2011 р. А. І. Дворецький був запрошений до Дніпропетровського аграрного університету, де організував та завідував кафедрою водних біоресурсів та аквакультури. Автор понад 400 наукових праць, у тому числі 4 монографій, 2 довідників, 8 навчальних посібників, 4 винаходів, які захищені авторськими свідоцтвами.

З 2014 р. генерал-осавул А. І. Дворецький є радником з питань гідроекології та рибництва Головного отамана ДОГО Січеславського козацтва Запорізького.

Бере активну участь у створенні та удосконаленні організаційного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу у ВЗО України, будучи членом НМК МОНУ за напрямом «Водні біоресурси» та членом експертної ради з природничих наук Державної акредитаційної комісії України.

Розробив навчальні програми курсів: «Вступ до спеціальності», «Радіобіологія», «Водна радіоекологія», «Водна токсикологія», «Охорона вод суші», «Методологія та організація наукових досліджень», «Основи екологічної

токсикології», «Хімія та мікробіологія води» та магістерські курси: «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі», «Охорона та раціональне використання водних ресурсів», «Сучасні проблеми гідробіології» та інші.

Діяльність Дворецького А. І. відома за кордоном: опублікував понад 100 наукових праць у міжнародних виданнях.

Активний член Гідроекологічного товариства України. Європейського радіобіологічного товариства, Міжнародного радіоекологічного союзу, Європейської біоелектромагнітної асоціації, перебував у службових відрядженнях в Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Угорщині, Китаї.

За його керівництва були розроблені, виконувались і виконуються науково-технічні програми: «Про розвиток і впровадження наукових розробок щодо підвищення рибопродуктивності садково-басейнових господарств в Дніпропетровській області» (1977–1985 рр.), «Програма розвитку рибного господарства Дніпропетровської області 2010–2014 рр.» та інші.

Колектив Інституту рибного господарства НААН та Дніпровського державного аграрно-економічного університету бажають шановному ювіляру подальших успіхів, міцного здоров'я, натхнення в його ділах і всього найкращого.

О. О. Олексієнко, канд. с.-г. наук, с. н. с.

Н. Л. Колесник, канд. с.-г. наук, с. н. с.

Л. А. Байдак, канд. іст. наук, н. с.

З МІЖНАРОДНИМ ЖІНОЧИМ ДНЕМ!

*З ледь відчутним весняним
подихом приходить до нас чудове
жіноче свято — 8 Березня. Цей
день несе у світ ніжність і красу.*

*Адже усе найдорожче, що є у нашому житті — щастя,
радість, надія, кохання — пов'язане з жінкою. Без вас, дорогі
жінки, не було б стільки світла, любові й тепла. Ви
наповнюєте будні яскравими фарбами, спонукаєте до
шляхетних вчинків і добрих справ. Нехай вас ніколи не
омінає турбота чоловіків, а прекрасні почуття дарують
натхнення для нових творчих успіхів і життєвих перемог.
Будьте коханими і кохайте, а ми, чоловіки, робитимемо все,
аби ви почувалися щасливими.*

FISHERIES SCIENCE OF UKRAINE

"Fisheries Science of Ukraine" — a scientific journal, has been published in Ukraine since 2007. "Fisheries Science of Ukraine" included in the List of Specialized Publications of Ukraine, which can be used for publishing results of doctor's and candidate's thesis (biological and agricultural sciences), was approved in 08.07.2009, recertification of 06.11.2014 (Ministry of Education and Science of Ukraine №1279)

Founder and publisher of the journal — Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

State registration certificate KB № 20934-10734 PR of 18.08.2014

EDITOR-IN-CHIEF

Ihor Hrytsyniak, Doctor of Sciences, Professor, Academician of the NAAS of Ukraine, Director, Institute of Fisheries of the NAAS

DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF

Oleksandr Tretiak, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Deputy Director in scientific works, Institute of Fisheries of the NAAS

Natalia Kolesnyk, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of International Scientific and Technical Cooperation and Intellectual Property, Institute of Fisheries of the NAAS

EDITORIAL BOARD

BIOLOGICAL SCIENCES

Boris Gomelsky, Doctor of Biological Sciences, Professor, Kentucky State University, UNITED STATES OF AMERICA

Daniel Patrick, Doctor of Biological Sciences, Head of Biology Department Laboratories of the Pyrenees and Landes, FRENCH REPUBLIC

Gautam V. Zodape, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Zoology of Shivaji University Kolhapur, REPUBLIC OF INDIA

Vasyl Sondak, Doctor of Sciences, Head of "Water Bioresources", National University of Water Management and Natural Resources, UKRAINE

Oleksandr Litvinenko, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director General, Federal State Unitary Enterprise "Gosrybtsentr", RUSSIA

Oleksandr Potrokhov, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Biology of reproduction of fish, Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, UKRAINE

Leonid Buchatskyi, Doctor of Sciences, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Leading Research Scientist of the Laboratory of Biotechnologies in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Ihor Buzevych, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Valentyna Solomatina, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Leading research scientist of the department of feeds and fish feeding, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

AGRICULTURAL SCIENCES

XU Pao, Doctor, Professor, Director of Freshwater Fisheries Research Center, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Jedrzey Krupinski, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director, National Research Institute of Animal Production, POLAND

Mykhailo Efymenko, Doctor of Sciences, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head Research Scientist, Institute of Animal Breeding and Genetics of the NAAS, UKRAINE

Serhiy Tarasiuk, Doctor of Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head of the Molecular-Genetic Research Department, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Ryszard Kolman, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Ichthyology Department, The Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute in Olsztyn, POLAND

Vitaliy Bekh, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Fish Selection, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Isaak Sherman, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Aquaculture Department, Kherson State Agrarian University, UKRAINE

Oleksandr Kostenko, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Veterinary Medicine and Zootechnics Department, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, UKRAINE

SCIENTIFIC EDITORS OF SECTIONS

are staff employees of the Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine: **Natalia Tushnytska**, PhD, Senior Research Scientist, Scientific Secretary of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Deren**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Feeds and Fish Feeding of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yaroslav Tuchapskyi**, PhD, Head of the Carp Breeding Laboratory of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Zaloilo**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Molecular-Genetic Studies of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Zabytyvskyi**, PhD, Senior Research Scientist of Section of Sturgeon of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Anatoliy Melnyk**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Ecological Investigation of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Antonina Mruk**, Head of the Laboratory Salmonids Culture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Tetiana Hryhorenko**, PhD, Head of the Laboratory of Hydrobiology and Technology of Invertebrates Cultivation of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Rud'**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Bio-technology in Aquaculture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Natalia Matvienko**, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Ichthyopathology of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Oleksandr Didenko**, PhD, Senior Research Scientist of the Department of Study Reservoirs Bioresources of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Viktor Chernik**, Head of the Laboratory of Management in Aquaculture of the Institute of Fisheries of the NAAS

Editorial board of the Journal "Fisheries Science of Ukraine", Institute of Fisheries NAAS, 135, Obukhivska St, Kiev-164, Ukraine, 03164; tel.: +38 (044) 223-84-34; tel/fax: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Layout design: Natalia Kolesnik, Serhiy Shinkar, Oleksandr Bezusyi; **Making-up:** Maria Simon, Yevheniy Arkhanhelskyi;

Literature editing: Oleksandr Oleksiienko, Tetiana Shvets; **Correctors:** Inna Liutkevych; **Typing:** Hanna Kovalchuk

ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НААН
вул. Обухівська, 135 м. Київ-164, 03164, Україна
тел.: +38(044) 223-84-34, тел./факс: +38(044) 423-74-62

<http://fsu.ua>

info@fsu.ua