ISSN 2312-9581 (Online)

ISSN 2075-1508 (Print)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

2 / 2017

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські науки), переатестація від 06.11.2014 (наказ Міністерства освіти і науки України №1279)

Засновник та видавник — Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20934-10734 ПР від 18.08.2014

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ГРИЦІНЯК Ігор Іванович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, директор Інституту рибного господарства НААН

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ТРЕТЯК Олександр Михайлович, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН

КОЛЕСНИК Наталія Леонідівна, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності, Інститут рибного господарства НААН

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Гомельський Борис, доктор біол. наук, професор, Державний Університет Кентуккі, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Патрік Даніель, доктор біол. наук, Голова департаменту біології Лабораторії Піренеїв, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА

Зодапе Гаутам В., доктор біол. наук, професор, декан факультету зоології Державного Університету Шиваджи в Колхатурі, РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ

Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, зав. кафедрою водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА

Литвиненко Олександр Іванович, доктор біол. наук, іноземний член Національної академії аграрних наук України, генеральний директор, Федеральне державне унітарне підприємство «Госрыбцентр», РОСІЯ

Потрохов Олександр Спиридонович, доктор біол. наук, с.н.с., керівник лабораторії біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, УКРАЇНА

Бучацький Леонід Петрович, доктор біол. наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), провідний науковий співробітник лабораторії біотехнологій в рибицтві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Бұзевіч Ігор Юрійович, доктор біол. наук, с.н.с., завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Соломатіна Валентина Дмитрівна, доктор біол. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник відділу кормів та годівлі риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Ху Пао, доктор наук, професор, директор Центру прісноводного рибного господарства, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

Крупінський Єджей, доктор наук, професор, іноземний член Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут зоотехнії Польщі, ПОЛЬЩА

Єфименко Михайло Якович, доктор с.-г. наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник, Інститут розведення і генетики тварин НААН, УКРАЇНА

Тарасюк Сергій Іванович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, зав. відділу молекулярно-генетичних досліджень, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Кольман Ришард, доктор наук, професор, зав. відділу іхтіології, Інститут прісноводного рибного господарства ім. Станіслава Саковича, ПОЛЬЩА

Бех Віталій Валерійович, доктор с.-г. наук, професор, зав. відділу селекції риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Шерман Ісаак Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедри рибицтва, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

Костенко Олександр Іванович, канд. с.-г. наук, с.н.с., нач. відділу ветеринарної медицини та зоотехнії, Національна академія аграрних наук України, УКРАЇНА

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

є штатними працівниками Інституту рибного господарства НААН України: **Тушницька Наталія Йосифівна**, канд. ветерин. наук, с.н.с., вчений секретар ІРГ НААН; **Дерень Ольга Володимирівна**, канд. с.-г. наук, с.н.с., зав. лабораторії кормів і годівлі риб ІРГ НААН; **Тучапський Ярослав Васильович**, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу селекції риб ІРГ НААН; **Залоїло Ольга Василівна**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ІРГ НААН; **Забитівський Юрій Михайлович**, канд. біол. наук, старший науковий співробітник сектору осетрівництва ІРГ НААН; **Мельник Анатолій Пилипович**, канд. хім. наук, с.н.с., зав. лабораторії екологічних досліджень ІРГ НААН; **Мрук Антоніна Іванівна**, зав. лабораторії лососівництва ІРГ НААН; **Григоренко Тетяна Володимирівна**, канд. с.-г. наук, зав. лабораторії гідробіології та технологій культивування цінних безхребетних ІРГ НААН; **Рудь Юрій Петрович**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії біотехнологій в рибицтві ІРГ НААН; **Матвієнко Наталія Миколаївна**, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу іхтіопатології ІРГ НААН; **Діденко Олександр Володимирович**, канд. біол. наук, с.н.с., старший науковий співробітник відділу вивчення біоресурсів водосховищ; **Чернік Віктор Васильович**, зав. лабораторії менеджменту в рибицтві ІРГ НААН

Редакція журналу «Рибогосподарська наука України», вул. Обухівська, 135, м. Київ-164, 03164

тел.: +38 (044) 223-84-34, тел./факс: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Підписано до друку 15.03.2017 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 7,1. Наклад 500 прим.

Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту рибного господарства НААН (Протокол №3 від 27 червня 2017 р.)

Дизайн макету: Колесник Н. Л., Шинкар С. В., Безусий О. Л. **Верстка:** Симон М. Ю., Архангельський Є. Ю. **Літературне редагування:** Олексієнко О. О., Швець Т. М. **Коректори:** Люткевич І. С. **Комп'ютерний набір:** Ковальчук Г. В.

Друкарня ТОВ «Наш Формат», пр-т Миру, 7, м. Київ, 02105, тел.: +38 (044) 353-85-58

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

2/2017(40)

Заснований у 2007 р.
Виходить 4 рази на рік

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 1-148
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02>

З М І С Т

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 5-28
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.003>

*А. В. Ляшенко, К. Є. Зоріна-Сахарова, Ю. М. Воліков, В. В. Маковський,
Ю. М. Ситник, Н. Л. Колесник*

Макрофауна безхребетних ставка Теремківський-3 (р. Нивка) 5

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 29-38
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.029>

П. В. Шекк, М. І. Бургаз

Зменшення органічного забруднення мілководних акваторій
солонуватоводних лиманів при вирощуванні риб в садках в полікультурі... 29

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 39-48
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.039>

П. Д. Мендришора, Г. А. Куріненко

Характеристика 3-річних плідників райдужної форелі, вирощених в
умовах індустріального господарства «Слобода Банилів» 39

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 49-59
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.049>

П. В. Шекк, Ю. О. Астафуров

Вплив складу раціону і умов вирощування на прояви канібалізму
у східної прісноводної креветки *Macrobrachium nipponense*
(De Naan, 1849) 49

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 60-67
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.060>

В. Г. Спиридонов

Розроблення методики ДНК-ідентифікації осетрових видів риб з
використанням полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі 60

© Інститут рибного господарства НААН України, 2017

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 68-77

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.068>

К. Н. Гейна, М. С. Козий

Динамічність мікроструктури мезонефросу ляща (*Abramis brama* Linnaeus, 1758) Дніпровсько-Бузької гирлової системи у зв'язку з

нерестовою міграцією 68

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 78-98

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.078>

І. І. Грициняк, М. Ю. Симон

Особливості гемопоєзу у осетрових видів риб (*Acipenseridae*) (огляд) 78

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 99-113

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.099>

І. С. Кононенко

Розроблення кріозахисних середовищ для низькотемпературного заморожування сперми стерляді (*Acipenser ruthenus*)..... 99

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 114-145

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.114>

О. О. Батуревич

Перспективи застосування в рибництві мінералів природного походження відповідно до оцінки їх фізико-хімічних властивостей та ефективності використання в тваринництві (огляд)..... 114

ХРОНІКА

Вчений іхтіолог-рибовод до 90-ї річниці від дня народження

Харитонові Наталії Миколаївни 146

СОДЕРЖАНИЕ

БИОРЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ ВОДОЕМОВ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 5-28

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.003>А. В. Ляшенко, К. Е. Зорина-Сахарова, Ю. М. Воликов, В. В. Маковский, Ю. М. Сытник,
Н. Л. Колесник

Макрофауна беспозвоночных пруда Теремковский-3 (р. Нивка) 5

ТЕХНОЛОГИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 29-38

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.029>

П. В. Шекк, М. И. Бургаз

Уменьшение органического загрязнения мелководных акваторий солоноватоводных лиманов
при выращивании рыб в садках в поликультуре 29

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 39-48

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.039>

П. Д. Мендришора, А. А. Куриненко

Характеристика 3-летних производителей радужной форели, выращенных в условиях
индустриального хозяйства «Слобода Банилов» 39

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 49-59

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.049>

П. В. Шекк, Ю. О. Астафуров

Влияние состава рациона и условий выращивания на проявление каннибализма у восточной
пресноводной креветки (*Macrobrachium nipponense* De Haan, 1849) 49

СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 60-67

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.060>

В. Г. Спиридонов

Разработка методики ДНК-идентификации осетровых видов рыб с использованием полимеразной
цепной реакции в реальном времени 60

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 68-77

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.068>

К. Н. Гейна, М. С. Козий

Динамичность микроструктуры мезонефроса леща (*Abramis brama* Linnaeus, 1758)
Днепровско-Бугской устьевой системы в связи с нерестовой миграцией 68

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 78-98

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.078>

И. И. Грициняк, М. Ю. Симон

Особенности гемопоэза у осетровых видов рыб (*Acipenseridae*) (обзор) 78

СТРАНИЦА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 99-113

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.099>

И. С. Кононенко

Разработка криозащитных сред для низкотемпературного замораживания спермы
стерляди (*Acipenser ruthenus*) 99

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 114-145

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.114>

О. А. Батуревич

Перспективы применения минералов природного происхождения в рыбоводстве с учетом их
физико-химических свойств и эффективность их использования в животноводстве (обзор) 114

ХРОНИКА

Ученый ихтиолог-рыбовод к 90-й годовщине со дня рождения

Харитоновой Наталии Николаевны 146

CONTENTS

BIORESOURCES AND ECOLOGY OF WATER BODIES

- Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 5-28
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.003>
A. Liashenko, K. Zorina-Sakharova, Iu. Volikov, V. Makovskyi, Iu. Sytnyk, N. Kolesnyk
Invertebrate macrofauna of the Teremkivsky-3 pond (Nivka river) 5

TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE

- Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 29-38
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.029>
P. Shekk, M. Burgaz
Reducing organic contamination of shallow areas in brackish lagoons during rearing fish in cages in polyculture 29

- Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 39-48
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.039>
P. Mendryshora, H. Kurylenko
Description age-3 brood rainbow trout bred in the conditions of the industrial fish farm "Sloboda Banyliv" 39

- Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 49-59
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.049>
P. Shekk, Iu. Astafurov
Effect of the diet and growing conditions on the manifestations of cannibalism in the eastern freshwater shrimp (*Macrobrachium nipponense* De Haan, 1849) 49

SELECTION, GENETICS AND BIOTECHNOLOGY

- Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 60-67
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.060>
V. Spyrydonov
Development of DNA identification for sturgeon species with the use of real time polymerase chain reaction 60

PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

- Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 68-77
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.068>
K. Heina, M. Koziy
The dynamicity of the mesonephros microstructure in bream (*Abramis brama* Linnaeus, 1758) of the Dnieper-Bug estuary system in relation to spawning migration 68

- Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 78-98
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.078>
I. Hrytsyniak, M. Simon
Peculiarities of hemopoiesis in sturgeons species (*Acipenseridae*) (a review) 78

YOUNG SCIENTIST PAGE

- Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 99-113
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.099>
I. Kononenko
Development of cryoprotective media for low-temperature freezing of sterlet (*Acipenser ruthenus*) sperm 99

- Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 114-145
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.114>
O. Baturevich
Prospects of the application of minerals of natural origin in fish culture due to their physical-chemical properties and efficiency in animal breeding (a review) 114

CHRONICLE

- Scientist ichthyologist-fish breeder. To the 90th anniversary of her birthday
Kharitonova Natalia Nikolaevna 146

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 5-28
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.003>
УДК 592/.595:574.5(28)

МАКРОФАУНА БЕЗХРЕБЕТНИХ СТАВКА ТЕРЕМКІВСЬКИЙ-3 (Р. НИВКА)

А. В. Ляшенко, artemlyashenko@bigmir.net, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

К. Є. Зоріна-Сахарова, zsk@bigmir.net, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Ю. М. Воліков, river@bigmir.net, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

В. В. Маковський, vmakovskiy@gmail.com, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Ю. М. Ситник, sytnik@ukr.net, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Н. Л. Колесник, kolenataleo@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Мета. Вивчення біорізноманіття та структурної організації макрофауни безхребетних ставка Теремківський-3, що на річці Нивка, сезонної динаміки показників та визначення на основі розрахунків біотичних індексів екологічного стану водойми та забрудненості її води.

Методика. Вивчення макрофауни безхребетних ставка Теремківський-3 виконано впродовж вегетаційного сезону 2005 р. (квітень, липень, вересень). Дослідження проводились за стандартними методиками гідроекологічних досліджень із застосуванням основних положень Водної Рамкової Директиви Європейського Співтовариства. Всього зібрано та проаналізовано 34 кількісні та якісні проби за матеріалами яких визначено структурні характеристики макрофауни, фітофільних та перифітонних безхребетних, та проведено розрахунки індексу різноманітності Шеннона, індексу Вудівісса, ступеня розвитку угруповань макрофауни та сапробності води за індикаторними видами.

Результати. Ставок Теремківський-3 відрізняється доволі високим розвитком зануреної водної рослинності, особливо влітку і восени, переважно в прибережній зоні, великим піщаним пляжем у центральній частині водойми й порівняно невеликими глибинами (у наших дослідженнях — до 3 м). Помірне заростання зануреною водною рослинністю стимулює процеси самоочищення ставка, надає додаткові укриття для багатьох видів безхребетних гідробіонтів і тим самим сприяє їхньому розвитку. Найгірші структурні характеристики зафіксовані для донної макрофауни центральної частини ставка, де зосереджені чорні мулисті ґрунти з домішками детриту та рослинних залишків. Показники видового різноманіття всіх трьох досліджуваних біотичних угруповань (зообентос, зооперифітон і зоофітос) були схожими, кількісні показники характеризувалися порівняно високими біомасами, зумовленими переважно розвитком червоногих молюсків. За сапробністю вода в ставку характеризувалась як β - α -мезосапробна. За показником ТВІ, розрахованим за загальною макрофауною, вода ставка належала до категорій — від «слабо забрудненої» весною до «чистої» та «достатньо чистої» влітку та восени відповідно.

Наукова новизна. Проведені дослідження структурної організації бентосних, перифітонних та фітофільних комплексів ставка Теремківський-3, за кількісними показниками та біотичними індексами визначено екологічний стан як кожної з груп

© А. В. Ляшенко, К. Є. Зоріна-Сахарова, Ю. М. Воліков, В. В. Маковський,
Ю. М. Ситник, Н. Л. Колесник, 2017

гідробіонтів, так і макрофауни водного об'єкта в цілому. З використанням індексів подібності оцінено ступінь схожості видового складу даних груп макробезхребетних та дана оцінка оригінальності кожного типу угруповань.

Практична значимість. Визначення екологічного стану одного із ставків м. Києва дасть змогу науковцям порівнювати та відслідковувати стан інших міських водойм в динаміці розвитку урбанізованих акваторій.

Ключові слова: ставок Теремківський-3, річка Нивка, макрофауна безхребетних, індекс різноманітності Шеннона, індекс Вудівісса, сапробність води.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

В останні роки усвідомлення важливості збереження довкілля, необхідності мати чисті річки і озера проникає у свідомість широких верств населення. Охорона вод є одним з пріоритетних напрямків діяльності Європейського Союзу (ЄС), входження до якого Україна проголосила своєю стратегічною метою. Основні принципи управління водними ресурсами ЄС визначені у Водній Рамковій Директиві [1]. Головною метою зазначено досягнення доброї якості води і безпечного екологічного стану водних об'єктів. Такий підхід визначає необхідність проведення робіт щодо гідроекологічного моніторингу, екологічної паспортизації, систематизації, вивчення стану та тенденцій змін водних екосистем, визначення заходів збереження їх біологічного та ландшафтного різноманіття і рекреаційної цінності. Директива встановлює при виконанні моніторингових робіт щодо оцінки екологічного стану водних об'єктів пріоритетність біотичних показників над абіотичними. Додаток V визначає при характеристиці екологічного стану озер **склад та розповсюдженість придонної фауни безхребетних** одним з чотирьох біотичних показників (нарівні з 1 — складом та розповсюдженістю і біомасою фітопланктону, 2 — складом та розповсюдженістю іншої аквафлори та 3 — складом, розповсюдженістю та віковою структурою риби). При цьому рекомендується зважувати таксономічний склад, співвідношення таксонів, чутливих та нечутливих до впливів навколишнього середовища різної природи, а також рівень різноманітності фауни безхребетних. Тому дослідження макрофауни є досить важливим як із загальнонаукових позицій, так і з точки зору впровадження сучасної методологічної бази для організації моніторингу довкілля, охорони природи та визначення стану водних екосистем.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

У широкому розумінні поняття макрофауна водних безхребетних об'єднує тварин завбільшки 5 мм, що вільно живуть на різних донних субстратах, камінні, рослинах або занурених у воду предметах, або ж тих, що активно зариваються у товщу ґрунту, а при більш точному підході як окремі екологічні групи визначають зообентос і зооперифітон [2–4]. В рамках останнього, особливу групу складають безхребетні тварини, безпосередньо пов'язані у своєму існуванні з водними рослинами — їх називають фітофільною фауною, зоофітосом, епіфітоном [4–6]. Організми макрофауни тісно пов'язані між собою спільністю таксономічного складу, в різні періоди свого існування одні й ті ж безхребетні можуть бути приурочені до різних екологічних груп.

Головною метою представленої роботи було вивчення біорізноманіття та структурної організації макрофауни безхребетних ставка Теремківський-3, що на річці Нивка в межах Києва, сезонної динаміки показників та визначення на основі розрахунків біотичних індексів екологічного стану водойми та забрудненості її вод.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Вивчення макрофауни безхребетних ставка Теремківський-3 виконано впродовж вегетаційного сезону 2005 р. (квітень, липень, вересень). Всього зібрано та проаналізовано 34 кількісні та якісні проби, за матеріалами яких визначено структурні характеристики макрофауни, фітофільних і перифітонних безхребетних, та проведено розрахунки індексу різноманітності Шеннона, індексу Вудівіса, ступеня розвитку угруповань макрофауни та сапробності води за індикаторними видами.

Збір донних безхребетних проводився згідно з традиційними методиками [7]. Проби відбирались секційним дночерпаком СДЧ-100. Дослідженнями були охоплені біотопи різних типів, в основному різнотипні ґрунти на чистоводді на різних глибинах, біля рослинних угруповань та серед рослин, а також прибережні мілини, заплави, пляжі тощо. Відібрану дночерпаком пробу поміщали в лоток та відділяли гідробіонтів від ґрунту та донних відкладів шляхом «відмучування»: воду разом з ґрунтом розкручували так, щоб легкі фракції та самі організми потрапляли у водну коловерть, яку швидко виливали у промивалку з газом № 23; процедуру повторювали стільки разів, скільки необхідно, щоб вода в лотку при повторних виливаннях не ставала мутною. Після цього ґрунт, що залишився в лотку, ретельно продивлялися, відбираючи організми, які випадково залишилися, здебільшого великі молюски з важкою мушлею. Промиту пробу переносили в склянки та фіксували 4%-м розчином формаліну. Подальше камеральне опрацювання проводили за допомогою бінокюляру, розділяючи організми на основні таксономічні групи (нематоди, олігохети, ракоподібні, личинки комах та ін.). Біомасу визначали зважуванням на вагах з точністю виміру до 1 мг, а чисельність — підрахунком окремих таксономічних груп макрзообентосу, з наступним перерахунком на 1 м² дна водойми.

Збір зоофітосу проводили з урахуванням фітоморфологічного типу макрофітів, тобто вивчали як повітряно-водну (ПВР), так занурену рослинність (ЗР) та рослинність з плаваючими листями (РПЛ). Для збору безхребетних цілі рослини або їх фрагменти діставали з водойми та поміщали в лоток з водою з місця відбору проби. При цьому, міцні стебла повітряно-водної рослинності відсікали біля дна садовими ножицями або секатором, надводна частина рослини також відрізалась. Ці фрагменти ретельно промивали та проводили пильний огляд пазух листя, де, як правило, оселяється багато видів личинок хірономід, так званих «мінерів». М'які розгалужені стебла та листя зануреної рослинності після промивання фіксувалися разом з пробою та роздивлялися під бінокюлем при камеральній обробці проби. Вміст лотка з водою та змитими з рослин тваринами проціджували через промивалку з газом № 23, а промитий залишок фіксували 4% розчином формаліну.

В літній період були проведені дослідження зооперифітону. Відбір проб з різних типів субстратів проводили за традиційними методиками. Одним із способів отримання на якісному рівні даних про склад та відносний ступінь

розвитку перифітону є вилучення невеликих за розмірами субстратів із води. До найпоширеніших субстратів такого типу відносяться відмерлі рештки рослин, затоплені корчі, мушлі мертвих та живих молюсків, каміння, невеликі предмети штучного походження. Для ефективного відокремлення організмів перифітону з поверхні вилучених об'єктів використовувалися пристосування, які мали вигляд замкнутих об'ємів. У них організми зооперифітону змивалися та збиралися для подальшого дослідження. Площі обростань субстратів із складною рельєфною конфігурацією визначалися методом розбиття на більш прості геометричні фігури з наступним перерахуванням на 1 м².

Із великої кількості знарядь і приладів, за допомогою яких зрізують або зішкрябають організми перифітону із субстрату, була обрана і використовувалася конструкція шкребка, площина леза якого становила певний кут із віссю держака. Така конструкція більш ефективна, ніж описані в літературі [8, 9], тому що перифітон зрізається з частиною поверхні субстрату, а не зішкрябається. Це призводить до мінімальних втрат досліджуваного матеріалу і практично реалізує методологічний принцип — відокремлювати організми, не порушуючи їх. Відібраний матеріал фіксували 4%-м розчином формальдегіду.

Подальше опрацювання проб відбувалося в лабораторних умовах. Попередня ідентифікація організмів проводилася із використанням мікроскопа МБС-10 та камери Богорова, остаточно — мікроскопа МБІ-11. Таксономічне визначення гідробіонтів донної макрофауни, перифітону та зоофітосу проводили з використанням визначників та іншої наукової літератури [10–16].

Питання визначення видового різноманіття та його складових є одним з найважливіших у сучасній екології, парадигмою сьогодення якої слід визнати вивчення біорізноманіття світу в усій його різнобічності, багатоплановості та багатоаспектності. З великої кількості запропонованих в останні десятиріччя індексів визначення біорізноманіття найбільш широкого застосування набув індекс Шеннона [4, 17], який був використаний в наших дослідженнях:

$$\text{Індекс Шеннона } H = -\sum_i p_i \log p_i = -\sum_i \left(\frac{n_i}{N} \right) \log \left(\frac{n_i}{N} \right),$$

де N — сумарний показник значущості виду, n_i — показник значущості i -го виду.

Індекс Вудівіса (або Trent Biotic Index — TBI) [18, 19] лежить в основі багатьох сучасних біотичних індексів і запропонований для впровадження в Україні, Росії та Білорусі [20]. Визначення TBI проводиться за робочою шкалою, де використана послідовність зникнення широко розповсюджених макробезхребетних бентосних угруповань у відповідності із забрудненням води та донних відкладів, тобто враховується співвідношення таксонів, чутливих та нечутливих до зовнішніх чинників. Результати оцінки надаються в балах від 0 до 10 [20]. Індекс був розроблений для використання на невеликій англійській річці, його головна перевага — достатня простота використання, можливість швидкого отримання результату.

На підставі визначення структурних показників макрофауни (таксономічний склад, чисельність та біомаса) згідно методики [21], визначали ступінь розвитку екологічних угруповань макрофауни безхребетних організмів.

Сапробність водойми — один з показників, за яким визначається якість її вод. Згідно «Методики екологічної оцінки ...» [22] сапробність зумовлена рівнем вмісту у воді органічних речовин, що розкладаються, і може визначатися за характеристиками видового складу і чисельності гідробіонтів-індикаторів сапробності. У своїх розрахунках ми скористалися одним з найбільш вживаних сьогодні в гідробіології методів визначення сапробності — за організмами макрофауни за Пантле–Букк у модифікації Сладечека [23] з використанням низки переліків видів-індикаторів [24–27].

В екологічних дослідженнях окремий інтерес та можливість отримати важливу інформацію надає аналіз подібності біологічних об'єктів [28, 29]. Сам термін «подібність», або «коефіцієнт подібності», має декілька синонімів: «близькість», «зв'язаність», «асоціативність», «спільність», «відповідність» тощо. Авторами першої книги з числової таксономії [29] була запропонована класифікація коефіцієнтів подібності, з розподілом на чотири групи, а саме: коефіцієнти кореляції, міри відстаней, коефіцієнти асоціативності та коефіцієнти вірогідності. Порівняно невелика кількість із запропонованих індексів знайшла визнання у сучасній екології. У гідробіологічних дослідженнях, мабуть, найбільш широке розповсюдження отримали прості у розрахунках коефіцієнти подібності Жаккара і Сьоренсена.

$$I_J = \frac{a}{(b + c - a)}; \quad I_{cs} = \frac{2a}{b + c},$$

де b — число видів у фауністичному списку b ; c — число видів у фауністичному списку c ; a — число загальних видів для обох списків.

Огляд і критичний аналіз основних евристичних індексів подібності проведений у змістовній монографії Ю. А. Песенко [28]. Автор підкреслює, що розглянуті ним основні індекси подібності, або асоціативності (index of association), крім того, що логічно та функціонально пов'язані один з одним, мають і свої особливості. Тому вибір лише одного з них може суттєво вплинути на результати аналізу. І навпаки, порівнюючи результати оцінок подібності, розрахованих із використанням різних коефіцієнтів, можна отримати додаткову інформацію не тільки про зв'язки, але і структуру угруповань, які досліджуються.

На результати оцінок подібності впливають два основні чинники: ступінь реагування на величину різниці розмірів фауністичних списків, які порівнюються, що залежить від абсолютної міри подібності, яка являє собою не що інше як загальне число видів. У результаті ретельного аналізу [28], автор доходить висновку, що в переважній більшості випадків перевагу слід надавати індексу Чекановського-Сьоренсена та його модифікаціям.

Ще одним рекомендованим Ю. А. Песенко [28] для застосування в екологічних дослідженнях є індекс Шимкевича — Сімпсона. Його слід використовувати у випадках, коли вивчається ступінь відповідності меншого переліку видів більшому, або коли треба нівелювати залежність оцінки подібності фаун, які порівнюються, від розмірів списків, а також у випадку, коли одна із них недостатньо вивчена [28]:

$$I_{SzS} = \frac{a}{c}, \text{ при } b > c.$$

В усіх випадках нами, як і іншими авторами [30], значущим прийнятий 50%-вий і вищі рівні схожості, тому що при меншому значенні відмінність таксономічного складу буде більшою, ніж спільність. Отже, у випадку застосування згаданих індексів, утворення асоціацій досліджуваних об'єктів вище 50%-го рівня може свідчити про високий або достатньо високий ступінь їх подібності.

Окремо в порівняльних фауністичних дослідженнях стоїть питання визначення «оригінальності» або «своєрідності» компонентів біоти водних об'єктів [31]. Найбільш широкого використання в сучасній гідроекології набув індекс оригінальності Смирнова [31]:

$$t_{xx} = \frac{S}{N} \sum_n \left(\frac{1}{\beta_i} \right) - 1 \quad [28],$$

де S — кількість фауністичних комплексів, що порівнюються; N — загальна кількість видів; β — фреквенція даного виду.

Суть його можна передати через визначення «максимуму» і «мінімуму» значень. Так, максимальне значення відповідає ситуації, коли присутні в списку види знаходяться лише в ньому і, відповідно, відсутні в інших списках порівняння. Мінімальне значення відповідає ситуації, коли фауністичні списки абсолютно ідентичні щодо видового складу. При цьому, значення показника, яке дорівнює 1, інтерпретується як середня оригінальність, діапазон від 0 до 1 відповідає характеристиці — нижче середньої, у випадку більше 1 — вище середньої. Максимум показника залежить від кількості взятих для порівняння об'єктів і розраховується за простою формулою: $M - 1$, де M — кількість об'єктів [28].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Ставок Теремківський-3 (р. Нивка) — це найбільша водойма з каскаду ставків річки Нивка, розташованих у районі житлового масиву Теремки-2. Ставок знаходиться у неглибокій западині, північний берег майже пологий, береги подекуди обладнані пляжами та майданчиками для відпочинку. Водойма простягнулася зі сходу на захід приблизно на 400 м, найбільша ширина сягає 40–50 м, максимальні зареєстровані нами глибини становили 2,5–3,0 м (рис. 1, 2). Ставок характеризувався наявністю різних типів ґрунтів та незначним розвитком повітряно-водних рослин, лише деінде розвивалися зарості очерету звичайного, сусаку зонтичного та бульбокомишу морського.

На противагу цьому, занурена рослинність та макрофіти з плаваючим листям набувають у водоймі значного розвитку.

Впродовж спостережень 2005 р. було зареєстровано 99 видів макрофауни безхребетних (табл. 1). З усієї кількості видів 32 належали до зооперифітону, 42 було знайдено в бентосних угрупованнях та 64 — серед заростей макрофітів.

Рис. 1. Карта-схема розташування донних ґрунтів та заростання ставка Теремківський-3 макрофітами

Рис. 2. Ставок Теремківський-3

Таблиця 1. Загальний перелік видів бентосних, перифітонних та фітофілних безхребетних ставка Теремківський-3 впродовж 2005 р.

№	Перелік видів	Весна			Літо				Осінь			Бентос за рік	Зоофітос за рік
		Б	Ф	М	Б	Ф	П	М	Б	Ф	М		
Hydrozoa													
1	Hydrozoa sp.				+			+		+	+		+
2	Cardylophora caspia (Pallas)						+	+					
Briozoa													
3	Cristatella mucedo (Cuvier)				+			+					+
Nematoda													
4	Nematoda sp.				+		+	+	+		+	+	
Oligochaeta													
5	Stylaria lacustris (Linnaeus)					+		+					+
6	Dero obtusa (D'udekem)					+		+					+
7	Chaetogaster diaphanus (Gruith.)		+	+						+	+		+
8	Chaetogaster diastrophus (Gruith.)									+	+		+
9	Ophidonais serpentina (O.F. Muller)		+	+						+	+		+

Продовження табл. 1

№	Перелік видів	Весна			Літо				Осінь			Бентос за рік	Зоофітос за рік
		Б	Ф	М	Б	Ф	П	М	Б	Ф	М		
10	<i>Nais</i> sp.	+		+	+			+				+	
11	<i>Nais communis</i> (Piquet)	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+
12	<i>Nais barbata</i> (O. F. Muller)					+	+	+		+	+		+
13	<i>Nais pseudobtusa</i> Piquet	+	+	+		+	+	+		+	+	+	+
14	<i>Nais elinguis</i> (O. F. Muller)				+			+	+		+	+	
15	<i>Enchytraeidae</i> sp.		+	+									+
16	<i>Peloscolex ferox</i> (Eisen)						+	+					
17	<i>Limnodrilus</i> sp.	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+
18	<i>Limnodrilus hoffmeisteri</i> (Claparede)	+		+					+		+	+	
19	<i>Tubifex tubifex</i> (O. F. Muller)	+		+	+		+	+	+		+	+	
20	<i>Lumbriculus variegatus</i> (O. F. Muller)						+	+					
Hirudinea													
21	<i>Helobdella stagnalis</i> (Linne)		+	+		+		+					+
22	<i>Erpobdella octoculata</i> (Linne)		+	+	+	+	+	+				+	+
Acariformes													
23	<i>Acariformes</i> sp.						+	+					
Izopoda													
24	<i>Asellus aquaticus</i> (Linne)					+	+	+					+
Chironomidae													
25	<i>Ablabesmia monilis</i> (Linnaeus)					+		+		+	+		+
26	<i>Anatopynia plumipes</i> (Fries)		+	+									+
27	<i>Chironomus plumosus</i> (Linnaeus)				+			+	+		+	+	
28	<i>Corynonevra scutellata</i> (Winnertz)					+		+		+	+		+
29	<i>Cricotopus silvestris</i> (F.)						+	+		+	+		+
30	<i>Polypedilum convictum</i> (Walker)	+		+			+	+		+	+	+	+
31	<i>Polypedilum bicrenatum</i> (Kieffer)								+		+	+	
32	<i>Polypedilum nubeculosum</i> (Meigen)	+		+	+			+				+

Продовження табл. 1

№	Перелік видів	Весна			Літо				Осінь			Бентос за рік	Зоофітос за рік
		Б	Ф	М	Б	Ф	П	М	Б	Ф	М		
33	<i>Polypedilum sordens</i> (Van der Wulp)		+	+									+
34	<i>Polypedilum scalaenum</i> (Schränk)				+	+	+	+				+	+
35	<i>Pentapedilum exectum</i> (Kieffer)				+			+				+	
36	<i>Cryptochironomus defectus</i> (Kieffer)				+			+	+		+	+	
37	<i>Endochironomus stackelbergi</i> (Goetghebuer)					+		+					+
38	<i>Endochironomus tendens</i> (F.)		+	+		+		+		+	+		+
39	<i>Endochironomus albipennis</i> (Meigen)		+	+			+	+		+	+		+
40	<i>Cladotanytarsus mancus</i> (Walker)		+	+		+		+	+		+	+	+
41	<i>Glyptotendipes gripekoveni</i> (Kieffer)	+	+	+		+		+		+	+	+	+
42	<i>Limnochironomus tritonus</i> (Kieffer)	+		+								+	
43	<i>Limnochironomus (Dikrotenidipes) nervosus</i> (Staeger)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
44	<i>Microcricotopus bicolor</i> (Zetterstedt)						+	+					
45	<i>Micropsectra praecox</i> (Meigen)						+	+					
46	<i>Microtenidipes chloris</i> (Meigen)					+	+	+	+	+	+	+	+
47	<i>Procladius ferrugineus</i> (Kieffer)	+		+	+		+	+				+	
48	<i>Paratanytarsus confusus</i> (Palmen)		+	+									+
49	<i>Paratanytarsus lauterborni</i> (Kieffer)						+	+					
50	<i>Tanytarsus vilipennis</i> (Kieffer)				+			+				+	
51	<i>Tanytarsus gregarius</i> (Kieffer)	+		+								+	
52	<i>Tanytarsus mendax</i> (Kieffer)					+		+					+
53	<i>Sergentia longiventris</i> (Kieffer)								+		+	+

Продовження табл. 1

№	Перелік видів	Весна			Літо				Осінь			Бентос за рік	Зоофітос за рік
		Б	Ф	М	Б	Ф	П	М	Б	Ф	М		
54	<i>Stictochironomus rosencholdi</i> (Zetterstedt)				+			+	+		+	+	+
55	<i>Stictochironomus histrio</i> (Fabricius)								+		+	+	
	Limoniidae												
56	<i>Limoniidae</i> sp.								+		+		+
	Ephydriidae												
57	<i>Ephydriidae</i> sp.								+		+		+
	Chaoboridae												
58	<i>Chaoborus</i> sp.								+		+	+	
	Ceratopogonidae												
59	<i>Ceratopogonidae</i> sp.	+		+	+		+	+	+		+	+	
60	<i>Bezzia flavicornis</i> (Staeger)		+	+									+
61	<i>Palmomyia lineata</i> (Meigen)				+			+	+		+		+
62	<i>Palpomyia tibialis</i> (Meigen)								+		+		+
	Culicidae												
63	<i>Anopheles</i> sp.				+			+	+		+		+
64	<i>Culex</i> sp.				+			+					+
	Odonata												
65	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier)				+			+					+
66	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier)		+	+					+		+		+
67	<i>Ischnura elegans</i> (Van der Linden)								+		+		+
	Lepidoptera												
68	<i>Lepidoptera</i> sp.		+	+		+		+	+		+		+
69	<i>Paraponyx stratiotata</i> (Linne)	+		+								+	
	Ephemeroptera												
70	<i>Caenis macrura</i> (Stephens)				+		+	+				+	
71	<i>Caenis horaria</i> (Linne)	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
72	<i>Cloeon simile</i> (Eaton)	+	+			+	+		+	+			+
73	<i>Cloeon dipterum</i> (Linne)								+	+			+
74	<i>Ephemerella ignita</i> (Poda)					+	+

Продовження табл. 1

№	Перелік видів	Весна			Літо				Осінь			Бентос за рік	Зоофітос за рік
		Б	Ф	М	Б	Ф	П	М	Б	Ф	М		
Trichoptera													
75	Hydroptilidae sp.	+		+								+	
76	Ecnomus tenellus (Rambur)		+	+		+	+	+					+
77	Mystacides longicornis (Linne)		+	+		+		+	+	+	+	+	+
78	Leptocerus tineiformis (Curtis)									+	+		+
79	Orthotrichia tetensii (Kolbe)		+	+		+	+	+		+	+		+
Heteroptera													
80	Micronecta sp.						+	+					
81	Mesovelia furcata (Mulsant et Rey)					+		+					+
82	Plea minutissima (Leach)									+	+		+
Psychodidae													
83	Psychoda sp.					+		+					+
Coleoptera													
84	Haliphus ruficollis (De Geer)					+		+		+	+		+
85	Curculionidae sp.									+	+		+
Gastropoda													
86	Anisus albus (O. F. Muller)	+		+	+			+		+	+	+	+
87	Anisus acronicus (Ferussac)		+	+		+		+		+	+		+
88	Armiger crista (Linne)		+	+	+	+	+	+	+		+	+	+
89	Bithynia tentaculata (Linne)	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+
90	Borystenia naticina (Menke)		+	+									+
91	Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer)						+	+					
92	Lymnaea auricularia (L.)	+		+		+		+				+	+
93	Lymnaea palustris (O. F. Muller)	+		+								+	
94	Lymnaea stagnalis (Linnaeus)	+	+	+	+	+		+		+	+	+	+
95	Lymnaea lagotis (Schrank)									+	+		+
96	Lymnaea ovata (Schrank)	+		+								+	
97	Valvata pulhella (Studer)					+		+		+	+		+

Продовження табл. 1

№	Перелік видів	Весна			Літо				Осінь			Бентос за рік	Зоофітос за рік
		Б	Ф	М	Б	Ф	П	М	Б	Ф	М		
98	<i>Viviparus viviparus</i> (Linne)	+	+	+	+	+	+	+				+	+
<i>Bivalvia</i>													
99	<i>Amesoda rivicola</i> (Clessin)								+		+	+	
Кількість видів		23	30	45	22	41	32	68	21	40	55	43	65

Примітка: Б — макрозообентос, Ф — зоофітос, П — зооперифітон, М — загальна макрофауна.

У **весняний** період макрофауна ставка Теремківський-3 була представлена 45 видами безхребетних, серед яких 23 види нараховувались у бентосі, 30 — в угрупованнях зоофітосу. За кількістю видів домінували личинки хірономід — 13 видів, також було знайдено 10 видів черевоногих молюсків, 9 — малощетинкових черв'яків, 4 види личинок волохокрильців, по 2 — в групах п'явок, личинок одноденок, мокреців, метеликів; личинки бабок були представлені 1 видом.

Співвідношення основних груп гідробіонтів за кількістю видів у бентосі та зоофітосі наведені на рис. 3. Загалом у донних угрупованнях у весняний період зустрічалося більше видів черевоногих молюсків, а у фауні заростей — личинок хірономід.

Аналіз чисельності та біомаси основних груп безхребетних бентосу та зоофітосу показав, що за чисельністю серед останніх переважають личинки хірономід, а в донних угрупованнях — малощетинкові черви, за біомасою в обох підсистемах — черевоногі молюски.

Рис. 3. Видова представленість різних груп макрофауни ставка Теремківський-3 у весняний період

Показники чисельності макробезхребетних змінювались у межах 1,8–7,8 тис. екз./м² для бентосу та 7,7–75,5 тис. екз./кг×м² — для зоофітосу, біомаси — 5,1–776,1 г/м² та 140,4–1591,9 г/кг×м² для донних і фітофільних угруповань відповідно (табл. 2). Широкий діапазон значень біомаси зумовлений нерівномірним розповсюдженням по акваторії озера (зосереджені, переважно, у прибережних заростях) крупних черевоногих молюсків (*Gastropoda*). За середніми значеннями загальної чисельності та біомаси макрофауни згідно [21], угруповання бентосних безхребетних характеризувалися «середнім» рівнем розвитку за чисельністю та «вищим за середній» за біомсою, а фітофільна макрофауна — «дуже високим» і «високим» відповідно.

Таблиця 2. Характеристика екологічного стану ставка Теремківський-3 за показниками макрофауни у весняний період

Показники	Зообентос	Зоофітос
Видове багатство	23	30
Загальна чисельність ¹	4,37 (1,80–7,80)	41,60 (7,72–75,48)
Загальна біомаса ²	262,77 (5,1–776,1)	866,1 (140,4–1591,9)
Індекс Шеннона, біт/екз.	2,07 (1,1–3,3)	3,14 (2,29–3,98)
ТВІ:		
значення	3	6
назва категорії	брудна	слабко забруднена
ТВІ (загальний): значення		6
назва категорії		слабко забруднена
Сапробність:		
значення	1,8 (1,81–1,89)	2,00 (1,83–2,17)
зона сапробності	β'-мезосапробна	β'-мезосапробна

Примітки: тут і в табл. 3–4 наведені середні значення, в дужках — межі коливання відповідного показника; ¹ — для зообентосу та зооперифітону — чисельність тис. екз./м², біомаса, г/м², ² — для зоофітосу — чисельність, тис. екз./кг×м², біомаса, г/кг м².

Значення індексу Шеннона для зообентосу становили 2,07 (1,1–3,3) (табл. 2), найменше його значення зареєстроване для угруповань донних безхребетних центральної частини озера (чорні детритні мули на глибинах до 3 м), найбільше — в заростях рослинних угруповань біля берега. Індекс Шеннона для зоофітосу змінювався в межах 2,29–3,98 біт/екз. і максимальним був у заростях повітряно-водних рослин.

Значення індексу Вудівіса (ТВІ) за організмами зообентосу дорівнювали 3, що за наявністю та співвідношенням індикаторних таксонів макрофауни безхребетних відповідає категорії «брудних вод». В свою чергу, за показниками фітофільної фауни ТВІ був значно вищий і становив 6 балів, що відповідає категорії «слабко забруднених вод». Інтегральний ТВІ за всіма компонентами макрофауни у весняний період був досить високим — 6 балів. Відповідно значенням індексу сапробності, розрахованого за індикаторними видами як зообентосу 1,80 (1,81–1,89), так і зоофітосу 2,00 (1,83–2,17), ця водойма належала до β'-мезосапробних вод.

Літній період характеризувався досить інтенсивним розвитком занурених макрофітів. Зарості елодеї канадської, рдесників гребінчастого та пронизанolistого, куширу темно-зеленого суцільним килимом покривають дно мілководної частини. Значного розвитку набуває рослинність з плаваючим листям. У прибережній частині зареєстровані асоціації глечиків жовтих та гірчака земноводного. Розвиток водної рослинності сприяв розвитку фітофільних комплексів безхребетних і загальної макрофауни озера. Влітку у водоймі було зареєстровано 68 видів безхребетних, 22 з яких зафіксовано в донних угрупованнях, 41 — серед фауни заростей та 32 належали до перифітонних організмів. Як і в попередній сезон, за представленістю переважали личинки хірономід — 23 види. Також було виявлено 11 видів малощетинкових червів, 9 — червононогих молюсків, 4 — личинок одноденок, 3 — личинок волохокрильців, по 2 види в групах гідроїдних поліпів, п'явок, клопів, личинок мокреців та кровосисних комарів, по 1 виду представлені рівноногі ракоподібні, моховатки, жуки, личинки бабок та представники двокрилих з родини *Psychodidae*. До виду не визначались групи *Lepidoptera*, *Nematoda*, *Acariformes*. Видова представленість макробезхребетних у кожній з досліджених екологічних груп наведена на рис. 4.

Найбільшим видовим різноманіттям у всіх підсистемах характеризувалися личинки хірономід, малощетинкові черви та червоногі молюски.

Рис. 4. Видова представленість різних груп макрофауни ставка Теремківський-3 в літній період

Показники чисельності донних макробезхребетних змінювались у межах 6,70–12,00 тис. екз./м², показники біомаси — 29,8–476,2 г/м². Як і навесні, максимальні показники біомаси зумовлені крупними червононогими молюсками, чисельності — олігохетами (табл. 3). За середніми значеннями чисельності і біомаси донної макрофауни, згідно О. П. Оксіюк та ін. [21], її розвиток характеризувався як «середній». Для фітофільної фауни чисельність змінювалась у межах 1,89–27,12 тис. екз./кг×м² та біомаса — 53,2–537,0 г/кг×м², що відповідало «дуже високому» та «вищому за середній» рівням розвитку за

чисельністю та біомасою відповідно (табл. 3). Максимальні кількісні показники фітофільної фауни зумовлені значним розвитком черевоногих моллюсків. Для перифітонних комплексів середня загальна чисельність становила 4,51 тис. екз./м², тобто відповідала «нижчому за середній» рівню розвитку, а біомаса — 64,6 г/м² — «вищому за середній» (табл. 3). Найбільша чисельність зареєстрована на занурених рештках деревини (7,44 тис. екз./м²) і була зумовлена розвитком личинок комарів-дзвінців, біомаса — на камінні (169,2 г/м²) — черевоногих моллюсків.

Таблиця 3. Характеристика екологічного стану ставка Теремківський-3 за показниками макрофауни в літній період.

Показники	Зообентос	Зоофітос	Зооперифітон
Видове багатство	22	41	32
Загальна чисельність ¹	9,60 (6,70–12,00)	12,69 (1,89–27,12)	4,51 (0,33–7,44)
Загальна біомаса ²	178,61 (29,82–476,16)	256,9 (53,2–537,0)	64,58 (0,06–169,20)
Індекс Шеннона, біт/екз.	1,60 (0,71–2,99)	3,19 (2,83–3,47)	2,71 (1,58–3,54)
ТВІ:			
значення	3	6 (4–6)	7 (3–7)
назва категорії	брудна	слабко забруднена	досить чиста
ТВІ (загальний):			
значення		8	
назва категорії		чиста	
Сапробність:			
значення	2,91 (2,27–3,80)	2,19 (1,99–2,54)	2,41 (2,25–2,47)
зона сапробності	α'-мезосапробна	β"-мезосапробна	β"-мезосапробна

Значення індексу Шеннона для зообентосу становили 1,60 (0,71–2,99), тобто дещо знизились у порівнянні з весняним періодом. Цей же індекс для зоофітосу змінювався в межах 2,98–3,47 біт/екз., тобто відповідав вищому за середній рівню біорізноманітності, а для перифітону становив 2,71 (1,58–3,54) біт/екз., що відповідало середньому рівню.

Значення ТВІ для донних угруповань дорівнювали 3, що за наявності та співвідношенням індикаторних таксонів макрофауни безхребетних відповідає категорії «брудних вод». Для зоофітосу індекс Вудівіса змінювався від 4 до 6, загальне значення для рослинних угруповань складало 6 («слабко забруднені» води). Цей показник для перифітону був найвищий з усіх екологічних груп і сягав 7 балів («досить чисті» води). Інтегральний ТВІ розрахований за всіма компонентами макрофауни в літній період був досить високим (8 балів), що відповідало категорії «чистих вод». Відповідно значенням індексу сапробності, розрахованого за індикаторними видами зообентосу, зооперифітону та зоофітосу, ця водойма належить до α'–β"-мезосапробних вод (табл. 3).

Восени ставок характеризувався значним розвитком занурених макрофітів (елodeя канадська) і рослин з плаваючим листям (гірчак земноводний), які вкривали значні площі дна і водної поверхні. Повітряно-водні рослини були представлені слабко, спостерігалися невеликі угруповання сусака зонтичного та

бульбокомишу морського. Організми зооперифітону не досліджували. Загальна кількість видів безхребетних становила 55 таксонів, 21 з них належав до бентосних угруповань, 40 — зареєстровано в комплексах фауни заростей. Найбільшим видовим різноманіттям характеризувалися личинки комарів-дзвінців — 16 видів, також було знайдено по 7 видів малощетинкових червів та червоногих молюсків, по 3 — серед личинок волохокрильців, одноденок та мокреців, по 2 види в групах жуків та личинок бабок, інші групи були представлені 1 видом (табл. 1). Співвідношення кількості видів у домінуючих таксонах у різних екологічних групах безхребетних наведені на рис. 5. Восени, як і в попередній сезон, у бентосних та фітофільних угрупованнях найбільшим видовим багатством характеризувалися личинки хірономід та малощетинкові черви, які в донних комплексах зумовлювали максимальні значення чисельності. У зоофітосі найбільш різноманітно були представлені червоногі молюски, вони зумовлювали максимальні показниками біомаси.

Рис. 5. Видова представленість різних груп макрофауни ставка Теремківський-3 в осінній період

Загальна чисельність макробезхребетних бентосу змінювалась у межах 1,8–18,8 тис. екз./м², біомаси — 3,8–469,0 г/м² (табл. 4). Середні значення загальної чисельності донної макрофауни (12,7 тис. екз./м²), згідно О. П. Оксіюк та ін. [21], характеризували її розвиток як «високий», біомаси (160,6 г/м²) — як «середній». Рівень розвитку фітофільних угруповань за середньою загальною чисельністю (25,9 тис. екз./кг×м²) характеризувався як «дуже високий», а за загальною біомасою (142,0 г/кг×м²) — як «середній».

Значення індексу Шеннона для зообентосу становили 2,18 (1,95–2,50) біт/екз., що відповідає середньому рівню біорізноманітності (табл. 4). Для фітофільної фауни цей показник був вищий (3,05–4,00 біт/екз.), що може свідчити про сприятливі умови існування цього комплексу безхребетних. ТВІ в угрупованнях бентосних безхребетних змінювався від 2 у центральній частині озера до 5 — у заростях рослин, а загалом для водойми становив 5, що за наявністю та співвідношенням індикаторних таксонів макрофауни безхребетних відповідає категорії «помірно забруднених вод» (табл. 4). ТВІ для зоофітосу в

цілому, як і його інтегральне значення, розраховане для всієї макрофауни, становив 7 балів, що відповідає категорії «достатньо чистих» вод (табл. 4). Відповідно значенням індексу сапробності, розрахованого за індикаторними видами зообентосу та зоофітосу, ця водойма належить до α - β -мезосапробних вод.

Таблиця 4. Характеристика екологічного стану ставка Теремківський-3 за показниками макрофауни в осінній період

Показники	Зообентос	Зоофітос
Видове багатство	21	40
Загальна чисельність ¹	12,73 (1,80–18,80)	25,93 (15,60–38,09)
Загальна біомаса ²	160,62 (3,83–469,02)	142,03 (37,4–393,4)
Індекс Шеннона, біт/екз.	2,18 (1,95–2,50)	3,10 (2,25–4,00)
ТВІ:		
значення	5 (2–5)	7
назва категорії	помірно забруднена	достатньо чиста
ТВІ (загальний):		
значення	7	
назва категорії	достатньо чиста	
Сапробність:		
значення	3,05 (2,42–3,64)	2,12 (1,87–2,37)
зона сапробності	α' -мезосапробна	β'' -мезосапробна

Результати аналізу подібності та оригінальності угруповань макрофауни із застосуванням різних індексів та підходів подані в табл. 5–7.

Таблиця 5. Аналіз (матриця) подібності (за індексом Жаккара) та оригінальності (за індексом Смирнова) макрофауни безхребетних ставка Теремківський-3

Зообентос			Зоофітос			ЗП	Σсезон	Σсезон	Σсезон	Σрік	Σрік
Весна	Літо	Осінь	Весна	Літо	Осінь	Весна	Весна	Літо	Осінь	ЗБ	ЗФ
0,88	0,35	0,15	0,17	0,18	0,19	0,17	0,52	0,23	0,20	0,55	0,16
	0,68	0,30	0,18	0,17	0,11	0,26	0,26	0,32	0,20	0,50	0,13
		0,90	0,16	0,17	0,11	0,15	0,18	0,20	0,38	0,48	0,12
			0,85	0,37	0,35	0,22	0,65	0,27	0,31	0,21	0,46
				1,15	0,37	0,22	0,32	0,60	0,35	0,27	0,63
					1,26	0,18	0,32	0,33	0,73	0,18	0,62
						1,20	0,24	0,47	0,21	0,25	0,21
							0,84	0,36	0,35	0,48	0,44
								0,79	0,41	0,40	0,53
									0,73	0,39	0,56
										0,78	0,22
											0,78

Примітка. ЗБ — зообентос, ЗФ — зоофітос, ЗП — зооперифітон; жирним шрифтом по діагоналі подані значення оригінальності, сірим кольором позначені рівні схожості понад 50%.

Усі три індекси подібності таксономічного складу свідчать про наявність однакових видів у різних угрупованнях, різні сезони та впродовж сезону досліджень, тобто засвідчують певну спільність таксономічного складу макрофауни в цілому. Результати розрахунків різних індексів дещо різняться, найбільше значимих показників подібності (більше 50%) зареєстровано за індексом Шимкевича — Сімпсона, найменше — за індексом Жаккара.

Таблиця 6. Аналіз подібності (за індексом Сьоренсена) та оригінальності (за індексом Смирнова) макрофауни безхребетних ставка Теремківський-3

Зообентос			Зоофітос			ЗП	Σсезон	Σсезон	Σсезон	Σрік	Σрік
Весна	Літо	Осінь	Весна	Літо	Осінь	Літо	Весна	Літо	Осінь	ЗБ	ЗФ
0,88	0,52	0,27	0,30	0,31	0,31	0,29	0,69	0,37	0,33	0,71	0,27
	0,68	0,47	0,31	0,29	0,19	0,41	0,41	0,49	0,34	0,67	0,23
		0,90	0,27	0,29	0,20	0,26	0,30	0,34	0,55	0,65	0,21
			0,85	0,54	0,51	0,35	0,79	0,43	0,47	0,35	0,63
				1,15	0,54	0,36	0,48	0,75	0,52	0,42	0,77
					1,26	0,31	0,49	0,50	0,84	0,31	0,76
						1,20	0,38	0,64	0,34	0,39	0,35
							0,84	0,53	0,51	0,64	0,61
								0,79	0,59	0,57	0,69
									0,73	0,57	0,72
										0,78	0,37
											0,78

Примітка. Позначення такі ж, як у табл. 5.

Таблиця 7. Аналіз подібності (за індексом Шимкевича — Сімпсона) та оригінальності (за індексом Смирнова) макрофауни безхребетних ставка Теремківський-3

Зообентос			Зоофітос			ЗП	Σсезон	Σсезон	Σсезон	Σрік	Σрік
Весна	Літо	Осінь	Весна	Літо	Осінь	Літо	Весна	Літо	Осінь	ЗБ	ЗФ
0,88	0,55	0,29	0,33	0,42	0,42	0,33	1,00	0,71	0,54	1,00	0,50
	0,63	0,48	0,36	0,41	0,27	0,50	0,64	1,00	0,59	1,00	0,45
		0,90	0,33	0,43	0,29	0,33	0,48	0,71	1,00	1,00	0,43
			0,85	0,63	0,60	0,37	1,00	0,70	0,67	0,43	1,00
				1,15	0,55	0,41	0,51	1,00	0,61	0,44	1,00
					1,26	0,34	0,53	0,68	1,00	0,33	1,00
						1,20	0,47	1,00	0,47	0,47	0,53
							0,84	0,65	0,57	0,66	0,74
								0,79	0,65	0,73	0,71
									0,73	0,64	0,78
										0,78	0,45
											0,78

Примітка. Позначення такі ж, як у табл. 5.

Найбільш сталим видовим складом впродовж року характеризувалася макрофауна зоофітосу. Вона ж характеризується й найбільшими значеннями показника оригінальності Смирнова та його збільшенням від весни до осені. Значення цього індексу зумовлюються наявністю таксонів, приналежних тільки до одного із порівнюваних списків; впродовж спостережень співвідношення таких видів може змінюватись внаслідок міграцій, виїдання хижаками, чергуванням стадій розвитку тощо. Оскільки значення показника подібності угруповання зоофітосу в різні сезони майже однакові, зміни показника оригінальності зумовлені в першу чергу змінами таксономічного складу донної макрофауни.

Отримані результати стосовно макрофауни перифітону свідчать про доволі високу спільність її таксономічного складу з фітофільним угрупованням, особливо за розрахунками індексу Шимкевича — Сімпсона. Цей показник є мірою включення, або процентного входження, меншої фауни до складу більшої.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Ставок Теремківський-3 характеризується доволі високим розвитком зануреної водної рослинності, особливо влітку і восени переважно, в прибережній зоні великим піщаним пляжем у центральній частині водойми й порівняно невеликими глибинами (у наших дослідженнях — до 3 м). Помірне заростання зануреною водною рослинністю стимулює процеси самоочищення ставка, надає додаткові укриття для багатьох безхребетних гідробіонтів і тим самим сприяє їхньому розвитку. Найгірші структурні характеристики зафіксовані для донної макрофауни центральної частини озера, де зосереджені чорні мулисті ґрунти з домішками детриту та рослинних залишків. Показники видового багатства всіх трьох досліджуваних біотичних угруповань (зообентос, зооперифітон і зоофітос) були схожими, кількісні показники характеризувалися порівняно високими біомасами, зумовленими, переважно, розвитком червононогих молюсків. За сапробністю вода в озері характеризувалась як β - α -мезосапробна. За показником ТВІ, розрахованим за загальною макрофауною, вода озера належала до досить високих категорій — від «слабко забрудненої» весною до «достатньо чистої» і «чистої» восени та влітку відповідно.

Порівняльний аналіз подібності видового складу макрофауни засвідчив, що поряд із спільністю таксономічного складу в цілому, кожне із досліджених біотичних угруповань вирізняється певною своєрідністю видового складу.

Дослідження проводяться в рамках Програми моніторингу гідроекологічного стану водойм і водотоків міської зони Києва щосезонно та щорічно.

ЛІТЕРАТУРА

1. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/EC. Основні терміни та їх визначення/EU Water Framework Directive 2000/60/EC. Definitions of Main Terms. Київ, 2006. 240 с.
2. Унифицированные методы исследования качества вод: Методы биол. анализа вод. Москва: СЭВ, 1976. Ч. 3. 186 с.
3. Константинов А. С. Общая гидробиология. Москва: Высш. школа, 1986. 472 с.
4. Романенко В. Д. Основи гідроекології: Підручник. Київ: Обереги, 2001. 728 с.
5. Зимбалевская Л. Н. Фитофильные беспозвоночные равнинных рек и водохранилищ: экологический очерк. Киев: Наук. думка, 1981. 216 с.

6. Протасов А. А. Пресноводный перифитон. Киев: Наук. думка, 1994. 308 с.
7. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах: Зообентос и его продукция/ред. Винберг Г. Г. и др. Ленинград: ГосНИОРХ, 1984. 151 с.
8. Жадин В. И. Методика изучения донной фауны водоемов и экологии донных беспозвоночных//Жизнь пресных вод СССР. Москва; Ленинград: АН СССР, 1956. Т. 4, ч. 1. С. 279—382.
9. Sladečková A. Limnological investigation methods for the periphyton (Aufwuchs) communities//Bot. Review. 1962. Vol. 28, № 2. P. 286—350.
10. Чекановская О. В. Водные малощетинковые черви фауны СССР. Москва; Ленинград: Наука, 1962. 411 с.
11. Панкратова В. Я. Личинки и куколки комаров подсемейства *Chironomidae* фауны СССР. (*Diptera, Chironomidae=Tendopodidae*). Ленинград: Наука, 1970. 341 с.
12. Панкратова В. Я. Личинки и куколки комаров подсемейства *Orthoclaadiinae* фауны СССР. (*Diptera, Chironomidae=Tendopodidae*). Ленинград: Наука, 1983. 295 с.
13. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР. Ленинград: Гидрометеиздат, 1977. 511 с.
14. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т. 1. Низшие беспозвоночные. Санкт-Петербург, 1994. 200 с.
15. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т. 2. Санкт-Петербург, 1995. 632 с.
16. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т. 4. Высшие насекомые. Двукрылые. Санкт-Петербург, 1999. 1000 с.
17. Шеляг-Сосонко Ю. Р., Ємельянов І. Г. Концепція біорізноманіття в аспекті функціонування та охорони біосистем і ландшафтів//Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. Київ: ІНТЕРЕКОЦЕНТР, 1997. С. 478—495.
18. Woodiwiss F. S. The biological system of stream classification used by Trent River Board//Chemistry and Industry, 1964. Vol. 11. P. 443—447.
19. Metcalfe J. L. Biological water quality assessment of running waters based on macroinvertebrate communities: history and present status in Europe//Environmental pollution. 1989. Vol. 60. P. 101—139.
20. Афанасьев С. А., Гродзинский М. Д. Методика оценки экологических рисков, возникающих при воздействии источников загрязнения на водные объекты. Киев: АйБи, 2004. 60 с.
21. Оценка состояния водных объектов Украины по гидробиологическим показателям: бентос, перифитон и зоофитос/Оксиук О. П. и др.//Гидробиол. журн. 1994. Т. 30, № 4. С. 31—35.
22. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями/Романенко В. Д. та ін. Київ, 1998. 28 с.
23. Sladecsek V. System of water quality from the biological point of view//Ergebnisse der Limnologie. 1973. Vol. 7. P. 1—128.
24. Голубева Г. В. Индикационное значение отдельных форм хирономид//Экология гидробионтов водоемов западного Урала. Пермь: Перм. ун-т, 1988. С. 43—51.
25. Макрушин А. В. Библиографический указатель по теме «Биологический

- анализ качества вод» с приложением списка организмов-индикаторов загрязнения. Ленинград: Зоологический институт АН СССР, 1974. 60 с.
26. Тодераш И. К. Функциональное значение хирономид в экосистемах водоемов Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1984. 181 с.
 27. Унифицированные методы исследования качества вод. Ч. 3. Методы биологического анализа вод. Приложение 1: Индикаторы сапробности. Москва: СЭВ, 1977. 124 с.
 28. Песенко Ю. А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. Москва: Наука, 1982. 287 с.
 29. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. Москва: Финансы и статистика, 1989. 215 с.
 30. Алимов А. Ф., Финогенова Н. П. Методы расчета продукции//Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресных водоемах. Зообентос и его продукция. Ленинград, 1984. С. 9—25.
 31. Харченко Т. А., Ляшенко А. В., Зорина-Сахарова К. Є. Оцінка оригінальності складу ценозів естуаріїв України за показниками біорізноманітності макрозообентосу//Природничий альманах. 2006. Вип. 8. С. 273—282. (Серія: Біологічні науки).

REFERENCES

1. *EU Water Framework Directive 2000/60/EC. Definitions of Main Terms.* (2006). Kyiv.
2. *Unifitsirovannyye metody issledovaniya kachestva vod: Metody biol. analiza vod.* Ch. 3. (1976). Moskva: SEV.
3. Konstantinov, A. S. (1986). *Obshchaya gidrobiologiya.* Moskva: Vyssh. shkola.
4. Romanenko, V. D. (2001). *Osnovy hidroekologii: Pidruchnyk.* Kyiv: Oberehy.
5. Zimbalevskaya, L. N. (1981). *Fitofil'nye bespozvonochnye ravninnykh rek i vodokhranilishch: ekologicheskoy ocherk.* Kiev: Nauk. dumka.
6. Protasov, A. A. (1994). *Presnovodnyy perifiton.* Kiev: Nauk. dumka.
7. *Metodicheskie rekomendatsii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskikh issledovaniyakh na presnovodnykh vodoemakh: Zoobentos i ego produktsiya.* Vinberg, G. G., & Lavrent'eva G. N. (Eds.) (1984). Leningrad: GosNIORKh.
8. Zhadin, V. I. (1956). Metodika izucheniya donnoy fauny vodoemov i ekologii donnykh bespozvonochnykh. *Zhizn' presnykh vod SSSR, T. 4, ch. 1.* Moskva; Leningrad: AN SSSR, 279-382.
9. Sladečková, A. (1962). Limnological investigation methods for the periphyton (Aufwuchs) communities. *Bot. Review*, 28, 2, 286-350.
10. Chekanovskaya, O. V. (1962). Vodnye maloshchetinkovye chervi fauny SSSR. Moskva; Leningrad: Nauka.
11. Pankratova, V. Ya. (1970). Lichinki i kukolki komarov podsemeystva *Chironomidae* fauny SSSR. (*Diptera, Chironomidae=Tendopedidae*). Leningrad: Nauka.
12. Pankratova, V. Ya. (1983). Lichinki i kukolki komarov podsemeystva *Orthocladinae* fauny SSSR. (*Diptera, Chironomidae=Tendopedidae*). Leningrad: Nauka.

13. *Opredelitel' presnovodnykh bespozvonochnykh Evropeyskoy chasti SSSR.* (1977). Leningrad: Gidrometeoizdat.
14. *Opredelitel' presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredel'nykh territoriy.* (1994). T. 1. Nizshie bespozvonochnye. Sankt-Peterburg.
15. *Opredelitel' presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredel'nykh territoriy.* (1995). T. 2. Sankt-Peterburg.
16. *Opredelitel' presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredel'nykh territoriy.* (1999). T. 4. Vysshie nasekomye. Dvukrylye.
17. Sheliakh-Sosonko, Iu. R., & Yemelianov, I. H. (1997). Kontseptsii bioriznomanittia v aspekti funktsionuvannia ta okhorony biosystem i landshaftiv. *Bioriznomanittia Karpatskoho biosferneho zapovidnyka*. Kyiv: INTEREKOTsENTR, 478-495.
18. Woodiwiss, F. S. (1964). The biological system of stream classification used by Trent River Board. *Chemistry and Industry*, 11, 443-447.
19. Metcalfe, J. L. (1989). Biological water quality assessment of running waters based on macroinvertebrate communities: history and present status in Europe. *Environmental pollution*, 60, 101-139.
20. Afanas'ev, S. A., & Grodzinskiy, M. D. (2004). *Metodika otsenki ekologicheskikh riskov, vznikayushchikh pri vozdeystvii istochnikov zagryazneniya na vodnye ob'ekty*. Kiev: AyBi.
21. Oksiyuk, O. P., Zimbalevskaya, L. N., Protasov, A. A., Pligin, Yu. V., & Lyashenko, A. V. (1994). Otsenka sostoyaniya vodnykh ob'ektov Ukrainy po gidrobiologicheskim pokazatelyam: bentos, perifiton i zoofitos. *Gidrobiol. zhurn.*, 30, 4, 31-35.
22. Romanenko, V. D., Zhukynskiy, V. M., & Oksiiuk, O. P., et al. (1998). *Metodyka ekologichnoi otsinky yakosti poverkhnevyykh vod za vidpovidnymi katehoriyamy*. Kyiv.
23. Sladeczek, V. (1973). System of water quality from the biological point of view. *Ergebnisse der Limnologie*, 7, 1-128.
24. Golubeva, G. V. (1988). Indikatsionnoe znachenie otdel'nykh form khironomid. *Ekologiya gidrobiontov vodoemov zapadnogo Urala*. Perm': Perm. un-t, 43-51.
25. Makrushin, A. V. (1974). *Bibliograficheskii ukazatel' po teme «Biologicheskii analiz kachestva vod» s prilozheniem spiska organizmov-indikatorov zagryazneniya*. Leningrad: Zoologicheskii institut AN SSSR.
26. Toderash, I. K. (1984). *Funktsional'noe znachenie khironomid v ekosistemakh vodoemov Moldavii*. Kishinev: Shtiintsa.
27. *Unifitsirovannye metody issledovaniya kachestva vod.* (1977). Ch. 3: Metody biologicheskogo analiza vod. Prilozhenie 1: Indikatory saprobnosti. Moskva: SEV.
28. Pesenko, Yu. A. (1982). *Printsipy i metody kolichestvennogo analiza v faunisticheskikh issledovaniyakh*. Moskva: Nauka.
29. *Faktornyy, diskriminantnyy i klasternyy analiz.* (1989). Moskva: Finansy i statistika.
30. Alimov, A. F., & Finogenova, N. P. (1984). *Metody rascheta produktsii. Metodicheskie rekomendatsii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskikh issledovaniyakh na presnykh vodoemakh. Zoobentos i ego produktsiya*, 9-25.
31. Kharchenko, T. A., Liashenko, A. V., & Zoryna-Sakharova, K. Ie. (2006). *Otsinka oryhinalnosti skladu tsenoziv estuariiv Ukrainy za pokaznykamy bioriznomanitnosti makrozoobentosu. Pryrodnychiy almanakh*, 8, 273-282.

МАКРОФАУНА БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ПРУДА ТЕРЕМКОВСКИЙ-3 (Р. НИВКА)

А. В. Ляшенко, artemlyashenko@bigmir.net, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

К. Е. Зорина-Сахарова, zsk@bigmir.net, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

Ю. М. Воликов, river@bigmir.net, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

В. В. Маковский, vmakovskiy@gmail.com, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

Ю. М. Сытник, sytnik@ukr.net, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

Н. Л. Колесник, kolenataleo@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

Цель. Изучение биоразнообразия и структурной организации макрофауны беспозвоночных пруда Теремковский-3, на реке Нивка, сезонной динамики показателей и определения на основе расчетов биотических индексов экологического состояния водоема и загрязнения его воды.

Методика. Изучение макрофауны беспозвоночных пруда Теремковский-3 выполнено во время вегетационного сезона 2005 г. (апрель, июль, сентябрь). Исследования проводились по стандартным методикам гидроэкологических исследований с применением основных положений Водной Рамочной Директивы Европейского Сообщества. Всего собрано и проанализировано 34 количественные и качественные пробы, по материалам которых определены структурные характеристики макрофауны, фитофильных и перифитонных беспозвоночных, а также проведены расчеты индекса разнообразия Шеннона и индекса Вудивисса, дана оценка степени развития макрофауны и сапробности воды по индикаторным видам.

Результаты. Пруд Теремковский-3 отличается довольно высоким развитием погруженной водной растительности, особенно летом и осенью, преимущественно в прибрежной зоне, крупным песчаным пляжем в центральной части водоема и сравнительно небольшими глубинами (в наших исследованиях — до 3 м). Умеренное зарастание погруженной водной растительностью стимулирует процессы самоочищения пруда, предоставляет дополнительные укрытия для многих видов беспозвоночных гидробионтов и тем самым способствует их развитию. Худшие структурные характеристики зафиксированы для донной макрофауны центральной части пруда, где сосредоточены черные илистые грунты с примесью детрита и растительных остатков. Показатели видового разнообразия всех трех исследуемых биотических сообществ (зообентос, зооперифитон и зоофитос) были сходными, количественные показатели характеризовались сравнительно высокой биомассой, преимущественно обусловленной развитием брюхоногих моллюсков. По сапробности вода в пруду характеризовалась как β - α -мезосапробная. По показателю индекса Вудивисса, рассчитанному по общей макрофауне, вода озера принадлежала к категориям от «слабо загрязненной» весной до «чистой» и «достаточно чистой» летом и осенью соответственно.

Научная новизна. Проведенные исследования структурной организации бентосных, перифитонных и фитофильных комплексов пруда Теремковский-3 по количественным показателям и биотическим индексам позволили определить экологическое состояние как каждой из групп гидробионтов, так и макрофауны водного объекта в целом. С использованием индексов сходства оценена степень сходства видового состава данных групп макробеспозвоночных и дана оценка оригинальности каждого типа групп.

Практическая значимость. Определение экологического состояния одного из прудов м. Киева позволит ученым сравнивать и отслеживать состояние других городских водоемов в динамике развития урбанизированных акваторий.

Ключевые слова: пруд Теремковский-3, река Нивка, макрофауна беспозвоночных, индекс разнообразия Шеннона, индекс Вудивисса, сапробность воды.

INVERTEBRATE MACROFAUNA OF THE TEREMKIVSKY-3 POND (NIVKA RIVER)

A. Liashenko, artemlyashenko@bigmir.net, Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv

K. Zorina-Sakharova, zsk@bigmir.net, Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv

Iu. Volikov, river@bigmir.net, Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv

V. Makovskyi, vmakovskyi@gmail.com, Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv

Iu. Sytnyk, sytnik@ukr.net, Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv

N. Kolesnyk, kolenataleo@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. The study the biodiversity and structural organization of invertebrate macrofauna of the Teremkivsky-3 pond of the river Nyvka, seasonal dynamics and of parameters and determination of pond ecological state and water pollution level based on the calculation of biotic indices.

Methodology. The study of invertebrate macrofauna of the Teremkivsky-3 pond was performed during the vegetation season of 2005 (April, July, September). The study was carried out using standard hydroecological techniques with the use of main provisions of the Water Framework Directive of the European Community. In total, 34 quantitative and qualitative samples were collected, which were used for the determination of the structural characteristics of the macrofauna of phytoplankton and periphyton invertebrates and following indices were calculated: Shannon diversity index, Woodiwiss index, the degree of the development of macrofauna communities and water saprobity based on indicator species.

Findings. The pond Teremkivsky-3 is characterized by relatively high development of submerged aquatic vegetation, especially in summer and autumn, mainly in the coastal zone, a large sandy beach in the central part of the reservoir and a relatively shallow depth (in our studies up to 3 m). A moderate overgrowth of submerged aquatic vegetation stimulates the processes of self-purification of the lake, provides additional shelter for many species of aquatic invertebrates and thus contributes to their development. The worst structural characteristics were recorded for bottom macrofauna of the central part of the lake, where black silty soils with admixtures of detritus and residues were located. Species diversity indices of all three studied biotic communities (zoobenthos, zooperiphyton zoophytos) were similar, quantitative parameters were characterized by relatively high biomass, mainly due to the development of gastropods. Based on the saprobity, water in the lake was characterized as β - α -mezosaprobic. Based on TBI calculated based on the total macrofauna, lake water belonged to the category of "slightly contaminated" in the spring to "clean" and "clean enough" in the summer and fall, respectively.

Originality. The studies of the structural organization of benthic, periphyton and phytoplankton complexes of the Teremkivsky-3 pond based on quantitative parameters have been conducted and the ecological state of both individual groups of aquatic organisms and total macrofauna of the water body has been determined. The use of similarity indices allowed assessing the degree of species similarity of these macroinvertebrate groups and the originality assessment of each community type has been performed.

Practical value. Determining the environmental state of one of the ponds of the city of Kyiv will allow scientists to compare and track the status of other local water bodies in the dynamics of urban waters.

Keywords: Teremkivsky-3 pond, Nyvka river, invertebrate macrofauna, Shannon diversity, Woodiwiss index, saprobity water.

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 29-38
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.029>
УДК 639.373.8

УМЕНЬШЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕЛКОВОДНЫХ АКВАТОРИЙ СОЛОНАТОВОДНЫХ ЛИМАНОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РЫБ В САДКАХ В ПОЛИКУЛЬТУРЕ

П. В. Шекк, shekk@ukr.net, Одесский государственный экологический университет, г. Одесса

М. И. Бургаз, mary_vbr@mail.ru, Одесский государственный экологический университет, г. Одесса

Цель. Разработка технологии контролируемого выращивания морских рыб остается одним из приоритетных, стратегических направлений развития отечественной марикультуры. Особый интерес представляет изучение возможности использования при садковом выращивании поликультуры. Совместное выращивание нескольких видов рыб в одном садке, как показала практика рыбоводства, не дает ощутимого положительного эффекта. Вместе с тем, использование садков особой конструкции может обеспечить получение значительной дополнительной рыбной продукции, за счет использования добавочных объектов выращивания. Большое значение имеет экологическое состояние акваторий, где размещаются садки. Высокие плотности посадки рыб и использование искусственных кормов может служить источником мощного биогенного и органического загрязнения, что особенно актуально для мелководных акваторий со слабым водообменном.

Цель исследования — разработка методов совместного выращивания рыб в садковой марикультуре, способных обеспечить получение высоких объемов рыбной продукции и ослабить органическое загрязнение мелководных акваторий, где размещены садковые хозяйства.

Методика. Исследования проводили в 1999 и 2004 гг. В садках специальной конструкции (внутренний 10 м³ и внешний 18,75 м³), установленных в солонатоводном Шаболатском лимане, выращивали в поликультуре стальноголового лосося, кефаль пиленгас, бычков травника и кругляка.

В работе применялись методы, широко используемые в рыбохозяйственных исследованиях. Для экспресс-анализа гидрохимических параметров среды в местах установки садков использовали приборы: «ЭКТОТЕСТ-2000 Т» (O₂; NO⁻₂; NO⁻₃; NH⁺₄; CO₂; фосфаты, pH); термооксиметр «АЖА-101М» (Т °С; O₂); pH-метр-150 М; рефрактометр «АТАГО-100» (соленость, ‰, и плотность воды).

Результаты. Приведены результаты выращивания морских рыб в поликультуре в садках в условиях мелководного Шаболатского лимана. Показано, что совместное выращивание лососевых, кефалевых и бычковых рыб в садках специальной конструкции в условиях мелководных морских лиманов позволяет более полно использовать искусственные и природные корма, обеспечивает высокий выход товарной рыбы и получение значительной дополнительной продукции при уменьшении уровня загрязнения акватории, где установлены садки.

Научная новизна. Разработан оригинальный метод выращивания морских рыб в поликультуре в садках особой конструкции. Экспериментально показана перспектива выращивания в поликультуре лососевых, кефалевых и бычковых рыб. Предложенная технология обеспечивает высокую эффективность садковой марикультуры, получение

© П. В. Шекк, М. И. Бургаз, 2017

дополнительной товарной продукции за счет использования добавочных объектов, снижение уровня органического загрязнения мелководных акваторий, где размещены садковые хозяйства.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при организации садковой марикультуры в условиях мелководных приморских лиманов. Формирование поликультуры морских рыб в садках специальной конструкции повысит эффективность выращивания, снизит затраты корма и уменьшит загрязнение акваторий.

Ключевые слова: мелководные лиманы, садки специальной конструкции, поликультура морских рыб, дополнительная продукция, органическое загрязнение.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Садковое рыбоводство — одно из перспективных направлений марикультуры, характеризующееся высокой рентабельностью производства при относительно низких капитальных затратах. Выбор объектов и методов выращивания определяет их технологичность, толерантность к условиям выращивания, наличие адекватных искусственных кормов и спрос на рынке.

В Средиземноморье садковая марикультура развивается быстрыми темпами с середины 80-х гг. XX ст. За последнее десятилетие объемы производства выросли с 34 до 137 тыс. т. (85% общего объема производства марикультуры). Основные объекты выращивания — лаврак (*Dicentrarchus labrax*) и дорадо (*Sparus aurata*). Перспективны для садкового рыбоводства в средиземноморском бассейне — лососевые, некоторые виды спаровых, тюрбо, голубой тунец и др. [1].

В Черноморском регионе Турции наиболее распространено выращивание радужной форели в морских садках, установленных как в прибрежных районах, так и в открытом море. В 80–90-х гг. XX ст. экспериментальные работы по выращиванию радужной форели, стальноголового лосося и осетровых в садках проводились у побережья Крыма, Кавказа, северо-западного Причерноморья и в Азовском море [2].

Перспективный объект садковой марикультуры — кефаль пиленгас. Экспериментальное выращивание этого эврибионтный вида в Керченском проливе, Молочном, Шаболатском и Хаджибейском лиманах показало, что пиленгас быстро адаптируется к условиям неволи, охотно питается искусственными кормами и быстро растет. Выход товарной продукции (двухлеток пиленгаса) средней навеской 0,3 кг при садковом выращивании в воде соленостью 16–18‰ составит 10 кг/м³, трехлеток средней массой 1,0–1,5 кг — 15 кг/м³ [3].

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕРЕШЕННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработка технологии контролируемого выращивания морских рыб остается одним из важных, стратегических направлений развития отечественной марикультуры. Большое значение при этом имеет экологическое состояние акваторий, где размещаются садки. Высокие плотности посадки рыб и использование искусственных кормов могут быть источником биогенного и органического загрязнения, то есть способствуют эвтрофикации, что особенно

актуально для мелководных акваторий со слабым водообменном.

Цель исследования — разработка методов совместного выращивания рыб в садковой марикультуре, способных обеспечить получение высокой рыбной продукции и ослабить органическое загрязнение мелководных акваторий, где размещены садковые хозяйства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводили в 1999 и 2004 гг. на базе Экспериментального кефалевого завода (ЭКЗ) Дирекции производственно-исследовательских экспериментальных рыбоводных объектов управления «Одессарыбвод» (ДВЕРОУ «Одессарыбвод») и рыбоводника Хозрасчетного межотраслевого объединения (ХТМО). Садки устанавливали в юго-западной части Шаболатского лимана с глубинами 2,4–2,6 м и в бассейне-накопителе зимовального комплекса ЭКЗ в Аккембетском заливе лимана (с. Беленькое) при глубине 2,0–2,4 м. Объектом исследования служили: стальноголовый лосось *Oncorhynchus mykiss*; кефаль пиленгас *Liza hematocheilus*; бычки: кругляк *Neogobius melanostomus* и травник *Zosterisessor ophiocephalus*.

Использовали стационарные садки из капроновой дели, вставлявшиеся один в другой (рис. 1). Размер малого (внутреннего садка) — $2,5 \times 2,0 \times 2,0$ м (10 м^3), большого (внешнего) — $3 \times 2,5 \times 2,5$ м ($18,75 \text{ м}^3$). Размер ячеи садков увеличивался от 6 мм в начале выращивания до 10–12 мм в конце.

Рис. 1. Устройство садка для выращивания морских рыб в поликультуре

Рыбопосадочным материалом служили сеголетки и годовики стальноголового лосося, кефали пиленгаса, полученные от искусственного воспроизводства на лососевом участке ЭКЗ и в питомнике ХТМО. Бычков кругляка и травника вылавливали в прибрежной зоне лимана мальковой волокушей. В работе применялись методы, широко используемые в рыбохозяйственных исследованиях [4–5]. Для экспресс-анализа гидрохимических параметров среды в местах установки садков использовали приборы: «ЭКОТЕСТ-2000 Т» (O_2 ; NO_2^- ; NO_3^- ; NH_4^+ ; CO_2 ; фосфаты; pH); термооксиметр «АЖА-101М» (T , $^{\circ}\text{C}$; O_2); pH-метр-150 М; рефрактометр «АТАГО-100» (соленость, ‰, и плотность воды).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для лучшего использования кормового ресурса и повышения выхода готовой продукции при садковом выращивании использовался принцип поликультуры — совместного выращивания нескольких видов рыб, отличающихся друг от друга спектром питания. Важным при этом является подбор основных и добавочных объектов выращивания. С позиций экологии, садковые хозяйства служат источником биогенного и органического загрязнения водоемов. Плотные посадки выращиваемых рыб и их интенсивное кормление искусственными кормами увеличивают количество органических веществ в водоеме, где располагаются хозяйства, то есть способствуют его эвтрофикации [6–7]. В нашем случае специальная конструкция садков и подбор объектов поликультуры должны также обеспечить уменьшение органического загрязнения акватории.

В ходе исследования проведено две серии экспериментов (рис. 2). В первом варианте в качестве основного объекта выращивания использовали годовиков стальноголового лосося (внутренний садок). Добавочными объектами служили пиленгас и бычки (внешний садок). В третьем и четвертом экспериментах основным объектом выращивания были годовики кефали пиленгаса (внешний садок), а добавочным объектом выращивания служили бычки (внутренний садок).

Рис. 2. Схема эксперимента по садковому выращиванию рыб в поликультуре

В период выращивания в садках в моно- и поликультуре пиленгаса и стальноголового лосося — основных объектов поликультуры — кормили дважды в сутки гранулированными кормами. Суточный рацион уменьшался от начала до конца выращивания с 8,0 до 3,5% от массы тела рыб. Для кормления лосося использовали искусственный корм РГМ-5В. Пиленгаса в период выращивания в садках кормили (как основной объект поликультуры) дважды в сутки пастообразным кормом (карповый комбикорм — 40,0–45,0%; фарш из атерины и шпрота — 35,0–40,0%; отходы зерновых — 10,0–15,0%; шрот подсолнечный — 5,0–10,0%; мясокостная мука — 5,0–7,7%; премикс — 1,0%).

Выращивание лосося проводили с марта по июль. Основные параметры среды в период выращивания представлены в табл. 1.

Таблица 1. Параметры среды в период выращивания лосося в садках, установленных в Аккембетском заливе Шаболатского лимана

Показатели*	Месяцы				
	III	IV	V	VI	VII
Температура, °C	<u>7,2</u> 5,3-9,4	<u>11,0</u> 7,7-14,5	<u>13,5</u> 9,0-16,5	<u>17,5</u> 14,4-18,8	<u>19,6</u> 16,5-20,5
Соленость, ‰	<u>9,5</u> 7,8-10,7	<u>9,2</u> 7,5-11,0	<u>8,7</u> 7,0-10,2	<u>10,2</u> 8,5-11,6	<u>10,3</u> 9,0-11,0
Содержание O ₂ , мг/дм ³	<u>8,4</u> 6,5-8,9	<u>7,0</u> 6,5-7,3	<u>6,8</u> 6,5-7,2	<u>6,0</u> 5,8-6,2	<u>5,8</u> 5,5-6,0

Примечание. В числителе — средние, в знаменателе — max-min значения.

В экспериментальный внутренний садок в качестве основного объекта выращивания сажали годовиков стальноголового лосося массой 40–60 г. Плотность посадки составляла 80–90 экз./м³. В качестве объектов поликультуры во внешний садок сажали годовиков кефали пиленгаса и бычка-кругляка, средняя масса которых соответственно составляла 20–25 и 4–5 г, а плотность посадки — 85 и 100 экз./м³. Контрольный садок (рис. 2) зарыбляли годовиками стальноголового лосося; размеры и плотность посадки соответствовали аналогичным показателям экспериментального садка.

При одинаковой плотности посадки и начальной массе посадочного материала рост лосося и выход товарной продукции в поликультуре был несколько выше, чем в монокультуре (табл. 2). Благодаря этому выход лосося при выращивании в поликультуре составил 64,46 кг, а относительная продукция — 6,65 кг/м³, а при выращивании в монокультуре, при прочих равных условиях (вид корма, рацион, плотность посадки и начальная масса годовиков), эти показатели составили соответственно 56,2 кг и 5,62 кг/м³. В первом эксперименте за счет поликультуры (во внешнем садке) было выращено дополнительно 57,15 кг пиленгаса (6,36 кг/м³) и 8,55 кг (0,96 кг/м³) бычка-кругляка (табл. 2).

Таблица 2. Результаты садкового выращивания рыб в условиях Шаболатского лимана в моно- и поликультуре

Виды	W ₀ , г	W _t , г	Плотность посадки, экз./м³	Выжи- вание, %	Период выращива- ния, суток	Продукция,	
						Общая, кг	Относи- тельная, кг/м³
Поликультура							
Лосось	35,5±4,9	115,0±16,7	95	88		66,46*	6,65
Пиленгас	22,0±7,3	105,0±15,8	85	90	135	57,15**	6,36
Бычки	4,5±1,3	14,5±3,8	100	95		8,55**	0,96
Монокультура							
Лосось	35,5±4,9	105,0±12,5	95	85	135	56,2*	5,62

Продолжение табл. 2

Виды	W ₀ , г	W _t , г	Плотность посадки, экз./м ³	Выжи- вание, %	Период выращива- ния, суток	Продукция,	
						Общая, кг	Относи- тельная, кг/м ³
Поликультура							
Пиленгас	25,5±4,5	346,5±21,6	200	90	215	577,80*	57,78
Бычок- кругляк	5,2±1,5	15,7±4,2	150	80		11,34**	1,26
Бычок- травник	6,3±0,9	18,5±4,3	100	92		10,10**	1,12
Монокультура							
Пиленгас	25,5	325,5±19,4	200	92	215	552,00*	55,20

Примечание. * в расчете на 10 м³; ** — в расчете на 8,75 м³.

Таким образом, выращивание лосося в поликультуре с пиленгасом и бычками обеспечило суммарный выход продукции товарной рыбы из одного садка — 132,3 кг (13,97 кг/м³), в то время как в монокультуре с одного садка было получено всего 56,2 кг товарного лосося (5,62 кг/м³). Исследование питания показало, что в период выращивания рацион лосося, при обеих вариантах выращивания, на 85–90% состоял из гранулированного корма. Остальная часть (10–15%) приходилась на долю креветки, атерины, бычков и некоторых других кормовых организмов. В питании пиленгаса остатки искусственного корма достигали 25%, обрастания — 15–25%, детрит — 40–45%, полихеты, амфиподы и др. организмы — 15–20%. Рацион бычков включал: 40–45% остатков искусственного корма, 23–35% ракообразных (идотеи, амфиподы, креветка), полихет, моллюсков и др. организмов и 5–15% рыбы (атерина, бычки).

Выращивание пиленгаса в поликультуре с бычками кругляком и травником проходило в юго-восточной части лимана. Средняя температура воды колебалась от 10,2 до 22,5°C, соленость — 15,2–17,7‰, кислородный режим был благоприятный (табл. 3).

Общий урожай кефали при выращивании в поликультуре составил 577,8 кг (57,78 кг/м³). Дополнительная продукция бычков за тот же период составила: травника — 11,34 кг (1,26 кг/м³) и кругляка — 10,10 кг (1,12 кг/м³).

Таблица 3. Параметры среды в период выращивания пиленгаса в садках, установленных в юго-западной части Шаболатского лимана

Показатели*	Месяцы						
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Температура, °C	<u>10,2</u> 8,3–12,8	<u>16,5</u> 9,6–18,5	<u>20,6</u> 19,4–22,5	<u>21,6</u> 19,8–23,6	<u>22,5</u> 20,1–28,7	<u>19,2</u> 17,4–21,5	<u>15,3</u> 12,5–17,8
Соленость, ‰	<u>15,7</u> 14,3–16,6	<u>16,6</u> 15,2–17,4	<u>15,2</u> 14,6–17,0	<u>16,8</u> 16,0–18,5	<u>17,2</u> 16,5–18,7	<u>17,6</u> 16,0–19,0	<u>16,0</u> 15,5–16,2
Содержание O ₂ , мг/дм ³	<u>6,9</u> 6,2–7,0	<u>5,9</u> 5,6–6,2	<u>5,4</u> 5,0–5,7	<u>5,3</u> 4,5–5,2	<u>5,1</u> 4,2–5,4	<u>5,5</u> 5,0–5,7	<u>6,0</u> 5,9–6,3

Примечание. В числителе — средние, в знаменателе — max-min значения.

Рацион пиленгаса практически полностью состоял из искусственного корма (90–95%). Доля обрастаний и других организмов не превышала 5–10%. Бычки питались в основном остатками искусственного корма (32–45%), идотейми, амфиподами (20–32%), креветкой (5–9%), полихетами (7–12%). Важный компонент питания — рыба (атерина и бычки). В питании кругляка рыба не превышала 7–8%, у травника — 15–20%. Интересно, что в желудках травника часто встречался бычок-кругляк. Очевидно, этим и объясняется сравнительно более низкий выход этого вида (табл. 3). Таким образом, суммарная продукция кефали и бычков при выращивании в поликультуре составила 599,24 кг. При выращивании кефали пиленгаса в монокультуре было получено 552,00 кг товарной рыбы.

При садковом рыбоводстве в мелководных водоемах, таких как Шаболатский лиман, существует проблема органического загрязнения акватории размещения садков. Результаты гидрохимического исследования донных осадков показали, что выращивание морских рыб в поликультуре по предлагаемой технологии значительно снижает органическое загрязнение (табл. 4).

Таблица 4. Характеристика донных отложений в районе установки садков в Шаболатском лимане (по данным гидрохимической лаборатории Одесского областного управления экологической безопасности)

Показатели	Вариант 1			Вариант 2		
	Садок 1	Садок 2	Контроль	Садок 1	Садок 2	Контроль
Р орг., мг/дм ³	<u>0,022–</u> <u>0,881</u> 0,027	<u>0,063–1,072</u> 0,047	<u>0,032–0,940</u> 0,055	<u>0,025–1,054</u> 0,062	<u>0,065–1,175</u> 0,073	<u>0,05–0,872</u> 0,055
N орг., мг/дм ³	<u>1,85–9,18</u> 6,50	<u>2,44–10,15</u> 9,25	<u>1,57–8,12</u> 5,35	<u>1,55–9,95</u> 7,16	<u>3,15–11,01</u> 10,89	<u>1,67–8,85</u> 3,76
ПО, мг О/дм ³	<u>4,55–12,45</u> 8,75	<u>8,65–15,85</u> 11,18	<u>4,32–12,88</u> 8,12	<u>6,22–11,87</u> 9,67	<u>9,55–16,56</u> 12,35	<u>6,45–10,65</u> 8,12

При выращивании в поликультуре, как в первом, так и во втором варианте опыта, состояние донных осадков было близким к фоновому. Использование монокультуры приводило к заметному повышению органического загрязнения донных отложений.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Проведенные исследования показали высокую эффективность использования садков специальной конструкции для выращивания морских рыб в поликультуре. Аналогичные результаты были получены при садковом выращивании пресноводных рыб в поликультуре с использованием пространственного изолирования [8]. Такая технология позволяет получать значительную дополнительную рыбную продукцию за счет использования добавочных объектов выращивания. Как было показано ранее, выращивание в одном садке кефалей, карпа и толстолобика оказалось малоэффективным в результате возникающей пищевой конкуренции [9]. Кроме дополнительной рыбной продукции, использование пространственно изолированных садков при выращивании

морских рыб в поликультуре по предлагаемой технологии значительно снижает органическое загрязнение донных отложений, что имеет большое значение для мелководных непроточных водоемов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Cardia F., Lovatelli A. Обзор садковой аквакультуры: Средиземное море // Садковая аквакультура. Региональные обзоры и всемирное обозрение: Технический доклад ФАО по рыбному хозяйству. № 498/ред. Halwart V. M., Soto D., Arthur J. R. //Рим: ФАО, 2010. С. 167—198.
2. Туркулова В. И. Опыт и перспективы развития морского садкового рыбоводства в Украине//Проблеми розвитку морської та прісноводної аквакультури: Міжнар. конф., 11 черв. 2008 р.: матер. Керч: ПівденНІРО. С. 125—132.
3. Шекк П. В. Товарне вирощування морських риб в ставках і садках//Рибогосподарська наука України. 2011. № 3(17). С. 70—76.
4. Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях. Москва: Наука, 1974. 250 с.
5. Пряхин Ю. В., Шницкий В. А. Методы рыбохозяйственных исследований. Краснодар: Кубанский госуниверситет, 2006. 214 с.
6. Михеев В. П., Михеева И. В., Михеев П. В. Влияние на рыбоводные процессы локального загрязнения акваторий садковыми хозяйствами//Первый конгресс ихтиологов России: тезисы докл. Москва, 1997. С. 289.
7. Михеев В. П. Садковое выращивание товарной рыбы. Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1982. С. 10—11.
8. Использование пространственного изолирования при садковом выращивании рыбы в поликультуре/Карачев Р. А. и др.//Проблемы аквакультуры: Междунар. науч.-практ. конф. по аквариологии: матер. Москва, 2007. Т. 2. С. 48—56.

REFERENCES

1. Cardia, F., & Lovatelli, A. (2010). Obzor sadkovoy akvakul'tury: Sredizemnoe more. Sadkovaya akvakul'tura – Regional'nye obzory i vseмирное obozrenie. *Tekhnicheskij doklad FAO po rybnomu khozyaystvu*, 498. Halwart, V. M., Soto, D., & Arthur, J. R. (Eds.). Rim: FAO, 167-198.
2. Turkulova, V. I. (2008). Opyt i perspektivy razvitiya morskogo sadkovogo rybovodstva v Ukraine. Problemy rozvytku morskoi ta prysnovodnoi akvakultury, 11 cherv. 2008 r. Mizhnar. konf.: mater. Kerch: PivdenNIRO, 125-132.
3. Shekk, P. V. (2011). Tovarne vyroshchuvannia morskyykh ryb v stavkakh i sadkakh. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 3(17), 70-76.
4. *Metodicheskoe posobie po izucheniyu pitaniya i pishchevykh otnosheniy ryb v estestvennykh usloviyakh.* (1974). Moskva : Nauka.
5. Pryakhin, Yu. V., & Shnitskiy, V. A. (2006). *Metody rybokhozyaystvennykh issledovaniy*. Krasnodar, Kubanskiy gosuniversitet.
6. Mikheev, V. P., Mikheeva, I. V., & Mikheev, P. V. (1997). Vliyanie na rybovodnye protsessy lokal'nogo zagryazneniya akvatoriy sadkovymi khozyaystvami. *Pervyy kongress ikhtiologov Rossii*. Moskva.
7. Mikheev, V. P. (1982). *Sadkovoe vyrashchivanie tovarnoy ryby*. Moskva : Legkaya i pishchevaya promyshlennost'.

8. Karachev, R. A., Vlasov, V. A., Labenets, A. V., & Lippo, E. V. (2007). Ispol'zovanie prostranstvennogo izolirovaniya pri sadkovom vyrashchivaniy ryby v polikulture. *Problemy akvakul'tury: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. po akvareologii: mater. T. 2*. Moskva, 48-56.

ЗМЕНШЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІЛКОВОДНИХ АКВАТОРІЙ СОЛОНУВАТОВИДИХ ЛИМАНІВ ЗА ВИРОЩУВАННЯ РИБ В САДКАХ В ПОЛІКУЛЬТУРІ

П. В. Шекк, Shekk@ukr.net, Одеський державний екологічний університет,
м. Одеса

М. І. Бургаз, mary_vbr@mail.ru, Одеський державний екологічний університет,
м. Одеса

Мета. Розроблення технології контрольованого вирощування морських риб залишається одним із пріоритетних, стратегічних напрямків розвитку вітчизняної марикультури. Особливий інтерес становить вивчення можливості використання при садковому вирощуванні полікультури. Спільне вирощування декількох видів риб в одному садку, як показала практика рибиництва, не дає відчутного позитивного ефекту. Разом з тим, використання садків особливої конструкції може забезпечити отримання значної додаткової рибної продукції, за рахунок використання додаткових об'єктів вирощування. Велике значення має екологічний стан акваторій, де розміщуються садки. Високі щільності посадки риб і використання штучних кормів можуть служити джерелом потужного біогенного і органічного забруднення, що особливо актуально для мілководних акваторій зі слабким водообміном.

Мета дослідження — розроблення методів спільного вирощування риб в садковій марикультурі, здатних забезпечити отримання високих обсягів рибної продукції і послабити органічне забруднення мілководних акваторій, де розміщені садкові господарства.

Методика. Дослідження проводили в 1999 і 2004 рр. У садках спеціальної конструкції (внутрішній — 10 м³ і зовнішній — 18,75 м³), встановлених в солонуватому Шаболатському лимані, вирощували в полікультурі стальноголового лосося, кефаль піленгас, бичків трав'яника і кругляка.

У роботі застосовувалися методи, широко використовувані в рибогосподарських дослідженнях. Для експрес-аналізу гідрохімічних параметрів середовища в місцях установки садків використовували прилади: «ЕКОТЕСТ-2000 Т» (O₂; NO₂; NO₃; NH₄⁺; CO₂; фосфати; рН); термооксиметр «АЖА-101М» (Т, °С; O₂); рН-метр-150 М; рефрактометр «АТАГО-100» (солоність, ‰, і густина води).

Результати. Наведено результати вирощування морських риб в полікультурі в садках в умовах мілководного Шаболатського лиману. Показано, що спільне вирощування лососевих, кефалевих і бичкових риб в садках спеціальної конструкції в умовах мілководних морських лиманів дозволяє більш повно використовувати штучні і природні корми, забезпечує високий вихід товарної риби і отримання значної додаткової продукції при зменшенні рівня забруднення акваторії, де встановлені садки.

Наукова новизна. Розроблено оригінальний метод вирощування морських риб в полікультурі в садках особливої конструкції. Експериментально показана перспектива вирощування в полікультурі лососевих, кефалевих і бичкових риб. Запропонована технологія забезпечує високу ефективність садкової марикультури, отримання додаткової товарної продукції за рахунок використання додаткових об'єктів, зниження рівня органічного забруднення мілководних акваторій, де розміщені садкові господарства.

Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані при організації садкової марикультури в умовах мілководних приморських лиманів. Формування

полікультури морських риб в садках спеціальної конструкції підвищить ефективність вирощування, знизить витрати корму і зменшить забруднення акваторій.

Ключові слова: мілководні лимани, садки спеціальної конструкції, полікультура морських риб, додаткова продукція, органічне забруднення.

REDUCING ORGANIC CONTAMINATION OF SHALLOW AREAS IN BRACKISH LAGOONS DURING REARING FISH IN CAGES IN POLYCULTURE

P. Shekk, Shekk@ukr.net, Odesa State Environmental University, Odesa

M. Burgaz, mary_vbr@mail.ru, Odesa State Environmental University, Odesa

Purpose. The development of the technology of the controlled rearing of marine fish remains one of the priority strategic trends of development of national mariculture. A study of the possibility of using polyculture for cage culture has a particular interest. Joint cultivation of several species of fish in the same cage, as practice of fish farming has demonstrated, does not have a tangible positive effect. At the same time, the use of cages of special design can provide significant additional fish products through the use of additional aquaculture objects. The ecological state of water areas, where the cages are located, is of great importance. High fish stocking density and the use of artificial feeds can serve as a source of powerful biogenic and organic pollution, which is especially important for shallow water areas with weak water exchange.

The purpose of the study is to develop the methods for joint fish production in cage mariculture capable to provide high fish production and to weaken organic pollution of shallow water areas where cage farms are located.

Methodology. The studies were conducted in 1999 and 2004. Cages of special design (internal 10 m³ and external 18.75 m³) installed in the brackish Shabolat Lagoon were used for rearing, steelhead trout, haarder, grass goby and round goby in polyculture.

The standard aquaculture research methods were used. For express-analysis of environment hydrochemical parameters in cage location area the following devices were used: "ECOTEST-2000 T" (O₂, NO₂, NO₃, NH₄, CO₂, phosphates, pH); termooksimetr "AJA-101M" (T; O₂); "pH meter-150 M); Refractometer "ATAGO-100" (salinity and water density).

Findings. The results of marine fish cultivation in cages in polyculture in the shallow Shabolat lagoon are presented. It has been shown that joint cultivation of salmon, mullet and gobies in specially designed cages in shallow marine lagoons allows using artificial and natural feeds more fully and provides a high yield of commercial fish that results in significant additional products with a decrease in pollution level of the water area where the cages are installed.

Originality. An original method for rearing marine fish in polyculture in specially designed cages has been developed. The perspective of culturing salmon, mullet and gobies in the polyculture has been demonstrated experimentally. The proposed technology ensures high efficiency of cage mariculture, allows getting additional production through the use of additional facilities and a reduction in the level of organic pollution in shallow water areas where cage farms are located.

Practical value. The results of the study can be used to create cage mariculture farms in shallow seaside lagoons. Creating marine fish polyculture in specially designed cages will increase the efficiency of cultivation, reduce feed costs and reduce pollution in shallow water areas.

Keywords: shallow lagoons, specially designed cages, marine fish polyculture, additional products, organic pollution.

ХАРАКТЕРИСТИКА 3-РІЧНИХ ПЛІДНИКІВ РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ, ВИРОЩЕНИХ В УМОВАХ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА «СЛОБОДА БАНИЛІВ»

П. Д. Мендришора, mendryshora@mail.ru, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

Г. А. Куріненко, annazakharenko@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

Мета. Проаналізувати результати вирощування та дати рибницько-біологічну характеристику трирічних плідників райдужної форелі, вирощеної за індустріальною технологією в умовах форелевого господарства «Слобода Банилів».

Методика. Вирощування проводили в басейнових умовах форелевого господарства «Слобода Банилів». Матеріалом для досліджень слугували трирічки райдужної форелі, отримані від ікри плідників осінньонерестуючої форми. Вирощування риб проводили в басейні площею 216 м², за густоти посадки 255 екз./м², згідно загальноприйнятої методики у форелівництві. Статистичну обробку матеріалу проводили в Microsoft Office Excel (2003). Аналіз величин виконано в системі абсолютних значень. Критеріями аналізу показників були їх середня величина та середнє відхилення ($M \pm m$), похибка (σ), показник мінливості (C_v). Годівлю риб проводили спеціалізованим кормом датського виробника «BioMar» (Данія) з високим вмістом протеїну (понад 40%).

Результати. Згідно з проведеними селекційно-племінними роботами щодо формування маточних стад райдужної форелі, виявлено, що плідники, вирощені в умовах індустріального господарства «Слобода Банилів», незважаючи на нестабільні умови вирощування характеризувалися помірним темпом росту та мали високі значення як продуктивних, так і репродуктивних ознак. Середній показник маси тіла самиць райдужної форелі у віці 3-х років становив 1282,5 г, плодючості — 3,48 тис. ікринок. Середній показник маси продукрованої ікри — 239,17 г, індивідуальні показники якої складали: за масою — 70,4 мг, діаметром — 4,58 мм.

Наукова новизна. Вперше проведено дослідження з формування маточних стад райдужної форелі із застосуванням аналізу фенотипових та продуктивних ознак в умовах господарства з нестабільним температурним та водним режимами.

Практична значимість. Результати проведеної роботи дозволять здійснювати відбір та формувати повноцінне маточне стадо, що характеризуватиметься високими показниками продуктивних та репродуктивних ознак.

Ключові слова: райдужна форель, маса тіла, довжина тіла, продуктивні, репродуктивні показники.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Історично склалося так, що форелівництво на території України бере свій початок в Українських Карпатах. Саме там в 1894–1896 р. був побудований перший форелевий завод. Упродовж наступних 50-ти років відбувався інтенсивний розвиток форелівництва в 1941 р. їх нараховувалося форелевих заводів більше десяти [1]. Ікру райдужної форелі завозили з Австрії, Угорщини, Чехословаччини, щорічна потужність цих заводів складала 12–15 млн мальків [2].

© П. Д. Мендришора, Г. А. Куріненко, 2017

В подальшому з метою відтворення райдужної форелі були реконструйовані в повносистемні господарства такі рибницькі заводи як «Шипот» та «Свалява», а з 70-х років ХХ ст. в даних господарствах були розпочаті роботи з акліматизації американської палії та севанської форелі гегаркуні [2, 3]. На території Європи формування полуляції даного виду відбувалося внаслідок гібридизації її різних форм (шаста, стальноголового лосося та власне райдужної форелі) [4, 5]. В умовах сьогодення в світовій аквакультурі виробництво товарної продукції райдужної форелі досягло значних обсягів. Так, за даними FAO, в 2008 р. в Данії було вирощено 31449 т, Франції — 32270 т, Німеччині — 22005 т, Італії — 37800 т, Норвегії — 75316 т, Англії — 13090 т, Чилі — 14911 т, Ірані — 91519 т [6, 7].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Після здобуття Україною незалежності у форелівництві, як і в аквакультурі в цілому, спостерігався значний спад виробництва товарної продукції. Дане явище пояснювалося скрутними соціальними та економічними чинниками, що склалися в той період. Однак в умовах сьогодення спостерігається частковий прогрес розвитку даної галузі. Задля її раціонального ведення та стабільного розвитку потрібно створити якісні продуктивні маточні стада, які повинні максимально задовольняти вимоги рибницьких господарств в здоровому життєстійкому посадковому матеріалі.

Разом з тим, численні фактори (високий рівень інбридингу, неконтрольоване схрещування різноманітних племінних груп риб тощо) призвели до поступового зменшення репродуктивних показників, погіршення племінних якостей і зниження резистентності риб до захворювань та несприятливих зовнішніх чинників довкілля.

Тому поєднання досліджень фенотипових та продуктивних ознак на теперішній час є передовим та необхідним напрямом у вітчизняному форелівництві.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Господарство «Слобода Банилів» розташоване у Вижицькому районі Чернівецької області. Джерелом водопостачання рибницьких басейнів є ґрунтові води басейну річки Черемош. Термічний режим в господарстві нестабільний: влітку вода в ставах прогрівається до 16–19°C, взимку — знижується до 2°C. Оскільки живлення джерела відбувається в основному за рахунок атмосферних осадів та танення снігу, для нього характерні сезонні коливання потужності, у зв'язку з чим водообмін в господарстві нестабільний, а в літні місяці буває на межі критичного для райдужної форелі.

Бонітування та відбір плідників проводили за 3 тижні до нересту. Оцінку плідників здійснювали на основі фенотипових ознак, що передбачає використання тільки здорових повноцінних особин без ушкоджень, вад розвитку та добре вгодованих. В нерестовій кампанії було використано тільки тих риб, які досягли статевої зрілості.

В робочому процесі самиць було поділено на три групи:

1 група — зрілі самиці з овально окресленим м'яким черевцем, в яких овуляція ікри відбулась і ікринки вільно витікають з генітального отвору.

2 група — самиці зрілі, черевце окреслене, досить м'яке, але ікринки овулювали не повністю, витікають, зіплені по дві–три разом.

3 група — самиці мають овальне черевце, проте туге на дотик, при масажних рухах відчувається, що ікринки не овулювали, дану групу у нересті використовували через 15 діб.

Екстер'єрна оцінка плідників проводилася за основними рибицько-іхтіологічними параметрами: масою та довжиною тіла за Смітом, довжиною тіла без хвостового плавця, довжиною тулуба, довжиною голови, найбільшою та найменшою висотою тіла, найбільшим та найменшим обхватом тіла [8, 9]. Проміри проводили сантиметровою стрічкою з точністю до 1 мм. Індивідуальне зважування здійснювали на електронних товарних терезах з точністю 1 г. Для дослідження використовували анестезовану рибу. За результатами вимірювань аналізували та визначали продуктивні характеристики плідників.

З метою визначення репродуктивних характеристик самиць було відібрано проби незаплідненої ікри, які були досліджені в лабораторних умовах. Загальну масу одержаної ікри визначали ваговим способом. Ікру фіксували 4%-вим розчином формаліну. Зважування ікри відбувалося на електронних терезах «Axis AD 500» третього класу точності. Діаметр ікри визначали з допомогою штангенциркуля з точністю 0,1 мм.

Відбір ікри від самиць здійснювали методом зіджування. Для цього самиць обережно брали таким чином, щоб нижня частина тіла межувала з поверхнею миски (ємність для відібраної ікри). Перша партія ікри стікала сама, решту зіджували, легкими рухами масажуючи черевце самиці.

Запліднення ікри здійснювали «напівсухим» способом. Знеклеювання заплідненої ікри виконували методом промивання чистою водою упродовж двох годин.

Годівлю риб проводили штучним кормом фірми «BioMar» рецептури Efish alfa 717, із вмістом протеїну 42%.

Розрахунки щодо необхідної кількості кормів проводили відповідно до таблиць раціонів, які розроблені виробником. В даних таблицях враховані показники індивідуальної маси риб та температура води на момент годівлі.

За місяць до нересту раціон плідників зменшували наполовину та годували риб двічі на тиждень, за 5 днів до нересту годівлю припинили. На щоденну повноцінну годівлю плідників переводили на другий день після відбору статевих продуктів.

Коефіцієнт вгодованості розраховували за Фультоном [10]. Статистичну обробку морфометричних показників проводили в Microsoft Office Excel (2003). Обробку даних параметрів ікри здійснювали з застосуванням комп'ютерної програми ROSP. Аналіз величин пластичних ознак виконано в системі абсолютних значень. Критеріями аналізу показників були їх середня величина та середнє відхилення ($M \pm m$), похибка (σ), показник мінливості (Cv) [11].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Упродовж всього онтогенезу швидкість росту риб постійно змінюється та є властивістю виду [12].

Самиці райдужної форелі у віці 3-х років, вирощені в басейнах за нестабільних умов індустриального господарства «Слобода Банилів» характеризувалися помірними показниками темпу росту. Так, середній показник маси становив 1282,5 г, з межами коливань від 1010 до 1550 г. Коефіцієнт варіабельності за даним показником склав 10,6%. Понад 55% зрілих самиць мали масу 1300–1500 г. Найменша кількість самиць була серед особин масою 1100–1200 г (рис. 1).

Рис. 1. Розподіл самиць райдужної форелі за масою

Середній показник довжини тіла за Смітом склав 46,3 см. Межі коливань склали від 43,0 см до 52,5 см. Коефіцієнт варіабельності був вдвічі меншим, ніж за масою тіла, та склав 5,2%.

У порівнянні з самицями, трирічні самці райдужної форелі за масою тіла були меншими на 31,3% (402,5 г). Середня маса їх складала 880,0 г, межі коливань — 720–1020 г, відповідно, показник мінливості становив 12,4%. Частка самців середньою масою 800–900 г, що є близькою до середнього показника у вибірці, була найбільшою та складала 40%. Крупні особини, середня маса яких перевищувала 1,0 кг, у вибірці становила 10% (рис. 2).

Рис. 2. Розподіл самців райдужної форелі за масою

За показником довжини тіла за Смітом самиці переважали самців на 9,5% (4,4 см). Тобто, довжина тіла за Смітом трирічних самців в середньому становила

41,9 см. Максимальна довжина тіла риб дорівнювала 44,0 см, мінімальна — 39,0 см. Показник мінливості за довжиною тіла був нижчим, ніж за масою, та становив 4,2%. Згідно з морфометричними промірами, самці мали більш прогонисте тіло та коротший тулуб, й відповідно, переважали самиць за показником прогонистості на 8,1%, однак поступалися за довжиною тулуба на 16,7% (табл. 1).

Таблиця 1. Продуктивна характеристика трирічних плідників райдужної форелі

Показники	Самиці (n=18)		Самці (n=10)	
	M±m	Cv	M±m	Cv
Маса тіла, г	1282,5±148,11	10,55	880,00±106,87	12,44
Довжина тіла за Смітом, см	46,3±2,43	5,25	41,90±1,76	4,20
Довжина тіла без с*, см	43,0±2,23	5,19	38,10±1,52	3,98
Довжина голови, см	10,2±1,05	10,25	10,10±0,94	9,28
Довжина тулуба, см	32,4±2,12	6,54	27,00±0,94	3,46
Обхват тіла, великий, см	27,9±2,11	7,59	25,60±0,68	2,71
Обхват тіла, малий, см	12,0±0,73	6,04	11,00±0,58	5,27
Висота тіла, велика, см	12,6±1,18	9,39	12,20±0,54	4,41
Висота тіла, мала, см	5,0±0,53	10,56	4,50±0,18	4,0
Індекс вгодованості	1,3±0,14	10,99	1,19±0,003	2,37
Індекс прогонистості	3,7±0,23	6,31	3,40±0,01	1,37
Індекс великоголовості	22,0±1,86	8,43	23,90±1,37	5,71

Примітка. * — довжина тіла без хвостового плавця.

Залежність динаміки росту та накопичення маси риб описується степеневим рівнянням $y = 2,8102x^{1,5958}$ у самиць та $y = 0,0190x^{2,7848}$ у самців і характеризується високим показником апроксимації — 0,4821 та 0,9618 відповідно (рис. 3).

Аналіз репродуктивних показників трилітніх самиць, вирощених у басейнах за нестабільних умов, показав, що їх плодючість була високою та в середньому складала 3,48 тис. ікринок, з межами коливань 2,20–5,16 тис. ікринок з високим показником коефіцієнта мінливості — 25,8%. Середній показник маси відцідженої ікри становив 239,7 г, з межами коливань від 135 г до 350 г. Середня робоча плодючість складала 3,5 тис. ікринок, з межами коливань від 2,3 до 5,2 тис. ікринок. За високих показників репродуктивних ознак, відповідно, відношення маси ікри до маси тіла становило 19,6%, що є високим показником для вперше нерестуючих особин (табл. 2).

Ікра райдужної форелі велика, бурштинового кольору з відтінком рожевого. Середній показник діаметра ікринок становив 4,58 мм. Максимальне значення — 4,89 мм, мінімальне — 4,16 мм. Коефіцієнт варіації складав 5,28%. Показники маси ікринок характеризувалися широкими межами коливань — від 49,0 мг до 95,1 мг, в середньому становлячи 70,4 мг (табл. 2).

ХАРАКТЕРИСТИКА 3-РІЧНИХ ПЛІДНИКІВ РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ, ВИРОЩЕНИХ В УМОВАХ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА «СЛОБОДА БАНИЛІВ»

Рис. 3. Взаємозалежність маси та довжини тіла трирічних плідників райдужної форелі: А — самиць, Б — самців

Таблиця 2. Репродуктивна характеристика трирічних самиць райдужної форелі

Показники	Трирічки (n=18)	
	M±m	Cv
Маса відцідженої ікри, г	239,17±52,35	21,9
Плодючість робоча, ікринок	3476,44±898,08	25,8
Плодючість відносна, ікринок	2718,00±643,86	23,7
Маса ікринки, мг	70,41±12,38	17,5
Діаметр ікринки, мм	4,58±0,24	5,3
Відношення маси ікри до маси тіла, %	18,65±3,66	19,6

Аналіз репродуктивних показників трирічних самців засвідчив високі результати. Об'єм еякуляту в середньому становив 9,0 см³, з межами коливань від 7,0 до 12 см³. Показник мінливості становив 12,0%.

Для порівняння, в умовах рибдільниці «Шипот», де джерелом водопостачання є річка «Шипот» і господарство можна віднести до категорії з нестабільним водопостачанням, самиці райдужної форелі, з яких сформоване селекційне стадо, та досягли статевої зрілості у трирічному віці, мають середні показники маси тіла 1450,8 г, довжини тіла за Смітом — 47,2 см, робочої плодючості — 3961,6 ікринок. Проте самці поступалися за вищеперерахованими показниками значною мірою. Середня маса трирічних самців за довжини тіла за Смітом 46,0 см складала 1212,8 г, що є на 27,4% вище [13, 14].

Отримання статистичних показників надало змогу проаналізувати, завдяки застосуванню математичного аналізу, залежність між показниками маси і довжини тіла та робочою плодючістю самиць. Згідно даних розрахунків, залежність робочої плодючості від маси тіла описується лінійним рівнянням та має низький показник достовірності апроксимації.

А

Б

Рис. 4. Залежність плодючості самиць райдужної форелі: А — від маси тіла; Б — від довжини тіла за Смітом

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Проведені селекційно-племінні роботи з формування маточних стад райдужної форелі з застосуванням аналізу фенотипових та продуктивних ознак засвідчили, що плідники райдужної форелі, вирощені в умовах індустриального господарства «Слобода Банилів», мали помірні показники як за продуктивними, так і за репродуктивними ознаками, та характеризувалися достатньою вгодованістю з високою оплатою корму. Середній показник маси самиць райдужної форелі у віці 3-х років складав 1282,5 г, плодючості — 3,48 тис. ікринок, продукрованої ікри — 239,17 г, при цьому середні показники ікри за масою складали 70,4 мг, за діаметром — 4,58 мм. У порівнянні з самицями, трирічні самці райдужної форелі за масою тіла були меншими на 31,3%, за показником довжини тіла за Смітом — на 9,5%. Згідно з результатами морфометричних промірів, самці мали більш прогонисте тіло та коротший тулуб й переважали самиць за показником прогонистості на 8,1%, однак поступалися за довжиною тулуба на 16,7%.

ЛІТЕРАТУРА

1. Протасов А. А. Ручьевая и радужная форель в прикарпатских районах УССР//Труды научно-исследовательского института озерно-речного рыбного хозяйства. 1949. № 6. С. 111—123.
2. Розведення форелі на Україні/Алтухтов К. О. та ін. Київ: Урожай, 1967. 80 с.
3. Галасун П. Т. Состояние и перспективы форелевого хозяйства на Украине//Рыбное хозяйство. 1968. Вып. 6. С. 14—28.
4. Schäperclaus W. Untersuchungen über die Formen der deutschen & Regenbogenforelle and ihre Leistungen bei der aufzucht durch Künstliche Fütterung//Anhandlungen aus der Fisch. 1949. I.
5. Schäperclaus W. Lehrbuch der Teichwirtschaft. Berlin und Hamburg: Verlag P. Parey, 1961. S. 594.
6. Божик В. Й., Бачук Є. О.Сучасний стан і перспективи розвитку форелівництва в західному регіоні України//Науковий вісник ім. С. З. Гжицького. 2014. Т. 16, №3 (60), ч. 3, С. 26—31.
7. Afshin A., Fahimeh B. Production and Supply of Rainbow Trout in Iran and the World//World Journal of Fish and Marine Sciences. 2013. N 5(3). P. 335—341.
8. Фермерське рибництво/Грициняк І. І. та ін. Київ, 2008. 560 с.
9. Комплексна технологія відтворення лососевих риб в рибницьких господарствах України/Мрук А. І. та ін. Київ: ІРГ НААНУ, 2015. 27 с.
10. Инструкция по физиолого-биохимическим анализам рыбы/Лиманский В. В. и др. Москва: ВНИИПРХ, 1984. 60 с.
11. Плохинский Н. А. Биометрия. Москва: Московский университет, 1981. 367 с.
12. Никольский Г. В. Частная ихтиология. Москва: Советская наука, 1950. 436 с.
13. Мрук А. І., Олексик В. І. Селекційно-племінна робота з райдужною фореллю в господарстві Шипот//Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. 2008. Т. 9, № 3 (34), ч. 3. С. 92—95.
14. Мрук А. І. Рибницько-біологічна характеристика райдужної форелі трирічного селекційного покоління F2, вирощуваної у ВАТ «Закарпатський рибокомбінат»//Рибогосподарська наука України. 2008. № 2. С. 56—60.

REFERENCES

1. Protasov A. A. (1949). Ruch'evaya i raduzhnaya forel' v prikarpatskikh rayonakh USSR. *Trudy nauchno-issledovatel'skogo instituta ozerno-rechnogo rybnogo khozyaystva*, 6, 111-123.
2. Altukhov, K. O., Galasun, P. T., Demchenko, I. F., & Ivasyk, V. M. (1967). *Rozvedennia foreli na Ukraini*. Kyiv: Urozhay.
3. Galasun, P. T. (1968). *Sostoyanie i perspektivy forelevogo khazyaystva na Ukraine*. *Rybnoe khazyaystvo*, 6, 14-28.
4. Schäperclaus, W. (1949). Untersuchungen über die Formen der deutschen & Regenbogenforelle and ihre Leistungen bei der aufzucht durch Künstliche Fütterung. *Anhandlungen aus der Fisch, I*.
5. Schäperclaus, W. (1961). *Lehrbuch der Teichwirtschaft*. Berlin und Hamburg: Verlag P. Parey.
6. Bozhyk, V. Y., Bachuk, Ye. O. (2014). Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku forelivnytstva v zakhidnomu rehioni Ukrainy. *Naukovyi visnyk im. S. Z. Hzhyskoho*, 16, 3 (60), 3, 26-31.
7. Afshin, A., & Fahimeh, B. (2013). Production and Supply of Rainbow Trout in Iran and the World. *World Journal of Fish and Marine Sciences*, 5(3), 335-341.
8. Hrytsyniak, I. I., Hrynzhevskiy, M. V., & Tretiak, O. M. et al. (2008). *Fermers'ke ribniistvo*. Kyiv.
9. *Rekomendatsii z rozvedennia ta vyroshchuvannia vysokoproduktyvnykh plemynnykh stad raiduzhnoi foreli*. (2011). Zatverdzheno protokolom № 1 vid 24.24.2011 Problemno-metodychnoi rady IRH NAAN. Kyiv.
10. Limanskiy, V. V., Yarzombek, A. A., Bekina, E. N., & Andronikov S. B. (1984). *Instruktsiya po fiziologo-biokhimiicheskim analizam ryby*. Moskva: VNIIPRKh.
11. Plokhinskiy, N. A. (1981). *Biometriya*. Moskva: Moskovskiy universitet.
12. Nikol'skiy, G. V. (1950). *Chastnaya ikhtiologiya*. Moskva: Sovetskaya nauka.
13. Mruk, A. I., & Oleksyk, V. I. (2008). Seleksiino-pleminna robota z raiduzhnoiu forelli v hospodarstvi Shypot. *Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S. Z. Hzhyskoho*, 9, 3 (34), 3, 92-95.
14. Mruk, A. I. (2008). Rybnytsko-biolohichna kharakterystyka raiduzhnoi foreli tryrichnoho seleksiinoho pokolinnia F2, vyroshchuvanoi u VAT «Zakarpatskyi rybokombinat». *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 56-60.

ХАРАКТЕРИСТИКА 3-ЛЕТНИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ, ВЫРАЩЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «СЛОБОДА БАНИЛОВ»

П. Д. Мендришора, mendryshora@mail.ru, Институт рыбного хозяйства НААН,
г. Киев

А. А. Куриненко, annazakharenko@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН,
г. Киев

Цель. Проанализировать результаты выращивания и дать рыбоводно-биологическую характеристику трехлетних производителей радужной форели, выращенной по индустриальной технологии в условиях форелевого хозяйства «Слобода Банилов».

Методика. Выращивание проводили в бассейновых условиях форелевого хозяйства «Слобода Банилов». Материалом для исследований послужили трехлетки радужной форели, полученные от икры осенненерестующей формы радужной форели. Выращивание проводили

в басейне площею 216 м², при щільності посадки 255 екз./м², згідно з загальноприйнятими методиками в форелеводстві. Статистичну обробку матеріала проводили в Microsoft Office Excel (2003). Аналіз величин виконано в системі абсолютних значень. Критеріями аналізу показателів виступали їх середня величина і середнє відхилення ($M \pm m$), похибність (σ), показник змінливості (Cv). Кормлення риб проводили спеціалізованим кормом данського виробника «BioMar» (Данія) з високим вмістом протеїну (більше 40%).

Результати. Згідно з проведеними селекційно-племенними роботами по формуванню маточних стад радужної форелі, виявлено, що виробники, вирощені в умовах індустриального господарства «Слобода Банілів», незважаючи на нестабільні умови вирощування, характеризувалися помірного темпу росту і мали високі значення як продуктивних, так і репродуктивних показників. Середнє значення показника маси самок радужної форелі в віці 3-х років становило 1282,5 г, плодовитості — 3,48 тис. ікринок. Середнє значення маси виробимої ікри — 239,17 г, при цьому індивідуальні показники по масі становили 70,4 мг, по діаметру — 4,58 мм.

Наукова новизна. Вперше проведено дослідження по формуванню маточних стад радужної форелі з аналізом фенотипічних і продуктивних ознак в умовах господарства з нестабільним температурним і водним режимом.

Практична значимість. Результати проведеної роботи дозволять провести відбір і сформувати повноцінне маточне стадо, характеризуючеся високими показниками продуктивних і репродуктивних ознак.

Ключові слова: радужна форель, маса тіла, довжина тіла, продуктивні, репродуктивні показники.

DESCRIPTION AGE-3 BROOD RAINBOW TROUT BRED IN THE CONDITIONS OF THE INDUSTRIAL FISH FARM "SLOBODA BANYLIV"

P. Mendryshora, mendryshora@mail.ru, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

H. Kurylenko, annazakharenko@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To analyze the results of cultivation and give fish-breeding and biological characteristics of age-3 brood rainbow trout grown using industrial technology in the conditions of the trout farm "Sloboda Banyliv."

Methodology. Fish cultivation was carried in tank conditions of the trout farm "Sloboda Banyliv". The material for the study were age-3 brood rainbow trout obtained from eggs of the fall-spawning form of rainbow trout. Cultivation was carried out in a 216 m² tank, stocking density of 255 fish/m², using standard trout culture methods. Statistical analysis of the material was performed in Microsoft Office Excel (2003). Analysis of the variables was performed in the system of absolute values. The analysis criteria were their mean values mean deviations ($M \pm m$), standard error (σ), variability coefficient (Cv). Fish were fed with specialized feed manufactured by "BioMar" (Denmark) with a high protein content (more than 40%).

Findings. Based on the performed selective-breeding works aimed at creating brood stocks of rainbow trout, it was found that brood fish reared in the industrial conditions of the fish farm "Sloboda Banyliv", despite instable culture conditions, were characterized by a moderate growth rate and had high values of productive and reproductive features. Mean weight of age-3 rainbow trout females was 1282.5 g, fecundity — 3.48 thousand eggs. Mean weight of produced eggs was 239.17 g, while individual parameters were 70.4 mg for the weight and 4.58 mm for the diameter.

Originality. For the first time a study aimed at the formation of brood stocks of rainbow trout with analysis of phenotypic and productive features in the conditions of a fish farm with instable temperature and water regimes has been conducted.

Practical value. The results of the performed work will allow selecting and forming a brood stock with high values of productive and reproductive features.

Keywords: rainbow trout, body weight, body length, productive, reproductive parameters.

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 49-59
 DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.049>
 УДК: 595.384.12:639.512

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА РАЦИОНА И УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ НА ПРОЯВЛЕНИЕ КАННИБАЛИЗМА У ВОСТОЧНОЙ ПРЕСНОВОДНОЙ КРЕВЕТКИ *MACROBRACHIUM NIPPONENSE* (DE HAAN, 1849)

П. В. Шекк, shekk@ukr.net, Одесский государственный экологический университет, г. Одесса

Ю. О. Астафуров, astafurov.yu@ukr.net, Одесский государственный экологический университет, г. Одесса

Цель. Изучить влияние состава диеты и течения на проявление каннибализма креветки *Macrobrachium nipponense* при выращивании в контролируемых условиях.

Методика. Материалом для работы служила молодь креветки длиной 2,0–3,5 см и массой 1,5–3,0 г, выловленная осенью 2016 г. в прудах низовьев р. Днестр. Креветок содержали в бассейнах рециркуляционной системы объемом 0,3 м³. Температурный режим, освещение (период и интенсивность) и другие параметры среды поддерживались в соответствии с заданными параметрами. Взвешивание креветок проводили на электронных весах AXISAD-50 с точностью до 0,001 г. Длину тела измеряли линейкой и штангенциркулем. В хронических опытах исследовали две группы креветок, содержащихся при плотности посадки 3 экз.·дм⁻³, при температуре 26–29°C и прочих равных условиях в бассейнах установок с замкнутым циклом водообеспечения. Креветок кормили по поедаемости. Рацион первой группы состоял из животной пищи (мотыль, рыба, кальмары, улитки, трубочник, артемия), второй — из растительной (злаки, овощи, шпинат, орехи, люцерна, рис, нут).

Во второй серии экспериментов креветок содержали в выростных бассейнах при плотности посадки 2 экз. дм⁻³ и соотношении $\sigma^{\circ} : \text{♀} = 1 : 4$. Рацион креветок состоял из животной и растительной пищи (1 : 1). В течение 30 дней эксперимента температуру воды поддерживали на уровне 26,0±0,5°C, фотопериод — 12 ч. свет, 12 ч. темнота.

Результаты. Креветки, получавшие животную пищу, росли быстрее. У 20% самок формировалась икра. Вместе с тем, их агрессивность была высока, что привело к потере в результате травм и каннибализма 40% особей. Креветки, получавшие растительную пищу, росли медленнее. Их конечная масса и размеры были достоверно ниже ($P > 0,95$), чем у креветок первой группы при близких начальных показателях. Созревание самок во второй группе не происходило. Вместе с тем, случаи агрессивного поведения были редки, а каннибализм не наблюдался, что обеспечило 100% выживание.

В бассейне №1 создавали боковое течение умеренной силы. Креветки образовывали разреженное скопление в центре бассейна, избегая течения, не занимали убежища, не охраняли свою территории и не проявляли агрессии друг к другу.

В бассейне №2, при прочих аналогичных условиях, боковое течение отсутствовало. Креветки распределялись по всему объёму бассейна, занимали убежища и охраняли свою территорию, были агрессивны по отношению к другим особям, часто вступая с ними в драки. При близких размерно-весовых характеристиках креветок в обоих вариантах выращивания (различия незначимы, $P < 0,95$) в первом случае отход не наблюдался, а во втором составлял 20%.

Научная новизна. Впервые показано, что состав диеты влияет на рост, поведение и выживание креветки *M. nipponense*. Использование кормов растительного происхождения снижает агрессивность и повышает выживание креветок. Животная пища повышает

© П. В. Шекк, Ю. О. Астафуров, 2017

интенсивность роста, обеспечивает созревание самок, но также увеличивает отход креветок в результате каннибализма.

Выращивание креветки в установке с боковым течением умеренной силы снижает травматизм и отход особей в результате агрессивного поведения, при близких размерно-весовых показателях.

Практическая значимость. Креветка *Macrobrachium nipponense* — перспективный объект аквакультуры в условиях юга Украины. Повышение выхода товарной продукции — важный аспект, обеспечивающий рентабельность производства. В связи с этим, разработка методов, позволяющих снизить агрессивность и повысить выживание креветок в условиях товарного выращивания, имеет важное практическое значение.

Ключевые слова: креветка *Macrobrachium nipponense*, пища растительная, животная, влияние течения, каннибализм, рост, выживание.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Восточная (японская) пресноводная креветка *Macrobrachium nipponense* встречается в пресноводных и солоноватоводных водоёмах Японии, Китая, Кореи, Тайваня, Вьетнама, в оз. Ханка на границе с Россией [1]. В 80-х годах XX в., как перспективный объект аквакультуры *M. nipponense* была акклиматизирована в Сингапуре, на Филиппинах [2, 4]. В 1960-х годах японская креветка использовалась для акклиматизации в водоемах-охладителях электростанций России, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, а в 1986 г. была интродуцирована из водохранилища-охладителя Березовской ГРЭС (Беларусь) в Кучурганское водохранилище (Молдова) [3, 8].

К концу прошлого столетия *M. nipponense* была акклиматизирована и успешно натурализовалась в Кучурганском водохранилище, где сформировала устойчивую популяцию, проникла в реки Турунчук и Днестр, распространившись по всей акватории от г. Тирасполь до Днестровского лимана [3, 4, 9]. Широкое распространение в бассейне р. Днестр, толерантность к неблагоприятным условиям среды, неприхотливость в питании, высокая стоимость и гастрономические качества делают японскую пресноводную креветку перспективным объектом для аквакультуры Украины.

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕРЕШЕННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Следует отметить, что методы индустриального культивирования *M. nipponense* разработаны недостаточно [3, 5, 8]. Для эффективного воспроизводства в контролируемых условиях необходимо решить ряд проблем, в первую очередь связанных с высокими плотностями посадки, вызывающими каннибализм [6].

Целью исследования являлось изучение влияния состава диеты и течения на проявление каннибализма креветки *Macrobrachium nipponense* при выращивании в контролируемых условиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для работы служила молодь креветки, выловленная осенью 2016 г. в рыбодонных прудах низовьев р. Днестр и доставленная в аквариальную

кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Одесского государственного экологического университета. Длина креветок колебалась от 2 до 3,5 см (в среднем — 2,8 см), масса — от 1,5 до 3,0 г (в среднем 2,2 г). Креветок разместили в бассейнах объемом 0,3 м³, объединенных в рециркуляционную установку, состоящую из блоков механической и биологической очистки и водоподготовки (насыщение кислородом, обеззараживание, терморегуляция и т. д.). Температурный режим и освещение (период и интенсивность) регулировались искусственно в соответствии с заданными параметрами. Взвешивание проводили на электронных весах AXISAD-50 с точностью до 0.001 г, длину измеряли линейкой и штангенциркулем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Креветка *M. nipponense* в нативном ареале обитает в температурном диапазоне от 10 до 30°C, оптимальный показатель жесткости воды *составляет* dH 5–10°, pH 6,4–7,4. Требовательна к кислородному режиму: содержание растворенного в воде кислорода должно быть не ниже 75–80% насыщения [1, 2, 7].

В бассейне Днестра, как показали проведенные исследования, японская *пресноводная* креветка приспособилась к обитанию в диапазоне температур от 2–4 до 28–30°C, солености — от 0 до 12–14‰, и pH — 7,4–8,2 [1–3, 8].

Половой зрелости достигает в возрасте 4–6 месяцев. Созревание и вынашивание икры проходит в диапазоне температуры 19–30°C. При температуре 28°C вынашивает икру 3–4 недели. В конце этого срока самка сбрасывает созревшую икру (диаметр до 1,5 мм) на грунт, где и происходит вылупление эмбрионов [8, 9].

Японская креветка агрессивна, охраняет свои укрытия и прилегающую территорию, при этом травмируется, теряет конечности и погибает [10]. Часто крупные особи поедают более мелких. Рассматривая причины усиления каннибализма и предлагаемые пути его ослабления (табл. 1), видим, что сила воздействия их на объект культивирования возрастает по мере интенсификации производства.

Таблица 1. Причины усиления агрессии и каннибализма при выращивании *M. nipponense* и возможные пути их ослабления

Снижают каннибализм	Повышают каннибализм	Причины
Избыток корма	Недостаток корма	Повышение агрессивности на фоне роста пищевой активности и конкуренции
Низкая плотность посадки	Высокая плотность посадки	Повышение вероятности встречи особей, уменьшение размеров охраняемой территории
Однородные по размеру группы	Разноразмерные группы	Разные сроки линьки, поедание крупными особями мелких, перелинявших

Продовження табл. 1

Снижают каннибализм	Повышают каннибализм	Причины
Однородная половая структура групп либо соотношение ♂ : ♀ — 1 : 3–1 : 5	Разнородные по половому составу группы (преобладание самцов)	Агрессивное поведение самцов по отношению к самкам
Снижение температуры воды	Повышение температуры воды	Повышение активности и возрастающая частота встреч особей
Увеличение светового периода	Уменьшение светового периода	
Наличие укрытий	Отсутствие или недостаток укрытий	Защита от нападения и травм, убежища для отстающих в росте, линяющих и травмированных особей

Комплекс биотехнических мероприятий, направленных на повышение выхода товарной продукции при выращивании креветки, включает ряд традиционных методов, которые не всегда эффективны. Поэтому необходим поиск новых технологий направленных на ослабления каннибализма.

Одно из таких направлений — изучение влияния характера диеты на проявление агрессии и каннибализма. В хронических опытах исследовали две группы креветок, содержащихся при сходных условиях (табл. 2), но питавшихся разной по составу пищей. Корм задавали по поедаемости. Рацион первой группы состоял из животной пищи: мотыль, рыба, кальмары, улитки, трубочник, артемия, второй — из растительной пищи: злаки, овощи, шпинат, орехи, люцерна, рис, нут.

Креветки, получавшие животную пищу росли быстрее (рис. 1), у 20% самок формировалась икра. Вместе с тем, их агрессивность была высока, что привело к потере в результате травм и каннибализма 40% особей.

Длина, см

Рис. 1. Линейный рост креветок *M. nipponense* при выращивании на животном (1 ряд) и растительном (2 ряд) рационе

Таблица 2. Параметры среды при выращивании креветки в хроническом эксперименте

Показатели	Температура воды, °C		Содержание растворенного кислорода, min-max		pH min-max	Освещенность, свет/темнота	Сумма теплоскопления, градусо-дней	Период выращивания, суток	Минерализация, мг·дм ⁻³
	min	max	мг·дм ⁻³	%					
	26,0	29,0	5,01–5,79	91–105	7,8–8,0	10 : 14	4107	159	0,253

Таблица 3. Основные параметры выращивания креветки

Состав рациона	Рацион, % от массы	Длина, см		Масса, г		Выживание, %	Созревание ♀, % от общего числа особей	Обеспеченность укрытиями, %	Плотность посадки, экз·дм ⁻³	n
		Начальная	Конечная	Начальная	Конечная					
*Животная пища	45–30	1,8±0,18	5,2±0,19	0,80±0,02	4,60±0,08	100	–	100	3	210
**Растительная пища		1,9±0,02	4,6±0,17	0,84±0,09	3,90±0,07	60	20	100	3	215

Примечания. * — мотыль, рыба, кальмары, улитка, трубочник, артемия;

** — злаки, овощи, шпинат, орехи, люцерна, рис, нут.

Креветки, получавшие растительную пищу, росли хуже. Их конечная масса и размеры были достоверно ниже ($P > 0,95$), чем у креветок первой группы, при близких начальных показателях (рис. 1, 2). Созревание самок во второй группе не наблюдалось.

Масса, г

Рис. 2. Динамика массы креветки *M. nipponense* при выращивании на животном (1 ряд) и растительном (2 ряд) рационе

Вместе с тем, случаи агрессивного поведения были редки (потеря клешни у единичных особей), а каннибализм не наблюдался, что обеспечило 100% выживание (табл. 3).

Полученные результаты показали, что различные по составу диеты влияют на рост, поведение, и созревание креветок. Рацион, состоящий полностью из животной пищи стимулирует рост и созревание креветок, но при этом повышается их агрессивность, что неизбежно приводит к массовому каннибализму и снижению выживания. Растительный рацион замедляет рост и развитие, однако снижает агрессивность креветок и повышает выход, что позволяет увеличивать плотность посадки.

Во второй серии экспериментов исследовали влияние на проявление каннибализма у креветок интенсивности и направленности течения. Молодь креветки *M. nipponense* содержали в выростных бассейнах объемом 3 м³ при плотности посадки 2 экз./дм³ и соотношении ♂ : ♀ 1 : 4. Рацион креветок во время эксперимента включал животную и растительную пищу (50 : 50%). В течение 30 дней эксперимента температуру воды поддерживали на уровне 26,0±0,5°C, фотопериод — 12 ч. Свет : 12 ч. темнота.

В бассейне № 1 создавали боковое течение умеренной силы (рис. 3). Креветки образовывали разреженное скопление в центре бассейна, не проявляли агрессии друг к другу и не охраняли свою территорию.

В бассейне № 2, при прочих аналогичных условиях, боковое течение отсутствовало. Креветки распределялись по всему объёму бассейна, занимали и охраняли свою территорию, были агрессивны по отношению к другим особям, часто вступая с ними в драки.

Рис. 3. Схема воздействия бокового течения в рециркуляционной установке на креветок

Размерно-весовые характеристики креветок при обоих вариантах выращивания были близкими (рис. 4 и 5). Различия линейного и весового роста особей незначимы ($P < 0,95$).

В установке № 1 отход не наблюдался, у 10% особей отмечены повреждения клешни. В установке № 2 до 35% креветок имели травмы разной степени тяжести, а отход составил 20%.

Масса, г

Продолжительность эксперимента, сутки

Рис. 4. Динамика линейного роста *M. nipponense* в установке с использованием бокового течения (1) и без него (2)

Масса, г

Продолжительность эксперимента, сутки

Рис. 5. Динамика массы *M. nipponense* при выращивании в установке с использованием бокового течения (1) и без него (2)

Умеренная сила течения и его направленность (по периферии ёмкости) заставляет креветок формировать группу и ориентироваться в направлении против движения водных масс. Энергетические затраты при этом очевидно невысоки, о чем свидетельствуют сопоставимые размерно-весовые характеристики. Вместе с тем, формирование слабого потока воды в выростных ёмкостях снижает агрессивность креветок, уменьшает травматизм и отход.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Состав диеты при выращивании креветок *M. nipponense* влияет на их рост, поведение и выживание. Использование кормов растительного происхождения снижает агрессивность и повышает выживание креветок, но замедляет рост и формирование икры. Кормление исключительно животной пищей повышает интенсивность роста, обеспечивает созревание самок, но увеличивает отход в результате каннибализма.

Выращивание креветки в установке с боковым течением умеренной силы снижает травматизм и отход особей в результате агрессивного поведения, при близких размерно-весовых показателях роста.

ЛИТЕРАТУРА

1. Биологическое обоснование вселения субтропических пресноводных креветок *Macrobrachium nipponense* в водоем-охладитель Березовской ГРЭС/Хмелева Н. Н. и др.; Институт зоологии АН БССР. Минск, 1982. 33 с. Деп. в ВИНТИ 30.09.82, № 5014-82//Весці АН БССР. 1983. № 2. С. 119. (Сер.: Біял. навукі).
2. Экология пресноводных креветок/Хмелева Н. Н. и др. Минск: Беларус. навука, 1997. 254 с.
3. Свицкий В. Г., Рачек Е. И., Андреева И. Н. Результаты вселения пресноводной креветки *Macrobrachium nipponense* (De Haan) в водоем-охладитель Приморской ГРЭС//Изв. Тихоок. НИИ рыбн. х-ва и океаногр. 1994. Т. 113. С. 151—153.
4. Гигиняк Ю. Г., Алехнович А. В., Кулеш В. Ф. Результаты интродукции субтропической пресноводной креветки *Macrobrachium nipponense* (De Haan) в водоем-охладитель Березовской ГРЭС (Беларусь)//VII Всерос. конф. по промысловым беспозвоночным (памяти Б. Г. Иванова), Мурманск, 9—13 окт. 2006 г.: тезисы докл./ВНИРО. Москва, 2006. С. 276—277.
5. Владимирова М. З., Тодераш И. К., Чорик Ф. П. Восточная речная креветка (*Macrobrachium nipponense* De Haan,) новый элемент гидрофауны Кучерганского водохранилища//Изв. АН МССР. 1989. № 1. С. 77—78. (Сер. биол. наук).
6. Кулеш В. Ф. Биология культивирования промысловых видов пресноводных креветок и речных раков на теплых водах. Москва: Новое знание, 2012. 328 с.
7. Кулеш В. Ф. Личиночный рост субтропической пресноводной креветки *Macrobrachium nipponense* (De Haan) в условиях водоема-охладителя Березовской ГРЭС//Весці АН БССР. 1982. № 1. С. 100—110. (Сер. біял. навук).
8. Кулеш В. Ф. Рост и выживаемость гигантской пресноводной креветки *Macrobrachium rosenbergii* (De Man) в зависимости от плотности при различных условиях выращивания//Гидробиологический журнал. 1996. Т. 32, № 4. С. 2—14.
9. Найденова Н. Н. Подводные камни в аквакультуре гигантской пресноводной креветки *Macrobrachium rosenbergii* (Decapoda, Palaemonidae)//Рыбное хозяйство Украины. 2003. № 5. С. 10—24.
10. Dineshbabu, A. P. Length-weight relationship and growth of the speckled shrimp *Metapenaeus monoceros* (Fabricius) of Saurashtra. Journal of Marine Biology Ass. India. 2006. № 48 (2). P. 130—170.

REFERENCES

1. Khmeleva, N. N. Et al. (1982). *Biologicheskoe obosnovanie vseleniya subtropicheskikh presnovodnykh krevetok Macrobrachium nipponense v vodoem-okhladitel' Berezovskoy GRES*. Minsk: Institut zoologii AN BSSR. Dep. v VINITI 30.09.82, № 5014-82. Vestsi AN BSSR, 1983, № 2, 119. (Ser.: Biyal. navuki).
2. Khmeleva, N. N. Et al. (1997). *Ekologiya presnovodnykh krevetok*. Minsk: Belarus. navuka.
3. Svirskiy, V. G., Rachek, E. I., & Andreeva, I. N. (1994). Rezul'taty vseleniya presnovodnoy krevetki *Macrobrachium nipponense* (De Haan) v vodoem-okhladitel' Primorskoy GRES. *Izv. Tikhook. NII rybn. kh-va i okeanogr.*, 113, 151-153.
4. Giginyak, Yu. G., Alekhovich, A. V., & Kulesh, V. F. (2006). Rezul'taty introduktsii subtropicheskoy presnovodnoy krevetki *Macrobrachium nipponense* (De Haan) v vodoem-okhladitel' Berezovskoy GRES (Belarus'). *VII Vseros. konf. po promyslovym bespozvonochnym (pamyati B. G. Ivanova)*, Murmansk, 9-13 okt. 2006 g. Moskva: VNIRO, 276-277.
5. Vladimirova, M. Z., Toderash, I. K., & Chorik, F. P. (1989). Vostochnaya rechnaya krevetka (*Macrobrachium nipponense* De Haan,) novyy element gidrofauny Kucherganskogo vodokhranilishcha. *Izv. AN MSSR*, 1, 77-78.
6. Kulesh, V. F. (2012). *Biologiya kul'tivirovaniya promyslovykh vidov presnovodnykh krevetok i rechnykh rakov na teplykh vodakh*. Moskva: Novoe znanie.
7. Kulesh, V. F. (1982). Lichinochnyy rost subtropicheskoy presnovodnoy krevetki *Macrobrachium nipponense* (De Haan) v usloviyakh vodoema-okhladitelya Berezovskoy GRES. *Vestsi AN BSSR*, 1, 100-110.
8. Kulesh, V. F. (1996). Rost i vyzhivaemost' gigantskoy presnovodnoy krevetki *Macrobrachium rosenbergii* (De Man) v zavisimosti ot plotnosti pri razlichnykh usloviyakh vyrashchivaniya. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 32, 4, 2-14.
9. Naydenova, N. N. (2003). Podvodnye kamni v akvakul'ture gigantskoy presnovodnoy krevetki *Macrobrachium rosenbergii* (Decapoda, Palaemonidae). *Rybnoe khozyaystvo Ukrainy*, 5, 10-24.
10. Dineshbabu, A. P. (2006). Length-weight relationship and growth of the speckled shrimp *Metapenaeus monoceros* (Fabricius) of Saurashtra. *Journal of Marine Biology Ass. India*, 48 (2), 130-170.

**ВПЛИВ СКЛАДУ РАЦІОНУ І УМОВ ВИРОЩУВАННЯ
НА ПРОЯВИ КАНІБАЛІЗМУ У СХІДНОЇ ПРІСНОВОДНОЇ КРЕВЕТКИ
MACROBRACHIUM NIPPONENSE (DE HAAN, 1849)**

Шекк П. В., shekk@ukr.net, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

Астафуров Ю. О., astafurov.yu@ukr.net, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

Мета. Дослідити вплив дієти та течії на проявлення канібалізму креветки *Macrobrachium nipponense* при вирощуванні в контрольованих умовах.

Методика. Матеріалом для роботи слугувала молодь креветки довжиною 2,0–3,5 см і масою 1,5–3,0 г, що була виловлена восени 2016 р. в ставах пониззя р. Дністер. Креветок утримували в басейнах з рециркуляційною системою об'ємом 0,3 м³. Температурний режим,

освітлення (період і інтенсивність) та інші параметри середовища підтримувалися відповідно до заданих параметрів. Зважування проводили на електронних вагах AXISAD-50 з точністю до 0,001 г. Довжину вимірювали лінійкою та штангенциркулем. У хронічних експериментах досліджували дві групи креветок, які вирощувалися за густоти посадки 3 екз·дм⁻³, температури 26–29°C та інших рівних умов у басейнах установок із замкнутим циклом водопостачання. Креветок годували за поїданням. Раціон першої групи складався з тваринної їжі (мотиль, риба, кальмари, равлики, трубочник, артемія), другої — з рослинної (злаки, овочі, шпинат, горіхи, люцерна, рис, нут).

У другій серії експериментів креветок утримували у вирощувальних басейнах за густоти посадки 2 екз·дм⁻³ і співвідношення $\sigma : \varphi = 1 : 4$. Раціон креветок складався з тваринної і рослинної їжі (1 : 1). Протягом 30 діб експерименту температуру води підтримували на рівні 26,0±0,5°C, фотоперіод — 12 год. світло, 12 год. темрява.

Результати. Креветки, які одержували продукти тваринного походження, росли швидше. У 20% самок формувалася ікра. Разом з тим, їх агресивність була висока, що призвело до втрати в результаті травм і канібалізму 40% особин. Креветки, які одержували рослинну їжу росли повільніше. Їх кінцева маса і розміри були достовірно нижчі ($P > 0,95$), ніж у креветок першої групи при близьких початкових показниках. Дозрівання самок в другій групі не відбувалося. Разом з тим, випадки агресивної поведінки були рідкісні, а канібалізм не спостерігався, що забезпечило 100% виживання.

У басейні № 1 створювали бічні течії помірної сили. Креветки утворювали розріджене скупчення в центрі басейну, уникаючи течії, не займали схованок, не виявляли агресії один до одного і не охороняли свою територію. У басейні № 2, при аналогічних умовах, але за відсутності бічних течій, креветки розподілялися по всьому об'єму басейну, займали схованки і охороняли свою територію, були агресивні стосовно інших особин, часто вступаючи з ними в бійку. При близьких розмірно-масових характеристиках креветок в обох варіантах вирощування (різниця не значуща, $P < 0,95$) у першому випадку відхід не спостерігався, а в другому становив 20%.

Наукова новизна. Вперше показано, що склад дієти впливає на ріст, поведінку і виживання креветки *M. nipponense*. Використання кормів рослинного походження знижує агресивність і підвищує виживання креветок. Тваринна їжа підвищує інтенсивність росту, забезпечує дозрівання самок, але збільшує відхід креветок у результаті канібалізму. Вирощування креветки в установці з бічною течією помірної сили знижує травматизм і відхід особин у результаті агресивної поведінки, при близьких розмірно-масових показниках.

Практична значимість. Креветка *Macrobrachium nipponense* — перспективний об'єкт аквакультури в умовах півдня України. Підвищення виходу товарної продукції — важливий аспект, що забезпечує рентабельність виробництва. У зв'язку з цим, розробка методів, які дозволяють знизити агресивність і підвищити виживання креветок в умовах товарного вирощування, має важливе практичне значення.

Ключові слова: креветка *Macrobrachium nipponense*, їжа рослинна, тваринна, вплив течії, канібалізм, ріст, виживання.

EFFECT OF THE DIET AND GROWING CONDITIONS ON THE MANIFESTATIONS OF CANNIBALISM IN THE EASTERN FRESHWATER SHRIMP (*MACROBRACHIUM NIPPONENSE* DE HAAN, 1849)

P. Shekk, shekk@ukr.net, Odessa State Environmental University

Iu. Astafurov, astafurov.yu@ukr.net, Odessa State Environmental University

Purpose. To study the effect of diet and water flow composition on the manifestations of cannibalism of shrimp *Macrobrachium nipponense* during rearing under controlled conditions.

Methodology. The material for the work was shrimp fry with a length 2.0-3.5 cm and weight 1.5-3.0 g, caught in autumn 2016 in ponds of the lower reaches of the Dniester river. The shrimp were

kept in tanks of the recirculation system with a volume of 0.3 m³. The temperature regime, light (period and intensity), and other environmental parameters were maintained in accordance with the specified parameters. Weighing was carried out on an AXISAD-50 electronic balance with an accuracy of 0.001 g. The length was measured with a ruler or with a caliper. In chronic experiments, two groups of shrimps were kept at the stocking density of 3 ind./L, temperature of 26-29°C and other equal conditions in tanks of a recirculating system. The diet of the first group consisted of animal food (bloodworm, fish, squid, snail, tubule, artemia), the second group was fed by plant feeds (cereals, vegetables, spinach, nuts, alfalfa, rice, chickpeas). Maturation of females in the second group was not observed. At the same time, cases of aggressive behavior were rare, and cannibalism was not observed, which ensured 100% survival. In the second series of experiments, shrimp were kept in fattening tanks at stocking density of 2 ind./L and a ratio ♂♂: ♀♀ - 1: 4. The diet of shrimp consisted of animal and plant feeds (1: 1). During the 30 days of the experiment, the water temperature was maintained at 26.0 ± 0.5 °C, the photoperiod was 12 hours light, 12 hours dark.

Findings. The shrimp, which received animal food, grew faster. 20% of the females formed eggs. At the same time, their aggressiveness was high, which led to the loss due to injuries and cannibalism of 40% of the individuals. The shrimp, which received vegetable food, grew slower. Their final weight and size were significantly lower ($P > 0.95$) than those of shrimps of the first group with similar initial parameters. In the tank No. 1, a lateral flow of moderate force was created. Shrimps formed a sparse aggregation in the center of the tank avoiding the current. They did not take refuge, did not show aggression towards each other and did not protect their territory. In the tank No. 2, with similar conditions, there was no lateral flow. Shrimps were distributed evenly in the tank, took refuge and protected their territory, were aggressive towards other individuals, often entering into fights with them. With similar size and weight characteristics of shrimp in both cultivation variants (the difference is not significant $P < 0.95$), no loss was observed in the first case, while it was 20% in the second case.

Originality. For the first time, it was shown that the diet composition affects the growth, behavior and survival of *M. nipponense* shrimp. The use of vegetable feeds reduced aggressiveness and improved shrimp survival. Animal food increased the intensity of growth, ensured maturation of females, but increased the loss of shrimp due to cannibalism. Cultivation of shrimp in a tank with lateral flow of moderate force reduced traumatism and the loss of individuals due to aggressive behavior, with similar size and weight parameters.

Practical value. Shrimp *Macrobrachium nipponense* is a promising object of aquaculture in the southern Ukraine. Increasing the yield of marketable production is an important aspect ensuring profitability of production. In this regard, the development of the methods, which allow reducing aggressiveness and increase the survival of shrimps in conditions of marketable cultivation is of great practical importance.

Key words: shrimp *Macrobrachium nipponense*, plant food, animal, effect of flow, cannibalism, growth, survival.

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 60-67
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.060>
УДК 597-115.08:639.371.2

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ДНК-ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСЕТРОВИХ ВИДІВ РИБ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

В. Г. Спиридонов, spyrydonov@ukr.net, Інститут ветеринарної медицини НААН України, м. Київ

Мета. Розробити та провести апробацію методики ДНК-ідентифікації видової приналежності осетрових риб з використанням полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі.

Методика. Для проведення ДНК-ідентифікації осетрових риб використовували ПЛР з детекцією результатів у реальному часі.

Результати. На підставі використання ПЛР у реальному часі розроблено та апробовано методику видової ДНК-ідентифікації таких видів осетрових риб, як білуга (*Huso huso* Linnaeus), російський осетер (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt), стерлядь (*Acipenser ruthenus* Linnaeus) та севрюга (*Acipenser stellatus* Pallas). За отриманими результатами аналітичної специфічності та порівнянням параметрів ампліфікації було встановлено специфічну ампліфікацію та відсутність перехресних реакцій для фрагментів плавців та ікри досліджуваних видів осетрових риб. Запропонована методика ДНК-ідентифікації може використовуватися для встановлення видової приналежності осетрових риб, що дозволить контролювати виробництво конкурентоспроможної продукції аквакультури, яка буде відповідати вимогам CITES.

Наукова новизна. Вперше розроблено та апробовано методику видової ідентифікації осетрових риб з використанням ПЛР в реальному часі.

Практична значимість. Видова ідентифікація осетрових риб дозволить контролювати виробництво конкурентоспроможної та легалізованої продукції аквакультури, яка буде відповідати вимогам CITES, а також забезпечить виконання стратегічного напрямку держави з продовольчої безпеки України.

Ключові слова: ДНК-ідентифікація, полімеразна ланцюгова реакція у реальному часі, мітохондріальні ДНК-маркери, осетрові види риб.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Видова ідентифікація об'єктів аквакультури останнім часом набуває все більш практичного значення, оскільки дозволяє встановлювати популяційну і видову приналежність особин, встановлювати факти фальсифікації товарної продукції, а також дозволяє здійснювати контроль збереження і відновлення рідкісних генотипів досліджуваних об'єктів під час проведення селекційно-плеємних робіт [1, 2].

© В. Г. Спиридонов, 2017

Застосування генетичної ідентифікації має важливий прикладний аспект з огляду на розширення області використання ДНК-маркерів для ідентифікації продукції тваринного походження, яка щорічно надходить на міжнародний ринок [3–6]. Варто зазначити, що теперішнього часу генетична ідентифікація осетрових є одним з найважливіших доказів, що сприймається Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, які знаходяться під загрозою зникнення CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) для імпорту і експорту даних видів риб і продукції з них [7]. Масштабність і важливість такої тенденції підтверджується тим, що в багатьох країнах вже введені закони, які протоколюють і регулюють цей процес. Той факт, що ДНК чітко вказує на видову приналежність особини, відкриває можливості не тільки для видової ідентифікації живих ресурсів, але й для відстеження шляхів бракон'єрської торгівлі [8, 9].

Одним із різновидів ПЛР, що найчастіше використовується в діагностичних лабораторіях, є ПЛР у реальному часі (ПЛР-РЧ) [10]. Використання флуоресцентних зондів забезпечує безперервний моніторинг флуоресцентного сигналу на екрані комп'ютера, що дозволяє за короткий проміжок часу інтерпретувати отримані результати [11, 12].

При проведенні ПЛР у реальному часі для реєстрації флуоресцентного сигналу було використано технологію «антипраймера» [13]. Суть цієї модифікації полягає у тому, що до одного із праймерів «пришивається» універсальна нуклеотидна послідовність (15–20 нуклеотидів), мічена флуоресцентним барвником на 5'-кінці. Відповідно, в реакційне середовище вносять комплементарну їй нуклеотидну послідовність — «антипраймер», — мічену гасником флуоресценції на 3'-кінці. Таким чином, до початку реакції флуоресцентний сигнал відсутній, оскільки флуорофор і гасник флуоресценції просторово зближені. За наявності специфічної матриці при проведенні ПЛР «антипраймер» руйнується Таq-ДНК-полімеразою, в результаті чого підвищується рівень флуоресценції. Такий підхід до проведення ПЛР в реальному часі є максимально економним, оскільки виключається необхідність використання флуоресцентних зондів до кожної досліджуваної матриці [13, 14].

Перевагою такої модифікації ПЛР є зменшення ризику контамінації та хибнонегативних результатів, оскільки немає потреби в проведенні розділення продуктів ампліфікації в агарозному гелі. Крім того, при використанні ПЛР-РЧ можна проводити детекцію двох і більше нуклеотидних послідовностей в одній пробірці (мультиплексний аналіз) та кількісно оцінювати результати досліджень.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Розроблення та впровадження у виробничу практику ДНК-ідентифікації методом ПЛР у реальному часі дозволить оперативно встановлювати видову ДНК-приналежність осетрових риб та продукції з них, що надасть більше можливостей осетровим господарствам захистити свою товарну продукцію від фальсифікації, а споживачам — впевнитися в достовірності видового походження даної продукції.

Мета роботи — розробити та апробувати методику ДНК-ідентифікації видової приналежності осетрових видів риб з використанням ПЛР у реальному часі.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Для дослідження використовували фрагменти тканин плавців та ікру осетрових риб, таких як білуга, російський осетер, стерлядь та севрюга.

Фрагменти плавців відбирали прижиттєво шляхом акуратного відтинання фрагмента грудного чи хвостового плавця за допомогою стерильних інструментів. Ікру від осетрових риб відбирали під час маніпуляцій зі штучного відтворення в кількості 3–5 г кожного досліджуваного зразка. Відібраний біологічний матеріал фіксували 96% етанолом у спеціально промаркованих стерильних пробірках індивідуально для кожної особини.

Виділення геномної ДНК з відібраних фрагментів плавців та ікри проводили згідно інструкції виробника, використовуючи набір «ДНК-сорб-В» («Амплі-Сенс», Росія) [15, 16]. Ампліфікацію ДНК-мішені здійснювали на приладі *ABI PRISM SDS 7000* (*Applied Biosystems, Великобританія*) із наступним температурним профілем: активація ДНК-полімерази — 5 хв. при 95°C, та 30 циклів ампліфікації, які включали: денатурацію (15 с, 95°C); відпалювання праймерів (30 с, 58°C); елонгація (30 с, 72°C); приєднання антипраймера (45 с, 50°C).

Для видової ідентифікації використовували ділянку мітохондріальної ДНК, що кодує ділянку гена *Cyt b* [2]. Дизайн прамейрів здійснювали таким чином, щоб один із них був спільним для чотирьох видів осетрових риб (мічений флуоресцентним барвником FAM), а інші, немічені, були видоспецифічні [17].

Ампліфікацію проводили в реакційній суміші об'ємом 25 мкл, що містила: 50,0 мМ Трис-НCl (рН 8,3), 3,0 мМ MgCl₂, 0,2 мМ кожного з дНТФ, по 5 пМ пари олігонуклеотидних праймерів, 10 пМ «антипраймера» та 1 од. Таq-ДНК-полімерази. Зразки виділеної ДНК вносили по 5 мкл.

Для попередження отримання хибнопозитивних та хибнонегативних результатів дослідження за проведення ПЛР використовували наступні контролю:

- позитивний контроль;
- негативний контроль;
- перехресні контролю;
- контроль без матриці (NTC, no template control);
- негативний контроль виділення (НКВ).

Аналіз результатів та статистичну обробку даних здійснювали за допомогою програмного забезпечення *ABI Prism 7000 Vs. 1.2.3*.

Для інтерпретації результатів ПЛР проводили аналіз кривих ампліфікації невідомих зразків та контролів. Зразок вважали позитивним, якщо спостерігалася ампліфікація за барвником FAM (цільова мішень). Негативним вважали зразок, у якого відсутня ампліфікація за барвником FAM.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

В результаті використання ПЛР у реальному часі розроблено та апробовано методику видової ДНК-ідентифікації осетрових видів риб із використанням видоспецифічних мітохондріальних ДНК-маркерів.

Розроблена методика дозволяє здійснити одночасну видову ідентифікацію чотирьох видів осетрових риб, які найбільш широко представлені в аквакультури: білуга (*Huso huso* Linnaeus); російський осетер (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt); севрюга (*Acipenser stellatus* Pallas); стерлядь (*Acipenser ruthenus* Linnaeus).

З метою визначення аналітичної специфічності методу було проведено дослідження ДНК, виділеної з плавців та ікри осетрових риб (табл. 1).

Таблиця 1. Аналітична специфічність методики видової ідентифікації осетрових риб

Досліджуваний матеріал	Значення порогового циклу за каналом FAM (Ct)			
	Тест для ідентифікації ДНК білуги	Тест для ідентифікації ДНК рос. осетра	Тест для ідентифікації стерляді	Тест для ідентифікації севрюги
Плавець білуги № 1	22,3	—	—	—
Плавець білуги № 2	23,2	—	—	—
Плавець білуги № 3	22,9	—	—	—
Плавець рос.осетра № 1	—	22,8	—	—
Плавець рос.осетра № 2	—	22,3	—	—
Плавець рос.осетра № 3	—	23,5	—	—
Плавець рос.осетра № 4	—	22,2	—	—
Ікра рос. осетра	—	23,1	—	—
Ікра рос. осетра	—	22,6	—	—
Плавець стерляді № 1	—	—	25,6	—
Плавець стерляді № 2	—	—	24,3	—
Плавець стерляді № 3	—	—	24,8	—
Ікра стерляді № 1	—	—	24,9	—
Ікра стерляді № 1	—	—	23,8	—
Ікра стерляді № 1	—	—	24,6	—
Плавець севрюги № 1	—	—	—	25,2
Плавець севрюги № 2	—	—	—	24,3
Ікра севрюги № 1	—	—	—	24,5
Ікра севрюги № 2	—	—	—	24,8

Отримані результати, відображені в таблиці 1, вказують на те, що при дослідженні біологічного матеріалу від російського осетра, стерляді та севрюги була відмічена специфічна ампліфікація, а також відсутність перехресних реакцій при проведенні ДНК-ідентифікації.

Незначна різниця значення порогового циклу (Ct) та ефективності флуоресценції (ВОФ) свідчать про рівнозначну можливість використання як плавців, так і ікри для видової ідентифікації осетрових риб (табл. 2).

Таблиця 2. Порівняльні дослідження параметрів ампліфікації, отриманих при дослідженні плавців та ікри осетрових риб

Сировина	Плавець		Ікра	
	Ct*	ВОФ**	Ct	ВОФ
Російський осетр	22,7	800	22,9	800
Стерлядь	24,9	700	24,5	800
Севрюга	24,8	1000	24,7	1100

Примітка. *Ct — значення порогового циклу, **ВОФ — відносні одиниці флуоресценції.

Розроблена методика була успішно валідована в умовах Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК з метою аналізу видової приналежності осетрових риб та отриманої від них продукції.

Таким чином, розроблена методика ДНК-ідентифікації осетрових риб дозволяє визначати їх видову приналежність, і, таким чином, встановлювати факти фальсифікації товарної продукції, що має вагоме економічне значення як для вітчизняного, так і міжнародного ринку осетрової продукції.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Для точного та оперативного визначення видового походження осетрових риб було впроваджено методику ДНК-ідентифікації із застосуванням полімеразної ланцюгової реакції. Проведені дослідження свідчать про ефективність розробленої методики ДНК-ідентифікації таких осетрових риб, як білуга (*Huso huso* Linnaeus); російський осетр (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt); севрюга (*Acipenser stellatus* Pallas) та стерлядь (*Acipenser ruthenus* Linnaeus).

За результатами визначення аналітичної специфічності та порівняльних досліджень параметрів ампліфікації було встановлено специфічну ампліфікацію та відсутність перехресних реакцій як для фрагментів плавців, так і для ікри досліджуваних видів осетрових риб.

Запропонована методика для ДНК-ідентифікації осетрових риб дозволить контролювати виробництво конкурентоспроможної продукції аквакультури, що відповідає вимогам CITES, а також забезпечить виконання стратегічного плану держави з продовольчої безпеки України шляхом запобігання фальсифікації даного виду продукції.

ЛІТЕРАТУРА

1. Войнова Н. В. Генетическая паспортизация осетровых: практические и теоретические аспекты. Москва: ВНИРО, 2004. 189 с.
2. Мюге Н. С. Полиморфизм контрольного региона митохондриальной ДНК восьми видов осетровых и разработка системы ДНК-идентификации видов//Генетика. 2008. № 7. С. 913—919.
3. Identification of interspecific hybrids by amplified fragment length polymorphism: the case of sturgeon/ Congiu L. et al.//Mol. Ecol. 2001. Vol. 10. P. 2355—2359.
4. Применение молекулярно-генетических исследований в аквакультуре осетровых рыб/Козлова Н. В. и др.//Вестник АГТУ. 2013. № 3. С. 113—117. (Серия: Рыбное хозяйство).

5. Барминцева А. Е. Использование микросателлитных локусов для установления видовой принадлежности осетровых (*Acipenseridae*) и выявления особей гибридного происхождения//Генетика животных. 2013. Т. 49, № 9. С. 1093—1105.
6. Molecular genetic analysis among subspecies of two Eurasian sturgeon species, *Acipenser baerii* and *A. stellatus*/Doukakis P. et al.//Mol Ecol. 1999. Vol. 12. P. 117—127.
7. Raymakers C. CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora: its role in the conservation of *Acipenseriformes*//J. Appl. Ichthyol. 2006. Vol. 22 (Suppl. 1). P. 53—65.
8. Впровадження генетичної паспортизації осетрових в Україні/Малишева О. О. та ін.//Тваринництво України. 2015. № 9. С. 12—15.
9. Генетическая паспортизация производителей осетровых рыб/Войнова Н. В. и др.//Новые технологии в защите биоразнообразия в водных экосистемах: Междунар. конф.: матер. Москва, 2002. С. 91.
10. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. Москва: Мир, 2002. 589 с.
11. Kinetic PCR: Real time monitoring of DNA amplification reactions/Higuchi R. et al.//Biotechnology. 1993. Vol. 11. P. 1026—1030.
12. The polymerase chain reaction: clinical applications/White T. J. et al.//Adv. Clin. Chem. 1992. Vol. 29. P. 161—196.
13. Jin Li G., Makrigiorgos G. M. Anti-primer quenching-based real-time PCR for simplex or multiplex DNA quantification and single-nucleotide polymorphism genotyping//Nature Protocols. 2007. Vol. 2, iss. 1. P. 50—58.
14. Методические рекомендации по использованию метода полимеразной цепной реакции в животноводстве/Зиновьева Н. А. и др. Дубровицы: ВИЖ, 1998. 47 с.
15. Rapid and Simple Method for Purification of Nucleic Acids/Boom R. et al.//Journal of Clinical Microbiology. 1990. Vol. 28. P. 495—503.
16. Carter M. J., Milton I. D. An inexpensive and simple method for DNA purifications on silica particles//Nucleic Acids Res. 1993. Vol. 21. P. 1044—1046.
17. Ребриков Д. В., Саматон Г. А., Трофимов Д. Ю. ПЦР в реальном времени. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Бинوم. Лаборатория знаний, 2009. 223 с.

REFERENCES

1. Voynova, N. V. (2004). *Geneticheskaya pasportizatsiya osetrovyykh: prakticheskie i teoreticheskie aspekty*. Moskva: VNIRO.
2. Myuge, N. S. (2008). Polimorfizm kontrol'nogo regiona mitokhondrial'noy DNK vos'mi vidov osetrovyykh i razrabotka sistemy DNK-identifikatsii vidov. *Genetika*, 7, 913-919.
3. Congiu, L., Dupanloup, I., & Patarnello, T. et al. (2001). Identification of interspecific hybrids by amplified fragment length polymorphism: the case of sturgeon. *Mol. Ecol.*, 10, 2355-2359.
4. Kozlova, N. V., Bazelyuk, N. N., Fayzulina, D. R., & Stonogina, E. V. (2013). Primenenie molekulyarno-geneticheskikh issledovaniy v akvakul'ture osetrovyykh ryb. *Vestnik AGTU*, 3, 113-117.
5. Barmintseva, A. E. (2013). Ispol'zovanie mikrosatellitnykh lokusov dlya ustanovleniya vidovoy prinadlezhnosti osetrovyykh (*Acipenseridae*) i vyyavleniya osobey gibridnogo proiskhozhdeniya. *Genetika zhivotnykh*, 49, 9, 1093-1105.

6. Doukakis, P., Birstein, V. J., & Ruban, J. J. et al. (1999). Molecular genetic analysis among subspecies of two Eurasian sturgeon species, *Acipenser baerii* and *A. stellatus*. *Mol Ecol.*, 12, 117-127.
7. Raymakers, C. (2006). CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora: its role in the conservation of *Acipenseriformes*. *J. Appl. Ichthyol.*, 22 (Suppl. 1), 53-65.
8. Malysheva, O. O., Spyrydonov, V. H., & Melnychuk, S. D. (2015). Vprovadzhennia henetychnoi pasportyzatsii osetrovyykh v Ukraini. *Tvarynnystvo Ukrainy*, 9, 12-15.
9. Voinova, N. V., Timoshkina, N. N., Chistyakov, V. A., Barmintsev, V. A., Abramova, A. B., & Chudinov, O. S. (2002). Geneticheskaya pasportizatsiya proizvoditeley osetrovyykh ryb. *Novye tekhnologii v zashchite bioraznoobraziya v vodnykh ekosistemakh: Mezhdunarodnaya konf.* Moskva. 91.
10. Glik, B., & Pasternak, Dzh. (2002). Molekulyarnaya biotekhnologiya. Printsipy i primeneniye. Moskva: Mir.
11. Higuchi, R., Fockler, C., Dollinger, G., & Watson, R. (1993). Kinetic PCR: Real time monitoring of DNA amplification reactions. *Biotechnology*, 11, 1026-1030.
12. White, T. J., Madej, R., Persing, D. H., & Erlich, H. A. (1992). The polymerase chain reaction: clinical applications. *Adv. Clin. Chem.*, 29, 161-196.
13. Jin, Li G., & Makrigiorgos, G. M. (2007). Anti-primer quenching-based real-time PCR for simplex or multiplex DNA quantification and single-nucleotide polymorphism genotyping. *Nature Protocols*, 2, 1, 50-58.
14. Zinov'eva, N. A., Popov, A. P., & Ernst, L. K. et al. (1998). *Metodicheskie rekomendatsii po ispol'zovaniyu metoda polimeraznoy tsepnoy reaktsii v zhivotnovodstve*. Dubrovitsy: VIZh.
15. Boom, R., Sol, C. J. A., & Salimans, M. M. et al. (1990). Rapid and Simple Method for Purification of Nucleic Acids. *Journal of Clinical Microbiology*, 28, 495-503.
16. Carter, M. J., & Milton, I. D. (1993). An inexpensive and simple method for DNA purifications on silica particles. *Nucleic Acids Res.*, 21, 1044-1046.
17. Rebrikov, D. V., Samaton, G. A., & Trofimov, D. Yu. (2009). *PTsR v real'nom vremeni. (2-nd ed.)*. Moskva: Binom. Laboratoriya znaniy.

**РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДНК-ИДЕНТИФИКАЦИИ ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ
РЫБ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЦЕПНОЇ РЕАКЦІЇ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ**

В. Г. Спиридонов, spyrydonov@ukr.net, Институт ветеринарной медицины НААН
Украины, г. Киев

Цель. Разработать и провести апробацию методики ДНК-идентификации видовой принадлежности осетровых рыб с применением полимеразной цепной реакции в реальном времени.

Методика. Для проведения ДНК-идентификации осетровых рыб использовали ПЦР с детекцией результатов в реальном времени.

Результаты. На основании использования ПЦР в реальном времени разработано и апробировано методику видовой ДНК-идентификации таких видов рыб, как белуга (*Huso huso* Linnaeus), русский осетр (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt), стерлядь (*Acipenser ruthenus* Linnaeus) и севрюга (*Acipenser stellatus* Pallas). По полученным результатам аналитической специфичности и сравнения параметров амплификации было установлено специфическую амплификацию и отсутствие перекрестных реакций для фрагментов плавников и икры

исследуемых видов осетровых рыб. Предложенная методика ДНК-идентификации может использоваться для определения видовой принадлежности осетровых рыб, что позволит контролировать производство конкурентоспособной продукции аквакультуры, которая будет соответствовать требованиям CITES.

Научная новизна. Впервые разработана и апробирована методика видовой идентификации осетровых рыб с использованием ПЦР в реальном времени.

Практическая значимость. Видовая идентификация осетровых рыб позволит контролировать производство конкурентоспособной и легализованной продукции аквакультуры, соответствующей требованиям CITES, а также обеспечит выполнение стратегического плана страны по продовольственной безопасности Украины.

Ключевые слова: ДНК-идентификация, полимеразная цепная реакция в реальном времени, митохондриальные ДНК-маркеры, осетровые виды рыб.

DEVELOPMENT OF DNA IDENTIFICATION FOR STURGEON SPECIES WITH THE USE OF REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION

V. Spyrydonov, spyrydonov@ukr.net, Institute of veterinary medicine, NAAS, Kyiv

Purpose. Sturgeon is the common name for the 27 species of fish belonging to the family Acipenseridae. The family is grouped into four genera: Acipenser, Huso, Scaphirhynchus and Pseudoscaphirhynchus. Four species may now be extinct. Two closely related species, Polyodon spathula (paddlefish) and Psephurus gladius (Chinese paddlefish, possibly extinct) are of the same order, Acipenseriformes, but belong to the family Polyodontidae and are not considered as "true" sturgeons. The aim of our paper is to develop and carry out a new DNA identification methodology for the sturgeons species with the use of real time polymerase chain reaction.

Methodology. A PCR with the detection of results in real time was used for DNA-identification of sturgeon species.

Findings. The new real-time PCR was developed and tested for rapid and accurate identification of DNA extracted from eggs and meat of four sturgeon species such as beluga (*Huso huso*, Linnaeus), Russian sturgeon (*Acipenser gueldenstaedtii*, Brandt), sterlet (*Acipenser ruthenus*, Linnaeus) and stellate sturgeon (*Acipenser stellatus*, Pallas). Based on the results of analytical specificity and comparison of the amplification parameters, we detected specific amplification and absence of cross reactions for fin fragments and eggs of the studied fish species. The proposed DNA-identification method can be used for the identification of sturgeon species that will allow controlling the production of competitive aquaculture products, which will meet CITES requirements.

Originality. For the first time, the development and approbation of the methodology for species identification of sturgeon fish by using real-time PCR was carried out.

Practical value. Species identification of sturgeon fish will allow controlling the production of competitive and legalized aquaculture products that meet CITES requirements as well as will ensure the implementation of the country strategic plan for food security in Ukraine.

Keywords: DNA-identification, real time polymerase chain reaction, mitochondrial DNA markers, sturgeon species.

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 68-77
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.068>
УДК 597-18:597.554.3(282.247.322.171)

ДИНАМИЧНОСТЬ МИКРОСТРУКТУРЫ МЕЗОНЕФРОСА ЛЕЩА (*ABRAMIS BRAMA LINNAEUS*, 1758) ДНЕПРОВСКО-БУГСКОЙ УСТЬЕВОЙ СИСТЕМЫ В СВЯЗИ С НЕРЕСТОВОЙ МИГРАЦИЕЙ

К. Н. Гейна, gejnakonstantin@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН
Украины, г. Киев

М. С. Козий, kozij67@gmail.com, Черноморский национальный университет
им. Петра Могилы, г. Николаев

Цель. Проанализировать с помощью микроанатомических методов исследований структуру мезонефроса леща (*Abramis brama Linnaeus*, 1758) в период нерестовой миграции, определить перспективу использования данных микроанатомического мониторинга в ихтиологической практике с целью оценки функционального статуса рыб.

Методика. Сбор ихтиологических материалов осуществлялся по разрешительным документам Института рыбного хозяйства НААН, а обработку — в лаборатории кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Херсонского ГАУ.

Для сбора ихтиологических материалов применялись ставные сети, частиковые вентеры, закидные неводы. Учетные станции располагались по ходу нерестовой миграции вида из Днепроовского лимана в плавневую систему Днепра.

Полевую и камеральную обработку материала проводили с помощью авторского оборудования и оригинальных методик, специально предназначенных для гистологической диагностики тканей гидробионтов животного происхождения.

Результаты. Основой адаптации почек леща к водоемам с различной соленостью является структурная неоднородность нефронов, выраженная в величине и строении почечных телец и извитых канальцев. Значительные колебания показателей осмолярности в пределах акваторий низовьев Днепра достоверно влияют на изменение строения и функции нефрогенной ткани в виде уменьшения диаметра капсулы Боумена–Шумлянского на 9,0 мк. Изменения диаметра капсулы Боумена–Шумлянского особей из среды с умеренной минерализацией фиксируется в пределах 6,0 и 4,0 мк. В пользу факта снижения функциональной активности конволюты свидетельствует также и уменьшение высоты эпителиоцитов проксимальных извитых канальцев на 3,0; 2,0 и 4,0 мк.

Колебания соотношения нефрогенной и гемопоэтической тканей носит балансный характер, что может быть связано с перераспределением этих составляющих в связи с возникновением адаптации под действием хлорид-ионов.

Дислоцирование ионотранспортирующих клеток вблизи кровеносных сосудов и вокруг эпителиоцитов канальцев свидетельствует об участии мезонефроса в ионорегуляторных процессах, повышая устойчивость к изменению осмолярности среды.

При снижении осмолярности в мезонефросе леща изменяется функциональная активность нефрона, что выражается в уменьшении диаметра почечных телец и высоты эпителия проксимальных извитых канальцев.

Научная новизна. Впервые за последнее время проведен детальный микроанатомический анализ структуры мезонефроса половозрелых особей леща Днепроовско-Бугской устьевой системы. Существенно уточнена и дополнена существующая

© К. Н. Гейна, М. С. Козий, 2017

информация в отношении таксономических особенностей трансформации нефрогенной ткани рыб в условиях нерестовой миграции.

Практическая значимость. Фактическая информация предоставляет возможность использования полученного материала не только в морфофизиологических исследованиях, но также в практике ихтиологии и рыбоводства в связи с существующей проблемой понижения жизненного статуса особей, что предопределяет сокращение запасов ряда ценных промысловых видов, образовавших полупроходные формы в дельтовых акваториях речных систем.

Ключевые слова: нефрон, мезонефрос, нефрогенная ткань, осморегуляция, адаптация.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Одним из ключевых моментов в решении проблемы взаимодействия организма и среды является выяснение механизмов адаптаций рыб к факторам различного происхождения. Согласно концепции биомаркеров, разработанной и признанной в 90-е годы прошлого века, в научных исследованиях наиболее востребованными являются физиологические, биохимические и микроанатомические показатели.

Как известно, наряду с печенью и жабрами, почки рыб являются важнейшими индикаторами состояния организма ввиду своей незаменимости в процессе поддержания стабильной внутренней среды, включающей водно-солевой баланс, выведение продуктов обмена веществ, синтез ряда гормонов, а также формирование неспецифического и специфического иммунитета [8, 9]. Очевидно также, что в условиях умеренных нагрузок на водные экосистемы для мезонефроса рыб характерна значительная реактивность, что параллельно сочетается с резервом функциональной способности. В то же время, в условиях миграции происходит активация функции ренальной ткани, что чаще всего выражается в разнообразных морфологических изменениях [7]. Эта составляющая в ихтиологических исследованиях имеет определенную теоретическую значимость, которую можно использовать в прикладной работе при оценке функционального статуса рыб.

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕРЕШЕННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

На уровне световой микроскопии наиболее полно изучена микроструктура почечной паренхимы у рыб разных экологических групп, как в естественных, так и в трансформированных условиях обитания [6, 7]. Вместе с тем, отдельные вопросы, касающиеся тканевых перестроек в паренхиме мезонефроса у отдельных таксономических групп в зависимости от изменения определенных факторов среды обитания, представляются решенными лишь отчасти.

Становится очевидным, что исследования в области микроанатомии осморегуляторной системы гидробионтов достаточно актуальны ввиду необходимости расширения представлений об устойчивости различных видов костистых рыб к изменению физико-химических параметров среды обитания.

В этой связи, главной целью данной работы явился гистологический анализ мезонефроса леща с акцентированием внимания на таксономических особенностях клеточных и тканевых адаптаций в период нерестовой миграции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В основу работы легли результаты исследований, проведенных в нерестовый период 2014 г. Сбор ихтиологических материалов осуществлялся по разрешительным документам Института рыбного хозяйства НААН Украины, а обработка — в лаборатории кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Херсонского ГАУ.

В качестве экспериментального материала были использованы половозрелые особи леща. Для сбора ихтиологических материалов применялись ставные сети, частичковые вентери, закидные неводы. Учетные станции располагались по ходу нерестовой миграции вида из Днепроовского лимана в плавневую систему Днепра.

За нулевую точку была принята станция, которая располагалась в Днепроовском лимане на траверсе с. Александровка — о. Тендра. Общая протяженность акватории Днепроовско-Бугской устьевой системы, которая в нашем случае могла быть использована лещом в качестве миграционного пути, составляет около 120 км. С учетом изменений минерализации воды нерестовый путь был условно разделен на участки протяженностью около 30 км каждый. Использование изложенных выше подходов к выполнению поставленных задач позволило собрать ихтиологический материал в динамике изменений минерализации воды и сравнить результаты с таковыми из Каховского водохранилища, своеобразным стандартом пресноводного вида. При этом использовались половозрелые лещи одного возраста с максимально приближенными линейными размерами.

Видовую принадлежность исследуемых особей определяли по современному определителю [2], а возраст — в соответствии с методической разработкой В. Л. Брюзгина [3], которая является общепризнанной в практике ихтиологических исследований. Всего было исследовано 23 экземпляра леща в возрасте семи лет.

За основу микроанатомической оценки полученного материала была взята структура ткани мезонефроса (туловищной почки). Камеральную обработку материала проводили с помощью авторского оборудования и оригинальных методик, специально предназначенных для гистологической диагностики тканей гидробионтов животного происхождения с привлечением оптической аппаратуры «E. Leitz «diaplan» Wetzlar» [4, 5].

Корректирующая обработка микроснимков проведена с помощью компьютерных программ «Microsoft Office Picture Manager», «F S Viewer». Биометрические исследования тканей выполнены согласно общепринятым методикам [1].

Полученные результаты обрабатывали методом вариационной статистики с использованием пакета прикладных программ «Microsoft Excel» с акцентированием внимания на ошибках средних величин [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

С целью проведения анализа микроструктурных составляющих туловищных почек леща в связи с изменением минерализации среды обитания, был исследован мезонефрос рыб данного вида из акватории Каховского водохранилища. Микрокартина, рассматриваемая в качестве своеобразного стандарта для последующего сравнения, отличается следующими особенностями (рис. 1).

Рис. 1. Мезонефрос семилетней особи леща из акватории Каховского водохранилища: 1 — капсула Боумена–Шумлянского; 2 — каналцы конволюты; 3 — вставочный отдел нефрона; 4 — собирательная трубка. Гематоксилин Бемера, фукселин Харта (в модификации). X200

Опираясь на данные рисунка 1, можно заключить, что слепой проксимальный конец каналца углублен в собственную полость — при этом он образует капсулу Боумена–Шумлянского. Стенка капсулы построена из двух листков, из которых наиболее отчетливо выделяется париетальный. Ядра эпителиоцитов париетального листка несколько вытянуты. Висцеральный листок местами тесно срастается с клубочком капилляров. Первичная моча накапливается в пространстве, образованном между листками капсулы (на рисунке видна как светлая щель). Структуры расположены одиночно (гораздо реже — небольшими группами), находятся в тесном контакте с кровеносными капиллярами.

Следующие отделы нефрона представлены проксимальными и дистальными петлями каналцев конволюты, которые, сильно извиваясь, оплетают капсулу Боумена–Шумлянского. Эпителиоциты, образующие стенку проксимальных каналцев, имеют кубическую форму, ядра их округлые, с отчетливо выраженными глыбками хроматина и сравнительно крупной нуклеолой. Цитоплазма клеток мутная, с темно-розовым оттенком, что свидетельствует об активно проходящих в этом отделе нефрона процессах реабсорбции. На апикальном конце эпителиоцитов имеется увеличивающаяся площадь всасывания щетковидная каемка.

В связывающем отделе эпителий теряет щеточное окаймление, каналцы конволюты переходят в сравнительно короткий дистальный отдел — более тонкие трубки, выстланные низким призматическим эпителием. Цитоплазма клеток светлая, ядра округлые, щетковидная каемка отсутствует.

Вставочные отделы впадают в собирательные трубки. Диаметр просвета у них значительно шире, внутренняя поверхность выстлана призматическим эпителием. Цитоплазма клеток прозрачная, светло-розового цвета, ядра эллиптические. За собирательными трубками идут выводящие трубки —

канальцы с наиболее широким диаметром просвета и светлым эпителием.

Специфика строения мезонефроса и его функционирование у совершающих нерестовые миграции видов рыб на фоне смены физико-химических параметров среды связаны с особенностями осморегуляции в определенный период сезона. В сравнительной микроанатомии органов мочевыделения представляет интерес структура мезонефроса особей, находящихся в условиях повышенной солёности воды. На момент вылова в акватории Днепровского лимана (начало нерестовой миграции) в нефрогенной и гемопоэтической тканях мезонефроса установлены следующие микроструктурные признаки (рис. 2).

Рис. 2. Мезонефрос семилетней особи леща из акватории Днепровского лимана: 1 — капсула Боумена–Шумлянского; 2 — канальцы конволюты; 3 — вставочный отдел нефрона; 4 — выводящая трубка; 5 — гемопоэтическая ткань. Гематоксилин Бемера, фукселин Харта (в модификации). X250

Как видно из рисунка 2, пространство между листками капсулы Боумена–Шумлянского достаточно широкое, что указывает на присутствие в полости капсулы достаточного объема первичного фильтрата и однозначно свидетельствует о способности нефрона усиленно компенсировать потери воды из организма.

В мезонефросе особей из Днепровского лимана в малых количествах обнаруживаются **хлоридные** клетки, морфологически идентичные ионотранспортирующим клеткам жаберного аппарата. Для этих клеток характерно присутствие секреторных гранул, степень насыщения цитоплазмы которыми свидетельствует о более высоком уровне энергозатрат на поддержание гомеостаза.

Установлено, что в мезонефросе хлоридные клетки могут располагаться в паренхиме как диффузно, так и вблизи кровеносных сосудов, а также вокруг эпителиоцитов канальцев. Подобная дислокация свидетельствует о потенциальной возможности осуществления транспорта ионов из канальцев в

клетку и из клетки в кровь через межклеточную жидкость. Представляется очевидным, что мезонефрос, помимо основной функции, участвует и в ионорегуляторных процессах.

В мезонефрозе исследованных рыб обнаруживается также небольшое количество бокаловидных секретирующих клеток, имеющих сходную структуру с клетками верхних слоев эпидермиса, мочеточников, жаберного и обонятельного эпителиев, слизистой оболочки кишечной трубки. Показано, что слизь, выделяемая этими клетками, предотвращает слущивание эпителия, что включено в механизм регенерации канальцев.

Межканальцевую (гемопозитическую) ткань составляют ретикуло-лимфомиелоидные элементы и кровеносные сосуды разного калибра. Согласно данным рисунка 2, большая часть форменных элементов крови представлена эритроцитами и лимфоцитами, среди которых встречаются также созревающие лейкоциты зернистого ряда. Показано, что степень развития лимфоидной ткани в мезонефрозе леща находится в обратной зависимости от количества нефрогенной ткани.

Таким образом, по мере продвижения рыб из осолоненных акваторий в более опресненные приустьевые участки р. Днепр (30 км и 60 км от контрольной точки) в почечной паренхиме постепенно уменьшается количество гемопозитической ткани. Соответственным образом увеличивается количество мочевыводящих канальцев и клубочков, что подтверждается результатами микроанатомических исследований (рис. 3).

Рис. 3. Обзорные гистосрезы мезонефроса семилетних особей леща (А — удаленность 60 км; Б — удаленность 30 км). Гематоксилин Бемера, фукселин Харта (в модификации). X200

Анализ обзорных гистосрезов почечной паренхимы позволил установить наличие хорошо развитого фильтрационного аппарата. При этом, сравнивая показания «А» и «Б» рисунка 3, можно заключить, что незначительные колебания показателей осмоларности в пределах акваторий низовьев Днепра достоверно не влияют на изменение строения и функции нефрогенной ткани, что подтверждается и данными таблицы 1.

Таблица 1. Изменение структуры мезонефроса леща в зависимости от колебания показателей осмолярности среды обитания, $M \pm m$, $n=23$

Акватория	Нефрогенная ткань			Гемопозитическая ткань, %
	капсула Боумена–Шумлянського, диаметр, мк	эпителий проксимальных извитых канальцев, мк	эпителий дистальных извитых канальцев, мк	
Днепро́вский лиман	$72,0 \pm 15,34^{**}$	$11,0 \pm 3,05^{**}$	$4,0 \pm 1,0$	$52 \pm 9,34^{***}$
Приустьевой участок р. Днепр	$67,0 \pm 12,78$	$8,0 \pm 1,94^*$	$3,0 \pm 0,95$	$37 \pm 8,04^*$
Р. Днепр	$69,0 \pm 13,21^*$	$9,0 \pm 2,11$	$4,0 \pm 1,10$	$38 \pm 8,87^*$
Каховское водохранилище	$63,0 \pm 11,32$	$7,0 \pm 1,25$	$4,0 \pm 1,03$	$35 \pm 7,25$

Примечание. * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$.

Как свидетельствуют данные представленной таблицы, в наиболее контрастном случае очевиден факт уменьшения диаметра капсулы Боумена–Шумлянського (на 9,0 мк). В отношении мезонефроса особей из среды с умеренной минерализацией, изменения диаметра капсулы Боумена–Шумлянського фиксируется в пределах 6,0 и 4,0 мк, что соответствует второму уровню статистической достоверности. В пользу факта снижения функциональной активности конволюты свидетельствует также и уменьшение высоты эпителиоцитов проксимальных извитых канальцев (на 3,0; 2,0 и 4,0 мк соответственно).

Количество ретикуло-лимфомиелоидных элементов в мезонефросе особей из Каховского водохранилища (контроль) и акваторий Днепра (опыт) отличается невысоким уровнем достоверности. Соотношение гемопозитической ткани и структурных единиц конволюты в мезонефросе особей в конце пути миграции приблизительно одинаково, что соответствует нормальному физиологическому статусу рыб.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Основой адаптации почек леща к водоемам с различной соленостью является структурная неоднородность нефронов, выраженная в величине и строении почечных телец и извитых канальцев.

Колебания соотношения нефрогенной и гемопозитической тканей носит балансный характер, что может быть связано с перераспределением этих составляющих в связи с возникновением адаптации под действием хлорид-ионов.

Дислоцирование ионотранспортирующих клеток вблизи кровеносных сосудов и вокруг эпителиоцитов канальцев свидетельствует об участии мезонефроса в ионорегуляторных процессах, повышая устойчивость к изменению осмолярности среды.

При снижении осмолярности в мезонефросе леща изменяется функциональная активность нефрона, что выражается в уменьшении диаметра почечных телец и высоты эпителия проксимальных извитых канальцев.

Фактическая информация предоставляет возможность использования полученного материала не только в морфофизиологических исследованиях, но также в практике ихтиологии и рыбоводства в связи с существующей проблемой

понижения жизненного статуса особей, что предопределяет сокращение запасов ряда ценных промысловых видов, образовавших полупроходные формы в дельтовых акваториях речных систем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Автандилов Г. Г. Морфофункциональные методы исследования в норме и патологии: учебник для студентов медицинских техникумов и ВУЗов. Киев: Здоровье, 1983. 168 с.
2. Мовчан Ю. В. Риби України (визначник-довідник). Київ: Золоті Ворота, 2011. 444 с.
3. Брюзгин В. Л. Методы изучения роста рыб по чешуе, костям и отолитам. Киев: Наукова думка, 1969. 187 с.
4. Козий М. С. Оценка современного состояния гистологической техники и пути усовершенствования изучения ихтиофауны: монография. Херсон: Олди-плюс, 2009. 310 с.
5. Козий М. С. Перспективи впровадження методики діоксанового зневоднення у процесі викладання гістології//Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2008. Вип. 4 (47). С. 176—179.
6. Козий М. С. Гістологічний аналіз осморегуляції у лосося чорноморського (*Salmo trutta labrax*)//Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 2010. С. 263—266. (Серія: біологія).
7. Козий М. С. Гистоморфологические особенности ихтиофауны юга Украины: монография. Херсон: Олди-плюс, 2011. 310 с.
8. Лепилина И. Н. Развитие мезонефроса у личинок осетровых рыб//Вопросы ихтиологии. 2007. Т. 47, № 1. С. 86—92.
9. Возрастные, видовые и экологические особенности состава головной почки трех видов пресноводных костистых рыб Рыбинского водохранилища/Назарова Е. А. и др.//IX съезд гидробиологического общества РАН: тез. докл. Тольятти, 2006. С. 53—54.
10. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва: Колос, 1969. 255 с.

REFERENCES

1. Avtandilov, G. G. (1983). *Morfofunktsional'nye metody issledovaniya v norme i patologii: uchebnik dlya studentov meditsinskikh tekhnikumov i VUZov*. Kiev: Zdorov'e.
2. Movchan, Yu. V. (2011). *Ryby Ukrainy (vyznachnyk-dovidnyk)*. Kyiv: Zoloti Vorota.
3. Bryuzgin, V. L. (1969). *Metody izucheniya rosta ryb po cheshue, kostyam i otolitam*. Kiev: Naukova dumka.
4. Koziiy, M. S. (2009). *Otsenka sovremennogo sostoyaniya gistologicheskoy tekhniki i puti usovershenstvovaniya izucheniya ikhtiofauny: monografiya*. Kherson: Oldi-plyus.
5. Koziiy, M. S. (2008). *Perspektyvy vprovadzhennia metodyky dioksanovoho znevodnennia u protsesi vykladannia histolohii. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor'ia*, 4 (47), 176-179.
6. Koziiy, M. S. (2010). *Histolohichni analiz osmorehuliatcii u lososia chornomorskoho (Salmo trutta labrax). Naukovi zapysky Ternopilskoho pedahohichnoho universytetu im. V. Hnatiuka*, 263-266. (Serii: biolohiia).

7. Koziy, M. S. (2011). *Gistomorfologicheskie osobennosti ikhtiofauny yuga Ukrainy: monografiya*. Kherson: Oldi-plyus.
8. Lepilina, I. N. (2007). Razvitie mezonefrosa u lichinok osetrovyykh ryb. *Voprosy ikhtiologii*, 47, 1, 86-92.
9. Nazarova, E. A., & Zabotkina, E. A. (2006). Vozrastnye, vidovye i ekologicheskie osobennosti sostava golovnoy pochki trekh vidov presnovodnykh kostistykh ryb Rybinskogo vodokhranilishcha. *IX s"ezd Gidrobiologicheskogo obshchestva RAN: tez. dokl.* Tol'yatti, 53-54.
10. Plokhinskiy, N. A. (1969). *Rukovodstvo po biometrii dlya zootekhnikov*. Moskva: Kolos.

ДИНАМІЧНІСТЬ МІКРОСТРУКТУРИ МЕЗОНЕФРОСУ ЛЯЩА (ABRAMIS BRAMA LINNAEUS, 1758) ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКОЇ ГИРЛОВОЇ СИСТЕМИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕРЕСТОВОЮ МІГРАЦІЄЮ

К. М. Гейна, gejnakonstantin@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН
України, м. Київ

М. С. Козій, kozij67@gmail.com, Чорноморський національний університет
ім. Петра Могили, м. Миколаїв

Мета. Проаналізувати за допомогою мікроанатомічних методів досліджень структуру мезонефросу ляща (*Abramis brama* Linnaeus, 1758) в період нерестової міграції, визначити перспективу використання даних мікроанатомічного моніторингу в іхтіологічній практиці з метою оцінки функціонального статусу риб.

Методика. Збір іхтіологічних матеріалів здійснювався за дозволими документами Інституту рибного господарства НААН, а опрацювання — в лабораторії кафедри водних біоресурсів і аквакультури Херсонського ДАУ.

Для збору іхтіологічних матеріалів застосовувалися ставні сітки, частикові ятері, закидні неводи. Облікові станції розташовувалися за ходом нерестової міграції виду з Дніпровського лиману в заплаву систему Дніпра.

Польове і камеральне опрацювання матеріалу проводили за допомогою авторського устаткування і оригінальних методик, спеціально призначених для гістологічної діагностики тканин гідробіонтів тваринного походження.

Результати. Основою адаптації нирок ляща до водойм з різною солоністю є структурна неоднорідність нефронів, виражена у величині і будові ниркових тілець і звитих канальців. Значні коливання показників осмоларності в межах акваторій пониззя Дніпра достовірно впливають на зміну будови і функції нефрогенної тканини у вигляді зменшення діаметру капсули Боумена–Шумлянського на 9,0 мк. Зміни діаметру капсули Боумена–Шумлянського особин з середовища з помірно мінералізацією фіксуються в межах 6,0 і 4,0 мк. На користь факту зниження функціональної активності конволюти свідчить також і зменшення висоти епітеліоцитів проксимальних звитих канальців на 3,0; 2,0 і 4,0 мк.

Колівання співвідношення нефрогенної і гемопоетичної тканин носить балансний характер, що може бути пов'язане з перерозподілом цих складових у зв'язку з виникненням адаптації під дією хлорид-іонів.

Дислокація іонотранспортуючих клітин поблизу кровоносних судин і навколо епітеліоцитів канальців свідчить про участь мезонефросу в іонорегуляторних процесах, підвищуючи стійкість до зміни осмоларності середовища.

При зниженні осмоларності в мезонефросі ляща змінюється функціональна активність нефрону, що виражається в зменшенні діаметру ниркових тілець і висоти епітелію проксимальних звитих канальців.

Наукова новизна. Вперше за останній час проведений детальний мікроанатомічний аналіз структури мезонефросу статевозрілих особин ляща Дніпровсько-Бузької гирлової системи. Істотно уточнена і доповнена інформація відносно таксономічних особливостей

трансформації нефрогенної тканини риб в умовах нерестової міграції.

Практична значимість. Фактична інформація надає можливість використання отриманого матеріалу не тільки в морфофізіологічних дослідженнях, але також в практиці іхтіології і рибництва у зв'язку з існуючою проблемою пониження життєвого статусу особин, що зумовлює скорочення запасів ряду цінних промислових видів, що утворили напівпрохідні форми в дельтових акваторіях річкових систем.

Ключові слова: нефрон, мезонефрос, нефрогенна тканина, осморегуляція, адаптація.

THE DYNAMICITY OF THE MESONEPHROS MICROSTRUCTURE IN BREAM (*ABRAMIS BRAMA* LINNAEUS, 1758) OF THE DNIEPER-BUG ESTUARY SYSTEM IN RELATION TO SPAWNING MIGRATION

K. Heina, gejnakonstantin@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS of Ukraine, Kyiv
M. Koziy, kozij67@gmail.com, Petr Mogyla Black Sea National University, Mykolaiv

Purpose. To analyze the mesonephros structure in the bream (*Abramis brama* Linnaeus, 1758) during its spawning migration, to determine the perspective of the use of microanatomical monitoring data in fisheries practice for assessing the functional status of fish.

Methodology. Collection of ichthyological material was carried out using permit documents of the Institute of Fisheries NAAS of Ukraine, while their processing was done at the Department of Aquatic Bioresources and Aquaculture of the Kherson State Agricultural University.

Ichthyological material was collected using gill nets, fyke nets, beach seines. Monitoring stations were located along the spawning migration run of the bream from the Dnieper lagoon to the plavni system of the Dnieper River.

Field and laboratory processing of the material was done using author's equipment and original methods specially designed for histological diagnostics of tissues of aquatic animals.

Findings. The basis of the adaptation of bream kidneys to waters of different salinities is structural irregularity of nephrons expressed in the size and structure of renal corpuscles and convoluted tubules. Significant fluctuations of osmolarity parameters within the lower Dnieper area have significant effects on changes in the structure and function of nephrogenic tissue in form of the reduction in the diameter of Boumen-Shumliansky capsule by 9.0 μm . Changes of the Boumen-Shumliansky capsule diameter in fish with moderate mineralization is the range of 6.0 and 4.0 μm . The reduction in the height of epitheliocytes of proximal convoluted tubules by 3.0; 2.0 and 4.0 μm also indicate on the reduction of the functional activity of the convolute.

The fluctuations of nephrogenic and homeopathic tissue ratio have a balance nature that can be related to the redistribution of these components due to the appearance of an adaptation under the effect of chloride-ions.

The dislocation of ion-transporting cells near the blood vessels and around tubule epitheliocytes indicate on the participation of mesonephros in ion-regulating processes by increasing the resistance to changes in the osmolarity of the medium.

The functional activity of a nephron changes when the osmolarity in bream mesonephros decreases that is manifested as a reduction in the diameter of renal corpuscles and height of the epithelium of proximal convoluted tubules.

Originality. The detailed microanatomical analysis of mesonephros structure of mature bream of the Dnieper-Bug mouth system has been performed for the first time. The existing information on the taxonomic peculiarities of the transformation of nephrogenic tissue of fish in the conditions of spawning migration has been significantly elaborated and updated.

Practical value. The actual information gives an opportunity to use the obtained material not only in morphophysiological studies but also in the practice of ichthyology and aquaculture in relation to the existing problem of the reduction in the life status of individual fish that results in the reduction of the stock of valuable commercial species, which formed partially migratory forms in the delta areas of river ecosystems.

Keywords: nephron, mesonephros, nephrogenic tissue, osmoregulation, adaptation.

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 78-98
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.078>
УДК 597-111.12:597.442

ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОПОЕЗУ У ОСЕТРОВИХ ВИДІВ РИБ (*ACIPENSERIDAE*) (ОГЛЯД)

І. І. Грициняк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

Мета. Проаналізувати наукові джерела щодо видоспецифічних особливостей гемопоезу та гісто-морфологічних характеристик гемопоетичних тканин і органів у осетрових видів риб (*Acipenseridae*). Розглянути загальні моменти їх будови на різних етапах онтогенезу. Висвітлити загальні риси диференціювання та проліферації формених елементів крові.

Результати. Огляд наукових праць виявив, що гемопоез у осетрових видів риб суттєво відрізняється від такого не лише у ссавців (*Mammalia*), а й у інших риб з класів хрящових (*Chondrichthyes*) та кісткових (*Osteichthyes*). Крім того, осетровим притаманна видоспецифічність в розвитку органів гемопоезу на кожному з етапів онтогенезу. Органами гемопоезу у осетрових є: гемопоетичний краніальний або лімфоїдний орган, зябра, селезінка, серце, тимус, шлунково-кишковий тракт (передній відділ травного каналу, пілорична залоза, середній відділ кишківника, спіральний клапан та печінка) і нирки (пронефрос та мезонефрос).

Практична значимість. Систематизовані дані стосовно специфіки перебігу гемопоезу та закономірностей розвитку гемопоетичних органів у осетрових видів риб стануть у пригоді як дослідникам, так і фермерам-рибоводам. Це обумовлено тим, що перебіг гемопоезу найбільш повно відображає певний етап розвитку осетрових риб і слугує миттєвою реакцією ряду тканинних систем організму на будь-які зміни як внутрішнього, так і зовнішнього середовища.

Ключові слова: осетрові види риб (*Acipenseridae*), гемопоез, гемоцитобласти, біла кров, червона кров, гемопоетичний краніальний орган, зябровий апарат, селезінка, серце, тимус, шлунково-кишковий тракт, мезонефрос, гепатолатеральний гемопоез.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Гемопоез — це процес утворення клітин крові із гемопоетичних стовбурових клітин (гемоцитобластів). Останні є досить великими за розміром клітинами, з базofilною цитоплазмою, ядром з розпорошеним хроматином та добре вираженим активним ядрцем. Вони дають початок клітинам-попередникам, які інтенсивно проліферують та поступово диференціюються у зрілі форменні елементи крові (ФЕК). На початковому етапі гемопоезу відбувається диференціація на дві клітинні лінії: міелоїдну (дає початок еритроцитам, мегакаріоцитам, гранулоцитам та моноцитам) та лімфоїдну (дає початок В-лімфоцитам, Т-лімфоцитам та НК-клітинам) [1–4].

Специфічність гемопоезу осетрових риб виявляється у рівні його інтенсивності (про що свідчить постійна присутність в крові незрілих форм еритроцитів та білих клітин) та локалізації.

© І. І. Грициняк, М. Ю. Симон, 2017

Рівень інтенсивності гемопоєзу осетрових риб залежить від численних зовнішніх та внутрішніх чинників. Це пояснюється тим, що він, в свою чергу, є елементом процесу гістогенезу, а отже, й відповідною реакцією низки тканинних систем організму на будь-які зміни [5, 6]. Наприклад, за дефіциту кисню спостерігається посилення еритропоєзу (процесу утворення еритроцитів), при зниженні температури води або її забрудненні органічними речовинами — посилення лейкопоєзу (процесу утворення лейкоцитів) за рахунок фагоцитуючих форм (нейтрофілів, еозинофілів, моноцитів тощо), а інфікування риби, крім фагоцитозу, підсилює й морфогенез лімфоцитів [7, 8].

Локалізацію гемопоєзу у осетрових риб значною мірою визначає відсутність червоного кісткового мозку (основного гемопоетичного органу вищих хребетних) та лімфатичних вузлів. Відповідно, цю функцію виконують інші органи, які функціонально відрізняються від таких у теплокровних хребетних [9, 10]. Органами гемопоєзу у осетрових є (табл. 1): гемопоетичний краніальний або лімфоїдний орган (ГКО), зябра, селезінка, серце, тимус, шлунково-кишковий тракт (передній відділ травного каналу, пілорична залоза, середній відділ кишечника, спіральний клапан та печінка) і нирки (пронефрос та мезонефрос) [11, 12].

Таблиця 1. Органи гемопоєзу основних систематичних груп риб (за М. П. Грушко) [11]

Гемопоетичний орган	Систематична група риб		
	Хрящові (<i>Chondrichthyes</i>)	Хрящові ганоїди (<i>Chondrostei</i>)	Кісткові (<i>Osteichthyes</i>)
ГКО	—	усі ФЕК	усі ФЕК
Зябра	—	гранулоцити агранулоцити	гранулоцити агранулоцити
Селезінка	усі ФЕК	усі ФЕК	усі ФЕК
Серце	еритроцити гранулоцити агранулоцити	еритроцити гранулоцити агранулоцити	еритроцити гранулоцити агранулоцити
Тимус	—	лімфоцити гранулоцити	лімфоцити
ШКТ	гранулоцити агранулоцити	гранулоцити агранулоцити	гранулоцити агранулоцити
Нирки	еритроцити гранулоцити агранулоцити	еритроцити гранулоцити агранулоцити	еритроцити гранулоцити агранулоцити

Хрящові ганоїди (*Chondrostei*) — це підклас класу променеперих (*Actinopterygii*) риб, до якого належить ряд осетроподібних (*Acipenseriformes*) риб. В останніх всі центральні та периферичні органи гемопоєзу, за винятком тимусу, в ранньому онтогенезі продукують усі клітинні лінії ФЕК. При цьому, нирка, селезінка, зябра, ГКО та гемопоетичні утворення шлунково-кишкового тракту (ШКТ) є органами, де відбувається розвиток плазматичних клітин (основних клітин, що продукують антитіла, будучи кінцевим етапом розвитку

β-лімфоцитів) [12]. Крім того, селезінка забезпечує утворення клітин еритроїдного ряду (базофільних еритробластів, поліхроматофільних еритробластів, оксифільних еритробластів, поліхроматофільних нормобластів, оксифільних нормобластів, ретикулоцитів та еритроцитів), які функціонально нагадують червоний кістковий мозок ссавців. Серце осетрових риб всередині вистелене одношаровим плоским епітелієм, який також причетний до процесу гемопоезу, як і ендотелій кровоносних судин. Наявність лімфоїдних конгломератів в слизовій оболонці травної трубки осетрових риб дозволяє асоціювати з гемопоезом й ШКТ. Зокрема, чимало дослідників вважають, що лімфоїдні утворення в ньому є резервуарами білих клітин, за рахунок яких відбувається постійне поповнення пулу білої крові (лейкоцитарної формули), що циркулює судинами. Крім того, важливе місце в процесі утворення білої крові відводиться тимусу та ГКО [8, 9].

Таким чином, всі клітини крові осетрових риб мають спільне походження від гемоцитобластів — гемопоетичних стовбурових клітин, які, в свою чергу, походять від клітин первинної ембріональної мезодерми (середнього зародкового листка). Згодом дозрівання окремих форм лейкоцитів відбувається в лімфоїдній тканині травної трубки, ГКО та тимусі. Дозрівання тромбоцитів, швидше за все, проходить в селезінці. Інтенсивність гемопоезу різних органів у осетрових видів риб характеризує табл. 2 [8, 9].

Таблиця 2. Вміст ФЕК в гемопоетичних органах та судинній крові осетрових видів риб, % (за М. П. Грушко) [8]

Вид клітин крові	Екстраваскулярний гемопоез						Інтраваскулярний гемопоез
	Зябра	Нирки	ШКТ	Серце	Селезінка	ГКО	
Еритробласти	7,6	3,3	—	2,50	2,5	3,3	1,0
Еозинофіли	3,5	6,0	1,0	8,00	15,2	18,2	1,8
Гемоцитобласти	1,0	2,9	—	—	3,0	2,5	1,5
Мієлобласти	1,0	2,0	—	—	2,0	—	1,0
Промієлобласти	2,5	2,2	—	1,00	2,5	1,0	3,5
Мієлоцити	3,6	3,4	—	2,50	5,2	7,0	2,7
Метамієлоцити	3,0	4,8	2,0	2,11	5,2	3,5	4,0
n-гранулоцити	6,5	9,6	2,0	5,00	9,1	20,0	10,6
c-гранулоцити	4,0	11,6	1,0	12,20	9,9	3,5	12,2
Лімфоцити	61,3	53,6	93,5	38,40	65,5	39,0	54,7
Моноцити	4,0	—	0,5	1,70	2,0	2,0	5,0

В ембріональному періоді розвитку осетровим рибам притаманний жовтковий гемопоез, який досліджували В. В. Мільштейн та З. С. Кауфман [13, 14]. Його утворення обумовлено зростаючими потребами ембріону у кисні. Він нерозривно пов'язаний з системою жовткового кровообігу — провізорного дихального органу, який зникає з появою зябрового дихання (в передличинковий період розвитку). Таким чином, жовтковий гемопоез відбувається під час

ембріонального періоду розвитку, який складається з двох періодів: власне ембріонального та передличинкового. Цей тип гемопоєзу закінчується за повного розсмоктування жовткового мішка, до моменту переходу на активне живлення [12, 15]. В передличинковому періоді розвитку осетрових риб мезенхіма — пухка волокниста неоформлена ембріональна сполучна тканина — виконує роль мікрооточення. Згодом, починаючи з личинкового періоду розвитку, її замінюють ретикулярні клітини (ретикулоцити), які утворюють волокнисту сполучну тканину з колагену 3-го типу (ретикулярний синцитій). Ретикулоцити поділяються на чотири типи — сплячі, малоактивні, перехідні та активні. Причому перші три типи є своєрідним резервним фондом, а останній слугує мікрооточенням для клітин крові, що розвиваються. На одну таку клітину припадає, в середньому, 6–7 ретикулоцитів. Будова мікрооточення у осетрових видоспецифічна. Слід зазначити, що, починаючи з цього періоду розвитку, диференціація клітинних рядів (еритропоетичного, лімфоцитопоетичного та мієлоцитопоетичного) у осетрових риб відбувається гетерохронно — з асинхронністю фаз розвитку окремих органів та функцій [12].

У молоді осетрових віком 5 місяців всі гемопоетичні органи повністю сформовані і мають дефінітивні морфологічні риси [11, 12].

У статевозрілих осетрових гемопоетичні утворення в кишківнику та зябрах є місцем формування гранулоцитів (еозинофілів, нейтрофілів, базофілів) та агранулоцитів (лімфоцитів та моноцитів). Крім того, саме в них відбувається проліферація та диференціювання лімфоцитів та плазмоцитів. В селезінці розвиваються всі три (лейкоцити, еритроцити, тромбоцити) типи ФЕК, а в міжканальцевій тканині мезонефроса та пронефросі — два. Таким чином, основними гемопоетичними органами, в яких реалізується процес проліферації та диференціювання клітин крові у осетрових риб, є селезінка, мезонефрос та тимус [16].

Протягом всього життя у осетрових риб наявий розподіл гемопоєзу на екстраваскулярний (поза судинами, в тканинах) та інтраваскулярний (всередині судин) типи. Однак, в ранньому онтогенезі їх інтенсивність видоспецифічна [11, 12, 16]. Екстраваскулярний гемопоєз у осетрових видів риб в ранньому онтогенезі слабкіше розвинутий, ніж інтраваскулярний. Так, в периферичній (тій, яка циркулює судинами за межами кровотворних органів) крові на 36 стадії розвитку вже є поліоксифільні нормобласти, тоді як в мезонефросі — тільки базофільні нормобласти. Загалом, першим з усіх клітинних рядів формується еритропоетичний (на 39 стадії розвитку передличинкового періоду), другим — лімфоцитопоетичний (до 41 стадії), останнім — мієлоцитопоетичний (в мальковий період). У статевозрілих осетрових риб екстраваскулярний гемопоєз найбільш інтенсивно відбувається в мезонефросі [12, 15]. Інтраваскулярний гемопоєз забезпечує дозрівання моноцитів та гранулоцитів. В периферичній крові осетрових видів риб відбувається формування клітин еритропоетичного, агрануло- та гранулоцитопоетичного рядів [11].

Метою даної роботи є огляд та аналіз масиву інформації щодо гістологічних, фізіолого-біохімічних, морфологічних та генетичних особливостей гемопоєзу на різних стадіях онтогенезу осетрових видів риб.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ. ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Гемопоетичним органам представників родини осетрових (*Acipenseridae*) видів риб притаманна низка відмінностей не лише від подібних органів класу ссавців (*Mammalia*), а й від таких у риб з класів хрящових (*Chondrichthyes*) та кісткових (*Osteichthyes*). Крім того, їм притаманна видоспецифічність розвитку органів гемопоезу, що робить останні актуальним об'єктом досліджень. Нижче ми розглянемо гемопоетичні утворення осетрових видів риб та особливості їх функціонування в різні онтогенетичні періоди.

Гемопоетичний краніальний орган (ГКО), або лімфоїдний орган, вперше був досліджений Н. Т. Івановою в 1970-х роках. Він являє собою скупчення лімфоїдної тканини і ретикулярного синцитію та знаходиться у осетрових риб під кришкою черепа, над довгастим мозком та мозочком [17, 18]. Між ГКО та мозком розташована судина, від якої відходять численні синусоїдні капіляри, переповнені кров'ю. Крім того, в самому органі є безліч кровоносних лакун, деякі з них поєднані між собою. В онтогенезі він розвивається пізніше інших гемопоетичних органів, вперше виявляючись в кінці личинкового періоду розвитку — на 15 добу активного живлення. Його гістологічна будова подібна до будови червоного кісткового мозку у ссавців. Таким чином, це перший в еволюції тварин приклад асоціації гемопоетичної тканини та скелету, що спостерігається у вищих хребетних [19]. Зовні він має пірамідальну форму з чітко позначеними межами та тонкою прозорою оболонкою. Його темно-сіре забарвлення зумовлене наявністю в ній численних пігментних клітин. Вміст ГКО — сірувато-рожевого кольору [10]. Усередині він розділений сполучнотканинними перетинками на лопаті, кожна з яких поділяється на центральну частину та периферичну. В останній острівці гемопоетичної тканини утворюють скупчення, тоді як в центральній частині вони розташовуються поодинокі, оточуючи кровоносні судини. Їм притаманна округла форма, завдяки чому їх скупчення нагадують грона винограду [20].

У статевозрілих осетрових риб маса цього органу досить висока: наприклад, у трирічної білуги (*Huso huso* Linnaeus, 1758) вона становить 0,8% загальної маси тіла [10]. Більшу частину маси становлять ретикулярна тканина та ФЕК, у співвідношенні 1:4. Найчастіше останні оточені активними ретикулоцитами, тоді як малоактивні, перехідні та сплячі ретикулоцити розташовуються групами по кілька клітин обабіч від гемопоетичних острівців. Так, середня частка активних ретикулоцитів найбільша, становлячи близько $62,8 \pm 2,25\%$, у малоактивних та перехідних вона трохи менша — $15,7 \pm 0,51$ і $12,6 \pm 1,01\%$ відповідно, а найменша — у сплячих: $8,9 \pm 0,05\%$ [21]. В ГКО у осетрових, як і у костистих риб, формуються всі типи ФЕК. Втім, якщо у останніх переважають клітини агранулоцитопоетичного ряду, то у осетрових — еритропоетичного (70%) [10, 11]. З його клітин домінують базofilьні та поліоксифільні нормобласти, становлячи 29,6 та 26,7% відповідно. Оксифільних нормобластів близько 18,5%, а ортохромних — 8,1%. Нормобластів та еритробластів практично в рівній кількості — 8,1 та 8,9% відповідно. З клітин білої крові в ГКО осетрових риб домінують пролімфоцити (62,7%) та зрілі лімфоцити (18,6%). З бластних форм

переважають лімфобласти (10,2%) та мієлобласти (6,8%), а найменше — монобластів (1,6%) [10, 19–21].

Гемопоез у зябровому апараті осетрових, як і у костистих риб, відбувається поряд з дихальною та іншими функціями впродовж всього життя. В цьому органі він здійснюється за рахунок ендотелію судин та ретикулоцитів, зосереджених у ділянці зябрових дужок, біля основ зябрових пелюсток [7, 21, 22]. В цих острівцях гемопоетичної тканини розвиваються клітини грануло- та агранулоцитопоеетичного рядів, мікрооточення яких утворюють ретикулоцити всіх чотирьох типів, з переважанням активного. На відміну від костистих риб, у яких клітин агрануло- та гранулоцитарних рядів приблизно порівну, у осетрових риб переважають клітини лімфоцитопоеетичного ряду (72,0%) [11]. Наприклад, у білуги (*Huso huso* Linnaeus, 1758) частка лімфобластів від загальної клітин лімфоцитопоеетичного ряду становить $14,0 \pm 0,42\%$, за діаметра лімфобластів $9,8 \pm 0,02$ мкм. Для пролімфоцитів ці показники — $13,0 \pm 0,21\%$ та $5,88 \pm 0,01$ мкм відповідно. Плазмобласти поодинокі, частка плазмоцитів — $6,0 \pm 0,12\%$, діаметр — $9,8 \pm 0,03$ мкм. Кількість мієлобластів невелика — $6,0 \pm 0,05\%$, їх діаметр $17,36 \pm 0,02$ мкм, промієлоцитів — $6,0 \pm 0,06\%$ діаметром $15,19 \pm 0,01$ мкм, а еозинофільних мієлоцитів — $16,0 \pm 0,16\%$ та $13,02 \pm 0,02$ мкм відповідно [22].

Гемопоез у селезінці. У древніх риб (кістково-хрящових, хрящових та дводішних) будова цього органу досконаліша, ніж у костистих, — як і у ссавців, вона складається з червоної та білої пульпи з різним складом гемопоетичної тканини [23, 24]. Характерною відмінністю осетрових риб від костистих є можливість чіткого візуального поділу строми на білу та червону пульпу, в якій можна виділити центральну і периферичну зони [12, 15]. Крім того, в них площа білої пульпи менша, ніж у костистих [11]. В основі структури білої пульпи селезінки осетрових риб лежить спеціальна система венозних синусів, які пронизують товщу гемопоетичної тканини. Строма останньої утворює мережу розгалужених клітин ретикулярної тканини усіх 4-х типів у білій пульпі. Активні ретикулоцити оточують гетерогенну систему морфологічно невиразних камбіальних клітин та ФЕК, що диференціюються. Разом це створює складну картину розподілу різноманітних за рівнем та напрямом диференціювання клітинних елементів [25]. За своєю участю в гемопоезі вона є універсальним органом, оскільки в ній формуються клітини еритропоетичного, лімфоцитопоеетичного і мієлоцито-поетичного рядів, а також відбувається тромбоцитопоез та імунцитопоез [25, 26]. Дослідження А. П. Скворцова вперше виявили властиву селезінці функцію фагоцитозу. Так, в ній накопичуються та руйнуються клітини крові [11, 27, 28]. І. І. Шмальгаузен, А. А. Заварзін та С. С. Щелкунов висунули гіпотезу про те, що селезінка риб та амфібій швидше нагадує червоний кістковий мозок, ніж селезінку у ссавців [7, 29–34]. Втім, А. А. Максимов та А. А. Заварзін вважають селезінку основним органом еритро- та тромбопоезу, що має певні розбіжності з думкою Н. Т. Іванової, яка вважає, що в селезінці здійснюється й лімфогранулопоез [7, 18, 35, 36]. В основі еритропоезу в селезінці лежать гемоцитобласти, які після диференціації утворюють еритробласти, що скупчуються в острівцях з 4–6 клітин. В міру накопичення гемоглобіну в них відбувається зміна здатності цитоплазми сприймати барвники: базofilія на початкових стадіях диференціювання змінюється оксифілією на кінцевих. Таким чином, в селезінці осетрових риб знаходяться базофільні, поліхроматофільні, еозинофільні та оксифільні еритробласти. Припинення

диференціації відбувається на стадії нормобластів. Підґрунтям для тромбоцитопоезу в селезінці є наявність великих мегакаріоцитів — попередників тромбоцитів. Загалом, для осетрових видів риб є характерним переважання в селезінці ФЕК еритропоетичного (52,0–68,0%) та тромбоцитопоетичного (2,0–6,5%) рядів, в той час як у костистих риб — грануло- та агранулоцитопоетичного (62,1%). Іншою відмінністю між осетровими і костистими видами риб в гемопоезі у селезінці є картина лейкоцитарної формули. Так, у осетрових риб переважають клітини гранулоцитопоетичного (76,0–90,0%), тоді як у костистих — агранулоцитопоетичного ряду (67,4%) [11].

У передличинок осетрових видів риб вперше виявляється закладка селезінки, а саме — на 45 стадії розвитку, до їх переходу на активне живлення. У цей момент вона являє собою щільне скупчення клітин мезенхіми [12, 15]. Вона формується на основі тканини біля кишківника, розташовуючись в його петлях, перед спіральним клапаном [23, 24].

У личинок осетрових риб селезінка представлена білою пульпою, в якій відбувається формування клітин еритропоетичного, лімфоцитопоетичного та гранулоцитопоетичного рядів. Зокрема, в ній містяться фолікулоподібні скупчення лімфоцитів, гранулоцитів та макрофагів [23]. В цей період розвитку строма органа містить високу кількість гемоцитобластів і до початку малькового періоду в ній відбувається активний розвиток ретикулярного синцитію [12, 15].

У молоді осетрових риб в селезінці остаточно формується структура червоної та білої пульпи, а також починають утворюватися макрофагальні центри [12, 15]. У білій пульпі, серед елементів ретикулярного синцитію, розвиваються клітини гранулоцитопоетичного та агранулоцитопоетичного рядів. Наприклад, у молоді російського осетра (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt, 1833) частка монобластів становить 4,0%, а їх діаметр — 17,64 мкм. Для мієлобластів ці показники 10,2% та 17,36 мкм відповідно. Гемопоетичні острівці налічують 10–15 клітин, в яких найбільша частка у лімфоцитів — 34,0%, трохи менша у лімфобластів — 32,8% і найменша у пролімфоцитів — 19,0%. Діаметр цих клітин наступний: у лімфоцитів — 3,92 мкм, у лімфобластів — 9,8 мкм, у пролімфоцитів — 5,88 мкм. Таким чином, в ретикулярній тканині білої пульпи селезінки молоді осетрових риб відбувається інтенсивний процес формування всіх клітинних елементів крові. При цьому, клітини червоної крові переважають над клітинами білої — 73,0 та 27,0% частки відповідно. Основна площа білої пульпи представлена ретикулоцитами всіх 4-х типів, з переважанням активних (53,2%). Їм властива чарункова цитоплазма та ядро, що містить тонке хроматинове мереживо і ядерце. Діаметр цих клітин — $8,4 \pm 0,23$ мкм. На 2-му місці за чисельністю (20,3%) — малоактивні ретикулоцити, більші діаметром ($9,8 \pm 0,34$ мкм) та з грубшим хроматиновим мереживом. 3-є місце (13,8%) посідають перехідні ретикулоцити, діаметром $12,8 \pm 0,09$ мкм, з базофільною цитоплазмою і великим ядром. Найменша чисельність (12,7%) у сплячих ретикулоцитів — найбільших (діаметром $13,2 \pm 0,59$ мкм) клітин овальної форми, з слабобазофільною цитоплазмою та блідим ядром, в якому найтонші нитки хроматину та відсутні ядерця. Червона пульпа становить близько 45% об'єму селезінки і складається з ретикулярного синцитію з хаотично розташованими в ньому клітинами крові та великої кількості макрофагів [23, 24]. У віці 5 місяців у осетрових видів риб відбувається завершення формування селезінки. В цей час вона являє собою

морфологічно розвинений орган, з дуже тонкою сполучнотканинною капсулою, що без чітких меж переходить в сполучнотканинний шар серози (тонкої та щільної сполучнотканинної мембрани, вистилаючої порожнину тіла). Від неї всередину органу відходять трабекули, які анастомозують одна з одною. Паренхіма селезінки пронизана капілярами, заповненими ФЕК [19, 20].

Гемопоез у серці осетрових видів риб відбувається за рахунок гемопоетичної тканини, асоційованої з епікардом, — вісцеральним листком перикарду (зовнішньої серозної оболонки серця) [37, 38]. Епікард у осетрових риб представлений сполучнотканинним прошарком, що складається в основному з колагенових та еластичних волокон, вкритий зовні мезотелієм (шаром плоских клітин, що розвиваються зі спланхотомів мезодерми). Йому притаманна розгалужена мережа кровоносних судин, відростки капілярів яких пронизують зовнішній шар міокарда [12, 15, 37]. Завдяки їй товщина епікарду досить значна. Цей показник у осетрових риб варіює в широких межах та є видоспецифічним. Наприклад, у білуги (*Huso huso* Linnaeus, 1758) він становить близько 1,59 мм, в той час як у севрюги (*Acipenser stellatus* Pallas, 1771) — 0,33 мм. Епікард рівномірно оточує серце з усіх боків, маючи практично однакову товщину. Гемопоетична тканина, асоційована з ним, складається з ретикулоцитів і ФЕК, що розвиваються [19, 20]. Розвиток гемопоезу у серці осетрових риб видоспецифічний. Так, у білуги він формується на 10 добу активного живлення, у російського осетра — на 15, а у севрюги лише на 30. На початковому етапі розвитку гемопоетична тканина, асоційована з епікардом, являє собою послідовно розташовані, компактні скупчення острівців гемопоезу, оточуючих шлуночок та відсутніх навколо передсердя. В середньому їх близько 40, з приблизним діаметром $6,2 \pm 0,34$ мкм. У процесі розвитку гемопоетичної тканини, асоційованої з епікардом, вони об'єднуються, утворюючи велику гемопоетичну стрічку, рівномірно оточуючу серце з усіх боків. Вона нагадує мереживо, складаючись з окремих гемопоетичних острівців різної форми і розміру [12, 15]. В ній формуються всі ФЕК (гранулоцитопоетичного, агранулоцитопоетичного та еритропоетичного рядів), крім тромбоцитів і моноцитів [11]. Однак, під час онтогенезу у осетрових видів риб в гемопоетичній тканині, асоційованій з епікардом, відбувається зміна домінуючих рядів клітин крові.

У личинок осетрових риб гемопоетична тканина асоційована з епікардом, на 95% представлена клітинами еритропоетичного ряду і лише на 5% — лейкоцитопоетичного. Для цього періоду розвитку притаманні великі острівці гемопоезу з 3–5 бластних клітин в центрі, навколо яких розташовані еритроцити на різних стадіях розвитку. За зменшенням кількості останніх логічно утворюється наступний ряд: поліоксифільні нормобласти (53,3%) → еритробласти (15,0%) → оксифільні нормобласти (13,3%) → базофільні нормобласти (11,5%) → зрілі ортохромні еритроцити (3,6%) → нормобласти (3,1%). Клітини білої крові окремих острівців гемопоезу не утворюють. Вони здебільшого (60,0%) представлені пролімфоцитами, а із зрілих форм клітин — лише пролімфоцитами (4,0%). З бластних форм — лімфобласти (16,0%) та мієлобласти (15%), а монобластів найменше — 5,0% [38].

У молоді осетрових вже повністю морфологічно сформована гемопоетична тканина, асоційована з епікардом. В ній активно розвиваються клітини лімфоцитопоетичного та мієлоцитопоетичного рядів. Наприклад, у молоді

російського осетра в мікрооточенні острівців гемопоезу серед ретикулоцитів домінують активні. Так, у російського осетра та севрюги їх 95,8 і 95,4%, а у білуги — 94,7% [12, 15, 38].

У цьоголіток осетрових риб кількість клітин бластного класу знижується, в ньому починають переважати лімфобласти та мієлобласти. Зокрема, найбільше бластоцитів у цьоголіток севрюги — 6,2% та білуги — 6,1%, а найменше у російського осетра — 5,7%. Серед ФЕК переважають агранулоцити, причому найбільше їх у білуги (16,7%) і трохи менше у російського осетра (12,5%) та севрюги (10,4%). В той же час, серед гранулоцитів найбільш активно відбувається дозрівання еозинофілів — їх кількість перевищує таку незрілих нейтрофілів в кілька разів. Зрілі ФЕК представлені ортохромними еритроцитами та лімфоцитами, причому останніх в понад десять разів більше [37, 38].

Відмінність гемопоезу в серці осетрових риб від костистих полягає у будові гемопоетичної тканини, асоційованої з епікардом, та співвідношенні клітин крові, що розвиваються. Так, в осетрових наявні горбки — фолікулярні вузлики овальної форми, зовні в тонкій сполучнотканинній капсулі, а всередині розділені сполучнотканинними перетинками на лопаті, в яких ретикулярний синцитій скупчений на периферії. З ФЕК у осетрових риб формується більше лейкоцитів та бластних клітин і менше — еритроцитів [11].

Гемопоєз у тимусі. Тимус осетрових, як і костистих риб, — це парний орган, розташований за ротовою порожниною на медіальній стороні зябрової кришки. Однак, на відміну від костистих, у цьоголіток осетрових риб він поділяється на частки [12, 15]. Дослідження О. В. Ложніченко показали, що в кожній частці є добре помітні мозкова та кіркова речовини, з переважанням останньої. Їм притаманний різний якісний склад: перша має острівці лімфоцитопоєзу та мієлоцитопоєзу з їх мікрооточенням, а друга — активні ретикулоцити і лімфоцити [11]. Хоча мозковий шар відповідає за уворення Т-лімфоцитів і в ньому містяться кулястої форми тільця Гесса, однак, в ранньому онтогенезі у осетрових тимус сприяє утворенню суто мієлоїдного ряду, лімфоїдні клітини відсутні [12, 15]. Слід зазначити, що, на відміну від ссавців, у риб тимус функціонує все життя [7, 20].

Гемопоєз в ШКТ у осетрових риб відбувається завдяки асоціюванню гемопоетичної тканини із слизовою оболонкою переднього відділу травного каналу, пілоричною залозою, середнім відділом кишківника, спіральним клапаном та печінкою. Утворені таким чином гемопоетичні острівці суттєво відрізняються від таких у костистих риб. Крім того, серед лейкоцитів у всіх відділах ШКТ осетрових риб переважають клітини лімфоцитопоетичного ряду [11, 38].

У передньому відділі травного каналу в гемопоетичній тканині, асоційованій із слизовою оболонкою, формуються агранулоцити та гранулоцити, причому найбільше — лімфоцитів [11].

У пілоричній залозі гемопоетичні острівці відрізняються за розмірами від таких у середньому відділі кишківника та спіральному клапані, однак у всіх цих трьох органах вони оточені щільною сполучнотканинною оболонкою [39].

У середньому відділі кишківника частка агранулоцитів, що формуються, видоспецифічна. Наприклад, у стерляді вона становить близько 87,0%, а у севрюги — 97,0% [11].

У спіральному клапані їхня частка також видоспецифічна. Наприклад, у російського осетра вона становить близько 96,0%, а у білуги — 97,0% [11].

Гепатолатеральний період гемопоезу у осетрових є тимчасовим — він триває з личинкового періоду розвитку (10 доба активного живлення) до віку цьоголіток. Літературних вказівок про існування подібного гемопоезу у нижчих хребетних не відзначено [40]. Гепатолатеральний гемопоез починає реалізовуватися з масивного розростання близькосудинної сполучної тканини, хоча печінка у осетрових риб закладається на 35 стадії розвитку у вигляді т. зв. печінкового дивертикула — випинання вентральної стінки первинної кишки [20].

У віці 10 діб активного живлення капіляри печінки розширені і заповнені ФЕК, а їх стінки зсередини вистелені великими клітинами Бровича-Купфера (зірчастого ендотелію). Власне печінці притаманна балочна структура, гепатоцити полігональної форми, їх ядра відрізняються поліморфізмом. За наявності ядер гепатоцити поділяють на 3 групи: з великими ядрами (світлі клітини, з кількома ядерцями), з темними пікнотичними ядрами та безядерні. Серед гепатоцитів розташовані численні клітини мезенхіми, які утворюють острівці гемопоезу. Діаметр останніх — видоспецифічний. Так, у личинок білуги він найбільший, становлячи $87,35 \pm 12,16$ мкм, а у російського осетра та у севрюги менший — $85,13 \pm 21,30$ і $76,44 \pm 18,34$ мкм відповідно. На периферії печінки розташовуються більші острівці гемопоезу, ніж в її центрі. В центрі острівців гемопоезу розташовані 1–2 напівстовбурові клітини крові, поруч з ними — уніпотентні клітини-попередниці, а потім бластні клітини. Навколо кожної з цих груп клітин розташоване мікрооточення [40]. Отже, в міру віддалення від центру острівця гемопоезу клітини крові все більш зрілі. Розвиток різних рядів клітин крові відбувається топографічно в різних острівцях, діаметр яких видоспецифічний (табл. 3).

Таблиця 3. Діаметр ФЕК в печінці личинок осетрових видів риб на 10 добу активного живлення, мкм (за О. В. Ложніченко) [40]

Вид риб	Процес розвитку клітинної лінії			
	Мієлоцитопоез	Еритропоез	Моноцитопоез	Лімфоцитопоез
Білуґа	589,34±35,61	452,18±32,10	387,50±35,64	276,59±25,64
Російський осетер	557,61±26,17	392,46±26,14	352,41±26,14	251,28±23,06
Севрюґа	526,43±31,60	346,27±25,91	324,16±30,16	241,67±24,68

У віці 15 діб активного живлення, розростання гемопоетичної тканини охоплюють практично всю площу строми печінки. Гемопоетичні острівці набувають ознак видоспецифічності. Наприклад, у російського осетра вони становлять близько 35% від маси всього органа, а у личинок севрюги — до 45% [39]. Активно відбувається проліферація всіх клітинних рядів: еритропоетичного, лімфоцитопоетичного і мієлоцитопоетичного, а також тромбоцитопоез (табл. 4) [11, 12, 15, 40].

Таблиця 4. Вміст ФЕК в печінці личинок осетрових видів риб, на 15 добу активного живлення, % (за О. В. Ложніченко) [40]

Вид ФЕК	Вид риб					
	Білуга		Російський осетер		Севрюга	
	доба активного живлення					
	10	15	10	15	10	15
Напівстовбурові	5,9	6,6	10,7	6,3	4,4	3,9
Уніпотентні клітини-попередниці	3,6	3,8		4,2		2,6
Еритробласти	7,8	4,6	6,2	5,1	6,1	5,9
Лімфобласти	5,2	4,1	3,4	3,8	5,1	5,5
Мієлобласти	4,4	4,0	1,4	1,6	1,8	1,6
Монобласти	1,1	1,2	0,6	0,7	0,9	0,8
Пронормобласти	6,3	5,0	2,1	1,8	2,6	1,8
Пролімфоцити	4,5	4,6	4,7	5,6	6,1	5,8
Базофільні нормобласти	10,8	6,0	4,8	3,9	3,5	2,2
Поліоксифільні нормобласти	17,6	9,8	7,5	8,8	7,0	9,1
Оксифільні нормобласти	17,9	4,2	16,9	19,4	10,6	14,3
Ортохромні еритроцити	5,7	4,2	23,1	18,6	16,8	17,7
Лімфоцити	8,9	6,4	15,7	14,9	22,1	11,4
Еозинофіли	12,3	16,4	2,7	1,5	15,0	14,6
Нейтрофіли	5,3	9,2	0,7	3,8	3,6	2,8

Таким чином, у віці 15 діб активного живлення в печінці осетрових риб чітко виділяються гепатоцити та острівці гемопоезу з ретикулоцитами і ФЕК, причому останнім притаманна видоспецифічність [11, 12, 15].

Гемопоєз у нирках. Нирка осетрових риб представлена парними тяжами, розташованими дорсально від вивідної протоки, з численними сечовими каналцями, які за В. Л. Яніним поділяють на 4 типи [41]. Канальці 1-го типу мають вигляд «перешийка» та безпосередньо взаємодіють з нирковим або мальпігійним тільцем — клубочком найтонших судин з капсулою Боумена–Шумлянського (келихоподібним виопукленням каналця). Канальці 2-го типу — це найбільші сегменти, аналоги проксимального відділу нефрона, вистелені одношаровим призматичним епітелієм [42]. Канальці 3-го типу починаються з вигину каналців 2-го типу, аналоги дистального відділу метанефрального нефрона, вистелені одношаровим кубічним епітелієм [43]. Гемопоєз в нирці осетрових риб триває впродовж всього онтогенезу. Вона є одним з основних гемопоетичних органів цих риб. Зокрема, А. А. Заварзін та Н. Т. Іванова порівнювали її з червоним кістковим мозком ссавців [32–36]. Для неї характерний поділ на два відділи — пронефрос (головна) та мезонефрос (тулубова). Обидва

відділи є універсальними органами гемопоєзу, яким притаманне переважання клітин грануло- та агранулоцитопоетичних рядів над еритроїдними [11].

Пронефрос виконує гемопоетичну та ендокринну функції. Його формування розпочинається в ранньому онтогенезі за рахунок розростання міжканальцевої тканини краніальної частини мезонефроса. На початкових стадіях розвитку він складається з ретикулярної тканини, в якій пізніше розвиваються інтерреналові тільця та хромафінна тканина, утворена нейроендокринними хромафінними клітинами наднирників [12, 15]. Йому притаманна трохи менша кількість клітин еритропоетичного ряду, з яких найбільше зрілих еритроцитів (37,0% у севрюги, 39,0% у стерляді), у порівнянні з мезонефросом. Основна маса лейкоцитів, що які у ньому формуються, представлена гранулоцитами (91,0% — у стерляді, 94,0% — у севрюги). Варто вказати, що вищезазначені показники значно перевищують такі у костистих риб [11]. Іншою характерною особливістю пронефросу осетрових риб є те, що в ньому вже на личинковому періоді розвитку реєструються гранулоцити на стадії метамієлоцитів, тоді як в інших органах гемопоєзу вони диференціюються лише у молоді [12, 15].

Мезонефрос бере участь в становленні дефінітивної системи гемопоєзу у осетрових риб, при цьому мезонефральний етап гемопоєзу реалізується до моменту переходу предличинки на екзогенне живлення [44]. В ранньому онтогенезі, до кінця періоду ембріонального розвитку, він є високодиференційованим органом, починаючи виконувати екскреторну функцію. Відразу після вилуплення, коли організм вільного ембріона осетрових риб вступає в прямий контакт із зовнішнім середовищем, відбувається формування мезонефросу як універсального органу гемопоєзу, в той час як інші органи гемопоєзу знаходяться на стадії мезенхімних утворень [45, 46]. В його гемопоетичній тканині відбувається диференціювання еритроцитів, клітини яких становлять основну масу цього органу [39, 47]. Наприклад, у личинок білуги в гемопоетичній тканині мезонефросу найменший вміст монобластів та мієлобластів. За вмістом інших клітин крові формується наступний ряд (за збільшенням): гемоцитобласти (3,2%) → поліхроматофільні нормобласти (5,8%) → базофільні нормобласти (9,8%) → пронормобласти (27,0%) → еритробласти (29,1%). Клітини білої крові становлять приблизно 20,89%, з переважанням клітин лімфоцитопоетичного ряду: зокрема, пролімфоцитів близько 6,1%, а лімфобластів — 7,2% [11, 48].

Процес розвитку та диференціювання структур мезонефросу у осетрових риб видоспецифічний: динаміка його розвитку варіює в залежності від виду. Наприклад, процес диференціювання мезонефронів (з утворенням каналців 4 типу, що впадають у Вольфів протік) найшвидше завершується у білуги. Під час диференціювання відбувається зміна типів епітелію від багаторядного призматичного (в везикулах) до одношарового кубічного (у звивистих каналцях) та одношарового плоского (в мальпігієвих тільцях). У предличинки осетрових видів риб утворення сполучних відділів мезонефронів починається до переходу на активне живлення, на 45 стадії розвитку — за Т. А. Детлаф [43, 47–49].

У віці 10 діб активного живлення в структурі мезонефросу осетрових риб спостерігається видоспецифічність (табл. 5) [43, 50].

Таблиця 5. Мезонефрос личинок осетрових видів риб на 10 добу активного живлення (за О. В. Бобровою) [43]

Характеристика структури мезонефроса	Вид риб		
	Севрюга	Російський осетер	Білуга
S мальпігієвих тілець, мкм ²	3434,66±13,27	5215,82±5,90	7464,55±19,49
S судинних клубочків, дотичних до капсули Боумена–Шумлянського, мкм ²	1534,96±19,80	—	3181,37±15,07
Частка сечового простору, від S мальпігієвих тілець, %	55,31	41,67	57,38
Кількість клітин в судинних клубочках	45–48	30–37	45–64
S каналців 1-го типу, мкм ²	—	297,87±12,50	569,50±14,34
Частка епітелію, від S каналців 1-го типу, %	—	64,29	75,80
S каналців 2-го типу, мкм ²	1203,15±15,51	2051,68±19,72	3556,24±15,87
Частка епітелію, від S каналців 2-го типу, %	80,0	80,0	54,7
S каналців 3-го типу, мкм ²	586,62±13,47	820,67±13,09	1529,89±16,23
Частка епітелію, від S каналців 3-го типу, %	73,06	82,71	70,86

Примітка. Тут і далі S — площа.

В цей період у личинок осетрових риб не відбувається істотних структурних перетворень в мезонефросі, проте збільшуються розміри структурних компонентів мезонефронів. Сечовий простір має вигляд півмісяця, що оточує судинні клубочки. Мальпігієві тільця набувають витягнутої еліпсоподібної форми. Судинні клубочки найчастіше займають в них центральне положення [43, 44].

Вік 15 діб активного живлення — мезонефрос морфологічно сформований, вкритий власною капсулою та складається з функціонально активних структур (мезонефронів), пухкої волокнистої неоформленої сполучної тканини і міжканалцевої гемопоетичної тканини. У порожнинах проксимальних сегментів мезонефронів (каналцях 2-го типу), в результаті апокринової секреції (відриву апікальної частини епітеліоцитів з проникненням цитоплазми) присутній білок. Інтенсивність апокринової секреції видоспецифічна: так, у білуги вона найбільша, а у російського осетра — найменша [51]. Розташування капілярних клубочків в порожнині капсул Боумена–Шумлянського та їх розміри видоспецифічні [43] (табл. 6).

Таблиця 6. Мезонефрос личинок осетрових видів риб на 15 добу активного харчування (за О. В. Бобровою) [43]

Характеристика структури мезонефросу	Вид риб		
	Севрюга	Російський осетер	Білуга
S мальпігієвих тілець, мкм ²	7102,34±16,82	6836,38±15,42	14890,61±11,69
S судинних клубочків, дотичних до капсули Боумена–Шумлянського, мкм ²	4848,04±18,57	4630,20±10,47	9538,01±13,01
Частка сечового простору, від S мальпігієвих тілець, %	31,74	32,27	35,95
Кількість клітин в судинних клубочках	78–89	64–119	114–189

У мезонефросі молоді білуги у більшості мальпігієвих тілець судинні клубочки розташовуються на периферії капсул Боумена–Шумлянського, а сечовий простір оточує їх у вигляді півмісяця. У мезонефросі російського осетра вони, в основному, округлої форми з центрально розташованими капілярними клубочками. У севрюги їх форма витягнута, еліпсоїдна, рідше округла, а клубочки дотичні до стінок капсул Боумена–Шумлянського.

З вищезазначеного випливає, що органам гемопоезу осетрових риб властива морфофункціональна видоспецифічність на кожному з етапів онтогенезу.

ВИСНОВКИ

Крім клінічної діагностики, кров та органи гемопоезу є важлими об'єктами дослідження видових особливостей осетрових риб. Гістологічні дослідження, поряд з підрахунками ФЕК, здатні найбільш повно відображати кількісну та якісну сторони гемопоезу, його інтенсивність і локалізацію [11].

Осетровим риbam притаманна видова специфічність інтенсивності гемопоезу. Екстраваскулярний та інтраваскулярний гемопоез, а також розвиток клітин крові відбуваються у них гетерохронно. Зокрема, гемопоетична функція реалізується в ГКО на 10 добу активного живлення у осетра і севрюги, та на 15 — у білуги. В зябровому апараті та селезінці вона розпочинається з 10 доби активного живлення. В серці: на 10 добу активного живлення у російського осетра, 15 — у севрюги та 30 — у білуги. У тимусі російського осетра та севрюги — з 10 доби активного живлення, а у білуги — з 15. Гемопоетичні конгломерати асоційовані зі слизовою оболонкою ШКТ, — на 30 добу активного живлення, за виключенням гепатолатерального гемопоезу. Інтенсивності розвитку ФЕК також притаманна видова гетерохронність. При переході від личинкового періоду розвитку до віку молоді, динаміка утворення острівців лімфоцитопоезу та мієлоцитопоезу у білуги стрибкоподібна, а у російського осетра та севрюги — поступова [12].

Мезонефрос осетрових риб є основним органом гемопоезу, починаючи з 36 стадії розвитку і до кінця життєвого циклу. В ньому розвиваються всі клітинні ряди крові: еритропоетичний, лімфоцитопетичний, мієлоцитопетичний та моноцитарний. Впродовж всього передличинкового періоду розвитку його гістоморфологічна будова ускладнюється. Однак, на кожному з етапів онтогенезу осетрових риб їй притаманна видоспецифічність. Загальним є морфогенез

мезонефроса з утворенням диференційованих мезонефронів на ранніх стадіях розвитку предличинок. У личинковий період в цьому органі виокремлюються якісно нові морфофункціональні особливості та неспецифічні зміни в структурі мезонефронів. У молоді осетрових відбуваються перетворення в його структурі та функціях, з метою оптимізації адаптацій до умов навколишнього середовища [51, 52].

Лімфоцитопоез здійснюється у осетрових за відсутності виключно лімфоїдного типу гемопоетичних тканин. Навіть в тимусі відбувається не лише формування клітин лімфоцитопоетичного ряду, а й розвиток гранулоцитів — еозинофілів.

Диференціювання плазматичних клітин проходить в ГКО, селезінці, зябрах, гемопоетичних конгломератах ШКТ і нирці.

Мегакаріоцитопоез у осетрових риб локалізований в наступних органах: ГКО, селезінці, нирці і в ранньому онтогенезі — в печінці. Остання активно бере участь в продукції всіх клітинних рядів, здійснюючи гепатолатеральний тип гемопоезу, який є тимчасовим.

В міру онтогенетичного розвитку осетрових риб, в них у зябрах, серці, ШКТ та нирці відбувається зміна типів гемопоезу. Так, на передличинковій та личинковій стадіях розвитку, а також у молоді переважають клітини еритропоетичного ряду, у цьоголіток — клітини лімфоцитопоетичного та мієлоцитопоетичного рядів. Втім, в ГКО, селезінці та мезонефросі впродовж всього життя зберігаються напівстовбурові клітини. Крім того, в залежності від стадії розвитку, мікрооточенням клітин крові слугують різні клітини. Так, на початку онтогенезу це клітини мезенхіми, а вже з личинкового періоду розвитку цю роль починають виконувати ретикулоцити. Причому, до віку цьоголіток як мікрооточення виступають активні та малоактивні ретикулоцити. Після чого ретикулярний синцитій набуває дефінітивних рис і в якості мікрооточення слугують виключно активні ретикулоцити.

ЛІТЕРАТУРА

1. Orkin S. H., Zon L. I. Hematopoiesis: An Evolving Paradigm for Stem Cell Biology//Cell. 2008. № 132. С. 631—644.
2. Hoffbrand V., Moss P., Pettit J. Essential Haematology: 5th edn. Malden, Mass.: Blackwell Pub., 2006. 380 p.
3. Molecular Biology of the Cell: 5th edn./Alberts B. et al. Garland Science, 2007.
4. Stem cell information. The National Institutes of Health resource for stem cell research. URL: <https://stemcells.nih.gov/info/scireport/chapter5.htm> (дата звернення 22.03.2017).
5. Пучков Н. В. Физиология рыб. Москва, 1954. 371 с.
6. Строганов Н. С. Физиологическая приспособляемость рыб к температуре воды. Москва, 1956. 152 с.
7. Органы, участвующие в процессе кроветворения. URL: <http://www.biofinder.ru/bfins-949-1.html>.
8. Грушко М. П. Морфо-физиологические особенности гемопоэза у осетровых: на примере половозрелых самок: дис. ... кандидата биол. наук: 03.00.13. Астрахань, 2002. 182 с.
9. Гемопоэз у рыб. URL: <http://medlec.org/lek-26182.html>. (дата звернення 22.03.2017).

10. Козий М. С., Шерман І. М. Особенності гистоморфофункціональної організації лимфоїдного органа белуги (*Huso huso* Linnaeus, 1758)//Рибогосподарська наука України. 2012. № 2. С. 104—106.
11. Грушко М. П. Клеточний склад кроветворних органів половозрілих самок представників класу риб, земноводних і пресмикаючихся: дис. ... доктора біол. наук: 03.03.04. Астрахань, 2010. 364 с.
12. Ложниченко О. В. Цитогенез формених елементів крові і особенності формування органів кроветворення у осетрових риб: дис. ... доктора біол. наук: 03.00.25. Астрахань, 2007. 471 с.
13. Мильштейн В. В. Осетроводство. Москва: Легка і харчова промисловість, 1982. 152 с.
14. Кауфман З. С. Ембріологія риб. Москва: Агропромиздат, 1990. 204 с.
15. Житенева Л. Д. Екологічні закономірності їхтиогематології. Ростов-на-Дону: АЗНІІРХ, 2000. 56 с.
16. Грушко М. П., Ложниченко О. В., Федорова Н. Н. Гемопоез у осетрових риб: монографія. Астрахань: Тріада, 2009. 190 с.
17. Іванова Н. Т. Атлас кліток крові риб. Сравнительная морфологія і класифікація формених елементів крові риб. Москва, 1982. 184 с.
18. Іванова Н. Т. Некотріє аспекти к основам їхтиогематології. Ростов-на-Дону: РГПУ, 2002. 54 с.
19. Грушко М. П. Кроветворення в краніальному органі виробителів осетрових риб//Вестник АГТУ. 2006. № 3 (32). С. 141—144. (Серія: Рибне господарство).
20. Дехтярьов П. А., Євтушенко М. Ю., Шерман І. М. Фізіологія риб: підручник. Київ: Аграрна освіта, 2008. 342 с.
21. Ложниченко О. В. Полустеволові клітки крові і їх дифференціровка в різних органах кроветворення у молоді руского осетра//Вестник ВолГМУ. 2005. № 3 (15). С. 13—17.
22. Грушко М. П., Федорова Н. Н. Жабри осетрових риб як органи кроветворення//Успехи сременного естествознания. 2003. № 5. С. 49.
23. Ложниченко О. В. Полустеволові клітки і їх дифференціровка в селезенке молоді руского осетра//Вестник АГТУ. 2005. № 3 (26). С. 85—88. (Серія: Рибне господарство).
24. Ложниченко О. В. Полустеволові клітки крові і їх дифференціровка в селезенке личинок осетрових риб//Вестник АГТУ. 2006. № 3 (32). С. 135—140. (Серія: Рибне господарство).
25. Валова В. Н. Фізіологічне состояние молоді амурских осетрових риб, вирощуємих в условиях лососєвого рибоводного заводу//Известия ТИПРО. 2011. Т. 167. С. 207—222.
26. Справочник по физиологии рыб/Яржомбек А. А. и др.; ред. Яржомбек А. А. Москва: Агропромиздат, 1986. 192 с.
27. Скворцов А. П. О строении селезенки костистых рыб//ДАН СССР. 1947. Т. VIII, № 6. С. 94—98.
28. Скворцов А. П. Кровеносная система селезенки костистых рыб. Москва, 1947. 199 с.
29. Шмальгаузен И. И. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии. Москва: АН СССР. 1938. 365 с.
30. Шмальгаузен И. И. Пути и возможности эволюционного процесса. Москва, 1939. 135 с.

31. Шмальгаузен И. И. Основы сравнительной гистологии. Москва, 1947. 353 с.
32. Заварзин А. А. Очерки по эволюционной гистологии крови и соединительной ткани. Избранные труды. Т. 4. Москва, 1953. 717 с.
33. Заварзин А. А. Основы частной цитологии и сравнительной гистологии многоклеточных животных. Ленинград: Наука, 1976. 411 с.
34. Заварзин А. А. Основы сравнительной гистологии. Ленинград: Ленинградский ун-т, 1985. 400 с.
35. Иванова Н. Т. Система крови. Материалы к сравнительной морфологии системы крови человека и животных. Ростов-на-Дону, 1995. 156 с.
36. Иванова Н. Т. Материалы к морфологии крови рыб. Ростов-на-Дону, 1970. 138 с.
37. Кульчицкий К. И., Роменский О. Ю. Сравнительная анатомия и эволюция кровеносных сосудов сердца. Киев: Здоров'я, 1985. 176 с.
38. Ложниченко О. В. Эпикардальный кроветворный орган сеголеток осетровых рыб//Вестник АГТУ. 2008. № 3 (44). С. 53—55. (Серия: Рыбное хозяйство).
39. Федорова Н. Н., Ложниченко О. В. К вопросу о кроветворении у личинок и молоди белуги//Фундаментальные исследования. 2004. № 2. С. 179—179.
40. Ложниченко О. В., Федорова Н. Н. Характеристика гепатолатерального типа кроветворения у осетровых рыб в раннем онтогенезе//Вестник АГТУ. 2008. № 3 (44). С. 56—60. (Серия: Рыбное хозяйство).
41. Янин В. Л. Мезонефрос. Структура и функции. Тюмень, 2000. 42 с.
42. Мезонефрос/Янин В. Л. и др. Екатеринбург, 2000. 130 с.
43. Боброва О. В. Морфологические особенности мезонефроса осетровых в предличиночный, личиночный и мальковый периоды развития: дис. ... кандидата биол. наук: 03.00.25. Астрахань, 2006. 148 с.
44. Лепилина И. Н. Состояние мезонефроса осетровых в современных экологических условиях//Вестник ОГУ. 2005. № 12. С. 47—50.
45. Романов А. А., Лепилина И. Н., Романов А. А. Морфофункциональные нарушения почек осетровых и костистых рыб Волго-Каспия в современных условиях//Цитология. 2006. Т. 48, № 1. С. 5—8.
46. Ложниченко О. В., Амплеева А. В., Хвостова С. М. Физиологические аспекты кроветворения в мезонефросе у осетровых рыб//Вестник АГТУ. 2010. № 2. С. 106—111. (Серия: Рыбное хозяйство).
47. Ложниченко О. В., Федорова Н. Н. Исследование клеток кроветворной ткани мезонефроса личинок и молоди осетровых//Успехи современного естествознания. 2003. № 9. С. 98—99.
48. Детлаф Т. А., Гинзбург А. С. Зародышевое развитие осетровых рыб (севрюги, осетра, белуги) в связи с вопросами их разведения. Москва: АН СССР, 1954. 216 с.
49. Детлаф Т. А., Гинзбург А. С., Шмальгаузен О. И. Развитие осетровых рыб. Созревание яиц, оплодотворение, развитие зародышей и предличинок. Москва: Наука, 1981. 228 с.
50. Лепилина И. Н. Развитие мезонефроса у предличинок осетровых (*Acipenseridae*) рыб//Вопросы ихтиологии. 2007. Т. 47, № 1. С. 86—92.
51. Боброва О. В. Формирование мочевыделительной функции в мезонефросе осетровых рыб на 36—45-й стадиях эмбриогенеза//Вестник АГТУ. 2005. № 3 (26). С. 73—78. (Серия: Рыбное хозяйство).

52. Особенности формирования воспроизводительной функции мезонефроса русского осетра при гормональной стимуляции/Ложниченко О. В. и др.//Вестник АГТУ. 2009. № 2. С. 60—66.

REFERENCES

- Orkin, S. H., & Zon, L. I. (2008). Hematopoiesis: An Evolving Paradigm for Stem Cell Biology. *Cell*, 132, 631-644.
- Hoffbrand, V., Moss, P., & Pettit, J. (2006). *Essential Haematology* (5-th edn). Malden, Mass.: Blackwell Pub.
- Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2007). *Molecular Biology of the Cell* (5th edn). Garland Science.
- Stem cell information. *stemcells.nih.gov*. The National Institutes of Health resource for stem cell research. Retrieved from <https://stemcells.nih.gov/info/scireport/chapter5.htm>.
- Puchkov, N. V. (1954). *Fiziologiya ryb*. Moskva.
- Stroganov, N. S. (1956). *Fiziologicheskaya prispособlyaemost' ryb k temperature vody*. Moskva.
- Organy, uchastvuyushchie v protsesse krovetvoreniya. *biofinder.ru*. Retrieved from <http://www.biofinder.ru/bfins-949-1.html>.
- Grushko, M. P. (2002). Morfo-fiziologicheskie osobennosti gemopoeza u osetrovyykh: na primere polovozrelykh samok. *Candidate's thesis*. Astrakhan'.
- Gemopoez u ryb. *medlec.org*. Retrieved from <http://medlec.org/lek-26182.html>.
- Koziy, M. S., & Sherman, I. M. (2012). Osobennosti gistomorfofunktsional'noy organizatsii limfoidnogo organa belugi (*Huso huso* Linnaeus, 1758). *Ribogospodars'ka nauka Ukrainy*, 2, 104-106.
- Grushko, M. P. (2010). Kletochnyy sostav krovetvornykh organov polovozrelykh samok predstaviteley klassa ryb, zemnovodnykh i presmykayushchikhsya. *Doctor's thesis*. Astrakhan'.
- Lozhnichenko, O. V. (2007). Tsitogenez formennykh elementov krovi i osobennosti formirovaniya organov krovetvoreniya u osetrovyykh ryb. *Doctor's thesis*. Astrakhan'.
- Mil'shteyn, V. V. (1982). *Osetrovodstvo*. Moskva: Legkaya i pishchevaya promyshlennost'.
- Kaufman, Z. S. (1990). *Embriologiya ryb*. Moskva: Agropromizdat.
- Zhiteneva, L. D. (2000). *Ekologicheskie zakonomernosti ikhtiogematologii*. Rostov-na-Donu: AzNIIRKh.
- Grushko, M. P., Lozhnichenko, N. N., & Fedorova, O. V. (2009). *Gemopoez u osetrovyykh ryb: monografiya*. Astrakhan': Triada.
- Ivanova, N. T. (1982). *Atlas kletok krovi ryb. Sravnitel'naya morfologiya i klassifikatsiya formennykh elementov krovi ryb*. Moskva.
- Ivanova, N. T. (2002). *Nekotorye aspekty k osnovam ikhtiogematologii*. Rostov-na-Donu: RGPU.
- Grushko, M. P. (2006). Krovetvorenie v kranial'nom organe proizvoditeley osetrovyykh ryb. *Vestnik AGTU*, 3(32), 141-144.
- Dekhtiarov, P. A., Yevtushenko, M. Iu., & Sherman, I. M. (2008). *Fiziologiya ryb: pidruchnyk*. Kyiv: Ahrar. osvita.

21. Lozhnichenko, O. V. (2005). Polustvolovye kletki krovi i ikh differentsirovka v raznykh organakh krovetvoreniya u molodi russkogo osetra. *Vestnik VolGMU*, 3(15), 13-17.
22. Grushko, M. P., & Fedorova, N. N. (2003). Zhabry osetrovyykh ryb kak organy krovetvoreniya. *Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya*, 5, 49.
23. Lozhnichenko, O. V. (2005). Polustvolovye kletki i ikh differentsirovka v selebenke molodi russkogo osetra. *Vestnik AGTU*, 3(26), 85-88.
24. Lozhnichenko, O. V. (2006). Polustvolovye kletki krovi i ikh differentsirovka v selebenke lichinok osetrovyykh ryb. *Vestnik AGTU*, 3 (32), 135-140.
25. Valova, V. N. (2011). Fiziologicheskoe sostoyanie molodi amurskikh osetrovyykh ryb, vyrashchivaemykh v usloviyakh lososevogo rybovodnogo zavoda. *Izvestiya TINRO*, 167, 207-222.
26. Yarzombek, A. A., Limanskiy, V. V., & Shcherbina, T. V. et al. (1986). Spravochnik po fiziologii ryb. Yarzombek, A. A. (Ed.). Moskva: Agropromizdat.
27. Skvortsov, A. P. (1947). O stroenii selebenki kostistyykh ryb. *DAN SSSR*. VIII, 6, 94-98.
28. Skvortsov, A. P. (1947). *Krovenosnaya sistema selebenki kostistyykh ryb*. Moskva.
29. Shmal'gauzen, I. I. (1938). *Organizm kak tseloe v individual'nom i istoricheskom razviti*. Moskva: AN SSSR.
30. Shmal'gauzen, I. I. (1939). *Puti i vozmozhnosti evolyutsionnogo protsessa*. Moskva.
31. Shmal'gauzen, I. I. (1947). *Osnovy sravnitel'noy gistologii*. Moskva.
32. Zavarzin, A. A. (1953). *Ocherki po evolyutsionnoy gistologii krovi i soedinitel'noy tkani*. *Izbrannye trudy*, 4.
33. Zavarzin, A. A. (1976). *Osnovy chastnoy tsitologii i sravnitel'noy gistologii mnogokletochnyykh zhivotnykh*. Leningrad: Nauka.
34. Zavarzin, A. A. (1985). *Osnovy sravnitel'noy gistologii*. Leningrad: Leningradskiy un-t.
35. Ivanova, N. T. (1995). *Sistema krovi. Materialy k sravnitel'noy morfologii sistemy krovi cheloveka i zhivotnykh*. Rostov-na-Donu.
36. Ivanova, N. T. (1970). *Materialy k morfologii krovi ryb*. Rostov-na-Donu.
37. Kul'chitskiy, K. I., & Romenskiy, O. Yu. (1985). *Sravnitel'naya anatomiya i evolyutsiya krovenosnykh sosudov serdtsa*. Kyiv: Zdorov'ya.
38. Lozhnichenko, O. V. (2008). Epikardial'nyy krovetvornyy organ segoletok osetrovyykh ryb. *Vestnik AGTU*, 3 (44), 53-55.
39. Fedorova, N. N., & Lozhnichenko, O. V. (2004). K voprosu o krovetvorenii u lichinok i molodi belugi. *Fundamental'nye issledovaniya*, 2, 179-179.
40. Lozhnichenko, O. V., & Fedorova, N. N. (2008). Kharakteristika gepatolateral'nogo tipa krovetvoreniya u osetrovyykh ryb v rannem ontogeneze. *Vestnik AGTU*, 3 (44), 56-60.
41. Yanin, V. L. (2000). *Mezonefros. Struktura i funktsii*. Tyumen'.
42. Yanin, V. L., Dunaev, P. V., Solov'ev, G. S., Pantelev, S. M., & Mataev, S. I. (2000). *Mezonefros*. Ekaterinburg.
43. Bobrova, O. V. (2006). Morfologicheskie osobennosti mezonefrosa osetrovyykh v predlichinochnyy, lichinochnyy i mal'kovyy periody razvitiya. *Candidate's thesis*. Astrakhan'.
44. Lepilina, I. N. (2005). Sostoyanie mezonefrosa osetrovyykh v sovremennykh ekologicheskikh usloviyakh. *Vestnik OGU*, 12, 47-50.

45. Romanov, A. A., Lepilina, I. N., & Romanov, A. A. (2006). Morfofunktsional'nye narusheniya pochetk osetrovyykh i kostistyykh ryb Volgo-Kaspiya v sovremennykh usloviyakh. *Tsitologiya*, 1, 5-8.
46. Lozhnichenko, O. V., Ampleeva, A. V., & Khvostova, S. M. (2010). Fiziologicheskie aspekty krovektvoreniya v mezonefroze u osetrovyykh ryb. *Vestnik AGTU*, 2, 106-111.
47. Lozhnichenko, O. V., & Fedorova, N. N. (2003). Issledovanie kletok krovetvornoj tkani mezonefroza lichinok i molodi osetrovyykh. *Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya*, 9, 98-99.
48. Detlaf, T. A., & Ginzburg, A. S. (1954). *Zarodyshevoe razvitie osetrovyykh ryb (sevryugi, osetra, belugi) v svyazi s voprosami ikh razvedeniya*. Moskva: AN SSSR.
49. Detlaf, T. A., Ginzburg, A. S., & Shmal'gauzen, O. I. (1981). *Razvitie osetrovyykh ryb. Sozrevanie yaits, oplodotvorenie, razvitie zarodyshey i predlichinok*. Moskva: Nauka.
50. Lepilina, I. N. (2007). Razvitie mezonefroza u predlichinok osetrovyykh (*Acipenseridae*) ryb. *Voprosy ikhtiologii*, 1, 86-92.
51. Bobrova, O. V. (2005). Formirovaniye mochevydelitel'noy funktsii v mezonefroze osetrovyykh ryb na 36–45-y stadiyakh embriogeneza. *Vestnik AGTU*, 3, 73-78.
52. Lozhnichenko, O. V., Zagriychuk, V. P., Kuchkova, A. V., & Myastsova, P. V. (2009). Osobennosti formirovaniya vosproizvoditel'noy funktsii mezonefroza russkogo osetra pri gormonal'noy stimulyatsii. *Vestnik AGTU*, 2, 60-66.

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОПОЭЗА У ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ РЫБ (*ACIPENSERIDAE*) (ОБЗОР)

И. И. Грициняк, info@ifr.com.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Проанализировать данные из научных источников информации касательно видоспецифических особенностей гемопоэза и гисто-морфологических характеристик гемопоэтических тканей и органов у осетровых видов рыб (*Acipenseridae*). Рассмотреть общие моменты их строения на разных этапах онтогенеза. Представить общие черты дифференцировки и пролиферации форменных элементов крови.

Результаты. Обзор научных работ и литературы обнаружил, что гемопоэз у осетровых видов рыб существенно отличается от такового не только у млекопитающих (*Mammalia*), но и от других рыб из классов хрящевых (*Chondrichthyes*) и костных (*Osteichthyes*). Кроме того, осетровым рыбам присуща видоспецифичность в развитии органов гемопоэза на каждом из этапов онтогенеза. Органами гемопоэза у них являются: гемопоэтический краниальный или лимфоидный орган, жабры, селезенка, сердце, тимус, желудочно-кишечный тракт (передний отдел пищеварительного канала, пилорическая железа, средний отдел кишечника, спиральный клапан и печень) и почки (пронефрос и мезонефрос).

Практическая значимость. Систематизированные данные о специфике процессов гемопоэза и закономерностей развития гемопоэтических органов у осетровых видов рыб пригодятся как исследователям, так и фермерам-рыбоводам. Это обусловлено тем, что течение гемопоэза наиболее полно отражает каждый конкретный этап развития осетровых видов рыб, будучи мгновенной реакцией ряда тканевых систем организма на любые изменения как внутренней, так и внешней среды.

Ключевые слова: осетровые виды рыб (*Acipenseridae*), гемопоэз, гемоцитобласты, белая кровь, красная кровь, гемопоэтический краниальный орган, жаберный аппарат, селезенка, сердце, тимус, желудочно-кишечный тракт, мезонефрос, гепатолатеральный гемопоэз.

PECULIARITIES OF HEMOPOISIS IN STURGEONS SPECIES (ACIPENSERIDAE) (A REVIEW)

I. Hrytsyniak, info@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

M. Simon, seemann.sm@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To analyze data from scientific sources of information regarding the species-specific features of the hematopoietic and histo-morphological characteristics of hematopoietic tissues and organs of sturgeons (Acipenseridae). Consider the general aspects of their structure at different stages of ontogeny. To present the general features of differentiation and proliferation of blood elements.

Findings. A review of scientific papers and literature has revealed that hematopoiesis in sturgeon species of fish differs significantly from that of mammals (Mammalia), but also from other fish from cartilaginous (Chondrichthyes) and bony (Osteichthyes) classes. Moreover, sturgeon fishes are characterized by a species-specificity in the development of hemopoiesis organs on each stage of ontogenesis. The age-related changes of the developing blood cells, ranging from blast elements (erythroblasts, lymphoblasts, monoblasts, myeloblasts) to the appearance of mature (definitive) forms, are marked. The specific heterochrony is revealed in the development of sturgeon blood cells. The organs of hemopoiesis are: hemopoietic cranial or lymphoid organ, gills, spleen, heart, thymus, gastrointestinal tract (anterior part of the digestive canal, pyloric gland, middle intestine, spiral valve and liver) and kidneys (pronephros and mesonephros). Hepatic hematosis begins to be realized during the larval period of development from a massive spread near the vascular connective tissue. A little bit later in the age of 15 days of active feeding, a similar spread covers practically all area of the body. At this time in liver hepatocytes and reticular cells with developing blood corpuscle are precisely allocated. In this period, proliferation of all cellular lines: erythropoietic, lymphocytopoietic, myelocytopoietic, and also thrombocytopoiesis take place in liver. The plasmocyte differentiation occurs in cranial haematogenic organ of sturgeon. In reticular tissue of lymphoid organ, thrombocyte precursors — megakariocytes were found. Mesonephros is a hemopoietic organ, which first starts to perform the hemopoietic function, and executes it until the end of the life cycle of fish. Cell development of erythropoietic and lymphocytopoiesis series is over in the prolarvaperiod of the development in the hematopoietic tissue of the kidney, and the formation of the granular series occurs in the larval period, and eosinophilic myelocytes are marked much earlier than in other hematopoietic organs (the 43 stage of the development), and a bit later — neutrophil myelocytes.

Practical value. Systematized data on the specifics of hematopoiesis processes and patterns of development of hemopoietic organs in sturgeon species will be useful both for researchers and fish farmers. This is due to the fact that the course of hemopoiesis most fully reflects each specific stage of the development of sturgeon species, being an instant reaction of a number of body tissues to any changes in the internal and external environment.

Keywords: sturgeon species of fish (Acipenseridae), hemopoiesis, hemocytoblasts, white blood, red blood, hematopoietic cranial organ, branchial gill, spleen, heart, thymus, gastrointestinal tract, mesonephros, hepatolateral hemopoiesis.

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 99-113
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.099>
UDC 621.59:[597-146.31:639.371.2]

DEVELOPMENT OF CRYOPROTECTIVE MEDIA FOR LOW-TEMPERATURE FREEZING OF STERLET (*ACIPENSER RUTHENUS*) SPERM

I. Kononenko, kononenko_irina88@ukr.net, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Purpose. To develop the optimum composition of a cryoprotective solution for freezing sterlet sperm with the use of new and standard constituents and compare the results of the fertilization of eggs with sperm frozen by different ways and in different media. To analyze the results of keeping sterlet males in simulated conditions of natural spawning and to assess the quality of sexual products obtained during early spawning periods in comparison with natural ones.

Methodology. The tasks set for the optimization of cryoprotective media for freezing sterlet sperm were solved according to generally accepted cryobiology methods and in accordance with Kopyeyka Ye. F. recommendations. The works with brood sterlet were conducted in accordance with the generally accepted methods of sturgeon breeding and recommendations for natural spawning modeling.

Findings. The studies demonstrated a positive effect of creatine, the introduction of which into the solution allowed increasing the cryoprotection of sperm from damaging factors of cryopreservation. During low-temperature freezing of sperm by different ways, the best results were obtained when freezing sperm in samples of smallest volume — granules that was evidenced by the number of live thawed spermatozoa, fertilization rates of eggs and the number of developing embryos. The simulation of the conditions of natural spawning allowed obtaining high-quality sexual products from sterlet males earlier in comparison with natural spawning periods, freezing them and fertilizing eggs after several weeks of storage.

Originality. Among a variety of substances used in cryobiology for the optimization of the composition of protective solutions, positive results were tested and obtained with the use of creatine. Optimization of the cryopreservation solution composition was carried out using sterlet sperm obtained at early spawning terms compared to the natural ones.

Practical value. The obtained results can be used in the conditions of hatcheries for obtaining sterlet offspring both for market and for the restoration of their populations in natural water bodies. In addition, the obtained results are the basis for further studies on the development of optimum composition of cryoprotective media for freezing sterlet sperm.

Keywords: sterlet (*Acipenser ruthenus*), simulated conditions of natural spawning, pre-spawning group, spermatozoa, methanol, creatine.

PROBLEM STATEMENT AND ANALYSIS OF LAST ACHIEVEMENTS AND PUBLICATIONS

Since a long time, sturgeon species have been an object of intensive industrial fishery and poaching. With time this and a number of hydroecological factors made impossible their natural reproduction, and consequently, led to a sharp reduction

© I. Kononenko, 2017

in their population size in natural waters. However, a reduction in the number of sturgeons and an increase in the value of their products did not cause a decline in demand, but on the contrary, led to its increase with further annual growth. Nowadays, the reproduction and development of these species are possible only in the conditions of fish farms. If the production of sturgeon products in Ukraine takes place at several farms, the rearing of fish seeds for stocking natural water takes place only at the Dnieper Production and Experimental Fish Hatchery named after academician S. Artyushchik [1]. However, both trends of sturgeon culture face a problem of the lack of high quality sexually mature brood fish [2]. Therefore, for solving this and several other problems in sturgeon culture, both traditional approaches and advanced technology and biotechnology are used, which are the basis for rational environmental management and biodiversity conservation [3].

Currently, one of the current biotechnological methods of the preservation and reproduction of sturgeon is the cryopreservation of male sexual products, followed by the possibility of using this material for producing offspring or for freezing sperm samples in banks as a reserve [4, 5]. The success of the cryopreservation process depends on many factors, among which the most important is the composition of the cryogenic solution, which is used for sperm dilution. Therefore, most studies, which are described in the available literature, are aimed at optimizing the composition of cryoprotective media and searching for new compounds, which can protect the sperm structure from damage during freezing and thawing [6–9].

Regarding the works with the sperm of sturgeon species, the cryopreservation of sexual products requires the development of species-specific freezing technologies, taking into account a number of factors due to a range of specific features of their sperm [9–11]. Perhaps, because of particularly difficult operations with the sperm of sturgeons, despite a large amount of experiments, no successful results on attaining the high quality of the frozen sperm comparable to that of native one were obtained. This fact is a reason for new research and developments in the field of the cryopreservation of sturgeon sperm.

Moreover, sturgeon breeding in controlled conditions, which allows stabilizing the temperature regime, shortening the duration of sturgeon keeping until complete gametogenesis and obtaining sexual products repeatedly, thus intensifying the process of fish cultivation, has been actively used last time [12–14]. This process is important when working with sturgeon species, particularly during the cryopreservation of their sexual products, enabling doing a larger amount of work and getting the desired results.

HIGHLIGHT OF THE EARLIER UNRESOLVED PARTS OF THE GENERAL PROBLEM. AIM OF THE STUDY

Cryopreservation of fish sexual products is a quite complicated biotechnological process, where the desired result is achieved by performing many experiments, and if we take into account the seasonality of spawning works, then it can take more than one year. In the case of sturgeon species, work with low freezing of their sperm is somewhat complicated due to a low quantity of sexual products that may be insufficient to complete the experiment. Simulating natural spawning conditions and controlling the maturation processes of breeding stocks are of great interest for both market sturgeon culture and for work on the reproduction of sturgeon for the restoration of their natural

stocks. This process attracts an evident interest also in the works on the cryopreservation of sturgeon sperm. The efficiency of cryopreservation products increases due to a larger quantity of available sexual products. Therefore, the aim of our research was the development of an optimum composition of a cryoprotective medium for freezing sturgeon sperm with the use of sperm obtained from males at early terms compared to natural ones.

MATERIALS AND METHODS

The work is based on the results of studies, which were performed at the base of educational, scientific and industrial laboratory of the Aquaculture Department of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Eight males of sterlet (prespawning group) were used for the study. They were kept in a special thermocontainer with adjustable system of water heating and maintenance of the necessary water flow regime (at 0.2–0.5 m/s). Simulation of natural spawning conditions by gradual rise of water temperature at 0.5°C daily during 21 day was performed for the maturation of sterlet males and development of their reproductive cells [15, 16]. All manipulations with brood fish of the prespawning group (stimulated maturation, obtaining sexual products, etc.) were conducted according to generally accepted methods used for sturgeon culture [17, 18].

Works on the cryopreservation of sterlet sperm were conducted according to the recommendations of E. Kopyeyka and other cryobiologists [10, 19]. A search for the optimal composition of cryoprotective medium was performed by testing the effect of different substances on sperm quality after thawing based on the results of fertilizing capacity of the thawed sperm (fertilization rates of eggs and number of developing embryos).

STUDY RESULTS AND THEIR DISCUSSION

Sterlet brood stock was kept in a recirculating aquaculture system with water temperature of about 7°C. To trigger the mechanisms, which promote spawning condition in the brood stock in convenient terms, the selected groups of males (prespawning group) were kept in simulated natural spawning conditions with the rise of daily water temperature from 0.5°C to 14.3°C. Monitoring of the physiological state of sterlet males showed that during the study period, which lasted for 21 days, brood fish were active and have good feed intake. The survival rate of sterlet males during this period was 100%, which proved favorable course of the simulation process of natural spawning conditions.

In order to stimulate the maturation of sexual products, the prespawning group of males was divided into two groups of four individuals each (tab. 1).

Quality assessment of males, performed based on major morphometric features, showed relative homogeneity of selected brood fish in both subgroups for all the studied features. The males in the first subgroup had an average age of 8.5 years and body weight from 0.9 kg to 1.2 kg. Their average body length was 52.73 ± 2.04 cm, with a range from 50.20 cm to 57.8 cm. The males in the second prespawning subgroup had an average age of 9 years. Their average body length and weight were virtually equal to these parameters in the first subgroup of males (1.06 ± 0.18 kg and 47.98 ± 2.57 cm respectively).

Table 1. Some results of works with the prespawning sterlet group, $M \pm m$

Group, № σ	Index			Stimulanting preparation	Response to stimulation
	age, years	weight (M), kg	length (L), cm		
Subgroups 1					
1	8	0.9	50.2	Reproginol	-
2	9	1.1	52.5		+
3	9	1.2	57.8		-
4	8	0.9	50.4		+
M±m	8.50±0.33	1.03±0.09	52.73±2.04		
σ	0.58	0.15	3.54		
Cv, %	6.79	14.6	6.71		
Subgroups 2					
5	9	1.05	55.0	Vadilen-2	+
6	10	1.45	61.6		-
7	8	0.7	54.7		-
8	9	1.05	57.6		+
M±m	9.00±0.47	1.06±0.18	57.23±1.84		
σ	0.82	0.30	3.19		
Cv. %	9.07	28.90	5.58		

Stimulation of male maturation in the prespawning group using stimulation preparations *Reproginol* and *Vadilen-2* resulted in the maturation of 50% brood fish: two in the first and two in the second subgroup (tab. 1).

It should be noted that the fish farm has a long positive experience with the use of both stimulation preparations; therefore the low level of maturation rate cannot be fully attributed to poor quality of the preparations used. Presumably, the lack of response in both male subgroups to stimulants may be associated with impaired functioning of neurohumoral systems and, consequently, insufficient preparedness of brood fish for spawning [20]. In addition, males were assessed regarding the quality of their sexual products, which is important when rearing brood fish in controlled conditions and is a determinant factor when deciding the suitability for sperm for cryopreservation (tab. 2).

In total, the first collection of sperm yielded to 11–18 ml; the second one (in 3 hours) — to 9–15 ml. The total amount of two portions of sperm yielded to 27 ml from the male number 2 (first subgroup), 21 ml and 30 ml from the males №№ 5 and 8, respectively, in the second subgroup. The results of rapid evaluation of the sperm quality of in the prespawning group showed the best vital features for the male № 2 of the first subgroup. The sperm of this brood fish had appropriate milky-white color, was characterized by required consistency and high motility of spermatozoa: 95–100% after their activation by pond water. The analysis of the quality of male sexual products in the second subgroups showed that the male № 5 had sexual products with normal consistency, but they had whitish-transparent color and the share of spermatozoa with straight-forward movement was slightly lower (90–95%). Sexual products of the male № 8 had whitish-transparent

color and normal consistency, but the motility of spermatozoa was 70–75% and the G. Persova score was 4. When performing the works on the cryopreservation of the mentioned males under the same conditions, the sperm of males № 2 and № 5 was found to be suitable for low-temperature freezing because the motility of spermatozoa after the process of freezing and thawing remained the highest. The sexual products of the male № 8 from the second subgroup were characterized by the abrupt loss of spermatozoa motor activity even after using different compositions of cryoprotective solutions.

Table 2. The results of obtaining sexual products of sterlet males at prespawning terms

Group ♂, №	Ejaculate volume, ml			Sperm color	Consistence	Presence of admixtur es*	Score
	Portion I	Portion II	Σ				
Subgroup 1							
1	–	–	–	–	–	–	–
2	18	9	27	milk-white	liquid sour cream	–	5
3	–	–	–	–	–	–	–
4	15	–	15	transparent	watery	+	3
	Σ, ml		42				
Subgroup 2							
5	11	10	21	whitish- transparent	liquid sour cream	-	5
6	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–
8	15	15	30	whitish- transparent	liquid sour cream	–	4
	Σ, ml		51				

Note. * — high content of ovarian fluid, presence of blood, urine, mucus, and others foreign substances.

Testing cryoprotective properties of standard media showed poor results on sterlet sperm. Therefore, for improving the efficiency of the cryopreservation of sterlet sexual products, a decision was taken to optimize the composition of cryoprotective solutions. Thus, four cryoprotective solutions were selected after testing a number of them. They are based on methanol and dimethyl sulfoxide (DMSO) (tab. 3).

Quality assessment of the defrosted sperm diluted by these solutions demonstrated different effects of cryoprotective substances of various substances. Moreover, the quality of sperm was affected by the volume of the frozen sample. In particular, the dilution of sperm with the cryoprotective solution № 1 and freezing it in 1.5 ml test-tubes caused a decrease in spermatozoa motility in the thawed sperm from 35 to 45% compared to the native one. In the sperm frozen in 0.5 ml test-tubes, approximately 50–60% of spermatozoa were able to move after thawing and activation by pond water. The highest spermatozoa motility was observed in the thawed sperm, the samples of which were frozen in the form of granules — 75–80% (fig. 1a).

Table 3. Blend composition of cryoprotective solutions

No solutions	Composition
№ 1	DMSO — 2,115 M, KCl — 13,4 mM, sucrose — 14,6mM, glycine — 74,9 mM
№ 2	methanol — 3,73 M, KCl — 13,4 mM, sucrose — 14,6 mM, glycine — 20,5 mM
№ 3	DMSO — 1,057 M, methanol — 1,86 M, KCl — 13,4 mM, sucrose — 14,6 mM, glycine — 66,6 mM
№ 4	methanol — 3,73 M, KHCO_3 — 8,9 mM, creatine — 3,8 mM, sucrose — 14,6 mM

A tendency of the quality reduction of the thawed samples with an increase in their volumes was noted during cryopreservation when using the sperm diluted by the cryoprotective solution № 2. Spermatozoa motility of the thawed sperm in granules remained at the level of 45–55%, whereas when using the sperm frozen in test-tubes (0.5 ml) resulted in a decline to 25–30% (fig. 1b). Therefore, the studies confirmed the earlier results obtained by other scientists who noted the reduction of sperm quality with an increase in the volume of frozen samples [21–23].

Fig. 1. Spermatozoa motility (%) after thawing the sperm in different cryoprotective solutions: a — cryoprotective solution № 1, b — cryoprotective solution № 2

The obtained parameters of spermatozoa motility of the thawed sperm are associated not only with the cryopreservation method but also with the components of cryoprotective media, the components of which ensure the cryoprotection of cells from the extreme factors of cryopreservation and preservation of the functional usefulness of spermatozoa.

When comparing the effects of cryoprotective media on spermatozoa properties after thawing sperm, the highest activity was observed for the sperm diluted by the cryoprotective solution №1 based on DMSO and frozen in the form of granules: 75–80%. The obtained value significantly exceeded the result of freezing the sperm diluted by the cryoprotective solution № 2 based on methanol, when it was possible to produce only 45–55% of active spermatozoa (fig. 2).

Fig. 2. Spermatozoa motility after thawing the sperm frozen in different cryoprotective solutions: № 1 (DMSO) and № 2 (methanol)

The obtained results confirm the data of other scientists who observed a lower quality of the thawed sperm of sturgeons and salmonids, which was diluted by the cryoprotective solution based on methanol [11, 24, 25].

Freezing of the sperm diluted by the cryoprotective solution № 3 (based on DMSO and methanol), has caused a significant decline in the quality of the thawed samples. Spermatozoa motility decreased by more than 55% compared to cases when native sperm was used resulting in 35–45% (fig. 3).

However, despite the better results obtained using the cryoprotective media based on DMSO, due to its observed negative action and toxic effect on spermatozoa [26–29], it was replaced by methanol in further studies. In addition, KCl in the composition of the cryoprotective solution was replaced by KHCO_3 , the positive experience of working with which was described in the available literature [30, 31]. In addition, we used creatine as an osmolyte. As a result, the spermatozoa survival after sperm preservation increased up to 60–65% that was significantly higher than the results obtained earlier with the use of the cryoprotective solution based on methanol (fig. 3). We can say that the use of these components in the cryoprotective solution contributed to an increase in protective properties and improvement of the thawed sperm quality.

Fig. 3. The quality of sperm diluted by the cryoprotective solutions №№ 3 and 4

In general, the highest spermatozoa motility was observed in the sperm, which was cryopreserved in the cryoprotective solution based on DMSO (№ 1). A combination of

DMSO and methanol did not bring the expected result and caused a decrease in spermatozoa activity to 35–45% (cryoprotective solution № 3) compared to the use of the native sperm. At the same time, satisfactory results were obtained when using cryoprotective solution based on methanol with new components (№ 4) — 60–65%, which is promising for further studies.

The next stage of our works was the use of the thawed sperm to fertilize sterlet eggs for testing their fertilizing ability. For this purpose, small portions of eggs were used (about 2 g), the fertilization and development of which were performed in Petri dishes. Using small portions of eggs is very important for the study because it allows performing fertilization and incubation of embryos without the removal of mucilage [32, 33]. The frozen samples diluted by the cryoprotective solution №№ 1–4 were used for eggs fertilization. The frozen samples were stored for 17 days. Quality assessment of the thawed sperm did not find any deterioration of spermatozoa functional characteristics.

The results of sterlet egg fertilization performed in Petri dishes demonstrated a satisfactory performance (tab. 4).

Table 4. The results of sterlet egg fertilization by cryopreserved and native sperm in Petri dishes

Cryoprotective solution, №	Cryopreservation method	Spermatozoa motility, %		№ ♀	Petri dish, №	Fertilized eggs, %	Number of developing embryos, %
		after dilution	after thawing				
1	Test-tube 1.5	80–85	35–45	20	1a	39.0	32.4
					1 b	35.0	29.8
					M	37.0	31.1
	Test-tube 0.5	80–85	35–45	18	2a	38.5	30.5
					2	38.0	28.7
					M	38.3	29.6
2	Granules 0.1	75–80	50–60	20	3	45.0	41.9
					4	55.0	50.7
	Test-tube 0.5	75–80	25–30	10	5	33.0	28.1
					6a	64.0	55.0
					6 b	66.0	55.9
3	Granules 0.1	80–85	45–55	20	M	65.0	55.4
					7a	53.0	48.4
					7 b	57.0	53.2
	Granules 0.1	80–85	35–45	20	M	55.0	50.8
					8a	40.0	31.8
					8 b	42.0	34.0
4	Granules 0.1	75–80	60–65	14	M	41.0	32.9

Cryoprotective solution, №	Cryopreservation method	Spermatozoa motility, %		№ ♀	Petri dish, №	Fertilized eggs, %	Number of developing embryos, %
		after dilution	after thawing				
Control (♂ № 17)				18	9	79.4	69.1
				14	10	80.7	73.7
Control (♂ № 19)					11a	84.8	75.2
				20	11b	85.2	76.5
					M	85.0	75.8
				10	12	83.5	74.5

The percent of egg fertilization with the thawed sperm fluctuated from 33 to 66% that depended on the cryopreservation method and composition of the cryoprotective solution. For eggs fertilized by sperm granules, the obtained results were higher compared to eggs fertilized by sperm from the tubes of different volumes.

The study of the embryonal development of sterlet eggs on 4 blastomeres and gastrula stages confirmed earlier findings. The highest percentage of egg fertilization was observed in portions fertilized by the smallest samples — granules, and with an increase in the volume of the frozen sample, the egg fertilization rate decreased.

In addition, the studies showed that spermatozoa motility remained high after the cryopreservation of sperm in the cryoprotective solution with DMSO, but the fertilizing ability of the thawed sperm decreased, while the results obtained for the cryoprotective solution based on methanol were consistent with the earlier results obtained for the sperm of sturgeons and salmonids [34–36].

CONCLUSION AND PERSPECTIVES OF FURTHER DEVELOPMENT

Thus, the study on the optimization of the cryoprotective solutions for freezing sterlet sperm demonstrated positive results when using creatine and replacing KCl by KHCO_3 that was confirmed by egg fertilization and development data. The use of these components contributed to an increased cryoprotection of sperm from the negative effects of extreme factors of cryopreservation. The obtained result can be important for future studies.

BIBLIOGRAPHY

1. Алхімов Є. М., Шевченко В. Ю. Сучасний стан вирощування ремонтних цюголіток осетроподібних риб (*Acipenseriformes*) в умовах півдня України//Рибогосподарська наука України. 2017. № 1 (39). С. 52—63.
2. Чебанов М. С., Галич Е. В. Руководство по искусственному воспроизводству осетровых рыб. Технический доклад ФАО по рыбному хозяйству. Анкара, 2013. 325 с.
3. Результаты разработки методов формирования маточных стад стерляди в условиях замкнутого водообеспечения/Пономарева Е. Н. и др.//Вестник АГТУ. 2010. № 1. С. 86—91. (Серия: Рыбное хозяйство).

4. Вепринцев Б. Н., Пилиев С. А. Сохранить генофонд рыб и водных беспозвоночных//Рыбное хозяйство. 1989. № 6. С. 29—32.
5. Карнаухов В. Н. Проблемы и перспективы создания генетических криобанков для целей сохранения биоразнообразия//Биофизика живой клетки. 1994. Т. 6. С. 1—6.
6. Криоконсервация репродуктивного материалы рыб: разработки Южного научного центра Российской академии наук/Пономарева Е. Н. и др.//Современные рыбохозяйственные и экологические проблемы Азово-Черноморского региона: VII Междунар. конф., 20–23 июня 2012 г.: матер. Керчь: ЮгНИРО, 2012. Т. 2. С. 55—58.
7. Концепция сохранения и устойчивого использования биоразнообразия с применением методов криоконсервации геномов гидробионтов/Ананьев В. И. и др.//Избранные труды ВНИИПРХ. Дмитров: Север Подмосковья, 2002. Кн. 1, т. I–II. С. 385—399.
8. Белоус А. М., Гордиенко Е. А., Розанов Л. Ф. Биохимия мембран. Замораживание и криопротекция. Москва: Высшая школа, 1987. 80 с.
9. Использование новых технологий в аквакультуре/Войнова Н. В. и др.//Холодноводная аквакультура: старт в XXI век: Междунар. симп., 8–13 сент. 2003 г.: матер. Санкт-Петербург, 2003. С. 78—80.
10. Технология криоконсервации и хранения в низкотемпературном банке спермы рыб/Цветкова Л. И. и др.//Сборник научно-технической и методической документации по аквакультуре. Москва: ВНИРО, 2001. С. 152—158.
11. Fertilization rate of Siberian sturgeon (*Acipenser baeri* Brandt) milt cryopreserved with methanol/Glogowski J. et al.//Aquaculture. 2002. № 211. P. 367—373.
12. Особенности развития репродуктивной системы донской стерляди в зарегулированных условиях водной среды/Пономарева Е. Н. и др.//Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14, № 5. С. 191—194.
13. Особенности гаметогенеза стерляди в зарегулированных условиях водной среды/Пономарева Е. Н. и др.//Вестник АГТУ. 2011. №2. С. 112—117. (Серия: Рыбное хозяйство).
14. Справочник рыбовода. Инновационные технологии аквакультуры Юга России/Матишов Г. Г. и др.; ред. Пономарев С. В. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН. 2013. С. 109—120.
15. Корчунов А. А. Методы ускоренного формирования маточного стада стерляди в условиях УЗВ//Актуальные проблемы обеспечения продовольственной безопасности Юга России: инновационные технологии для сохранения биоресурсов, плодородия почв, мелиорации и водообеспечения: Междунар. науч. конф., 27–30 сент. 2011 г.: матер. Ростов-на-Дону, 2011. С. 24—25.
16. Результаты разработки методов формирования маточных стад стерляди в условиях замкнутого водоснабжения/Пономарева Е. Н. и др.//Вестник АГТУ. 2010. № 1. С. 86—91. (Серия: Рыбное хозяйство).
17. Судакова Н. В. Технологии и нормативы по товарному осетроводству в VI рыбоводной зоне. Москва: ВНИРО, 2006. 100 с.
18. Чебанов М. С., Галич Е. В., Чмырь Ю. М. Руководство по разведению и выращиванию осетровых рыб. Москва: Росинформагротех, 2004. 135 с.
19. Инструкция по низкотемпературной консервации спермы карпа/Копейка Е. Ф. Москва: ВНИИПРХ, 1986. 11 с.

20. Залепухин В. В. Индивидуальная рабочая плодовитость как характеристика эндогенной разнокачественности рыб//Вестник АГТУ. 2009. № 1. С. 73—78. (Серия: Рыбное хозяйство).
21. Stein H. Zum Einfluss von Schutzsubstanz und Konfektionierung auf das Befruchtungsergebnis mit tiefgefrorenem Bachforellensperma (*Salmo trutta morpha fario* L.) // Berl. Munch. Tierarztliche Wochenschrift. 1979. Vol. 92. P. 420—421.
22. О некоторых факторах, влияющих на криоустойчивость спермы карпа *Cyprinus carpio*/Цветкова Л. И. и др./Избранные труды ВНИИПРХ. Дмитров: Север Подмоскowsья, 2002. Кн. 1, т. I—II. С. 377—384.
23. Красильникова А. А., Тихомиров А. М. Объем замораживаемого образца как один из факторов выживаемости сперматозоидов осетровых видов рыб при криоконсервации//Естественные науки. Биотехнология. 2014. № 2 (47). С. 62—69.
24. Effects of cryoprotectants and male on motility parameters and fertilizabilization rate in paddlefish (*Polyodon spathula*) frozen-thawed spermatozoa/Linhart O. et al./J. Appl. Ichthyol. 2006. Vol. 22, suppl. I. P. 384—388.
25. Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития/Цветкова Л. И. и др. Астрахань, 2004. С. 213—214.
26. Acrosome staining and motility characteristics of sterlet spermatozoa after cryopreservation with use of methanol and DMSO/Psenicka M. et al./Cryobiology. 2008. № 56. P. 251—253.
27. The relationship of the cryoprotectants methanol and dimethylsulfoxide and hyperosmotic extenders on sperm cryopreservation of two North-American sturgeon species/Horvath A. et al./Aquaculture. 2005. № 247. P. 243—251.
28. Chao N.-H., Liao I. C. Cryopreservation of finfish and shellfish gametes end embryos//Aquaculture. 2001. № 197. P. 161—189.
29. Sperm cryopreservation of the Indian major carp, *Labeo calbasu*: Effects of cryoprotectants, cooling rates and thawing rates on egg fertilization/Nahiduzzaman Md. et al./Animal Reproduction Science. 2012. № 136. P. 133—138.
30. Mounib M. S. Cryogenic preservation of fish and mammalian spermatozoa/J. Reprod. Fert. 1978. Vol. 53. № 1. P. 13—18.
31. Mounib M. S., Hwang P. C., Idler R. R. Cryogenic preservation of Atlantic Cod (*Gadus morhua*) sperm/J. Fish. Res. Board. Can. 1968. Vol. 25, № 12. P. 2623—2632.
32. Черномашенцев А. И., Мильштейн В. В. Рыбоводство. Москва: Легкая промышленность, 1983. 272 с.
33. Иванов А. П. Рыбоводство в естественных водоемах. Москва: Агропромиздат, 1988. 367 с.
34. The relationship of the cryoprotectants methanol and dimethylsulfoxide and hyperosmotic extenders on sperm cryopreservation of two North-American sturgeon species/Horváth Á. et al./Aquaculture. 2005. Vol. 247, № 1—4. P. 243—251.
35. Studies on the sperm biology and sperm cryopreservation in the sterlet, *Acipenser ruthenus* L./Lahnsteiner F. et al./Aquaculture Research. 2004. Vol. 35. P. 519—528.
36. Lahnsteiner F., Weismann T., Patzner R. A. Methanol as cryoprotectant and the suitability of 1.2 ml and 5 ml straws for cryopreservation of sperm from salmonid fishes//Aquaculture Research. 1997. Vol. 28. P. 471—479.

REFERENCES

1. Alkhimov, Ie. M., & Shevchenko, V. Iu. (2017). Suchasnyi stan vyroshchuvannia remontnykh tsoholitik osetropodibnykh ryb (*Acipenseriformes*) v umovakh pivdnia Ukrainy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1(39), 52-63.
2. Chebanov, M. S., & Galich, E. V. (2013). *Rukovodstvo po iskusstvennomu vosproizvodstvu osetrovyyh ryb: Tehnicheskij doklad FAO po rybnomu hozhajstvu*. Ankara.
3. Ponomareva, E. N., Sorokina, M. N., Grigor'ev, V. A., Kovaleva, A. V., & Korchunov, A. A. (2010). Rezul'taty razrabotki metodov formirovaniya matochnykh stad sterljadi v usloviyakh zamknutogo vodoobespecheniya. *Vestnik AGTU*, 1, 86-91.
4. Veprincev, B. N., & Piliev, S. A. (1989). Sohranit' genofond ryb i vodnyh bespozvonochnyh. *Rybnoe hozhajstvo*, 6, 29-32.
5. Karnauhov, V. N. (1994). Problemy i perspektivy sozdaniya geneticheskikh kriobankov dlja celej sohraneniya bioraznoobraziya. *Biofizika zhivoy kletki*, 6, 1-6.
6. Ponomareva, E. N., Tihomirov, A. M., Bogatyreva, M. M., & Krasil'nikova, A. A. (2012). Kriokonservaciya reproduktivnogo materialy ryb: razrabotki Juzhnogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. *Sovremennye rybohozajstvennye i jekologicheskie problemy Azovo-Chernomorskogo regiona: VII Mezhdunarodnaja konferencija*. Kerch', 55-58.
7. Anan'ev, V. I., Gahova, Je. N., Katasonov, V. Ja., Rott, N. N., & Cvetkova, L. I. (2002). koncepcija sohraneniya i ustojchivogo ispol'zovaniya bioraznoobraziya s primineniem metodov kriokonservacii genomov gidrobiontov. *Izbrannye trudy VNIIPRH*. Dmitrov: Sever Podmoskov'ja, 385-399.
8. Belous, A. M., Gordienko, E. A., & Rozanov, L. F. (1987). *Biohimija membran. Zamorazhivane i krioprotekcija*. Moskva: Vysshaja shkola.
9. Vojnova, N. V., Mirzojan, A. V., Ivanov, G. Ju., & Fedchenko, V. M. (2003). Ispol'zovanie novykh tehnologij v akvakul'ture. *Holodnovodnaja akvakul'tura: start v HHI vek: mezhdunarodnyj simpozium*. Sankt-Peterburg, 78-80.
10. Cvetkova, L. I., Dokina, O. B., Pronina, N. D., & Milenko, V. A. (2001). Tehnologija kriokonservacii i hraneniya v nizkotemperaturnom banke spermy ryb. *Sbornik nauchno-tehnicheskij i metodicheskij dokumentacii po akvakul'ture*. Moskva: VNIRO.
11. Glogowski, J., Kolman, R., Szczepkowski, M., Horvath, A., Urbanyi, B., Sieczynski, P., Rzemieniecki, A., Domagala, J., Demianowicz, W., Kowalski, R., & Ciereszko, A. (2002). Fertilization rate of Siberian sturgeon (*Acipenser baeri* Brandt) milt cryopreserved with methanol. *Aquaculture*, 211, 367-373.
12. Ponomareva, E. N., Metallov, G. F., Korchunov, A. A., & Kovaleva, A. V. (2012). Osobennosti razvitija reproduktivnoj sistemy donsnoj sterljadi v zaregulirovannykh usloviyakh vodnoj sredy. *Izvestija Samarskogo nauchnogo centra RAN*, 5, 191-194.
13. Ponomareva, E. N., Grigor'ev, V. A., Sorokina, M. N., Kovaleva, A. V., & Korchunov, A. A. (2011). Osobennosti gametogeneza sterljadi v zaregulirovannykh usloviyakh vodnoj sredy. *Vestnik AGTU*, 2, 112-117.
14. Matishov, G. G., Ponomarev, S. V., & Bakaneva, Ju. M. et. al. (2013). *Spravochnik rybovoda. Innovacionnye tehnologii akvakul'tury Juga Rossii*. Rostov-na-Donu: JuNC RAN.
15. Korchunov, A. A. (2011). Metody uskorennoho formirovaniya matochnogo stada sterljadi v usloviyakh UZV. *Aktual'nye problemy obespecheniya prodovol'stvennoj*

- bezopasnosti Juga Rossii: innovacionnye tehnologii dlja sohraneniya bioresursov, plodorodija pochv, melioracii i vodoobespechenija: Mezhdunarodnaja nauchnaja konf. Rostov-na-Donu, 24-25.*
16. Ponomareva, E. N., Sorokina, M. N., Grigor'ev, V. A., Kovaleva, A. V., & Korchunov, A. A. (2010). Rezul'taty razrabotki metodov formirovaniya matochnyh stad sterljadi v uslovijah zamknutogo vodosnabzhenija. *Vestnik AGTU, 1*, 86-91.
 17. Sudakova, N. V. (2006). *Tehnologii i normativy po tovarnomu osetrovodstvu v VI rybovodnoj zone*. Moskva: VNIRO.
 18. Chebanov, M. S., Galich, E. V., & Chmyr', Ju. M. (2004). *Rukovodstvo po razvedeniju i vyrashhivaniju osetrovih ryb*. Moskva: Rosinformagrotekh.
 19. Kopejka, E. F. (1986). *Instrukcija po nizkotemperaturnoj konservacii spermy karpa*. Moskva: VNIIPRH.
 20. Zalepuhin, V. V. (2009). Individual'naja rabochaja plodovitost' kak harakteristika jendogennoj raznokachestvennosti ryb. *Vestnik AGTU. Rybnoe hozjajstvo, 1*, 73-78.
 21. Stein, H. (1979). Zum Einfluss von Schutzsubstanz und Konfektionierung auf das Befruchtungsergebnis mit tiefgefrorenem Bachforellensperma (*Salmo trutta morpha fario* L.). *Berl. Munch. Tierarztliche Wochenschrift, 92*, 420-421.
 22. Cvetkova, L. I., Titareva, L. N., Kochetov, A. A., Voronina, V. P., Milenko, V. A., & Pronina, N. D. (2002). O nekotoryh faktorah, vlijajushhij na krioustojchivost' spermy karpa *Cyprinus carpio*. *Izbrannye trudy VNIIPRH*. Dmitrov: Sever Podmoskov'ja, 377-384.
 23. Krasil'nikova, A. A., & Tihomirov, A. M. (2014). Ob'em zamorazhivaemogo obraztsa kak odin iz faktorov vyzhivaemosti spermatozoidov osetrovih vidov ryb pri kriokonservacii. *Estestvennye nauki. Biotehnologija, 2 (47)*, 62-69.
 24. Linhart, O., Mims, S. D., Gomelsky, B., Cvetkova, L. I., Cosson, J., Rodina, M., Horvath, A., & Urbanyi, B. (2006). Effects of cryoprotectants and male on motility parameters and fertilizabilization rate in paddlefish (*Polyodon spathula*) frozen-thawed spermatozoa. *J. Appl. Ichthyol., 22*, 384-388.
 25. Cvetkova, L. I., Dokina, O. B., Pronina, N. D., Milenko, V. A., & Tansybaev, A. N. (2004). *Akvakul'tura osetrovih ryb: dostizhenija i perspektivy razvitija*. Astrahan'.
 26. Psenicka, M., Dietrich, G. J., Wojtczak, M., Nynca, J., Rodina, M., Linhart, O., Cosson, J., & Ciereszko, A. (2008). Acrosome staining and motility characteristics of sterlet spermatozoa after cryopreservation with use of methanol and DMSO. *Cryobiology, 56*, 251-253.
 27. Horvath, A., Wayman, W. R., Urbanyi, B., Ware, K. M., Dean, J. C., & Tiersch T. R. (2005). The relationship of the cryoprotectants methanol and dimethylsulfoxide and hyperosmotic extenders on sperm cryopreservation of two North-American sturgeon species. *Aquaculture, 247*, 243-251.
 28. Chao, N.-H., & Liao, I. C. (2001). Cryopreservation of finfish and shellfish gametes end embryos. *Aquaculture, 197*, 161-189.
 29. Nahiduzzaman, Md., Hassan, Md. M., Roy, P. K., Hossain, Md. A., Hossain, M. Ali R., & Tierach, T. R. (2012). Sperm cryopreservation of the Indian major carp, *Labeo calbasu*: Effects of cryoprotectants, cooling rates and thawing rates on egg fertilization. *Animal Reproduction Science, 136*, 133-138.
 30. Mounib, M. S. (1978). Cryogenic preservation of fish and mammalian spermatozoa. *J. Reprod. Fert., 1 (53)*, 13-18.
 31. Mounib, M. S., Hwang, P. C., & Idler, R. R. (1968). Cryogenic preservation of Atlantic Cod (*Gadus morhua*) sperm. *J. Fish. Res. Board. Can., 12(25)*, 2623-2632.

32. Chernomashencev, A. I., & Mil'shtejn, V. V. (1983) *Rybovodstvo*. Moskva: Legkaja promyshlennost'.
33. Ivanov, A. P. (1988). *Rybovodstvo v estestvennyh vodoemah*. Moskva: Agropromizdat.
34. Horváth, Á., Wayman, W. R., & Urbányi B. (2005). The relationship of the cryoprotectants methanol and dimethylsulfoxide and hyperosmotic extenders on sperm cryopreservation of two North-American sturgeon species. *Aquaculture*, 247, 243-251.
35. Lahnsteiner, F., Berger, B., Horvath, A., & Urbanyi, B. (2004). Studies on the sperm biology and sperm cryopreservation in the sterlet, *Acipenser ruthenus* L. *Aquaculture Research*, 35, 519-528.
36. Lahnsteiner, F., Weismann, T., & Patzner R. A. (1997). Methanol as cryoprotectant and the suitability of 1.2 ml and 5 ml straws for cryopreservation of sperm from salmonid fishes. *Aquaculture Research*, 28, 471-479.

РОЗРОБЛЕННЯ КРІОЗАХИСНИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЗАМОРОЖУВАННЯ СПЕРМИ СТЕРЛЯДІ (*ACIPENSER RUTHENUS*)

I. С. Кононенко, kononenko_irina88@ukr.net, Національний університет
біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Мета. Розробити оптимальний склад кріозахисного розчину для заморожування сперми стерляді з використанням нових та стандартних складових компонентів і порівняти результати запліднення ікри спермою, замороженою різними способами та у різних середовищах. Проаналізувати результати утримання самців стерляді у модельованих умовах природного нересту та оцінити якість статевих продуктів, отриманих у ранні, порівняно із природними, строки нересту.

Методика. Поставлені завдання з оптимізації кріозахисних середовищ для заморожування сперми стерляді вирішувалися згідно з загальноприйнятими методиками робіт у кріобіології та відповідно до рекомендацій Копейки Є. Ф. Роботи з плідниками стерляді проводилися відповідно до загальноприйнятих методів в осетрівництві та моделювання умов природного нересту.

Результати. Дослідженнями встановлено позитивну дію креатину, введення якого до складу розчину дозволило підвищити кріозахист сперми від пошкоджувальних чинників кріоконсервування. В результаті низькотемпературного заморожування сперми різними способами найкращі результати отримані за заморожування сперми у зразках найменшого об'єму — гранулах, про що свідчать кількість живих розморожених спермій, показники запліднення ікри та кількості ембріонів, що розвиваються. Моделювання умов природного нересту дозволило отримати від самців стерляді якісні статеві продукти у ранні, порівняно із природними, строками нересту, здійснити їх заморожування та запліднити ними через кілька тижнів зберігання ікру.

Наукова новизна. Серед різноманіття речовин, що використовуються в кріобіології для оптимізації складу захисних розчинів, було випробувано та отримано позитивні результати від введення креатину. Оптимізацію складу кріорозчину проведено із використанням сперми стерляді, отриманої у ранні, порівняно із природними, строки нересту.

Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані в умовах рибницьких заводів з метою отримання потомства стерляді як для товарних потреб, так і для відновлення її популяцій у природних водоймах. Крім того, отримані результати є підґрунтям для подальших досліджень з розроблення оптимального складу кріозахисного середовища для заморожування сперми стерляді.

Ключові слова: стерлядь (*Acipenser ruthenus*), модельовані умови природного нересту, донерестова група, сперматозоїди, метанол, креатин.

РАЗРАБОТКА КРИОЗАЩИТНЫХ СРЕД ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ СПЕРМЫ СТЕРЛЯДИ (*ACIPENSER RUTHENUS*)

И. С. Кононенко, kononenko_irina88@ukr.net, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

Цель. Разработать оптимальный состав криозащитной среды для замораживания спермы стерляди с использованием новых и стандартных составных компонентов и сравнить результаты оплодотворения икры спермой, замороженной разными способами и в разных средах. Проанализировать результаты содержания самцов стерляди в моделированных условиях естественного нереста и оценить качество половых продуктов, полученных в ранние, по сравнению с естественными, сроки нереста.

Методика. Поставленные задачи по оптимизации криозащитных сред для замораживания спермы стерляди решались согласно общепринятым методикам работ в криобиологии. Работы с производителями стерляди проводились в соответствии с общепринятыми методами в осетроводстве и моделированию условий естественного нереста.

Результаты. Исследованиями установлено позитивное действие креатина, введение которого в состав раствора позволило повысить криозащиту спермы от повреждающих факторов криоконсервирования. В результате низкотемпературного замораживания спермы разными способами лучшие результаты получены в образцах с наименьшим объемом — гранулах, о чем свидетельствуют количество живых размороженных спермиев, показатели оплодотворения икры и количества развивающихся эмбрионов. Моделирование условий естественного нереста позволило получить от самцов стерляди качественные половые продукты в ранние, по сравнению с естественными, сроки нереста, провести их замораживание и оплодотворить ими через несколько недель хранения икры.

Научная новизна. Среди разнообразия веществ, используемых в криобиологии для оптимизации состава защитных растворов, было апробировано и получено позитивные результаты от введения креатина. Оптимизацию состава криораствора проведено с использованием спермы стерляди, полученной в ранние, по сравнению с естественными, сроки нереста.

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы в условиях рыбоводных заводов с целью получения потомства стерляди как для товарных потребностей, так и для восстановления ее популяции в естественных водоемах. Кроме того, полученные результаты являются основой для дальнейших разработок оптимального состава криозащитной среды для замораживания спермы стерляди.

Ключевые слова: стерлядь (*Acipenser ruthenus*), моделированные условия естественного нереста, донерестовая партия, сперматозоиды, метанол, креатин.

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 114-145
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.114>
УДК 636.087.72:639.3.043.13

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В РИБНИЦТВІ МІНЕРАЛІВ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ОЦІНКИ ЇХ ФІЗИКО- ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТВАРИННИЦТВІ (ОГЛЯД)

О. О. Батуревич, shtefan_91@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Охарактеризувати основні фізико-хімічні та біологічні властивості деяких мінералів вулканічного походження, зокрема: цеоліту, сапоніту та бентоніту, поклади яких є на території України. Розглянути та здійснити порівняльну оцінку їх хімічного складу та біологічних властивостей. Узагальнити літературні дані щодо ефективності їх застосування в годівлі тварин, птиці та риби як кормових добавок.

Результати. З-поміж мінералів вулканічного походження, поклади яких є на території України, розглянуто групи цеолітів, сапонітів та бентонітів. Хімічний склад, а, відповідно і властивості даних мінералів, мають суттєві відмінності. Огляд наукових праць свідчить про їх широке використання в промисловості, медицині та тваринництві. Цеолітовий складник представлений кліноптилолітом, який є придатним для годівлі тварин завдяки структурі кристалічної решітки. Його структура і хімічний склад зумовлюють сорбуючі та іонообмінні властивості. Встановлено позитивний вплив цеоліту, сапоніту та бентоніту на організм тварин. В рибництві цеоліт застосовується з метою підвищення рибопродуктивності та очищення рибогосподарських водойм. Окреслено перспективу дослідження ефективності використання мінералів вулканічного походження в годівлі риб у переднерестовий період.

Практична значимість. Аналіз та узагальнення результатів наукових досліджень, проведених в різних галузях тваринництва, дозволить визначити перспективи та способи використання мінералів вулканічного походження (цеоліту, сапоніту та бентоніту) в рибництві.

Ключові слова: мінерали вулканічного походження, цеоліт, сапоніт, бентоніт, кормова добавка, годівля риб, сорбція, іонообмін.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

В сучасних умовах в світі відбувається стрімкий розвиток промисловості, що призводить до погіршення екологічних умов та техногенного навантаження на довкілля. Тому з кожним роком зростає актуальність пошуку екологічних рішень для локалізації та ліквідації забруднень нафтопродуктами, кислотами, лугами та іншими небезпечними речовинами. Існує велика кількість сорбентів, що призначені для зв'язування певних хімічних як органічних, так і неорганічних сполук. Тобто сорбенти — це речовини, що можуть селективно вбирати із навколишнього середовища газу, пари та сполуки. Виходячи з цього, вони широко використовуються не лише в промисловості, а й в тваринництві, рослинництві та медицині. Проте як сорбуючі речовини в основному застосовують синтетичні препарати, які не є екологічно безпечними.

© О. О. Батуревич, 2017

Ефективним сорбуючим засобом, що може стати альтернативою синтетичним сорбентам, є мінерали вулканічного походження. До таких речовин, поклади яких є на території України, належать цеоліти, бентоніти та сапоніти. Ці природні мінерали характеризуються адсорбційними, іонообмінними та каталітичними властивостями. Їх застосування в різних галузях господарства економічно доцільне з огляду на їхню невисоку вартість та наявність великих промислових родовищ в Україні [1, 2].

Головним завданням дослідження є проведення порівняльного аналізу ефективності застосування мінералів-сорбентів родовищ України у тваринництві та окреслення перспектив для рибиництва, оскільки матеріали, котрі б певною мірою охарактеризували вплив цих речовин на організм риб, органи та системи органів є фрагментарними та дослідженими не до кінця.

Метою представленої роботи є аналіз масиву доступної наукової інформації щодо фізико-хімічних та біологічних властивостей мінералів вулканічного походження (цеоліту, сапоніту та бентоніту), поклади яких є на території України, та здійснення порівняльної оцінки ефективності їх застосування в годівлі тварин, птиці та риби в якості кормової добавки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ. ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Зараз у світі виробляється або використовується близько 200 видів сорбентів, які класифікують за різними ознаками: походженням, дисперсністю, призначенням. Розрізняють такі типи сорбентів: неорганічні, природні органічні і органо-мінеральні, а також синтетичні [3].

На території України є поклади різноманітних мінералів вулканічного походження, промислове застосування яких в останні роки набуло широких масштабів. До таких мінералів відносяться цеоліт, сапоніт та бентоніт, які широко використовують в тваринництві (при виробництві кормових добавок, комбікормів), рослинництві (з метою розкислення та збагачення ґрунтів мінеральними речовинами), медицині (як медичні препарати-сорбенти, косметичні засоби), хімічній і нафтопереробній промисловості (виготовлення безфосфатних миючих засобів тощо).

Основними перевагами цих мінералів, порівняно з сорбентами синтетичного походження, є те, що вони широко розповсюджені в Україні, мають нижчу вартість, а відпрацьований сорбент не потребує регенерації, оскільки не є токсичним.

Так, цеоліти Сокиринського родовища широко використовуються в сільському господарстві як добавка до кормів для тварин та птиці, як меліоранти з метою покращення врожайності сільськогосподарських культур, у риборозведенні та гідропонії - для осушування вологого зерна, а також з метою покращення гігієнічних умов у тваринницьких приміщеннях, очищення їх стоків, як тепличний субстрат тощо [4]. Бентоніти Черкаського родовища використовували під час аварії на Чорнобильській АЕС з метою запобігання розповсюдженню радіоактивного забруднення [3].

Актуальним питанням рибного господарства завжди була і залишається повноцінна і раціональна годівля риб. Тому безліч досліджень в цій галузі було проведено з використанням мінеральних добавок, котрі, крім своїх корисних фізико-хімічних властивостей, були б економічно вигідними.

Найбільш досліджуваним мінералом природного походження був і залишається цеоліт, який за використання в рибній галузі показав достойні результати та відкрив свої позитивні властивості.

Дослідниками було встановлено ефективність застосування цеоліту з метою очищення водного середовища при вирощуванні риб. Відзначено, що концентрація біогенних елементів у воді активніше зменшувалася при використанні цеоліту в якості фільтру у районі водонапуску, ніж при внесенні мінералу розсипом у водойму. Також спостерігалось зниження концентрацій нітратів на водовипуску в 1,6 рази, що значно підвищує якість води рибогосподарських водойм [5].

Цеоліти південноафриканського походження використовували для видалення аміаку в рециркуляційній системі при вирощуванні акваріумних рибок гуппі. Було доведено, що найефективніше вбирав аміак фільтр, в якому містився цеоліт фракційним розміром 1,0–1,4 мм [6].

Внесення цеоліту в стави протягом 100 днів при вирощуванні форелі не вплинуло на ріст риб, проте концентрація амонійного азоту у воді була значно нижчою [7].

В умовах індустріальних тепловодних рибних господарств встановлено оптимальну дозу цеоліту у складі продукційних комбікормів для дволіток коропа, що дозволяє збільшити приріст на 17,1–27,2%, та знизити витрати кормів на 12,7–19,5%. Максимальний ефект приросту коропа був встановлений за використання 3% цеоліту у складі кормів рослинного походження. При споживанні комбікормів з цеолітом не було виявлено жодного впливу на рівень гемоглобіну, еритроцитів та лейкоцитів у периферичній крові коропа. Була помічена тенденція до збільшення білка у сироватці крові риб, що свідчило про покращення можливостей транспортної системи крові [8]. Доведено, що цеоліт у складі комбікорму сприяє виведенню важких металів (свинцю, кадмію) з кишечника коропа, підвищує ріст риби за рахунок інтенсивнішого синтезу у тканинах білка та жиру, а також підвищує доступність 15 амінокислот з 17 досліджених. Також відбулися зміни у швидкості просування їжі по травному тракту коропа. Так, за внесення цеоліту у складі корму в кількості 3,5 та 7,0% повне просування їжі затримувалось на 1, 6 та 10 годин відносно контролю, що зумовлює краще засвоювання поживних речовин під час травлення [8].

Підвищення темпу росту коропа при додаванні до складу комбікорму цеоліту відбувається за рахунок більш інтенсивного синтезу у тканинах білка та жиру. При цьому на енергетичні витрати у коропа використовуються в першу чергу вуглеводи [9].

Були отримані позитивні результати при використанні цеолітів в якості добавок в корми різновікових груп коропа, в якості сорбенту при інкубації ікри коропа і транспортуванні личинок риб. Також виявлено, що у тріліток коропа, які

споживали корм із додаванням 10% цеоліту, середній індивідуальний приріст зріс на 10,7% порівняно з контрольною групою [10].

Крім того, згодовування цеоліту в складі комбікормів для коропа сприяє збільшенню швидкості росту та виживання [11].

На підставі досліджень біологічних і фізіолого-біохімічних показників організму молоді гібрида «російський осетер × ленський осетер», можна зробити висновок про доцільність додавання цеоліту до складу комбікорму в кількості 3 і 6% [12].

В ході експериментів встановлено що, введення цеоліту в комбікорм у кількості 3 і 5% позитивно впливає на швидкість росту, накопичення маси, вгодованість, рівень виживання і активність системи антиоксидантного захисту організму радужної форелі та сибірського осетра [13].

Цеоліт застосовують в кормовиробництві з метою збільшення терміну зберігання рибної муки. Встановлено його здатність до сповільнення процесів окиснення ліпідів та підвищення вмісту мононенасичених жирних кислот. При цьому мінерал не чинить негативного впливу на якість м'яса риби [14, 15].

Крім цеолітових покладів, на території України були виявлені поклади сапонітів та бентонітів, котрі можуть зайняти достойне місце в годівлі риб та вже показали деякі позитивні результати в цьому напрямі.

Доведено, що сапоніт ефективно впливає на якість питної води, що окреслює перспективу його використання в рибогосподарській галузі. Також наявна інформація щодо знезараження води сапонітом в поєднанні з іншими матеріалами [16–18].

Розроблено та здійснено перевірку в індустріальних умовах вирощування кормів для осетрових риб з введення до їх складу бентоніту і цеоліту. Це сприяє підвищенню об'єму корму, якості екструдованих кормів, міцності та гладкості гранул [19].

Спираючись на активне використання вищезгаданих мінералів в тваринництві, припускаємо, що в рибництві вони можуть показати не менш позитивні результати та відкрити нові властивості.

Цеоліти (грец. *zéō* — киплю та *lithos* — камінь) – група алюмосилікатів лужних і лужноземельних металів каркасної структури із дуже малим (0,4–0,8 нм) розміром пор кристалічної решітки [20]. Вони були відкриті більше двохсот років тому шведським мінералогом Фредеріком Кронстедтом [21].

Природні цеоліти відносяться до класу тектосилікатових мінералів, завдяки своїй особливій кристалічній будові є адсорбентами та каталізаторами. Молекулярно-ситових та інших фізико-хімічних властивостей цеоліти набувають після видалення молекул води із порожнин решітки хімічним або термічним шляхом. Такі властивості зумовлюють їх широке застосування в сільському господарстві, медицині та в інших галузях промисловості [22].

Відомо близько 50 видів природних цеолітів та більше 150 синтетичних [23, 24].

Перші спроби отримати цеоліти синтетичним шляхом були зроблені більше 100 років тому. Вперше синтез силікатів в гідротермальних умовах був здійснений Шафотле в 1845 р. У 1862 р. Сент-Клер Девіль отримав синтетичний калієвий філіпсит при нагріванні силікату і алюмінату калію за температури 200°C. У близьких умовах при температурі до 170°C був отриманий синтетичний шабазит. У 1948 р. професором Баррером Р. розпочаті роботи із синтезу цеолітів, а в 50-х рр. минулого століття в лабораторних умовах здійснений синтез морденіту, шабазиту, філіпситу, фожазиту, стронцієвих і барієвих цеолітів в умовах знижених температур (100°C) при нормальному тиску [25].

Синтетичні цеоліти використовують в різних технологічних процесах, зокрема при очищенні технічних масел, в якості каталізатора в нафто- і газопереробній галузі, а також в синтезі органічних речовин [26]. Однак, в тваринництві використовують природні цеоліти, оскільки вони не чинять токсичного впливу на організм, що підтверджено біологічними дослідженнями. Достовірність експериментальних даних забезпечується широким використанням сучасних методів досліджень, таких як екстракційно-фотометричний, рентгено-радіометричний, седиментаційний, потенціометричний, мікробіологічний, а також досліджень, передбачених ТУ 21 УРСР 485-90, статистичною обробкою результатів, перевіркою їх на практиці [27].

Природні цеоліти частіше за все утворюють білі, іноді безбарвні та прозорі, а рідше червонуваті, коричнюваті та зеленкуваті кристали кристалографічних сингоній (рис. 1).

Хімічний склад природних цеолітів, на відміну від синтетичних, є стабільним. Наявність у їхньому складі шкідливих елементів не більше: плюмбуму — 0,003%, арсену — 0,0001%. Цеоліти нерозчинні у воді, кислотах, лугах та органічних розчинниках, термостійкі в межах температур до 500°C [28].

Рис. 1. Природний цеоліт [29]

Структура природних цеолітів утворена тетраедричними групами $\text{SiO}_2/4$ і $\text{AlO}_2/4$, що об'єднані своїми вершинами в тривимірний каркас, пронизаний порожнинами та каналами (порами) розміром 2–15 ангстрем (рис. 2). Відкрита каркасно-порожнинна структура цеолітів $[\text{AlSi}]_n\text{O}_4$ має негативний заряд [30, 31].

Рис. 2. Проекція фрагменту структури цеоліту [29]

Цеоліти належать до адсорбентів з дуже тонкими порами, величини яких схожі з розмірами молекул і виконують роль молекулярних сит, що використовуються для розподілу молекул за розмірами. В сухому стані цеоліти застосовують як адсорбенти, що добре поглинають із газової (парової) фази несиметричні молекули (H_2O , CO_2) і молекули органічних речовин із кратними зв'язками (етилен, ацетилен тощо).

При зануренні у воду цеоліти набухають і утворюють особливу псевдофазу із сприятливими для проведення процесів іонного обміну властивостями, виступаючи в ролі іонітів. Це речовини з дрібнопористою структурою, які обмежено набухають у водних розчинах. Структура цих речовин складається із каркасу, на якому є фіксований заряд (закріплені йони, функціональні групи), що зрівноважують цей заряд, мають певну рухливість і здатні до заміщення [32]. Отже, адсорбенти — це тверді пористі речовини, а іоніти, хоча зовні і здаються твердими речовинами, за своїми фізико-хімічними властивостями в набухлому стані одночасно характеризується властивостями твердих тіл і рідин. Така структура цеоліту і пояснює його селективну вибірковість та активну взаємодію з молекулами води, які фактично активізують процеси поглинання та іонообміну.

Природні цеоліти широко розповсюджені в приповерхневих частинах земної кори. Вони формуються під час різних геологічних процесів. За походженням виділяють: цеоліти кори вивітрювання, осадові, вулканогенно-осадові, діагенетичні, епігенетичні, метаморфічні, вулканогенні, гідротермальні, пізньомагматичні. Основну промислову цінність на сьогоднішній день мають родовища двох геолого-промислових типів: вулканогенно-осадового та вулканогенного, оскільки саме в них є поклади мінералів з найбільшою цеолітовою часткою (до 80%) [33].

Вулканогенно-осадові родовища ранньодіагенетичного походження виникають за умови діагенезу осаду високолужних содових озер, цеолітизації вулканічного матеріалу кислого або сублужного складу. Такі родовища відомі в західних штатах США, Південно-Східній Африці, Італії. Поклади цеолітів в цих родовищах характеризуються плаstopодібною формою та значною потужністю.

Вулканогенно-осадові родовища пізньодіагенетичного походження широко розвинені в країнах Європи та Японії. Процес перетворення вулканічного скла на цеоліти тут проходив повільно за оптимальної лужності. Іноді родовища таких глин містять пласти бентонітів. Типовим прикладом родовищ цього типу є Сокирницьке в Закарпатті та Айдазьке в Закавказзі [33].

Вулканогенні гідротермально-метасоматичні родовища трапляються в Росії та Японії. У формуванні родовищ цеолітів цього типу провідну роль відіграють процеси раннього діагенезу й епігенезу вулканічних утворень, пов'язаних з гідролізом кременистого скла або вулканічного попелу, що також проходить під дією молекул води з атмосфери. Потужність — від десятків метрів до 1–2 км. Цеолітова частка варіюється в межах 15–80%.

За величиною запасів родовища цеолітів поділяються на: великі (сотні мільйонів тонн), середні (десятки мільйонів тонн), дрібні (декілька мільйонів тонн). Промислову цінність являють родовища кліноптилоліту, морденіту, шабазиту, перспективними є родовища анальциму та філіпситу. Всього у світі відомо близько 1000 великих родовищ більше ніж у 40 країнах. Світове споживання цеолітової сировини оцінюється в 1–3 млн т на рік. Головна його частина припадає на КНР (більше 2,5 млн т), Південну Корею, Японію, Мексику, Росію, Україну, а також Кубу, США, Італію, Німеччину та на низку інших країн [33].

В Україні родовища цеоліту розвідані і розробляються із 1979 р. у Карпатах [34], окремі поклади виявлені в Криму, де в 1914–1941 рр. почався їх видобуток [35].

Загальні запаси цеолітовмісних туфів в Україні, в умовах відкритої розробки перевищують 1 млрд т. Цеоліти України мають кліноптилолітовий, морденітовий, анальцимовий склад і належать до сировини багатоцільового використання в промисловості та сільському господарстві [36]. На рис. 3 подана карта офіційних родовищ цеолітів, що розроблені на території України. Мінеральні ресурси високоякісних цеолітів Закарпатської внутрішньої западини забезпечують попит на сировину як внутрішнього, так і зовнішнього ринків.

Серед природних цеолітів в промисловості та сільському господарстві найбільше застосовують кліноптилоліт (англ. *Clinoptiolite*). Родовища цих мінералів розташовані в багатьох куточках світу [37], в тому числі і в Україні (Закарпаття, Крим) [38].

На території України найбільшим родовищем цеоліту (кліноптилоліту) є Сокирницьке (с. Сокирниця Хустського р-ну Закарпатської обл.). Особливістю даного родовища є те, що вміст кліноптилоліту в покладах досягає 75% і вище, який, на відміну від цеолітів Китаю та Японії, не потребує подальшого збагачення і характеризується високою стійкістю до зношення. До складу також входять кварц, гідрослюда та ін. (табл. 1). Сокирницьке родовище кліноптилолітових туфів, за прогнозами, містить близько 168 млн т цеоліту.

Кліноптилоліт $((\text{Na}, \text{KCa})_4[\text{Al}_6\text{Si}_{30}\text{O}_{72}] \times 24\text{H}_2\text{O})$ — один з найпоширеніших природних цеолітів, належить до родини хьюландитів. Відношення кремнію до алюмінію (Si/Al) в кліноптилоліті знаходиться в межах від 4,5 до 5,3 [39].

Рис. 3. Карта розташування родовищ цеолітів на території України [36]

Таблиця 1. Мінеральний склад цеоліту Сокириницького родовища (Україна)

Мінерали	Вміст, %
Кліноптилоліт	65–80
Монтморилоніт	2–4
Кварц	до 10
Плагіоклаз	5–10
Карбонат	3
Гідрослюда	1–3

Структура кліноптилоліту являє собою тривимірну алюмосилікатну решітку, котра утворює систему мікропор та каналів заповнених молекулами води та обмінними катіонами (Na, K, Ca, Mg, Fe, Si, Ba та ін.) [39]. Мінерал має строго калібрований розмір пор, тому здатний виявляти сорбційні властивості тільки по відношенню до іонів макро- і мікроелементів та сполук з невеликими розмірами молекул, не вступаючи в пряму взаємодію з вітамінами, білками, амінокислотами та іншими органічно складними сполуками. Ця властивість зумовлює його безпечне використання в якості кормової добавки. Крім того, кліноптилоліт має овальну форму решітки і не здатен пошкоджувати стінки кишечника [40].

Кліноптилоліт добре сорбує пари води, аміаку, ацетилену, метанолу. Використання кліноптилолітів дозволяє знизити вміст іонів амонію в стічних водах на 93% [22]. Сорбційна здатність кліноптилоліту значно підвищується в результаті термодесорбції води, після якої цеоліти можуть сорбувати органічні рідини, інертні гази, сірководень [41]. На відміну від типових

кристалогідратів, які під час нагрівання також виділяють значну кількість води, природні цеоліти поглинають і виділяють воду без суттєвої зміни кристалічної структури [42].

Цеоліти (кліноптилоліти) Сокирицького родовища характеризуються комплексним впливом на організм тварин завдяки іонообмінним та сорбційним властивостям. Тобто цеоліт віддає іони мікро- та макроеlementів, а замість них вбирає токсичні іони і утримує їх у своїй решітці та виводиться з організму без порушення своєї кристалічної структури. Мінерал має поглинальну здатність до 50% від свого об'єму [43].

Дослідженнями встановлено, що серед багатьох методів хімічного модифікування з метою збільшення ефективного діаметру та об'єму внутрішніх каналів, а також появи у структурі сорбентів деякої кількості макропор найефективнішим є кислотне модифікування цеолітів з наступним заміщенням водню на катіони одновалентних металів. За використання цього методу зростає пористість цеоліту і, як наслідок, адсорбційна здатність для відносно крупних молекул [22]. Оброблення цеоліту слабкими розчинами кислот приводить до видалення катіонів металів (декатіонування), а за дії більш концентрованих кислот — до деалюмініювання. Після такої обробки спостерігається зміна адсорбційної ємності, а також виявляється вторинна пористість, внаслідок чого цеоліт здатен поглинути більшу кількість молекул. Такі способи обробки цеоліту використовують для адсорбції бензолу, а також барвників, розмір молекул яких перевищує розмір мікропор цеоліту [44].

Якщо із цеоліту видалити воду методом нагрівання, вільні додаткові пори можуть бути знову заповнені молекулами води або іншою речовиною. Цеоліти, оброблені таким способом, можуть бути використані для осушення, очищення і розділення складних сумішей. Такий спосіб підвищення ефективності сорбуючої здатності цеоліту найдешевший і найбільш придатний для використання в складі кормів для тварин, оскільки пори цеоліту недостатньо великі, що унеможливорює поглинання ним вітамінів чи амінокислот під час проходження по шлунково-кишковому тракту [45].

В 2004 р. були проведені інноваційні дослідження з термодесорбції води та визначення адсорбційних властивостей кліноптилолітів Сокирицького родовища. В ході експерименту було встановлено, що адсорбційні властивості закарпатських цеолітів стосовно важких металів залежать від їх попередньої термічної обробки останніх, і максимум їхньої адсорбційної ємності припадає на температурний діапазон 70–150°C, який відповідає першій і другій стадіям дегідратації. Очевидно, видалення поверхневої плівки рідкої води і капілярно-зв'язаної води з мезопор і капілярів приводить до активації кліноптилоліту як адсорбенту важких металів [46].

Вміст основних мінералів (кліноптилоліт, морденіт) є одним із основних показників якості породи та її чистоти. Запаси цеолітів в низці країн Євразії становлять близько 4 млрд т. Близько 50% зосереджено в Закарпатті та Криму (Україна), 39% — на Далекому Сході та Сибіру (Росія), 10% — в Європейській частині Росії та на Уралі і 1% — в Східному і Південному Казахстані (табл. 2).

Таблиця 2. Хімічний склад найбільших родовищ цеоліту в Україні, Росії та Грузії, % [47]

Хімічний складник	Сокирницьке (Україна)	Тедзамське (Грузія)	Шівиртуйське (Росія)	Хотинське (Україна)
SiO ₂	68,02	59,12	62,34	62,60
Al ₂ O ₃	13,04	13,65	14,86	19,60
CaO	2,71	5,17	3,29	8,17
K ₂ O	2,64	2,34	2,18	1,82
Fe ₂ O ₃	1,92	1,30	1,66	2,10
MgO	1,63	1,41	1,05	2,20
Na ₂ O	1,57	2,30	1,22	1,50
TiO ₂	0,30	0,60	0,54	0,31
MnO	0,04	0,06	0,05	0,04
P ₂ O ₅	0,02	0,02	0,04	0,06
H ₂ O	16,94	15,22	16,30	14,18

З результатів, викладених у табл. 2, видно, що серед поданих зразків масова частка SiO₂ найбільша в кліноптилоліті Сокирницького родовища. Проте, вибір цеоліту залежить від конкретних задач, тому необхідно враховувати ступінь вивчення і дослідження цього матеріалу в конкретній галузі [47].

В світовій практиці Японія є однією із перших країн, де почали видобувати та використовувати природні цеоліти (кліноптилоліти та модерніти). Останні в переважній кількості були відкриті в західній половині острова Хонсю з продовженням в південно-східну частину острова Хоккайдо. В розрізі цих товщ цеолітова мінералізація найбільш широко виражена в верхньоміоценових утвореннях. Цеолітизовані кислі туфи відрізняються світло-зеленою пігментацією [21].

З промислової точки зору, для Японії найбільш придатним є цеолітовмісне родовище Сайнокаї. В цій зоні кліноптилоліт може досягати потужності до 230 м. Такі площі зафіксовані в центральній і північній частині регіону. Видобуток «зелених туфів» зосереджений в родовищі Ітая, Футатусі-махі та Ямамато-ган [48]. Порівняльна характеристика (за хімічними властивостями) між двома потужними родовищами наведена в табл. 3.

Таблиця 3. Хімічний склад цеоліту Сокирницького родовища (Україна) та родовища Сайнокаї (Японія), %

Хімічний складник	Сокирницьке (Україна)	Сайнокаї (Японія)
SiO ₂	71,30	71,10
Al ₂ O ₃	13,10	9,40
CaO	5,20	1,00
K ₂ O	3,40	0,50
Fe ₂ O ₃	1,90	1,30
MgO	1,20	2,10

Продовження табл. 3

Хімічний складник	Сокирицьке (Україна)	Сайнокаї (Японія)
Na ₂ O	1,30	1,30
TiO ₂	0,30	0,23
MnO	0,04	0,05
P ₂ O ₅	0,02	сліди
H ₂ O	16,94	4,70

Невисокий вміст води в кліноптилолітах Японії свідчить про те, що в його структурі менше пор, які можуть вмістити сорбовані молекули.

Зневоднені цеоліти мають хороші адсорбційні, іонообмінні та каталітичні властивості й можуть застосовуватися як «молекулярні сита» при очищенні розчинів, продуктів хімічних реакцій та води; розділенні газів і рідин, переробці радіоактивних розчинів; у рослинництві й тваринництві, як кормові добавки та ін. [49, 50].

Хімічний склад цеоліту зумовили його широке використання в медицині. Це доступний природний матеріал, оскільки широко розповсюджений в навколишньому середовищі. Встановлено, що вживання цеолітів людиною дає ряд позитивних клінічних ефектів: імуномодуючий, антианемічний, антисклеротичний. Воно також підвищує рівень стресостійкості організму і сприяє виведенню важких металів [51, 52, 53]. Вживання цеоліту в умовах експериментальної моделі гострої ниркової недостатності призводить до покращення функціональних показників водно-сольового гомеостазу, що виражається в зниженні вмісту креатиніну, сечовини і калію в плазмі крові [54]. На основі цеоліту розроблено та зареєстровано медичний екологічно чистий препарат з комерційною назвою «Літовіт», що виробляється з метою детоксикації організму. Препарат складається з суміші цеоліту та пшенично-житніх висівок [55].

Використання природних цеолітів в годівлі сільськогосподарських тварин було розпочато в 60-х рр. XX ст., про що свідчить ряд робіт закордонних авторів. Передумовою було те, що цеоліт регулярно знаходили у випорожненнях диких тварин та птахів [54].

За нинішніх умов, використання цеоліту в тваринництві набуло широких розмахів. Відкриті нові властивості цеолітів, які підтверджені науковими випробуваннями [52, 56–58].

Використання цеоліту в годівлі молодняку свиней є ефективним при лікуванні проносів та позитивно впливає на приріст маси [59]. Додаткове введення цеоліту в корм для свиней в кількості 10% сприяє збільшенню приростів їх маси на 25% в порівнянні з контрольною групою [60].

За використання цеоліту в годівлі бройлерів м'ясна продуктивність збільшується на 13,3%, вихід їстівної частини підвищується на 18,7% [61]. Відзначається істотне зростання приросту бройлерів, яким був згодований цеоліт разом з кормом впродовж 21 дня в кількості 1% від добового раціону [62].

При вивченні впливу додавання кліноптилоліту до корму поросят та свиней

на функціональний стан організму в процесі вирощування встановлено значне зменшення кількості шлункових, легеневих та серцевих захворювань і збільшення рівня виживання дослідних тварин. Доведено позитивний вплив кліноптилоліту на процеси травлення за згодовування в кількості 5% [56].

Використання цеоліту в годівлі бичків в якості кормової мінеральної добавки з розрахунку 15 г на 100 кг живої маси сприяє збільшенню швидкості їх росту на 19,9% [63].

Додавання цеоліту в порошкоподібному вигляді до складу комбікормів (3–5%) супроводжується активацією анаболітичних процесів в організмі жуйних тварин. Основна дія цеоліту проходить у травному тракті, головним чином у рубцевому середовищі, де він, завдяки своїм властивостям, виконує роль позитивного регулятора метаболізму азотистих сполук, вуглеводів, поживних і біологічно активних речовин, зв'язує до 15–20% азоту, стримує відтік рідини в наступні відділи травного тракту, чим знижує всмоктування аміаку та інших токсичних речовин у кров [64].

Під впливом кормової добавки збільшується період інтенсивної молоковіддачі, а також покращується якість молока, зростає вміст білка на 0,03–0,06% та вміст жиру — на 0,07–0,11% в молоці корів [65].

Введення мінералу у кількості 1,5% до раціону перепелів справляє позитивний вплив на їхню продуктивність та метаболічні процеси. Підтвердженням останнього є вміст загального білка, активність аспартат- і аланінамінотрансфераз та лужної фосфатази у крові та печінці птиці [57].

Сапоніт (від лат. *sapo* — мило) — водний алюмосилікат магнію з підкласу шаруватих силікатів, групи монтморилоніту. Був відкритий ще у 1840 р. шведським хіміком і мінерологом Л. Ф. Сванбергом [66]. Сапоніт ($\text{Mg}_3\text{Si}_4\text{O}_{10}[\text{OH}]_2$) є основним породоутворюючим мінералом змінених гіпергенезом туфів, мінералом групи монтморилоніту, в якому Al майже цілком замінений на Mg [33].

Сапоніти відрізняються високими показниками питомої поверхні набухання, колоїдності, ємності катіонного обміну. У вигляді ізоморфної домішки містять іони заліза, нікелю, інколи хрому [67].

Геологорозвідувальними організаціями на північно-західних схилах Українського щита відкрито нову бентонітову провінцію, в межах якої розвідано декілька промислових родовищ магнієвого монтморилоніту, що визначається як сапоніт. Вважається, що горизонт сапонітових глин являє собою кору вивітрювання туфогенної товщі, яка відноситься до верхньодокембрійського періоду. Аргілітоподібні туфогенні товщі осадово-вулканогенних порід в районі сапонітових родовищ характеризуються типовою для мілководних морських басейнів тонкою горизонтальною і косою верствуватістю, яка обумовлена різним мінералогічним та гранулометричним складом. Загальна потужність туфогенної товщі, корою вивітрювання якої є сапонітовий горизонт, досягає 170 м [68].

Станом на 2014 р. детально вивчене одне родовище — Варварівське, розташоване на території Хмельницької області, яке складається з двох ділянок — Варварівської і Ташківської, і обліковується Державним балансом запасів корисних копалин України. Їхні запаси становлять близько 40–50 млн т [69].

Сапонітова глина з родовища Ташківське є метаморфізованим туфом, що характеризується максимально високим вмістом смектитів, зокрема сапонітів (до 80%), і тому найкраще виявляє цінні сорбційні та катіонообмінні властивості (табл. 4) [70].

Сапоніти залягають на доступних для розробки відкритим способом глибинах (10–20 м). Потужність продуктивних пластів становить від 20 до 50 м [71]. Одним із відомих місць видобутку цього мінералу є Південна долина Панамінт, що в Каліфорнії (США) [72]. Також відкриті родовища сапонітових глин на Фарерських островах (Данія), в штаті Монтана (США), біля озера Верхне (Канада).

Таблиця 4. Хімічний склад сапоніту Варварського і Ташківського родовищ Хмельницької області (Україна) [72].

Хімічний складник	Вміст, %
SiO ₂	42,180–54,560
TiO ₂	1,050–1,850
Al ₂ O ₃	12,200–14,960
Fe ₂ O ₃	10,100–15,440
FeO	0,720–1,300
Mn ₂ O ₇	0,110–0,330
MgO	7,020–13,430
CaO	1,010–10,620
Na ₂ O	0,100–1,000
K ₂ O	0,190–2,910
P ₂ O ₅	0,083–0,236
Co	0,100–1,000×10 ⁻³
Cu	2,000–3,000×10 ⁻³
Zn	0,007–0,015
Ni	0,002–0,005
Au	5,000–10,000×10 ⁻⁶
Ba	1,500×10 ⁻³
Cr	0,010–0,150
V	1,500–3,200×10 ⁻³
Ge	0,120–0,150×10 ⁻³
Sn	1,500×10 ⁻⁴

Порода сапоніту темно-червоного, рудого чи сірого кольору, без смаку та запаху. Кристалічна структура мінералів групи монтморилонітів-сапонітів складається з двох шарів ненасичених форм: двох тетраедричних решіток SiO₂ і однієї октоедричної решітки, розташованої між ними, яка містить, в основному, Al, Mg, Fe. Між цими трьома шарами кристалічної решітки може відбуватися ізоморфний обмін, саме тому мінерали групи монтморилонітів характеризуються високими адсорбційними та іонообмінними властивостями.

Проведені дослідження показали, що кислотна активація приводить до зростання адсорбційної здатності мінералу. Адсорбція збільшується майже в 2 рази і становить 25,05 моль/кг або 19,038 г/кг сапоніту [73]. За рахунок кислотної активації збільшується кількість позитивно заряджених часточок, що і дає можливість мінералу відкрити подвійні сорбційні потужності.

Сапоніти відносять до 9 групи мінералів — групи силікатів і алюмосилікатів. Це важливий клас мінералів, представники якого разом із кварцом складають 95% від маси земної кори. Силікати і алюмосилікати ділять за будовою кристалічної решітки на наступні підкласи: а) острівні; б) кільцеві; в) ланцюгові; г) стрічкові; д) шарові; е) каркасні [73].

Дана порода виявляє підвищену селективну сорбуючу здатність до іонів лужних металів великих розмірів і амонію. Ефективно вбирає із води іони свинцю, стронцію, кадмію, амонію, радіоактивного цезію та ін. [67].

Рис. 4. Сапоніт Ташківського родовища (Україна): кристалічна решітка (а); загальний вигляд (б) [74]

Потреба України в сапонітовій сировині на початку XXI ст. становить 4 млн т на рік, — ось чому виникає питання про розширення областей видобування даного мінералу та проведення досліджень щодо застосування в різних галузях господарства [67]. Дослідженнями властивостей сапоніту Ташківського та Варварівського родовищ встановлено, що вони можуть використовуватися в харчовій промисловості, будівництві, сільському господарстві, медицині та ін. [75].

В умовах польових досліджень суміш чистого сапоніту, крейди і торфу може застосовуватись як ефективний хімічний меліорант, навіть у невеликих дозах (1–3 т/га) [76].

В тваринництві застосування сапоніту коровам, як у вигляді сапонітового борошна, так і у суміші з екструдованим кормом, дозволило підвищити відтворну здатність корів на 4%, їх молочну продуктивність на 12%, знизити збитки від неплідності на 19% [77].

Комплексна мінеральна добавка, виготовлена на основі сапоніту, при згодовуванні коровам у пасовищний період, дає можливість збалансувати їх

раціон за основними елементами мінерального живлення, що забезпечує підвищення молочної продуктивності на 7,6% і зменшення витрат кормів на одиницю продукції на 7,0% [78].

Додавання сапоніту до живильного середовища для гібрида каліфорнійського черв'яка у кількості 12% сприяє підвищенню в біомасі черв'яків вмісту заліза, магнію і цинку в середньому на 6%. В свою чергу, добавка 4% черв'ячної біомаси до повнораціонного комбікорму бройлерів сприяє збільшенню кількості еритроцитів та вмісту білка в сироватці крові і печінці [79].

Рекомендована норма сапоніту для хутрових звірів (норок) становить 1 г/кг живої маси. Зазначається, що таке дозування в складі раціону підвищує рівень відтворювальної здатності самок [80].

Також, на основі сапоніту одержана нова мінеральна кормова добавка для тварин та птахів під комерційною назвою «Фісташки» [73].

Згодовування сапоніту в комплексі з селеном дійним коровам покращує їх відтворювальну здатність, яка проявляється у зменшенні строку першого осіменіння на 7–19 днів [80].

Промислова відгодівля свиней комбікормами з добавкою природного сапоніту з розрахунку 15 г на 1 кормову одиницю протягом 112 днів дає додатковий приріст живої маси на 29,3% [82].

Бентонітові глини (англ. *Bentonite*) — глинисті породи, складені переважно мінералами смектитової групи, головним чином монтморилонітом ($\text{Al}_2[\text{Si}_4\text{O}_{10}](\text{OH})_2 \times n\text{H}_2\text{O}$) і бейделітом ($\text{Al}_2[\text{AlSi}_3\text{O}_9 \times (\text{OH})](\text{OH})_2 \times n\text{H}_2\text{O}$) [7]. Свою назву бентонітові глини отримали від форту Бентон, розташованого в штаті Вайомінг (США), де в кінці XIX ст. був розпочатий їх промисловий видобуток [82].

Вони мають високу ємність катіонного обміну, в'язучі властивості, пластичність, сорбційну здатність, можуть, вбираючи в себе воду, різко розбухати (до 8 разів). На колір бентоніти можуть бути білими, світло-зеленими, а вивітрені породи — червоними, жовтими, темно-коричневими (рис. 5) [33].

Рис. 5. Бентонітова глина

За складом вільних катіонів бентоніти можна розділити на лужні та лужноземельні. Лужні бентоніти мають високу пластичність, добре і швидко розбухають, і, таким чином, відносяться до високоякісної сировини, що дозволяє використовувати їх в різних галузях. Переважно вони складаються з 70–90% натрієвого монтморилоніту, поряд з яким часто зустрічаються хлорит, кристобаліт, цеоліт, польовий шпат та ін. [33].

На відміну від описаних вище мінералів, лужноземельні бентоніти за якістю поступаються лужним, тому спектр їх використання обмежений. Вони стають лужними після обробки натрієвими препаратами. Переважна частина лужноземельних бентонітів складається з кальцієвого монтморилоніту (80–90%). Як домішки можуть бути присутні кальцит, слюда, аморфний кремнезем [33].

Структура монтморилоніту представлена тришаровою схемою: два шари кремнекисневих тетраедрів, які з двох сторін покриті шаром алюмогідроксильних октаедрів (рис. 6) [83].

У проміжку між пакетами монтморилоніту розташовуються катіони металів (Na, Ca, K, Mg, Li, рідше — група NH_3). Вони врівноважують негативні заряди шарів. Залежно від переважання того чи іншого типу обмінних катіонів, наприклад, Ca, Mg або Na, в природі зустрічаються лужноземельні (Ca, Mg) і лужні (Na) монтморилоніти, які вже були описані вище. Крім обмінних катіонів, в міжшаровому просторі завжди присутні молекули зв'язаної води [84].

Рис. 6. Атомна структура бентоніту (монтморилоніту) [...] (за Гофманом, Енделлом, Вілмом, Маршалом і Хендріксом, 1933 р.)

Промислові поклади бентонітових глин виявлені в межах Українського щита, Дніпровсько-Донецької і Закарпатської внутрішньої западин, Передкарпатського крайового прогину, Волино-Подільської плити і Кримської складчастої області [36].

За мінеральним складом на території нашої держави виділяють три типи бентонітових глин. До першого типу відносяться глини монтморилонітового складу: цей різновид поширений в основному в АР Крим (Курцівське та Кудринське родовища), Хмельницькій області (Пижівське родовище). До другого типу відносяться бентонітові глини бейделіт-монтморилонітового складу, які поширені в Черкаській (Дашуківська ділянка) і в Тернопільській (Бережанське родовище) областях. До третього типу відносяться глини монтморилоніт-бейделітового складу, поклади яких розвідані в Хмельницькій, Тернопільській та Донецькій областях [36].

В табл. 5 представлені хімічні складові Дашуковського родовища (Черкаська обл.) [85].

Таблиця 5. Хімічний склад бентоніту Дашуковського родовища (Україна)

Хімічний складник	Вміст, %
Na - K	0,04
Ca	0,02
Mg	0,01
SO ₄	0,04
H ₂ O	57,19
Cl	0,02
SiO	0,35
Al ₂ O ₃	8,71
Fe ₂ O ₃	0,10
MnO	0,10
CaO	1,18
MgO	0,90

В Україні відомо більше 100 родовищ, але державним балансом обліковується лише 9 родовищ бентонітових глин з розвіданими і затвердженими у встановленому порядку запасами, з яких розробляються лише чотири (табл. 6, рис. 7) [36].

Добре відомі такі родовища бентонітових глин, як Черкаське, Горбське та ін. (Україна), що були традиційними постачальниками цього виду сировини для промисловості колишнього СРСР. Головним об'єктом українського шита є Черкаське родовище. Продуктивна товща глин датується нижнім і середнім міоценом. Родовище складається з 5 шарів (0,5–15,0 м) монтморилонітових, палигорськітових і полімінеральних глин. Запаси складають 50,4 млн т. На базі родовища споруджений комбінат і завод глинопорошків із щорічною продуктивністю 650 тис. т глини, придатної для виробництва керамзитового гравію, легких бурових розчинів, керамічних виробів і гідротехнічного цементу, залізородних окотнів тощо [33].

В меотичних і сарматських відкладах Причорноморської западини знайдені прояви бентонітоподібних глин, які вимагають подальшого вивчення. Прояви таких глин знайдено і в Криму (Курцівське і Кудринське родовища, Святої Гори на Карадазі) [33].

Таблиця 6. Розподіл запасів та видобутку бентонітових глин за адміністративним розташуванням [36]

Назва області	Кількість родовищ		Запаси на 01.01.2014 р.				Погашення в 2013 р.		
	Всього	У т. ч. ті, що розробляються	Всього		У т. ч. ті, що розробляються		Всього	У тому числі:	
			A+B+C ₁ *	C ₂ **	A+B+C ₁ *	C ₂ **		Видобуток	Втрачено
Всього в Україні	9	4	59939,860	378	52156,860	157	281,540	256,500	25,04
Вінницька	1	1	182,765	157	182,765	157	0,175	0,165	0,01
Донецька	1	1	3245,390	—	3245,390	—	146,770	128,940	17,83
Закарпатська	2	1	7386,000	—	562,000	—	—	—	—
Автономна республіка Крим	2	—	430,000	221	—	—	—	—	—
Тернопільська	1	—	426,000	—	—	—	—	—	—
Хмельницька	1	—	113,000	—	—	—	—	—	—
Черкаська	1	1	48166,700	—	48166,700	—	134,600	127,400	7,20

Примітка. * — А — запаси, які розвідано детально, що забезпечує повне виявлення умов залягання, форми і будови тіл корисної копалини, а також її якості і технологічних властивостей; В — запаси, розвідані і вивчені детально, що забезпечує з'ясування основних особливостей умов залягання, форми і характеру будови тіл корисної копалини, а також її якості й основних технологічних властивостей; С1 — запаси, розвідані і вивчені детально, що забезпечує з'ясування загальних умов залягання, форми і будови тіл корисної копалини, а також його якості і технологічних властивостей; ** — С2 — запаси, попередньо оцінені; кількість корисної копалини визначено за одиничними пробами і зразками.

Рис. 7. Карта родовищ бентонітових глин на Території України [36]

Металургійні підприємства України використовують бентонітові глини Дашуківської ділянки Черкаського родовища. Але більшість бентонітів для металургійного виробництва імпортуються з Азейбарджану, оскільки наявні породи на території України є не придатними для використання саме в цій галузі. Причина цілком очевидна — вищеперелічені родовища належать до групи лужноземельних корисних копалин і не здатні витримати конкуренцію у світі поряд із сировиною кращої якості [33].

Бентоніти Закарпаття залягають переважно в низах розрізу міоценових і міоцен-пліоценових відкладів Вигорлат-Гутинської гряди. Тут відомі декілька родовищ бентонітових глин: Горбське в Мукачівському районі, Ільницьке в Іршавському, Копанське у Виноградівському, однак усі вони відносяться до низькосортних лужноземельних копалин.

Винятково цінним є Киштинське родовище, розташоване на лівому березі р. Тиса. Поклади бентоніту тут сягають глибини до 2,7 м. В цьому місці бентоніти представлені світло-сірою або ж білою породою, яка швидко набухає під час контакту з водою. За складом обмінних катіонів бентоніти переважно відносяться до лужних, де основним компонентом іонного обміну є натрій і калій, які переважають над кальцієм і магнієм. Вони характеризуються високою пластичністю та ступенем розбухання від 6 до 13 разів. Придатні для виготовлення добротних бурових розчинів, можуть бути використані як адсорбенти, частково — як зв'язувальний компонент. Бентоніти в природному стані відповідають вимогам до бентонітових глин для тонкої та будівельної кераміки (ДСТ 7032-75) [86].

Серед різновидів глин у даному місці виявили прошарки унікальних білопалених глин з високим розбуханням (10–19 разів). Такі глини придатні для виготовлення якісних бурових розчинів, можуть бути використані як адсорбенти (характеризуються значною фільтрувальною здатністю та низькою оліємісткістю), частково — як зв'язувальний компонент формувальних сумішей в ливарному виробництві. Такі глини використовують як сорбент для очищення нафтопродуктів, олій для харчування, поглинання радіонуклідів, у виготовленні косметики та лікувальних препаратів. Запаси цього родовища оцінені в 4,8–9,6 млн т [87].

Світові запаси бентонітових глин перевищують 4 млрд т: Китай — 2400 млн т, США — 800, Туреччина — 400, Росія — 124 [33]. Провідними експортерами є США, Італія, Греція, Велика Британія; імпортерами — Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Канада, Японія. В табл. 7 представлені країни, які є лідерами у видобутку бентонітів.

Згідно зі статистичними даними, загальний видобуток бентонітових глин в Україні за 2013 р. складав 256,5 тис. т, проти 305,09 тис. т за 2012 р., що на 15,9% менше. Це пов'язано з невисокою конкурентоспроможністю нашої держави на світовому ринку бентонітів [36].

За результатами багатопрофільних випробувань бентоніт характеризується як універсальна мінеральна сировина, використання якої в якості біостимулятора і сорбента є високоефективним в багатьох галузях товарно-господарського виробництва і в екологічній сфері [71].

Таблиця 7. Видобуток бентоніту в світі в 2000–2004 рр., тис. т [33]

Країна	Рік				
	2000	2001	2002	2003	2004
Греція	950	950	950	950	950
Італія	500	500	500	500	500
Мексика	270	415	488	464	470
Німеччина	465	448	495	479	405
Польща	30	29	26	27	27
США	3760	3970	3970	3770	4060
СНД (без України)	750	750	750	750	750
Україна	300	300	300	300	300
Японія	415	406	438	426	430

В системі повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин, птиці та риби, особливе значення приділяється мінеральним речовинам, оскільки вони чинять комплексний позитивний вплив на організм. Науковими дослідженнями багатьох авторів встановлена висока господарська ефективність використання бентонітових глин. Вони характеризуються вмістом багатьох мінеральних елементів і цінними фізико-хімічними властивостями, що позитивно впливають на травні та інші функції тварин і птахів [76, 83, 88].

Бентоніти і цеоліти визнано агромінеральною сировиною ХХІ століття завдяки їх унікальним сорбційним, іонообмінним і каталітичним властивостям. За умови використання цих мінералів в сільськогосподарському секторі, забезпечується можливість підвищити якість продуктів тваринництва [88].

Дослідженнями встановлено, що бентоніт характеризується адсорбційними властивостями, високою обмінною структурою. Саме завдяки цьому бентоніти беруть участь у виведенні з організму радіонуклідів, сполук важких металів і газів [89].

Рекомендується застосовувати цей мінерал при вирощуванні озимої пшениці, що забезпечує вихід зерна в кінці сезону в кількості 20,3 ц/га [90].

При використанні бентоніту на очисних каналізаційних спорудах, в стоках знижується концентрація важких металів, амонійного азоту, прискорюється очищення в аеротенках [91].

Введення в кормовий раціон підсвінків бентоніту в кількості 1–2%, збільшує середньодобовий приріст живої маси тварини майже до 6% [92].

Встановлено, що заміщення мінералів, які містяться в складі раціону курчат, на бентоніт шляхом введення його до складу корму в кількості 4%, забезпечує їх фізіологічні потреби в мінеральних речовинах [93].

Включення бентонітових глин до раціону телиць сприяло кращому засвоєнню азоту та інших мінеральних речовин, що, в кінцевому результаті, значно підвищувало ефективність використання кормів при годівлі тварин [94].

Від кобил, що отримували бентоніт разом з кормом маса лошат, при народженні в дослідній групі зросла на 6% [95].

При згодовуванні бентоніту курям-несучкам підвищується інтенсивність яйценосності на 10%, а виуплення курчат — на 5%. В цей же час, собівартість виробництва інкубаційних яєць знижується на 7% [96].

ВИСНОВКИ

Аналіз доступних літературних джерел дозволяє стверджувати, що серед мінералів-сорбентів вулканічного походження, поклади яких є на території України, придатними для використання в тваринництві є: цеоліт, сапоніт і бентоніт. Поряд з іншими сферами господарської діяльності, дані мінерали широко використовуються в годівлі тварин, птиці та риби. Виявляючи адсорбуючі й іонообмінні властивості, дані мінеральні добавки природного походження позитивно впливають як на окремі фізіолого-біохімічні показники, так і на функціональний стан організму тварин в цілому.

Перспективи використання сапоніту, цеоліту та бентоніту в годівлі риби визначаються їх фізико-хімічними та біологічними властивостями, доступністю і низькою вартістю, що є актуальним при веденні рибогосподарської діяльності. Результати застосування їх в рибництві є фрагментарними, тому поглиблене вивчення їх впливу на організм різних порід і вікових груп риби є актуальним завданням.

ЛІТЕРАТУРА

1. Перспективи використання сапонітів в текстильній промисловості/Параска О. А. та ін.//Сучасні технології в легкій промисловості і сервісі: регіон. наук.-прак. конф., 22–23 вер. 2010р.: тези доп. Хмельницький, 2010. С. 7.
2. Структурно-сорбційні характеристики українського сапоніту/Марцин І. І. та ін.//Укр. хим. журн. 2001. Т. 67, № 2. С. 98—101.
3. Неорганические адсорбенты из техногенных отходов для очистки сточных вод промышленных предприятий/Гладун В. Д. и др.//Экология и промышленность России. 2007. № 5. С. 15—20.
4. Сивий М. І., Паранько Є. І. Географія мінеральних ресурсів України: монографія. Львів: Простір М, 2013. 684 с.
5. Мельник А. П., Стецюк З. О., Хижняк М. І. Результати дослідження води вирощувальних ставів за допомогою цеоліту//Рибогосподарська наука України. 2009. № 4. С. 28—32.
6. Mwale M. Ammonia removal from water by ion exchange using south African and Zambian zeolite samples. Rhodes University, 2000.
7. Durali Danabas, Tulay Altun. Effects of zeolite (Clinoptilolite) on some water and growth parameters of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum, 1792)//Digest journal of Nanomaterials and Biostructures. 2011. Vol. 6(3). P. 1111—1116.
8. Безкровна Н. І. Використання природних цеолітів для підвищення ефективності годівлі коропа за умов вирощування на теплих скидних водах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.10 «Іхтіологія». Київ, 1994. 25 с.
9. Бескровная Н. И. Применение природных цеолитов для повышения эффективности кормления карпа при выращивании на теплых сбросных водах

- ГРЭС: дис... кандидата биологических наук. Киев: Институт рыбного хозяйства, 1994. 150 с.
10. Бузмаков Г. Т. Эффективность использования цеолитов в индустриальном рыбоводстве//Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2012. № 4. С. 30—35.
 11. Желтов Ю. А. Организация кормления разновозрастного карпа в фермерских рыбных хозяйствах. Киев: ИНКОС, 2006. 282 с.
 12. Природные цеолиты в продукционных комбикормах для осетровых рыб/Баканева Ю. М. и др.//Вестник АГТУ. 2013. № 1. С. 162—166. (Серия: Рыбное хозяйство).
 13. Кузнецов А. А. Рыбоводно-биологическая эффективность применения природного цеолита-клиноптилолита в составе комбикормов для радужной форели и сибирского осетра: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук: 03.00.32. Москва, 2002. 26 с.
 14. Остроумова И. Н., Мосейчук К. Б. Роль цеолитов в торможении перекисного окисления липидов рыбной муки//Сб. науч. тр. ГосНИОРХ. 1997. Вып. 325. С. 31—39.
 15. Сравнительный анализ санитарно-гигиенической оценки рыбы, получавшей с кормом цеолиты разных месторождений/Дуварова А. С. и др.//Природные цеолиты России: республ. конф.: тезисы докл. Новосибирск, 1992. С. 36—37.
 16. Дмитренко Ю. А., Мальченко А. В., Шпилевая Н. И. Оценка сорбционных свойств сапонита по отношению к фторидам-ионам//Химия и технология воды. 2012. № 6. С. 460—468.
 17. Гирін В. М., Бойко І. І., Рудиченко В. Ф. Використання природного мінералу сапоніту для знезараження води//Лікарська справа. 1995. № 5—6. С. 177—179.
 18. Аналіз дослідження властивостей сапонітової глини/Рудь В. Д. та ін.//Технологический аудит и резервы производства. 2015. № 1(4). С. 54—57.
 19. Койшибаева С. К. Рекомендации по технологии выращивания осетровых рыб в условиях рыбоводных хозяйств Северного Казахстана. Алматы, 2011. 40 с.
 20. Kesraoui-ouki C. R., Cheeseman R. P. Natural zeolite utilisation in pollution control: a review of applications to metals effluents//Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 1994. № 59. P. 121—129.
 21. Цхакая Н. Ш., Квашали, Н. Ф. Японский опыт по использованию природных цеолитов. Тбилиси: Мецниереба, 1984. 129 с.
 22. Природные цеолиты/Цицишвили Г. В. и др. Москва: Химия, 1985. 246 с.
 23. Introduction to Zeolite Science and Practice. 2nd edn./ Jacobs P. A. et al. Amsterdam, 2001. 1078 p.
 24. Szostak R. Molecular Sieves – Principles of Synthesis and Identification. New York, 1989.
 25. Елисеева И. С. Становление и развитие производства синтетических цеолитов: дис. ... кандидата техн. наук: 02.00.13, 07.00.10. Уфа, 2003. 153 с.
 26. Ечевский Г. В. Новые цеолиты: все включено//Наука из первых рук. 2012. Т. 43, № 1. С. 40—42.
 27. Лонін О. Ю. Технологічні та біофармацевтичні дослідження мінералу цеоліту з метою використання в фармацевтичній практиці як сорбент: дис. ... кандидата фармац. наук: 15.00.01. Харків, 1996. 140 с.
 28. Заграй Я. М., Ребреньук А. В. Використання природних мінералів (цеоліт) як етапів комплексної технології корегування складу водних розбавлених розчинів до природно сформованої якості//Екологічні науки: наук.-практ. журнал. Київ. 2014. Вип. 6. С. 82—87.

29. Цеолиты. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Цеолиты> (дата обращения: 01.01.2017).
30. Zeolites in Sedimentary Rocks//United States Mineral Resources: Professional Paper, 1973. 820 p.
31. Арнаутков Н. В. Стандартные образцы химического состава природных минеральных веществ. Методические рекомендации. Новосибирск: Институт геологии и геофизики АН СССР, 1990. 143 с.
32. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» за спеціальністю 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»/уклад. Герасимчук Н. П. Житомир: Торговельно-економічний коледж КНТЕУ, 2013. 57 с.
33. Неметалічні корисні копалини України. Вид. 2-е, випр. і доп./Михайлов В. А. та ін. Київ: Київський університет, 2007. 503 с.
34. Байраков В. В. Особенности минерального состава клиноптилолитовых пород закарпатья//Природные цеолиты: IV болгаро-советский симпозиум: тезисы докл. Бургас, 1985. С. 23—24.
35. Краснов Е. Есть в Крыму минеральные удобрения. Симферополь: Крым, 1964. 68 с.
36. Мінеральні ресурси України/відп. за вип. Корпан Н. В. Київ: Державне Державний інформаційний геологічний фонд України, 2014. 270 с.
37. Брек Д. Цеолитовые молекулярные сита. Москва: Мир, 1976. 700 с.
38. Спринський М. І. Мінеральні ресурси цеолітів України//Праці 2-го західноукраїнського симпозіуму з адсорбції та хроматографії. Львів, 2000. С. 221—224.
39. McCusker L. B., Baerlocher C. Zeolite structures//Introduction to zeolite science and practice. Studies in Surface Sci. and Catalysis. 2001. Vol. 137. P. 37.
40. Новоселов Я. Б., Маянская Н. Н. Принципы воздействия на организм средств на основе природных минералов. Новосибирск: Экор, 2001. 85 с.
41. Чельшев Н. Ф. Ионнообменные свойства цеолитов. Москва: Наука, 1973. 202 с.
42. Кубасов А. А. Цеолиты — кипящие камни//Соросовский образовательный журнал. 1998. № 7. С. 70—76.
43. Герасев А. Д. Анализ механизма действия цеолита Шивиртуйского месторождения на водно-солевой обмен и функцию почек: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. биол. наук: 03.00.04, 03.00.13. Новосибирск, 2005. 18 с.
44. Ягольник С. Г., Троцький В. І., Ханік Я. М. Дослідження процесу хімічного модифікування клиноптилоліту за допомогою рентгенофазового аналізу//Науковий вісник Національного лісотехнічного університету. 2006. Вип. 16.1. С. 195—198.
45. Таран Н. Г. Адсорбенты и иониты в пищевой промышленности. Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1983. 248 с.
46. Закардонський В., Василенко В., Сташук П. Термодесорбція води й адсорбційні властивості закарпатських цеолітів//Вісник Львівського ун-ту. 2004. Вип. 44. С. 247—256. (Серія: Хімічна).
47. Природный цеолит «Сокирнит» ГК «Цеолитовые технологии». URL: <http://www.zeomix.ru/propertiesofnaturalzeolites.html> (дата обращения: 01.01.2017).

48. Ерёмин Н. И. Неметаллические полезные ископаемые//Двухсотпятидесятилетие Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова посвящается. Москва: МГУ, 2004. URL: http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1172887&uri=glava_10 (дата звернення: 01.01.2017).
49. Гороховский Л. М. О некоторых вопросах использования и изучения нефелинового сырья//Нефелиновое сырье. Москва, 1978. С. 180—183.
50. Нетрадиционные виды нерудного минерального сырья / сост. У. Г. Дистанов, Н. Н. Ведерников, А. С. Филько. М.: Недра, 1990. 261 с.
51. Средство с иммуностимулирующим действием: пат. 2093162 РФ. № 95112442/14 ; заявл. 19.07.1995 ; опубл. 20.10.1997.
52. Панин Л. Е., Мирсаяфов Д. С. Влияние цеолитов в распределении в тканях крыс ^{125}J при приеме его PER OS// Природные цеолиты в народном хозяйстве: Всесоюзн. совещание: тезисы. Новосибирск, 1990. С. 45—76.
53. Новоселов Я. Б., Маянская Н. Н. Принципы воздействия на организм средств на основе природных минералов. Новосибирск: Экор, 2001. 85 с.
54. Герасев А. Д. Анализ механизма действия цеолита Шивиртуйского месторождения на водно-солевой обмен и функцию почек: автореф. дис. на уч. степени докт. биол. наук: 03.00.04, 03.00.13. Новосибирск, 2005. 18 с.
55. Литовит/Веретенина О. А. и др. Новосибирск: Сибирский федеральный центр оздоровительного питания, 2006. 112 с.
56. Применение природных цеолитов в животноводстве и растениеводстве. Тбилиси: Мигниереба, 1984. С. 28—30.
57. Регламентация використання цеоліту Сокириницького родовища за вирощування перепелів/Харчишин В. М. та ін.// Зб.наук. пр. Білоцерківського націон. аграрного ун-ту. 2014. № 1 (110). С. 19—23. (Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва).
58. Поляков А. Д., Бузмаков Г. Т., Рассолов С. Н. Использование цеолитового туфа в качестве добавки в рацион сеголетков карпов//Современные наукоемкие технологии. 2009. № 2. С. 35—37.
59. Mupton F. A., Fishman P. H. The application of natural zeolites in animal science and aquaculture//American society of animal science. 1977. Vol. 45, № 5. P. 1188—1203.
60. Kondo N., Wagai B. Yoton koc. May, 1964. P. 1—4.
61. Карболин П. В. Использование в рационах цыплят-бройлеров глауконита и цеолита. Троицк, 2008. 137 с.
62. Willie L. W., Carey L. Evaluation of Zeolites Fed to Male Broiler Chickens//Poultry science. 1982. Vol. 61/ 3. P. 438—442.
63. Вплив цеолітових мінеральних добавок на продуктивність молодняку м'ясної худоби// Нові технології виробництва та переробки продукції тваринництва: Державна студ. наук. конф.: тези доп. Біла церква, 2012. 61 с.
64. Використання сумішки цеолітового та доломітового борошна в годівлі телят /Грабовський М. І. та ін.//Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013. Вип. 55(II). С. 132.
65. Курляк І. М. Використання цеолітів у годівлі дійних корів//Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. 2011. Т. 13, № 4(50). С. 12—16.
66. Рудь В. Д., Гулієва Н. М. Використання порошкових композиційних матеріалів на основі природних мінералів для водопідготовки питної води//

- Вода в харчовій промисловості: IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів та студентів: тези доп. Одеса, 2013. С. 53—54.
67. Ганзюк А. Я., Яфінович Ю. О. Дослідження адсорбційних властивостей сапоніту, модифікованого катіонами багатовалентних металів//Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 1. С. 230—235.
68. Грицьук В. Е. Новая бентонитовая (сапонитовая) провинция Украины и перспективы ее освоения//Месторождения природных адсорбентов и перспективы их использования в народном хозяйстве УССР: Респ. науч.-техн. совещание: сб. тр. Киев, 1978. С. 38—41.
69. Цеоліт-сметкитові туфи Рівненщини: біологічні аспекти використання/ред. Богданов Г. О. та ін. Рівне: Волинські обереги, 2005. 184 с.
70. Застосування сапоніту як магнієвого добрива. URL: <http://www.saponite.ua/articles/215/> (дата звернення: 01.01.2017).
71. Гурський Д. С., Білошапський М. В. Сапоніт — камінь родючості//Мін. ресурси України. 1994. № 1. С. 31—32.
72. Post J. L. Saponite from near Ballarat, California //Clays and Clay Minerals. 1984. Vol. 32, № 2. P. 147—153.
73. Ганзюк А. Я., Кулаков О. І. Дослідження сорбційних процесів на природному і кислотно активованому сапоніті//Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 2. С. 85—90.
74. Годовиков А. А. Минералогия. Москва: Недра, 1983. 647 с.
75. Гулієва Н. М. Хімічний аналіз та фізичні властивості природного мінералу — сапоніту// Наукові нотатки. 2014. № 44. С. 78—82.
76. Мазур М. А., Ткаченко М. А., Бойко Я. І. Застосування сапоніту як магнієвмісного добрива: зб. наук. пр. Київ: ВД ЕКМО, 2007. Вип. 3—4. С. 3—10.
77. Горюк В. В. Використання сапоніту в системі заходів з профілактики неплідності худоби на Поділлі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.07 «Ветеринарне акушерство». Київ, 2004. 23 с.
78. Хіміч О. В. Ефективність використання сапоніту, селену та комплексних мінеральних добавок на їх основі в раціонах молочних корів і бичків на відгодівлі: дис. ... кандидата с.-г. наук: 06.02.02. Вінниця, 2005. 149 с.
79. Мерзлов С. В. Корекція параметрів біотехнології вермикультивування та регламентація використання біомаси черв'яків і сапоніту у виробництві м'яса курчат-бройлерів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 03.00.20. Біла Церква, 2004. 20 с.
80. Гончар О. Ф., Гавриш О. М. Репродуктивна здатність норок: монографія. Черкаси: Чорнобаївське комунальне поліграфічне підприємство, 2010. 267 с.
81. Янов В. П. Сапонитовые глины. Фонд «Новотех». URL: http://www.novotech.kiev.ua/?page_id=65 (дата звернення: 01.01.2017).
82. Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Глинистые породы/МПР РФ. Москва, 2007. 48 с.
83. Наседкин В. В., Кваша Ф. С., Стаханов В. В. Бентонит в промышленности России. Москва: ГЕОС, 2001. 136 с.
84. Органоглины. Производство и основные направления использования/Наседкин В. В. и др.//Актуальные инновационные исследования: наука и практика. 2012. № 3.

85. Нікіпелова О. М. Результати фізико-хімічних досліджень бентоніту Дашуковського родовища//Вісник Одеського національного університету. 2014. Т. 19, вип. 3. С. 70—75. (Хімія).
86. Кирсанов Н. В., Сабитов А. А. Генетическая и промышленная классификация месторождений бентонитов СССР//Бентониты. Москва: Недра, 1980. С. 17—24.
87. Металічні і неметалічні корисні копалини України. Том II. Неметалічні корисні копалини//Гурський Д. С. та ін. Київ-Львів: Центр Європи, 2005.
88. Использование бентонита в животноводстве и птицеводстве/Булатов А. П. и др. Курган, 2005. С. 206.
89. Аракелян Ф. Р. Биологические основы применения бентонита в животноводстве: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. биол. наук. Ереван: ЕрЗВИ, 1991. С. 47.
90. Цыкалов А. Н. Влияние бентонитов на продуктивность сельскохозяйственных культур в степной зоне Воронежской области//Мировой опыт и перспективы развития сельского хозяйства: Междунар. конф., посвят. 95-летию ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени К. Д. Глинки», 23-24 окт. 2008 г.: матер. Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2008. С. 260.
91. Аблаева Л. А. Использование бентонитовых глин Кудринское месторождения для охраны окружающей среды: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. геол. наук. Киев, 2002. 18 с.
92. Хуцишвили И. И. Некоторые данные по использованию бентонитовой глины аскангеля при мясном откорме свиней и кормлении поросят-отъемышей//Интенсивное выращивание поросят: сб. Москва: Колос, 1983. С. 137—140.
93. Азимов Д. Использование биодобавок при выращивании молодняка кур//Птицеводство. 2010. № 10. С. 63—64.
94. Яковлев А. Г. Бентонит в кормлении крупного рогатого скота//Аграрный вестник Урала. 2008. № 4 (46). С. 38—39.
95. Кармацких Ю. А. Использование бентонита в кормлении лошадей// Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2007. № 1 (13). С. 134—137.
96. Аракелян Ф. Р. Биологические основы применения бентонита в животноводстве: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. биол. наук. Ереван: ЕрЗВИ, 1991. С. 47.

REFERENCES

1. Paraska, O. A., Rak, O. I., & Stopchak, V. O. (2010). Perspektyvy vykorystannia saponitiv v tekstylnii promyslovosti. *Suchasni tekhnolohii v lehkii promyslovosti i servisi: rehionalna nauk.-prak. konf.*, 22–23 ver. 2010 r. Khmelnytskyi, 7.
2. Martsyn, I. I., Mank, M. I., Lebovka, M. V., & Vyhornytskyi, M. V. (2001). Strukturno-sorbtsiini kharakterystyky ukrainskoho saponitu. *Ukr. khym. zhurn.*, 67, 2, 98–101.
3. Gladun, V. D., Andreeva, H. H., Akat'eva, L. V., & Dragina, O. G. (2007). Neorganicheskie adsorbenty iz tekhnogennykh otkhodov dlya ochistki stochnykh vod promyshlennykh predpriyatiy. *Ekologiya i promyshlennost' Rossii*, 5, 15–20.
4. Syvyi, M., Paranko, I., & Ivanov, I. (2013). *Heohrafiia mineralnykh resursiv Ukrainy: monohrafiia*. Lviv: Prostir M.

5. Melnyk, A. P., Stetsiuk, Z. O., & Khyzhniak, M. I. (2009). Rezultaty doslidu z ochyshchennia vody vyroshchuvalnykh staviv za dopomohoiu tseolitu. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 28-32.
6. Mwale, M. (2000). *Ammonia removal from water by ion exchange using south African and Zambian zeolite samples*. Rhodes University.
7. Durali, D., & Tulay, A. (2011). Effects of zeolite (Clinoptilolite) on some water and growth parameters of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum, 1792). *Digest journal of nanomaterials and biostructures*, 6(3), 1111-1116.
8. Bezкровна, N. I. (1994). Vykorystannia pryrodnykh tseolitiv dlia pidvyshchennia efektyvnosti hodivli koropa za umov vyroshchuvannia na teplykh skydnykh vodakh. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv.
9. Bezкровна, N. I. (1994). Vykorystannia pryrodnykh tseolitiv dlia pidvyshchennia efektyvnosti hodivli koropa (*Cyprinus carpio* L.) za umov vyroshchuvannia na teplykh skydnykh vodakh DRES. *Candidate's thesis*. Kyiv.
10. Buzmakov, G. T. (2012). Effektivnost' ispol'zovaniya tseolitov v industrial'nom rybovodstve. *Rybovodstvo i rybnoe khozyaystvo*, 4, 30-35.
11. Zheltov, Yu. A. (2006). *Organizatsiya kormleniya raznovozrastnogo karpa v fermers'kikh rybnykh khozyaystvakh*. Kiev: INKOS.
12. Bakaneva, Yu. M., Bychkova, A. P., Bakanev, N. M., & Fedorovykh, Yu. V. (2013). Prirodnye tseolity v produktsionnykh kombikormakh dlya osetrovyykh ryb. *Vesnik AGTU*, 1, 162-166.
13. Kuznetsov, A. A. (2002). Rybovodno-biologicheskaya effektivnost' primeneniya prirodnogo tseolita-klinoptilolita v sostave kombikormov dlya raduzhnoy foreli i sibirskogo osetra. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moskva.
14. Ostroumova, I. N., & Moseychuk, K. B. (1997). Rol' tseolitov v tormozhenii perekisnogo okisleni lipidov rybnoy muki. *Sb. nauch. tr. GosNIORKh*, 325, 31-39.
15. Duvarova, A. S., Ambartsumyan, L. I., & Van'yants, A. B. (1991). Sravnitel'nyy analiz sanitarno-gigienicheskoy otsenki ryby, poluchavshey s kormom tseolity raznykh mestorozhdeniy. *Prirodnye tseolity Rossii: Respubl. Soveshchaniye*, 25-27 noyabrya 1991 g.: tezisy dokladov. Novosibirsk, 36-37.
16. Dmitrenko, Yu. A., Mal'chenko, A. V., & Shpilevaya, N. I. (2012). Otsenka sorbtionnykh svoystv saponita po otnosheniyu k floridam-ionam. *Khimiya i tekhnologiya vody*, 6.
17. Hirin, V. M., Boyko, I. I., & Rudichenko, V. F. (1995). Vykorystannia pryrodnoho mineralu saponitu dlya znezarazhennia vody. *Likars'ka sprava*, 5-6, 177-179.
18. Rud', V. D., Samchuk, L. M., Sav'yuk, I. V., & Povstyan, Yu. S. (2015). Analiz doslidzhennia vlastivostey saponitovoyi hlyny. *Tekhnolohichnyy audyt ta rezervy vyrobnytstva*, 1(4), 54-57.
19. Koysibaeva, S. K. (2011). *Rekomendatsii po tekhnologii vyrashchivaniya osetrovyykh ryb v usloviyakh rybovodnykh khozyaystv Severnogo Kazakhstana*. Almaty.
20. Kesraoui-ouki, C., Cheeseman, R., Perry, R. (1994). Natural zeolite utilisation in pollution control: a review of applications to metals effluents. *Journal of Chemical Technology and Biotechnology*, 59, 121-129.
21. Tskhakaya, N. Sh., & Kvashali, N. F. (1984). *Yaponskiy opyt po ispol'zovaniyu prirodnnykh tseolitov*. Tbilisi: Metsniereba.
22. Tsitsishvili, G. V., Andronikashvili, T. G., Kirov, G. N., & Khimozova, L. D. (1985). *Prirodnye tseolity*. Moskva: Khimiya.

23. Jacobs, P. A., Flanigen, E. M., Jansen, J. C. & Bekkum, H. V. (2001). *Introduction to Zeolite Science and Practice*. 2nd edn. Amsterdam.
24. Szostak, R. (1989). *Molecular Sieves – Principles of Synthesis and Identification*. 1st edn. New York.
25. Eliseeva, I. S. (2003). Stanovlenie i razvitie proizvodstva sinteticheskikh tseolitov. *Candidate's thesis*. Ufa.
26. Echevskiy, G. V. (2012). Novye tseolity: vse vklyucheno. *Nauka iz pervykh ruk*, 43, 1, 40-42.
27. Lonin, O. Yu. (1996). Tekhnologichni ta biofarmatsevychni doslidzhennia mineralu tseolitu z metoiu vykorystannia v farmatsevychnii praktytsi yak sorbent. *Candidate's thesis*. Kharkiv.
28. Zahrai, Ia. M., & Rebreuiuk, A. V. (2014). Vykorystannia pryrodnykh mineraliv (tseolit) yak etapiv kompleksnoi tekhnologii korehuvannia skladu vodnykh rozbavlenykh rozchyniv do pryrodno sformovanoi yakosti. *Ekologichni nauky*, 6, 82-87.
29. Tseolity. *ru.wikipedia.org*. Retrieved from <https://ru.wikipedia.org/wiki/Tseolity>.
30. Zeolites in Sedimentary Rocks. (1973). *United States Mineral Resources, Professional Paper*.
31. Arnautov, N. V. (1990). *Standartnye obraztsy khimicheskogo sostava prirodnykh mineral'nykh veshchestv*. Metodicheskie rekomendatsii. Novosibirsk: Institut geologii i geofiziki AN SSSR.
32. Herasymchuk, N. P. (2013). *Metodychni rekomendatsii do samostiinoi roboty z dystsypliny «Fizychna ta koloidna khimii» za spetsialnistiu 5.05170101 "Vyrobnystvo kharchovoi produktsii*. Zhytomyrskyi torhovelno-ekonomichnyi koledzh KNTEU.
33. Mykhailov, V. A., Vynohradov, H. F., & Kurylo, M. V. et al. (2007). *Nemetalichni korysni kopalyny Ukrainy*. Kyiv: VTs Kyivskyi universytet.
34. Bayrakov, V. V. (1985). Osobennosti mineral'nogo sostava klinoptilolitovykh porod zakarpat'ya. *Prirodnye tseolity: IV Bolgaro-sovetskiy simpozium*. Burgas, 23-24.
35. Krasnov, E. (1964). *Est' v Krymu mineral'nye udobreniya*. Simferopol': Krym.
36. Korpan, N. V. (2014). *Mineralni resursy Ukrainy*. Kyiv.
37. Brek, D. (1976). *Tseolitovye molekulyarnye sita*. Moskva: Mir.
38. Sprynskyi, M. I. (2000). Mineralni resursy tseolitiv Ukrainy. *Pratsi 2-ho zakhidnoukrainskoho sympoziumu z adsorbtsii ta khromatohrafi*. Lviv, 221-224.
39. McCusker, L. B., & Baerlocher, C. (2001). Zeolite structures. *Introduction to zeolite science and practice. Studies in Surface Sci. and Catalysis*, 137, 37.
40. Novoselov, Ya. B., & Mayanskaya, H. H. (2001). *Printsipy vozdeystviya na organizm sredstv na osnove prirodnykh mineralov*. Novosibirsk: Ekor.
41. Chelyshev, N. F. (1973). *Ionoobmennye svoystva tseolitov*. Moskva: Nauka.
42. Kubasov, A. A. (1998). Tseolity – kipyashchie kamni. *Sorosovskiy obrazovatel'nyy zhurnal*, 7, 70-76.
43. Gerashev, A. D. (2005). Analiz mekhanizma deystviya tseolita Shivyrtuyskogo mestorozhdeniya na vodno-solevoy obmen i funktsiyu pochk. *Extended abstract of doctor's thesis*. Novosibirsk.
44. Iaholnyk, S. H., Trotskyi, V. I., & Khanyk, Ia. M. (2006). Doslidzhennia protsesu khimichnogo modyfikuvannia klynoptylolitu za dopomohoiu renhenofazovoho analizu. *Naukovyi visnyk*, 16.1, 195-198.

45. Taran, N. G. (1983). *Adsorbenty i ionity v pishchevoy promyshlenosti*. Moskva: Legkaya i pishchevaya prom-st'.
46. Zakordonskyi, V., Vasylenko, V., & Stashchuk, P. (2004). Termodesorbtsiia vody i adsorbtsiini vlastyvoli zakarpatskykh tseolitiv. *Visnyk Lviv un-tu*, 44, 247-256.
47. Prirodnyy tseolit «Sokimit»GK «Tseolitovye tekhnologii». www.zeomix.ru. Retrieved from <http://www.zeomix.ru/propertiesofnaturalzeolites.html>.
48. Eremin, N. I. (2004). Nemetallicheskie poleznye iskopaemye. *geo.web.ru*. Dvukhsotpyatidesyatiletuyu Moskovskogo Gosudarstvennogo Universiteta im. M.V. Lomonosova posvyashchaetsya. MGU. Moskva. Retrieved from http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1172887&uri=glava_10.
49. Gorokhovskiy, L. M. (1978). O nekotorykh voprosakh ispol'zovaniya i izucheniya nefelinovogo syr'ya. *Nefelinovoe syr'e*, 180-183.
50. Distanov, U. G., & Fal'ko, A. S. (1990). *Netraditsionnye vidy nerudnogo mineral'nogo syr'ya*. Moskva: Nedra.
51. Panin, L. E. (1997). Sredstvo s imunostimuliruyushchim deystviem. Patent of RF. № 2093162.
52. Panin, L. E., & Mirsayafov, D. S. (1990). Vliyanie tseolitov v raspredelenii vtkanykh kryz ¹²⁵J pri prieme ego PER OS. *Prirodnye tseolity v narodnom khozyaystve: Vsesoyuzn. soveshch.* Novosibirsk.
53. Novoselov, Ya. B., & Mayanskaya, H. H. (2001). *Printsipy vozdeystviya na organizm sredstv na osnove prirodnnykh mineralov*. Novosibirsk: Ekor.
54. Gerasev, A. D. (2005). Analiz mekhanizma deystviya tseolita Shivyrtuyskogo mestorozhdeniya na vodno-solevoy obmen i funktsiyu pochk. *Extended abstract of doctor's thesis*. Novosibirsk.
55. Veretenina, O. A., Kostina, N. V., Novoselova, T. I., Novoselov, Ya. B., & Roninson, A. G. (2006). *Litovit*. Novosibirsk.
56. *Primenenie prirodnnykh tseolitov v zhivotnovodstve i rastenievodstve*. (1984). Tbilisi. Migniereba. 28-30.
57. Kharchyshyn, V. M., Melnychenko, O. M., Vered, P. I., & Zlochevskiy, M. V. (2014). Rehlamentatsiia vykorystannia tseolitu sokyrnytskoho rodovyscha za vyroshchuvannya perepeliv. *Zb. nauk. pr. Bilotserkivskoho Natsion. ahrarnoho un-tu. Tekhnolohiia vyrobnytsva i pererobky produktii tvarynnytsva*, 1 (110), 19-23.
58. Polyakov, A. D., Buzmakov, G. T., & Rassolov, S. N. (2009). Ispol'zovanie tseolitovogo tufa v kachestve dobavki v ratsion segoletkov karpov. *Sovremennye naukoemkie tekhnologii*, 2.
59. Mupton, F. A., & Fishman, P. H. (1977). The application of natural zeolites in animal science and aquaculture. *American society of animal science*, 45, 5, 1188-1203.
60. Kondo, N., & Wagai, B. (1964). *Yoton koc. May*, 1-4.
61. Karbolin, P. V. (2008). *Ispol'zovanie v ratsionakh tsiplyat-broylerov glaukonita i tseolita*. Troitsk.
62. Willie, L., & Willis, C. L. et al. (1982). Evaluation of Zeolites Fed to Male Broiler Chickens. *Poultry science*, 61/ 3, 438-442.
63. Vplyv tseolitovykh mineralnykh dobavok na produktyvnist molodniaku m'iasnoi khudoby. (2012). *Novi tekhnolohii vyrobnytsva ta pererobky produktii tvarynnytsva: derzh. stud. nauk. konf.* Bila Tserkva.
64. Hrabovskiy, M. I., Ahii, V. M., Shylkin, O. P., & Filep, R. H. (2013). Vykorystannia sumishky tseolitovoho ta dolomitovoho boroshna v hodivli teliat. *Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytsvo*, 55(II), 132.

65. Kurliak, I. M. (2011). Vykorystannia tseolitiv u hodivli diinykh koriv. *Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Hzhyskoho*, 13, № 4(50), 12-16.
66. Rud, V. D., & Huliieva, N. M. (2013). Vykorystannia poroshkovykh kompozytsiinykh materialiv na osnovi pryrodnykh mineraliv dlia vodopidhotovky pytnoi vody. *Voda v kharchovii promyslovosti: IV Vseukrainska nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh, aspirantiv ta studentiv: zbirnyk tez dop.* Odesa, 53-54.
67. Hanzhiuk, A. Ia., & Yafynovych, Iu. O. (2010). Doslidzhennia adsorbtsiinykh vlastyvostei saponitu, modyfikovanoho kationamy bahativalentnykh metaliv. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu*, 1, 230-235.
68. Gritsyk, V. E. (1978). Novaya bentonitovaya (saponitovaya) provintsia Ukrainy i perspektivy ee osvoeniya. *Mestorozhdeniya prirodnykh adsorbentov i perspektivy ikh ispol'zovaniya v narodnom khozyaystve USSR: Resp. nauchn.-tekhn. Soveshchaniye: sb. tr.* Kiev, 38-41.
69. Bohdanov, H. O. et al. (Eds.). (2005). *Tseolit-smektynovi tufy Rivnenshchyny: biolohichni aspekty vykorystannia*. Rivne: Volynski oberehy.
70. Zastosuvannia saponitu yak mahniievroho dobryva. *www.saponite.ua*. Retrieved from <http://www.saponite.ua/articles/215>.
71. Hurskyi, D. S., & Biloshapskyi, M. V. (1994). Saponit – kamin rodiuchosti. *Min. resursy Ukrainy*, 1, 31-32.
72. Post, J. L. (1984). Saponite from near Ballarat, California. *Clays and Clay Minerals*, 32, 2, 147-153.
73. Hanzhiuk, A. Ia., & Kulakov, O. I. (2009). Doslidzhennia sorbtsiinykh protsesiv na pryrodnomu i kyslotno aktyvovanomu saponiti. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu*, 2, 85-90.
74. Godovikov, A. A. (1983). *Mineralogiya*. Moskva: Nedra.
75. Huliieva, N. M. (2014). Khimichniy analiz ta fizychni vlastyvosti pryrodnoho mineralu — saponitu. *Naukovi notatky*, 44, 78-82.
76. Mazur, M. A., Tkachenko, M. A., & Boiko, Ia. I. (2007). *Zastosuvannia saponitu yak mahniievmsinoho dobryva: zb. nauk. pr.* Kyiv: VD EKMO, 3-4, 3-10.
77. Horiuk, V. V. (2004). Vykorystannia saponitu v systemi zakhodiv z profilaktyky neplidnosti khudoby na Podilli. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv.
78. Khimich, O. V. (2005). Efektyvnist vykorystannia saponitu, selenu ta kompleksnykh mineralnykh dobavok na yikh osnovi v ratsionakh molochnykh koriv i bychkiv na vidhodivli. *Candidate's thesis*. Vinnytsia.
79. Merzlov, S. V. (2004). Korektsiia parametriv biotekhnolohii vermykultyvuvannia ta rehlamentatsiia vykorystannia biomasy cherv'iakiv i saponitu u vyrobnytstvi m'iasa kurchat-broileriv. *Extended abstract of candidate's thesis*. Bila Tserkva.
80. Honchar, O. F., & Havrysh, O. M. (2010). *Reproduktyvna zdatsnist norok: monohrafiia*. Cherkasy: Chornobaivske komunalne polihrafichne pidpriemstvo.
81. Yanov, V. P. Saponitoye gliny. Fond «Novotech». *www.novotech.kiev.ua*. Retrieved from http://www.novotech.kiev.ua/?page_id=65.
82. *Metodicheskie rekomendatsii po primeneniyu Klassifikatsii zasposv mestorozhdeniy i prognoznykh resursov tverdyykh poleznykh iskopaemykh. Glinistyie porody.* (2007). Moskva: MPR RF.
83. Nasedkin, V. V., Kvasha, F. S., & Stakhanov, V. V. (2001). *Bentonit v promyshlennosti Rossii*. Moskva: GEOS.
84. Nasedkin, V. V., Demidenok, K. V., Boeva, N. M., Belousov, P. E., Vasil'ev, A. L. (2012). Organogliny. Proizvodstvo i osnovnye napravleniya ispol'zovaniya. *Aktual'nye innovatsionnye issledovaniya: nauka i praktika*, 3.

85. Nikipelova, O. M. (2014). Rezultaty fizyko-khimichnykh doslidzhen bentonitu Dashukovskoho rodovyshcha. *Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Khimiia*, 19, 3, 70-75.
86. Kirsanov, N. V., & Sabitov, A. A. (1980). Geneticheskaya i promyshlennaya klassifikatsiya mestorozhdeniy bentonitov SSSR. *Bentonity*. Moskva: Nedra, 17-24.
87. Hurskyi, D. S., Yesypchuk, K. Iu., & Kalinin, V. I. et al. (2005). *Metalichni i nemetalichni korysni kopalyny Ukrainy. Vol. II. Nemetalichni korysni kopalyny*. Kyiv-Lviv: Tsent Evropy.
88. Bulatov, A. P., Mikolaychik, I. N., & Sukhanova, S. F. et al. (2005). *Ispol'zovanie bentonita v zhivotnovodstve i ptitsevodstve*. Kurgan.
89. Arakelyan, F. R. (1991). Biologicheskie osnovy primeneniya bentonita v zhivotnovodstve. *Extended abstract of doctor's thesis*. Erevan.
90. Tsykalov, A. N. (2008). Vliyanie bentonitov na produktivnost' sel'skokhozyaystvennykh kul'tur v stepnoy zone Voronezhskoy oblasti. *Mirovoy opyt i perspektivy razvitiya sel'skogo khozyaystva*: Mezhdunar. konf., posvyashchennaya 95-letiyu FGOU VPO Voronezhskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet imeni K.D. Glinki, 23-24 okt. 2008 g.: materialy. Voronezh: FGOU VPO VGau.
91. Ablaeva, L. A. (2002). Ispol'zovanie bentonitovykh glin Kudrinskoe mestorozhdeniya dlya okhrany okruzhayushchey sredy. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kiev.
92. Khutsishvili, I. I. (1983). Nekotorye dannye po ispol'zovaniyu bentonitovoy gliny askangelya pri myasnom otkorme sviney i kormlenii porosyat-ot"emyshy. *Intensivnoe vyrashchivanie porosyat: sb.* Moskva: Kolos, 137-140.
93. Azimov, D. (2010). Ispol'zovanie biodobavok pri vyrashchivanii molodnyaka kur. *Ptitsevodstvo*, 10, 63-64.
94. Yakovlev, A. G. (2008). Bentonit v kormlenii krupnogo rogatogo skota. *Agrarnyy vestnik Urala*, 4 (46), 38-39.
95. Karamatskikh, Yu. A. (2005). Ispol'zovanie bentonita v kormlenii loshadey. *Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*, 1(13), 134-136.
96. Arakelyan, F. R. (1991). Biologicheskie osnovy primeneniya bentonita v zhivotnovodstve. *Extended abstract of doctor's thesis*. Erevan.

**ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РЫБОВОДСТВЕ МИНЕРАЛОВ
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ (ОБЗОР)**

О. А. Батуревич, shtefan_91@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Охарактеризовать основные физико-химические и биологические свойства некоторых минералов вулканического происхождения, в частности: цеолита, сапонита и бентонита которые находятся на территории Украины. Рассмотреть и осуществить сравнительную оценку их химического состава и биологических свойств. Обобщить литературные данные об эффективности их применения в кормлении животных, птицы и рыбы в качестве кормовой добавки.

Результаты. Среди минералов вулканического происхождения, которые находятся на

территории Украины, рассмотрены группы цеолитов, сапонитов и бентонитов. Химический состав, а соответственно и свойства данных минералов, имеют существенные различия. Обзор научных работ свидетельствует об их широком использовании в промышленности, медицине и животноводстве. Цеолитовая составляющая представлена клиноптилолитом, что является пригодным для кормления животных благодаря структуре кристаллической решетки. Его структура и химический состав обуславливают сорбирующие и ионообменные свойства. Установлено положительное влияние цеолита, сапонита и бентонита на организм животных. В рыбоводстве цеолит применяется с целью повышения рыбопродуктивности и очистки рыбохозяйственных водоемов. Определены перспективы исследования эффективности использования минералов вулканического происхождения в кормлении рыб в преднерестовый период.

Практическая значимость. Анализ и обобщение результатов научных исследований, проведенных в различных отраслях животноводства позволит определить перспективы и способы использования минералов вулканического происхождения (цеолита сапонита и бентонита) в рыбоводстве.

Ключевые слова: минералы вулканического происхождения, цеолит, сапонит, бентонит, кормовая добавка, кормление рыб, сорбция, ионообмен.

PROSPECTS OF THE APPLICATION OF MINERALS OF NATURAL ORIGIN IN FISH CULTURE DUE TO THEIR PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES AND EFFICIENCY IN ANIMAL BREEDING (A REVIEW)

O. Baturevich, shtefan_91@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To describe the basic physical-chemical and biological properties of certain minerals of volcanic origin, which are deposited in Ukraine. To examine and make a comparative assessment of their chemical composition and biological properties including zeolite, bentonite and saponite. To summarize performance data on the effectiveness of their use in animal, poultry and fish feed as a feed additive.

Findings. Groups of zeolites, saponins and bentonites among the minerals of volcanic origin, which are deposited on Ukrainian territory, have been examined. The chemical composition, and hence the properties of these minerals have significant differences. The scientific review of papers shows their wide application in industry, medicine and animal breeding. Zeolite component is presented by clinoptilolite which is suitable for animal feed because of the structure of the crystal lattice. Its structure and chemical composition is determined by sorbing and ion exchange properties. There is a positive effect of zeolite, bentonite and saponite on animals. Zeolites are used in pisciculture in order to increase fish productivity of fisheries and clean fishing reservoir water. The perspective of research efficiency of volcanic origin minerals in fish feeding before the sawning period was determined

Practical value. Analysis and synthesis of scientific studies in various fields of animal breeding will help to determine the prospects and ways of the application of the minerals of volcanic origin (bentonite, zeolite and saponite) in pisciculture.

Keywords: minerals of volcanic origin, zeolite, saponite, bentonite, feed additive, fish feeding, sorption, ion exchange.

ХРОНІКА

ВЧЕНИЙ ІХТІОЛОГ-РИБОВОД. ДО 90-Ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ХАРИТОНОВОЇ НАТАЛІЇ МИКОЛАЇВНИ

Харитонова Н. М. народилася 27 червня 1927 року в с. Конишине Суханічеського району Калузької області.

У 1948 році Наталія Миколаївна вступила до Московського технічного Інституту рибної промисловості та господарства на іхтіологічний факультет, який закінчила в 1953 році, здобувши спеціальність іхтіолога-рибовода.

Після закінчення інституту вона була направлена на роботу до Білоцерківської державної рибницької породовипробувальної станції на посаду інженера-рибовода. В березні 1954 року Наталія Миколаївна була переведена до Українського науково-дослідного інституту рибного господарства (нині ІРГ НААН) на посаду молодшого наукового співробітника, а у квітні 1957 року — в рибгосп «Нивка» УНДІРГ на посаду рибовода.

У 1959 році Харитонова Н. М. вступила до аспірантури УНДІРГ за спеціальністю «ставове рибництво», яку закінчила в 1962 році. У 1963 році вона успішно захистила кандидатську дисертацію за темою: «Живлення, ріст і розвиток сріблястого карася в короповому ставовому господарстві УРСР», з присудженням наукового ступеня кандидата біологічних наук, а в 1969 році їй присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «іхтіологія».

З грудня 1962 по червень 1977 року Наталія Миколаївна працювала в Інституті рибного господарства — спочатку на посаді старшого наукового співробітника, а потім — завідувачки лабораторії.

З червня 1977 по липень 1988 року - вона працювала в Інституті гідробіології АН УССР, обіймаючи посади старшого, провідного наукового співробітника та консультанта відділу іхтіології.

У 1985 році Харитонова Н. М. захистила докторську дисертацію за темою: «Біологічні основи інтенсифікації ставового рибництва», та здобула науковий ступінь доктора біологічних наук зі спеціальності «іхтіологія», а в 1996 році їй було присвоєне вчене звання професора зі спеціальності «іхтіологія та рибництво».

У 1989 році Наталія Миколаївна повернулася до Інституту рибного господарства, в якому пропрацювала до 1997 року, обіймаючи посади провідного наукового співробітника лабораторії промислового рибництва, завідувачки відділу удосконалення технологій вирощування риби, завідувачки лабораторії аквакультури.

Наталія Миколаївна довгий час була головою спеціалізованої вченої ради ІРГ УААН із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей «іхтіології та рибництво», експертом комісії ДКНТ України, заступником голови науково-методичної комісії Міністерства освіти України за напрямом «Водні біоресурси», головою проблемно-методичної ради УкрНДІРГ.

Загалом Харитонова Н. М. в Інституті рибного господарства пропрацювала понад 30 років. За період її роботи в Інституті нею безпосередньо та за її керівництва розроблялись фундаментальні та прикладні напрями досліджень, в результаті чого було напрацьовано ряд важливих нормативно-технологічних документів, які успішно використовуються в рибогосподарській галузі. Зокрема, за її керівництва та участі удосконалювався метод комплексної інтенсифікації в рибництві, який дав можливість отримувати в ставових рибних господарствах від 2,0 до 4,5 т/га товарної риби і більше. Поряд з цим, нею відпрацьовувались ресурсозаощаджувальні технології вирощування рибопосадкового матеріалу та товарної риби на основі екосистемного підходу за рахунок раціонального використання екосистеми водойм оптимальною полікультурою риб. Використання цих технологій в галузі дає можливість одержувати без годівлі до 1,5 т/га товарної риби.

За участі д.б.н., професора ХаритонОВОЇ Н. М. для галузі була розроблена на перспективу програма збільшення обсягів вирощування рослиноїдних риб у водоймах України «Полікультура».

Нею розроблено низку теоретично важливих для практики рибництва положень, які опубліковані в 162 наукових роботах, 6 монографіях і 14 нормативно-технологічних документів, які стосуються різних проблем рибництва.

Наталія Миколаївна приділяла увагу підготовці наукових кадрів, за її керівництва захистилося 7 кандидатів наук. Читала лекції на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів тощо.

За вагомий внесок у розвиток рибогосподарської науки її було нагороджено Почесною грамотою Української академії аграрних наук.

Померла ХаритонОВА Н. М. 24 червня 1997 року. Похована в м. Києві на Берковецькому цвинтарі.

ОГОЛОШЕННЯ

В Інституті рибного господарства НААН працює **ПЛР лабораторія спрямована на діагностику інфекційних захворювань риб**. На сьогодні в арсеналі лабораторії є діагностикими для вірусних, бактеріальних та паразитарних захворювань, які за даними Міжнародного Епізоотичного Бюро (OIE) є найбільш небезпечними для об'єктів сучасної аквакультури. При розробленні діагностичних тест-систем, зверталась увага на тенденції розвитку вітчизняного рибництва та інфекційні агенти, які циркулюють в Україні або можуть проникнути у вітчизняні рибогосподарські підприємства із сусідніх країн.

Ми пропонуємо молекулярну діагностику вірусних захворювань коропових, лососевих, осетрових та інших видів риб.

Лососеві: вірус інфекційного панкреатичного некрозу IPNV; вірусна геморагічна септицимія VHSV; вірус інфекційного гемопоетичного некрозу IHNV.

Коропові: вірус весняної віремії SVCV; герпесвірус CyHV, герпесвірус Кої KHV.

Осетрові: герпесвірус AcHV; іридовірус AcIV; аденовірус AcAdV.

Іctalурові: герпесвірус каналного сома CCV

Для бактеріальних хвороб риб підібрані тест-системи для діагностики фурункульозу форелі (*Aeromonas salmonicida*), геморагічної септицемії (*Aeromonas hydrophila*), хвороби нирок лососевих (BKD) (*Renibacterium salmoninarum*), ентиричної хвороби “червоного рота” (*Yersinia ruckeri*), флавобактеріозу (*Flavobacterium columnarae* і *Flavobacterium psychrophila* (BCWD) та септицемії сома (*Edwardsiella ictaluri*).

Присутні також тест-системи ідентифікації ендопаразитів *Tetracapsuloides bryosalmonae* (проліферативна хвороба нирок) та *Myxobolus cerebralis*, що інфікують райдужну форель.

Для отримання додаткової інформації можна звертатися за адресою:

Інститут рибного господарства НААН, вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164.
Лабораторія біотехнологій у рибництві

Завідувач лабораторії: к.б.н., с.н.с. Рудь Юрій Петрович

тел. (097) 953-80-80 або e-mail: rud@if.org.ua.

FISHERIES SCIENCE OF UKRAINE

"Fisheries Science of Ukraine" — a scientific journal, has been published in Ukraine since 2007. "Fisheries Science of Ukraine" included in the List of Specialized Publications of Ukraine, which can be used for publishing results of doctor's and candidate's thesis (biological and agricultural sciences), was approved in 08.07.2009, recertification of 06.11.2014 (Ministry of Education and Science of Ukraine №1279)

Founder and publisher of the journal — Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

State registration certificate KB № 20934-10734 PR of 18.08.2014

EDITOR-IN-CHIEF

Ihor Hrytsyniak, Doctor of Sciences, Professor, Academician of the NAAS of Ukraine, Director, Institute of Fisheries of the NAAS

DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF

Oleksandr Tretiak, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Deputy Director in scientific works, Institute of Fisheries of the NAAS

Natalia Kolesnyk, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of International Scientific and Technical Cooperation and Intellectual Property, Institute of Fisheries of the NAAS

EDITORIAL BOARD

BIOLOGICAL SCIENCES

Boris Gomelsky, Doctor of Biological Sciences, Professor, Kentucky State University, UNITED STATES OF AMERICA

Daniel Patrick, Doctor of Biological Sciences, Head of Biology Department Laboratories of the Pyrenees and Landes, FRENCH REPUBLIC

Gautam V. Zodape, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Zoology of Shivaji University Kolhapur, REPUBLIC OF INDIA

Vasyl Sondak, Doctor of Sciences, Head of "Water Bioresources", National University of Water Management and Natural Resources, UKRAINE

Oleksandr Litvinenko, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director General, Federal State Unitary Enterprise "Gosrybtsentr", RUSSIA

Oleksandr Potrokhov, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Biology of reproduction of fish, Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, UKRAINE

Leonid Buchatskyi, Doctor of Sciences, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Leading Research Scientist of the Laboratory of Biotechnologies in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Ihor Buzevych, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Valentyna Solomatina, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Leading research scientist of the department of feeds and fish feeding, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

AGRICULTURAL SCIENCES

XU Pao, Doctor, Professor, Director of Freshwater Fisheries Research Center, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Jedrzey Krupinski, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director, National Research Institute of Animal Production, POLAND

Mykhailo Efymenko, Doctor of Sciences, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head Research Scientist, Institute of Animal Breeding and Genetics of the NAAS, UKRAINE

Serhiy Tarasiuk, Doctor of Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head of the Molecular-Genetic Research Department, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Ryszard Kolman, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Ichthyology Department, The Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute in Olsztyn, POLAND

Vitaliy Bekh, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Fish Selection, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Isaak Sherman, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Aquaculture Department, Kherson State Agrarian University, UKRAINE

Oleksandr Kostenko, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Veterinary Medicine and Zootechnics Department, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, UKRAINE

SCIENTIFIC EDITORS OF SECTIONS

are staff employees of the Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine: **Natalia Tushnytska**, PhD, Senior Research Scientist, Scientific Secretary of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Deren**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Feeds and Fish Feeding of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yaroslav Tuchapskyi**, PhD, Head of the Carp Breeding Laboratory of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Zaloilo**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Molecular-Genetic Studies of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Zabytviskyi**, PhD, Senior Research Scientist of Section of Sturgeon of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Anatoliy Melnyk**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Ecological Investigation of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Antonina Mruk**, Head of the Laboratory Salmonids Culture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Tetiana Hryhorenko**, PhD, Head of the Laboratory of Hydrobiology and Technology of Invertebrates Cultivation of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Rud'**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Bio-technology in Aquaculture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Natalia Matvienko**, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Ichthyopathology of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Oleksandr Didenko**, PhD, Senior Research Scientist of the Department of Study Reservoirs Bioresources of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Viktor Chernik**, Head of the Laboratory of Management in Aquaculture of the Institute of Fisheries of the NAAS

Editorial board of the Journal "Fisheries Science of Ukraine", Institute of Fisheries NAAS, 135, Obukhivska St, Kiev-164, Ukraine, 03164; tel.: +38 (044) 223-84-34; tel/fax: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Layout design: Natalia Kolesnik, Serhiy Shinkar, Oleksandr Bezusyi; **Making-up:** Maria Simon, Yevheniy Arkhanhelskyi;

Literature editing: Oleksandr Oleksiienko, Tetiana Shvets; **Correctors:** Inna Liutkevych; **Typing:** Hanna Kovalchuk

ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НААН
вул. Обухівська, 135 м. Київ-164, 03164, Україна
тел.: +38(044) 223-84-34, тел./факс: +38(044) 423-74-62

<http://fsu.ua>

info@fsu.ua