ISSN 2312-9581 (Online)

ISSN 2075-1508 (Print)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

3/2017

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські науки), переатестація від 06.11.2014 (наказ Міністерства освіти і науки України №1279)

Засновник та видавник — Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20934-10734 ПР від 18.08.2014

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ГРИЦІНЯК Ігор Іванович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, директор Інституту рибного господарства НААН

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ТРЕТЯК Олександр Михайлович, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН

КОЛЕСНИК Наталія Леонідівна, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності, Інститут рибного господарства НААН

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Гомельський Борис, доктор біол. наук, професор, Державний Університет Кентуккі, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Патрік Даніель, доктор біол. наук, Голова департаменту біології Лабораторії Піренеїв, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА

Зодапе Гаутам В., доктор біол. наук, професор, декан факультету зоології Державного Університету Шиваджи в Колхатурі, РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ

Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, зав. кафедрою водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА

Литвиненко Олександр Іванович, доктор біол. наук, іноземний член Національної академії аграрних наук України, генеральний директор, Федеральне державне унітарне підприємство «Госрыбцентр», РОСІЯ

Потрохов Олександр Спиридонович, доктор біол. наук, с.н.с., керівник лабораторії біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, УКРАЇНА

Бучацький Леонід Петрович, доктор біол. наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), провідний науковий співробітник лабораторії біотехнологій в рибистві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Бізуєвич Ігор Юрійович, доктор біол. наук, с.н.с., завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Соломатіна Валентина Дмитрівна, доктор біол. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник відділу кормів та годівлі риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Ху Пао, доктор наук, професор, директор Центру прісноводного рибного господарства, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

Крупінський Єджей, доктор наук, професор, іноземний член Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут зоотехнії Польщі, ПОЛЬЩА

Єфименко Михайло Якович, доктор с.-г. наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник, Інститут розведення і генетики тварин НААН, УКРАЇНА

Тарасюк Сергій Іванович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, зав. відділу молекулярно-генетичних досліджень, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Кольман Ришард, доктор наук, професор, зав. відділу іхтіології, Інститут прісноводного рибного господарства ім. Станіслава Саковича, ПОЛЬЩА

Бех Віталій Валерійович, доктор с.-г. наук, професор, зав. відділу селекції риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Шерман Ісаак Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедри рибиства, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

Костенко Олександр Іванович, канд. с.-г. наук, с.н.с., нач. відділу ветеринарної медицини та зоотехнії, Національна академія аграрних наук України, УКРАЇНА

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

є штатними працівниками Інституту рибного господарства НААН України: **Тушницька Наталія Йосифівна**, канд. ветерин. наук, с.н.с., вчений секретар ІРГ НААН; **Дерень Ольга Володимирівна**, канд. с.-г. наук, с.н.с., зав. лабораторії кормів і годівлі риб ІРГ НААН; **Тучапський Ярослав Васильович**, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу селекції риб ІРГ НААН; **Залоїло Ольга Василівна**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ІРГ НААН; **Забитівський Юрій Михайлович**, канд. біол. наук, старший науковий співробітник сектору осетрівництва ІРГ НААН; **Мельник Анатолій Пилипович**, канд. хім. наук, с.н.с., зав. лабораторії екологічних досліджень ІРГ НААН; **Мрук Антоніна Іванівна**, зав. лабораторії лососівництва ІРГ НААН; **Григоренко Тетяна Володимирівна**, канд. с.-г. наук, зав. лабораторії гідробіології та технологій культивування цінних безхребетних ІРГ НААН; **Рудь Юрій Петрович**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії біотехнологій в рибистві ІРГ НААН; **Матвієнко Наталія Миколаївна**, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу іхтіопатології ІРГ НААН; **Діденко Олександр Володимирович**, канд. біол. наук, с.н.с., старший науковий співробітник відділу вивчення біоресурсів водосховищ.

Редакція журналу «Рибогосподарська наука України», вул. Обухівська, 135, м. Київ-164, 03164

тел./факс: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, fsu.journal@gmail.com

Підписано до друку 28.08.2017 р. Формат 70х108/16. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 7,1. Наклад 500 прим.

Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту рибного господарства НААН (Протокол № 4 від 29 серпня 2017 р.)

Дизайн макету: Колесник Н. Л., Шинкар С. В., Безусий О. Л. **Верстка:** Архангельський Є. Ю. **Літературне**

редагування: Олексієнко О. О., Шведь Т. М. **Коректори:** Симон М. Ю., Ковальчук Г. В.

Друкарня ТОВ «Наш Формат», пр-т Миру, 7, м. Київ, 02105, тел.: +38 (044) 353-85-58

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

3/2017(41)

Заснований у 2007 р.
Виходить 4 рази на рік

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 1-112
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03>

З М І С Т

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 5-16
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.005>

І. І. Абрам'юк, С. О. Афанасьєв

Структурна характеристика іхтіопланктону малої річки, що протікає в межах великогиристої заплави Дніпра..... 5

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 17-25
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.017>

Е. О. Аристархова

Експрес-оцінка токсичності вод поверхневих джерел водопостачання з використанням риб *Danio rerio*..... 17

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 26-36
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.026>

Н. П. Чужма

Інформаційне різноманіття фітопланктону дослідних вирощувальних ставів під дією різних видів органічних добрив за індексом Шеннона 26

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 37-49
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.037>

К. М. Гейна

Біологічна характеристика промислового стада сріблястого карася (*Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) Дніпровсько-Бузької гирлової системи..... 37

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 50-64
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.050>

Т. В. Григоренко, Н. М. Савенко, А. М. Базаєва, Н. П. Чужма, О. М. Колос, Л. В. Титова

Продуктивність вирощувальних ставів при застосуванні бактеріального добрива «Фосфобактерин» 50

© Інститут рибного господарства НААН України, 2017

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 65-75 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.065 <i>П. Д. Мендришора, А. І. Мрук, Г. А. Куріненко</i> Морфометрична характеристика ремонтно-маточного стада райдужної форелі (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792) вирощеної в умовах індустріального господарства «Слобода Банилів»	65
---	----

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 76-82 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.076 <i>І. С. Ярова, О. В. Залоїло, В. В. Бех, І. А. Залоїло</i> Аналіз генетичного різноманіття популяції галицького коропа господарства «Великий Любін» за використання мікросателітних маркерів	76
--	----

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 83-97 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.083 <i>І. С. Кононенко, А. Ю. Пуговкін, Р. В. Кононенко, В. О. Черепнін, К. І. Буцький, Є. Ф. Копейка</i> Оптимізація умов кріоконсервування сперми стерляді (<i>Acipenser ruthenus</i> L., 1758) для запліднення ікри в умовах рибних господарств	83
--	----

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 98-108 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.098 <i>Т. С. Шарамок, Н. Б. Єсінова, Н. Л. Колесник</i> Патоморфологічні та цитометричні показники клітин червоної крові дволіток карася сріблястого (<i>Carassius auratus gibelio</i> (Bloch, 1782) за умов інтоксикації іонами міді	98
--	----

ХРОНІКА

Фундатор рибогосподарської науки Кузьома Олександр Іванович	109
--	-----

СОДЕРЖАНИЕ

БИОРЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ ВОДОЕМОВ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 5-16

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.005>

И. И. Абрамюк, С. А. Афанасьев

Структурная характеристика ихтиопланктона малой реки, протекающей в пределах крупногрядистой поймы Днепра 5

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 17-25

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.017>

Э. А. Аристархова

Экспресс-оценка токсичности вод поверхностных источников водоснабжения с использованием рыб *Danio rerio* 17

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 26-36

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.026>

Н. П. Чужма

Информационное разнообразие фитопланктона опытных выростных прудов под воздействием различных видов органических удобрений по индексу Шеннона 26

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 37-49

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.037>

К.Н. Гейна

Биологическая характеристика промыслового стада серебряного карася (*Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) Днепровско-Бугской устьевой системы 37

ТЕХНОЛОГИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 50-64

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.050>

Т.В. Григоренко, Н.Н. Савенко, А.Н. Базаева, Н.П. Чужма, Е.Н. Колос, Л.В. Титова

Продуктивность выростных прудов при применении бактериального удобрения «Фосфобактерин» 50

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 65-75

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.065>

П. Д. Мендришора, А. И. Мрук, А. А. Куриченко

Морфометрическая характеристика ремонтно-маточного стада радужной форели (*Oncorhynchus mykiss* (Walbaum, 1792) выращенной в условиях индустриального хозяйства «Слобода Банилов» 65

СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 76-82

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.076>

И. С. Яровая, О. В. Залошло, В. В. Бех, И. А. Залошло

Анализ генетического разнообразия популяции галицийского карпа хозяйства «Великий Любень» при использовании микросателлитных маркеров 76

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 83-97

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.083>

И. С. Кононенко, А. Ю. Пуговкин, Р. В. Кононенко, В. А. Черепнин, К. И. Буцкий, Е. Ф. Конейка

Оптимизация условий криоконсервирования спермы стерляди (*Acipenser ruthenus*, L. 1758) для оплодотворения икры в условиях рыбных хозяйств 83

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 98-108

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.098>

Т.С. Шарамок, Н.Б. Есипова, Н. Л. Колесник

Патоморфологические и цитометрические показатели клеток красной крови двухлеток карася серебряного (*Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) в условиях интоксикации ионами меди 98

ХРОНИКА

Основатель рыбохозяйственной науки Кузема Александр Иванович 109

CONTENTS

BIORESOURCES AND ECOLOGY OF WATER BODIES

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 5-16 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.005 <i>I. Abramiuk, S. Afanasyev</i> Structural characteristic of ichthyoplankton in a small river flowing within a bar plain of the Dnipro river.....	5
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 17-25 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.017 <i>E. Arystarkhova</i> Express-assessment of toxicity of waters from surface water supply sources with the use of <i>Danio rerio</i>	17
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 26-36 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.026 <i>N. Chuzhma</i> Shannon diversity indices of phytoplankton in experimental fish-rearing ponds under the effect of different types of organic fertilizers.....	26
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 37-49 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.037 <i>K. Heina</i> Biological characteristics of prussian carp (<i>Carassius auratus gibelio</i> (Bloch, 1782) commercial stock of the Dnieper-Bug estuary.....	37

TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 50-64 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.050 <i>T. Hryhorenko, N. Savenko, A. Bazaieva, N. Chuzhma, O. Kolos, L. Tytova</i> Productivity of growing ponds when applying the bacterial fertilizer «Phosphobakterin»	50
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 65-75 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.065 <i>P. Mendrisha, A. Mruk, G. Kurinenko</i> Morphometric characteristics of the replacement-brood stock of rainbow trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792) reared in the conditions of the industrial fish farm “Sloboda-Banyliv”	65

SELECTION, GENETICS AND BIOTECHNOLOGY

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 76-82 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.076 <i>I. Yarova, O. Zaloilo, V. Bech, I. Zaloilo</i> Analysis of genetic diversity of galician carp population on the base of fish farm «Velykyy Lyubin’» with using microsatellite markers	76
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 83-97 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.083 <i>I. Kononenko, A. Pugovkin, R. Kononenko, V. Cherepnin, K. But's'kyi, Ye. Kopeika</i> Optimization of the conditions of sterlet (<i>Acipenser ruthenus</i> , L. 1758) sperm cryopreservation for egg fertilization in fish farm conditions	83

PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 98-108 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.098 <i>T. Sharamok, N. Yesipova, N. Kolesnyk</i> Pathomorphological and cytometric parameters of blood red cells of age-2 prussian carp (<i>Carassius auratus gibelio</i> (Bloch, 1782) in the conditions of intoxication with copper ions.....	98
--	----

CHRONICLE

The founder of the Fisheries Science Kuzioma Olexandr Ivanovych	109
---	-----

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 5-16
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.005>
UDC 597+574.583 (282.274.32)

STRUCTURAL CHARACTERISTIC OF ICHTHYOPLANKTON IN A SMALL RIVER FLOWING WITHIN A BAR PLAIN OF THE DNIPRO RIVER

I. Abramiuk, abrmyk@yahoo.com, Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, Kyiv
S. Afanasyev, safanasyev@ukr.net, Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, Kyiv

Purpose. Using as an example of a small river, which flows through a bar plain of the Dnipro, to study species composition of the littoral ichthyoplankton, dynamics of its structure during the season and its diversity in different parts of the river.

Methodology. The littoral ichthyoplankton was investigated during four seasons of 2011-2014 on the Vita river, a right tributary of the Dnipro affected by the operation of Kaniv HPP. The research covered the main channel, a permanent backwater connected with the channel, as well as temporarily flooded areas of the floodplain and separated from the channel oxbow lakes. Samples were collected with standard sweep nets and Bagenal buoyant nets. Identification of young fish was carried out under binocular microscope MBS-9. Early life stages of larvae were determined according to the system of V. Vasnetsov. Species diversity of ichthyoplankton was assessed by the Shannon index.

Findings. The littoral ichthyoplankton during May-July mostly consisted of limnophilic fish larvae belonging to a family Cyprinidae. In the river channel and the backwater at the beginning of the period the larvae of roach (*Rutilus rutilus*) prevailed, later they were substituted by larvae of more thermophilic species, among which the rudd (*Scardinius erythrophthalmus*) was the most abundant. In the oxbow lakes and temporarily flooded areas in spring the coastal ichthyoplankton was mainly structured by larvae of *Carassius* sp. and the rudd, in summer the larvae assemblages of oxbow lakes were quantitatively dominated by the sunbleak (*Leucaspis delineatus*). In areas covered with vegetation the larvae of invasive Chinese sleeper (*Perccottus glenii*) were firstly found. Rheophilic species among young fish were absent, which indicates unfavorable conditions for their spawning at present hydrologic regime of the river.

Originality. For the first time the coastal communities of early young fish in a small tributary of the Dnipro were investigated, seasonal dynamics of their structure was considered, the main spawning grounds of industrial fish were determined.

Practical value. The obtained results point out the important role of small tributaries of the Dnipro in reproduction of many fishes, particularly the industrial ones. They can serve as a basis for identifying the most suitable places for restoration of fish populations, as well as for proper planning of measures aimed at protection, conservation and restoration of ichthyofauna of small rivers and waters associated with them.

Keywords: small rivers, bar plain, hydrologic regime, littoral ichthyoplankton, limnophilic species, invasive species.

PROBLEM STATEMENT AND ANALYSIS OF LAST ACHIEVEMENTS AND PUBLICATIONS

An important role in the reproduction of ichthyofauna in large rivers belongs to their small tributaries. They serve as spawning and nursery grounds for various fishes.

© I. Abramiuk, S. Afanasyev, 2017

The most effective in this regard are unregulated tributaries, as they do not contain any barriers for fish spawning migrations [1, 2]. However, very few rivers have been still maintained in their natural state. Particularly, in the Kyiv area, most of the Dnipro tributaries are transformed into cascades of ponds or enclosed in collectors and concrete gutters [3]. Moreover, due to differences in water levels, a number of tributaries which flow into the Dnipro reservoirs is now pumped from the embankment areas and completely lost its function as a place of fish reproduction.

Among many small rivers in Kyiv, the Vita River can be considered as the one which is most preserved in its natural state [4]. Even though the channel on its middle reaches is partially straightened, the river does not have any dam along the whole stretch. The lower reaches of the river flow within a bar plain of the Dnipro [5]. After construction of the reservoirs cascade, this rare type of landscape has been preserved only in some parts of the Pripyat River in the Chernobyl Exclusion Zone and on a small plot: on the left bank from Kiev to Bortnychi, and on the right bank in the Vita River mouth area. The unicity of the bar plain is characterized by a peculiar structure: it has a complicated terrain with relatively high bars, as well as an exceptionally sandy soil composition, which causes the floodplain to be eroded with deep water galls, based on which a network of shallow backwaters is formed [6,7].

Since ancient times, the mouth area of the Vita has served as a center for feeding, breeding and settling of fish in the middle Dnipro. In 1921, most of this territory was included into the State Ichthyological Reserve "Koncha Zaspа" [8, 9]. By that time, the Vita was characterized by rich ichthyofauna. E.g., in 1928, D. Beling provided a list of 41 species. This list, in particular, included the representatives of some migratory fish that are not found here nowadays: sturgeon, herring, eel [10]. It had been a long time until the next survey of ichthyofauna was conducted on this area in 1995-1997 [11]. As a result of the work carried out at various parts of the river, 29 species of fish from 13 families were registered in total. Somewhat later, as a result of an inventory of ichthyofauna in the Vita River mouth area in 2006-2007, the list of species found decreased to 21, which was explained by the decline in the number of typical river fishes: chub, asp, razor fish and zobel. The basis of ichthyocomplexes was formed by phytophilic fish: roach, rudd and silver bream [12].

HIGHLIGHT OF THE EARLIER UNRESOLVED PARTS OF THE GENERAL PROBLEM. AIM OF THE STUDY

After creation of the Kaniv reservoir in 1974-1976 [13], the Vita River suffered a backwater effect, which has changed its hydrologic regime: today, when the level of the reservoir is raised, its mouth area may even develop a reverse flow [4]. On the one hand, it creates favorable conditions for spawning of many fish species, especially the representatives of phytophilic ichthyofauna, many of which are valuable for fishing and industry. On the other hand, the conditions of the reproduction of typical river fishes have deteriorated resulting in a significant decrease in their numbers [12].

An indisputable indicator of successful spawning in any river or water body is a presence of early age fish. Since the aggregations of larvae and juveniles of most fishes are mainly located close to the banks, monitoring of such areas when studying the young fish assemblages is of paramount importance [14-17].

Despite the significant role of small inflows of the Dnipro as spawning grounds, very little attention was given to the study of young fish in such rivers, in contrast to the reservoirs, which they flow in. Previous researches were limited by studying the downstream movement of pikeperch *Sander lucioperca* (L.) larvae in the Olshanka River [18] and fragmentary studies of coastal young fish at the peak of flood in the Vita River [11].

The purpose of this study was to investigate the species composition of littoral ichthyoplankton, the dynamics of its structure during the season and its peculiarities and diversity at different parts of the river catchment using the Vita River as an example.

MATERIALS AND METHODS

Coastal ichthyoplankton was investigated from the moment of mass appearance of free-floating larvae in the littoral zone (1st to 2nd decades of May) until most of them transformed to juveniles (2nd to 3rd decades of July) twice a month during the four seasons of 2011-2014. The study was conducted mainly on the river channel and a permanent backwater connected with it, as well as in temporarily flooded areas of the floodplain and oxbow lakes separated from the channel. The flooded section of floodplain located between the channel and the backwater was surveyed in 2013 from June until the first half of July, when the water level dropped and the bank finally drained. The oxbow lakes were studied in 2014.

Samples were collected with sweep nets made of 0.5 mm mill mesh with a metal opening of 0.35 m diameter (circle area of 0.1 m²), as well as Bagenal buoyant nets [19] modified by Dolinskiy [20] with the circle area of 0.5 m². The collected larval fish were preserved in a 4% formaldehyde solution. Water temperature was measured in the water column during each sampling with a mercury thermometer to the nearest 0.1°C.

Identification of ichthyoplankton was carried out under binocular microscope MBS-9 with the help of identification guides [21, 22]. Early life stages of larval fish were determined according to the system of V. Vasnetsov [23]. Fish taxonomy was given according to Yu. V. Movchan [24].

The characteristic of species diversity of the ichthyoplankton was made using the Shannon index. The assessment of species composition similarity in different parts of the river was performed using Sorensen indexes [25, 26].

STUDY RESULTS AND THEIR DISCUSSION

During the period of the research, larvae of 12 fish species belonging to 4 families were found in littoral ichthyoplankton of the Vita River. The most abundant was *Cyprinidae* family, which included 9 species. *Syngnathidae*, *Odontobutidae* and *Gobiidae* families were represented by one species each (Table 1).

The similarity analysis of ichthyoplankton species composition showed that the most similar were the channel and the backwater, as well as lakes and temporary waters, the Sorensen coefficient for which was 0.90 and 0.75, respectively. Meanwhile, the structure of ichthyoplankton in all studied biotopes fluctuated continuously during the spring-summer period.

Table 1. Species composition of littoral ichthyoplankton in the Vita River (2011-2014)

Species	Channel	Backwater	Oxbow lakes	Temporary waters
Cyprinidae				
<i>Rutilus rutilus</i> (L.) – roach	+	+	–	–
<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (L.) – rudd	+	+	+	+
<i>Alburnus alburnus</i> (L.) – bleak	+	+	–	–
<i>Leucaspis delineatus</i> (Heckel) – sunbleak	–	–	+	–
<i>Blicca bjoerkna</i> (L.) – silver bream	+	+	+	+
<i>Abramis brama</i> (L.) – bream	+	+	–	–
<i>Rhodeus amarus</i> (Bloch) – bitterling	+	+	–	–
<i>Carassius</i> sp.*	+	+	+	+
<i>Tinca tinca</i> L. – tench	+	+	–	–
Syngnathidae				
<i>Syngnathus nigrolineatus</i> Eichwald – shore pipefish	+	–	–	–
Odontobutidae				
<i>Perccottus glenii</i> Dybowski – Chinese sleeper	+	+	–	–
Gobiidae				
<i>Proterorhinus semilunaris</i> (Heckel) – western tubenose goby	+	–	–	–
Total:	11	9	5	3

Note.* identified to the genus level

In the coastal zone of the channel and the backwater, first larvae appeared almost simultaneously, mainly in the first decade of May at a water temperature of 15-19°C. The basis of ichthyoplankton at that time consisted of roach larvae, where their relative number reached 98% (Fig. 1). Together with the roach, single larvae of bream, silver bream and rudd were also found. The share of bream larvae was slightly higher in the backwater (3.4%) than in the channel (2.0%). Due to such inequality of larval communities, the beginning of the period was characterized, respectively, by the lowest values of the Shannon index, from 0.13 in the channel to 0.52 in the backwater. The period of roach predominance in ichthyoplankton was rather short and mostly ended at the end of May, since this species is characterized by a short spawning period. With the water warming up to 20-24°C, the roach in ichthyoplankton communities was replaced with the rudd, while the late larvae and juveniles of roach gradually moved away from the shore and settled the deeper areas. In this intermediate period, which accounted for the end of May-early June, the species diversity indices of the littoral ichthyoplankton increased significantly, from 1.18 in the backwater to 1.40 in the river channel. During summer, with further water warming up to 24-25°C, ichthyoplankton in the channel and the backwater was dominated by rudd larvae. Significant share also accounted for such

species as bleak (up to 42% by number), bitterling (up to 36%), silver bream (up to 28%) and *Carassius sp.* (up to 9%). The larvae of tench and the invasive Chinese sleeper occurred in small numbers mainly in vegetated areas of the backwater. The larvae of shore pipefish and western tubenose goby were caught as single individuals in the channel. Despite the predominance of the rudd, due to the presence of other thermophilic species larvae, the Shannon indexes in the summer were practically at the same level as in the transitional spring-summer period, reaching the values of 1.34 in the channel and 1.42 in the backwater.

Fig 1. Dynamics of mass species number ratio in the channel (I) and the backwater (II) ichthyoplankton in 2014

The temporarily flooded section of the floodplain between the channel and the backwater was characterized by low species richness of ichthyoplankton. In the material collected, the larvae of only three species were detected. Within the flooding period the basis of ichthyoplankton was presented by *Carassius sp.* and the rudd. Silver bream larvae were caught only as single specimens (Fig. 2.I). Despite a fairly good equality of communities, the diversity index due to a small number of species here did not exceed the value of 1.0.

In the investigated oxbow lakes, the first fish larvae emerged near shores in the second decade of May, at a temperature of 15-18°C. The larvae of rudd (84.3% by number) and *Carassius sp.* (15.7%) were detected then. Herewith, the larvae of *Carassius sp.* were caught exclusively inside the water vegetation, while the rudd were mainly found at open areas close to the water plants. In June, the ichthyoplankton was prevailed by the larvae of sunbleak (79.6%), then followed by the rudd (11.1%) and the silver bream (8.3%) (Fig. 2.II). The maximum value of diversity index did not exceed 0.98 due to the low number of species.

The general changes in the ichthyoplankton structure in the channel and the backwater were rather similar and reflected the reproductive periods of species with early and tight (roach) and late and long spawning (rudd, bitterling, bleak, *Carassius sp.*). At the same time, the coastal ichthyoplankton of the backwater, compared with the channel, had a slightly smaller share of roach and a shorter period of its occurrence, while the relative number of rudd and other typical limnophiles such as *Carassius sp.*, tench and Chinese sleeper was higher. Such differences are obviously related to different hydrological conditions of the given river sections, since the channel is characterized by the continued overflow, while the backwater is a practically stagnant water body, as a result being more silty and vegetated [7]. Remarkably, the larvae of bream, a commercially valuable species, occurred simultaneously with roach larvae only in May, which indicates rather early and tight spawning of this fish in the Vita River.

Fig. 2. Dynamics of ichthyoplankton structure in temporary waters (I) and oxbow lakes (II) of the Vita River

The obtained results concerning the composition of ichthyoplankton in oxbow lakes and temporary waters indicate that *Carassius sp.* and the rudd prefer shallow places with no current for reproduction. Their spawning in such areas commences somewhat earlier than in the channel and the backwater, which may be explained by faster heating of water to the spawning temperature, as well as by the lack of roach, which massively spawns in the channel and the backwater at the peak of flood. The high number of *Carassius sp.* larvae in such parts of the river emphasizes their key role

in reproduction of this genus. Therefore it is necessary to avoid strong fluctuations in the level of the reservoir during operation of the Kaniv HPP, which can lead to drying the eggs deposited on the flooded banks.

Noteworthy, the larvae of typical river fishes such as chub *Squalius cephalus* (L.), ide *Idus idus* (L.), zobel *Ballerus sapa* (Pallas) and asp *Aspius aspius* L. were not detected at any of the studied sites of the Vita River. A decrease in the number of these species was reported even earlier, however, asp larvae in small numbers were still found [12]. It means that under the current hydrologic regime of the Vita River, connected with its backwater effect by the Kaniv reservoir, the conditions for reproduction of rheophylic fishes are unfavorable.

CONCLUSION AND PERSPECTIVES OF FURTHER DEVELOPMENT

In the littoral ichthyoplankton of the Vita river, 12 fish species, 9 of which belonged to the *Cyprinidae* family, were detected. The littoral ichthyoplankton of the river channel and the backwater during the season changed its structure: in spring, the basis of larvae communities was formed by the roach; in summer, when water temperature increased, the roach was substituted by the rudd. Among secondary species, the commercially valuable ones such as bream, *Carassius sp.* and tench, were also found; their relative number in the backwater section was slightly higher compared to the river channel.

The oxbow lakes and flooded areas of floodplain were characterized by a lower species richness and completely different species ratios. In certain periods, the basis of ichthyoplankton communities of the studied waters was formed by *Carassius sp.* larvae that indicated on their key role in the reproduction of this genus within the Dnipro bar plain.

Due to the specific geological structure of the floodplain, as well as the backwater effect of the Kaniv reservoir, the Vita River serves as a reproduction area mainly for limnophilic fish, while typical river species do not find favorable conditions for spawning here.

An important addition to the data obtained should be the study of ichthyoplankton in open areas of the river, which will provide information about the reproduction of *Percidae* fishes, most of which have pelagic larvae.

We consider it advisable to carry out similar studies on other tributaries of the Dnipro, which will give the possibility to evaluate their role in the reproduction of different fish populations.

BIBLIOGRAPHY

1. Distribution and abundance of fish eggs and larvae in three tributaries of the Upper Uruguay River (Brazil) / Nappi Corrêa R. et al. // Environ. Biol. Fish. 2011. Vol. 91. P. 51—61.
2. Fish passes — Design, dimensions and monitoring / FAO/DVWK. Rome : FAO, 2002. 119 p.
3. Вишневецький В. І. Малі річки Києва. Київ : Інтерпрес ЛТД, 2007. 28 с.
4. Стецюк В. В., Романчук С. П., Щур Ю. В. Київ як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія. Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2001. 259 с.

5. Марковський Ю. М. Морфологія водойм заплавин Дніпра // Тр. Ін-ту гідробіології АН УРСР. 1941. № 17. С. 5—38.
6. Стратегія сохранения біологічного і ландшафтного різноманіття басейна Дніпра / Романенко В. Д. і др. ; ред. Білоконь В. Н. Київ : Ай-Би, 2004. 106 с.
7. Макрофіти і донна фауна водоемів устьєвої області р. Вити / Афанасьєв С. А. і др. // Гідробіологічний журнал. 2001. № 2. С. 26—35.
8. Шарлемань М. Державний заповідник «Конча Заспа» // Збірник праць державного рибного заповідника «Конча Заспа». 1928. Т. 1. С. 11—24.
9. Овчинник М. До вивчення темпу росту ляща (*Abramis brama* L.) р. Дніпра Київського району // Збірник праць державного рибного заповідника «Конча Заспа». 1928. Т. 1. С. 56—62.
10. Белінг Д. До характеристики рибного населення заповідника «Конча Заспа» // Збірник праць державного рибного заповідника «Конча Заспа». 1928. Т. 1. С. 84—101.
11. Афанасьєв С. А., Цыбульський А. И. Ихтиофауна водоемів рекреаційної зони Києва в устьєвої області р. Вита // Екологія городів і рекреаційних зон : Міжнарод. науч.-практ. конф. : тези докл. Одеса : Астропринт, 1998. С. 13—17.
12. Інвентаризація їхтиофауни устьєвої області річки Вита / Афанасьєв С. А. і др. // Озерні екосистеми: біологічні процеси, антропогенна трансформація, якість води : III Міжнарод. науч. конф. : тези докл. Минск—Нарочь, 2007. С. 275—276.
13. Водний фонд України. Штучні водойми — водосховища і ставки : довідник / Гребінь В. В. та ін. ; ред. Хільчевський В. К., Гребінь В. В. Київ : Інтерпрес ЛТД, 2014. 164 с.
14. Сухойван П. Г. Розмноження риб у Кременчуцькому водоймищі // Біологія риб Кременчуцького водоймища / ред. Сухойван П. Г. Київ : Наукова думка, 1970. С. 34—119.
15. Долинський В. Л. Молодь риб в зарослях повітряно-водної рослинності // Гідробіологічний журнал. 1983. № 3. С. 96—100.
16. Фомічев О. А. Біотопне розподілення молоді риб в прибережній зоні водотоків дельти Волги в період покатої міграції // Научний бюлетень КаспНІРХ. 2000. № 1. С. 157—158.
17. Холостова Е. В. Видовий склад, чисельність, розподілення, еколого-морфологічні особливості личинок весняно-нерестуючих риб в Свіязькому затоці Куйбишевського водохранилища в період дестабілізації його екосистеми // Вестник Татарстанського відділення Російської екологічної академії. 2005. № 4. С. 27—32.
18. Білий Н. Д. Скот судака на ранніх стадіях розвитку в річці Ольшанці // Проблеми їхтиології. 1960. Вип. 16. С. 164—174.
19. Bagenal T. B. A buoyant net designed to catch freshwater fish larvae quantitatively // Freshwater Biology. 1974. Vol. 4(2). P. 107—109.
20. Долинський В. Л., Кудринська О. И. Вспливаюча сітка для лову молоді риб // Гідробіологічний журнал. 2002. № 4. С. 99—101.
21. Коблицька А. Ф. Визначальник молоді прісноводних риб. Москва : Легка і харчова промисловість, 1981. 208 с.

22. Воскобойникова О. С., Павлов Д. А. Личиночное развитие ротана-головешки *Percottus glenii* (*Perciformes, Gobioidae, Odontobutidae*) в связи с происхождением рыб подотряда *Gobioidae* // Вопросы ихтиологии. 2006. № 6. С. 826—841.
23. Васнецов В. В. Этапы развития костистых рыб // Очерки по общим вопросам ихтиологии. Москва : АН СССР, 1953. С. 207—217.
24. Мовчан Ю. В. Риби України (визначник-довідник). Київ : Золоті ворота, 2011. 444 с.
25. Шитиков В. К., Розенберг Г. С., Зинченко Т. Д. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации. Тольятти : ИЭВБ РАН, 2003. 463 с.
26. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. ; ред. Романенко В. Д. Київ : ЛОГОС, 2006. 408 с.

REFERENCES

1. Nappi Corrêa, R., Hermes-Silva, S., Reynalte-Tataje, D., & Zaniboni-Filho, E. (2011). Distribution and abundance of fish eggs and larvae in three tributaries of the Upper Uruguay River (Brazil). *Environ. Biol. Fish.*, 91, 51-61.
2. FAO/DVWK (2002). Fish passes – Design, dimensions and monitoring. Rome: FAO.
3. Vyshnevskiy, V. I. (2007). *Mali richky Kyieva*. Kyiv: Interpres LTD.
4. Stetsiuk, V. V., Romanchuk, S. P., & Shchur, Yu. V. (2001). *Kyiv yak ekolohichna systema: pryroda-liudyna-vyrobnytstvo-ekolohiia*. Kyiv: Tsentr ekolohichnoi osvity ta informatsii.
5. Markovskiy, Yu. M. (1941). Morfolohiia vodoim zaplavyn Dnipra. *Tr. In-tu hidrobiolohii AN URSR*, 17, 5-38.
6. Romanenko, V. D., Afanas'ev, S. A., Grodzinskiy, M. D., Dronova, E. L., Nikiforov, M. E., & Bambalov, N. N. et al. (2004). *Strategiya sokhraneniya biologicheskogo i landshafnogo raznoobraziya basseyna Dnepra*. Bilokon' V. N. (Ed.). Kiev.
7. Afanas'ev, S. A., Karpova, G. A., Pan'kova, N. G., & Kurilenko, O. G. (2001). Makrofity i donnaya fauna vodoemov ust'evoy oblasti r. Vity. *Gidrobiol. zhurn.*, 2, 26-35.
8. Sharleman, M. (1928). Derzhavnyi zapovidnyk «Koncha Zaspa». *Zbirnyk prats derzhavnoho rybnoho zapovidnyka «Koncha Zaspa»*, 1, 11-24.
9. Ovchynnyk, M. (1928). Do vyvchennia tempu rostu liashcha (*Abramis brama* L.) r. Dnipra Kyivskoho raionu. *Zbirnyk prats derzhavnoho rybnoho zapovidnyka «Koncha Zaspa»*, 1, 56-62.
10. Belinh, D. (1928). Do kharakterystyky rybnoho naselennia zapovidnyka «Koncha-Zaspa». *Zbirnyk prats derzhavnoho rybnoho zapovidnyka «Koncha Zaspa»*, 1, 84-101.
11. Afanas'ev, S. A., & Tsybul'skiy, A. I. (1998). Ikhtiofauna vodoemov rekreatsionnoy zony Kieva v ust'evoy oblasti r. Vita. *Ekologiya gorodov i rekreatsionnykh zon: Mezhdunar nauch.-prakt. konf.: tezisy dokl.* Odessa: Astroprint, 13-17.
12. Afanas'ev, S. A., Kirilyuk, O. P., Goncharenko, N. I., Dolinskiy, V. L., & Savchenko, E. V. (2007). Inventarizatsiya ikhtiofauny ust'evoy oblasti reki Vita. *Ozernye ekosistemy: biologicheskie protsessy, antropogennaya transformatsiya*,

- kachestvo vody: III Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. : tezisy dokl.* Minsk–Naroch', 275-276.
13. Hrebin, V. V., Khilchevskiy, V. K., Stashuk, V. A., Chunarov, & O. V. Yaroshevych, O. Ye. (2014). *Vodnyi fond Ukrainy. Shtuchni vodoimy – vodoskhovyshcha i stavky: Dovidnyk*. Kyiv: Interpres LTD.
 14. Sukhoivan, P. H. (1970). Rozmnozhennia ryb u Kremenchutskomu vodoimyschi. *Biologiya ryb Kremenchutskoho vodoimyscha*. Sukhoivan P. H. (Ed.). Kyiv: Nauk. dumka, 34-119.
 15. Dolinskiy, V. L. (1983). Molod' ryb v zaroslyakh vozdushno-vodnoy rastitel'nosti. *Gidrobiol. zhurn.*, 3, 96-100.
 16. Fomichev, O. A. (2000). Biotopnoe raspredelenie molodi ryb v pribrezhnoy zone vodotokov del'ty Volgi v period pokatnoy migratsii. *Nauchnyy byulleten' KaspNIRKh*, 1, 157-158.
 17. Kholostova, E. V. (2005). Vidovoy sostav, chislennost', raspredelenie, ekologo-morfologicheskie osobennosti lichinok vesennee-nerestuyushchikh ryb v Sviyazskom zalive Kuybyshevskogo vodokhranilishcha v period destabilizatsii ego ekosistemy. *Vestnik Tatarstanskogo otdeleniya Rossiyskoy ekologicheskoy akademii*, 4, 27-32.
 18. Belyy, N. D. (1960). Skat sudaka na rannikh stadiyakh razvitiya v reke Ol'shanke. *Voprosy ikhtiologii*, 16, 164-174.
 19. Bagenal T. B. (1974). A buoyant net designed to catch freshwater fish larvae quantitatively. *Freshwater Biology*, 4(2), 107-109.
 20. Dolinskiy, V. L., & Kudrinskaya, O. I. (2002). Vsplyvayushchaya set' dlya lova molodi ryb. *Gidrobiol. zhurn.*, 4, 99-101.
 21. Koblitskaya, A. F. (1981). *Opredelitel' molodi presnovodnykh ryb*. Moskva: Legkaya i pishchevaya promyshlennost'.
 22. Voskoboynikova, O. S., Pavlov, D. A. (2006). Lichinochnoe razvitie rotanogoloveshki *Percottus glenii* (Perciformes, Gobioidae, Odontobutidae) v svyazi s proiskhozhdeniem ryb podotryada Gobioidae. *Voprosy ikhtiologii*, 6, 826-841.
 23. Vasnetsov, V. V. (1953). Etapy razvitiya kostistyykh ryb. *Ocherki po obshchim voprosam ikhtiologii*. Moskva: AN SSSR, 207-217.
 24. Movchan, Yu. V. (2011). *Ryby Ukrainy (vyznachnyk-dovidnyk)*. Kyiv: Zoloti vorota.
 25. Shitikov, V. K., Rozenberg, G. S., & Zinchenko, T. D. (2003). *Kolichestvennaya gidroekologiya: metody sistemnoy identifikatsii*. Tol'yatti: IEVB RAN.
 26. Arsan, O. M., Davydov, O. A., & Diachenko, T. M. et al. (2006). *Metody hidroekologichnykh doslidzhen poverkhnevyykh vod*. Romanenko V. D. (Ed.). Kyiv: LOHOS.

СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІХТІОПЛАНКТОНУ МАЛОЇ РІЧКИ, ЩО ПРОТІКАЄ В МЕЖАХ ВЕЛИКОГРИВИСТОЇ ЗАПЛАВИ ДНІПРА

І. І. Абрам'юк, abrmuk@yahoo.com, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
С. О. Афанасьєв, safanasyev@ukr.net, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Мета. На прикладі малої річки, що протікає великогровистою заплавою Дніпра, дослідити видовий склад прибережного іхтіопланктону, динаміку його структури протягом сезону та її відмінності на різних ділянках річки.

Методика. Прибережний іхтіопланктон досліджували протягом чотирьох сезонів 2011–2014 рр. на річці Віта — правій притоці Дніпра, що зазнає підпору внаслідок роботи Канівського гідровузла. Дослідженнями охоплено основне русло, сполучену з ним постійну затоку, а також тимчасово затоплені ділянки заплави та відокремлені від русла заплавні озера. Проби відбирали стандартними мальковими сачками та спливаючими сітками Бедженала. Визначення молоді риб проводили під бінокулярним мікроскопом МБС–9. Періоди і етапи розвитку молоді визначали за системою В. В. Васнецова. Видове різноманіття іхтіопланктону оцінювали за індексом Шеннона.

Результати. Основу прибережного іхтіопланктону протягом травня–липня складали личинки лімnofільних видів риб родини коропових. На початку періоду у руслі та затоці переважали личинки плітки, згодом вони замінювались личинками більш теплолюбних видів, серед яких основу чисельності складала краснопірка. У заплавних озерах та тимчасово залитих ділянках заплави основу прибережного іхтіопланктону навесні складали личинки карася та краснопірки, влітку у заплавних озерах кількісно переважали личинки вівсянки. У зарослих ділянках вперше знайдено личинок інвазивного виду головешки-ротана. Реофільні види риб серед молоді не виявлені, що вказує на відсутність умов для їх нересту при сучасному гідрологічному режимі річки.

Наукова новизна. Вперше досліджено прибережні угруповання ранньої молоді риб малої притоки Дніпра, розглянуто сезонну динаміку їх структури, визначено основні місця нересту промислових видів риб.

Практична значимість. Одержані результати показують важливу роль малих приток Дніпра у відтворенні багатьох видів риб, зокрема промислово цінних. Вони можуть слугувати основою для визначення найбільш придатних місць для відновлення популяцій риб, а також правильного планування заходів, спрямованих на охорону, збереження та відновлення іхтіофауни малих річок та пов'язаних з ними вододім.

Ключові слова: малі річки, крупногривиста заплава, гідрологічний режим, прибережний іхтіопланктон, лімnofільні види, інвазивні види.

СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИХТИОПЛАНКТОНА МАЛОЙ РЕКИ, ПРОТЕКАЮЩЕЙ В ПРЕДЕЛАХ КРУПНОГРИВИСТОЙ ПОЙМЫ ДНЕПРА

И. И. Абрамюк, abrmuk@yahoo.com, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

С. А. Афанасьев, safanasyev@ukr.net, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

Цель. На примере малой реки, протекающей по крупногривистой пойме Днeпра, исследовать видовой состав прибрежного ихтиопланктона, динамику его структуры в течение сезона и ее отличия на разных участках реки.

Методика. Прибрежный ихтиопланктон исследовали в течение четырех сезонов 2011–2014 гг. на реке Вита — правом притоке Днeпра, испытывающем подпор вследствие работы Каневского гидроузла. Исследованиями охвачено главное русло, соединенный с ним постоянный залив, а также временно затопленные участки поймы и отделенные от русла пойменные озера. Пробы отбирали стандартными мальковыми сачками и всплывающими сетками Бэдженала. Определение молодежи рыб проводили под бинокулярным микроскопом МБС–9. Периоды и этапы развития молодежи определяли по системе В. В. Васнецова. Видовое разнообразие ихтиопланктона оценивали по индексу Шеннона.

Результаты. Основу прибрежного ихтиопланктона в течение мая–июля составляли личинки лимnofильных видов рыб семейства карповых. В начале периода в русле и заливе преобладали личинки плотвы, впоследствии они замещались личинками более теплолюбивых видов, среди которых основу численности составляла красноперка. В

пойменных озерах и временно залитых участках поймы основу прибрежного ихтиопланктона весной составляли личинки карася и красноперки, летом в пойменных озерах количественно преобладали личинки верховки. В заросших участках впервые найдены личинки инвазивного вида ротана-головешки. Реофильные виды рыб среди молоди не обнаружены, что указывает на отсутствие условий для их нереста при современном гидрологическом режиме реки.

Научная новизна. Впервые исследованы прибрежные группировки ранней молоди рыб малого притока Днепра, рассмотрена сезонная динамика их структуры, определены основные места нереста промысловых видов рыб.

Практическая значимость. Полученные результаты показывают важную роль малых притоков Днепра в воспроизводстве многих видов рыб, в том числе промыслово ценных. Они могут служить основой для определения наиболее подходящих мест для восстановления популяций рыб, а также правильного планирования мероприятий, направленных на охрану, сохранение и восстановление ихтиофауны малых рек и связанных с ними водоемов.

Ключевые слова: малые реки, крупногривистая пойма, гидрологический режим, прибрежный ихтиопланктон, лимнофильные виды, инвазивные виды.

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 17-25
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.017>
УДК 577.34:574.64:504.062

ЕКСПРЕС-ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ ВОД ПОВЕРХНЕВИХ ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ РИБ *DANIO RERIO*

Е. О. Аристархова, ella.aryst@gmail.com, Інститут агроекології і
природокористування НААН, м. Київ

Мета. Підвищення інформативності та скорочення термінів біотестування вод поверхневих джерел водопостачання м. Житомира за рахунок використання риб даніо реріо (*Danio rerio* Hamilton-Buchanan) замість традиційних тест-об'єктів групи ретикулята (*Poecilia reticulata* Peters) та вивчення їх етології за методом «time sampling».

Методика. Для біотестування були відібрані водні проби з водосховищ р. Тетерів, з використанням яких у акваріумах (10 дм³) формували контрольну та дослідні групи проб за наступною схемою: контрольна група — проби з відстояної (24 год) водопровідної води; дослідна група Д1 — проби з води Денишівського водосховища; дослідна група Д2 — з водозабору Відсічне. Тест-об'єктами були самиці *P. reticulata* та *D. rerio*, у яких визначали показники типової і нетипової рухової активності та кормової поведінки. Експонування особин здійснювали впродовж 12-ти год. В обох дослідних та контрольній групах визначали індекси токсичності вод.

Результати. У дослідженнях було визначено можливість використання для експрес-оцінки токсичності вод поверхневих джерел водопостачання м. Житомира *P. reticulata* та *D. rerio* за методом «time sampling», який полягає у миттєвій фіксації кількості особин, що надають перевагу тому чи іншому акту поведінки. Показано, що риби даніо виявились більш чутливими до комплексної дії забруднюючих речовин у дослідних водах, ніж традиційний тест-об'єкт групи, за тест-реакціями посилення векторного руху та зниження активності поїдання корму (через 12 год від початку біотестування у середньому у групі Д1 на 8,43%, у групі Д2 — на 11,71%). Розрахунок за вказаними етологічними актами індексів токсичності, що перевищували 50%, засвідчив середній рівень забруднення досліджуваних вод.

Наукова новизна. Вперше проведено експрес-оцінку токсичності вод поверхневих джерел водопостачання м. Житомира шляхом спостереження за руховою активністю та кормовою поведінкою риб *D. rerio* з використанням методу «time sampling».

Практична значимість. Результати досліджень використовуються для експрес-оцінки токсичності вод поверхневих джерел водопостачання м. Житомира.

Ключові слова: води джерел водопостачання, експрес-оцінка, біотестування, *P. reticulata*, *D. rerio*, «time sampling».

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Нині в Україні і світі проблема забруднення поверхневих вод постає особливо гостро. Небезпеку несуть не тільки залпові скиди, але й надходження у води помірних кількостей забруднювальних речовин, здатних накопичуватись у ланках водних екосистем. Такі речовини найчастіше знаходяться у концентраціях, що не перевищують ГДК, проте, нагромаджуючись у донних відкладах, тканинах водних рослин і тварин, являють собою справжню загрозу щодо вторинного

© Е.О. Аристархова, 2017

забруднення, коли за градієнтом концентрації виходять з депонованого стану у водне середовище [1]. Особливу роль починають відігравати і наночастинки – забруднювачі, що надходять у водне середовище внаслідок використання нанотехнологій у промисловості, комунальному та сільському господарстві, поведінку яких у гідроекосистемах взагалі поки що неможливо передбачити [2]. Не завжди можливо спрогнозувати також процеси взаємодії речовин, що потрапили у воду, між собою та з речовинами, присутніми у водному середовищі як їх природні компоненти. Внаслідок протікання хімічних реакцій часто синтезуються нові небезпечні речовини, які або важко виявляти, або для визначення яких взагалі відсутні методи дослідження. Тому стає все складніше визначати безпечність поверхневих вод, використовуючи методи фізико-хімічного аналізу. Більшість науковців переконані у необхідності його доповнення біологічними методами досліджень [3–7], серед яких біологічне тестування повинно бути обов'язковим методом визначення токсичності вод.

Проводити біотестування доцільно на уніфікованих організмах різних рівнів біологічної організації — безхребетних, рослинах та хребетних тваринах, зокрема на рибах [6–11]. Відомо, що найбільш поширеними у тестуванні хребетними тваринними формами є риби гуппі [12]. Однак у випадку біологічного тестування якості поверхневих вод, призначених для водопостачання, що повинні бути чистішими, ніж інші, з уніфікованих тест-об'єктів необхідно обрати найчутливіші.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

У літературних джерелах останніх років багато уваги було приділено риbam даніо (брахіданіо) реріо щодо доцільності їх використання для тестування токсичності води. Вважається, що вони є більш чутливими до забруднень, ніж інші види риб, яких використовують у стандартних дослідах [13]. Тому являють інтерес з точки зору використання їх для виявлення загальної токсичності води, зумовленої відносно невисокими концентраціями забруднювальних речовин, на які майже не реагують інші уніфіковані види риб, що застосовуються у міжнародних та національних стандартах. До того ж, важливо це зробити у ранні періоди біотестування, забезпечивши здійснення експрес-оцінки токсичності води на підставі виявлення порушень поведінки особин, що можуть вказувати на наявність небажаних для живих організмів компонентів (важких металів, синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР)), шкідливих органічних речовин тощо).

Отже, у зв'язку з нагальною потребою у проведенні експрес-оцінки стану вод за використання уніфікованих видів риб доцільно визначити, яким актам поведінки (типовим чи нетиповим) у водах з різним рівнем забруднення вони надають перевагу, що може бути виявлено впродовж першої доби тестування.

Відповідно, метою досліджень є підвищення інформативності та скорочення термінів біотестування вод поверхневих джерел водопостачання за рахунок використання риб даніо реріо замість традиційного тест-об'єкта гуппі ретикулята та спостереження за їх етологічними показниками на підставі методу «time sampling».

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Для реалізації мети досліджень у квітні 2016 р. проведено порівняльний аналіз токсичності вод, проби яких було відібрано у розрахунок 8 дм³ на групу за загальноприйнятою методикою сумісно із співробітниками КП «Житомирводоканал» з водосховищ р. Тетерів та водопровідної мережі водоканалу [4, 5]. З відібраних проб води у акваріумах (10 дм³) формували контрольну та дослідні групи за наступною схемою:

- *контрольна група* — проби відстояної (24 год) водопровідної води;
- *дослідна група Д1*: проби води — з Денишівського водосховища;
- *дослідна група Д2*: проби води — з водозабору Відсічне.

Тест-об'єкти: самиці риб гуппі ретикулята (*P. reticulata*) та даніо періо (*D. rerio*) — аналоги за віком (3 тижні) та розміром (4,5±0,5 см).

Утримання риб проводилось в акваріумах об'ємом по 10 дм³ води, концентрація розчиненого кисню у якій не опускалась нижче 4 мгО/дм³, за температури +20±2,5°C, густоти посадки — одна особина/дм³ та в умовах природної освітленості й заміни води відповідної якості через кожні 2 доби.

Годували риб сухим тваринним (дафнії, циклопи) та живим рослинним кормом (водорості, листя водних рослин).

Тест-реакції: плавний і стрибкоподібний (векторний) рух, контакти з іншими особинами, іммобілізація, поїдання корму та детриту.

Експонування: на гостру токсичність — впродовж 12-ти год.

Біотестування: спостереження за етологічними актами особин за використання методу «time sampling» через кожні 4 год.

Експерименти проводили за 3-разової повторності, використовуючи стандартні методики та власні розробки [4, 5, 10, 12, 13].

Отримані у дослідних групах дані порівнювали з такими контрольної. Для обох дослідних проб води розраховували індекс токсичності, використовуючи наступну формулу:

$$T = \frac{I_k - I_o}{I_k} 100$$

де: T — індекс токсичності, %;

I_k — величина тест-реакції особин у контролі;

I_o — величина тест-реакції особин у досліді.

Для розрахунку індексу токсичності вод за реакціями риб, що характеризують акти їх нетипові поведінки, формула видозмінюється таким чином, що величини тест-реакції особин у контролі та досліді замінюються на протилежні. У будь-якому випадку індекс токсичності вод не повинен перевищувати 50%, незалежно від тест-об'єктів, які використовуються у дослідженнях.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Вибір уніфікованих організмів, перш за все хребетних, за допомогою тест-реакцій яких можна виявляти ступінь забруднення поверхневих вод з більш високою інформативністю та з меншою тривалістю часу, ніж за аналогічними

реакціями традиційних тест-об'єктів, вважається одним з пріоритетних питань біотестування якості джерел водопостачання. Тому тест-реакції особин мають бути достатньо чутливими до різних рівнів токсичності вод, легко фіксуватися спостерігачем, а також піддаватися швидкому опрацюванню отриманих результатів тестування. До таких високочутливих реакцій організмів слід віднести особливості їх поведінки у нетипових умовах середовища (у тому числі за наявності забруднювальних речовин) порівняно з типовими умовами. Тобто певні етологічні порушення особин будуть свідчити про рівень забруднення вод.

Виходячи із зазначеного вище, у проведених нами дослідженнях як тест-організми на чутливість до токсичних компонентів вод поверхневих джерел водопостачання м. Житомира випробовували риб даніо реріо, порівнюючи реакції їх поведінки з реакціями традиційних тест-об'єктів гуппі ретикулята.

Стандартні методики визначення гострої летальної токсичності речовин та природних вод на даніо реріо (1996) [13] і гуппі ретикулята (1997) [12] передбачали визначення показника смертності з експозицією особин впродовж 96 год тестування. Проте використання у наших експериментах прижиттєвих етологічних показників засвідчило можливість застосування деяких з них як тест-реакцій із значно меншою експозицією (12 год.), ніж за існуючих стандартів. До того ж, для визначення етологічних актів особин було використано метод «time sampling», який дозволив дуже швидко виявити помітні відхилення від типових етологічних реакцій організмів під впливом забруднювальних речовин. Сутність методу полягає у миттєвій фіксації кількості тест-об'єктів, що надають перевагу тому чи іншому акту поведінки.

Основні етологічні показники риб відображено у табл. 1.

Таблиця 1. Порівняльний аналіз біотестування вод водосховищ р. Тетерів з використанням риб гуппі ретикулята та даніо реріо за методом «time sampling» (n=30)

Етологічні реакції особин (%)	Кількість особин та індекс токсичності досліджуваних вод, %				
	К	Д1	Т _{д1}	Д2	Т _{д2}
Гуппі ретикулята					
Типова рухова активність:	43,33	20,00	53,84	21,89	46,15
• плавні рухи	30,00	13,33	55,56	16,67	44,44
• контакти з іншими особинами	6,67	відсут.	відсут.	відсут.	відсут.
• малорухливий стан	6,67	6,67	відсут.	6,67	відсут.
Нетипова рухова активність*:	13,33	36,67	63,64	33,33	60,00
• векторні рухи*	10,00	21,89	57,14	20,00	50,00
• биття об скло*	3,33	6,67	50,00	6,67	50,00
• іммобілізація*	відсут.	6,67	відсут.	6,67	відсут.
Кормова поведінка:	43,33	43,33	відсут.	43,33	відсут.
• поїдання тваринного корму	20,00	6,67	66,67	10,00	50,00
• живлення детритом*	10,00	21,89	57,14	20,00	50,00
• живлення рослинами	13,33	13,33	відсут.	13,33	відсут.

Етологічні реакції особин (%)	Кількість особин та індекс токсичності досліджуваних вод, %				
	К	Д1	Т _{Д1}	Д2	Т _{Д2}
Данію перію					
Типова рухова активність:	43,33	16,67	61,54	20,00	53,85
• плавні рухи	30,00	10,00	66,67	13,33	55,56
• контакти з іншими особинами;	6,67	відсут.	відсут.	відсут.	відсут.
• малорухливий стан	6,67	6,67	відсут.	6,67	відсут.
Нетипова рухова активність*:	10,00	40,00	75,00	33,33	60,00
• векторні рухи*	6,67	26,67	75,00	21,89	71,43
• биття об скло*	3,33	3,33	відсут.	3,33	відсут.
• імобілізація*	відсут.	10,00	відсут.	6,67	відсут.
Кормова поведінка:	46,67	43,33	7,14	46,67	відсут.
• поїдання тваринного корму	21,89	6,67	71,43	10,00	57,14
• живлення детритом*	10,00	21,89	57,14	21,89	57,14
• живлення рослинами	13,33	13,33	відсут.	13,33	відсут.

Примітки: Т_{Д1}, Т_{Д2} — індекси токсичності досліджуваних вод, %;

відсут. — відсутність етологічної реакції особин та/або токсичності води;

* — показники, за якими індекс токсичності розраховується за видозміненою формулою:

$$T = \frac{I_o - I_k}{I_o} 100, \%$$

За період 12-годинного біотестування з використанням риб виявлено етологічні акти, що можуть бути використані для визначення загальної токсичності досліджуваних вод: плавні та векторні (стрибокоподібні) рухи риб, поїдання ними корму та живлення детритом. Проведення спостережень за іншими тест-реакціями особин для виявлення небезпечності вод поверхневих джерел водопостачання було визнано недоцільним.

Наведені у таблиці дані свідчать про те, що поведінка особин обох видів риб у дослідних групах суттєво відрізнялась від поведінки особин контрольної групи. Перші п'ять хвилини перебування в акваріумах дослідні риби знаходились майже на поверхні води, на відміну від контрольних, які досить глибоко занурились у воду, виявляючи ознаки типової рухової активності. У подальшому особини контрольних груп надавали перевагу плавним рухам та поїданню сухого тваринного корму, на відміну від дослідних, серед яких переважали акти нетипової рухової та кормової поведінки, а також тимчасової імобілізації.

Суттєва відмінність у прояві тест-реакцій, що свідчать про токсичність вод (за значеннями відповідних індексів), була визначена також між дослідними групами гуппі та данію. Так, порівняно з гуппі, у данію виявлена менша (на 11,11% у групі Д1 та 11,12% у групі Д2) відносна кількість особин з плавними рухами і більша (на 17,86% у групі Д1 і 21,43% у групі Д2) — з векторними рухами, що

вказує на підвищену чутливість риб даніо до небезпечних компонентів вод, на які вони реагують активізацією нетипової рухливості. Різниця між тест-об'єктами гуппі та даніо відмічалась і у відношенні кормової поведінки. Так, значення індексу токсичності вод, розраховане за показником кількості особин риб даніо, що надавали перевагу корму тваринного походження, у дослідній групі Д1 було на 4,76%, а у групі Д2 — на 7,14% вищим, ніж значення індексу токсичності вод, розраховане за показниками особин гуппі. Деякі етологічні показники риб (переважно зменшення частки плавного і збільшення — векторного руху) дозволили виявити майже на 4% вищий рівень токсичності вод Денишівського водосховища (група Д1) порівняно з водозабором Відсічне (Д2). Розрахунок за вказаними етологічними актами індексів токсичності, величини яких знаходились переважно у межах 50—75%, засвідчив середній рівень токсичності досліджуваних вод.

За даними біотестування було використано шкалу рівнів токсичності вод, апробовану у наших попередніх дослідженнях на нижчих ракоподібних, яка цілком може бути використана і для визначення рівнів токсичності вод за біотестуванням з використанням риб даніо [4]: 1—25 % — допустимий рівень токсичності; 26—50% — низький рівень токсичності; 51—75% — середній рівень токсичності; 76—100% — високий рівень токсичності. Відповідно до неї, визначено, що води водосховищ р. Тетерів мають середній рівень токсичності (значення відповідних індексів у межах 51—75%).

Таким чином, аналіз отриманих даних свідчить про те, що запропонований для проведення експрес-оцінки води методом «time sampling» тест-організм даніо реріо за реакціями порушення рухової активності (перевага векторних рухів, тимчасова іммобілізація) та кормової поведінки (поїдання корму і детриту) є більш чутливим до гострої токсичності вод, ніж гуппі ретикулята.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Визначена перевага використання риб *D. rerio* порівняно з гуппі за проведення методу «time sampling» для експрес-оцінки токсичності вод поверхневих джерел водопостачання м. Житомира за етологічними показниками (руховою активністю та кормовою поведінкою). Риби даніо виявились більш чутливими до комплексної дії забруднювальних речовин у досліджуваних водах, ніж традиційний тест-об'єкт гуппі за тест-реакціями посилення векторного руху та зниження активності поїдання корму (через 12 год від початку біотестування у середньому у групі Д1 на 8,43% і у групі Д2 на 11,71%). Розрахунок за вказаними етологічними актами індексів токсичності, величини яких знаходились переважно у межах 50—75%, засвідчив середній рівень токсичності дослідних вод.

У подальшому доцільно використати ембріони риб *D. rerio* (у тому числі отримані від протестованих самиць) для визначення ембріотоксичної і тератогенної дії вод р. Тетерів.

ЛІТЕРАТУРА

1. River watch. Manual for public environmental monitoring. SPb. : Friends of the Baltics / Coalition Clean Baltics, 2015. 32 p.

2. Nanostructured zinc oxide-cotton fibers: synthesis, characterization and applications / El-Nahhal I. M. et al. // *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*. 2013. P. 3970—3975.
3. Malik A., Grohmann E., Akhtar R. *Environmental Deterioration and Human Health: Natural and anthropogenic determinants*. Dordrecht ; Heidelberg ; London ; New York : Springer, 2014. P. 8—23.
4. Аристархова Е. О. Експрес-оцінка потенційної небезпеки води методом біотестування на *Daphnia magna* S. // *Вісник аграрної науки*. 2017. № 2. С. 50—54.
5. ДСанПіН 2.2.4-171-10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. Київ : МОЗ України, 2010. 50 с. (Державні стандартні норми та правила).
6. Zooplankton (*Cladocera*) species turnover and long-term decline of *Daphnia* in two high mountain lakes in the Austrian Alps / Nevalainen L. et al. // *Hydrobiologia*. 2014. Vol. 722 (1). P. 75—91.
7. ISO 10706: 2000. Water quality. Determination of long term toxicity of substances to *Daphnia magna* Straus (*Cladocera*, *Crustacea*). 26 p.
8. Jakob U., Reichmann D. *Oxidative Stress and Redox Regulation*. Dordrecht ; Heidelberg ; London ; New York : Springer, 2013. P. 59—126.
9. Скок С. В. Оцінювання якості питної води м. Херсона методом біотестування // *Агроекологічний журнал*. 2015. № 2. С. 26—30.
10. Комплексна оцінка токсичності водних зразків за допомогою рослинних і тваринних тест-організмів / Осмалений М. С. та ін. // *Фактори експериментальної еволюції організмів*. 2015. Т. 16. С. 74—77.
11. Спосіб комплексного визначення якості генетично безпечної питної води : пат. 106035 Україна. № у 201510804 ; заявл. 5.11.2015 ; опубл. 11.04.2016 ; Бюл. № 7.
12. КНД 211.1.4.057-97. Методика визначення гострої летальної токсичності води на рибах *Poecilia reticulata* Peters.
13. ISO 7346-1:1996. Water quality. Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [*Brachydanio rerio* Hamilton-Buchanan (*Teleostei*, *Cyprinidae*)]. Part 1 : Static method.

REFERENCES

1. *River watch. Manual for public environmental monitoring* (2015). Saint-Petersburg: Friends of the Baltics / Coalition Clean Baltics.
2. El-Nahhal, I. M., Zourab, S. M., & Kodeh, F. S. (2013). Nanostructured zinc oxide-cotton fibers: synthesis, characterization, and applications. *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, 3970-3975.
3. Malik, A., Grohmann, E., & Akhtar, R. (2014). *Environmental Deterioration and Human Health: Natural and anthropogenic determinants*. Dordrecht; Heidelberg; London; New York: Springer, 8-23.
4. Arystarkhova, E. O. (2017). Ekspres-otsinka potentsiinoi nebespeky vody metodom biotestuvannia na *Daphnia magna* S. *Visnyk agrarnoi nauky [News of agrarian sciences]*, 2, 50-54.
5. Higiyenichni vymogy do vody pytnoi, prysnachenoj dlya spo vzhyvannya ludynoiu (2010). *DSanPiN 2.2.4-171-10*. Kyiv: Ministerstvo okhorony sdorovia Ukrainy.

6. Nevalainen, L., Ketola, M., & Korosi, J. B. (2014). Zooplankton (*Cladocera*) species turnover and long-term decline of *Daphnia* in two high mountain lakes in the Austrian Alps. *Hydrobiologia*, 722(1), 75-91.
7. Water quality. Determination of long term toxicity of substances to *Daphnia magna* Straus (*Cladocera, Crustacea*). BS 6068-5. 28: 2000, ISO 10706: 2000.
8. Jakob U., & Reichmann, D. (2013). *Oxidative Stress and Redox Regulation*. Dordrecht; Heidelberg; London; New York: Springer, 59-126.
9. Skok S. V. (2015). Otsiniuvannia yakosti pytnoi vody m. Khersona metodom biotestuvannia. *Ahroekolohichniy zhurnal*, 2, 26-30.
10. Osmalenyi, M. S., Holovkov, A. M., Nanijeva, A. V., & Vergolias, M. R. (2015). Kompleksna otsinka toksychnosti vodnykh srazkiv za dopomogoju roslinnykh I tvarynnykh test-orhanizmiv. *Fakty eksperymentalnoi evolutsii orhanismiv*, 16, 74-77.
11. Honcharuk, V. V. (2016). *Sposib kompleksnoho vyznachennia yakosti henetychno bezpechnoi pytnoi vody*. Patent of Ukraine. № 106035.
12. Metodyka vysnashennia gostroi letalnoi toksychnosti vody na rybakh *Poecilia reticulata* Peters (1997). *KND 211.1.4.057–97*.
13. Water quality. Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [*Brachydanio rerio* Hamilton-Buchanan (*Teleostei, Cyprinidae*)]. – Part 1: Static method (1996). *ISO 7346-1:1996*.

ЕКСПРЕС-ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ВОД ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЫБ *DANIO RERIO*

Э.А. Аристархова, ella.aryst@gmail.com, Институт агроэкологии и природопользования НААН, г. Киев

Цель. Повышение информативности и сокращение сроков биотестирования вод поверхностных источников водоснабжения г. Житомира за счет использования рыб данио рерио (*Danio rerio* Hamilton-Buchanan) вместо традиционных тест-объектов группы ретикулята (*Poecilia reticulata* Peters) и изучение их этологии по методу «time sampling».

Методика. Для биотестирования были отобраны водные пробы из водохранилищ р. Тетерев, с использованием которых в аквариумах (10 дм³) формировали контрольную и опытные группы по следующей схеме: контрольная группа — пробы отстоявшейся (24 ч) водопроводной воды; опытная группа Д1 — пробы воды из Денишовского водохранилища; опытная группа Д2 — из водозабора Отсечное. Тест-объектами были самки *P. reticulata* та *D. rerio*, у которых определяли показатели типичной и нетипичной двигательной активности и кормового поведения. Экспонирование особей производили в течение 12-ти часов. В обеих опытных и контрольной группах определяли индексы токсичности вод.

Результаты. В исследованиях была определена возможность использования для экспресс-оценки токсичности вод поверхностных источников водоснабжения г. Житомира *P. reticulata* и *D. rerio* по методу «time sampling», который заключается в мгновенной фиксации количества особей, которые демонстрируют тот или иной акт поведения. Показано, что рыбы данио оказались более чувствительными к комплексному действию загрязняющих веществ опытных вод, чем традиционные тест-объекты группы по тест-реакциям усиления векторного движения и снижения активности поедания корма (через 12 ч от начала биотестирования в среднем по группе Д1 на 8,43% и по группе Д2 — на 11,71%). Расчет по указанным этологическим актам индексов токсичности, которые превышали 50%, засвидетельствовал средний уровень загрязнения последующих вод.

Научная новизна. Впервые проведена экспресс-оценка токсичности вод поверхностных источников водоснабжения г. Житомира путем наблюдения за двигательной активностью и комовым поведением рыб *D. rerio* с использованием метода «time sampling».

Практическая значимость. Результаты исследований используются для экспресс-оценки токсичности вод поверхностных источников водоснабжения г. Житомира.

Ключевые слова: воды источников водоснабжения, экспресс-оценка, биотестирование, *P. reticulata*, *D. rerio*, «time sampling».

EXPRESS-ASSESSMENT OF TOXISITY OF WATERS FROM SURFACE WATER SUPPLY SOURCES WITH THE USE OF *DANIO RERIO*

E. Arystarkhova, ella.aryst@gmail.com, Institute of Agrarian Ecology and Nature Use of National Academy of Agrarian Sciences, Kyiv

Purpose. An increase in the informativeness and shortening of the timing required for biotesting of water from surface water sources in the city of Zhytomyr with the use of *Danio rerio* Hamilton-Buchanan instead of the traditional test object *Poecilia reticulata* Peters and observation of their ethology using the «time sampling» method.

Methods. Water samples were collected from reservoirs of the Teteriv river in April 2016. They were used placed in aquaria (10 dm³), where control and experimental groups were formed according to the following scheme: control group – samples with settled (24 hours) tap water; experimental group D1 – water samples from the Denishivsky reservoir; experimental group D-2 – from water intake Vidsichne. Test specimens were females of *P. reticulata* and *D. rerio*, in which the parameters of typical and non-typical motor activity and feeding behavior were determined. Fish were exposed to water for 12 hours. Water toxicity indexes were determined for both experimental and control groups.

Findings. The studies showed the possibility of using the "time sampling" method for rapid assessment of the water toxicity of surface water sources of Zhytomyr with the use of *P. reticulata* and *D. rerio*, which consists in the instantaneous fixation of the number of individuals preferring different behavior acts. *D. rerio* were more susceptible to the combined action of pollutants in experimental waters than the traditional test object guppies regarding the test reactions of increasing the vector movement and reducing the activity of consumed feed (in 12 hours after the start of biotesting on average by 8,43% in the group D1 and by 11,71% in the group D2). The calculation of toxicity indexes based on the above-mentioned ethological acts, which exceeded 50%, detected an average level of pollution of the experimental water.

Originality. For the first time, the rapid assessment of the water toxicity of surface water sources in the city of Zhytomyr was carried out by observing the motor activity and feeding behavior of *D. rerio*.

Practical value. The results of the research are used for the rapid assessment of the toxicity of water of surface water sources in the city of Zhytomyr.

Key words: waters of water supply sources, rapid assessment, biotesting, *P. reticulata*, *D. rerio*, «time sampling».

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 26-36
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.026>
УДК 597-153:581.526:325+639.311:631.86/.87

ІНФОРМАЦІЙНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПЛАНКТОНУ ДОСЛІДНИХ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ ПІД ДІЄЮ РІЗНИХ ВИДІВ ОРГАНІЧНИХ ДОБРІВ ЗА ІНДЕКСОМ ШЕННОНА

Н. П. Чужма, n_chuzhma@ukr.net, Інституту рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Провести порівняльний аналіз індексів інформаційного різноманіття розвитку фітопланктону у вирощувальних рибницьких ставках, удобрених біогумусом, «Рівермом» і традиційними видами органічних добрив, для визначення наявності чи відсутності деградації фітопланктону цих водойм за умов застосування вказаних добрив.

Методика. Представлено результати трьох років дослідження розвитку фітопланктону у ставках, в яких вирощувався рибопосадковий матеріал коропа в моно- та полікультурі за інтенсивної та екстенсивної технологій вирощування. Інформаційне різноманіття водоростевих угруповань ставів визначали, розраховуючи індекс Шеннона за кількісними характеристиками розвитку фітопланктону.

Результати. Проведені дослідження показали: внесення досліджуваних добрив не призводить до дегенерації водоростевих угруповань у вирощувальних ставках, яка б виражалась у збідненні інформативного біорізноманіття кількісних характеристик фітопланктону; ступені інформативного різноманіття чисельності та біомаси фітопланктону змінюються у часі незалежно один від одного; сезонна динаміка ступеня інформативного різноманіття біомаси фітопланктону визначається кількістю внесення досліджуваних органічних добрив — перегною ВРХ, біогумусу і «Ріверму»; сезонна динаміка ступеня інформативного різноманіття чисельності фітопланктону залежить, насамперед, від природних чинників; збільшення чисельності синьозелених водоростей до кінця сезону, як і спалахи протягом сезону не є наслідком дії внесених добрив.

Наукова новизна. Вперше використано індекс інформаційного різноманіття за Шенноном для характеристики розвитку фітопланктону вирощувальних рибницьких ставів за умови застосування для їх удобрення біогумусу та «Ріверму».

Практична значимість. Отримані результати свідчать про перспективність використання біогумусу та «Ріверму» для стимулювання розвитку природної кормової бази риб, зокрема при вирощуванні рибопосадкового матеріалу коропа у вирощувальних ставках

Ключові слова: Фітопланктон, індекс інформаційного різноманіття за Шенноном, вирощувальні стави, органічні добрива, біогумус, "Ріверм".

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Відповідно до застосування індексу Шеннона (H) в практиці гідробіологічних досліджень [1], ознакою деградації фітопланктону є те, що індекс Шеннона набуває значень, як правило, не вищих від 1. Такі показники індексу Шеннона свідчать про те, що фітопланктон у досліджуваній водоймі представлений монодомінантним комплексом і основна частина (понад 50 %) досліджуваної ознаки, біомаси чи чисельності, формується за рахунок 1 — 2 видів. Значення індексу $H \geq 2$ свідчать про те, що фітопланктон представлений полідомінантним комплексом видів, тобто величина певної його кількісної характеристики формується представниками більшості таксономічних груп.

© Н. П. Чужма, 2017

Аналізуючи кількісні характеристики розвитку фітопланктону за допомогою індексу Шеннона слід враховувати, що оскільки індивідуальна маса окремих клітин водоростей може відрізнятися у багато разів, індекс Шеннона визначають для кількості видів і чисельності (H_N) та окремо — для кількості видів і біомаси (H_B) фітопланктону.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Одним з аспектів аналізу отриманих даних про розвиток фітопланктону був розрахунок індексу інформаційного різноманіття за Шенноном. Необхідність визначення цього індексу спричинена потребою перевірки, за допомогою відомих математичних методів, яким чином впливає застосування різних видів органічних добрив на водоростеві угруповання дослідних вирощувальних ставів, і чи не призводять нові чи традиційні методи удобрення ставів до деградації в них фітопланктону.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження були проведені в лабораторії гідробіології Інституту рибного господарства НААН та на базі дослідного господарства «Нивка».

Представлено результати, отримані протягом трьох років дослідження розвитку фітопланктону у ставах, в яких вирощувався рибопосадковий матеріал цьоголіток коропа в монокультурі та полікультурі з рослиноідними рибами за інтенсивної та випасної технологій. Площа дослідних ставів становила 0,5 га, середня глибина — 1 м. Для стимулювання розвитку природної кормової бази риб, вирощувальні стави удобрювались як традиційним видом органічних добрив — перегноем ВРХ, так і двома дослідними видами органічних добрив — біогумусом та «Рівермом», які є фактично різними формами продуктів трофічного перероблення компосту і гною каліфорнійським черв'яком (*Eisenia foetida andrei*). Причому, перегній ВРХ вносили з розрахунку 3 т/га, біогумус — у кількості 600 кг/га, а «Ріверм», застосовували методом розливу по воді у кількості 50 л на 500 м³.

Загалом, розглядаються п'ять варіантів досліду, промарковані відповідно до застосованих добрив і згруповані таким чином, що разом розглядаються результати досліджень, отриманих протягом одного року:

- 1 рік — 1ПГ — перегній, 1К — контроль;
- 2 рік — 1Б — біогумус, 2Р — Ріверм;
- 3 рік — 3Б — біогумус, 3Р — Ріверм, 3К — контроль.

Умови середовища у вирощувальних ставах контролювались протягом сезону. Хімічні параметри води дослідних і контрольних водойм за період досліджень знаходились в межах рибницьких норм.

Для вивчення динаміки розвитку фітопланктону у вирощувальних ставах відбір гідробіологічних проб проводити 2–3 рази на місяць. Чисельність та біомасу фітопланктону визначали за загальноприйнятим розрахунково-об'ємним методом у фіксованих 40% -вим формаліном пробах води [2 — 4].

Визначення видової і надвидової таксономічної приналежності планктонних водоростей проводили за визначниками прісноводних водоростей [5—9].

Інформаційне різноманіття фітопланктону розраховували за індексом Шеннона [10] за формулами:

Індекс Шеннона за чисельністю (H_N):

$$H_N = \sum_{i=1}^n \frac{N_i}{N} \log_2 \frac{N_i}{N},$$

Індекс Шеннона за біомасою (H_B):

$$H_B = \sum_{i=1}^n \frac{B_i}{B} \log_2 \frac{B_i}{B},$$

де N_i (B_i) — чисельність (біомаса) i -го виду;

N (B) — загальна чисельність (біомаса) фітопланктону;

n — кількість видів.

Максимум інформаційного різноманіття відповідає ситуації, коли усі організми водоростевого угруповання належать до різних видів ($N=n$ за $N_i=1$), у той час як мінімум відповідає ситуації, за якої усі організми належать тільки до одного виду ($N=N_i$ при $n=1$).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Індекс Шеннона розраховували за кількісними характеристиками розвитку фітопланктону, визначеними протягом трьох років гідробіологічних досліджень у дослідних і контрольних вирощувальних ставах. Отримані значення індексу Шеннона, а також результати їх статистичного опрацювання представлені в табл. 1.

Таблиця 1. Середньосезонні значення індексу Шеннона (H) за чисельністю (H_N) та біомасою (H_B) фітопланктону дослідних ставів (біт/екз.)

Індекс Шеннона	Варіанти дослідів						
	1ПГ	1К	2Б	2Р	3Б	3Р	3К
H_N (min-max)	1,53-3,12	1,61-3,69	1,16-3,37	1,90-3,37	1,66-4,20	1,20-4,04	1,10-3,94
H_N	2,35	2,48	2,25	2,73	2,81	2,60	2,31
H_B (min-max)	2,21-3,68	2,59-3,57	2,32-3,79	2,45-3,91	2,73-3,86	2,60-3,58	2,53-4,16
H_B	3,26	3,25	3,05	3,29	3,22	3,10	3,18
$\pm m$ (H_N)	0,20	0,30	0,29	0,22	0,33	0,37	0,36
$\pm m$ (H_B)	0,21	0,12	0,22	0,21	0,14	0,14	0,20
σ (H_N)	0,53	0,79	0,77	0,59	0,87	0,97	0,95
σ (H_B)	0,55	0,31	0,59	0,55	0,38	0,37	0,52

Примітка. min-max — межі коливання індексу, $\pm m$ — стандартна похибка середньої арифметичної, σ — середньоквадратичне відхилення.

З даних таблиці видно, що незалежно від умов конкретних дослідів, середньосезонні значення індексу Шеннона протягом всіх років досліджень ні за чисельністю, ні за біомасою не набували значень, нижчих від критичного рівня, яким вважається 2. Отже, у відповідності до показників індексу Шеннона, фітопланктон у всіх випадках був представлений полідомінантним комплексом. Таким чином, застосовані рибогосподарські технології і, передусім, використання кожного із досліджуваних методів удобрення ставів, не було для водоростевих угруповань деструктивним і агресивним чинником і не призводило до деградації в ставах фітопланктону, яка б виражалась у збідненні інформаційного різноманіття кількісних параметрів його розвитку.

Як видно з табл. 1, середньосезонні значення індексу Шеннона, обчислені за біомасою фітопланктону для кожного із ставів (варіантів досліду), відрізнялися від тих, що були обчислені за його чисельністю, як за абсолютними показниками, так і за розмахом варіабельності даного показника. У даному разі, незважаючи на те, що самі чисельність і біомаса фітопланктону визначаються у різних одиницях вимірювання, індекс Шеннона (a значить — і середньоквадратичне відхилення (σ)) має однакову розмірність — біт/екз., а, отже, може бути порівнюваним. Особливо це справедливо щодо інформаційного різноманіття біомаси фітопланктону, яке є суттєво вищим, ніж аналогічний показник за чисельністю фітопланктону, про що буде сказано далі.

Всі абсолютні значення H_N були значно вищими відповідних значень H_B (в середньому на 40%). Отже, з одного боку, показник інформаційного різноманіття чисельності фітопланктону в кожний конкретний момент часу є суттєво меншим, ніж такий для його біомаси, з іншого, варіабельність показника H_N протягом сезону є значно вищою, ніж H_B (рис. 1 і 2).

Характер сезонної динаміки величин H_B і H_N , визначених, відповідно, за біомасою та чисельністю фітопланктону одного і того ж ставу, відрізняється між собою значно більше ніж динаміка одноіменних показників індексу Шеннона фітопланктону різних ставів протягом одного року. Спостерігається подібність зміни у часі показників H_N , визначених за чисельністю фітопланктону різних ставів протягом одного і того ж сезону. Характер такої подібності змін сезонної динаміки показників H_N має високий ступінь кореляційного зв'язку.

Сезонні коливання показника H_N характеризуються однією спільною рисою, яка проявляється у всіх досліджених випадках: значення індексу Шеннона за чисельністю фітопланктону до кінця вегетаційного сезону, меншою чи більшою мірою, але неодмінно знижується (в той час як значення H_B можуть залишатися порівняно стало високими).

Для порівняно різких коливань значень H_N протягом кожного з сезонів в кожному зі ставів не спостерігається адекватної за розмахом амплітуди коливань параметра H_B . З аналізу сезонної динаміки показників H_N і H_B та відносної біомаси представників домінуючих видів водоростей в тих чи інших пробах видно, що частки домінантних і субдомінантних таксонів характеризувались порівняно невисокими абсолютними значеннями, зміною протягом сезону видів-домінантів і не прослідкованою тенденцією до будь-яких усталених хронологічних змін.

Рис. 1. Сезонна динаміка індексу Шеннона за біомасою фітопланктону (H_b) дослідних і контрольних ставів

Загалом, у формуванні біомаси фітопланктону брали більш-менш рівнозначну участь представники багатьох таксонів (що і підтверджують більш вищі показники індексу Шеннона), звичайний рівень часток домінування за біомасою у видів-домінантів становив 20—30%. За всі роки досліджень вказані показники не перевищували рівня 54—58 %, причому таких високих значень цей параметр досягав вкрай рідко і фіксувався лише 1–2 рази на сезон. Так, наприклад, у варіанті досліді 1Пг, у червневій пробі, частка *Trachelomonas armata* становила 58% від загальної біомаси, у варіанті 2Б, у пробах за червень, серпень і вересень, частки домінуючих *Scenedesmus quadricauda*, *Aphanizomenon flos-aquae*, і *Microcystis aeruginosa* досягали, відповідно 54—55% всієї біомаси, а у варіанті 2Р 55% біомаси у травневій пробі цього ж року утворював *T. armata*. В контролі 3К в кінці серпня 2005 року 55% біомаси утворював *M. aeruginosa*.

Рис. 2. Сезонна динаміка індексу Шеннона за чисельністю фітопланктону (H_N) дослідних і контрольних ставів

Натомість, частки домінування розраховані за чисельністю фітопланктону у цих же ставах характеризувались значно вищими величинами для видів-домінантів (максимальні величини до 72–86%), причому простежувалась закономірність збільшення даного показника до кінця сезону. У більшості випадків високі показники часток домінуючих за чисельністю видів, які до того ж стрімко зростали, наприкінці сезонів були характерними для одного представника синьозелених — *M. aeruginosa*. Слід враховувати, що такі спалахи чисельності *M. aeruginosa* не були пов'язані з продукуванням адекватної біомаси: так, *M. aeruginosa* міг становити 86% чисельності фітопланктону у пробі і лише 45% його біомаси.

Отже, виявлені невідповідності характерів сезонної динаміки показників H_N і H_B є результатом бурхливого розмноження синьозелених водоростей, зокрема *M. aeruginosa*, яке посилюється до кінця сезону.

Однак, виявлені спалахи чисельності *M. aeruginosa* дають настільки невисоку біомасу, що не здатні вагомо перерозподілити представництво різних таксономічних груп у загальній біомасі ставу, а значить — і синхронно змінити показники H_B . Спільність такої тенденції для всіх варіантів досліді (включно з контролем, де жодні добрива не вносились) свідчить про те, що такі спалахи чисельності синьозелених водоростей не можуть розглядатися як результат дії внесених досліджуваних добрив, а є природним процесом.

Підтвердженням цьому є той факт, що хронологічна динаміка індексу Шеннона за чисельністю фітопланктону, як вже було сказано, протягом одного року дослідження виявилась надзвичайно синхронною, як у контролі, так і у всіх варіантах дослідів. В табл. 2 приведено результати математичного вираження сили даної кореляції, проведеного із застосуванням методу Z Фішера, спеціально адаптованого для малих розмірів вибірки. Динаміка сезонних змін показника H_N у різних ставках корелює між собою з високою силою ($r = 0,71-0,98$), в той час як коефіцієнт кореляції між показниками H_B фітопланктону цих же ставів у ці ж роки був значно нижчим, і в жодному випадку не досягав критичного рівня 0,7, вище якого кореляція вважається сильною.

Таблиця 2. Кореляційна залежність між рядами значень індексу Шеннона за чисельністю та біомасою фітопланктону

Показник	Порівняльні пари варіантів досліді				
	1ПГ/1К	2Б/2Р	3Б/3Р	3Б/3К	3Р/3К
$r(H_N)/tz$	<u>0,74/1,92</u>	<u>0,71/1,76</u>	<u>0,93/3,32</u>	<u>0,97/4,35</u>	<u>0,98/4,53</u>
p	$p > 0,1$	$p > 0,1$	0,05 > $p > 0,02$	0,01 > $p > 0,002$	0,01 > p
$r(H_B)/tz$	<u>0,64/1,53</u>	<u>0,06/0,12</u>	<u>0,03/0,05</u>	<u>0,68/1,66</u>	<u>0,06/0,13</u>
p	$p > 0,1$	$p > 0,1$	$p > 0,1$	$p > 0,1$	$p > 0,1$

П р и м і т к а: Індекс Шеннона за чисельністю (H_N) та біомасою (H_B) фітопланктону; коефіцієнт кореляції (r) (чисельник — r / критерій tz Фішера; знаменник — показник достовірності коефіцієнта кореляції P , жирним виділені статистично достовірні значення).

З даних таблиці видно, що, принаймні, у двох випадках із п'яти, високий ступінь кореляції між показниками H_N не можна вважати статистично достовірним результатом ($p > 0,1$), але причиною цього є не низький рівень критерію tz Фішера, а невисока кількість ступенів свободи, яка визначається величиною вибірки, тобто в даному разі кількістю відібраних проб за сезон.

Уникнути тієї обставини, що кількість проб, відібраних у конкретному ставу окремо за кожен досліджуваний сезон, є недостатньо великим (з точки зору статистики) числом, можна у наступний спосіб. Протягом трьох послідовних сезонів для проведення дослідів фактично використовувались ті самі стави. Результати гідробіологічних досліджень для однієї пари таких ставів можна розглянути не як суму дискретних сезонів окремо на кожний з водойм, а як один тривалий період дослідження. Хоч умови різних варіантів досліді-контролю з

року в рік змінювались, важливим є лише те, щоб проби у порівнюваних водоймах відбирались синхронно. Таким чином, можна дослідити ступінь взаємної кореляції (чи відсутності такої) між характеристиками динаміки показників H_N^1 і H_N^2 та, відповідно, H_B^1 і H_B^2 на більш тривалому проміжку часу. Адже відомо, що, з одного боку, слабкі кореляційні зв'язки можуть бути зафіксованими лише за достатньо великої кількості спостережень, з іншого, навіть сильна кореляція може бути надійно статистично доведена лише на великій кількості вимірювань (табл. 3).

Таблиця 3. Рівень кореляційного зв'язку між динамікою індексу Шеннона (Н) (біт/екз.), відповідно, за чисельністю (H_N) та біомасою (H_B) фітопланктону пари дослідних ставів за весь період досліджень

№ ставу	Індекс Шеннона (Н)	середній Н	MinH - MaxH	Коефіцієнт кореляції r	критерій tz Фішера	Рівень значимості
№ 1	H_N^1	2,47	1,16–4,20	0,74	4,3430	P < 0,001
№ 2	H_N^2	2,60	1,20–4,04			
№ 1	H_B^1	3,18	2,21–3,79	0,11	0,4966	P > 0,10
№ 2	H_B^2	3,21	2,45–3,91			

Як видно з даних табл. 3, на більш тривалому проміжку часу, який де-факто охоплював три сезони, для двох подібних ставів, умови в яких були різними та ще й змінювались із року в рік, індекс Шеннона, розрахований за чисельністю фітопланктону, коливався надзвичайно синхронно (коефіцієнт кореляції 0,74, за рівня значимості $P < 0,001$), в той же час кореляції між динамікою індексу Шеннона за біомасою фітопланктону даних двох ставів (навіть слабкої, яка б проявилась на більшому проміжку часу) виявити не вдалося. З цього однозначно випливає, що антропогенний вплив, яким для досліджуваних ставів є рибогосподарська діяльність загалом і, зокрема, внесення досліджуваних органічних добрив, змінює певним чином представленість різних видів водоростей у загальній біомасі фітопланктону з одного боку, і водночас мало впливає на співвідношення чисельності представників різних видів водоростей у загальній чисельності фітопланктону. Як показав аналіз часток видів-домінантів, така парадоксальна, на перший погляд, ситуація виявляється можливою завдяки масштабним коливанням чисельності синьозелених водоростей (у нашому випадку, передусім *Microcystis aeruginosa*), причому ці коливання, внаслідок мізерної індивідуальної маси клітин синьозелених, практично не відбиваються на адекватних змінах біомаси фітопланктону. Крім того, висока корельованість показників H_N як у дослідних (незалежно від умов проведення дослідів), так і у контрольних ставах свідчить про те, що характер динаміки чисельності представників окремих таксономічних груп (як ми бачимо, передусім синьозелених) підпорядкований виключно дії природних чинників, спільних (протягом року) як для всіх варіантів дослідів, так і для контролю. Натомість, відсутність кореляції між показниками H_B говорить про те, що на формування біомаси того чи іншого з видів водоростей специфічно впливають умови конкретного дослідів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Внесення досліджуваних добрив не призводить до дегенерації водоростевих угруповань у вирощувальних ставах, яка б виражалася у збідненні інформативного різноманіття кількісних характеристик фітопланктону.

Ступені інформативного різноманіття чисельності та біомаси фітопланктону змінюються у часі незалежно один від одного.

Сезонна динаміка ступеню інформативного різноманіття біомаси фітопланктону визначається рибогосподарською діяльністю людини (у даному випадку – внесенням досліджуваних органічних добрив, перегною ВРХ, біогумусу і «Ріверму»).

Сезонна динаміка ступеню інформативного різноманіття чисельності фітопланктону залежала, насамперед, від природних чинників;

Збільшення чисельності синьозелених водоростей до кінця сезону, як і спалахи протягом сезону не є наслідком дії внесених добрив.

Отримані результати свідчать про перспективність використання біогумусу та «Ріверму» для стимулювання розвитку природної кормової бази риб, зокрема при вирощуванні рибопосадкового матеріалу коропа у вирощувальних ставах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Щербак В. І. Методи досліджень фітопланктону // Методичні основи гідробіологічних досліджень водних екосистем // ред. В. І. Назаренко. Київ, 2002. С. 41—47.
2. Водоросли. Справочник / Вассер С. П. и др. Киев : Наукова думка, 1989. 608 с.
3. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / заг. ред. Романенко В. Д. ; НАН України, Ін-т гідробіології. Київ : Логос, 2006. 408 с.
4. Усачев П. И. Количественная методика сбора и обработки фитопланктона // Труды ВГБО. 1961. Т. XI. 411 с.
5. Ассаул З. І. Визначник евгленових водоростей Української РСР. Київ : Наукова думка, 1975. 407 с.
6. Кондратьева Н.В. Визначник прісноводних водоростей Української РСР. Київ : АН СРСР, 1968. 523 с.
7. Паламар-Мордвінцева Г. М. Кон'югати. Десмідієві — *Desmidiaceae* // Визначник прісноводних водоростей УРСР. Київ : Наукова думка, 1986. Вип. 8, ч. 2. 320 с.
8. Топачевский А. В., Масюк Н. П. Пресноводные водоросли Украинской ССР. Киев, 1984. 336 с.
9. Царенко П. М. Краткий определитель хлорококковых водорослей Украинской ССР. Киев : Наукова думка, 1990. 208 с.
10. Одум Ю. Основы экологии. Москва : Мир, 1975. 740 с.

REFERENCES

1. Shcherbak, V. I. (2002). Metody doslidgen phytoplanktonu. *Metodychni osnovy hidrobiologichnyh doslidgen vodnyh ekosystem*. V. I. Nazarenko (Ed.). Kyiv.
2. Wasser, S. P., Kondratieva, N. V., & Masuk, N. P. et al. (1989). *Vodorosli. Spravochnik*. Kyiv: Naukova dumka.

3. Romanenko, V. D. (Ed.). (2006). *Metody gidroekologichnyh doslidgen poverhnevnyh vod*. Kyiv: Logos.
4. Usachev, P. I. (1961). Kolichestvennaya metodika sbora i obrabotki phytoplanktona. *Trudy VGBO, XI*.
5. Assaul, Z. I. (1975). *Viznachnik evglenovyh vodorostey Ukrainskoi RSR*. Kyiv: Naukova dumka.
6. Kondratiev, N. V. (1968). *Viznachnik prysnovodnih vodorostey Ukrainskoi RSR*. Kyiv: AN SRSR.
7. Palamar-Mordvintseva, G. M. (1986), Kon'jugaty. Desmidievi — Desmidiiales. *Viznachnik prysnovodnih vodorostey Ukrainskoi RSR*. (Vol. 8, iss. 2). Kyiv: Naukova dumka.
8. Topachevskyy, A.V., & Masuk, N. P. (1984). *Presnovodnye vodorosli Ukrainskoy SSR*. Kiev.
9. Tsarenko, P. M. (1990). *Kratkiy opredelitel' hlorokokkovykh vodorosley Ukrainskoy SSR*. Kiev: Naukova dumka.
10. Odum, U. (1975). *Osnovy ekologii*. Moskva: Mir.

ИНФОРМАЦИОННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ФИТОПЛАНКТОНА ОПЫТНЫХ ВЫРОСТНЫХ ПРУДОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПО ИНДЕКСУ ШЕННОНА

Н. П. Чужма, n_chuzhma@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Провести сравнительный анализ индексов информационного биоразнообразия развития фитопланктона в выростных рыбоводных прудах, удобренных биогумусом, «Ривермом» и традиционными видами органических удобрений, для определения наличия или отсутствия деградации фитопланктона данных водоемов в условиях применения указанных удобрений.

Методика. Представлены результаты трех лет исследования развития фитопланктона в прудах, в которых выращивался рыбопосадочный материал карпа в моно- и поликультуре при интенсивной и экстенсивной технологиях выращивания. Информационное разнообразие водорослевых сообществ прудов определяли рассчитывая индекс Шеннона по количественным характеристикам развития фитопланктона.

Результаты. Проведенные исследования показали: внесение исследуемых удобрений не приводит к дегенерации водорослевых сообществ в выростных прудах, которая бы выражалась в обеднении информативного биоразнообразия количественных характеристик фитопланктона; степени информативного разнообразия численности и биомассы фитопланктона меняются во времени независимо друг от друга; сезонная динамика степеней информативного разнообразия биомассы фитопланктона определяется внесением исследуемых органических удобрений, перегноя КРС, биогумуса и «Риверма»; сезонная динамика степеней информативного разнообразия численности фитопланктона зависит главным образом от природных факторов; увеличение численности синезеленых водорослей до конца сезона, как и вспышки в течение сезона не являются следствием действия внесенных удобрений.

Научная новизна. Впервые использован индекс информационного разнообразия по Шеннону для характеристики развития фитопланктона выростных рыбоводных прудов в условиях применения для их удобрения биогумуса и «Риверма».

Практическая значимость. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования биогумуса и «Риверма» для стимулирования развития естественной кормовой базы рыб, в частности при выращивании рыбопосадочного материала карпа в выростных прудах.

Ключевые слова: фитопланктон, индекс информационного разнообразия по Шеннону, выростные пруды, органические удобрения, биогумус, «Риверм».

SHANNON DIVERSITY INDICES OF PHYTOPLANKTON IN EXPERIMENTAL FISH-REARING PONDS UNDER THE EFFECT OF DIFFERENT TYPES OF ORGANIC FERTILIZERS

N. Chuzhma, n_chuzhma@ukr.net, Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv

Purpose. To perform a comparative analysis of information diversity indices of phytoplankton development in fish-rearing ponds fertilized with biohumus, Riverm and traditional types of organic fertilizers for the determination of the presence or absence of phytoplankton degradation in these water bodies under the effect of the application of these fertilizers.

Methodology. The article describes the results obtained during three years of the studies of phytoplankton in fish-rearing ponds, in which was carp seeds were grown in monoculture and polyculture using intensive and extensive cultivation technologies. The information diversity of algal communities of ponds was determined by calculating the Shannon index based on quantitative characteristics of phytoplankton development.

Findings. The performed studies have shown that the application of the studied fertilizers did not lead to the degeneration of algal communities in fish-rearing ponds, which would be expressed as a depleted information diversity of phytoplankton quantitative characteristics; the degree of the information diversity of phytoplankton abundance and biomass varied in time independently; the seasonal dynamics of the informative diversity of phytoplankton biomass was shaped by the amounts applied studied organic fertilizers such as cattle humus, biohumus and Riverm; the seasonal dynamics of the information diversity degree of phytoplankton abundance depends mainly on natural factors; an increase in the abundance of blue-green algae by the end of the season, like algal blooms during the season, is not a consequence of the effect of the applied fertilizer.

Originality. For the first time Shannon diversity index was used to characterize the development of phytoplankton in fish-rearing ponds after the application of biohumus and Riverm for their fertilization.

Practical value. The obtained results indicate on the promising use of biohumus and Riverm to stimulate the development of the natural food supply for fish, in particular, when growing carp seeds.

Keywords: phytoplankton, Shannon diversity index, fish-rearing ponds, organic fertilizers, biohumus, «Riverm».

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 37-49
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.037>
УДК 597.554.3(282.247.322.171)

БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМИСЛОВОГО СТАДА СРІБЛЯСТОГО КАРАСЯ (*CARASSIUS AURATUS GIBELIO* (BLOCH, 1782) ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКОЇ ГИРЛОВОЇ СИСТЕМИ

К. М. Гейна, geinakonstantin@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН
України, м. Київ

Мета. Дати біологічну оцінку промислового стада сріблястого карася *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) Дніпровсько-Бузької гирлової системи в умовах трансформованого річкового стоку Дніпра.

Методика. В процесі аналізу біологічного стану промислового стада сріблястого карася проведено вивчення динаміки вікової, статевий структури, темпу лінійно-вагового росту, абсолютної плодючості та вгодованості. Вихідні дані були отримані в процесі роботи контрольно-спостережних пунктів Інституту рибного господарства на акваторії Дніпровсько-Бузької гирлової системи протягом останніх 15 років. Збір та опрацювання іхтіологічних матеріалів виконані у відповідності до загальновизнаних методик.

Результати. Аналіз показав, що в останні роки вікова структура сріблястого карася Дніпровсько-Бузької гирлової системи є найбільш лабільною серед інших представників промислової іхтіофауни коропових риб. Визначено, що внаслідок розширення та зростаючої наповнюваності правого крила вікового ряду відбувається поступове зростання середнього виваженого віку промислового стада. На початку досліджень (2001–2002 рр.) ядро стада формували три–шестирічки (до 95%), проте у подальші роки відмічено зміщення домінантів у бік переважання (понад 80% загальної чисельності) чотири–семирічок. При цьому питома вага трирічок (поповнення промислової частини стада) знаходилася на відносно високому рівні – до 10,6%.

Лінійний ріст більшою інтенсивністю відрізнявся до п'ятирічного віку, але зі збільшенням віку темп закономірно знижувався і суттєвою мінливістю не відрізнявся. Маса тіла найбільшою варіабельністю була характерною для чотирирічок ($C_v=9,62\%$). Відмічені незначні відхилення за темпом росту маси тіла особин правого крила вікового ряду, які зумовлені стабільним переважанням у структурі стада самиць, для яких характерне коливання середньої маси через різницю у розвитку статевих залоз.

Динаміка вікових змін вгодованості вказує на поступове зниження коефіцієнта Фультона від $3,47\pm 0,22$ у трирічок до $3,12\pm 0,06$ у шестирічок. Найвища мінливість показників характерна для п'ятирічок ($C_v=10,9\%$; $\text{lim}=2,46\text{--}3,89$), що пов'язується з темпом лінійно-масового росту та плодючістю. Зі збільшенням віку варіабельність вгодованості суттєво знижується.

Наукова новизна. Представлені нові, а також суттєво оновлені існуючі дані з основних біологічних характеристик промислового стада сріблястого карася в трансформованих умовах існування іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової системи.

Практична значимість. Отримані результати є науковим підґрунтям раціонального ведення рибного господарства та оптимізації промислового навантаження по відношенню до представників цінної туводної іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової системи. В сучасних умовах представлена інформація є доволі актуальною з точки зору збереження та підтримання на належному рівні біорізноманіття екосистем цінних у рибогосподарському відношенні природних водоемів України.

Ключові слова: Дніпровсько-Бузька гирлова система, сріблястий карась, вікова, статевая структура, абсолютна індивідуальна плодючість, темп росту, вгодованість.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Розвиток народного господарства країн Східної Європи передбачав широкомасштабне гідробудівництво, де головними напрямками вважалися потреби в енергетичних ресурсах. Для забезпечення поставлених цілей у другій половині минулого століття був зарегульований стік більшості річкових систем. У руслі Дніпра виник каскад водосховищ площею біля 700 тис. га [1].

Сформована протягом тривалого історичного періоду динамічна рівновага між абіотичними та біотичними параметрами водного середовища, до якої була пристосована більшість представників аборигенної та прохідної іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової системи, виявилася порушеною [2].

У міру протікання трансформаційних процесів відбувалися зміни структурних характеристик іхтіоценозу. Основним проявом впливу змін гідрологічного режиму Дніпра було перевтілення якісних характеристик промислових уловів, що пов'язувалося з чисельністю окремих представників промислової іхтіофауни. Одні види не змогли пристосуватися до нових умов існування, їх чисельність різко знизилася, що було адекватною відповіддю на порушення умов відтворення. В той же час, для окремих риб ситуація, що склалася, виявилася фатальною і у складі іхтіофауни вони взагалі перестали реєструватися [3].

Для інших видів нові, змінені умови виявилися досить сприятливими, що втілювалося у збільшенні їх чисельності. При цьому спостерігався значний закономірний процес освоєння вільних екологічних ніш, які з'явилися внаслідок зниження чисельності інших представників іхтіофауни. Результатом виступало те, що утворена ситуація сприяла зниженню рівня конкуренції за нагульні та нерестові площі. У підсумку саме це зумовило можливість другорядним промисловим видам риб збільшити чисельність і зайняти провідні позиції в структурі промислових уловів [4].

За нашого часу спостережувана тенденція набула сталого характеру і без активного втручання людини у процеси, що відбуваються, достатньо перспективний регіон басейну Дніпра може втратити статус цінної рибогосподарської водойми. В той же час, за сучасних умов господарської діяльності, подібне втручання має бути науково обґрунтованим з біологічної точки зору [5].

З огляду на вищезгадане, досить чітко викристалізовується актуальність досліджень, спрямованих на вивчення сучасного стану важливих у промисловому відношенні представників іхтіофауни та значення її окремих видів у процесі формування біологічної та промислової продуктивності Дніпровсько-Бузької гирлової системи.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ МЕТА РОБОТИ

До недавнього часу сріблястий карась у структурі промислових уловів Дніпровсько-Бузької гирлової системи мав другорядне значення. За нинішнього часу він зайняв провідні позиції у промислі. При цьому важливо наголосити, що подібна ситуація характерна практично для всіх природних водойм України [6].

Проте існуюча на сьогодні інформація щодо головних біологічних характеристик сріблястого карася безпосередньо з Дніпровсько-Бузької гирлової системи є доволі обмеженою і застарілою [7–9]. Більшість сучасних наукових публікацій стосується біології сріблястого карася з інших водойм ареалу [10–12].

Враховуючи достатньо високу пластичність виду, що розглядається, саме вивченню головних структурних показників стада слід надавати пріоритетне значення. У цьому зв'язку була сформована основна мета представленої роботи, яка полягала в аналізі вікової, статеві структури та темпу лінійно-вагового росту сріблястого карася *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) Дніпровсько-Бузької гирлової системи в умовах трансформованого стоку Дніпра.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Збір іхтіологічних матеріалів здійснювався під час функціонування контрольно-спостережних пунктів Інституту рибного господарства НААН, розташованих на різних біотопах Дніпровсько-Бузької гирлової системи. Науковими дослідженнями був охоплений період 2001–2015 рр.

Діяльність спостережних пунктів регламентувалася рішеннями Науково-промислової ради центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства України за дозволами, які видавалися місцевими органами рибоохорони у відповідності до виділених квот на вилучення водних біоресурсів.

Іхтіологічні дослідження базувалися на контрольних та промислових ловах з використанням стандартних знарядь лову, які звично використовуються в практиці подібних робіт [13–14]. Комплекс зважувань та морфологічних вимірювань було здійснено за методикою І. Ф. Правдіна [15]. Вікова структура визначалася за методичними напрацюваннями В. Л. Брюзгіна [16] та Н. І. Чугунові [17]. Статева структура та плодючість аналізувалися за типовою методикою [18]. Математичне опрацювання отриманих результатів виконано за методикою математичної оцінки результатів [19] з використанням електронних таблиць редактора Microsoft Office Excel 2003.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Вікова структура сріблястого карася, серед інших представників промислової іхтіофауни коропових риб Дніпровсько-Бузької гирлової системи, є найбільш лабільною. За більшістю проаналізованих років середній виважений вік стада знаходився в межах від 5,0 до 5,6 років. При цьому слід наголосити, що в останній час, внаслідок розширення та зростаючої наповнюваності правого крила вікового ряду, спостерігається відносно стала тенденція до збільшення середнього віку в стаді (рис. 1).

Аналіз динаміки вікової структури вказує на те, що кількість вікових груп дорівнювала дев'яти. Віковий ряд розпочинався трирічками і закінчувався одинадцятирічками. Основу стада формували особини віком від трирічок до восьмирічок. Проте спостерігалися певні особливості, які пов'язувалися з розширенням домінантних груп за рахунок особин старшого віку.

Якщо розглядати вікову структуру стада сріблястого карася у динаміці, то досить наочним є те, що на початку досліджень (2001–2002 рр.) ядро стада

формували чотири вікові групи — від трирічок до шестирічок із загальною часткою вагою на рівні 94,5–95,0% загальної чисельності.

Рис. 1. Середній виважений вік промислового стада сріблястого карася Дніпровсько-Бузької гирлової системи

У наступні роки, у міру подовшання та більшої наповнюваності правого крила вікового ряду, у стаді почали домінувати чотирирічки, п'ятирічки та шестирічки. Їх частка у 2004–2008 рр. знаходилася в межах від 73,5 до 82,1%. Проте у 2009–2010 рр. понад 80% чисельності стада формували вже чотири вікові групи. До вище перелічених додалися семирічки — 9,7–10,0% загальної кількості. При цьому важливо відмітити, що частка поповнення (трирічок) в цей час знаходилася на відносно високому рівні і становила 8,8–9,2%, що є відповідним резервом промислової частини стада на майбутні роки.

Також необхідно акцентувати увагу на постійно зростаючій чисельності старших вікових груп, тобто особин від восьми років і старше, що було характерним для 2011–2015 рр. В означені роки частка восьмирічок коливалася в межах від 7,2 до 10,2%, дев'ятирічок — від 2,6 до 6,2%, десятирічок — від 0,9 до 2,3%, а одинадцятирічок, які у попередні роки взагалі не реєструвалися — від 0,6 до 1,9% загальної чисельності стада (табл. 1).

Таблиця 1. Вікова структура промислового стада сріблястого карася Дніпровсько-Бузької гирлової системи, %

Роки	Вік, років									екз.
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2001	19,3	29,9	33,2	12,6	4,3	0,7	-	-	-	446
2002	19	32,5	30,6	12,4	4,6	0,9	-	-	-	621
2003	10,3	24	31,7	17,3	7,8	4,8	3,3	0,8	-	496
2004	6,9	28,1	30,1	15,3	9,5	6,7	2,6	0,8	-	394
2005	8,1	24,5	35,7	18,4	8,6	2,3	1,8	0,6	-	522

Роки	Вік, років									екз.
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2006	5,9	29,4	33,7	19,0	6,6	3,0	1,7	0,7	–	690
2007	9,9	28,7	29,7	18,9	8,2	2,4	1,6	0,6	–	831
2008	6,0	30,1	31,4	17,1	9,3	3,5	2,0	0,6	–	687
2009	9,2	23,9	25,2	21,3	10,0	5,9	2,7	1,8	–	603
2010	8,8	28,3	25,4	17,5	9,7	5,5	3,4	1,4	–	557
2011	10,2	22,3	23,1	19,2	10,3	7,2	3,7	2,1	1,9	712
2012	9,8	23,8	22,7	16,4	9,2	8,4	6,2	2,3	1,2	685
2013	11,3	21,4	23,1	18,6	11,4	9,5	3,2	0,9	0,6	745
2014	10,6	20,5	21,7	19,4	12,6	10,2	2,6	1,3	1,1	780
2015	10,1	19,4	20,5	20,2	14,1	10,1	3,2	1,7	0,7	810

Накопичення у стаді особин старшого віку відбувається внаслідок не зовсім ефективного використання їх промислом, що орієнтує на оптимізацію навантаження на відповідні вікові групи шляхом коригування параметрів селективних знарядь лову.

На необхідність зосередження промислового навантаження на старші вікові групи вказує і динаміка характеристик росту сріблястого карася. Дослідження показали, що лінійний ріст більшою інтенсивністю відрізняється до п'ятирічного віку. Лінійні розміри збільшувалися від $15,20 \pm 0,14$ у трирічок до $23,30 \pm 0,12$ см у п'ятирічок. У подальшому темп лінійного росту закономірно знижується і суттєвою мінливістю не відрізняється.

Результати розрахунків вказують на те, що варіабельність довжини тіла (C_v) знижується від 2,78% у п'ятирічок до 1,30% у одинадцятирічок. Тобто відбувається уповільнення росту і, як наслідок, відповідне вирівнювання лінійної структури всередині вікових груп. При цьому зменшуються і розбіжності між мінімальною та максимальною (lim) довжиною тіла (рис. 2).

Найбільша мінливість маси тіла спостерігається у чотирирічок, тобто у віці повного статевого дозрівання стада. Коефіцієнт варіації тут є найвищим і становить 9,62%. При цьому слід відмітити, що мінливість лінійних показників у чотирирічок була несуттєвою — $C_v = 1,89\%$.

Таким чином, характерною рисою сучасного біологічного стану промислового стада сріблястого карася Дніпровсько-Бузької гирлової системи є накопичення старших вікових груп за відносно сталих показників лінійного росту та росту маси тіла. Відмічені незначні відхилення за темпом росту маси тіла особин правого крила вікового ряду, які обумовлені стабільним переважанням у структурі стада самиць.

Рис. 2. Динаміка вікових змін лінійних розмірів та маси тіла сріблястого карася (усереднені показники)

Стадо сріблястого карася у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі є двостатевим, а аналіз структури вказує на стале домінування самиць, що взагалі характерно для виду. Частка самців становила в середньому по стаду 31,3%, самиць – 68,7%, що відповідало співвідношенню на рівні 1,00:0,45. Домінування самиць спостерігалось за всіма віковими групами. При цьому відмічалася закономірна тенденція до більш суттєвішого домінування самиць зі збільшенням віку. У трирічок частка самців становила 39,3%, але в граничній групі одинадцятирічок вона знизилася до 4,9% (табл. 2).

Подібна динаміка відмічалася і за усереднення даних щодо статевий структури стада за п'ятирічними періодами 2001–2015 рр. Аналіз показав, що у стаді спостерігається чітке збільшення кількості самців, що призводить до відповідних змін статевого співвідношення. У 2001–2005 рр. воно дорівнювало 1,00:0,38, тобто частка самиць у стаді становила 72,7%. При цьому важливо відмітити, що віковий ряд самців був коротшим, ніж у самиць, на дві групи.

Таблиця 2. Статева структура промислового стада сріблястого карася Дніпровсько-Бузької гирлової системи (усереднені дані 2001–2015 рр., %)

Вік, років	Самиці		Самці		Співвідношення ♀:♂
	екз	%	екз	%	
3	595	60,7	386	39,3	1,00:0,65
4	1558	63,9	882	36,1	1,00:0,57
5	1754	67,1	861	32,9	1,00:0,49
6	1216	71,1	494	28,9	1,00:0,41
7	675	75,5	219	24,5	1,00:0,32
8	425	78,1	119	21,9	1,00:0,28
9	225	90,0	25	10,0	1,00:0,11
10	97	93,3	7	6,7	1,00:0,07
11	39	95,1	2	4,9	1,00:0,05
Загалом	6584	68,7	2995	31,3	1,00:0,45

У подальші роки кількість зареєстрованих вікових груп у самців збільшувалася і у 2011–2015 рр. вона була однаковою із самицями. У незначних кількостях почали реєструватися самці віком одинадцять років з лінійними розмірами до 30 см. Утворення такої ситуації зумовлювало відносно вирівнювання статевого співвідношення у бік підвищення частки самців. Проте більшою мірою таке сприяння утворювалося через збільшення частка самців у найбільш продуктивній частині стада, зокрема у три-п'ятирічок, частка яких зростала від 27,0–34,0% у 2001–2005 рр. до 41,0–44,1% у 2011–2015 рр.

Таким чином, в умовах сучасності у статевій структурі сріблястого карася Дніпровсько-Бузької гирлової системи спостерігається поступове збільшення частка самців, що було характерним і для минулого століття, коли після зарегулювання стоку Дніпра Каховською ГЕС, протягом перших дванадцяти років стадо сріблястого карася перетворилося з одностатевого у двостатеве із сталим зростанням (до 46%) частка самців [7].

Однією з біологічних особливостей сріблястого карася, яка дозволяє підтримувати високу чисельність, є порційність ікрометання. Статеві продукти дозрівають за асинхронним порядком. У самиць сріблястого карася Дніпровсько-Бузької гирлової системи протягом вегетаційного сезону формується переважно три порції ікри. Відомості щодо абсолютної плодючості є досить різними і стосуються переважно інших водоем. Дослідженнями встановлено, що у пониззі Інгульця за збільшення лінійних розмірів самиць сріблястого карася від 17 до 29 см абсолютна плодючість коливалася від 79 до 477 тис. ікринок. У пониззі Дніпра плодючість самиць старших вікових груп (маса більше 1 кг) була в межах від 200 до 235 тис. ікринок [9].

За сучасними даними, абсолютна плодючість сріблястого карася у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі коливається в межах від $39,10 \pm 1,16$ (лім 34,2–44,3) у трирічок до $259,0 \pm 8,68$ тис. ікринок (лім 250,3–267,7) у одинадцятирічок. Варіабельність плодючості знижується від $C_v=7,9\%$ у трирічок до $C_v=2,8\%$ у дев'ятирічок (рис. 3).

Рис. 3. Абсолютна індивідуальна плодючість самиць сріблястого карася, (усереднені дані), тис. ікринок

Представлені дані переконливо вказують на те, що плодючість у вікових групах, які формують ядро промислової частини стада, є доволі високою, що зумовлює спостережуване останніми роками значне зростання чисельності молодших вікових груп сріблястого карася, що, в свою чергу, може викликати напруженість у харчових стосунках з іншими представниками іхтіофауни.

Сприятливі умови нагулу молодших вікових груп зумовили достатньо високі показники вгодованості всіх вікових груп сріблястого карася. Динаміка змін вгодованості свідчить про поступове зниження коефіцієнтів Фультона від $3,47 \pm 0,22$ у трирічок до $3,12 \pm 0,06$ у шестирічок. При цьому найвища мінливість показників відмічена у п'ятирічок $Cv=10,9\%$ за меж змін показника (lim) від 2,46 до 3,89, що пов'язується з темпом лінійно-вагового росту та масою продукуваної ікри. Зі збільшенням віку розбіжності між мінімальною та максимальною вгодованістю суттєво зменшувалися (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка вікових змін вгодованості сріблястого карася, усереднені дані за 2001–2015 рр.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Характерною рисою сучасного біологічного стану стада сріблястого карася Дніпровсько-Бузької гирлової системи є накопичення старших вікових груп за відносно сталих показників лінійного росту та росту маси тіла. Результати роботи спонукають до проведення досліджень, орієнтованих на вирішення питань, пов'язаних з оптимізацією промислового навантаження з урахуванням біологічного стану та чисельності відповідних вікових груп інших промислово цінних видів риб, зокрема ляща, як потенційного об'єкта прилову у селективні знаряддя лову, якими здійснюється вилов сріблястого карася.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гринжевський М. В. Аквакультура України. Львів : Вільна Україна, 1998. 364 с.
2. Романенко В. Д., Сиренко Л. А., Федоровський А. Д. Экологические проблемы Днепра в ретроспективе и на современном этапе // Гидробиологический журнал. 1998. Т. 34, № 6. С. 22—34.
3. Шевченко П. Г., Мальцев В. И. Изменения в ихтиофауне Днепра в пределах Украины во II половине XX столетия // Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф. : матер. Київ : ІРГ УААН, 2005. С. 291—297.
4. Щербуха А. Я. Ихтиофауна України у ретроспективі та сучасні проблеми збереження її різноманіття // Vestnik zoologii. 2004. № 38(3). С. 3—18.
5. Екологічні трансформації річкових гідроекосистем та актуальні проблеми рибного господарства / Шерман І. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2013. № 4 (26). С. 5—16.
6. Дворецький А. І. Біомоніторинг еколого-токсикологічного стану водойм — передумова формування високопродуктивних іхтіоценозів // Рыбное хозяйство Украины. 2006. № 3—4. С. 14—16.
7. Артюшик С. Т. О промысловой мере на серебряного карася *Carassius auratus gibelio* (Bloch) в бассейне Нижнего Днепра // Рыбное хозяйство. 1976. Вып. 23. С. 74—77.
8. Артюшик С. Т. Особенности биологии днепровского серебряного карася // Рыбное хозяйство. 1975. № 6. С. 18—19.
9. Бугай К. С., Коваль Н. В. К биологии размножения серебряного карася (*Carassius auratus gibelio* (Bloch) водоемов Днепро-Бугской устьевой области // Гидробиологический журнал. 1976. № 5 (12). С. 53—58.
10. Абраменко М. И. Адаптивные механизмы распространения и динамики численности *Carassius auratus gibelio* в понто-каспийском регионе (на примере Азовского бассейна) // Российский Журнал Биологических Инвазий. 2011. № 2. С. 3—27.
11. Плічко В. Ф., Захарченко І. Л., Рудик-Леуська Н. Я. Промислово-біологічна характеристика сріблястого карася Каховського водосховища // Рибогосподарська наука України. 2013. № 1. С. 17—24.
12. Христенко Д. С. Особливості біології надвидового комплексу карася сріблястого (*Carassius superspecies auratus*, Linnaeus, 1758) у спеціальних товарних рибних господарствах // Рибогосподарська наука України. 2012. № 4. С. 76—80.

13. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилову риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України № 166 від 15.12.98. Київ, 1998. 47 с.
14. Методические указания по оценке численности рыб в пресноводных водоемах. Москва : ВНИО по рыбоводству, 1986. 50 с.
15. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1966. 376 с.
16. Брюзгин В. Л. Методы изучения роста рыб по чешуе, костям и отолидам. Киев : Наукова думка, 1969. 187 с.
17. Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. Москва : АН СССР, 1959. 164 с.
18. Спаковская В. Д., Григораш В. А. К методике определения плодовитости у одновременно и порционно нерестующих рыб // Типовые методики исследований продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Вильнюс : Моклас, 1976. С. 54—62.
19. Аксютин З. М. Элементы математической оценки результатов наблюдений в биологических и рыбохозяйственных исследованиях. Москва : Пищевая промышленность, 1968. 289 с.

REFERENCES

1. Hrynzhhevskiy, M. V. (1998). Akvakultura Ukrainy. Lviv : Vilna Ukraina.
2. Romanenko, V. D., Sirenko, L. A., & Fedorovskiy, A. D. (1998). Ekologicheskije problemy Dnepra v retrospektive i na sovremennom etape. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 6, 22-34.
3. Shevchenko, P. G., & Mal'tsev, V. I. (2005). Izmeneniya v ikhtiofaune Dnepra v predelakh Ukrainy vo II polovine XX stoletiya. *Aktualni problemy akvakultury ta ratsionalnogo vykorystannia vodnykh bioresursiv : Mizhnar. nauk.-prakt. konf. : mater.* Kyiv: IRG UAAN, 291-297.
4. Shcherbukha, A. Ya. (2004). Ikhtiofauna Ukrainy u retrospektivi ta suchasni problemi zberezheniya ii riznomanitya. *Vestnik zoologii*, 38(3), 3-18.
5. Sherman, I. M., Geyna, K. M., Kutishchev, S. V., & Kutishchev, P. S. (2013). Ekologichni transformatsii richkovikh gidroekosistem ta aktual'ni problemi ribnogo gospodarstva. *Ribogospodars'ka nauka Ukrainy*, 4, 5-16.
6. Dvoret's'kiy, A. I. (2006). Biomonitoring ekologo-toksikologichnogo stanu vodoym – peredumova formuvannya visokoproduktivnykh ikhtiotsenoziv. *Rybnoe khozyaystvo Ukrainy*, 3-4, 14-16.
7. Artyushchik, S. T. (1976). O promyslovy mere na serebryanogo karasya *Carassius auratus gibelio* (Bloch) v bassejne Nizhnego Dnepra. *Rybnoe khozyaystvo*, 23, 74-77.
8. Artyushchik, S. T. (1975). Osobennosti biologii dneprovskogo serebryanogo karasya. *Rybnoe khozyaystvo*, 6, 18-19.
9. Bugay, K. S., & Koval', N. V. (1976). K biologii razmnzheniya serebryanogo karasya (*Carassius auratus gibelio* (Bloch)) vodoemov Dneprovsko-Bugskoy ust'voy oblasti. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 5(12), 53-58.
10. Abramenko, M. I. (2011). Adaptivnye mekhanizmy rasprostraneniya i dinamiki chislennosti *Carassius auratus gibelio* v ponto-kaspiyskom regione (na primere Azovskogo baseyna). *Rossiyskiy Zhurnal Biologicheskikh Invaziy*, 2, 3-27.

11. Plichko, V. F., Zakharchenko, I. L., & Rudik-Leus'ka, N. Ya. (2013). Promislovo-biologichna kharakteristika sriblyastogo karasya Kakhovs'kogo vodoshkovichcha. *Ribogospodars'ka nauka Ukrainy*, 1, 17-24.
12. Khristenko, D. S. (2012). Osoblivosti biologii nadvidovogo kompleksu karasya sriblyastogo (*Carassius superspecies auratus*, Linnaeus, 1758) u spetsial'nikh tovarnikh ribnikh gospodarstvakh. *Ribogospodars'ka nauka Ukrainy*, 4, 76-80.
13. Metodyka zboru i obrobky ikhtiologichnykh i hidrobiologichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoshkovyshch i lymaniv Ukrainy: Zatv. nakazom Derzhkomrybhospu Ukrainy № 166 vid 15.12.98. (1998). Kyiv.
14. Metodicheskie ukazaniya po otsenke chislennosti ryb v presnovodnykh vodoemakh. (1986). Moskva: VNPO po rybovodstvu.
15. Pravdin, I. F. (1966). *Rukovodstvo po izucheniyu ryb*. Moskva: Pishchevaya promyshlennost'.
16. Bryuzgin, V. L. (1969). *Metody izucheniya rosta ryb po cheshue, kostyam i otolitam*. Kiev: Naukova dumka.
17. Chugunova N.I. (1959). *Rukovodstvo po izucheniyu vozrasta i rosta ryb*. Moskva: AN SSSR.
18. Spakovskaya, V. D., & Grigorash, V. A. (1976). K metodike opredeleniya plodovitosti u edinovremenno i portsiionno nerestuyushchikh ryb. *Tipovye metodiki issledovaniy produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Vil'nyus: Moklas, 54-62.
19. Aksyutina, Z. M. (1968). *Elementy matematicheskoy otsenki rezul'tatov nablyudeniy v biologicheskikh i rybokhozyaystvennykh issledovaniyakh*. Moskva: Pishchevaya promyshlennost'.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЫСЛОВОГО СТАДА СЕРЕБРЯНОГО КАРАСЯ (*CARASSIUS AURATUS GIBELIO* (BLOCH, 1782) ДНЕПРОВСКО-БУГСКОЙ УСТЬЕВОЙ СИСТЕМЫ

К. Н. Гейна, gejnakonstantin@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН
Украины, г. Киев

Цель. Дать биологическую оценку промыслового стада серебряного карася *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) Днепро-Бугской устьевой системы в условиях трансформированного речного стока Днепра.

Методика. При анализе биологического состояния промыслового стада серебряного карася проведено изучение динамики возрастной, половой структуры, темпа линейно-весового роста, абсолютной плодовитости и упитанности. Исходные данные были получены в процессе работы контрольно-наблюдательных пунктов Института рыбного хозяйства на акватории Днепро-Бугской устьевой системы в течение 15 лет. Сбор и обработка ихтиологических материалов проводились в соответствии с общепризнанными методиками.

Результаты. Анализ показал, что в последние годы возрастная структура серебряного карася Днепро-Бугской устьевой системы является наиболее лабильной среди других представителей промысловой ихтиофауны карповых рыб. Определено, что в результате расширения и увеличивающейся наполняемости правого крыла возрастного ряда наблюдается постепенное увеличение среднего взвешенного возраста промыслового стада. В начале исследований (2001–2002 гг.) ядро стада формировали три–шестигодовики, которые формировали до 95% общей численности стада. Однако в последующие годы

отмечено смещение доминирующих групп в сторону правого крыла возрастного ряда. Ядро стада было представлено четырех–семигодовиками, удельный вес которых превышал 80% общей численности. При этом доля трехгодовиков, которые являются пополнением промысловой части стада, достигала 10,6%, что является относительно высоким показателем и свидетельствует об удовлетворительной воспроизводительной способности стада в целом.

Линейный рост большей интенсивностью характеризовался до пятилетнего возраста, но в более старших группах темп закономерно снижался и существенной изменчивостью не отличался. Масса тела наиболее вариабельной была у четырехгодовиков ($C_v=9,62\%$). Незначительные отклонения темпа роста массы тела у особей правого крыла возрастного ряда обуславливались стабильным доминированием в структуре стада самок, для которых характерны колебания средней массы, связанные в большей степени с развитием половых желез.

Динамика возрастных изменений упитанности указывает на постепенное снижение коэффициента Фультонна от $3,47\pm 0,22$ у трехгодовиков до $3,12\pm 0,06$ у шестигодовиков. Наибольшая изменчивость данных показателей характерна для пятигодовиков ($C_v=10,9\%$; $lim=2,46-3,89$), что связано с темпом линейно-весового роста и плодовитостью. С увеличением возраста вариабельность упитанности существенно снижается.

Научная новизна. Представлены современные, а также значительно обновлены существующие данные по основным биологическим характеристикам промыслового стада серебряного карася в трансформированных условиях обитания ихтиофауны Днепроовско-Бугской устьевой системы.

Практическая значимость. Полученные результаты являются научной базой для рационального ведения рыбного хозяйства и оптимизации промысловой нагрузки на представителей ценной туводной ихтиофауны Днепроовско-Бугской устьевой системы. В современных условиях представленная информация является достаточно актуальной с точки зрения сохранения и поддержания на должном уровне биоразнообразия экосистем ценных рыбохозяйственных водоемов Украины.

Ключевые слова: Днепроовско-Бугская устьевая система, серебряный карась, возрастная, половая структура, абсолютная индивидуальная плодовитость, темп роста, упитанность.

BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PRUSSIAN CARP (*CARASSIUS AURATUS GIBELIO* (BLOCH, 1782)) COMMERCIAL STOCK OF THE DNIEPER-BUG ESTUARY

K. N. Heina, geinakonstantin@gmail.com, Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv

Purpose. To provide the biological assessment of the silver Prussian carp (*Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782)) commercial stock of the Dnieper-Bug estuary in the conditions of the transformed Dnieper river flow.

Methodology. During the analysis of the biological state of the Prussian carp commercial stock, the main attention was given to the dynamics of age and sexual structure, length-weight growth rate, absolute fecundity and condition factor. The basic data were collected during the work of control-observation stations of the Institute of Fisheries in the Dnieper-Bug estuary during the current century. The collection and processing of ichthyological materials were performed in accordance with the generally accepted methodologies.

Findings. The analysis showed that during the current century, the age structure of the Prussian carp of the Dnieper-Bug estuary was the most labile among other commercial cyprinids. It was found that as a result of an increase in the right wing of the age series, there was a gradual increase of the mean weighted age of its commercial stock. At the beginning of studies (2001-2002), the core of the

stock was formed by age-3-6 fish (up); however in subsequent years, a displacement of dominant groups toward the dominance of age-4-7 fish (more than 80% of the total stock) was observed. At the same time, the relative number of age-3 fish (recruits) was at a relatively high level – up to 10.6%.

The linear growth varied more intensively until the age-5, but it reduced with ageing and did not show high variability. The body weight most variable was in age-4 fish ($Cv=9.62\%$). The noted insignificant deviations in the body weight growth rate of the right wing of the age series was due to stable predominance of females in the stock structure, which were characterized by a variability of the mean weight as a result of different development of gonads.

The dynamics of the age-related changes in the condition factor indicated on a gradual decline Fulton condition factor from 3.47 ± 0.22 in age-3 fish to 3.12 ± 0.06 in age-6 fish. The highest variability of these indexes was typical for age-5 fish ($Cv=10.9\%$; $lim=2.46-3.89$), that was related to the linear-weight growth and fecundity. With an increase in the age, the variableness of condition factor reduced substantially.

Originality. The paper contains modern and significantly updated data on main biological characteristics of the Prussian carp commercial stock in the transformed conditions of the Dnieper-Bug estuary.

Practical value. The obtained results are a scientific background for rational fishery optimization of commercial pressure on the representatives of valuable fish fauna of the Dnieper-Bug estuary. In current conditions, the presented information is actual enough from the point of view of the maintenance and support the biodiversity of valuable commercial species in natural water bodies of Ukraine.

Keywords: Dnieper-Bug estuary, Prussian carp, age, sexual structure, absolute individual fecundity, growth rate, condition factor.

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 50-64
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.050>
УДК [639.311:631.8]:579.68

ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БАКТЕРІАЛЬНОГО ДОБРИВА «ФОСФОБАКТЕРИН»

Т. В. Григоренко, grygorenko-@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

Н. М. Савенко, hydrobiology@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

А. М. Базаєва, a_bazaeva@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Н. П. Чужма, n_chuzhma@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

О. М. Колос, ecology@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Л. В. Титова, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН, м. Київ

Мета. Дослідити вплив бактеріального добрива «Фосфобактерин» на формування гідрохімічного режиму, розвиток природної кормової бази та рибопродуктивність вирощувальних ставів.

Методика. При проведенні досліджень були використані загальноприйняті в гідрохімії, мікробіології, гідробіології та рибництві методики.

Результати досліджень. У статті представлено результати досліджень щодо продуктивності вирощувальних ставів за різних способів застосування бактеріального добрива «Фосфобактерин».

Встановлено, що гідрохімічний режим експериментальних ставів формувався під впливом джерела водопостачання та заходів, спрямованих на інтенсифікацію розвитку природної кормової бази, і був сприятливий для розвитку кормових організмів та вирощування рибопосадкового матеріалу.

Внесення бактеріального добрива на початку вегетаційного сезону, лише по поверхні водного дзеркала, виявилося малоефективним для підвищення продуктивності екосистеми ставу в цілому. Більш ефективним способом підвищення біологічної продуктивності, в тому числі рибопродуктивності вирощувальних ставів, виявилося застосування «Фосфобактерину» впродовж вегетаційного сезону як по ложу, так і по поверхні водного дзеркала в комплексі з органічним добривом — перегноем ВРХ. В дослідному ставу за комплексного удобрення середні за вегетаційний сезон показники біомаси фітопланктону були в 1,5 раза, бактеріопланктону — в 1,1 раза, зообентосу — в 2,6 раза вищими, а отримана загальна рибопродуктивність — в 1,2 раза вищою, порівняно з контрольним ставом (при застосуванні лише перегною ВРХ).

Наукова новизна. Досліджено особливості формування гідрохімічного і гідробіологічного (фіто-, бактеріо-, зоопланктон, зообентос) режимів вирощувальних ставів та представлено рибницькі показники при застосуванні бактеріального добрива «Фосфобактерин» як самостійно, так і в поєднанні з традиційним органічним добривом — перегноем ВРХ.

Практична значимість. На підставі отриманих результатів розроблені тимчасові рекомендації щодо застосування бактеріального добрива «Фосфобактерин» для підвищення продуктивності вирощувальних ставів.

© Т. В. Григоренко, Н. М. Савенко, А. М. Базаєва, Н. П. Чужма, О. М. Колос,
Л. В. Титова, 2017

Ключові слова: вирощувальні стави, гідрохімічний режим, фітопланктон, бактеріопланктон, зоопланктон, зообентос, перегній ВРХ, «Фосфобактерин», удобрення ставів.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасних умовах розвитку ставової аквакультури особлива увага приділяється ресурсозаощадливим й екологічно доцільним технологіям вирощування риби.

Відомо, що підвищення продуктивності ставів в умовах пасовищного вирощування риби зводиться до управління розвитком природної кормової бази за використання різних видів добрив, що сприяє інтенсивному розвитку кормових для риб організмів. Для інтенсифікації розвитку природної кормової бази у ставовому рибництві традиційно застосовуються мінеральні (азотні, фосфорні, калійні, кальцієві) та органічні (перегній, гноївка, компости тощо) добрива [1–4].

Однак, в умовах сьогодення європейське суспільство ставить за мету зменшити та запобігти забрудненню ґрунтів та води, спричиненого застосуванням мінеральних добрив та гною сільськогосподарських тварин [5]. Крім того, недостатня кількість і якість традиційних органічних добрив, зокрема перегною та компостів на його основі, спонукають до пошуку нових удобрювальних речовин.

У сільському господарстві більшості європейських країн поряд з традиційними мінеральними та органічними добривами все більшої популярності набуває застосування бактеріальних препаратів на основі азотфіксуючих та фосфатмобілізуєчих мікроорганізмів, що здатні до ферментативного або метаболічного (внаслідок продукування певних метаболітів) перетворення важкорозчинних ґрунтових фосфатів у розчинні форми. Бактеріальні добрива відносять до екологічно безпечних, застосування яких забезпечує економію енерговитрат і матеріальних ресурсів, зменшує забруднення навколишнього середовища, сприяє природному проходженню біологічних процесів. В Україні налагоджено виробництво бактеріальних добрив, які успішно використовуються в рослинництві [6–8].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Екологічно безпечні технології мають забезпечувати і зростання природної продуктивності рибогосподарських водойм. Одним із способів підвищення продуктивності ставових екосистем є вивільнення поживних речовин ставового ґрунту, переведення їх у доступну для гідробіонтів форму. Так, у ґрунті міститься багато органічних фосфатів, які малодоступні рослинам. Шляхом застосування фосформобілізуєчих бактерій можна перевести наявні фосфати у розчинну форму. Дослідження проведенні в останні роки рядом вчених, підтверджують успішність застосування з данною метою бактерій роду *Bacillus* [8–13], що і зумовило, в свою чергу, проведення нами досліджень з використанням бактеріального препарату «Фосфобактерин», створеного на основі фосфатмобілізуєчих бактерій *Bacillus megaterium*.

Тому метою представленої роботи було дослідження впливу бактеріального добрива «Фосфобактерин» на формування гідрохімічного режиму, розвиток природної кормової бази та рибопродуктивність вирощувальних ставів.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проводилися у 2015 р. на базі ДП ДГ «Нивка» ІРГ НААН у трьох експериментальних ставах площею 0,05–0,08 га та середньою глибиною 1,0 м, один з яких був контрольним. Для інтенсифікації розвитку природної кормової бази у став № 113 (дослід I) навесні (травень) було внесено перегній ВРХ (1,0 т/га), а за 5 діб до заливки його водою – бактеріальне добриво «Фосфобактерин» (1,0 л/га), шляхом розпилювання по ложу ставу. Ще раз у такій же кількості бактеріальне добриво вносили в липні, по поверхні водного дзеркала ставу. У став № 117 (дослід II) бактеріальне добриво вносили лише по поверхні водного дзеркала, на початку вегетаційного сезону (1,0 л/га). Контролем був став № 118, в який навесні було внесено перегній ВРХ з розрахунку 2,0 т/га (табл. 1).

Таблиця 1. Схема проведення досліджень в експериментальних ставах ДП ДГ «Нивка», 2015 р.

Варіанти дослідів (номери ставів)	Площа ставу, га	Середня глибина ставу, м	Густота посадки непідрослених личинок, тис. екз./га		Інтенсифікаційні заходи
			короп	білий амур	
Контроль (№ 118)	0,08	1,0	50,0	10,0	Перегній ВРХ
Дослід I (№ 113)	0,08	1,0	50,0	10,0	Перегній + «Фосфобактерин»
Дослід II (№ 117)	0,05	1,0	50,0	10,0	«Фосфобактерин»

Стави зарибнювались непідросленими 3–4-добовими личинками нивківського лускатого коропа та личинками білого амура, отриманими заводським методом відтворення. Рибопосадковий матеріал вирощувався за пасовищної технології.

Впродовж періоду вирощування риби проводились спостереження за температурним, гідрохімічним та гідробіологічним режимами експериментальних ставів.

Гідрохімічні та гідробіологічні проби впродовж вегетаційного сезону відбирались двічі на місяць.

Відбір проб води для хімічного аналізу та їх оброблення в лабораторії екологічних досліджень ІРГ НААН проводилися згідно методики [14].

Відбір та опрацювання проб бактеріопланктону здійснювалися за методиками [15,16].

Відбір, фіксація, камеральне опрацювання проб фіто-, зоопланктону та зообентосу проводилися за загальноприйнятими в гідробіології методами [17]. Для визначення якісного складу планктонних водоростей та безхребетних тварин використовувались визначники [18–24].

Для розрахунку продукції використовувались середньосезонні біомаси фіто-, зоопланктону і зообентосу та відомі із літератури Р/В – коефіцієнти [25].

Результати вирощування цьогоріток риб оцінювали за отриманими рибницькими показниками, а саме: за виходом цьогоріток від посаджених на вирощування личинок (%), середньою масою риби (г) та рибопродуктивністю ставів (кг/га).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Температура води в експериментальних ставах впродовж вегетаційного сезону, який тривав 135 діб, коливалася від 15,3 до 24,2°C, з максимальними показниками в перших декадах липня (до 23,8°C) та серпня (до 24,2°C). Зниження температури води до 15,3°C спостерігалось у вересні.

Гідрохімічний режим формувался під впливом джерела водопостачання, підстилаючих ґрунтів та різних біологічних процесів, що відбувалися в екосистемі ставів за внесення добрив та вирощування риби.

За хімічним складом вода експериментальних ставів згідно з класифікацією О. О. Альокіна відносилась до гідрокарбонатного класу групи кальцію, що є характерним для природних вод поліської фізико-географічної зони. Вміст гідрокарбонатів (HCO_3^-) перебував у межах норми і коливався від 183,1 до 292,2 мг/дм³. Концентрації іонів кальцію (Ca^{2+}) у воді вирощувальних ставів змінювалися в межах від 56,1 до 86,2 мг/дм³ і дещо перевищували нормативні значення, особливо це характерно для контрольного ставу (табл. 2).

Таблиця 2. Гідрохімічні показники експериментальних ставів ДП ДГ «Нивка», 2015 р. (min–max / $M \pm m$, $n=7$)

№ з/п	Показники	Варіанти досліджу			НЗ для ставової води
		Дослід I	Дослід II	Контроль	
1	Водневий показник, рН	<u>7,60–9,40</u> 8,20±0,20	<u>7,50–8,30</u> 7,90±0,10	<u>7,50–7,90</u> 7,70±0,10	6,50–8,50
2	Вільний аміак NH_3 , мгN/дм ³	<u>0,01–0,36</u> 0,10±0,05	<u>0,01–0,04</u> 0,02±0,01	<u>0,01–0,04</u> 0,02±0,00	до 0,05
3	Перманганатна окиснюваність, мгО/дм ³	<u>8,70–21,00</u> 11,10±1,70	<u>8,80–15,10</u> 11,10±0,80	<u>7,20–18,30</u> 10,40±1,40	до 15,0
4	Біхроматна окиснюваність, мгО/дм ³	<u>21,70–52,50</u> 27,70±4,20	<u>21,90–37,70</u> 27,60±2,0 0	<u>17,90–45,80</u> 26,00±3,60	до 50,0
5	Амонійний нітроген, NH_4^+ , мгN/дм ³	<u>0,58–0,86</u> 0,71±0,04	<u>0,62–1,19</u> 0,88±0,08	<u>0,64–0,90</u> 0,78±0,04	до 2,00
6	Нітрити, NO_2^- , мгN/дм ³	<u>0,05–0,08</u> 0,06±0,00	<u>0,06–0,10</u> 0,08±0,01	<u>0,05–0,07</u> 0,06±0,00	до 0,10
7	Нітрати, NO_3^- , мгN/дм ³	<u>0,18–0,37</u> 0,27±0,02	<u>0,15–0,36</u> 0,28±0,03	<u>0,18–0,31</u> 0,25±0,02	до 2,00
8	Мінеральний фосфор, PO_4^{3-} , мгP/дм ³	<u>0,27–0,87</u> 0,46±0,09	<u>0,17–0,32</u> 0,26±0,02	<u>0,27–0,39</u> 0,33±0,02	до 0,70

Продовження табл. 2

№ з/п	Показники	Варіанти дослідів			НЗ для ставової води
		Дослід I	Дослід II	Контроль	
9	Загальне залізо, $\text{Fe}^{2+} + \text{Fe}^{3+}$, мг/дм ³	<u>0,10–0,40</u> 0,26±0,04	<u>0,21–0,92</u> 0,54±0,09	<u>0,23–0,85</u> 0,40±0,09	до 1,00
10	Кальцій, Ca^{2+} , мг/дм ³	<u>56,10–84,20</u> 70,10±5,300	<u>68,10–86,20</u> 77,20±3,70	<u>74,10–86,20</u> 80,20±2,70	до 70,00
11	Магній, Mg^{2+} , мг/дм ³	<u>10,90–15,80</u> 13,40±1,10	<u>18,2–26,7</u> 22,5±1,9	<u>10,9–26,7</u> 18,8±3,5	до 30,00
12	Натрій+Калій, $\text{Na}^+ + \text{K}^+$, мг/дм ³	<u>78,30–80,30</u> 79,30±0,40	<u>38,50–74,30</u> 56,40±8,00	<u>50,50–65,50</u> 58,00±3,30	до 50,00
13	Гідрокарбонати, HCO_3^- , мг/дм ³	<u>183,10–292,90</u> 238,00±24,50	<u>244,10–256,30</u> 250,20±2,70	<u>219,70–292,90</u> 256,30±16,40	до 300,00
14	Хлориди, Cl^- , мг/дм ³	<u>100,00–104,20</u> 102,10±0,94	<u>93,1–100,0</u> 96,5±3,4	<u>95,8–97,2</u> 96,5±0,7	до 70,00
15	Сульфати, SO_4^{2-} , мг/дм ³	<u>42,80–46,50</u> 44,70±1,80	<u>50,60–58,00</u> 54,30±3,70	<u>42,4–49,0</u> 45,7±3,3	до 60,00
16	Загальна твердість, мг-екв./дм ³	<u>3,70–5,50</u> 4,600±0,900	<u>4,90–6,50</u> 5,70±0,80	<u>4,6–6,5</u> 5,6±0,9	5,00–7,00
17	Мінералізація, мг/дм ³	<u>481,10–618,20</u> 549,60±30,70	<u>555,30–558,80</u> 557,10±1,70	<u>509,80–558,80</u> 555,40±20,40	до 1000,00

Мінералізація води вирощувальних ставів була середньою з сумою іонів на рівні 549,6–557,1 мг/дм³.

Загальна твердість води не виходила за межі нормативних значень і складала 4,6±0,9–5,7±0,8 мг-екв./дм³ у дослідних варіантах та 5,6±0,9 мг-екв./дм³ у контрольному (табл. 2).

Водневий показник (рН) впродовж вегетаційного сезону в дослідних варіантах коливався від 7,5 до 9,4, тобто середовище змінювалося від слабколужного до лужного. У контролі рН впродовж вегетаційного сезону змінювався в межах 7,5–7,9, тобто середовище було слабколужне (табл. 2).

Величина перманганатної окиснюваності, що визначає кількість водорозчинної органічної речовини та рівень органічного забруднення водного середовища, знаходилася в межах нормативних значень — 7,2–15,1 мгО/дм³ і, лише у кінці серпня спостерігалось незначне її підвищення до 21,0 мгО/дм³ у досліді I та до 18,3 мгО/дм³ у контрольному варіанті (табл. 2).

У воді експериментальних ставів упродовж вегетаційного сезону були присутні всі біогенні елементи (NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , Fe^{2+3+}), концентрації яких не перевищували нормативні значення. При цьому вміст мінерального фосфору в середньому за вегетаційний сезон в досліді I був 1,8 раза вищим, порівняно з дослідом II та в 1,4 раза, порівняно з контролем. Внесення бактеріального препарату як по ложу, так і по воді (дослід I) виявилось більш ефективним для підвищення вмісту мінерального фосфору, ніж застосування препарату лише по поверхні водного дзеркала ставу (дослід II). У контролі ж (при застосуванні перегною ВРХ) вміст мінерального фосфору був 1,3 раза вищим, порівняно з дослідом II (див. табл. 2).

Стави господарства піддаються забрудненню як із джерела водопостачання, так із прилеглих територій, що мало істотний вплив на вміст ($\text{Na}^+ + \text{K}^+$) та (Cl^-). Вміст хлоридів особливо у весняний період був на рівні 93,1–104,2 мг/дм³, що в 1,3–1,5 раза перевищувало нормативні значення для ставової води. Дане явище вказує на досить високе забруднення води, що надходила в експериментальні стави.

В цілому, гідрохімічний режим як дослідних, так і контрольного ставів був сприятливим для розвитку кормових організмів та вирощування рибопосадкового матеріалу.

Впродовж вегетаційного сезону експериментальні стави заростали макрофітами. Найбільш сильне заростання (до 40% водного дзеркала) ставів водною рослинністю (*Potamogeton pectinatus*, *Ceratophyllum demersum*, *Polygonum amphibium* L., *Lemna minor*) спостерігалось в липні та серпні.

Дослідження гідробіологічного режиму експериментальних ставів показали, що якісний склад рослинного планктону істотно не відрізнявся, флористичне різноманіття його збільшувалося від весни до осені. Всього в альгофлорі вирощувальних ставів було виявлено 148 видів та внутрішньовидових таксонів водоростей, що належать до 6 систематичних відділів: *Cyanophyta*, *Euglenophyta*, *Dinophyta*, *Bacillariophyta*, *Chryzophyta* та *Chlorophyta*. Основу видового складу планктонних водоростей становили зелені (59–66%), евгленові (14–17%), синьозелені (7–12%) та діатомові (7–11%).

Фітопланктон експериментальних ставів характеризувався помірним розвитком. На початку вегетаційного сезону біомаса фітопланктону в дослідних ставах була на однаковому рівні (4,41–4,78 мг/дм³), у контрольному – майже вдвічі вищою (7,89 мг/дм³). Головна роль у формуванні біомаси належала зеленим водоростям, переважно хлорококовим (35,6–44,8% загальної біомаси фітопланктону).

При застосуванні органічного добрива в комплексі з бактеріальним (дослід І), виявилися кращі умови для розвитку рослинного планктону, чисельність якого досягала 98,1 млн. кл./дм³, біомаса — 21,11 мг/дм³. У контрольному ставу чисельність фітопланктону впродовж вегетаційного сезону не перевищувала 32,1 млн. кл./дм³, біомаса — 9,65 мг/дм³. Найнижчі кількісні показники розвитку фітопланктону були в досліді ІІ (табл. 3).

Таблиця 3. Фітопланктон експериментальних ставів ДП ДГ «Нивка», 2015 р.

Варіанти досліді	Загальна чисельність, тис. кл./дм ³	Біомаса, мг/дм ³	Продукція за сезон, кг/га
Контроль	232,0–41208,0 15851,0±6019,9	0,15–9,65 3,66±1,39	5490,0
Дослід І	2118,0–98080,0 24876,4±12670,4	0,70–21,11 5,63±2,62	8445,0
Дослід ІІ	390,0–27429,0 9408,3±4046,1	0,10–5,06 2,12±0,73	1590,0

Примітка: Тут і надалі чисельник — межі коливань; знаменник — середнє значення.

Мінімальний розвиток фітопланктону в усіх вирощувальних ставках спостерігали в кінці червня та липні в період активного розвитку бактеріо- та зоопланктону.

Максимальні показники чисельності та біомаси фітопланктону як у дослідних, так і в контрольному ставках було зафіксовано в другій половині серпня. Домінуюче становище в цей час займав представник зелених водоростей *Scenedesmus quadricauda*.

В середньому за вегетаційний сезон кількісний розвиток рослинного планктону за комплексного удобрення ставу (дослід І) був у 1,5 раза вищим, ніж у контрольному ставі, та в 2,7 раза, ніж у ставі (дослід ІІ). Продукція фітопланктону за вегетаційний сезон у ставках була на рівні 1590,0-8445,0 кг/га (табл. 3).

Основна роль у формуванні чисельності фітопланктону експериментальних ставів в середньому за вегетаційний сезон належала синьозеленим (49,0–55,7%) та зеленим (37,4–45,0%) водоростям. Біомасу рослинного планктону першочергово формували зелені водорості (43,9–57,0%), хоча слід також зазначити, що евгленові водорості за мінімальної чисельності, яка складала в середньому за сезон лише 2,0–2,3% від загальної чисельності фітопланктону, продукували значну біомасу, яка становила 17,0–24,5% від загальної біомаси фітопланктону (рис. 1).

Рис. 1. Таксономічна структура фітопланктону за чисельністю (а) та біомасою (б) експериментальних ставів ДП ДГ «Нивка», 2015 р.

Бактеріопланктон вирощувальних ставів був представлений мікроскопічними кулястими та паличкоподібними формами. Загальна чисельність мікроорганізмів впродовж вегетаційного сезону в дослідних ставах змінювалася в межах 2,87–11,02 млн кл./мл, з середньосезонними показниками на рівні 5,98–6,59 млн кл./мл, біомаса — 2,29–8,81 мг/дм³, з середньосезонними показниками на рівні 4,78–5,24 мг/дм³. У контрольному варіанті чисельність бактеріопланктону змінювалася в межах від 3,83 до 8,39 млн кл./мл, за середніх значень 6,09 млн кл./мл, біомаса — відповідно 3,06–6,72 мг/дм³ та 4,87 мг/дм³ (табл. 4).

Таблиця 4. Бактеріопланктон експериментальних ставів ДП ДГ «Нивка», 2015 р.

Варіанти дослідів	Загальна чисельність, млн. кл./мл	Біомаса, мг/дм ³	Гетеротрофи, тис. кл./мл
Контроль	<u>3,83–8,39</u> 6,09±0,68	<u>3,06–6,72</u> 4,87±0,56	<u>0,17–5,04</u> 2,51±0,72
Дослід I	<u>2,87–11,02</u> 6,59±1,03	<u>2,29–8,81</u> 5,24±0,82	<u>0,48–4,84</u> 1,86±0,54
Дослід II	<u>2,91–10,67</u> 5,98±1,07	<u>2,33–8,53</u> 4,78±0,86	<u>0,11–6,68</u> 2,19±0,83

Вищі показники розвитку бактеріопланктону були характерні для дослідних ставів, де піки чисельності мікроорганізмів, як правило, спостерігалися після внесення бактеріального добрива «Фосфобактерин».

Середні за вегетаційний сезон показники чисельності та біомаси бактеріопланктону в досліді I були в 1,2 раза вищими, ніж в досліді II, та в 1,1 раза, ніж у контролі (табл. 3).

Вивчення розвитку гетеротрофів в експериментальних ставах показало, що найвищі показники чисельності в усіх ставах (4,84–6,68 тис. кл./мл) було зафіксовано на початку серпня, в період найвищих температур води.

Середньосезонні показники чисельності гетеротрофних бактерій у воді ставів знаходилися в межах від 1,86 до 2,51 тис. кл./мл (табл. 4). При цьому найбільша чисельність гетеротрофної мікрофлори характерна для контрольного ставу (із внесенням перегною ВРХ). В цілому ж, показники забрудненості в усіх ставах відповідають якості води (ОСТ 15.372.87), що використовується в рибецьких господарствах.

У зоопланктонних угрупованнях контрольного та дослідних ставів усього було зареєстровано 23 таксони гідробіонтів, що належать до трьох основних груп: *Rotifera* (11 видів), *Cladocera* (10 видів), *Copepoda* (2 види). Серед групи інших організмів були відмічені планктонні личинки хірономід (*Chironomidae larvae*), веснянки (р. Perlidae), ефіпіїми ракоподібних, статобласти моховаток (*Bryozora*) та черепашкові рачки (*Ostracoda* sp.).

Вивчення сезонної динаміки розвитку зоопланктону показало, що, незважаючи на достатню забезпеченість зоопланктону їжею (бактеріо- і фітопланктон), через значне виїдання рибою чисельність його в дослідних ставах не перевищувала 621,0–654,0 тис. екз./м³, біомаса — 7,06–9,35 г/м³, у контрольному — відповідно 519,0 тис. екз./м³ та 8,37 г/м³ (табл. 5).

Таблиця 5. Зоопланктон експериментальних ставів ДП ДГ «Нивка», 2015 р.

Варіанти дослідів	Загальна чисельність, тис. екз./м ³	Біомаса, г/м ³	Продукція за сезон, кг/га
Контроль	<u>181,0–519,0</u> 310,7±48,9	<u>1,96–8,37</u> 5,13±0,85	1026,0
Дослід I	<u>104,0–621,0</u> 234,8±68,2	<u>1,81–7,06</u> 3,96±0,72	792,0
Дослід II	<u>63,0–654,0</u> 387,7±94,9	<u>1,09–9,35</u> 5,59±1,13	1118,0

Внесення у став бактеріального добрива в комплексі з органічним забезпечило в ньому кращі стартові умови для вирощування цьоголіток корошових риб. Так, на момент зарибнення ставів личинками корошових риб в досліді I основу чисельності (до 67,3%) та біомаси (до 41,8%) зоопланктону становили коловертки (*Brachionus diversicornis*, *Br. calyciflorus*, *Euchlanis dilatata*) – найбільш доступні кормові організми для личинок риб на даному етапі їх розвитку, в контролі 63,0 та 38,4% відповідно — гіллястовусі ракоподібні (*Bosmina longirostris*, *Moina rectirostris*). У досліді II чисельність (38,1%) та біомасу (74,3%) тваринного планктону формувала група інших організмів, менш доступна на цей час для личинок риб.

У подальшому зоопланктон експериментальних ставів формувався за рахунок розвитку гіллястовусих (*Bosmina longirostris*, *Daphnia longispina*, *Moina rectirostris*, *Chydorus sphaericus*, *Ceriodaphnia affinis*, *Scapholeberis mucronata*) та веслоногих (*Cyclops* sp., їх наупліальні та копеподитні стадії розвитку) ракоподібних.

Середні за вегетаційний сезон показники розвитку зоопланктону в дослідних ставах були на рівні 234,8–387,7 тис. екз./м³ за чисельністю та 3,96–5,59 г/м³ за біомасою, у контрольному — відповідно 310,7 тис. екз./м³ та 5,13 г/м³ (табл. 5). При цьому основу чисельності та біомаси зоопланктону в дослідних ставах майже в рівних кількостях формували гіллястовусі та веслоногі ракоподібні, у контрольному – веслоногі (рис. 2).

Продукція зоопланктону за вегетаційний сезон у дослідних варіантах була на рівні 792,0–1118,0 кг/га, в контрольному – 1026,0 кг/га.

Макрозообентос експериментальних ставів був представлений личинками двокрилих із родин *Chironomidae*, *Heleidae* та малощетинковими червами (*Oligochaeta*).

У дослідних варіантах основу як чисельності (до 69–100%), так і біомаси (до 78–100%) становили личинки хірономід. У контрольному основу чисельності формували малощетинкові черви (до 56%), а біомаси — личинки хірономід (до 57%).

Основними домінуючими видами серед личинок хірономід були: *Chironomus dorsalis*, *Chironomus plumosus*, *Cryptohironomus ex. defectus*.

Кількісний розвиток зообентосу в експериментальних ставах впродовж вегетаційного сезону був незначний. У дослідних ставах чисельність зообентосу не перевищувала 599,4–666,0 екз./м², а біомаса — 2,23–3,97 г/м², у контрольному — відповідно 133,3 екз./м² та 1,24 г/м².

Рис. 2. Співвідношення основних таксономічних груп зоопланктону експериментальних ставів ДП ДГ «Нивка» за середньосезонними показниками чисельності (а) та біомаси (б)

Оскільки біомаса макрозообентосу формувалася, в основному, за рахунок розвитку личинок хірономід, то її динаміка впродовж вегетаційного сезону була зумовлена як життєвими циклами їх розвитку, так і елімінацією коропом. Найбільш інтенсивно донна фауна виїдалася в другій половині вегетаційного сезону.

Середні за вегетаційний сезон показники розвитку зообентосу в дослідних варіантах були на рівні 114,2–138,0 екз./м² за чисельністю та 0,59–0,70 г/м² за біомасою, що відповідно в 2,7–3,2 та в 2,6–3,0 рази вище, ніж у контрольному. За вегетаційний сезон в дослідних ставах створювалося 35,4–41,4 кг/га продукції макрозообентосу, в контрольному — 13,8 кг/га.

Восени під час обловів ставів, середня маса вирощених цьоголіток коропа найбільшою була в досліді I – 25,1 г, а найменшою в досліді II – 18,0 г. У контролі маса цьоголіток коропа становила 23,4 г (табл. 6).

Вихід цьоголіток коропа від посаджених на вирощування заводських непідрослених личинок в експериментальних ставах знаходився на рівні 20,0–22,3 % (див. табл. 6).

Таблиця 6. Результати вирощування цьоголіток риб в експериментальних ставах ДП ДГ «Нивка», 2015 р.

Варіанти дослідів	Вид риб	Посаджено непідщощених личинок тис. екз./га	Вилловлено цьоголіток			Рибопродуктивність, кг/га	
			тис. екз./га	середня маса, г	вихід, %	за видами	загальна
Контроль	Короп	50,0	10,95	23,4±1,2	21,9	256,2	
	Білий амур	10,0	1,00	65,4±2,7	10,0	65,4	321,6
Дослід I	Короп	50,0	10,00	25,1±1,7	20,0	251,0	
	Білий амур	10,0	3,24	46,4±3,2	32,4	150,3	401,3
Дослід II	Короп	50,0	11,15	18,0±2,1	22,3	200,7	
	Білий амур	10,0	0,64	77,8±2,0	6,4	49,8	250,5

Середня маса вирощених цьоголіток білого амура в усіх ставах значно перевищувала нормативні показники (20–25 г) і становила 46,4–77,8 г. Вихід цьоголіток білого амура найвищим був у досліді I — 32,4%, а в контролі та досліді II становить відповідно 10 і 6,4 %.

Рибопродуктивність за коропом в експериментальних ставах була на рівні 200,7–256,2 кг/га, загальна рибопродуктивність становила 250,5–401,3 кг/га. В досліді I загальна рибопродуктивність складала 401,3 кг/га і була більшою на 79,7 кг/га, ніж у контролі, та на 150,8 кг/га, ніж у досліді II.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Гідрохімічний режим експериментальних ставів формувався під впливом джерела водопостачання та заходів, спрямованих на інтенсифікацію розвитку природної кормової бази, і був сприятливим для розвитку кормових організмів та вирощування рибопосадкового матеріалу.

Внесення бактеріального добрива на початку вегетаційного сезону, лише по поверхні водного дзеркала, з розрахунку 1,0 л/га виявилось малоефективним для підвищення продуктивності екосистеми ставу в цілому. Більш ефективним способом підвищення біологічної продуктивності, в тому числі рибопродуктивності вирощувальних ставів, виявилось застосування «Фосфобактерину» впродовж вегетаційного сезону як по ложу (1,0 л/га), так і по поверхні водного дзеркала (1,0 л/га) в комплексі з органічним добривом — перегноєм ВРХ.

За сумісного застосування бактеріального добрива з двічі меншою кількістю органічного добрива (перегною ВРХ) в дослідному ставі створювалися сприятливі умови для розвитку природної кормової бази, росту та виживання цьоголіток коропових риб, а отримана загальна рибопродуктивність була в 1,2 раза вищою, ніж у контрольному ставі (за застосування лише перегною ВРХ).

Подальше вивчення продуктивності ставових екосистем за використання бактеріальних добрив дозволить розробити науково обґрунтовані норми екологічно безпечного удобрення ставів при вирощуванні рибопосадкового матеріалу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / Андрющенко А. І. та ін. ; ред. М. В. Гринжевський. Київ, 1998. 124 с.
2. Винберг Г. Г., Ляхнович В. П. Удобрение прудов. Москва : Пищевая промышленность, 1965. 272 с.
3. Wurts W. A. Organic fertilization in culture ponds // World Aquaculture. 2004. Vol. 35, iss. 2. P. 64—65.
4. Brunson M. W., Stone N., Hargreaves J. Fertilization of Fish Ponds // Southern Regional Aquaculture Center Publication. 1999. № 471.
5. Калініченко А. В., Мінькова О. Г. Біологічний азот у законодавстві ЄС // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. 2014. № 3(60). С. 7—9. (Серія : Біологія).
6. Патыка В. Ф. Биологический азот и новая стратегия производства продукции растениеводства в Украине // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. 2014. № 3(60). С. 10—14. (Серія : Біологія).
7. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика / Волкогон В. В., та ін. ; ред. В. В. Волкогон. Київ : Аграрна наука, 2006. 312 с.
8. Токмакова Л. М. Мікробні препарати на основі фосфатмобілізуючих мікроорганізмів у землеробстві // Пропозиція. 2006. № 9. С. 68—70.
9. Родина А. Г. Микроорганизмы и повышение рыбопродуктивности прудов. Москва, 1958. С. 159—164.
10. Садунова А. В. Общая характеристика бактерий рода *Bacillus*. Владивосток. 66 с.
11. Суслова М. Ю. Распространение и разнообразие спорообразующих бактерий рода *Bacillus* в водных экосистемах : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.16 «Экология», 03.00.07 «Микробиология». Улан-Удэ, 2007. 22 с.
12. Павлова Г. Г., Рой А. О., Курдиш І. К. Фосфатмобілізувальні бактерії, виділені з донних відкладень дофінівського лиману та одеського регіону північно-західної частини Чорного моря // Мікробіологічний журнал. 2014. Т. 76, № 4. С. 34—40.
13. Базаєва А. В. Біологічні основи використання фосформобілізуючого бактеріального препарату поліміксобактерину в рибництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.03 «Рибництво». Київ, 2011. 20 с.
14. Алёкин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеиздат, 1973. 262 с.
15. Кузнецов С. И., Дубинина Г. А. Методы изучения водных микроорганизмов. Москва : Наука, 1989. 285 с.
16. Антипчук А. Ф. Микробиология рыбоводных прудов. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1983. 145 с.
17. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. ; ред. В. Д. Романенко ; НАН України, Ін-т гідробіології. Київ : Логос, 2006. 408 с.
18. Асаул З. И. Определитель пресноводных водорослей. Эвгленовые. Москва : Наука, 1973. 330 с.
19. Пресноводные водоросли Украинской ССР / Топачевский А. В., Масюк Н. П. ; ред. Макаревич М. Ф. Киев : Вища школа, 1984. 336 с.

20. Водоросли. Справочник / Вассер С. П. и др. Киев : Наукова думка, 1989. 608 с.
21. Царенко П. М. Краткий определитель хлорококковых водорослей Украинской ССР. Киев : Наук. думка, 1990. 208 с.
22. Кутикова Л. А. Коловратки фауны СССР. Ленинград : Наука, 1970. 744 с.
23. Мануйлова Е. Ф. Ветвистоусые рачки (*Cladocera*) фауны СССР. Москва ; Ленинград : Наука, 1964. 328 с.
24. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части ССР (Планктон, бентос). Ленинград : Гидрометеиздат, 1977. 512 с.
25. Шерман І. М. Ставові рибництво. Київ : Урожай, 1994. 336 с.

REFERENCES

1. Andriushchenko, A. I., Baltadzi, R. A., Vovk, N. I., Hrynzhewskiy, M. V., Hudyma, B. I., & Demchenko, I. T. et al. (1998). *Metody pidvyshchennia pryrodnoi ryboproduktyvnosti staviv*. M. V. Hrynzhewskiy (Ed.). Kyiv.
2. Vinberg, G. G., & Lyakhnovich, V. P. (1965). *Udobrenie prудov*. Moskva: Pishchevaya promyshlennost'.
3. Wurts, W. A. (2004). Organic fertilization in culture ponds // *World Aquaculture*, 35(2), 64-65.
4. Brunson, M. W., Stone, N., & Hargreaves, J. (1999). Fertilization of Fish Ponds // *Southern Regional Aquaculture Center Publication*, 471.
5. Kalinichenko, A. V., & Minkova, O. H. (2014). Biologichnyi azot u zakonodavstvi YeS. *Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu*, 3(60), 7-9.
6. Patyka, V. F. (2014). Biologicheskiiy azot i novaya strategiya proizvodstva produktsii rastenievodstva v Ukraine. *Naukovi zapiski Ternopil's'kogo natsional'nogo pedagogichnoho universitetu*, 3(60), 10-14.
7. Volkohon, V. V., Nadkernychna, O. V., & Kovalevska, T. M. et al. (2006). *Mikrobnii preparaty u zemlerobstvi. Teoriia i praktyka*. V. V. Volkohon (Ed.). Kyiv: Ahrarna nauka.
8. Tokmakova, L. M. (2006) Mikrobnii preparaty na osnovi fosfatmobilizuiuchykh mikroorhanizmiv u zemlerobstvi. *Propozytsiia*, 9, 68-70.
9. Rodina, A. G. (1958). *Mikroorganizmy i povyshenie ryboproduktyvnosti prудov*. Moskva.
10. Sadunova, A. V. (2012). *Obshchaya kharakteristika bakteriy roda Bacillus*. Vladivostok.
11. Suslova, M. Yu. (2007). Rasprostranenie i raznoobrazie sporoobrazuyushchikh bakteriy roda *Bacillus* v vodnykh ekosistemakh. *Extended abstract of candidate's thesis*. Ulan-Ude.
12. Pavlova, H. H., Roi, A. O. & Kurdysh, I. K. (2014). Fosfatmobilizувальні бактерії, виділені з донних відкладен дофінівського лиману та одеського регіону північно-західної частини Чорного моря. *Мікробіологічний журнал*, 76, 4, 34-40.
13. Bazaieva, A. V. (2011). Biologichni osnovy vykorystannia fosformobilizuiuchoho bakterialnoho preparatu polimiksobakterynu v rybnytstvi. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv.
14. Alekin, O. A., Semenov, A. F., & Skopintsev, V. A. (1973). *Rukovodstvo po khimicheskomu analizu vod sushi*. Leningrad: Gidrometizdat.
15. Kuznetsov S. I., Dubinina G. A. (1989). *Metodi izucheniya vodnykh mikroorganizmov*. Moskva: Nauka.

16. Antipchuk, A. F. (1983). *Mikrobiologiya rybovodnykh prudov*. Moskva: Legkaya i pishchevaya promyshlennost'.
17. Arsan, O. M., Davydov, O. A., & Diachenko, T. M. et al. (2008). *Metody hidroekologichnykh doslidzhen poverkhnevnykh vod*. V. D. Romanenko (Ed.). Kyiv: Lohos.
18. Asaul, Z. I. (1973). *Opredelitel' presnovodnykh vodorosley. Evglenovye*. Moskva: Nauka.
19. Topachevskiy, A. V., & Masyuk, N. P. (1984). *Presnovodnye vodorosli Ukrainской SSR*. Makarevich M. F. (Ed.). Kyiv: Vishcha shkola.
20. Vasser, S. P., Kondrat'eva, N. V., & Masyuk, N. P. et al. (1989). *Vodorosli. Spravochnik*. Kyiv: Naukova dumka.
21. Tsarenko, P. M. (1990). *Kratkyi opredelytel khlorokokkovykh vodoroslei Ukraynskoй SSR*. Kyiv: Naukova dumka.
22. Kutikova, L. A. (1970). *Kolovratki fauny SSSR*. Leningrad: Nauka.
23. Manuylova, E. F. (1964). *Vetvistosyie rachki (Cladocera) fauny SSSR*. Moskva; Leningrad: Nauka.
24. *Opredelitel' presnovodnykh bespozvonochnykh Evropeyskoy chasti SSR (Plankton, bentos)*. (1977). Leningrad: Gidrometeoizdat.
25. Sherman, I. M. (1994). *Stavove rybnytstvo*. Kyiv.

ПРОДУКТИВНОСТЬ ВЫРОСТНЫХ ПРУДОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ «ФОСФОБАКТЕРИН»

Т. В. Григоренко, grygorenko@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
Н. Н. Савенко, hydrobiology@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
А. Н. Базаева, a_bazaeva@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
Н. П. Чужма, n_chuzhma@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
Е. Н. Колос, ecology@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
Л. В. Титова, Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН, г. Киев

Цель. Исследовать влияние бактериального удобрения «Фосфобактерин» на формирования гидрохимического режима, развитие естественной кормовой базы и рыбопродуктивность выростных прудов.

Методика. При проведении исследований были использованы общепринятые в гидрохимии, микробиологии, гидробиологии и рыбоводстве методики.

Результаты исследований. В статье представлены результаты исследования продуктивности выростных прудов при разных способах применения бактериального удобрения «Фосфобактерин».

Установлено, что гидрохимический режим экспериментальных прудов формировался под влиянием источника водоснабжения и мероприятий, направленных на интенсификацию развития естественной кормовой базы, и был благоприятным для развития кормовых организмов и выращивания рыбопосадочного материала.

Внесение бактериального удобрения в начале вегетационного сезона по поверхности водного зеркала пруда оказалось малоэффективным для повышения продуктивности экосистемы пруда в целом. Более эффективным методом повышения биологической продуктивности, в том числе и рыбопродуктивности выростных прудов, оказалось применение «Фосфобактерина» на протяжении вегетационного сезона как по ложу, так и по поверхности водного зеркала в комплексе с органическим удобрением — перегноем КРС. В опытном пруду при комплексном удобрении средние за вегетационный период биомассы

фитопланктона были в 1,5 раза, бактериопланктона — в 1,1 раза, зообентоса — в 2,6 раза, а полученная общая рыбопродуктивность в 1,2 раза выше, чем в контрольном пруду (при применении только перегноя КРС).

Научная новизна. Исследованы особенности формирования гидрохимического и гидробиологического (фито-, бактерио-, зоопланктон, зообентос) режимов выростных прудов и представлены рыбоводные показатели при использовании бактериального удобрения «Фосфобактерин» как самостоятельно, так и совместно с традиционным органическим удобрением — перегноем КРС.

Практическая значимость. На основании полученных результатов разработаны временные рекомендации по применению бактериального удобрения «Фосфобактерин» для повышения продуктивности выростных прудов.

Ключевые слова: выростные пруды, гидрохимический режим, фитопланктон, бактериопланктон, зоопланктон, зообентос, перегной КРС, «Фосфобактерин», удобрение прудов.

PRODUCTIVITY OF GROWING PONDS WHEN APPLYING THE BACTERIAL FERTILIZER «PHOSPHOBAKTERIN»

T. Hryhorenko, gyrgorenko-@ukr.net, Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv

N. Savenko, hydrobiology@if.org.ua, Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv

A. Bazaieva, a_bazaeva@ukr.net, Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv

N. Chuzhma, n_chuzhma@ukr.net, Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv

O. Kolos, ecology@if.org.ua, Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv

L. Tytova, Danulo Zabolotny Institute of Microbiology and Virology NAS, Kyiv

Purpose. To investigate the effect of the bacterial fertilizer "Phosphobacterin" on the formation of the hydrochemical regime, development of the natural food supply and fish productivity in the growing ponds.

Methodology. The work was conducted according to generally accepted hydrochemical, microbiological, hydrobiological and fish farming methods.

Findings The article presents the results of a study of the productivity of growing ponds with different methods of the application of the bacterial fertilizer "Phosphobacterin".

It was found that the hydrochemical regime of the experimental ponds was formed under the effect of the source of water supply and measures aimed at intensifying the development of the natural food supply and was favorable for the development of feed organisms and the cultivation of fish seeds.

Application of the bacterial fertilizer at the beginning of the growing season along the water pond surface proved to be little effective for increasing the productivity of the pond ecosystem as a whole. A more effective method of increasing biological productivity, including fish productivity of growing ponds, was the application of "Phosphobacterin" during the growing season both on the bed and on the water surface in combination with the organic fertilizer - cattle humus. In the experimental pond under complex fertilization, the average phytoplankton biomass during the growing season was 1.5 times, bacterioplankton 1.1 times, zoobenthos 2.6 times higher, and the obtained total fish productivity was 1.2 times higher than in the control pond (when applying only cattle humus).

Originality. The peculiarities of formation of hydrochemical and hydrobiological (phyto-, bacterio-, zooplankton, zoobenthos) regimes of growing ponds and the fishery indices are studied, both for bacterial fertilizer "Phosphobacterin" independently and together with the traditional organic fertilizer - cattle humus.

Practical value. Based on the obtained results, we developed temporary recommendations for using the bacterial fertilizer "Phosphobacterin" to increase the productivity of growing ponds.

Key words: growing ponds, hydrochemical regime, phytoplankton, bacterioplankton, zooplankton, zoobenthos, cattle humus, Phosphobacterin, ponds fertilizers.

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 65-75
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.065>
УДК: [639.371.13:639.3.06]:597-14

МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕМОНТНО-МАТОЧНОГО СТАДА РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ (*ONCORHYNCHUS MYKISS* (WALBAUM, 1792), ВИРОЩЕНОЇ В УМОВАХ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА «СЛОБОДА БАНИЛІВ»

П. Д. Мендришора, mendryshora@mail.ru, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

А. І. Мрук, amruk@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Г. А. Куріненко, annazakharenko@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

Мета. Проаналізувати результати морфометричних промірів та дати рибницько-біологічну характеристику, з застосуванням генетичних досліджень, цьоголіток та дволіток райдужної форелі, вирощеної за індустріальної технології в умовах форелевого господарства «Слобода Банілів».

Методика. Дослідження проводили в індустріальному господарстві «Слобода Банілів» Чернівецької області. Матеріалом для досліджень слугували цьоголітки та дволітки райдужної форелі, отримані від ікри осінньонерестуючої форми райдужної форелі. Вирощування цьоголіток проводили в басейні площею 216 м², за густоти посадки 255 екз./м², дволіток — 108 м² та 33 екз./м² відповідно, згідно з загальноприйнятими методиками у форелівництві. Морфометричні проміри риб здійснювали за методикою І. Ф. Правдіна. Статистичне опрацювання матеріалу проводили в Microsoft Office Excel (2003). Аналіз величин виконано за системою абсолютних значень. Критеріями аналізу показників були їх середня величина та похибка ($M \pm m$), відхилення (σ), показник мінливості (C_v). Годівлю риб проводили штучним кормом з високим вмістом протеїну, данського виробника — фірми «Biotag».

Результати. Проведені дослідження з вирощування райдужної форелі в індустріальних умовах засвідчили, що пропорції тіла у риб з віком не змінюються, проте довжина їхніх плавців зменшується, однак у дволіток як індекс високоспинності, так і коефіцієнт прогонистості незначно знижувався, що є закономірним за зростання висоти тіла. Незважаючи на нестабільні умови вирощування, особини, як у віці цьоголіток, так і у віці дволіток, характеризувалися помірним темпом росту та високим коефіцієнтом оплати корму.

Наукова новизна. Вперше в умовах України проведено дослідження щодо формування ремонтно-маточних стад райдужної форелі з застосуванням аналізу фенотипових та продуктивних ознак і за генетичним контролем [1].

Практична значимість. Результати проведеної роботи дадуть змогу на підставі охарактеризованих фенотипових показників із застосуванням генетичних методів сформувати маточне стадо райдужної форелі, що характеризуватиметься високими показниками продуктивних та репродуктивних ознак.

Ключові слова: райдужна форель, цьоголітки, дволітки, маса, довжина тіла.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

В умовах сьогодення райдужна форель культивується більше ніж у 80 країнах світу і посідає друге місце в прісноводній та морській аквакультурі після чисельної родини коропових риб [2, 3]. Однак, незважаючи на сприятливі умови

© П. Д. Мендришора, А. І. Мрук, Г. А. Куріненко, 2017

виращування, Україна не є лідером з виробництва товарної форелі [4]. На території Європи формування маточних стад даного виду відбувалося внаслідок гібридизації її різних форм (шаства, сталеголового лосося та власне райдужної форелі) [5, 6], що були завезені в різний час з Америки інкубованою ікрою на стадії інтенсивної пігментації очей. В умовах України розвиток форелівництва поступається традиційному коропівництву та більшою частиною відбувається в західних областях. Як напрям аквакультури форелівництво почало свій розвиток з 1894–1896 р.

Для сучасних форелевих господарств характерна висока концентрація виробництва та узагальнена технологія утримання і розведення. Культивування риб відбувається в спеціальних рибницьких спорудах за високої густоти посадки та використання спеціалізованих штучних кормів [2, 7].

Від вищеперерахованих чинників абіотичного та біотичного походження залежать морфометричні показники риб. За певних умов утримання змінюється і їх фізіологічний стан. Встановлено, що одним з головних складників фенотипу є форма тіла, що зумовлюється особливостями пристосування виду до дії екологічних чинників у процесі філогенезу [8]. Ця особливість виявляється за адаптації риб до мінливого водного середовища, в умовах зміни гідрохімічного та гідрологічного режимів водойми, наявності об'єктів живлення. За морфологічними індексами можна оцінити фізіологічний стан риб [9].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Останнім часом, у зв'язку з антропогенним впливом на основні джерела водопостачання рибницьких господарств, спостерігається погіршення екологічних умов для риб, що, відповідно, призводить до порушення технології їх вирощування. Разом з тим, численні чинники (високий рівень інбридингу, неконтрольоване схрещування різноманітних племінних груп риб тощо), призводять до поступового зменшення репродуктивних показників, погіршення племінних якостей та зниження резистентності риб до захворювань чи несприятливих зовнішніх умов середовища.

Тому раціональне ведення форелевого господарства потребує створення високоякісних продуктивних маточних стад, які повинні максимально задовольняти вимоги господарств у здоровому життєстійкому посадковому матеріалі.

Отже, поєднання досліджень щодо фенотипових та продуктивних ознак з генетичним контролем на теперішній час є передовим та необхідним напрямом у вітчизняному форелівництві. Даний напрям в умовах індустриального форелевого господарства «Слобода Банилів» практикується впродовж останніх п'яти років і дає змогу сформувати високопродуктивне маточне стадо райдужної форелі.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідні роботи проводили в басейновому господарстві «Слобода Банилів», що знаходиться у Вижницькому районі Чернівецької області. Джерелом водопостачання господарства є ґрунтові води басейну р. Черемош. Термічний режим у господарстві нестабільний: влітку вода в ставах прогрівається до 16–

19°C, взимку знижується до 2°C. Оскільки живлення джерела відбувається в основному за рахунок атмосферних опадів та талої води, для нього характерні сезонні коливання потужності, у зв'язку з чим водообмін у господарстві не стабільний і в літні місяці буває на межі критичного для райдужної форелі.

Матеріалом для досліджень слугували цьоголітки та дволітки райдужної форелі, отримані від ікри осінньо-нерестуючої форми райдужної форелі. Вирощування цьоголіток проводили в басейні площею 216 м² за густоти посадки 255 екз./м², дволіток — відповідно 108 м² та 33 екз./м². Основні технологічні ланки вирощування проводили згідно з «Комплексною технологією відтворення лососевих риб у рибницьких господарствах України» [10], «Рекомендаціями з розведення та вирощування високопродуктивних племінних стад райдужної форелі» [11], «Технологической инструкцией по производству радужной форели в различных типах хозяйств Украины» [12].

Аналіз темпу росту та накопичення маси дослідних груп риб здійснювався один раз на місяць шляхом проведення контрольних ловів, під час яких проводили зважування 10–15 екземплярів. Визначення індивідуальної маси риб проводили на електронних терезах з точністю до 1 г.

Морфометричні проміри риб здійснювали згідно з методикою І. Ф. Правдіна [13, 14]. Досліджено 27 пластичних ознак, що найбільш часто використовуються за проведення біологічного і систематичного аналізу. Схему промірів наведено на рис. 1.

Рис. 1. Схема промірів лососевих риб:

af — довжина всієї риби, см; *ab* — довжина тіла за Смітом, см; *av* — довжина без хвостового плавця, см; *cu* — довжина тулуба, см; *ag* — довжина рила, мм; *gh* — діаметр ока, мм; *a₅d* — довжина середньої частини голови, мм; *a₅i* — довжина верхньощелепної кістки, мм; *ac* — довжина голови, мм; *hc* — позаоковий відділ голови, мм; *l₁m₁* — висота голови за потилицею, мм; *kl* — довжина нижньої щелепи, мм; *qm* — найбільша висота тіла, мм; *ζη* — найменша висота тіла, мм; *aq* — антедорсальна відстань, мм; *sv* — постдорсальна відстань, мм; *aw* — антевентральна відстань, мм; *ay* — антеанальна відстань, мм; *lv* — довжина хвостового стебла, мм; *qr* — довжина основи D, мм; *st* — найбільша висота D, мм; *yz* — довжина основи A, мм; *αβ* — найбільша висота A, мм; *uv* — довжина P, мм; *ωx* — довжина V, мм; *uw* — пектовентральна відстань, мм; *ωy* — вентральна відстань, мм.

Годівлю риб проводили штучним кормом фірми «Biomar». Розрахунки щодо необхідної кількості кормів проводили відповідно до таблиць раціонів, в яких враховані показники індивідуальної маси риб та температура водного середовища на момент годівлі.

Статистичне опрацювання матеріалу проводили в Microsoft Office Excel (2003). Аналіз величин пластичних ознак виконано за системою абсолютних значень. Критеріями аналізу показників були їх середня величина та середнє відхилення ($M \pm m$), похибка (σ), показник мінливості (C_v).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Рибницько-біологічна характеристика цьоголіток райдужної форелі.

Вирощені цьоголітки були одержані від осінньо-нерестуючої райдужної форелі. У листопаді 2013 р. на інкубацію було закладено 100 тис. ікринок. Вживання мальків середньої маси 3 г складало 55%. Вживання цьоголіток за середньої маси тіла 40 г становило 85%. Кормовий коефіцієнт складав 0,99 одиниці. Приріст маси цьоголіток був рівномірним упродовж сезону (рис. 2).

Загальна продуктивність за вирощування цьоголіток складала 11 кг/м³.

Рис. 2. Графік накопичення маси цьоголітками райдужної форелі

Відомо, що основними показовими значеннями, які характеризують умови існування виду в різноманітних умовах, є приріст і маса тіла. Саме темп лінійного та вагового росту є критерієм, що визначає цінність виду як об'єкта товарного рибництва [15]. Так, середня маса цьоголіток в рендомній вибірці складала 29,8 г за середньої довжини тіла 14,5 см. Пропорції тіла відповідали вимогам для райдужної форелі у віці цьоголіток. Величина голови становила 17,4% від довжини тіла, висота тіла — 19,3%, тобто, риби були високоспинними. Черевні плавці розміщені під кінцем спинного плавця, спинний незначно зміщений до хвоста. Всі плавці були розвиненими, їх величини у відсотках від довжини тіла за Смітом були наступними: спинний — 5,18, грудні — 3,83, черевні — 5,06, анальний — 5,18 (табл. 1).

Таблиця 1. Морфометрична характеристика цьоголіток райдужної форелі господарства «Слобода Банилів», n=15

Показники	Від довжини риби за Смітом, %	Від довжини голови, %	$M \pm m$	δ	Cv
<i>aф</i>			14,53±1,24	0,23	8,56
<i>ab</i>			14,08±1,29	0,24	9,17
<i>au</i>			13,02±1,29	0,24	9,94
<i>cu</i>			9,83±0,72	0,19	7,36
<i>ag</i>	3,70	21,7	5,33±0,62	0,16	11,57
<i>gh</i>	2,70	16,0	3,93±0,07	0,26	6,56
<i>a₅d</i>	11,90	68,7	16,87±2,00	0,52	11,83
<i>ac</i>	17,40		24,53±1,00	3,74	15,20
<i>hc</i>	8,5	49,2	12,07±1,62	0,42	13,46
<i>l₁m₁</i>	13,90	80,1	19,67±1,11	0,29	5,66
<i>a₅i</i>	6,00	34,7	8,53±1,30	0,34	15,26
<i>kl</i>	8,80	50,5	12,40±1,64	0,42	13,22
<i>qμ</i>	19,30	110,8	27,2±0,18	0,68	2,52
<i>ζη</i>	6,20	35,8	8,8±0,03	0,12	1,36
<i>aq</i>	45,60		64,27±5,56	1,43	8,65
<i>σu</i>	35,90		50,60±4,44	1,15	8,77
<i>αω</i>	46,10		65,0±5,35	1,38	8,22
<i>αy</i>	66,20		93,27±5,43	1,4	5,82
<i>λu</i>	13,00		18,40±2,80	0,72	15,21
<i>qr</i>	7,43		10,47±1,46	0,38	13,92
<i>st</i>	5,78		8,14±2,03	0,54	24,96
<i>yz</i>	4,97		7,00±1,13	0,29	16,20
<i>αβ</i>	5,18		7,73±1,79	0,46	23,17
<i>uv</i>	3,83		5,40±1,43	0,45	26,48
<i>ωx</i>	5,06		7,13±2,23	0,58	31,29
<i>uω</i>	29,70		41,87±8,56	2,21	20,44
<i>ωy</i>	17,60		24,87±2,95	0,76	11,86

Примітка. Умовні позначення аналогічні рис. 1.

Рибницько-біологічна характеристика дволіток райдужної форелі. Упродовж 2013–2014 рр. вирощування дволіток становило 10 місяців. Густота посадки складала 33 екз./м², або 47 екз./м³. Вживання в кінці вегетаційного сезону становило 87%, що на 3% нижче від нормативного значення (90 %). Приріст маси риб мав значні коливання в літній період (рис. 3), що було пов'язано з коливаннями дебету джерела водопостачання та високими температурами води, які спостерігали в липні та серпні.

Рис. 3. Динаміка масонакопичення дволітками райдужної форелі

При підвищенні температури води до 20°C, відповідно, знижувався вміст розчиненого у воді кисню, в зв'язку з цим годівлю риб не проводили, що й вплинуло на процес накопичення маси та виживання. Загальна рибопродуктивність за вирощування дволіток склала 20,0 кг/м³.

За середньої маси дволіток 237 г, їх середня довжина тіла становила 28,4 см. З віком у риб зростала довжина голови, яка становила 20% від довжини тіла, та висота тіла (22,4%), тобто риби були високоспинними (табл. 2).

Таблиця 2. Морфометрична характеристика дволіток райдужної форелі

Показники	Від довжини риби за Сміттом, %	Від довжини голови, %	Межі коливань		M±m	δ	Cv
			Max	Min			
af			35	20	28,43±2,91	0,51	10,23
ab			34	23	27,97±2,44	0,45	8,73
av			32	22	26,13±2,24	0,41	8,56
cv			25	17	20,37±1,91	0,35	9,39
ag	5,7	28,45	23	11	15,97±2,98	0,54	18,64
gh	3,4	17,00	11	8	9,57±0,77	0,14	8,09
a ₅ d	14,5	73,00	53	30	41,47±4,94	0,90	11,91
ac	20,0	51,80	70	45	56,13±5,79	1,06	10,31
hc	10,4	71,00	41	25	29,13±5,88	1,07	20,17
l ₁ m ₁	14,2	42,90	50	30	39,93±5,96	1,09	14,92
a ₅ i	8,6	53,9	36	17	24,10±4,73	0,86	19,62
kl	10,8		40	24	30,27±4,81	0,88	15,90

Показники	Від довжини риби за Сміттом, %	Від довжини голови, %	Межі коливань		M±m	δ	Cv
			Max	Min			
<i>qμ</i>	22,4		90	47	62,83±10,33	1,89	16,43
<i>ζη</i>	8,4		35	15	23,53±5,13	0,94	21,8
<i>αq</i>	45,7		158	110	128,0±12,45	2,27	9,73
<i>σv</i>	38,7		140	85	107,13±14,04	2,56	13,11
<i>αω</i>	49,3		165	110	135,33±14,32	2,61	10,58
<i>αy</i>	67,9		230	153	190,0±18,21	3,32	9,58
<i>λv</i>	15,8		65	35	44,30±7,52	1,37	16,98
<i>qr</i>	8,8		47	15	25,23±6,77	1,23	26,81
<i>st</i>	6,6		25	8	18,63±4,07	0,74	21,85
<i>yz</i>	7,3		31	10	20,47±5,04	0,92	24,64
<i>αβ</i>	7,1		30	11	20,07±4,33	0,79	21,58
<i>uv</i>	6,5		30	10	18,27±5,32	0,97	29,11
<i>ωx</i>	6,6		30	10	18,70±5,09	0,92	27,20
<i>uω</i>	29,0		110	70	81,33±9,03	1,65	11,10
<i>ωy</i>	19,5		70	45	54,63±6,26	1,14	11,46
<i>M</i>			470	139	237,20±69,19	12,63	29,17
<i>Kвг</i>			1,25	0,84	1,06±1,10	0,02	9,61
<i>Kп</i>			5,09	3,69	4,51±0,43	0,08	9,53
<i>Kв</i>			21,74	17,54	20,07±1,12	0,21	5,59

Примітка: умовні позначення аналогічні рис. 1.

Пропорції тіла у риб з віком не змінювалися, однак довжина плавців зменшувалась, їх величини у відсотках становили: спинний – 6,6, грудні – 6,5, черевні – 6,6, анальний – 7,1.

Отже, динаміка параметрів, аналіз яких було проведено вище, вказує на своєрідні тенденції, які, з біологічної точки зору, пов'язані у першу чергу із віковим та фізіологічним станом риб. Про це свідчать показники екстер'єрних індексів, суттєвої різниці в яких не спостерігалось, окрім індексу прогонистості, який у цьоголіток становив 5,24, у дволіток знижувався і складав 4,5 одиниці, що є закономірним за зростання висоти тіла та характерним для лососевих риб (табл. 3).

Таблиця 3. Екстер'єрні індекси цьоголіток та дволіток райдужної форелі

Показник	Цьоголітки			Дволітки		
	M ± m	δ	Cv	M ± m	δ	Cv
Індекс високоспинності (I/H)*	0,49±0,08	0,02	15,86	0,42±0,05	0,01	10,87
Індекс прогонистості	5,24±0,85	0,22	16,15	4,51±0,43	0,08	9,53
Індекс обхвату (I/O)*	0,23±0,02	0,01	8,59	-	-	-
Індекс голови (I/C)*	0,54±0,08	0,02	15,58	0,47±0,03	0,01	6,71
Коефіцієнт вгодованості	1,09±0,16	0,04	14,59	1,06±1,10	0,02	9,61

*Примітка. L — довжина тіла без хвостового плавця; H — висота тіла найбільша; O — обхват тіла найбільший; C — довжина голови

Натомість, показники коефіцієнта вгодованості практично не відрізнялися, становлячи 1,09 у цьоголіток та 1,06 у дволіток. Необхідно також зазначити, що з віком зменшувався показник коефіцієнта варіації за всіма індексами, найбільший прогрес було зафіксовано серед показника індексу голови — 8,87 %.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Аналіз морфометричних даних райдужної форелі за вирощування в індустриальних умовах засвідчив, що пропорції тіла у риб з віком не змінюються, проте зменшується довжина її плавців, зокрема, у дволіток незначно знижувався коефіцієнт прогонистості та високоспинності, що є закономірним за зростання висоти тіла. Натомість, показники коефіцієнта вгодованості практично не відрізнялися. Попри нестабільні умови вирощування, райдужна форель, як у віці цьоголіток, так й у віці дволіток, характеризувалася помірним темпом росту та високим коефіцієнтом оплати корму.

ЛІТЕРАТУРА

1. Mendrisha P., Nagornjuk T., Tarasjuk S. Peculiarities of the genetic structure of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) groups at the fish farm «Sloboda Banilov» Chernivtsi region / Рибогосподарська наука України. — 2016. — № 2. — С. 65—72.
2. Фермерське рибництво / [Грициняк І. І. та ін. Київ, 2008. 560 с.
3. Божик В. Й., Бачук Э. О. Сучасний стан і перспективи розвитку форелівництва в західному регіоні України. // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. Гжицького. 2014. Т. 16, № 3(60), ч. 3. С. 2—31.
4. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры: отчет Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО. Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций, 2010. 225 с.
5. Schäperclaus W. Untersuchungen über die Formen der deutschen & Regenbogenforelle and ihre Leistungen bei der aufzucht durch Künstliche Fütterung. //Anhandlungen aus der Fisch. 1949. Vol.I.

6. Schäperclaus W. Lehrbuch der Teichwirtschaft. Berlin und Hamburg : Verlag P. Parey, 1961. 594 s.
7. Організація селекційно-племінної роботи в рибництві / Гринжевський М. В. та ін. Київ. 2006. 352 с.
8. Васильев А. Г., Васильев А. Г., Васильева И. А., Большаков В. И. Эволюционно-экологический анализ устойчивости популяционной структуры вида (хроногеографический подход) / Екатеринбург, 2000. 132 с.
9. Артамонова В. С., Махров А. А. Генетические системы как регуляторы процессов адаптации и видообразования // Современные проблемы биол. эволюции. Москва, 2008. С. 381—403.
10. Комплексна технологія відтворення лососевих риб в рибницьких господарствах України / Мрук А. І. та ін. Київ, ІРГ НААНУ, 2015. 27 с.
11. Мрук А. І., Олексик В. І., Захаренко Г. А. Рекомендації з розведення та вирощування високопродуктивних племінних стад райдужної форелі / Київ. 2010. 24 с.
12. Галасун П. Т., Булатович М. А., Борбат Н. А. Технологическая инструкция по производству райдужной форели в различных типах хозяйств Украины. / Львов, 1987. 17 с.
13. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Ленинград, 1939. 246 с.
14. Титарев Е. Ф. Форелеводство. Москва: Пищевая промышленность, 1980. 166 с.
15. Митрофанов В. П. Экологические основы морфологического анализа рыб Алма-Ата : КазГУ, 1977. 35 с.

REFERENCES

1. Mendrishora P., Nagornjuk T., Tarasjuk S. (2016). Peculiarities of the genetic structure of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) groups at the fish farm «Sloboda Banilov» Chernivtsi region. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 65-72.
2. *Fermerske rybnytstvo*. Hrytsyniak I.I., Hrynzhhevskiy M.V., Tretiak O.M. et al (2008) Kyiv.
3. Bozhyk V.Y., Bachuk Ve. O. (2014). Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku foelivnytstva v zakhidnomu rehioni Ukrainy. *Naukovyi visnyk LNUVMBT im. Hzhyskoho*, 16, 3(60), 3, s. 2—31.
4. Sostoyanie mirovogo rybolovstva i akvakul'tury: otchet Departamenta rybolovstva i akvakul'tury FAO. (2010) Rim: Prodovol'stvennaya i sel'skokhozyaystvennaya Organizatsiya Ob"edinennykh Natsiy.
5. Schäperclaus, W. (1949). Untersuchungen über die Formen der deutschen & Regenbogenforelle and ihre Leistungen bei der aufzucht durch Künstliche Fütterung. *Anhandlungen aus der Fisch, I*.
6. Schäperclaus W. (1961). *Lehrbuch der Teichwirtschaft*. Berlin und Hamburg: Verlag P. Parey.
7. Hrynzhhevskiy, M.V. etal. (2006). *Orhanizatsiia selektsiino-pleminnoi roboty v rybnytstvi*. Kyiv.

8. Vasil'ev, A. G., Vasil'ev, A. G., Vasil'eva, I. A., Bol'shakov, V. I. *Evolutsionno-ekologicheskii analiz ustoychivosti populyatsionnoy struktury vida (khronogeograficheskii podkhod)*. (2000). Ekaterinburg.
9. Artamonova, V. S., Makhrov, A. A. Geneticheskie sistemy kak regulatory protsessov adaptatsii i vidoobrazovaniya. *Sovremennye problemy biol. evolyutsii*. (2008). Moskva.
10. Mruk, A. I., Terterian, L. A., Kucheruk, A. I., Kurinenko, H. A., Haloian, L. L. *Kompleksna tekhnolohiia vidtvorennia lososevykh ryb v rybnytskykh hospodarstvakh Ukrainy*. (2015). Kyiv: IRH NAANU.
11. *Rekomendatsii z rozvedennia ta vyroshchuvannia vysokoproduktyvnykh plemennykh stad raiduzhnoi foreli*. Mruk, A.I., Oleksyk, V.I., Zakharenko, H.A. (2010). Kyiv.
12. Galasun, P. T., Bulatovich, M. A., Borbat, M. O. *Tekhnologicheskaya instruktsiya po proizvodstvu rayduzhnoy foreli v razlichnykh tipakh khozyaystv Ukrainy*. / (1987). L'vov.
13. Pravdin, I. F. (1939). *Rukovodstvo po izucheniyu ryb*. Leningrad.
14. Titarev, E. F. (1980). *Forelevodstvo*. Moskva : Pishchevaya promyshlennost.
15. Mitrofanov V. P. (1997). *Ekologicheskie osnovy morfologicheskogo analiza ryb*. Alma-Ata : KazGU.

**МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕМОНТНО-МАТОЧНОГО
СТАДА РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ (*ONCORHYNCHUS MYKISS* (WALBAUM, 1792),
ВЫРАЩЕННОЙ В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА «СЛОБОДА БАНИЛОВ»**

П. Д. Мендришора, mendryshora@mail.ru, Институт рыбного хозяйства НААН,
г. Киев

А. И. Мрук, amruk@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

А. А. Куриненко, annazakharenko@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН,
г. Киев

Цель. Проанализировать результаты морфометрических измерений и дать рыбоводно-биологическую характеристику сеголеток, двухлеток радужной форели, выращенной по индустриальной технологии в нестабильных условиях форельного хозяйства «Слобода Банилов».

Методика. Исследования проводили в индустриальном хозяйстве «Слобода Банилов», Черновицкой области. Материалом для исследований служили сеголетки и двухлетки радужной форели, полученные от икры осенненерестящейся формы радужной форели. Выращивание сеголеток проводили в бассейне площадью 216 м², при плотности посадки 255 экз./м², двухлеток — 108 м² и 33 экз./м² соответственно, согласно общепринятым методикам в форелеводстве. Морфометрические измерения рыб осуществляли согласно методике И. Ф. Правдина. Статистическую обработку материала проводили в Microsoft Office Excel (2003). Анализ величин выполнен в системе абсолютных значений. Критериями анализа показателей были их средняя величина и средняя погрешность ($M \pm m$), отклонение (σ), показатель изменчивости (C_v). Кормление рыб проводили искусственным кормом с высоким содержанием протеина, датского производителя — фирмы «Biotag».

Результаты. Проведенные исследования по выращиванию радужной форели в индустриальных условиях засвидетельствовали, что пропорции тела у рыб с возрастом не изменяются, но длина их плавников уменьшается, однако в двухлеток коэффициент прогонистости незначительно снижался, что является закономерным при росте высоты тела. Невзирая на нестабильные условия выращивания, особи, как в возрасте сеголеток, так и в возрасте двухлеток характеризовались умеренным темпом роста и высоким

коэффициентом оплаты корма.

Научная новизна. Впервые в условиях Украины проведено исследование по формированию ремонтно-маточных стад радужной форели с применением анализа фенотипических и продуктивных признаков в хозяйстве с нестабильными условиями выращивания.

Практическая значимость. Результаты проведенной работы, дадут возможность на основании охарактеризованных фенотипических и продуктивных признаков сформировать маточное стадо радужной форели, которая будет характеризоваться высокими показателями продуктивных и репродуктивных признаков в хозяйствах с нестабильными условиями выращивания.

Ключевые слова. радужная форель, сеголетки, двухлетки, масса, длина тела.

MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE REPLACEMENT-BROOD STOCK OF RAINBOW TROUT (*ONCORHYNCHUS MYKISS* (WALBAUM, 1792), REARED IN THE CONDITIONS OF THE INDUSTRIAL FISH FARM "SLOBODA-BANYLIV"

P. Mendryshora, mendryshora@mail.ru, Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv

A. Mruk, amruk@ukr.net, Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv

G. Kurinenko, annazakharenko@ukr.net, Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv

Purpose. To analyze the results of morphometric measurements and dates of aquaculture-biological characteristics of the young-of-the-year and age-1+ rainbow trout reared under industrial technology at instable conditions of the fish farm "Sloboda-Banyliv".

Methodology. The study has been performed at the industrial fish farm "Sloboda-Banyliv", Chernivtsi region. The materials for the study were young-of-the-year and age-1+ rainbow trout obtained from the eggs of autumn-spawning form rainbow trout. The young-of-the-year were reared in a 216 m² tank with stocking density of 255 ind./m², age-1+ fish were reared in 108 m² tank with a stocking density of 33 ind./m² according to generally accepted methods in trout culture. Morphometric measurements of fish were performed according to I.F. Pravdin. Statistical processing of data was carried out in Microsoft Office Excel (2003). The analysis of values was done in the system of absolute values. The analyzed criteria of the measured parameters were their mean values and standard errors ($M \pm m$), deviation (σ), variability coefficient (C_v). Fish were fed with the artificial feed with high protein content manufactured by "Biomar" (Denmark).

Findings. The studies on rainbow trout rearing under industrial conditions showed that fish body proportions did not change with age, however, the length of their fins decreased. The slenderness coefficient in age-1+ fish decreased insignificantly that is typical with increasing body depth. Despite instable rearing conditions, both young-of-the-year and age-1+ fish were characterized by moderate growth rate and high feed-conversion efficiency.

Originality. For the first time, in conditions of Ukraine, a study on the formation of rainbow trout brood stocks in a fish farm with instable rearing conditions was performed with the use of the analysis of phenotypical and productive features.

Practical value. The results of the performed work will provide an opportunity to form a rainbow trout brood stock based on characterized phenotypical and productive features that would have high productive and reproductive features in a fish farm with instable rearing conditions.

Key words. rainbow trout, young-of-the-year, age-1+ fish, weight, body length.

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 76-82
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.076>
УДК 575.22:597.442

АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ПОПУЛЯЦІЇ ГАЛИЦЬКОГО КОРОПА ГОСПОДАРСТВА «ВЕЛИКИЙ ЛЮБІНЬ» ЗА ВИКОРИСТАННЯ МІКРОСАТЕЛІТНИХ МАРКЕРІВ

І. С. Ярова, ya.i.s92@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. В. Залоїло, ozaloilo@yahoo.com, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. В. Бех, vitbekh@online.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. А. Залоїло, zaloilo@yahoo.com, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Мета. Дослідити генетичну структуру популяції галицького коропа з використанням мікросателітних ДНК-маркерів.

Методика. Зразки крові відібрані з хвостової вени особин галицького коропа господарства «Великий Любін», Львівська обл. ($n=15$ екз.), які були мічені електронними чипами марки Aqua Putr та A-CHIP. Загальна ДНК була виділена за стандартною методикою, за допомогою набору Gene JET Whole Blood Genomik DNA Purification Mini Kit (США). Концентрацію та якість ДНК визначали на біофотометрі Eppendorf Bio Photometr.

Для дослідження генетичної структури популяції коропа використовували чотири мікросателітні маркери: MFW 06, MFW 15, MFW 23, MFW 31.

Результати. Як матеріал для досліджень використовували зразки крові, відібрані з хвостової вени риб ($n=15$ екз.). У ході роботи підбрано оптимальні умови проведення SSR-PCR — аналізу. Проведені дослідження дозволили визначити чинники, які мають найбільший вплив на ефективність ампліфікації, а саме: концентрація препарату ДНК, концентрація праймера у реакційній суміші та кількість циклів ампліфікації. У досліджуваній групі за чотирма мікросателітними локусами було виявлено 18 алелей з молекулярною масою 130–343 п.н. Число алелей на локус варіювало від 3 до 6. Найбільш поліморфним був локус MFW 23 (виявлено 6 алелей), а найменш поліморфним — локус MFW 31 (виявлено 3 алелі). Ефективне число алелей у досліджуваній вибірці генотипів варіювало від 2,14 (MFW 31) до 5,23 (MFW 23). За розрахунками алельних частот визначено основні показники генетичної мінливості. Максимальний рівень наявної гетерозиготності зафіксований для локусу MFW 23, найнижчий — для локусу MFW 31.

Наукова новизна. Вперше було досліджено генетичну структуру популяції галицького коропа.

Практична значимість. Результати будуть використовуватися у подальших дослідженнях масиву галицького коропа.

Ключові слова: галицький короп, мікросателітні локуси, популяція, ДНК.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Короп (*Cyprinus carpio*) — один з основних об'єктів ставового рибництва на території пострадянського простору та країн Східної Європи. Завдяки високій

© І. С. Ярова, О. В. Залоїло, В. В. Бех, І. А. Залоїло, 2017

плодючості та порівняно простим умовам утримання, коропаи здавна використовувалися для селекції, у результаті чого з'явився ряд порід з унікальними морфометричними особливостями та високими смаковими якостями [1, 2].

Галицький короп є однією з найдавніших порід коропа, характеризується високоспинністю. Він малопоширений в межах України, що зумовлює необхідність більш широко займатися дослідженнями даного виду коропа. Він потребує детального вивчення щодо його зимостійкості, рибогосподарського використання, ведення селекційної роботи з ним в умовах господарств Прикарпаття. Отже, галицький короп є перспективною породою як для промислового вирощування, так і для ефективного ведення селекційної роботи [3].

Таким чином, доцільним було провести основні генетичні дослідження для чіткого подальшого аналізу та порівняння результатів.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Утримання породи в окремому господарстві може істотно ускладнюватися внаслідок генетичних змін. Результатом численних спаровувань особин у межах однієї популяції є втрата товарних характеристик риб, зниження репродуктивних якостей, зменшення стійкості до захворювань, уповільнення росту, поява мутацій тощо. Тому проведення генетичних досліджень популяцій галицького коропа у сучасних рибницьких господарствах набуває пріоритетної актуальності.

Ефективним методом у даному аспекті може стати використання мікросателітних маркерів. Мікросателіти часто виявляються локусами, здатними до швидких мутацій, що дозволяє ефективно використовувати їх для виявлення розбіжностей між спорідненими популяціями у рибництві. Дослідження достатньої кількості мікросателітних локусів та кількості повторів у них дозволяє отримати унікальну інформацію про генетичну структуру на рівні особини, визначити число алельних варіантів та частоти алелів у популяціях, вивчити спадкові зв'язки між особинами [4–7].

Метою роботи було дослідження генетичної структури популяції галицького коропа з використанням мікросателітних ДНК-маркерів.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Як матеріал для досліджень використовували зразки крові, відібрані з хвостової вени особин галицького коропа господарства «Великий Любін», Львівська обл. (n=15 екз.), які були мічені електронними чипами марки Aqua Pump и А-СНІР. Загальна ДНК була виділена за стандартною методикою, за допомогою набору Gene JET Whole Blood Genomik DNA Purification Mini Kit (США). Концентрацію та якість ДНК визначали на біофотометрі Eppendorf Bio Photometr.

Для дослідження генетичної структури популяції коропа використовували чотири мікросателітні маркери: MFW 06, MFW 15, MFW 23, MFW 31 [8].

Таблиця 1. Нуклеотидні послідовності праймерів

Локус	Послідовність праймерів 5'-3'	Температура відпалу праймерів (°C)
MFW 15	F: CTCCTGTTTTGTTTTGTGAAA R: GTTCAACAAGGTCATTTCCAGC	54
MFW31	F:CCTTCCTCTGGCCATTTCCAC R:TACATCGCAGAGAATTCGTAAG	53
MFW 23	F:GTATAATTGGGAGTTTTAGGG R:CAGGTTTATCTCCCTCTAG	55
MFW06	F: ACCTGATCAATCCCTGGCTC R:TTGGGACTTTTAAATCACGTTG	55

ПЛР проводили на ампліфікаторі «Termo scientific» (Arktik Thermal Cycler) в наступному температурному режимі: 5 хв за 94°C; 33 цикли: 1 хв за 94°C, 30 с за 53–55°C (в залежності від локуса), 30 с за 72°C; 5 хв за 72°C. Реакційна суміш об'ємом 25 мкл містила: 67 мМ Tris-HCl (pH 8,8), 17 мМ (NH₄)₂SO₄, 0,01% Tween-20, 0,2 ммоль dNTP, 1 од. Tag-полімерази, 50 нг ДНК, 1,7 ммоль MgCl₂ і по 0,2 мкм праймерів. Електрофоретичне розділення продуктів ампліфікації здійснювали в 3%-му агарозному гелі з використанням 1×TAE-буфера.

Опрацювання і аналіз гелів проводили за допомогою програми Totallab v2.01. Статистичне опрацювання отриманих результатів виконували з використанням комп'ютерної програми Excel 2010.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Були проаналізовані генотипи особин з використанням чотирьох мікросателітних локусів ДНК: MFW 06, MFW 15, MFW 23, MFW 31. У ході роботи підібрано оптимальні умови проведення SSR-PCR аналізу. Проведені дослідження дозволили визначити чинники, які мають найбільший вплив на ефективність ампліфікації, а саме: концентрація препарату ДНК, концентрація праймера у реакційній суміші та кількість циклів ампліфікації. Для отримання чітких і відтворюваних алелей по кожному локусу було індивідуально підібрано оптимальні умови проведення ПЛР. Приклади отриманих SSR-спектрів наведені на рис. 1.

У дослідженій групі генотипів за чотирма мікросателітними локусами MFW 06, MFW 15, MFW 23, MFW 31 було виявлено всього 18 алелей з молекулярною масою 130–343 п.н. Число алелей на локус варіювало від 3 до 6. Найбільш поліморфним був локус MFW 23 (виявлено 6 алелей), а найменш поліморфним — локус MFW 31 (виявлено 3 алелі; табл. 2).

Рис. 1. Електрофоретичний розподіл продуктів ампліфікації SSR-PCR за локусами MFW 15 і MFW 31 (А), MFW 23 (В), MFW 06 (С) (1–11 — досліджені зразки, М — маркер молекулярної маси)

Таблиця 2. Характеристики мікросателітних локусів ДНК

Локус	Кількість алелей	Молекулярна маса продукту (п.н.)	Ефективне число алелей	H_{obs}	H_{exp}
MFW 06	4	149–162	3,333	0,600	0,700
MFW 15	5	141–343	3,937	0,650	0,746
MFW 23	6	130–168	5,236	0,850	0,809
MFW 31	3	258–307	2,146	0,500	0,534
Середнє	4,5	237	3,663	0,65	0,697

Ефективне число алелей (показник, який характеризує локуси за частотою трапляння алелей) у досліджуваній вибірці генотипів варіювало від 2,14 (MFW 31) до 5,23 (MFW 23). Середнє ефективне число алелей на локус склало 3,663. За розрахунками алельних частот визначено основні показники генетичної мінливості. Максимальний рівень наявної гетерозиготності зафіксований для локусу MFW 23, найнижчий — для локусу MFW 31. Значення фактичної гетерозиготності за мікросателітним локусом MFW 31 було близьким до очікуваного, локус MFW 23 характеризувався надлишком гетерозигот, а для локусів MFW 06 і MFW 15 визначено їх дефіцит.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Досліджено генетичну структуру популяції галицького коропа господарства «Великий Любін» з використанням мікросателітних ДНК-маркерів.

За кожним локусом індивідуально підібрано оптимальні умови проведення ПЛР та розраховано їх основні характеристики (ефективне число алелей та показники гетерозиготності).

Запропонований у роботі метод мікросателітного аналізу буде ефективним для дослідження сформованої популяції галицького коропа та її подальшого генетичного контролю. Описаний спосіб дослідження поліморфізму є доцільним для використання у селекційній роботі з цією популяцією.

ЛІТЕРАТУРА

1. Катасонов В. Я., Гомельський Б. И. Селекция рыб с основами генетики. М. : Агропромиздат, 1991. 208 с.
2. Кузема А. И. Разведение и селекция карпа : научный отчет НИИ рыбного хозяйства Украины. Киев, 1936. 188 с.
3. Кузема А. И. Создание исходных селекционных стад карпа в рыбхозах Киевского и Винницкого рыбтрестов, их характеристика и оценка : научный отчет НИИ рыбного хозяйства. Киев, 1948. 121 с.
4. Тарасюк С. І., Грициняк І. І. Молекулярно-генетичні дослідження в рибистві. Київ : Аграрна наука, 2013. 310 с.
5. Дубін О. В. Мікросателітні маркери у дослідженні генетичного поліморфізму російського осетра. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2012. Вип. 4, т. 2, ч. 1. С. 70—73.
6. Characterization of microsatellite loci in silver carp (*Hypophthalmichthys molitrix*) and cross-amplification in other cyprinid species / Gheyas A. A. et al. // *Molecular Ecology Notes*. 2006. № 3. P. 455—461.
7. Ровба Е. А., Конєва О. Ю., Дромашко С. Е. Оценка генетического разнообразия пород карпа белорусской селекции с помощью микросателитных маркеров // Актуальные проблемы выращивания и переработки прудовой рыбы : Междунар. науч.-техн. интернет-конф. : матер. Краснодар : Кубанский государственный технологический университет, 2012. С. 22—23.
8. Microsatellite markers in common carp (*Cyprinus carpio* L.) / Crooijmans R. et al. *Animal Genetics*. 1997. Vol. 28. P. 129—134.

REFERENCES

1. Katasonov, V. Ya., & Gmel'skiy B. I. (1991). *Seleksiya ryb s osnovami genetiki*. Moskva : Agropromizdat.
2. Kuzema, A. I. (1936). Razvedenie i seleksiya karpa : *nauchnyy otchet NII rybnogo khozyaystva Ukrainy*. Kiev.
3. Kuzema A. I. (1948). Sozdanie iskhodnykh selektsionnykh stad karpa v rybkhozakh Kievskogo i Vinnitskogo rybtrrestov, ikh kharakteristika i otsenka : *nauchnyy otchet NII prudovogo i ozernogo rybnogo khozyaystva MRP USSR*. Kiev.
4. Tarasyuk, S. I., & Hrytsyniak, I. I. (2013). *Molekuliarno-henetychni doslidzhennia v rybnytstvi*. Kyiv : Agrarna nauka.

5. Dubin, O. V. (2012). Mikrosatelitni markery u doslidzhenni henetychnoho polimorfizmu rosiiskoho osetra. *Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria*, 4, 2, 1, 70-73.
6. Gheyas, A. A., Cairney, M., Gilmour, A. E., Sattar, M. A., Das, T. K., Mcandrew, B. J., Penman, D. J., & Taggart, J. B. (2006). Characterization of microsatellite loci in silver carp (*Hypophthalmichthys molitrix*) and cross-amplification in other cyprinid species. *Molecular Ecology Notes*, 3, 455-461.
7. Rovba, E. A., Koneva, O. Yu., & Dromashko, S. E. (2012). Otsenka geneticheskogo raznoobraziya porod karpa belorusskoy seleksii s pomoshch'yu mikrosatelitnykh markerov. *Aktual'nye problemy vyrashchivaniya i pererabotki prudovoy ryby: Mezhdunar. nauch.-tekhn. internet-konf.: mater.* Krasnodar: Kubanskiy gosudarstvennyy tekhnologicheskyy universitet, 22-23.
8. Crooijmans, R. P. M. A., Poel, J. J. V. D., Groenen, M. A. M., Bierbooms, V. A. F., & Komen, J. (1997). Microsatellite markers in common carp (*Cyprinus carpio* L.). *Animal Genetics*, 28, 129-134.

АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПОПУЛЯЦИИ ГАЛИЦИЙСКОГО КАРПА ХОЗЯЙСТВА «ВЕЛИКИЙ ЛЮБЕНЬ» ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ МАРКЕРОВ

И. С. Яровая, ya.i.s92@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

О. В. Залоило, ozaloilo@yahoo.com, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

В. В. Бех, vibekh@online.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

І. А. Залоило, zaloilo@yahoo.com, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

Цель. Исследовать генетическую структуру популяции галицийского карпа с использованием микросателлитных ДНК-маркеров.

Методика. Образцы крови отобраны из хвостовой вены особей галицийского карпа хозяйства «Великий Любень», Львовская обл. ($n = 15$ экз.), которые были помечены электронными чипами марки Aqua Rupt и A-CHIP. Общая ДНК была выделена по стандартной методике, с помощью набора Gene JET Whole Blood Genomik DNA Purification Mini Kit (США). Концентрацию и качество ДНК определяли на биофотометре Eppendorf Bio Photometr.

Для исследования генетической структуры популяции карпа использовали четыре микросателлитных маркера: MFW 06, MFW 15, MFW 23, MFW 31.

Результаты. В качестве материала для исследований использовали образцы крови, взятые из хвостовой вены рыб ($n = 15$ экз.). В ходе работы подобраны оптимальные условия проведения SSR-PCR — анализа. Проведенные исследования позволили определить факторы, оказывающие наибольшее влияние на эффективность амплификации, а именно: концентрация ДНК, концентрация праймера в реакционной смеси и количество циклов амплификации. В исследованной группе по четырем микросателлитным локусам было выявлено 18 аллелей с молекулярной массой 130–343 п.н. Число аллелей на локус варьировало от 3 до 6. Наиболее полиморфным был локус MFW 23 (выявлено 6 аллелей), а наименее полиморфным — локус MFW 31 (выявлено 3 аллеля). Эффективное число аллелей в исследуемой выборке генотипов варьировало от 2,14 (MFW 31) до 5,23 (MFW 23). По расчетам аллельных частот определены основные показатели генетической изменчивости. Максимальный уровень имеющейся гетерозиготности зафиксирован для локуса MFW 23, наиболее низкий — для локуса MFW 31.

Научная новизна. Впервые была исследована генетическая структура популяции галицийского карпа.

Практическая значимость. Результаты будут использоваться в дальнейших исследованиях массива галицийского карпа.

Ключевые слова: галицийский карп, микросателлитные локусы, популяция, ДНК.

ANALYSIS OF GENETIC DIVERSITY OF GALICIAN CARP POPULATION ON THE BASE OF FISH FARM «VELYKY LYUBIN» WITH USING MICROSATELLITE MARKERS

I. S. Yarova, ya.i.s92@ukr.net, Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv
O. V. Zaloilo, ozaloilo@yahoo.com, Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv
V. V. Bech, vitbekh@online.ua, Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv
I. A. Zaloilo, zaloilo@yahoo.com, National University of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

Purpose. To investigate the genetic structure of the Galician carp population using microsatellite DNA markers.

Methodology. Blood samples taken from the caudal vein of the specimens of the Galician carp farm "Velykyy Lyubin", Lviv region. (N = 15 persons). When landing, they were labeled with electronic chips of the brand Aqua Pump and A-CHIP. The total DNA was isolated using the standard method, using the Gene JET Whole Blood Genomik DNA Purification Mini Kit (USA). The concentration and quality of DNA were determined on an Eppendorf Bio Photometr biophotometer.

To study the genetic structure of the Galician carp population, four microsatellite markers were used: MFW 06, MFW 15, MFW 23, MFW 31.

Findings. Blood samples taken from the tail vein of fish (n = 15 oz.) Were used as research material. In the course of work, optimal conditions for SSR-PCR analysis have been selected. The conducted studies allowed to determine the factors that have the greatest impact on the amplification efficiency, namely: the concentration of the DNA preparation, the concentration of the primer in the reaction mixture and the number of amplification cycles. In the study group, for all 4 microsatellite loci, only 18 alleles with a molecular weight of 130-343 ng were detected. The number of alleles per locus varied from 3 to 6. The most polymorphous was the locus MFW 23 (6 alleles were detected), and the least polymorphic was the locus MFW 31 (3 alleles were detected). The effective number of alleles in the sample of genotypes studied varied from 2.14 (MFW 31) to 5.23 (MFW 23). According to calculations of allelic frequencies, the main indicators of genetic variability are determined. The maximum level of available heterozygosity is fixed for the MFW 23 locus, the lowest for the MFW locus 31.

Originality. For the first time in 65 years the genetic structure of the Galician carp population has been investigated.

Practical value. The results will be used in further studies of the arboreal of Galician carp.

Keywords. Galician carp, microsatellite loci, population, DNA.

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 83-97
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.083>
УДК 639.212./3.034.2:502.7

ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ СПЕРМИ СТЕРЛЯДІ (*ACIPENSER RUTHENUS* L. 1758) ДЛЯ ЗАПЛІДНЕННЯ ІКРИ В УМОВАХ РИБНИХ ГОСПОДАРСТВ

І. С. Кононенко, kononenko_irina88@ukr.net, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
А. Ю. Пуговкін, lina@online.ua, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків
Р. В. Кононенко, ruslan_kononenko@ukr.net, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
В. О. Черепнін, diglador@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
К. І. Буцький, cryo@online.kharkov.ua, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків
Є. Ф. Копейка, ekopeik@yahoo.com, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

Мета. Оптимізувати умови кріоконсервування сперми стерляді для проведення робіт щодо запліднення ікри та отримання життєстійкого потомства в умовах рибних осетрових господарств. Проаналізувати вплив заморожування сперми у різних формах на показники виживання сперматозоїдів та запліднення ікри. Порівняти результати використання для заморожування сперми стерляді різних за складом компонентних кріозахисних розчинів та проаналізувати їх вплив на якість отриманого потомства.

Методика. Завдання з оптимізації умов кріоконсервування сперми стерляді для запліднення ікри в умовах рибних господарств вирішувалися згідно з загальноприйнятими методиками у кріобіології. Роботи щодо вирощування молоді стерляді проводилися відповідно до загальноприйнятих методів в осетрівництві.

Результати. Дослідженнями встановлено, що оптимізація умов кріоконсервування сперми стерляді дозволила зберегти властивості відігрітих сперматозоїдів на рівні показників нативної сперми. Встановлено, що функції кріоконсервованої в парах рідкого азоту сперми в гранулах та ампулах у розчинах із метанолом або диметилсульфоксидом (ДМСО), краще зберігались у гранулах при використанні метанолу. В умовах рибного господарства оцінено функції сперми після її заморожування в кріозахисних розчинах №№ 5 та 6. Встановлено, що запліднювальна здатність кріоконсервованої сперми в розчині № 5 (85,6%; з нижчою осмотичністю) майже не відрізнялась від контролю (87,6%) при використанні 25–60 г ікри. У кріозахисному розчині № 6 даний показник був на 17,6% нижчим. Приріст маси та довжини тіла 3-місячних особин, одержаних від ікри, заплідненої спермою, кріоконсервованою в обох розчинах, був більшим, ніж у контрольному варіанті.

Наукова новизна. Введення до кріозахисного розчину креатину та фруктози дозволило підвищити його захисні властивості та зберегти показники активності сперматозоїдів після розморожування на рівні нативної сперми. Кріоконсервування сперми у гранулах дозволило оптимізувати умови низькотемпературного заморожування сперми цього представника осетрових видів риб та отримати якісне життєстійке потомство.

© І. С. Кононенко, А. Ю. Пуговкін, Р. В. Кононенко, В. О. Черепнін, К. І. Буцький, Є. Ф. Копейка, 2017

Практична значимість. Отримані результати можуть використовуватися осетрівниками в умовах рибних господарств для робіт з отримання життєстійкого потомства стерляді як для товарних потреб, так і для відновлення її популяцій у природних водоймах, та кріобіологами для робіт з іншими видами риб.

Ключові слова: кріоконсервування, стерлядь, сперма, запліднення, гранули, ампули, креатин, сироватка крові карася.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Відомо, що осмотичність кріозахисного середовища може в кілька разів перевищувати осмотичність сперми риб. Існує думка, що зниження осмотичності кріозахисного середовища підвищує запліднювальну здатність розмороженої сперми лососевих, осетрових і коропових риб [1–5]. Через велике різноманіття видів риб, різну реакцію сперматозоїдів на зміни навколишнього середовища та за відсутності теорії формування кріореزистентності сперматозоїдів, на сьогодні не розроблено уніфікованого способу їх збереження.

На думку А. Хорвача та співавторів [3], осмотичність середовища є ключовим чинником кріопошкоджень сперматозоїдів. Дослідження властивостей сперми риб, які нерестяться в прісній і солоній воді, показало, що осмотичний градієнт — один із головних чинників кріопошкоджень [1, 6, 7]. Ступінь цих пошкоджень залежить як від температури води, так і від її солоності, тобто від екологічної ніші нересту риб [6], яка формує кріорезистентність сперматозоїдів при взаємодії з геномом клітин та організмів. Харвей та співавтори [8, 9] першими почали використовувати низькомолекулярний кріопротектор метанол та показали його ефективність під час кріоконсервування сперми риб *Sarotherodon mossambicus* та *Danio rerio*. З 2000 р. активно розроблялися нові методи кріоконсервування сперми лососевих, осетрових і коропових риб [3, 10–14] з використанням середовищ, які містять метанол та сахарозу, що дозволило значно підвищити ефективність низькотемпературного заморожування сперми риб, однак не повністю вирішило всі проблеми.

В еякулятах прісноводних риб сперматозоїди знаходяться в нерухомому стані. Під час кріоконсервування сперми в різних частинах контейнера, в якому заморожують зразок, змінюється концентрація солей, що приводить до активації частини клітин та зменшення запліднювальної здатності сперми [15]. Так, через 5 хв після розморожування запліднювальна здатність сперми райдужної форелі *Salmo gairdneri* знижувалась з 70 до 10,7% [16]. При збільшенні об'єму контейнера підвищується вірогідність цих змін. Але за умов високої концентрації сперматозоїдів лососевих риб, їхня запліднювальна здатність була такою ж, як і після кріоконсервування в ампулах 0,5 та 1,2 мл [12]. У разі зменшення об'єму сперми вдвічі до такої ж самої маси ікри, запліднююча здатність сперми з ампул 1,2 мл була значно нижчою, ніж із ампул 0,5 мл. Це свідчило про меншу збереженість сперматозоїдів, заморожених у більших ампулах.

Аналогічний результат був отриманий і під час запліднення відігрітою спермою як лососевих, так і коропових видів риб [6, 11, 17]. При збільшенні маси ікри для запліднення з 80 до 120 г необхідно було підвищувати й об'єм

розмороженої сперми. При цьому її запліднювальна здатність істотно знижувалася – з 65 ± 18 до $21 \pm 14\%$. Таким чином, збільшення об'єму сперми риб при кріоконсервуванні знижувало її якість [12, 17].

Існують дані щодо вищих показників запліднення кріоконсервованою спермою великих об'ємів ікри ленського осетра [18, 19]. Автори розводили сперму кріозахисним розчином, який містив сахарозу, хлорид калію, метанол та гліцерин. Після 60-хвилинної еквілібрації за 5°C суспензію клітин розфасовували в ампули (1,5 мл) і заморожували за триетапною програмою. Для запліднення 100 г ікри використовували 3 або 6 мл розмороженої сперми, а до 300 г ікри додавали від 9 до 18 мл сперми. У разі збільшення відношення об'єму сперми до маси ікри показник запліднення змінювався з 50 до 75%. Однак, після запліднення 100 г ікри білуги або сибірського осетра результати були значно нижчими (16,5–48,8%). Недоліком запропонованого О. Б. Докіною та співавторами [18] способу можна вважати низьку активність (10–40%) розмороженої сперми — в спермі стерляді після розморожування здатними до руху залишалось лише 10 і 30% клітин. Запліднення такою спермою може призвести до збіднення геному популяції осетрових риб внаслідок селекції, як впливає з роботи [20], в якій ікру російського осетра *Acipenser guldenstädtii* Brandt запліднили розмороженою спермою з активністю спермій 20–30 % і методом електрофорезу в поліакриламідному гелі вивчили зміни ферментів малатдегідрогенази та естерази в тканинах личинок на стадії переходу на активне живлення. Автори встановили, що використання кріоконсервованої сперми з низькою активністю підвищувало показник смертності личинок на ранніх стадіях ембріонального розвитку. В результаті селективної дії екстремальних чинників кріоконсервування значно зменшилася кількість активних клітин у розмороженій спермі до 30%, а личинки втратили рідкісний алель *e* в локусі естерази. Крім того, встановлено підвищення гетерозиготності за алелями малатдегідрогенази та естерази відносно контролю.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Головним завданням робіт щодо низькотемпературного заморожування сперми рідкісних та зникаючих видів риб є підвищення ефективності методів кріоконсервування, тобто збереження рухливості та запліднюючої здатності розморожених сперматозоїдів. Для цього, на наш погляд, необхідно оптимізувати всі етапи кріоконсервування сперми та її використання після розморожування в умовах рибних господарств.

Підвищення кріозахисту сперми можливе шляхом введення до кріозахисного розчину антифризів риб [21] або сироватки крові карася, у якого в зимовий період під час адаптації до навколишньої температури середовища збільшується кількість вільних амінокислот [22]. Тому існує вірогідність, що додавання до кріозахисного розчину сироватки крові карася може підвищити збереження кріоконсервованої сперми. Крім того, для зменшення селективної дії екстремальних чинників необхідно також визначитись з оптимальною осмотичністю кріозахисного середовища, кращим кріопротектором та способом заморожування сперми.

У зв'язку з вищевказаним, метою даного дослідження була оптимізація умов

кріоконсервування сперми стерляді, що дозволить зберегти властивості розморожених сперматозоїдів (активність та запліднюючу здатність) близькими до нативної сперми, та не втратити їх під час запліднення незалежно від об'єму ікри.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Експеримент проводили з використанням п'яти самців масою 0,90–1,45 кг та восьми самиць стерляді масою 1,20–1,60 кг. Витримування плідників проводили в басейнах з установками замкнутого водопостачання за температури води 14°C. Для отримання сперми та ікри плідників стимулювали дворазовою ін'єкцією суспензії гіпофіза ляща *Abramis brama* в розрахунку 3 мг/кг маси самця та 5 мг/кг маси самиці. Репродуктивні клітини отримували на наступний день. Охолоджену до 4°C сперму розводили 1:1 ізотермічними кріозахисними розчинами. Після цього суспензію клітин накрапували на фторопластову пластину по 100 мкл, або розливали в поліетиленові ампули об'ємом 0,5 та 1,5 мл. Для підтримання необхідного режиму охолодження змінювали висоту пластини над поверхнею азоту.

Сперму охолоджували за такою програмою: швидкість охолодження 3–5 град/хв до температури –15°C із затравленням кристалізації вологим повітрям [7] або вібрацією. Далі зі швидкістю охолодження 15–20 град/хв до температури –70°C з подальшим зануренням пластини в рідкий азот. Температуру гранул або ампул контролювали за допомогою термopари від цифрового термометра «UT320» («*Digital Thermometer UT320 series*», Китай) з реєстрацією на комп'ютері. Розморожування ампул сперми проводили на водяній бані за 40°C до появи рідкої фази за інтенсивного перемішування води.

Сперму в гранулах також інтенсивно перемішували зі ставовою водою за 15°C і додавали по 1 мл у кожну чашку Петрі, в якій знаходилося по 2 г ікри. Ікру (25–60 г) через 3–5 хв після її запліднення промивали 0,6%-м розчином таніну для видалення клейковини. Інкубація ікри проходила в апаратах Вейса.

У першій серії експериментів при визначенні кращих умов кріоконсервування сперму розводили в чотирьох розчинах (№№ 1–4) із кріопротекторами метанолом або диметилсульфоксидом і заморожували в гранулах та ампулах. Після 17 діб зберігання зразків у рідкому азоті сперму розморожували та оцінювали активність сперматозоїдів за активації ставовою водою (1:50) та їх запліднюючу здатність у чашках Петрі.

У другій частині експериментів для кріоконсервування використовували суміш сперми від двох самців, яку розводили 1:1 кріозахисним середовищем № 5 (KHCO₃ — 8,9 мМ; креатин — 3,8 мМ; сахароза — 11,7 мМ; фруктоза — 5,6 мМ; метанол — 3,75 М) — дослідна група № 1; та середовищем № 6 (KHCO₃ — 8,9 мМ; креатин — 7,6 мМ; сахароза — 11,7 мМ; фруктоза — 5,6 мМ; метанол — 3,75 М; плазма крові карася *Carassius auratus* 1:800 (v/v)) — дослідна група № 2; і відразу ж накрапували по 100 мкл на фторопластову пластину, яка знаходилася в парі азоту за температури 5°C.

Розморожували по 10 гранул сперми (1 мл) шляхом додавання до 50–60 мл ставової води за температури 14°C, після інтенсивного перемішування запліднювали порції ікри від 25 до 120 г. У контрольному варіанті запліднювали

ікру (100 г) сумішшю нативної сперми від двох самців у такому співвідношенні: 1 мл сперми : 200 мл ставової води. Для оцінки якості нативної та кріоконсервованої сперми використовували ікру від чотирьох самиць.

Рівень активності нативних та розморожених сперматозоїдів, які були активовані ставовою водою, визначали візуально за допомогою мікроскопа за відсотковим співвідношенням клітин із прямолінійним рухом до загальної кількості видимих у полі зору клітин.

Запліднюючу здатність сперматозоїдів оцінювали на стадії чотирьох бластомерів.

Вплив кріоконсервування на властивості сперматозоїдів визначали за довжиною (під біокуляром) та масою отриманих личинок і молоді. У контрольному та кожному варіанті експериментів, починаючи з личинки і до 3-місячного віку, кількість проб складала 50.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

На перших етапах роботи були спрямовані на дослідження впливу об'єму сперми, кріоконсервованої в різних середовищах, на активність та запліднюючу здатність сперматозоїдів після розморожування. Від самців було отримано по 10–20 мл сперми, оцінка якості якої показала, що при активації ставовою водою здатності до прямолінійного руху набувають 95–100% клітин.

Загальний аналіз розвитку ембріонів, отриманих через 24 год. після запліднення ікри розмороженою спермою, показав відставання у розвитку та нерівномірний розвиток ембріонів, які в одній пробі знаходилися на різних стадіях розвитку.

В результаті проведених досліджень встановлено, що об'єм кріоконсервованого зразка сперми впливав на активність та запліднюючу здатність розморожених сперматозоїдів (табл. 1).

При збільшенні об'єму кріоконсервованої сперми в ампулах до 0,5 або 1,5 мл досліджувані показники були нижчими, ніж після кріоконсервування в гранулах ($p \leq 0,05$). Отримані дані узгоджуються з результатами досліджень Х. Штейна [23].

Порівняння впливу кріозахисних розчинів та процесу кріоконсервування на властивості сперматозоїдів показало, що активність статевих клітин, які заморожували-розморожували в гранулах, була найвищою в середовищі № 1 з кріопротектором ДМСО, та майже вдвічі перевищувала активність сперматозоїдів, заморожених у розчині з метанолом та незначним додаванням гліцерину (№ 2). При цьому, запліднююча здатність сперми із даним розчином була на 10% нижчою, ніж при додаванні метанолу. Ці результати узгоджуються з даними, які були отримані в експериментах зі спермою осетрових та лососевих риб [3, 12, 24], в яких після кріоконсервування в розчинах із ДМСО краще зберігається рухова активність сперматозоїдів, однак знижується запліднююча здатність, а кріоконсервування в розчинах із метанолом, навпаки, підвищує показник запліднення.

Таким чином, результати експериментів підтвердили кращу захисну дію кріопротектора метанолу, порівняно з ДМСО, а також вищу ефективність заморожування сперми стерляді в гранулах, ніж в ампулах.

Таблиця 1. Склад кріозахисних розчинів, умови кріоконсервування та характеристика розмороженої сперми

№ кріо-розчину	Компонентний склад	Спосіб заморожування (об'єм)	Активність сперматозоїдів після: (%)		№♀	Запліднення ікри, %
			Розведення	Розморожування		
1	2,115 М ДМСО,	ампули (1,5 мл)		40,0±2,36	18	38,3
	13,4 мМ KCl,		83,75± 1,44			37,0
	14,6 мМ сахарози,	ампули (0,5 мл)		56,25±2,76	20	45,0
	74,9 мМ гліцину	гранули (0,1 мл)		77,5±1,67		55,0
2	3,73 М метанол,	ампули (0,5 мл)		27,5±1,67		33,0
	20,5 мМ гліцерин,		76,26± 1,44		10	
	13,4 мМ KCl,	гранули (0,1 мл)		50,0±2,36		65,0
	14,6 мМ сахарози					
3	1,057 М ДМСО,					
	1,86 М метанол,					
	13,4 мМ KCl,	гранули (0,1 мл)	80,0± 2,36	41,25±2,76	20	55,0
	14,6 мМ сахарози,					
4	66,6 мМ гліцину					
	3,73 М метанол,					
	8,9 мМ КНСО ₃ ,	гранули (0,1 мл)	78,75± 1,44	63,75±1,44	14	41,0
	14,6 мМ сахарози,					
КОНТРОЛЬ ♂ (№ 17)	3,8 мМ креатин					
		-	-	-	14	80,7
					18	79,4
					20	85,0
КОНТРОЛЬ ♂ (№ 19)		-	-	-	10	83,5

У другій серії експериментів в умовах рибного господарства було скорочено до мінімуму проміжок часу між отриманням сперми та її кріоконсервування, розморожену сперму одразу ж використовували для запліднення ікри. Крім того, було вдвічі зменшено розведення сперми ставовою водою під час запліднення. Оскільки у попередніх дослідах [25] було встановлено тенденцію кращого збереження сперми в розчині, який містив сироватку крові карася, для підтвердження цього ефекту її включили до нового кріозахисного розчину № 6. Додатково у кріозахисні розчини було включено КНСО₃, який раніше неодноразово успішно використовувався для кріоконсервування сперми різних організмів [26, 27], а також креатин та фруктозу. Зменшення об'єму кріоконсервованої сперми до 100 мкл та затравлення кристалізації парою вологого повітря [7] дозволили стандартизувати режим кріоконсервування для всіх гранул.

За результатами запліднення були встановлені вищі захисні властивості кріорозчину № 5, порівняно із № 6 (табл. 2).

Таблиця 2. Умови запліднення та кількість (%) ікри, заплідненої нативною та розмороженою спермою (стадія 4-х бластомерів)

№ інкуб. апарату	№ кріосередовища	Маса ікри, г	Кількість ікринок, екз.			Запліднення ікри, %	Відповідно до контролю, %
			всього	Незапліднених	Запліднених		
1	Контроль	90	218	25	193	88,5	–
			256	34	222	86,7	
			183	22	161	88,0	
						Серед. – 87,7	
2		80	197	25	172	87,3	–
			283	37	246	86,9	
			264	31	233	88,3	
						Серед. – 87,5	
3		40	201	68	133	66,2	76,5
			243	75	168	69,1	
			213	73	140	65,7	
						Серед. – 67	
4	№ 6	40	187	27	160	85,6	97,7
			198	28	170	85,9	
			205	30	175	85,4	
						Серед. – 85,6	
5		40	273	110	163	59,7	65,6
			247	105	142	57,5	
			217	97	120	55,3	
						Серед. – 57,5	
6		40	246	88	158	64,2	70,7
			179	70	109	60,9	
			221	87	134	60,6	
						Серед. – 61,9	
7		60	241	27	214	88,8	100
			287	38	249	86,8	
			201	26	175	87,1	
						Серед. – 87,6	
8	№ 5	60	147	28	119	81,0	91,2
			139	27	112	80,6	
			252	55	197	78,2	
						Серед. – 79,9	
9		25	245	26	219	89,4	101,8
			236	23	213	90,3	
			248	30	218	87,9	
						Серед. – 89,2

Низький рівень запліднення спермою, кріоконсервованою в розчині № 6, пов'язаний з недостатнім захистом сперми від негативного впливу екстремальних температур та можливими пошкодженнями сперматозоїдів під час заморожування-розморожування. Розчин № 6 відрізняється від розчину № 5 вищою осмотичністю за рахунок вдвічі більшої концентрації креатину та вмістом плазми крові карася. Однією з причин відсутності очікуваного кріозахисту сперми від плазми крові карася в цьому експерименті, можливо, була занадто висока осмотичність кріозахисного розчину № 6, а можливо, була його більша осмотичність, ніж розчину № 5. За результатами дослідження впливу розчину № 5 на сперму та за показником її запліднення після розморожування можна зробити висновок, що на ранніх стадіях ембріогенезу кількість незапліднених та загиблих ікринок не відрізнялася від таких контролю, як і показник запліднення ($p < 0,05$).

Оптимізація умов кріоконсервування та запліднення сперми дозволила зберегти вищу запліднювальну здатність сперматозоїдів, заморожених у середовищі № 5 — майже на рівні контролю, та запліднити від 25 до 60 г ікри. На підвищення досліджуваного показника також вплинув об'єм води, який був вдвічі меншим, ніж при заплідненні нативною спермою. Запліднювальну здатність розморожених сперматозоїдів із розчином № 6 оцінювали за менших об'ємів ікри (40 г), ніж із розчином № 5 (60 г). Це могло підвищити запліднювальну здатність сперми та компенсувати незначний вплив різниці в розведенні за рахунок зменшення впливу сперматозоїдів, що втратили активність. Середня кількість ембріонів, отриманих після запліднення ікри спермою, кріоконсервованою в розчині № 6 була 68,0% (інкубаційні апарати 3–6), а в розчині 5 — 85,6% (інкубаційні апарати 7–9). Сумарна кількість ембріонів у двох контрольних варіантах, отриманих від запліднення нативною спермою, складала 87,6% (інкубаційні апарати 1–2).

Менший вплив чинників кріоконсервування на сперму, заморожену в розчині № 5, встановлений і при порівнянні характеристик молоді, отриманої після запліднення ікри розмороженою спермою (табл. 3). Довжину та масу мальків визначали впродовж трьох місяців, при цьому на дев'яту добу відмічався перехід на активне живлення, а, починаючи з сімнадцятої доби, їх почали підгодовувати комбікормом.

На стадії передличинки у молоді стерляді, яку отримали від запліднення ікри кріоконсервованою спермою з використанням розчинів № 5 (група 1) та № 6 (група 2), відмічалась тенденція до збільшення маси відносно контрольних. Довжина тіла передличинок обох дослідних груп була більшою, порівняно з контрольною.

Аналіз маси та довжини тіла молоді групи 2 свідчить про те, що майже на всіх вивчених нами етапах розвитку та до кінця третього місяця досліджень маса і довжина тіла молоді групи 2 перевищували результати, отримані в групі 1 та в контрольній. В. К. Миловановим [28] вперше було повідомлено про можливі зміни маси молоді, отриманої від розмороженої сперми. Так, після витримування сперми баранів в атмосфері водню було вирощено молодь, маса якої була меншою, ніж така контрольної групи.

Таблиця 3. Результати вимірювань молоді стерляді, $M \pm m$

Вік	Маса, мг			Довжина, мм		
	Контроль	Група 1	Група 2	Контроль	Група 1	Група 2
2 доби	8,34±0,16	8,72±0,16	8,74±0,16	7,76±0,12	8,46±0,18*	8,48±0,14*
9 діб	21,20±0,42	21,64±0,36	20,72±0,37	15,90±0,14	16,10±0,13*	16,38±0,14
17 діб	67,32±2,62	71,62±2,27*,**	78,94±2,14**	22,52±0,34	23,02±0,30*	23,66±0,27
31 доба	237,5±9,81	258,18±10,94*	277,18±9,94	32,78±0,65	35,4±0,56*	36,92±0,50*
Маса, г			Довжина, см			
1,5 міс.	0,91±0,04	1,09±0,05*,**	1,25±0,06*,**	5,01±0,08	5,21±0,07*	5,38±0,08*
2 міс.	1,88±0,09	2,29±0,09*	2,50±0,11*	5,68±0,07	6,12±0,10*,**	6,55±0,11*,**
2,5 міс.	2,37±0,10	3,02±0,08*,**	3,28±0,09*,**	6,62±0,12	7,11±0,08*,**	7,34±0,08
3 міс.	3,96±0,21	4,37±0,21*,**	5,05±0,26**	8,39±0,13	8,78±0,13*	9,09±0,18*

Примітка. * — відмінність статистично значуща відносно контролю за $p \leq 0,005$,

** — відмінність статистично значуща між дослідними групами за $p \leq 0,005$.

Протилежні результати були отримані під час запліднення ікри сазанів кріоконсервованою спермою німецького коропа [26]. У результаті цієї роботи був отриманий гетерозисний гібрид, маса та швидкість росту якого були значно більшими, ніж при заплідненні ікри сазана нативною спермою сазана. С. І. Савушкіна та співавтори [30] повідомили про збільшення маси та швидкості росту коропів та осетрів при заплідненні ікри кріоконсервованою спермою, але активність розмороженої сперми була майже вдвічі нижчою, порівняно з результатами, отриманими в результаті проведення наших дослідів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Основним чинником, який впливав на кількість пошкоджених сперматозоїдів під час розведення сперми, була осмотичність кріозахисного середовища. За кріоконсервування осмотичність розчину та об'єм заморожуваного зразка сперми мали визначальний вплив на запліднювальну здатність сперматозоїдів та на збільшення розмірів і маси отриманої молоді, порівняно з молоддю від запліднення ікри нативною спермою. При цьому пошкоджуючий вплив був значно меншим для сперми, яку кріоконсервували в розчині № 5 з нижчою осмотичністю.

Маса та довжина тіла молоді, отриманої при заплідненні ікри розмороженою спермою, протягом трьох місяців, були більшими від таких у контролі. Приріст маси молоді був меншим за використання сперми, кріоконсервованої в розчині № 5 без плазми крові карася. Збільшення маси молоді, яку отримали у результаті запліднення ікри відігрітою спермою, після кріоконсервування в обох розчинах залежить від селективного впливу екстремальних чинників кріоконсервування на сперму плідників: зміни проникності мембран сперматозоїдів під час кріоконсервування та більшого накопичення креатину в сперматозоїдах,

кріоконсервованих у розчині № 6 з вищою осмотичністю, та більшою пошкоджувальною дією.

Менший приріст маси молоді від запліднення спермою, кріоконсервованою в розчині № 5, свідчить про краще збереження сперми в цьому розчині.

Мінімальний вплив чинників кріоконсервування на сперматозоїди відбивається на метаболізмі отриманої молоді, однак він не може бути шкідливим для її виживання.

Для вирішення питання щодо впливу креатину або різного ступеня пошкодження мембран на збільшення довжини та маси молоді необхідне проведення додаткових експериментів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Каранова М. В., Гахова Э. Н. Биохимическая стратегия выживания пресноводного моллюска *Lymnaea stagnalis* при околонулевых температурах // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. 2007. Т. 43, № 3. С. 258—264.
2. Дрокин С. І., Копейка Є. Ф. Середовище для кріоконсервування сперми коропа : пат. 49236 Україна. № u 200910499 ; заявл. 16.10.2009; опубл. 26.04.2010. Бюл. № 8.
3. The relationship of the cryoprotectants methanol and dimethylsulfoxide and hyperosmotic extenders on sperm cryopreservation of two North-American sturgeon species / Horvath A. et al. // Aquaculture. 2005. Vol. 247, № 1–4. P. 243—251.
4. Stein H., Bayrle H. Cryopreservation of the sperm of some freshwater teleosts // Ann. Biol. Anim. Bioch. Biophys. 1978. Vol.18, № 4. P. 1073—1076.
5. Stoss J., Holtz W. Cryopreservation of rainbow trout (*Salmo gairdneri*) sperm. The effect of DMSO concentration and equilibration time on sperm survival, sucrose and KCL as extender components and the osmolality of the thawing solution // Aquaculture. 1983. Vol. 32. P. 321—330.
6. Вплив осмотичності кріозахисного середовища, форми та об'єму контейнерів на виживання кріоконсервованих сперматозоїдів коропів *Cyprinus carpio* / Копейка Є. Ф. та ін. // Рибне господарство. 2009. Вип. 66. С. 89—93.
7. Kopeika E., Kopeika J. Variability of sperm quality after cryopreservation in fish // Fish Spermatology. Oxford, U.K., 2008. P. 347—396.
8. Harvey B. Cryopreservation of *Sarotherodon mossambicus* spermatozoa // Aquaculture. 1983. Vol. 32, iss. 3–4. P. 313—320.
9. Harvey B., Kelley N. R., Ashwood-Smith M. J. Cryopreservation of zebrafish spermatozoa using methanol // Can. J. Zool. 1982. Vol. 60, iss. 8. P. 1867—1870.
10. Relationships between selected sperm characteristics and fertilization success in the beluga sturgeon, *Huso huso* (Linnaeus, 1758) / Aramli M.S. et al. // Veterinarni Medicina. 2015. Vol. 60, № 9. P. 509—514.
11. Fertilising rate of Siberian sturgeon (*Acipenser baerii*, Brandt) milk cryopreserved with methanol / Glogowski J. et al. // Aquaculture. 2002. Vol. 211, iss. 4. P. 367—373.
12. Studies on the semen biology and sperm cryopreservation in the sterlet, *Acipenser ruthenus* L. / Lahnsteiner F. et al. // Aquaculture Research. 2004. Vol. 35. P. 519—528.
13. Motility and fertilizing capacity of fresh and frozen-thawed spermatozoa in sturgeons *Acipenser baeri* and *A. ruthenus* / Tsvetkova L.I. et al. // J. of Applied Ichthyology. 1996. Vol. 12, № 2. P. 107—112.

14. Urbany B., Horvath A., Kovacs B. Successful hybridization of *Acipenser* species using cryopreserved sperm // Aquaculture International. 2004. Vol. 12. P. 47—56.
15. Пуговкін А. Ю., Копейка Є. Ф. Проникність плазматичних мембран сперматозоїдів коропа (*Cyprinus carpio*, L., 1758) для молекул води та кріопротекторів на різних етапах кріоконсервування // Проблеми криобіології і криомедицини. 2016. Т. 26, № 4. С. 340—348.
16. Stoss J., Holtz W. Cryopreservation of rainbow trout (*Salmo gairdneri*) sperm. Effect of thawing solution, sperm density and interval between thawing and insemination // Aquaculture. 1981. Vol. 22. P. 97—104.
17. Cryopreservation of common carp (*Cyprinus carpio*) sperm in 1.2 and 5 ml straws and occurrence of haploids among larvae produced with cryopreserved sperm / Horvath A. et al. // Cryobiology. 2007. Vol. 54, iss. 3. P. 251—257.
18. Метод кріоконсервації сперми осетрових риб — об'єктів аквакультури / Докина О. Б. и др. // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : IV Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Москва : ВНИРО, 2006. С. 76—79.
19. Способ кріоконсервирования спермы осетровых рыб : пат. МПК А01К 61/00, А0N 1/02 РФ ; заявл. 02.06.2006; опубл. 27.02.2008. Бюл. № 6.
20. Шишанова Е. И., Тренклер И. В., Мамонова А. С. Влияние кріоконсервации спермы на выживаемость и генетический полиморфизм личинок русского осетра // Вестник АГТУ. 2012. № 2. С. 105—110. (Серия : Рыб. хоз-во).
21. Hypotonic treatment prior to freezing improves cryoresistance of common carp (*Cyprinus carpio* L.) spermatozoa / Dzyuba B. et al. // Cryobiology. 2013. Vol. 66. P. 192—194.
22. Каранова М. В. Состав свободных аминокислот крови и мышц ротана *Perccottus glehni* в период подготовки и завершения гибернации // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. 2009. Т. 45, № 1. С. 59—67.
23. Stein H. Zum Einfluss von Schutzsubstanz und Konfektionierung auf das Befruchtungsergebnis mit tiefgefrorenem Bachforellensperma (*Salmo trutta forma fario* L.) // Berl. Munch. Tierärztliche Wochenschrift. 1979. Vol. 92. P. 420—421.
24. Lahnsteiner F., Weismann T., Patzner R.A. Methanol as cryoprotectant and the suitability of 1.2 ml and 5 ml straws for cryopreservation of semen from salmonid fishes // Aquaculture Research. 1997. Vol. 28. P. 471—479.
25. Кріоконсервирование спермы стерляди: оптимизация состава криозащитной среды / Пуговкин А. Ю. и др. // Проблеми криобіології і криомедицини. 2016. Т. 26, № 2. С. 160.
26. Mounib M. S. Cryogenic preservation of fish and mammalian spermatozoa // J. Reprod. Fert. 1978. Vol. 53, № 1. P. 13—18.
27. Mounib M. S., Hwang P. C., Idler R. R. Cryogenic preservation of Atlantic Cod (*Gadus morhua*) sperm // J. Fish. Res. Board. Can. 1968. Vol. 25, № 12. P. 2623—2632.
28. Милованов В. К. Биология воспроизводства и искусственное осеменение животных. Москва : Сельхозиздат, 1962. 696 с.
29. Использование кріоконсервированной спермы карпа для коммерческой гибридизации на теплых водах Приморской ГРЭС / Копейка Е. Ф. и др. // Рыбохоз. использование теплых вод : IV Всесоюз. совещ., окт., 1990. : тезисы докл. Москва, 1990. С. 145—146.
30. Савушкина С. И. Выращивание рыбопосадочного материала, полученного с использованием кріоконсервированной спермы // Рациональное

использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК»: науч.-практ. конф., 17–19 дек. 2007 г. : матер. Москва : Россельхозакадемия, 2007. С. 303—305.

REFERENCES

1. Karanova, M. V., & Gahova, Je. N. (2007). Biohimicheskaja strategija vyzhivaniya presnovodnogo molljuska *Lymnaea stagnalis* pri okolonulevyh temperaturah. *Zhurnal jevoljucionnoj biohimii i fiziologii*, 43, 3, 258-264.
2. Drokyn, S.I., & Kopyejka, Ye.F. (2010). *Seredovyshhe dlya kriokonservuvannya spermy koropa*. Patent of Ukraine. № 49236.
3. Horvath A., Wayman W.R., Urbányi B. et al. (2005). The relationship of the cryoprotectants methanol and dimethylsulfoxide and hyperosmotic extenders on sperm cryopreservation of two North-American sturgeon species. *Aquaculture*, 247 (1–4), 243-251.
4. Stein, H., & Bayrle, H. (1978). Cryopreservation of the sperm of some freshwater teleosts. *Ann. Biol. Anim. Bioch. Biophys*, 18, 4, 1073-1076.
5. Stoss, J., & Holtz, W. (1983). Cryopreservation of rainbow trout (*Salmo gairdneri*) sperm. The effect of DMSO concentration and equilibration time on sperm survival, sucrose and KCL as extender components and the osmolality of the thawing solution. *Aquaculture*, 32, 321-330.
6. Kopyejka, Ye. F., Drokin, S. I., & Gordiyenko, Ye. O. et al. (2009). Vplyv osmotychnosti kriozahtynogo seredovyshha, formy ta ob'yemu kontejneriv na vyzhyvannya kriokonservovanyh spermatozoidiv koropiv *Cyprinus carpio*. *Rybne gospodarstvo*, 66, 89-93.
7. Kopeika, E., & Kopeika, J. (2008). Variability of sperm quality after cryopreservation in fish. *Fish Spermatology*. Oxford, U.K., 347-396.
8. Harvey, B. (1983). Cryopreservation of *Sarotherodon mossambicus* spermatozoa. *Aquaculture*, 32 (3–4), 313-320.
9. Harvey, B., Kelley, N. R. & Ashwood-Smith, M. J. (1982). Cryopreservation of zebrafish spermatozoa using methanol. *Can. J. Zool.*, 60 (8), 1867-1870.
10. Aramli, M. S., Kalbassi, M. R., Nazari, R. M., & Sarvi, K. (2015). Relationships between selected sperm characteristics and fertilization success in the beluga sturgeon, *Huso huso* (Linnaeus, 1758). *Veterinarni Medicina*, 60 (9), 509-514.
11. Glogowski, J., Kolman, R., & Szczepkowski, M. et al. (2002). Fertilising rate of Siberian sturgeon (*Acipenser baerii*, Brandt) milk cryopreserved with methanol. *Aquaculture*, 211 (4), 367-373.
12. Lahnsteiner, F., Berger, B., Horvath, A., & Urbanyi, B. (2004). Studies on the semen biology and sperm cryopreservation in the sterlet, *Acipenser ruthenus* L. *Aquaculture Research*, 35, 519-528.
13. Tsvetkova, L. I., Cosson, J., Linhart, O., et al. (1996). Motility and fertilizing capacity of fresh and frozen-thawed spermatozoa in sturgeons *Acipenser baeri* and *A. ruthenus*. *J. of Applied Ichthyology*, 12 (2), 107-112.
14. Urbany, B., Horvath, A., & Kovacs, B. (2004). Successful hybridization of *Acipenser* species using cryopreserved sperm. *Aquaculture International*, 12, 47-56.
15. Pugovkin, A. Yu., & Kopyejka, Ye.F. (2016). Pronyknist plazmatychnykh membran spermatozoidiv koropa (*Cyprinus carpio*, L., 1758) dlya molekul vody ta krioprotektoriv na riznyh etapah kriokonservuvannya. *Problemy kriobiologii i kriomedycyny*, 26 (4), 340-348.

16. Stoss, J., & Holtz, W. (1981). Cryopreservation of rainbow trout (*Salmo gairdneri*) sperm. Effect of thawing solution, sperm density and interval between thawing and insemination. *Aquaculture*, 22, 97-104.
17. Horváth, Á., Miskolczi, E., & Mihálffy, S. et al. (2007). Cryopreservation of common carp (*Cyprinus carpio*) sperm in 1.2 and 5 ml straws and occurrence of haploids among larvae produced with cryopreserved sperm. *Cryobiology*, 54 (3), 251-257.
18. Dokina, O. B., Cvetkova, L. I., Pronina, N. D., & Milenko, V. A. (2006). Metod kriokonservacii spermy osetrovih ryb — obektov akvakul'tury. *Akvakul'tura osetrovih ryb: dostizheniya i perspektivy razvitija: IV Mezhdunarodnaya nauch-prakt. konf.* Moskva: VNIRO, 76-79.
19. Dokina, O. B., Cvetkova, L. I., Pronina, N. D., & Milenko, V. A. (2008). *Sposob kriokonservirovaniya spermy osetrovih ryb*. Patent of RF № A01K 61/00, A0N 1/02.
20. Shishanova, E. I., Trenkler, I. V., & Mamonova, A. S. (2012). Vliyanie kriokonservacii spermy na vyzhivaemost' i geneticheskij polimorfizm lichinok russkogo osetra. *Vestnik AGTU. Ser.: Ryb. hoz-vo*, 2, 105-110.
21. Dzyuba, B., Cosson, J., & Yamaner, G. et al. (2013). Hypotonic treatment prior to freezing improves cryoresistance of common carp (*Cyprinus carpio* L.) spermatozoa. *Cryobiology*, 66, 192-194.
22. Karanova, M. V. (2009). Sostav svobodnyh aminokislot krovi i myshc rotana *Perccottus glehni* v period podgotovki i zaversheniya gibernacii. *Zhurnal jevoljucionnoj biohimii i fiziologii*, 45 (1), 59-67.
23. Stein, H. (1979). Zum Einfluss von Schutzsubstanz und Konfektionierung auf das Befruchtungsergebnis mit tiefgefrorenem Bachforellensperma (*Salmo trutta morpha fario* L.). *Berl. Munch. Tierärztliche Wochenschrift*, 92, 420-421.
24. Lahnsteiner, F., Weismann, T., & Patzner, R. A. (1997). Methanol as cryoprotectant and the suitability of 1.2 ml and 5 ml straws for cryopreservation of semen from salmonid fishes. *Aquaculture Research*, 28, 471-479.
25. Pugovkin, A. Ju., Kononenko, I. S., & Kononenko, R. V., et al. (2016). Kriokonservirovanie spermy sterljadi: optimizacija sostava kriozashhitnoj sredy. *Problemy kriobiologii i kriomediciny*, 26 (2), 160.
26. Mounib M. S. (1978). Cryogenic preservation of fish and mammalian spermatozoa. *J. Reprod. Fert.*, 53 (1), 13-18.
27. Mounib, M. S., Hwang, P. C., & Idler, R. R. (1968). Cryogenic preservation of Atlantic Cod (*Gadus morhua*) sperm. *J. Fish. Res. Board. Can.*, 25 (12), 2623-2632.
28. Milovanov, V. K. (1962). *Biologija vosproizvodstva i iskusstvennoe osemenenie zhivotnyh*. Moskva: Sel'hozizdat.
29. Kopejka, E. F., Cherepanov, V. V., Ajushin, B. N., & Rachev, E. I. (1990). Ispol'zovanie kriokonservirovannoj spermy karpa dlja kommercheskoj gibridizacii na teplyh vodah Primorskoj GRES. *Rybohozyaystvennoe ispol'zovaniju teplykh vod: IV Vses. soveshh.* Moskva, 145-146.
30. Savushkina, S. I. (2007). Vyrashhivanie ryboposadochnogo materiala, poluchennogo s ispol'zovaniem kriokonservirovannoj spermy. Racional'noe ispol'zovanie presnovodnyh jekosistem — perspektivnoe napravlenie realizacii nacional'nogo proekta «Razvitie APK»: nauch.-prakt. konf.: mater. Moskva: Rossel'hozakademija, 303-305.

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЯ СПЕРМЫ СТЕРЛЯДИ (*ACIPENSER RUTHENUS*, L. 1758) ДЛЯ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ИКРЫ В УСЛОВИЯХ РЫБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

И. С. Кононенко, kononenko_irina88@ukr.net, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

А. Ю. Пуговкин, lima@online.ua, Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

Р. В. Кононенко, ruslan_kononenko@ukr.net, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

В. А. Черепнин, diglador@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

К. И. Буцкий, cryo@online.kharkov.ua, Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

Е. Ф. Копейка, ekopeik@yahoo.com, Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

Цель. Оптимизировать условия криоконсервирования спермы стерляди для проведения работ по оплодотворению икры и получению жизнестойкого потомства в условиях рыбных осетровых хозяйств. Проанализировать влияние замораживания спермы в разных формах на показатели выживания сперматозоидов и оплодотворения икры. Сравнить результаты использования для замораживания спермы стерляди разных по составу компонентных криозащитных растворов и проанализировать их влияние на качество полученного потомства.

Методика. Задачи по оптимизации условий криоконсервирования спермы стерляди для оплодотворения икры в условиях рыбных хозяйств выполнялись согласно общепринятым методикам в криобиологии. Работы с полученным потомством стерляди проводились согласно общепринятым методам в осетроводстве.

Результаты. Исследованиями установлено, что оптимизация условий криоконсервирования спермы стерляди позволила сберечь свойства отогретых сперматозоидов на уровне показателей нативной спермы. Установлено, что функции криоконсервированной в парах жидкого азота спермы в гранулах в растворах с метанолом или диметилсульфоксидом (ДМСО), лучше сохранялись в гранулах при использовании метанола. В условиях рыбного хозяйства оценены функции спермы после её замораживания в криозащитных растворах №№ 5 и 6. Установлено, что оплодотворяющая способность криоконсервированной спермы в растворе № 5 (85,6%) (с меньшей осмотичностью) почти не отличалась от контроля (87,6%) при использовании 25–60 г икры. В криозащитном растворе № 6 данный показатель был на 17,6% ниже. Прирост массы и длины тела 3-месячных особей, полученных в результате оплодотворения икры спермой, криоконсервированной в обоих растворах, был больше, чем в контроле.

Научная новизна. Введение в криозащитный раствор креатина и фруктозы позволило повысить его защитные свойства и сохранить показатели активности сперматозоидов после размораживания на уровне нативной спермы. Криоконсервирование спермы в гранулах позволило оптимизировать условия низкотемпературного замораживания спермы данного представителя осетровых видов рыб и получить качественное жизнестойкое потомство.

Практическая значимость. Полученные результаты могут использоваться осетроводами в условиях рыбных хозяйств для работ по получению жизнестойкого потомства стерляди как для товарных потребностей, так и для восстановления её популяций в естественных водоёмах, и криобиологами для работ с другими видами рыб.

Ключевые слова: криоконсервирование, стерлядь, сперма, оплодотворение, гранулы, ампулы, креатин, сыворотка крови карася.

OPTIMIZATION OF THE CONDITIONS OF STERLET
(*ACIPENSER RUTHENUS*, L. 1758) SPERM CRYOPRESERVATION
FOR EGG FERTILIZATION IN FISH FARM CONDITIONS

I. Kononenko, kononenko_irina88@ukr.net, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

A. Pugovkin, lima@online.ua, Institute of Cryobiology and Cryomedicine Problems NAS of Ukraine, Kharkiv

R. Kononenko, ruslan_kononenko@ukr.net, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

V. Cherepnin, diglador@ukr.net, Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv

K. Buts'kyi, cryo@online.kharkov.ua, Institute of Cryobiology and Cryomedicine Problems NAS of Ukraine, Kharkiv

Ye. Kopeika, ekopeik@yahoo.com, Institute of Cryobiology and Cryomedicine Problems NAS of Ukraine, Kharkiv

Purpose. To optimize the conditions of sterlet sperm cryopreservation for works on egg fertilization and for producing viable offspring in the conditions of sturgeon farms. To analyze the effect of sperm freezing in different forms on spermatozoa survival and egg fertilization. To compare the results of cryoprotective solutions with compositions on the results of their use of sterlet sperm fertilization and to analyze their effect on the quality of the produced offspring.

Methodology. The task aimed at optimizing the conditions of sterlet sperm cryopreservation for egg fertilization in the conditions of fish farms were carried out according to generally accepted methods in cryobiology and recommendations of Ye.F. Kopeika. The works with the produced sterlet offspring were carried out according to conventional sturgeon culture methods.

Findings. The studies showed that the optimization of the conditions of sterlet sperm cryopreservation allowed preserving the properties of thawed spermatozoa at the level of native sperm. It was found that the functions of the sperm cryopreserved in liquid nitrogen vapors in granules in solutions with methanol or dimethyl sulfoxide (DMSO) were better preserved in granules when using methanol. The functions of the sperm after its freezing in cryopreservation solutions №№ 5 and 6 were evaluated in the conditions of a fish farm. It was found that the fertilizing capacity of the cryopreserved sperm in the solution № 5 (85.6 %) (with lower osmolality) did not virtually differ from the control (87.6 %) when using 25-60 g of eggs. In the cryopreservation solution № 5, this value was 17.6 % lower. The weight and length gain after egg fertilization with the sperm cryopreserved in both solutions in 3-month fish was higher than in the control.

Originality. Introduction of creatine and fructose into the cryopreservation solution allowed increasing its protective properties and preserving spermatozoa activity after thawing at the level of the native sperm. Sperm cryopreservation in granules allowed optimizing the conditions of low temperature freezing of this sturgeon species and producing high quality viable offspring.

Practical value. The obtained results can be used by sturgeon culturists in the conditions of fish farms for works aimed at producing viable sterlet offspring both for commercial purposes and for restocking into natural water bodies as well as by cryobiologists for works with other fish species.

Key words: cryopreservation, sterlet, sperm, fertilization, granules, ampoules, creatine, Prussian carp serum.

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 98-108

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.098>

УДК [597–111:597.554.3]:[597–1,044:628.394.17] (282.247.326.8)

ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ТА ЦИТОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ КЛІТИН ЧЕРВОНОЇ КРОВІ ДВОЛІТОК КАРАСЯ СРІБЛЯСТОГО (*CARASSIUS AURATUS GIBELIO* (BLOCH, 1782)) ЗА УМОВ ІНТОКСИКАЦІЇ ІОНАМИ МІДІ

Т. С. Шарамок, sharamok@i.ua, Дніпровський національний університет імені
Олеса Гончара, м. Дніпр

Н. Б. Єсіпова, yesipova.natalia@gmail.com, Дніпровський національний університет
імені Олеса Гончара, м. Дніпр

Н. Л. Колесник, kolenataleo@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН
України, м. Київ

Мета. Виявити вплив підвищених концентрацій іонів міді (10 рибогосподарських ГДК) на морфологічні та цитометричні показники еритроцитів дволіток карася сріблястого (*Carassius gibelio* Bloch, 1782) в експериментальних та природних умовах.

Методика. В ході роботи використовувалися узагальнені результати досліджень, що проводилися протягом 2015–2016 рр. Визначали морфологічні та цитометричні показники еритроцитів карася сріблястого в умовах природного існування (Запорізьке водосховище) та експерименту. Концентрація іонів міді в експерименті та в природних умовах була однаковою і дорівнювала 0,01 мг/л (10 рибогосподарських ГДК). Експериментальні дослідження проводилися протягом 21 доби. У контрольному акваріумі риби утримувалися у відстояній водопровідній воді, у дослідних акваріумах інтоксикацію риб іонами міді моделювали внесенням у воду CuSO_4 . Мазки крові досліджували за збільшення об'єктиву 40 $\times$ та 100 $\times$ з використанням мікрофотознімання цифровою камерою «Sciencelab T500 5.17 М».

Результати. Проведені гематологічні дослідження показали, що у дволіток карася сріблястого в умовах експериментальної інтоксикації іонами міді (0,01 мг/л) відбувається збільшення частки незрілих форм еритроцитів, підвищується кількість еритроцитів з патологічними явищами (руйнування клітинної оболонки, атиповість форми), зростає ядерно-цитоплазматичне співвідношення, але різниця у цитометричних показниках еритроцитів між дослідними та контрольними рибами не була вірогідною. При порівнянні морфометричних показників еритроцитів карася, що мешкав в експериментальних і природних умовах за аналогічної концентрації іонів міді (0,01 мг/л), встановлено вірогідне збільшення площ ядер зрілих еритроцитів і, відповідно, збільшення ядерно-цитоплазматичного співвідношення еритроцитів (майже на 30%) у риб в експериментальних умовах порівняно з рибами, що мешкали в Запорізькому водосховищі. Збільшення даних показників опосередковано свідчить про пригнічення функціональної активності еритроцитів.

Наукова новизна. Вперше представлений аналіз впливу іонів міді за концентрації 0,01 мг/л (10 рибогосподарських ГДК) на цитометричні показники еритроцитів дволіток карася сріблястого при утриманні в умовах експерименту та природного існування.

© Т. С. Шарамок, Н. Б. Єсіпова, Н. Л. Колесник, 2017

Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для виявлення адаптаційних реакцій в організмі риб за умов впливу важких металів, а також у гідроекологічному моніторингу для виявлення небезпечного для гідробіонтів рівня забруднення важкими металами водних екосистем.

Ключові слова: карась сріблястий, мідь, еритроцити, морфологічні та цитометричні показники, Запорізьке водосховище, експеримент.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Забруднення навколишнього середовища важкими металами визнано світовою проблемою [1]. Мідь займає друге місце за рівнем небезпечності для гідробіонтів серед важких металів [2]. У зв'язку із забрудненням навколишнього середовища деякими промисловими та сільськогосподарськими забруднювачами, кількість міді у водоймах поступово зростає [3]. У воді Запорізького водосховища вміст міді складає в середньому 10 рибогосподарських ГДК [4]. В порівнянні з іншими важкими металами, мідна інтоксикація у прісноводних риб досліджена недостатньо. Встановлено, що мідь викликає окиснювальний стрес [5] та справляє токсичний вплив на деякі клітинні лінії [6, 7].

Відомо, що кровоносна система риб з вираженими функціональними розладами та патологічними змінами за умов впливу токсичних речовин є цінним індикатором стану гідробіонтів. Риби дуже чутливі до вмісту у воді хімічних агентів та відповідають на їх присутність змінами, зокрема у червоній крові [8]. Однак на теперішній час при вивченні забруднення природних водойм якісні та кількісні показники складу крові риб використовуються недостатньо [9].

Інформація щодо дії іонів міді на патоморфологічні та цитометричні показники клітин еритроїдного ряду карася сріблястого досить обмежена і стосується оцінки впливу високих концентрацій іонів міді у воді (0,1 мг/л та вище) на деякі метричні показники еритроцитів та зміни параметрів цитогенетичної нестабільності клітин червоної крові [1, 10].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Науковий та практичний інтерес являє дослідження морфологічних та фізіологічних порушень, що відбуваються в клітинах еритроїдного ряду промислових видів риб, та визначення взаємозв'язку цитопатологічних процесів із впливом антропогенних чинників. Реакція крові окремих особин у відповідь на зовнішній вплив є неспецифічною і може бути використана як засіб ранньої діагностики нормального або патологічного стану популяції риб у цілому. Вирішення даної проблеми дозволить використовувати ряд інтегрованих показників для оцінки фізіологічного стану організму, ранньої діагностики розвитку патології промислових риб та ступеня токсичності водного середовища [11, 12].

Однією з основних проблем екологічного стану дніпровських водосховищ є забруднення важкими металами, а саме — іонами міді, вміст яких у воді перевищує рибогосподарські норми у декілька разів. Залишаються невирішеними питання щодо впливу іонів міді на фізіологічний стан основних промислових видів риб, серед яких сріблястий карась займає домінуюче становище.

У зв'язку з цим, метою представленої роботи було виявлення впливу підвищених концентрацій іонів міді у водному середовищі (10 рибогосподарських ГДК) на патоморфологічні та цитометричні показники еритроцитів карася сріблястого (*Carassius gibelio* Bloch, 1782) в експериментальних та природних умовах.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Об'єктом дослідження були дволітки карася сріблястого (*Carassius gibelio* Bloch, 1782). У Запорізькому водосховищі риб відловлювали за допомогою зябрових сіток під час проведення науково-дослідних ловів у літньо-осінній період протягом 2015–2016 рр.

Лабораторний експеримент проводили у 50-літрових акваріумах з підтриманням постійних газового та температурного режимів. В кожному акваріум було поміщено по 10 екземплярів риб.

Контрольних риб утримували в чистій відстояній водопровідній воді. Інтوكсикацію моделювали внесенням у воду акваріумів, де знаходились дослідні групи риб, $\text{CuSO}_4 \times 5\text{H}_2\text{O}$, до досягнення вмісту іонів міді 10 рибогосподарських ГДК для ставової води (0,01 мг/л). Підтримувались оптимальні гідрохімічні показники в акваріумах: вміст кисню — на рівні 6,0–6,5 мг/л, вуглекислого газу — 4,0–3,5 мг/л. Величина рН була близькою до 7,7–7,9. Температура води становила 23–24°C. Риб годували один раз на добу, маса корму складала 3% від їх загальної маси. Експеримент тривав протягом 21 доби. Відбір проб для визначення гематологічних показників здійснили по закінченні експерименту.

Кров відбирали з хвостової вени. Морфологічні дослідження еритроцитів проводились на мазках крові, які фарбували за методом Романовського—Гімзо. Мазки крові досліджували за збільшення об'єктиву $40\times$ та $100\times$ з використанням мікрофотознімання цифровою камерою «Sciencelab T500 5.17 М». На препаратах проглядали 100 полів зору. При цьому визначали наступні показники: великий повздовжній (D) та малий поперечний (d) діаметри зрілих еритроцитів, площу еритроцита (S), площу ядра еритроцита (s), ядерно-цитоплазматичне співвідношення (s/S), відсоток зрілих еритроцитів (ЗЕ), відсоток незрілих еритроцитів (НЕ) та їх форм.

Статистичне опрацювання отриманих даних здійснювали за загальноприйнятими методами із застосуванням програми *Excel 2010*.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

За результатами досліджень мазків крові у дволіток карася, що мешкав у Запорізькому водосховищі, еритроцити мали овальну форму з чітко вираженою оболонкою (рис. 1). Цитоплазма світлого кольору, ядро займає центральне положення у клітині. Мікроядра не виявлені. Зафіксована незначна кількість еритроцитів з атиповою формою (близько 8 %).

За даними інших дослідників [13–15] у крові риб за різних патологічних явищ (токсикозів, інфекційних хвороб) з'являється велика кількість незрілих форм еритроцитів, збільшується частина клітин з дегенеративними змінами (амітоз), порушується морфологія еритроцитів.

За результатами наших досліджень, кількість незрілих еритроцитів у карася Запорізького водосховища була досить низькою і становила 4 %. Серед незрілих

форм домінували поліхроматофільні нормобласти (76% від загальної кількості HE). Явища амітозів були одиничними. Кількість еритроцитів з патологією складала 7% від загальної кількості еритроцитів у полі зору мікроскопа. Патологічні зміни були представлені, в основному, зруйнованою клітинною оболонкою, каріолізісом, пойкилоцитозом.

Рис. 1. Еритроцити карася сріблястого Запорізького водосховища

Результати лабораторних досліджень показали, що клітини крові карася забарвлювались від світло-фіолетового до темно-синього кольорів. У контрольній групі еритроцити, у більшості випадків, мали чіткі межі, овальну форму та одне ядро.

У дослідній групі (10 ГДК вмісту у воді міді) виявлено ряд патологічних відхилень еритроцитів. Відзначався пойкилоцитоз, фестончатість мембран та зсув ядра. Відмічені клітини грушоподібної, серповидної, ромбовидної форм. Траплялися еритроцити з відростками, що свідчить про пригнічення еритропоезу. У невеликій кількості виявлені мікроядра та амітози. Такі зміни вказують на погіршення фізіологічного стану риб дослідної групи через негативний вплив іонів міді (рис. 2). Кількість клітин з патологічними змінами у контрольному варіанті складала 3,9%, при цьому найчастіше траплявся пойкилоцитоз (2,3%).

Рис. 2. Еритроцити карася сріблястого в умовах експерименту: А — пойкилоцитоз; В — зсув ядра; С — фестончатість мембран.

У риб дослідного варіанту кількість патологій еритроцитів складала 30,9% від загальної кількості клітин та була більшою порівняно з рибами контрольного варіанту на 87%, з одновіковими особинами Запорізького водосховища — більше на 77% ($p \leq 0,05$).

Зрілі еритроцити складали найчисельнішу групу елементів червоної крові дволіток карася сріблястого — 97% у контролі та 90,3% у досліді. Відповідно максимальна кількість незрілих еритроцитів (9,7%) спостерігалась у карася, що знаходився під впливом підвищеної концентрації іонів міді. Збільшення частки НЕ спостерігалась нами раніше у молоді інших видів риб в умовах гіпоксії [16], а також у плітки різних вікових груп в умовах забрудненого середовища [17]. При цьому відзначалось зменшення відносної частки ЗЕ і збільшення молодих баластних форм еритроцитів. Відомо, що у риб синтез гемоглобіну в клітинах еритроїдного ряду починається зі стадії поліхроматофільного нормобласту [18]. Тобто зменшення частки зрілих еритроцитів і збільшення незрілих форм свідчить про пригнічення інтенсивності окиснювально-відновних процесів в організмі риб під впливом антропогенного забруднення.

Дослідження цитометричних показників ЗЕ карася сріблястого у досліді та в контролі не виявили вірогідних розбіжностей (табл. 1).

Таблиця 1. Цитометричні показники зрілих еритроцитів периферійної крові молоді карася сріблястого в природних та експериментальних умовах.

Умови існування риб	Діаметр еритроцита, мкм		Площа еритроцита, мкм ²	Площа ядра еритроцита, мкм ²
	D	d		
Карась 1+ (Запорізьке водосховище)	12,80±0,08	8,70±0,07	88,9 ± 0,47	13,40 ± 0,16*
Карась 1+ (Експеримент – контрольна група)	13,15±0,62	8,46±0,43	91,4±2,16	16,36±0,76
Карась 1+ (Експеримент – дослідна група)	13,20±0,76	8,30±0,68	89,60±7,64	18,96±2,8*

Примітка.* — різниця між показниками вірогідна, $p \leq 0,05$.

Розмір великих діаметрів еритроцитів (D) відповідав встановленим біоконстантам для коропових риб [19].

В умовах наднормативних концентрацій міді у воді у дослідних риб спостерігалось збільшення площі ядра на 16% порівняно з контрольними, але різниця не була вірогідною ($p \geq 0,05$). При порівнянні показників крові риб, що знаходились під впливом підвищеної концентрації міді в експериментальних та природних умовах, відмічається вірогідна різниця ($p \leq 0,05$) в площях ядер еритроцитів: у карася в експерименті цей показник був на 41% вищими порівняно з карасем Запорізького водосховища.

Ядерно-цитоплазматичне співвідношення еритроцитів карася варіювало від 0,15 до 0,21; максимальним цей показник був у дослідних риб, що утримувались в

акваріумах з підвищеною концентрацією міді (рис. 3). Відомо, що накопичення ядерної маси звичайно пов'язано з початком амітотичного поділу клітин. Саме в цих зразках були наявні амітотичні клітини.

Рис. 3. Показники ядерно-цитоплазматичного співвідношення еритроцитів дворічок карася в експериментальних та природних умовах

Таким чином, підвищення ядерно-цитоплазматичного співвідношення еритроцитів у карася під впливом іонів міді (0,01 мг/л) вказує на зменшення функціональної площі цитоплазми, яка відповідає за окиснювально-відновлювальні процеси в клітині, що опосередковано вказує на пригнічення її функціональної діяльності. Але в умовах Запорізького водосховища, за наявності у воді аналогічної концентрації міді, співвідношення площ ядра і цитоплазми в еритроцитах було меншим майже на 30%. Тобто в природних умовах токсична дія іонів міді частково знешкоджується за рахунок антагоністичної дії низки чинників (розчинені органічні та мінеральні речовини тощо).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

У дволіток карася сріблястого в умовах експериментальної інтоксикації іонами міді (0,01 мг/л) відбувається збільшення частки незрілих форм еритроцитів, підвищується кількість еритроцитів з патологічними явищами (руйнування клітинної оболонки, атипові форми), зростає ядерно-цитоплазматичне співвідношення, однак різниця цитометричних показників еритроцитів між дослідними та контрольними рибами не була вірогідною.

При порівнянні морфометричних показників еритроцитів карася, що мешкав в експериментальних і природних умовах за аналогічної концентрації іонів міді (0,01 мг/л), встановлено вірогідне збільшення площі ядра зрілих еритроцитів і, відповідно, збільшення ядерно-цитоплазматичного співвідношення еритроцитів (майже на 30%) у риб в експериментальних умовах порівняно з рибами, що мешкали в Запорізькому водосховищі. Збільшення цих показників опосередковано свідчить про пригнічення функціональної активності еритроцитів. Отже, в природних умовах токсична дія іонів міді частково знешкоджується за рахунок антагоністичної дії ряду зовнішніх чинників

(розчинені у воді органічні та мінеральні речовини тощо).

Перспективою подальших досліджень є можливість використання отриманого матеріалу для гідроекологічного моніторингу рибогосподарських водойм, а також коригування гранично допустимих концентрацій міді у природних та штучних водоймах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Arnaudov A. D., Velcheva I. G. Tomova E. S. Influence of copper on the erythrocyte-metric parameters of *Carassius gibelio* (Pisces, Cyprinidae) // Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2008. Vol. 1, № 6. P. 557—563.
2. Kondera E. Wpływ kadmuim i edzinaaktywność krwiotwórczą nerkigłowowej karpia// Ochrona Środowiskai Zasobów Naturalnych. 2011. № 48. S. 143—150.
3. Georgieva E., Arnaudov A., Velcheva I. Clinical, hematological and morphological studies on ex situinduced copper intoxication in crucian carp (*Carassius gibelio*) // Journal of Central European Agriculture. 2010. Vol 11, № 2. P. 165—172.
4. Шарамок Т. С., Єсіпова Н. Б. Вплив антропогенних факторів на гематологічні показники риб // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. 2015. № 3—4 (64). С. 722—726. (Серія : Біологія. Спецвипуск : Гідроекологія).
5. Craig P. M., Wood C. M., McClelland G. B. Oxidative stress response and gene expression with acute copper exposure in zebrafish (*Danio rerio*) // American Journal of Physiology-Regulatory Integrative and Comparative Physiology. 2007. № 293. R1882—R1892.
6. Nawaz M., Manz C., Krumschnabel G. *In vitro* toxicity of copper, cadmium, and chromium to isolated hepatocytes from carp, *Cyprinus carpio* L. // Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 2005. Vol. 75. P. 652—661.
7. Comparative evaluation of the cytotoxicity sensitivity of six fish cell lines to four heavy metals *in vitro* / Tan F. X. at al.// Toxicology in Vitro. 2008. Vol. 22. P. 164—170.
8. Минеев А. К. Неспецифические реакции у рыб из водоемов средней и нижней // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15, № 3—7. С. 2301—2318.
9. Гилева Т. А., Костицына Н. В. Характеристика периферической крови и содержания тяжёлых металлов в органах и тканях окуня водоёмов бассейна р. Камы // Теоретическая и прикладная экология. 2014. № 2. С. 45—50.
10. Верголяс М. Р., Веялкіна Н. М., Гончарук В. В. Вплив іонів міді на гематологічні та цитогенетичні показники прісноводних риб *Carassius auratus gibelio* // Цитология и генетика. 2010. № 2. С. 65—70.
11. Кузина Т.В. Анализ гематологических показателей судака Волго-Каспийского канала // Естественные науки. 2009. № 4 (29). С. 96—100.
12. Минеев А. К. Морфологический анализ и патологические изменения структуры клеток крови у рыб Саратовского водохранилища // Вопросы ихтиологии. 2007. № 1. С. 93—100.
13. Головина Н. А., Тромбицкий И. Д. Гематология прудовых рыб. Кишинев : Штиинца, 1989. 158 с.
14. Серпунин Г. Г. Гематологические показатели адаптаций рыб : дис. ... доктора биол. наук. Калининград, 2002. 482 с.

15. Sharon G., Zilberg D. Atlas of Fish Histology and Histopathology. Central and Northern Arava Research and Development Centers, 2012. 78 p.
16. Єсіпова Н. Б., Сурова Ю. О. Особливості морфоструктури еритроцитів молоді різних видів риб в умовах гіпоксії // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології. Херсон : Гринь Д. С., 2015. С. 71—74.
17. Еколого-гематологічна характеристика плітки звичайної (*Rutilus rutilus* Linnaeus, 1758) Запорізького водосховища / Шарамок Т.С. та ін. // Біологічний вісник МДПУ імені Богдана Хмельницького. 2016. № 6 (2). С. 303—310.
18. Иванова Н. Т. Атлас клеток крови рыб. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1983. 186 с.
19. Nikolov B., Boyadzieva-Doichinova D. Parameters of the red blood cell count in three species of carp fishes // Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2010. Vol. 16, № 3. P. 307—310.

REFERENCES

1. Arnaudov, A. D., Velcheva, I. G. & Tomova, E. S. (2008). Influence of copper on the erythrocyte-metric parameters of *Carassius gibelio* (Pisces, Cyprinidae) // *Bulgarian Journal of Agricultural Science*, 14 (6), 557-563.
2. Kondera, E. (2011). Wpływ kadmu i miedzi na aktywność krwiotwórczą nerki głowowej karpia. *Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych*, 48, 143-150.
3. Georgieva, E., Arnaudov, A., & Velcheva, I. (2010). Clinical, hematological and morphological studies on ex situ induced copper intoxication in crucian carp (*Carassius gibelio*). *Journal of Central European Agriculture*, 11, 2, 165-172.
4. Sharamok, T. S., & Yesipova, N. B. (2015). Vplyv antropohennykh faktoriv na hematolohichni pokaznyky ryb. *Naukovi zapysky Ternopil's'koho nats. ped. un-tu im. V. Hnatyuka*, 3-4 (64), 722-726.
5. Craig, P. M., Wood, C. M., & McClelland, G. B. (2007). Oxidative stress response and gene expression with acute copper exposure in zebrafish (*Danio rerio*). *American Journal of Physiology-Regulatory Integrative and Comparative Physiology*, 293, 1882-1892.
6. Nawaz, M., Manzl, C., & Krumschnabel, G. (2005). *In vitro* toxicity of copper, cadmium, and chromium to isolated hepatocytes from carp, *Cyprinus carpio* L. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*, 75, 652-661.
7. Tan, F. X., Wang, M., & Wang, W. M. et al. (2008). Comparative evaluation of the cytotoxicity sensitivity of six fish cell lines to four heavy metals *in vitro*. *Toxicology in Vitro*, 22, 164-170.
8. Mineev, A. K. (2013). Nespecificheskie reakcii u ryb iz vodoemov srednej i nizhnej. *Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk*, 3-7, 15, 2301-2318.
9. Gileva, T. A., & Kosticyna, N. V. (2014). Harakteristika perifericheskoy krovi i sodержaniya tjazholykh metallov v organah i tkanjah okunja vodojonomov bassejna r. Kamy. *Teoreticheskaja i prikladnaja ekologija*, 2, 45-50.
10. Verholiyas, M. R., Veyalkina, N. M., & Honcharuk, V. V. (2010). Vplyv ioniv midi na hematolohichni ta tsytohennychni pokaznyky prysnovodnykh ryb *Carassius auratus gibelio*. *Tsytolohyya y henetyka*, 2, 65-70.
11. Kuzina T.V. (2009). Analiz gematologicheskikh pokazatelej sudaka Volgo-Kaspijskogo kanala. *Estestvennye nauki. – Astrahan'*, 4 (29), 96-100.

12. Mineev, A. K. (2007). Morfologicheskij analiz i patologicheskie izmeneniya struktury kletok krovi u ryb Saratovskogo vodohranilishha. *Voprosy ihtologii*, 1, 93-100.
13. Golovina, N. A., & Trombickij, I. D. (1989). *Gematologija prudovyh ryb*. Kishinev: Shtiinca.
14. Serpunin, G. G. (2002). Gematologicheskie pokazateli adaptacij ryb. *Doctor's thesis*. Kaliningrad.
15. Sharon, G., & Zilberg, D. (2012). *Atlas of Fish Histology and Histopathology*. Central and Northern Arava Research and Development Centers.
16. Yesipova, N. B., & Surova, Yu. O. (2015). Osoblyvosti morfostruktury erytrocytiv molodi riznykh vydiv ryb v umovakh hipoksiyi. *Suchasni problemy teoretychnoy i praktychnoy ikhtiologii*. Herson: Hrin' D.S., 71-74.
17. Sharamok, T. S., Yesipova, N. B., & Fedonenko, O. V. et al. (2016). Ekoloho-hematologichna kharakterystyka plitky zvychnoyi (*Rutilus rutilus* Linnaeus 1758) Zaporiz'koho vodoshkovyshcha. *Biologichnyy visnyk MDPU imeni Bohdana Khmel'nyts'koho*, 6 (2), 303-310.
18. Ivanova, N. T. (1983). *Atlas kletok krovi ryb*. Moskva: Legkaja i pishhevaja promyshlenost'.
19. Nikolov, B., & Boyadzieva-Doichinova, D. (2010). Parameters of the red blood cell count in three species of carp fishes. *Bulgarian Journal of Agricultural Science*, 16 (3), 307-310.

**ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЦИТОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КЛЕТОК КРАСНОЙ КРОВИ ДВУХЛЕТОВ КАРАСЯ СЕРЕБРЯНОГО
(*CARASSIUS AURATUS GIBELIO* (BLOCH, 1782))
В УСЛОВИЯХ ИНТОКСИКАЦИИ ИОНАМИ МЕДИ**

Т. С. Шарамок, sharamok@i.ua, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр

Н. Б. Есипова, yesipova.natalia@gmail.com, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр

Н. Л. Колесник, kolenataleo@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

Цель. Выявить влияние повышенных концентраций ионов меди (10 рыбохозяйственных ПДК) на морфологические и цитометрические показатели эритроцитов двухлеток карася серебряного (*Carassius gibelio* Bloch, 1782) в экспериментальных и естественных условиях.

Методика. В ходе работы использовались обобщенные результаты исследований, проводившихся в течение 2015–2016 гг. Определяли морфологические и цитометрические показатели эритроцитов карася серебряного в условиях естественного обитания (Запорожское водохранилище) и эксперимента. Концентрация ионов меди в эксперименте и в естественных условиях была одинаковой и составляла 0,01 мг/л (10 рыбохозяйственных ПДК). Экспериментальные исследования проводились в течение 21 суток. В контрольном аквариуме рыбы содержались в отстаивавшейся водопроводной воде, в экспериментальных аквариумах интоксикацию рыб ионами меди моделировали внесением в воду CuSO_4 . Мазки крови исследовали при увеличении объектива 40 $\times$ и 100 $\times$ с использованием микрофото съемки цифровой камерой «Scienclab T500 5.17 М».

Результаты. Проведенные гематологические исследования показали, что у двухлеток карася серебряного в условиях экспериментальной хронической интоксикации ионами меди

(0,01 мг/л) происходит увеличение доли незрелых форм эритроцитов, повышается количество эритроцитов с патологическими явлениями (разрушение клеточной оболочки, атипичность формы), возрастает ядерно-цитоплазматическое соотношение, но различия в цитометрических показателях эритроцитов между экспериментальными и контрольными рыбами не были достоверными. При сравнении морфометрических показателей эритроцитов карася, содержащегося в экспериментальных и естественных условиях при аналогичной концентрации ионов меди (0,01 мг/л), установлено достоверное увеличение площадей ядер зрелых эритроцитов и, соответственно, возрастание ядерно-цитоплазматического соотношения эритроцитов (почти на 30%) у рыб в экспериментальных условиях по сравнению с рыбами, которые обитали в Запорожском водохранилище. Увеличение данных показателей косвенно свидетельствует об угнетении функциональной активности эритроцитов.

Научная новизна. Впервые представлен анализ влияния ионов меди в концентрации 0,01 мг/л (10 рыбохозяйственных ПДК) на цитометрические показатели эритроцитов двухлеток карася серебряного при содержании в условиях эксперимента и естественного обитания.

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы для выявления адаптационных реакций в организме рыб в условиях воздействия тяжелых металлов, а также в гидроэкологическом мониторинге для выявления опасного для гидробионтов уровня загрязнения тяжелыми металлами водных экосистем.

Ключевые слова: карась серебряный, медь, эритроциты, патоморфологические и цитометрические показатели, Запорожское водохранилище, эксперимент.

PATHOMORPHOLOGICAL AND CYTOMETRIC PARAMETERS OF BLOOD RED CELLS OF AGE-2 PRUSSIAN CARP (*CARASSIUS AURATUS GIBELIO* (BLOCH, 1782)) IN THE CONDITIONS OF INTOXICATION WITH COPPER IONS

T. Sharamok, sharamok@i.ua, Dnipro National University named after Oles Honchar, Dnipro

N. Yesipova, yesipova.natalia@gmail.com, Dnipro National University named after Oles Honchar, Dnipro

N. Kolesnyk, kolenataleo@gmail.com, Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv

Purpose. To detect the effect of elevated copper ion concentrations (10 aquaculture Maximum Permissible Limits) on morphological and cytometric parameters of erythrocytes of age-2 Prussian carp (*Carassius gibelio* Bloch, 1782) in experimental and natural conditions.

Methodology. During the work, summarized results of studies performed in 2015-2016 were used. Morphological and cytometric parameters of Prussian carp erythrocytes were determined in the conditions of natural habitats (Zaporizhzhia reservoir) and an experiment. Copper ion concentration both in the experiment and natural conditions was similar and was 0.01 mg/L (10 aquaculture Maximum Permissible Limits). Experimental studies were performed during 21 days. In the control aquarium, fish were kept in the settled tap water; while in the experimental aquaria, intoxication of fish with copper ions was modelled by introducing CuSO_4 in water. Blood smears were examined under 40x and 100 x magnifications with the use of microphotography (digital camera Sciencelab T500 5.17 M).

Findings. The performed hematological studies showed that under the conditions of experimental chronic intoxication with copper ions (0.01 mg/L), age-2 Prussian carp had an increase in the share of immature forms of erythrocytes, increase in the number of erythrocytes with pathological signs (cell wall destruction, atypical forms), increase in the nucleus-cytoplasm ration, but

the difference in cytometric parameters of erythrocytes between experimental and control fish was not significant. When comparing the morphometric parameters of erythrocytes of fish kept in experimental and natural conditions with similar copper ion concentrations (0.01 mg/L), a significant increase in the nucleus areas of mature erythrocytes was detected and, correspondingly, an increase in the nucleus-cytoplasm ratio of erythrocytes (by almost 30%) in fish in experimental conditions compared to fish, which lived in the Zaporizhzhia reservoir. An increase in these parameters indirectly indicate on the inhibition of erythrocyte functional activity.

Originality. *For the first time, an analysis of the effect of copper ions at a concentration of 0.01 mg/L (10 aquaculture Maximum Permissible Limits) on cytometric parameters of Prussian carp erythrocytes in experimental and natural conditions was presented.*

Practical value. *The obtained results can be used for detecting adaptation reactions in fish organisms under the conditions of the effect of heavy metals as well as for hydroecological monitoring for detecting the levels of heavy metal pollution in aquatic ecosystems dangerous for hydrobionts.*

Key word: *Prussian carp, copper, erythrocytes, pathomorphological and cytometric parameters, Zaporizhzhia reservoir, experiment.*

ФУНДАТОР РИБОГОСПОДАРСЬКОЇ НАУКИ КУЗЬОМА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Як швидко плине час. Відходять в історію роки і століття, залишаючи після себе славні імена і події. Та пам'ять міцно тримає найяскравіші, найвидатніші з них. В цьому великому сузір'ї справ і особистостей, що втілили в себе риси дивовижної епохи, є багато зірок першої величини — видатних людей, фундаторів науки. Їх іменам присвячуємо цей розділ.

29 серпня 2017 року виповнилося 115 років від дня народження Олександра Івановича Кузьоми.

Вшановуючи пам'ять видатного фундатора рибогосподарської науки, згадаймо його на сторінках нашого видання.

Перші наукові роботи з генетики і селекції ставових риб у колишньому Радянському Союзі відносяться до 30-х років XX сторіччя. Саме в 30-ті роки минулого сторіччя в Україні за прямої участі та безпосереднього керівництва О. І. Кузьоми почалася селекційна робота з коропом.

Видатний рибовод-селекціонер України О. І. Кузьома народився 29 серпня 1902 р. в м. Ромни Сумської області.

У 1929 р. закінчив Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут, набувши кваліфікацію організатора-зоотехніка.

З 1927 по 1930 рр. працював лаборантом, а потім завідувачем виробничої лабораторії Антонівського рибгоспу Хмельницької області, з 1930 по 1937 рр. — завідувачем Антонівського науково-дослідного пункту Інституту рибного господарства.

У період з 1937 по 1941 рр. працював за сумісництвом на посадах завідувача відділу ставового господарства та сектору генетики і селекції риб Українського науково-дослідного інституту рибного господарства (м. Київ), а також заступника директора з наукової частини Васильківської рибницької селекційної станції. У період Великої Вітчизняної війни брав участь у боях з німецькими загарбниками. Після демобілізації — з 1946 р. повернувся до роботи в Інституті, де і працював до кінця життя, спочатку завідувачем відділу ставового господарства, а потім завідувачем відділу генетики та селекції риб.

Свій творчий шлях Олександр Іванович Кузьома цілком і повністю пов'язав з генетикою та селекцією риб. У 1948 р. йому було присвоєне вчене звання

старшого наукового співробітника за кваліфікацією «генетика і селекція риб». Він брав активну участь у післявоєнному відновленні та створенні нових стад коропа, розробляв теоретичні основи його порідного покращення, а також — генетичні аспекти успадкування лускатого покриву та гіногенетичного механізму розмноження риб; розробив методи племінної і селекційної роботи з коропом (метод масового і гніздового відбору, перевірка плідників коропа за якістю нащадків, лінійне розведення коропа).

Копіткі, наполегливі пошуки селекціонера увінчалися виведенням двох порід коропа — української рамчастої та української лускатої — перших порід коропа в колишньому Радянському Союзі.

З метою розширення можливостей рибництва та підвищення продуктивності водойм О. І. Кузьома значну увагу приділяв гібридизації ставових риб на міжвидовому та міжродовому рівнях. Поєднуючи біологічні особливості коропа і карася, вченому вдалося одержати плодючі коропо-карасеві та карасеві гібриди. Державний Комітет у справах винаходів та відкриттів СРСР визнав цей результат винаходом і захистив його авторським свідоцтвом.

О. І. Кузьома настійливо удосконалював продуктивні ознаки та розширював гетерогенну структуру українських порід коропа, він розробив нову оригінальну систему структуризації українських порід коропа, яка включає ряд зональних (екологічних) та внутрішньопорідних типів. За його керівництва та безпосередньої участі створено антонінсько-зозуленецькі та несвицькі зональні типи коропа. Крім того, розроблені основи і розпочаті роботи щодо створення нивківського та любінських внутрішньопорідних типів, які були продовжені і завершені їх апробацією науковцями-селекціонерами Інституту рибного господарства, результати якої були затверджені відповідними наказами Міністерства аграрної політики України як нові селекційні досягнення. Створення внутрішньопорідних типів, диференційованих за спадковими задатками та рівнем гетерогенності,

відкрило можливість періодичного та планового «освіження крові» племінних стад, не вдаючись до інших методів їх порідного поліпшення, в тому числі з використанням зарубіжних порід. Ця обставина дозволила не лише отримати порідне зрушення, але й значно удосконалити його.

Українські породи здобули загальне визнання — вони використовуються для покращання і створення нових порід, порідних груп, племінних стад, набули широкого впровадження як в Україні, так і в близькому та далекому зарубіжжі.

О. І. Кузьома був членом республіканської комісії з племінної справи, а також іхтіологічної комісії при Міністерстві рибного господарства СРСР.

Діяльність О. І. Кузьоми відзначена державними нагородами, зокрема медалями і орденом «Знак пошани».

Олександр Іванович був чуйною, турботливою людиною, особливо піклувався за свій колектив. Кожного визначного свята він збирав всіх співробітників відділу селекції риб у себе вдома; дружина його, Любов Макарівна, готувала частування, і ми всім колективом, по-родинному, відзначали свято.

Він також наполегливо відстоював інтереси співробітників відділу селекції риб у зверненнях до керівництва Інституту рибного господарства. Нас, селекціонерів, співробітників Інституту і виробничників напівжартома називали «кузьомівці». (Один з авторів цих рядків працював співробітником відділу селекції риб з 1965 по 1994 рр. та з 2011 по 2015 рр., постійно займаючись селекційно-племінною справою в коропівництві і донині).

О. І. Кузьома щедро ділився своїми знаннями з виробничниками, а також з молодими спеціалістами в галузі селекції риб. Ним створена школа селекціонерів-рибоводів, які успішно працюють в Інституті та його регіональних підрозділах. За його наукового керівництва троє фахівців успішно захистили кандидатські дисертації.

Помер О. І. Кузьома 3 березня 1971 року. Похований у м. Києві на Берківцевському кладовищі.

І. І. Грициняк, директор Інституту рибного господарства НААН,
докт. с.-г. наук, професор, академік НААН

О. О. Олексієнко, канд. с.-г. наук, с.н.с

ОГОЛОШЕННЯ

В Інституті рибного господарства НААН працює **ПЛР — лабораторія, спрямована на діагностику інфекційних захворювань риб**. На сьогодні в арсеналі лабораторії є діагностикими для вірусних, бактеріальних та паразитарних захворювань, які за даними Міжнародного Епізоотичного Бюро (OIE) є найбільш небезпечними для об'єктів сучасної аквакультури. При розробленні діагностичних тест-систем зверталась увага на тенденції розвитку вітчизняного рибництва та інфекційні агенти, які циркулюють в Україні або можуть проникнути у вітчизняні рибогосподарські підприємства із сусідніх країн.

Ми пропонуємо молекулярну діагностику вірусних захворювань коропових, лососевих, осетрових та інших видів риб.

Лососеві: вірус інфекційного панкреатичного некрозу IPNV; вірусна геморагічна септицемія VHSV; вірус інфекційного гемопоетичного некрозу IHNV.

Коропові: вірус весняної віремії SVCV; герпесвірус CyHV, герпесвірусної KHV.

Осетрові: герпесвірус AcHV; іридовірус AcIV; аденовірус AcAdV.

Іctalурові: герпесвірус каналного сома CCV.

Для бактеріальних хвороб риб підібрані тест-системи для діагностики фурункульозу форелі (*Aeromonas salmonicida*), геморагічної септицемії (*Aeromonas hydrophila*), хвороби нирок лососевих (BKD) (*Renibacterium salmoninarum*), ентеричної хвороби «червоного рота» (*Yersinia ruckeri*), флавобактеріозу (*Flavobacterium columnare* і *Flavobacterium psychrophila* (BCWD) та септицемії сома (*Edwardsiella ictaluri*).

Присутні також тест-системи ідентифікації ендопаразитів *Tetracapsuloides bryosalmonae* (проліферативна хвороба нирок) та *Myxobolus cerebralis*, що інфікують райдужну форель.

Для отримання додаткової інформації можна звертатися за адресою:

Інститут рибного господарства НААН, вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164. Лабораторія біотехнологій у рибництві.

Завідувач лабораторії: к.б.н., с.н.с. Рудь Юрій Петрович

Тел. (097) 953-80-80 або e-mail: rud@if.org.ua.

FISHERIES SCIENCE OF UKRAINE

"Fisheries Science of Ukraine" — a scientific journal, has been published in Ukraine since 2007. "Fisheries Science of Ukraine" included in the List of Specialized Publications of Ukraine, which can be used for publishing results of doctor's and candidate's thesis (biological and agricultural sciences), was approved in 08.07.2009, recertification of 06.11.2014 (Ministry of Education and Science of Ukraine №1279)

Founder and publisher of the journal — Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

State registration certificate KB № 20934-10734 PR of 18.08.2014

EDITOR-IN-CHIEF

Ihor Hrytsyniak, Doctor of Sciences, Professor, Academician of the NAAS of Ukraine, Director, Institute of Fisheries of the NAAS

DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF

Oleksandr Tretiak, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Deputy Director in scientific works, Institute of Fisheries of the NAAS

Natalia Kolesnyk, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of International Scientific and Technical Cooperation and Intellectual Property, Institute of Fisheries of the NAAS

EDITORIAL BOARD

BIOLOGICAL SCIENCES

Boris Gomelsky, Doctor of Biological Sciences, Professor, Kentucky State University, UNITED STATES OF AMERICA

Daniel Patrick, Doctor of Biological Sciences, Head of Biology Department Laboratories of the Pyrenees and Landes, FRENCH REPUBLIC

Gautam V. Zodape, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Zoology of Shivaji University Kolhapur, REPUBLIC OF INDIA

Vasyl Sondak, Doctor of Sciences, Head of "Water Bioresources", National University of Water Management and Natural Resources, UKRAINE

Oleksandr Litvinenko, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director General, Federal State Unitary Enterprise "Gosrybtsentr", RUSSIA

Oleksandr Potrokhov, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Biology of reproduction of fish, Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, UKRAINE

Leonid Buchatskyi, Doctor of Sciences, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Leading Research Scientist of the Laboratory of Biotechnologies in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Ihor Buzevych, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Valentyna Solomatina, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Leading research scientist of the department of feeds and fish feeding, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

AGRICULTURAL SCIENCES

XU Pao, Doctor, Professor, Director of Freshwater Fisheries Research Center, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Jedrzej Krupinski, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director, National Research Institute of Animal Production, POLAND

Mykhailo Efymenko, Doctor of Sciences, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head Research Scientist, Institute of Animal Breeding and Genetics of the NAAS, UKRAINE

Serhiy Tarasiuk, Doctor of Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head of the Molecular-Genetic Research Department, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Ryszard Kolman, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Ichthyology Department, The Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute in Olsztyn, POLAND

Vitaliy Bekh, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Fish Selection, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Isaak Sherman, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Aquaculture Department, Kherson State Agrarian University, UKRAINE

Oleksandr Kostenko, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Veterinary Medicine and Zootechnics Department, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, UKRAINE

SCIENTIFIC EDITORS OF SECTIONS

are staff employees of the Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine: **Natalia Tushnytska**, PhD, Senior Research Scientist, Scientific Secretary of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Deren**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Feeds and Fish Feeding of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yaroslav Tuchapskyi**, PhD, Head of the Carp Breeding Laboratory of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Zaloilo**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Molecular-Genetic Studies of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Zabytivskyi**, PhD, Senior Research Scientist of Section of Sturgeon of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Anatoliy Melnyk**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Ecological Investigation of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Antonina Mruk**, Head of the Laboratory Salmonids Culture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Tetiana Hryhorenko**, PhD, Head of the Laboratory of Hydrobiology and Technology of Invertebrates Cultivation of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Rud'**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Bio-technology in Aquaculture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Natalia Matvienko**, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Ichthyopathology of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Oleksandr Didenko**, PhD, Senior Research Scientist of the Department of Study Reservoirs Bioresources of the Institute of Fisheries of the NAAS.

Editorial board of the Journal "Fisheries Science of Ukraine", Institute of Fisheries NAAS, 135, Obukhivska St, Kiev-164, Ukraine, 03164; tel/fax: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, fsu.journal@gmail.com

Layout design: Natalia Kolesnik, Serhiy Shinkar, Oleksandr Bezusyi; **Making-up:** Yevheniy Arkhanhelskyi; **Literature editing:** Oleksandr Oleksiienko, Tetiana Shvets; **Correctors:** Maria Simon, Hanna Kovalchuk

ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НААН
вул. Обухівська, 135 м. Київ-164, 03164, Україна
тел./факс: +38(044) 423-74-62, тел.: +38(044) 423-74-65

<http://fsu.ua>

info@fsu.ua