ISSN 2312-9581 (Online)

ISSN 2075-1508 (Print)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

4 / 2017

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські науки), переатестація від 06.11.2014 (наказ Міністерства освіти і науки України №1279)

Засновник та видавник — Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20934-10734 ПР від 18.08.2014

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ГРИЦІНЯК Ігор Іванович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, директор Інституту рибного господарства НААН

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ТРЕТЯК Олександр Михайлович, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН

КОЛЕСНИК Наталія Леонідівна, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності, Інститут рибного господарства НААН

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Гомельський Борис, доктор біол. наук, професор, Державний Університет Кентуккі, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Патрік Даніель, доктор біол. наук, Голова департаменту біології Лабораторії Піренеїв, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА

Зодапе Гаутам В., доктор біол. наук, професор, декан факультету зоології Державного Університету Шиваджи в Колхатурі, РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ

Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, зав. кафедрою водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА

Литвиненко Олександр Іванович, доктор біол. наук, генеральний директор, Федеральне державне унітарне підприємство «Госрыбцентр», РОСІЯ

Потрохов Олександр Спиридонович, доктор біол. наук, с.н.с., керівник лабораторії біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, УКРАЇНА

Бучацький Леонід Петрович, доктор біол. наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), провідний науковий співробітник лабораторії біотехнологій в рибистві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Бұзевіч Ігор Юрійович, доктор біол. наук, с.н.с., завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Соломатіна Валентина Дмитрівна, доктор біол. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник відділу кормів та годівлі риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Ху Пао, доктор наук, професор, директор Центру прісноводного рибного господарства, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

Крупінський Єджей, доктор наук, професор, іноземний член Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут зоотехнії Польщі, ПОЛЬЩА

Єфіменко Михайло Якович, доктор с.-г. наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник, Інститут розведення і генетики тварин НААН, УКРАЇНА

Тарасюк Сергій Іванович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, зав. відділу молекулярно-генетичних досліджень, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Кольман Ришард, доктор наук, професор, зав. відділу іхтіології, Інститут прісноводного рибного господарства ім. Станіслава Саковича, ПОЛЬЩА

Бех Віталій Валерійович, доктор с.-г. наук, професор, зав. відділу селекції риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Шерман Ісаак Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедри рибиства, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

Костенко Олександр Іванович, канд. с.-г. наук, с.н.с., нач. відділу ветеринарної медицини та зоотехнії, Національна академія аграрних наук України, УКРАЇНА

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

є штатними працівниками Інституту рибного господарства НААН України: **Тушницька Наталія Йосифівна**, канд. ветерин. наук, с.н.с., вчений секретар ІРГ НААН; **Дерень Ольга Володимирівна**, канд. с.-г. наук, с.н.с., зав. лабораторії кормів і годівлі риб ІРГ НААН; **Тучапський Ярослав Васильович**, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу селекції риб ІРГ НААН; **Залоїло Ольга Василівна**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ІРГ НААН; **Забитівський Юрій Михайлович**, канд. біол. наук, старший науковий співробітник сектору осетрівництва ІРГ НААН; **Мельник Анатолій Пилипович**, канд. хім. наук, с.н.с., зав. лабораторії екологічних досліджень ІРГ НААН; **Мрук Антоніна Іванівна**, зав. лабораторії лососівництва ІРГ НААН; **Григоренко Тетяна Володимирівна**, канд. с.-г. наук, зав. лабораторії гідробіології та технологій культивування цінних безхребетних ІРГ НААН; **Рудь Юрій Петрович**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії біотехнологій в рибистві ІРГ НААН; **Матвієнко Наталія Миколаївна**, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу іхтіопатології ІРГ НААН; **Діденко Олександр Володимирович**, канд. біол. наук, с.н.с., старший науковий співробітник відділу вивчення біоресурсів водосховищ.

Редакція журналу «Рибогосподарська наука України», вул. Обухівська, 135, м. Київ-164, 03164

тел./факс: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, fsu.journal@gmail.com

Підписано до друку 08.09.2017 р. Формат 70х108/16. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 7,1. Наклад 500 прим.

Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту рибного господарства НААН (Протокол №8 від 12 грудня 2017 р.)

Дизайн макету: Колесник Н. Л., Шинкар С. В., Безусий О. Л. **Верстка:** Архангельський Є. Ю. **Літературне**

редагування: Олексієнко О. О., Швец Т. М. **Коректори:** Симон М. Ю., Ковальчук Г. В.

Друкарня ТОВ «Наш Формат», пр-т Миру, 7, м. Київ, 02105, тел.: +38 (044) 353-85-58

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

4/2017(42)

Заснований у 2007 р.
Виходить 4 рази на рік

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 1-148
DOI: 10.15407/fsu2017.04

З М І С Т

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 7-18
DOI: 10.15407/fsu2017.04.007

Ю. А. Глебова, О. В. Шкарупа

Розвиток реформ у рибній галузі України 7

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 19-32
DOI: 10.15407/fsu2017.04.019

В. О. Яковенко, О. В. Федоненко, Н. Й. Тушиницька

Оцінка стану зоопланктону і зообентосу річки Мокра Сура 19

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 33-41
DOI: 10.15407/fsu2017.04.033

Е. О. Аристархова

Оцінювання токсичності забруднених амоніаком вод на *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) методом «Time sampling» 33

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 42-52
DOI: 10.15407/fsu2017.04.042

О. В. Федоненко, О. М. Маренков, О. О. Петровський, О. С. Нестеренко, М. Ю. Симон

Біологічні основи зарибнення Запорізького (Дніпровського) водосховища 42

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 53-64
DOI: 10.15407/fsu2017.04.053

К. М. Гейна, С. С. Шашликова

Промислово-біологічна характеристика тюльки (*Clupeonella cultriventris* Nordmann, 1840) Дніпровсько-Бузької гирлової системи 53

© Інститут рибного господарства НААН України, 2017

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 65-74

DOI: 10.15407/fsu2017.04.065

*Х. М. Курта, О. О. Малишева, В. Г. Спиридонов*Розроблення мультиплексної ПЛР для генетичного аналізу популяцій
вєслоноса (*Polyodon spathula* Walbaum, 1792) ..... 65**ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ**

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 75-84

DOI: 10.15407/fsu2017.04.075

*Т. С. Шарамок, В. О. Курченко, Н. Л. Колесник*Гісто-морфометрична структура гепатопанкреасу деяких корокових
риб (*Cyprinidae* Rafinesque, 1810) Запорізького водосховища 75

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 85-98

DOI: 10.15407/fsu2017.04.085

*Н. Б. Єсінова, Г. В. Шварц, Я. В. Тучапський*Морфогістологічна оцінка цьоголіток канального сома (*Ictalurus punctatus*
Raf., 1818), утримуваних в умовах екстремальної зимівлі 85

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 99-111

DOI: 10.15407/fsu2017.04.099

*В. М. Марценюк, О. С. Потрохов, О. Г. Зінковський, М. В. Причєпа*Фізіолого-біохімічний статус окуня річкового (*Perca fluviatilis*
Linnaeus, 1758) та плітки звичайної (*Rutilus rutilus* Linnaeus, 1758) в
умовах надмірного антропогенного навантаження на водойму 99

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 112-120

DOI: 10.15407/fsu2017.04.112

*Л. Л. Галоян, И. И. Грициняк, Л. П. Драган*Вплив згодовування комбікорму «Aller Aqua» на вміст вільних
амінокислот у м'язах і печінці струмкової (*Salmo trutta* Linnaeus, 1758) та
райдувної (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum, 1792) форелей ..... 112**СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО**

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 121-127

DOI: 10.15407/fsu2017.04.121

*С. В. Юрчак*Стан системи імунного захисту плідників коропа (*Cyprinus carpio*
Linnaeus, 1758) за різного рівня вітаміну Е та селену в їх раціоні ..... 121**КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ**

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 128-146

DOI: 10.15407/fsu2017.04.128

*І. Й. Грициняк, Т. М. Швець*Африканський (кларієвий) сом (*Clarias gariepinus* Burchell, 1822).
Тематична бібліографія 128

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 7-18

DOI: 10.15407/fsu2017.04.007

Ю. А. Глебова, О. В. Шкарупа

Развитие реформ в рыбной отрасли Украины 7

БИОРЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ ВОДОЕМОВ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 19-32

DOI: 10.15407/fsu2017.04.019

В. А. Яковенко, Е. В. Федоненко, Н. И. Тушницкая

Оценка состояния зоопланктона и зообентоса реки Мокрая Сура 19

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 33-41

DOI: 10.15407/fsu2017.04.033

Э. А. Аристархова

Оценка токсичности загрязненных аммиаком вод для *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) методом «time sampling» 33

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 42-52

DOI: 10.15407/fsu2017.04.042

Е. В. Федоненко, О. Н. Маренков, А. А. Петровский, О. С. Нестеренко,

М. Ю. Симон

Биологические основы зарыбления Запорожского (Днепровского) водохранилища 42

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 53-64

DOI: 10.15407/fsu2017.04.053

К. Н. Гейна, С. С. Шапилькова

Промыслово-биологическая характеристика тюльки (*Clupeonella cultriventris* Nordmann, 1840) Днепровско-Бугской устьевой системы 53

СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 65-74

DOI: 10.15407/fsu2017.04.065

Х. М. Курта, О. А. Малышева, В. Г. Спиридонов

Разработка мультиплексной ПЦР для генетического анализа популяций веслоноса (*Polyodon spathula* Walbaum, 1792) 65

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 75-84

DOI: 10.15407/fsu2017.04.075

Т. С. Шарамок, В. А. Курченко, Н. Л. Колесник

Гисто-морфометрическая структура гепатопанкреаса некоторых карповых рыб (*Cyprinidae* Rafinesque, 1810) Запорожского водохранилища 75

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 85-98

DOI: 10.15407/fsu2017.04.085

Н. Б. Есипова, А. В. Шварц, Я. В. Тучапский

Морфогистологическая оценка сеголетков канального сома (*Ictalurus punctatus* Raf., 1818) содержащихся в условиях экстремальной зимовки 85

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 99-111 DOI: 10.15407/fsu2017.04.099	
Марценюк В. Н., Потрохов А. С., Зиньковський О. Г., Причена Н. В. Физиолого-биохимический статус окуня речного (<i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758) и плотвы обыкновенной (<i>Rutilus rutilus</i> Linnaeus, 1758) в условиях чрезмерной антропогенной нагрузки на водоем.....	99
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 112-120 DOI: 10.15407/fsu2017.04.112	
Л. Л. Галоян, И. И. Грициняк, Л. П. Драган Влияние скармливания комбикорма «Aller Aqua» на содержание свободных аминокислот в мышцах и печени ручьевой (<i>Salmo trutta</i> Linnaeus, 1758) и радужной (<i>Oncorhynchus mykiss</i> Walbaum, 1792) форелей.....	112
СТРАНИЦА МОЛОДОГО УЧЕНОГО	
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 121-127 DOI: 10.15407/fsu2017.04.121	
С. В. Юрчак Состояние иммунной системы производителей карпа (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758) при различном уровне витамина Е и селена в рационе	121
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 128-146 DOI: 10.15407/fsu2017.04.128	
Ир. И. Грициняк, Т. М. Швець Африканский (клариевый) сом (<i>Clarias gariepinus</i> Burchell, 1822). Тематическая библиография.....	128

CONTENTS

ACTUAL PROBLEMS AND PROSPECTS

- Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 7-18
DOI: 10.15407/fsu2017.04.007
Yu. Glebova, O. Shkarupa
Reformational direction of fish industry development in Ukraine..... 7

BIORESOURCES AND ECOLOGY OF WATER BODIES

- Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 19-32
DOI: 10.15407/fsu2017.04.019
V. Yakovenko, O. Fedonenko, N. Tushnytska
Zooplankton and zoobenthos of the Mokra Sura river..... 19
- Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 33-41
DOI: 10.15407/fsu2017.04.033
E. Arystarkhova
Evaluation of the toxicity of ammonia polluted waters for *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) by the «time sampling» method..... 33
- Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 42-52
DOI: 10.15407/fsu2017.04.042
O. Fedonenko, O. Marenkov, A. Petrovsky, O. Nesterenko, M. Simon
Biological fundamentals of stocking the Zaporizhzhia (Dnipro) reservoir with fish..... 42
- Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 53-64
DOI: 10.15407/fsu2017.04.053
K. Geina, S. Shashlykova
Commercial-biological characteristics of tulka (*Clupeonella cultriventris* Nordmann, 1840) of the Dnieper-Bug estuary system..... 53

SELECTION, GENETICS AND BIOTECHNOLOGY

- Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 65-74
DOI: 10.15407/fsu2017.04.065
K. Kurta, O. Malysheva, V. Spyrydonov
Development of a multiplex PCR for the genetic analysis of paddlefish (*Polyodon spathula* Walbaum, 1792) populations..... 65

PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

- Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 75-84
DOI: 10.15407/fsu2017.04.075
T. Sharamok, V. Kurchenko, N. Kolesnyk
Histological-morphometric structure of the liver of some cyprinids (*Cyprinidae* Rafinesque, 1810) from the Zaporizhzhia reservoir 75
- Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 85-98
DOI: 10.15407/fsu2017.04.085
N. Yesipova, G. Schwartz, Y. Tuchapsky
Morpho-histological evaluation of young-of-the-year channel catfish (*Ictalurus punctatus* Raf., 1818) in extremely wintering conditions..... 85

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 99-111 DOI: 10.15407/fsu2017.04.099 <i>V. Martseniuk, A. Potrokhov, O. Zinkovskyi, M. Prichepa</i> Physiological-biochemical status of perch (<i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758) and roach in conditions (<i>Rutilus rutilus</i> Linnaeus, 1758) of excessive anthropogenic pressure on the body of water	99

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 112-120 DOI: 10.15407/fsu2017.04.112 <i>L. Galoyan, I. Hrytsyniak, L. Dragan</i> The effect of the combined feed "Aller Aqua" on the content of free amino acids in the muscles and liver of brown (<i>Salmo trutta</i> Linnaeus, 1758) and rainbow (<i>Oncorhynchus mykiss</i> Walbaum, 1792) trout	112

YOUNG SCIENTIST PAGE

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 121-127 DOI: 10.15407/fsu2017.04.121 <i>S. Yurchak</i> State of the immune protection system of brood carp (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758) based on vitamin E and selenium levels in their diet	121

CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 128-146 DOI: 10.15407/fsu2017.04.128 <i>Ir. Hrytsyniak, T. Shvets</i> African catfish (<i>Clarias gariepinus</i> Burchell, 1822). Thematic bibliography	128

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 7-18

DOI: 10.15407/fsu2017.04.007

УДК 639.3(477)

РОЗВИТОК РЕФОРМ У РИБНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Ю. А. Глебова, [ya_glebova@ukr.net](mailto:glebova@ukr.net), Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

О. В. Шкарупа, knorush@ukr.net, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Мета. Промисел водних біоресурсів в Україні в останні роки був на низькому рівні. З метою забезпечення населення України високоякісною рибною продукцією, завданням працівників рибного господарства країни є створення належних умов для збільшення обсягів вилову риби та поліпшення організації праці й матеріального забезпечення в господарствах. Мета роботи полягає у визначенні напрямів реформування в рибній галузі, які забезпечують прогрес у ній і спрямовані на залучення інвестицій в аквакультуру; реорганізації органів рибоохорони з якісною зміною принципів їхньої роботи; формування культури соціально відповідального рибалки; досягнення прозорості та відкритості в роботі Держрибагентства України та підвищення ефективності функціонування державних установ.

Методика. Основою дослідження є наукові, статистичні та звітні дані рибної галузі України. Використано методи моніторингу та ретроспективного аналізу останніх досліджень та публікацій.

Результати. Наведено інформаційні дані щодо проведення реформ в рибогосподарській галузі України, зокрема зміни територіальних органів, апарату Держрибагентства України, режимів рибальства, використання водних біоресурсів, нормативно-правової бази, посилення, міжнародної діяльності та використання досвіду іноземних країн, збільшення фінансування, запровадження інвестування іноземними країнами та використання їхнього досвіду, що сприяє нарощуванню потужностей рибної галузі.

Наукова новизна полягає в аналітичному моніторингу зміни підходів до організації діяльності рибницьких формувань, що відзначаються істотними технологічними, економічними, організаційними, нормативно-правовими особливостями, які необхідно враховувати в господарських процесах.

Практичне значення. Матеріали статті можуть бути використані науковцями й працівниками рибної галузі.

Ключові слова: рибна галузь, реформування, нормативно-правове поле, закони, постанови, органи Держрибагентства України, рибоохорона, рибоохоронний патруль, міжнародний досвід, інвестиції.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

З метою забезпечення населення України високоякісною рибною продукцією завданням працівників рибного господарства країни є створення належних умов для збільшення обсягів вирощування риби та поліпшення організації праці й матеріального забезпечення в господарствах.

© Ю. А. Глебова, О. В. Шкарупа, 2017

Однак, протягом останнього десятиріччя виробництво товарної риби є низьким з негативною тенденцією. Зокрема, у внутрішніх водоймах країни у 2007р. воно складало 42364, у 2011 р. – 37032, у 2015 р. – 38507 т. Як свідчить аналіз очікуваних позитивних зрушень, передбачених Законом України «Про загальнодержавну програму розвитку рибної галузі України до 2016 року», не відбулося. Відтак, зумовлюється необхідність зміни підходів до організації діяльності рибницьких формувань та їх внутрішньогосподарських структурних одиниць, діяльність яких відзначається технологічними, економічними, організаційними особливостями, які необхідно враховувати в ході господарського управління [1–5].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРИШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

В сучасних умовах набуло актуальності питання реформування рибного господарства України. Метою роботи є визначення напрямів реформування в рибній галузі, які забезпечують прогрес у ній і будуть спрямовані на залучення інвестицій в аквакультуру, створення органів рибоохорони з якісною зміною принципів їхньої роботи, формування культури соціально відповідального рибалки, досягнення прозорості та відкритості в роботі Держрибагенства України, а також на підвищення ефективності функціонування державних установ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Основою дослідження є наукові, статистичні та звітні дані в рибній галузі України. Використано методи моніторингу та ретроспективного аналізу новітніх досліджень та публікацій останнього десятиріччя.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЇХ АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ

З використанням Програми діяльності Уряду в проведенні реформ, Держрибагенством було розроблено Концепцію реформування рибного господарства України. Вона спрямовувалася на залучення інвестицій в аквакультуру, створення органів рибоохорони із якісною зміною принципів їхньої роботи, формування культури соціально відповідального рибалки, досягнення прозорості та відкритості в роботі Держрибагенства, а також на підвищення ефективності функціонування державних установ.

Результатом реалізації Концепції було проведення змін у нормативно-правовому полі, структурі та в умовах забезпечення рибної галузі [1–16].

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. № 894 «Питання функціонування територіальних органів Державного агентства рибного господарства», триває процедура ліквідації територіальних органів як юридичних осіб публічного права та утворення територіальних органів як структурних підрозділів апарату Держрибагенства. Нині в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано 14 територіальних управлінь Державного агентства рибного господарства в регіонах.

16 червня 2016 р. на Київщині було запущено перший рибоохоронний

патруль. Набір на посади до нових територіальних органів Держрибагентства України проводили за конкурсним принципом. За результатами конкурсів, у відповідності до встановленого законодавством порядку, станом на 01 січня 2017 р. призначено 127 інспекторів рибоохорони:

Київський рибоохоронний патруль — 52 осіб;

Миколаївський рибоохоронний патруль — 14 осіб;

Одеський рибоохоронний патруль — 18 осіб;

Рівненський рибоохоронний патруль — 2 особи;

Тернопільський рибоохоронний патруль — 4 особи;

Харківський рибоохоронний патруль — 4 особи;

Чорноморський рибоохоронний патруль — 33 особи.

У 2016 р. з державного бюджету виділено 15 млн грн для оснащення Київського рибоохоронного патруля сучасною технікою: через систему ProZorro здійснено закупівлю човнів, автомобілів, тепловізорів, ехолотів-картплоттерів, морських радіостанцій та комп'ютерів. У бюджеті на 2017 рік передбачено фінансування у розмірі 40 млн грн на придбання нової техніки для рибного патруля. Це найбільша сума, виділена в рамках держбюджету за останні 10 років для оснащення органів рибоохорони.

Реформування роботи органів контролю рибальства проводиться з урахуванням досвіду іноземних країн. Так, відповідно до домовленостей з представниками Директорату з питань рибальства Королівства Норвегія було проведено навчальний семінар щодо контролю рибальства, метою якого було ознайомлення українських інспекторів рибоохорони з принципами та методами роботи норвезьких рибоохоронних органів.

Представниками Міністерства сільського господарства Литовської Республіки проведено семінар для українських інспекторів рибоохорони з метою ознайомлення з принципами та методами роботи литовських колег, врахування отриманої інформації під час виконання рибоохоронних функцій в Україні, внесення змін до національних інструкцій та правил роботи органів рибоохорони.

Крім того, продовжується активна робота щодо розвитку міжнародних зв'язків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади в діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна». Держрибагентство нині відповідає за співробітництво з трьома міжнародними організаціями: Організацією з рибальства у північно-західній частині Атлантичного океану (НАФО); Комісією щодо збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР); Змішаною комісією із застосування Угоди про рибальство у водах Дунаю.

У 2016 р. Україною було сплачено 4,3 млн грн членських внесків, з них 3,0 млн грн до ККАМЛР та 1,3 млн грн — до НАФО.

На запрошення заступника Регіонального представника ФАО в Албанії Регіонального бюро ФАО для Європи та Центральної Азії від 29.12.2015 р.

№ REU/2015/456PR 16/2 ALB представники Держрибагентства України брали участь у семінарі ФАО щодо розвитку потенціалу країн Середземного та Чорного морів стосовно реалізації Угоди ФАО про заходи держави порту приписки щодо боротьби з незаконним, непідзвітним та нерегульованим промислом, у співпраці з Комісією з питань рибальства у Середземномор'ї.

Держрибагенство України взяло участь у Регіональній конференції на тему: «Побудова майбутнього для сталого прибережного рибальства в Середземному та Чорному морях» (м. Алжир, Алжирська Народна Демократична Республіка) та в першому засіданні Цільової робочої групи з аквакультури ГКРС (м. Неаполь, Італійська Республіка).

У м. Київ проведено 5-те засідання Чорноморської робочої групи Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі (далі — ГКРС), на якому було представлено доповіді стосовно рибогосподарської політики та стану промислової діяльності прибережних країн Чорного моря. У рамках заходу було проведено також переговори керівництва Держрибагентства України з виконавчим секретарем ГКРС паном Абделлахом Сруром. За результатами переговорів опрацьовано проект Листа-угоди між Державним агентством рибного господарства України і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) від імені Генеральної Комісії з питань рибальства у Середземному морі щодо проекту «Технічна допомога веденню відповідального рибальства і сталої аквакультури» в контексті програм ГКРС, який було підписано у ході участі делегації Держрибагентства у Конференції на високому рівні з питань посилення співробітництва у сфері рибальства та аквакультури в Чорному морі.

Провідні спеціалісти Держрибагенства України взяли участь у засіданні кластера 5 (сільське господарство та розвиток сільських територій, рибальство та морська політика, ріка Дунай, транскордонне та регіональне співробітництво), у ході якого стороні ЄС повідомлено загальну інформацію щодо рибної галузі України, стан впровадження реформи рибної галузі, досягнутих позитивних змін та проблемних питань у її впровадженні. Крім того, за результатами засідання кластера 5 визначено напрями подальшого співробітництва між Україною та ЄС з питань рибного господарства.

Було здійснено візит представника Держрибагентства України до Республіки Білорусь для обговорення питань співробітництва у сфері охорони водних біоресурсів.

Делегація українських експертів взяла участь у засіданнях робочих груп ККАМЛР з метою захисту національних інтересів, забезпечення промислової діяльності та проведення науково-дослідних робіт суден під Державним Прапором України у зоні дії ККАМЛР. Вона працювала на засіданнях робочих груп Комісії щодо збереження морських живих ресурсів Антарктики (Італійська Республіка), засіданні Робочої групи з оцінки рибних запасів та засіданнях Комітетів (наукового, з дотримання та інспекцій, з адміністративно-фінансових питань) і XXXV сесії ККАМЛР (м. Гобарт, Тасманія, Австралія). У ході згаданих заходів було представлено результати виконання українським судом «СИМЕІЗ» у 2016 р. науково-дослідної роботи в зоні відповідальності ККАМЛР та результати спостережень щодо запасів водних біоресурсів, які здійснювалися під час промислу. Крім того, забезпечено можливість подальшого виконання

науково-дослідної роботи судном «СИМЕЇЗ» у 2017 р. та ведення промислу в зоні відповідальності ККАМЛР для суден під Державним прапором України в промисловому сезоні 2016/2017.

З метою розвитку науково-дослідного співробітництва в галузі рибного господарства між Україною і Республікою Корея опрацьовано та підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством рибного господарства України й Міністерством океанів та рибальства Республіки Корея стосовно системи міжнародного наукового спостереження Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики, який забезпечить законодавче підґрунтя для залучення науковців рибної галузі України і Республіки Корея до здійснення наукових спостережень на суднах обох держав як міжнародних наукових спостерігачів під час ведення промислу в зоні відповідальності зазначеної Комісії.

Реформування рибного господарства України здійснюється на підставі удосконалення нормативно-правової бази в рибній галузі відповідно до законодавства України з метою забезпечення раціонального використання водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах, морських водах України, територіальному морі, а також за межами юрисдикції України. Для впорядкування, уніфікації та відповідності нормативно-правової бази рибної галузі законам України у 2016 р. прийнято 5 постанов Кабінету Міністрів України [6–10] та видано 7 наказів Мінагрополітики [11–17].

У зв'язку з неможливістю здійснення у морських рибних портах, розташованих на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних, експедиційних робіт та інших, пов'язаних з цим, видів господарської діяльності, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства, дотримання вимог міжнародних договорів України, забезпечення охорони навколишнього природного середовища 10.12.2015 р. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про державну службу». Закон набрав чинності з 01.05.2016 р. Відповідно до Закону, посади державних службовців апарату Держрибагентства поділено на три категорії: 1) категорія «А» (вищий корпус державної служби), до якої віднесено посади Голови Держрибагентства та його заступників; 2) категорія «Б», до якої зокрема віднесено посади керівників структурних підрозділів Держрибагентства та їх заступників; 3) категорія «В» — інші посади державної служби, не віднесені до категорій «А» і «Б».

Кількість посад державної служби категорії «А» в Держрибагентстві становить 3 штатні одиниці, категорії «Б» — 58 та категорії «В» — 139 штатних одиниць. Загалом, кількість посад державної служби категорій «А» і «Б» в Держрибагентстві становить не більше третини штатної чисельності.

Відповідно до Закону та Критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 271, у Нацдержслужбі затверджено Перелік посад працівників Держрибагентства в кількості 10, які виконують функції з обслуговування.

У Держрибагентстві запроваджено призначення на посади державної служби виключно за результатами конкурсу — за Наказом Голови Держрибагентства від 15.09.2016 р. «Про утворення конкурсної комісії Державного агентства рибного господарства України».

Протягом 2016 року були внесені зміни до структури та штатного розпису Держрибагентства. Станом на 31 грудня 2016 р. в апараті Держрибагентства працювало 139 працівників.

У правовому полі впроваджуються нові правила для рибалок-промисловців. З 2016 р. розподіл часток на промисел (вилов) водних біоресурсів на водних об'єктах загальнодержавного значення та розподіл часток на промисловий вилов риби між користувачами водних біоресурсів у 2017–2021 рр. розпочався за новим підходом, який був розроблений Держрибагентством у 2015 р. Змінено видачу промислових квот строком на один рік, на закріплення часток вилову водних біоресурсів — на 5 років, що дає можливість планувати довгострокову діяльність підприємств, інвестувати у бізнес.

При розподілі часток на вилов також вперше повністю усунуено суб'єктивізм та людський чинник, оскільки частки розподіляються за формулою, визначеною законодавством України — Постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. № 992 «Про затвердження Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України». При цьому частка промислу (вилову) визначається у відсотках для кожного користувача водних біоресурсів строком на 5 років. За основу береться вилов щодо кожного користувача за 2013–2016 р. та загальний вилов всіма користувачами на водному об'єкті за ті роки. Нові підприємства, що планують здійснювати промисел водних біоресурсів, мають право отримати частку на вилов риби на аукціоні, де буде виставлено резерв лімітів — до 15% від затвердженого ліміту або прогнозу допустимого вилову водних біоресурсів.

3 листопада 2016 р. Верховна Рада України прийняла законопроект про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (№ 2418а) у частині внесення змін у процедуру видачі дозвільних документів у сфері рибного господарства. Законопроектом передбачено, що строк видачі дозволу на промисловий вилов зменшується з 30 до 5 робочих днів від дня подання суб'єктом господарювання пакету документів, необхідних для отримання такого дозволу.

У 2016 р. досягнуто домовленості про надання допомоги з боку Естонської Республіки у запровадженні в Україні електронної системи звітності про вилов промисловими суднами та обговорено технічні й організаційні питання щодо реалізації названого проекту. Естонській стороні надано необхідну інформацію та матеріали для здійснення подальших кроків з питань реалізації проекту впровадження в Україні електронної системи звітності про вилов рибальськими суднами.

Для впровадження прозорості та відкритості в Держрибагенстві України проведено роботу щодо оновлення веб-сайту Держрибагентства, на якому доступна функція пошуку в режимі он-лайн. Створено офіційну сторінку в соціальній мережі Facebook, де постійно висвітлюється інформація щодо основних заходів Держрибагентства України. Запущено «гарячу лінію» — центр

спілкування та приймання звернень громадян відповідно до питань, що входять до компетенції Держрибагентства України, та створено спеціальну електронну скриньку для повідомлень про корупцію в рибному господарстві. Держрибагентство України зробило відкритими свої електронні бази даних.

Проведено аудит державних підприємств, які входять до сфери управління Держрибагентства України, та змінено 13 директорів, під керівництвом яких підприємства показували низьку ефективність.

На вакантні посади керівників державних підприємств і територіальних органів рибоохорони проводяться прозорі та відкриті конкурси. Кандидати складають письмові іспити та проходять співбесіди, які транслюються он-лайн.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015–2017 роках» (із змінами), проводяться заходи щодо приватизації 12 державних підприємств, зокрема ДП «Центр аквакультури» та ДП «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс».

У 2016 р. Державне агентство рибного господарства України виступало стороною у 54 судових справах, з них: трудові спори — 16 справ; повернення незаконно отриманого майна, яке є державною власністю — 9 справ; з інших спорів — 9 справ.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Ситуація в Україні у сфері рибного господарства зумовила необхідність проведення реформ. Протягом 2015–2017 рр. реформування здійснюється у напрямках ліквідації територіальних органів як юридичних осіб публічного права та утворення територіальних органів як структурних підрозділів Держрибагентства.

Передусім, реформуванню піддано рибоохоронну сферу. Створено рибоохоронні патрулі в шести областях України та Чорноморський рибоохоронний патруль (всього призначено 127 інспекторів рибоохорони). Затверджено нові режими рибальства та нові правила для рибалок-промисловиків.

Внесено зміни до здійснення спеціального використання водних біоресурсів, до органів, видів та умов ліцензування господарської діяльності, до встановлення квот, лімітів та прогнозів використання водних біоресурсів, до чинності державної служби Держрибагентства.

Реформування рибного господарства України здійснюється на підставі удосконалення нормативно-правової бази в рибній галузі. У 2016 р. прийнято 5 постанов Кабінету Міністрів України та видано 7 наказів Мінагрополітики.

Нова організація в рибному господарстві проводиться з урахуванням досвіду іноземних країн на підставі розвитку та посилення міжнародної діяльності.

Таким чином, створення прозорої законодавчої бази, реформування і оптимізація науково-дослідних установ і асоціацій рибоводів та рибалок в Україні, поширення знань та актуальної інформації, захист та управління природними рибними ресурсами забезпечать розвиток рибогосподарської галузі в нашій країні.

ЛІТЕРАТУРА

1. Публічний звіт про роботу Державного агентства рибного господарства України у 2016 р. URL: http://darg.gov.ua/_publichnij_zvit_pro_robotu_0_0_0_3421_1.html (дата звернення: 01.11.2017).
2. Державна цільова економічна програма розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1245. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1245-2011-p> (дата звернення: 01.11.2017).
3. Муквич М. Г. Сучасний стан, проблеми та завдання розвитку рибництва в Україні // Рибогосподарська наука України. 2009. № 1. С. 4—8.
4. Механізм забезпечення прибутковості рибних господарств України / Смирнюк Н. І. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2009. № 1. С. 107—115.
5. Рибне господарство України : статистичний збірник / Державний комітет статистики України. Київ, 2006.
6. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 894 : постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 року № 86. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/86-2016-p> (дата звернення: 01.11.2017).
7. Про внесення змін до Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 105 та від 5 жовтня 2016 року № 808. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/808-2016-p> (дата звернення: 01.11.2017).
8. Про тимчасове закриття морських рибних портів» : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 263. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/263-2016-p> (дата звернення: 01.11.2017).
9. Про внесення зміни до пункту 19 переліку органів ліцензування : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 767. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/767-2016-p> (дата звернення: 01.11.2017).
10. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 845. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/845-2016-p> (дата звернення: 01.11.2017).
11. Про затвердження режимів рибальства у 2016 році : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 січня 2016 року № 2. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0109-16> (дата звернення: 01.11.2017).
12. Про затвердження нормативно-правових актів, необхідних для здійснення спеціального використання водних біоресурсів : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 січня 2016 року № 17. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0201-16> (дата звернення: 01.11.2017).
13. Про внесення зміни до квот спеціального використання водних біоресурсів загально-державного значення в Азовському морі із затоками, лиманами,

- протоками (у тому числі Утлюцький та Молочний лимани, Сиваш, Керченська протока) у 2016 році (тонн) : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31.05.2016 № 184. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1658-15> (дата звернення: 01.11.2017).
14. Про визнання таким, що втратив чинність наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31.05.2013 № 341 : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 лютого 2016 року № 61. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0399-16> (дата звернення: 01.11.2017).
  15. Про затвердження Змін до форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 листопада 2016 року № 471. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1600-16> (дата звернення: 01.11.2017).
  16. Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення у 2017 році : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 грудня 2016 року № 542. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1691-16> (дата звернення: 01.11.2017).
  17. Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення у 2017 році : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05 грудня 2016 року № 512. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1676-16> (дата звернення: 01.11.2017).

REFERENCES

1. Public report on the work of the State Agency of Fisheries of Ukraine in 2016 (2016). *darg.gov.ua*. Retrieved from http://darg.gov.ua/_publichnyj_zvit_pro_robotu_0_0_0_3421_1.html.
2. State Target Economic Program of Fisheries Development for 2012-2016. Approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 23, 2011, No 1245. *zakon2.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1245-2011-p>.
3. Mukvich, M. G. (2006). Current state, problems and objectives of fish culture development in Ukraine. *Fisheries science of Ukraine*, 1, 4-8.
4. Smirnyuk, N. I., Buriak, I. V., Onuchenko, O. V., & Mazur, P. V. (2009). The mechanism of profitability of fish farms of Ukraine. *Fisheries science of Ukraine*, 1, 107-115.
5. State Statistics Committee of Ukraine (2006). *Fisheries of Ukraine: Statistical Collection*. Kyiv.
6. On Amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 30, 2015, No. 894. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 4, 2016, No. 86. *zakon5.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/86-2016-p>.
7. On amendments to the Procedure for the implementation of special use of water bioresources in internal fish-farming water objects (their parts), inland seawater,

- territorial sea, exclusive (marine) economic zone and on the continental shelf of Ukraine. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 18 February 2016, No. 105 and October 5, 2016, No. 808. *zakon2.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/808-2016-p>.
8. On the temporary closure of sea-fishing ports. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 6, 2016, No. 263. *zakon3.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/263-2016-p>.
  9. On amending paragraph 19 of the list of licensing bodies. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 26, 2016, No. 767. *zakon2.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/767-2016-p>.
  10. On Approval of Licensing Conditions for the Implementation of Economic Activity for the Industrial Catching of Water Bioresources outside the jurisdiction of Ukraine. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 23, 2016, No. 845. *zakon2.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/845-2016-p>.
  11. On approval of fishing regimes in 2016. Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine dated January 6, 2016. No. 2. *zakon3.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0109-16.htm>.
  12. On the approval of the legal acts required for the special use of water bioresources. Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine of January 26, 2016, No. 17. *zakon3.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0201-16>.
  13. On the introduction of changes to the quotas for the special use of water bioresources of the general value in the Azov Sea with bays, estuaries, straits (including Utlyucky and Molochnyi Liman, Syvash, Kerch Strait) in 2016 (tons). Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine dated May 31, 2016, No. 184. *zakon3.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1658-15>.
  14. On the recognition of the decree of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine dated 31.05.2013, No 341. Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine dated February 26, 2016, No. 61. *zakon2.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0399-16>.
  15. On approval of the Changes to the form of the Act, drawn up on the basis of the planned (unscheduled) measure of state supervision (control) regarding compliance by the business entity with the requirements of legislation in the field of safety of navigation of vessels of the fleet of the fishing industry. Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine dated November 18, 2016 No. 471. *zakon2.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1600-16>.
  16. On approval of quotas for the acquisition of water bioresources of national importance in 2017. Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine dated December 16, 2016, No. 542. *zakon2.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1691-16>.
  17. On Approval of Limits and Projections of Admissible Special Use of Water Bioresources of National Value in 2017. Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine dated December 5, 2016, No. 512. *zakon2.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1676-16>.

РАЗВИТИЕ РЕФОРМ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

Ю. А. Глебова, ya_glebova@ukr.net, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

О. В. Шкарупа, knopush@ukr.net, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

Цель. Добыча водных биоресурсов в Украине в последние годы была на низком уровне. С целью обеспечения населения Украины высококачественной рыбной продукцией, задачей работников рыбного хозяйства страны является создание условий для увеличения объемов вылова рыбы и улучшения организации труда и материального обеспечения в хозяйствах. Цель работы заключается в определении направлений реформирования в рыбной отрасли, обеспечивающих прогресс в ней и направленных на привлечение инвестиций в аквакультуру, создание органов рыбоохраны с качественным изменением принципов их работы, формирование культуры социально ответственных рыбаков, достижение прозрачности и открытости в работе Госрыббазента, а также на повышение эффективности функционирования государственных учреждений.

Методика. Основой исследования являются научные, статистические и отчетные данные в рыбной отрасли Украины. Используются методы мониторинга и ретроспективного анализа последних исследований и публикаций.

Результаты. Приведены информационные данные относительно проведения реформ в рыбохозяйственной отрасли Украины, а именно: изменение территориальных органов, аппарата Госрыббазента, режимов рыболовства, использования водных биоресурсов, нормативно-правовой базы, усиление международной деятельности и использования опыта зарубежных стран, увеличение финансирования, введение инвестирования иностранными государствами и использования их опыта, что способствует наращиванию мощности рыбной отрасли.

Научная новизна заключается в аналитическом мониторинге изменения подходов к организации деятельности рыбоводных формирований, обладающих существенными технологическими, экономическими, организационными, правовыми особенностями, которые необходимо учитывать в хозяйственных процессах.

Практическое значение. Материалы статьи могут быть использованы учеными и работниками рыбной отрасли.

Ключевые слова: рыбная отрасль, реформирование, нормативно-правовое поле, законы, постановления, органы Госрыббазента, рыбоохрана, рыбоохранный патруль, международный опыт, инвестиции.

REFORMATIONAL DIRECTION OF FISH INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

Yu. Glebova, ya_glebova@ukr.net, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

O. Shkarupa, knopush@ukr.net, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Purpose. Exploitation of aquatic bioresources in Ukraine was traditionally low. In order to provide the population of Ukraine with high-quality fish products, the task of fish industry workers in the country is to create appropriate conditions for increasing fish catches and improve the organization of labor and material provision at fish farms. Our immediate goal in the work was to identify the areas of reforms in the fish industry, which would ensure the progress in it and would be aimed at attracting investments in aquaculture, establishing fish protection bodies with a qualitative change in their working principles, forming a culture of socially responsible fishing, achieving

transparency and openness in the work of the State Agency for Fisheries, as well as improving the efficiency of the functioning of state institutions.

Methodology. *The basis of the research is the scientific, statistical and reporting data in the fish industry of Ukraine. The research uses the methods of monitoring and retrospective analysis of recent research and publications.*

Findings. *The information on the implementation of reforms in the field of fish industry in Ukraine is presented: change of territorial bodies, State Fisheries Agency, fisheries regimes, use of aquatic biological resources, regulatory framework, strengthening of international activities and use of foreign experience. In order to increase the capacity of the fish industry, it is being reformed in the direction of changing its structure, increasing funding, introducing foreign investment and using their expertise.*

Originality. *The need for reforming the fish industry of Ukraine became highly important. Modern socio-economic conditions require changes in the approaches to the organization of the activity of f groups that are marked by significant technological, economic, organizational, regulatory and legal peculiarities that need to be taken into account in economic processes. In accordance with the need for changes in the fish industry, the importance of reforming the fish industry of Ukraine has become urgent.*

Practical value. *The materials of the article may be appropriate for using by scientists and fish industry workers.*

Keywords: *fish goulash, reformation, regulatory framework, Laws, Decrees, bodies of the State Fisheries Agency, fishery protection, fishing patrol, international experience, investments.*

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 19-32
DOI: 10.15407/fsu2017.04.019
УДК [574.583+574.587:504.61] (282.247.327)

ОЦІНКА СТАНУ ЗООПЛАНКТОНУ І ЗООБЕНТОСУ РІЧКИ МОКРА СУРА

В. О. Яковенко, yakovenko@ukr.net, кафедра загальної біології та водних біоресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара м. Дніпро

О. В. Федоненко, hydro-dnu@ukr.net, кафедра загальної біології та водних біоресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара м. Дніпро

Н. Й. Тушницька, n-tushnitska@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити розподіл структурно-функціональних показників зоопланктону і зообентосу на забруднених та умовно чистих ділянках антропогенно навантаженої річки Мокра Сура влітку, у період максимального розвитку гідробіоценозу.

Методика. Під час збору та подальшого лабораторного опрацювання проб зоопланктону та зообентосу використовувалися відповідні стандартні загальноприйняті гідробіологічні методики. Для ранжирування станцій на підставі структурно-функціональних показників зообентосу використовували комбінований індекс стану угруповання (KICU).

Результати. Проведені дослідження показали, що видовий склад зообентосу та зоопланктону річки Мокра Сура включав багато сапробіонтів з олігохет, хірономід і коловерток, які на окремих ділянках мали значний розвиток під впливом евтрофікації, мулонакопичення та за наявності антропогенного забруднення — процесів, що викликають пригнічення життєдіяльності фільтраторів із молюсків і ракоподібних, які є найбільш потужними агентами самоочищення з представників зоопланктону та зообентосу. Найвищі показники розвитку зоопланктону та зообентосу зафіксовано навпроти аварійного скиду правобережних стічних вод (стимулюючий вплив органічного забруднення), найнижчі — біля шинного заводу (спільний вплив хімічного забруднення промислових стічних вод та замулення). На станції «Біла автотраси Дніпро — Запоріжжя» низькі показники розвитку зоопланктону є наслідком замулення цієї ділянки, в той час як біомаса зообентосу тут була найвищою, завдяки інтенсивному розвитку олігохет. Якщо навпроти скиду стічних вод домінували планктонні сапробіонти коловертки, то на вищерозташованих ділянках річки — бделодні коловертки. Домінування планктонних та придонних коловерток-сапробіонтів зумовило найвищі індекси сапробності на цих ділянках. Найбільш чистими, згідно з індексом KICU, виявились ділянки річки на 3 км і на 2 км вище гирла; на це вказує також найбільший, порівняно з іншими ділянками, розвиток тут фільтраторів і найменші індекси сапробності. Ці результати свідчать про досить ефективну біогенну детоксикацію та осадження токсичних речовин на вищерозташованих ділянках, а також про розбавлюючий вплив великих мас води з річки Дніпро на пригирлових ділянках його приток.

Наукова новизна. Уперше проведено оцінку екологічного стану ділянок річки Мокра Сура за результатами комплексного дослідження структурно-функціональних показників зоопланктону і зообентосу в період максимального розвитку гідробіоценозу.

Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані в гідроекологічному моніторинзі для виявлення небезпечного екологічного стану малих річок

© В. О. Яковенко, О. В. Федоненко, Н. Й. Тушницька, 2017

та запобігання подальшій деградації їх екосистем, а також при розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок впливу стічних вод.

Ключові слова: річка Мокра Сура, евтрофікація, зоопланктон, зообентос, олігохети, бделоїдні коловертки.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Великі обсяги стічних вод надходять у притоки Запорізького водосховища, які виступають як буфер, де відбувається біогенна детоксикація та осадження токсичних речовин стічних вод. Річка Мокра Сура є найдовшою притокою Запорізького водосховища, яка впадає в нього з правого боку. В річку потрапляє значна кількість недоочищених стічних вод аварійних скидів правобережної станції аерації, господарсько-побутових стічних вод дачних ділянок, сіл та сільськогосподарських угідь. За даними вчених, у р. М. Сура підвищена концентрація біогенних елементів та легкоокиснюваних органічних речовин [20]. У наукових працях, присвячених малим річкам, відмічається, що висока концентрація органічної речовини сприяє заростанню макрофітами прибережної смуги, що призводить до замулення та скорочення довжини річки, і цей процес прискорює антропогенна евтрофікація [2, 7, 16, 24]. Але специфікою стічних вод р. М. Сура є також проблема токсичного забруднення, тому що сюди надходять промислові стічні води шинного та трубопрокатного заводів. Ще у 80-ті роки ХХ ст. співвідношення обсягу стічних вод, які скидаються підприємствами, з обсягом вод р. Мокра Сура складало 1,0:2,5, рівень вмісту нафтопродуктів у донних відкладах річки досягав 128–280 мг/100 г ґрунту [10]. Забруднення металами було найбільш вираженим у донних відкладах річки, тому в наш час склалася напружена ситуація з вторинним забрудненням води цими токсикантами [9]. Все це призвело до зростання мінералізації води в річці впродовж останніх 50 років з 1,1 до 2,8 г/л [22]. Таким чином, моніторингові дослідження річки є вкрай актуальними та необхідними, оскільки дозволяють виявити кризовий стан ділянок річки та запропонувати заходи щодо запобігання деградації її екосистеми. Найбільш чутливими до дії забруднень є зоопланктон та зообентос, до складу яких входять як фільтратори, так і детритофаги. Тому саме комплексний інтегральний аналіз екологічного стану річки за допомогою як зоопланктону, так і зообентосу дозволяє ранжувати ділянки водойми за якістю водного середовища.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Уперше зоопланктон і зообентос річки Мокра Сура були охарактеризовані в 30-х роках ХХ ст. як досить продуктивні та різноманітні за видовим складом [3, 19]. У подальшому внутрішньоводоймні процеси та вплив стічних вод призвели до скорочення видів безхребетних. В угрупованні зоопланктону річки стали коловертки, в угрупованні зообентосу — олігохети [6, 8]. За повідомленнями А.К. Диги, в гирлі р. М. Сура кількість видів зоопланктону скорочувалась і темпи розвитку були дуже низькі, а у таких видів ракоподібних, як *Daphnia longispina*, *D. cucullata*, *Chydorus sphaericus*, *Bosmina coregoni*, знижувалась плодючість. Також відзначалась велика чисельність сапробіонтних видів *Collotheca* sp. (17 тис. екз./м³) та *Rotifer Rotifera* (7 тис. екз./м³) [8].

Востаннє дослідження розподілу зоопланктону ділянок річки проводили навесні 2015 р. [25], літній зоопланктон деяких ділянок вивчався у 2003–2005 рр. [22], а зообентос річки – лише на ділянці безпосереднього впливу стоку в 2006 р. [21]. Ураховуючи деякі розбіжності між показниками біотестування та зоопланктону, що були проведені навесні 2015 р., а також відсутність комплексних досліджень екосистеми річки в літній період, для отримання повної об’єктивної картини необхідне дослідження як зоопланктону, так і зообентосу на забруднених та умовно чистих ділянках антропогенно навантаженої річки саме влітку, тобто в період максимального розвитку гідробіоценозу.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Об’єктом досліджень були представники зоопланктону та зообентосу. Відбір проб зоопланктону та зообентосу проводили влітку 2017 р. на 6 станціях літоралі річки Мокра Сура (рис. 1) N 48°19'26" E 35°08'35". Проби опрацьовували за загальноприйнятими методами [4, 5, 11, 12, 15, 18].

Рис. 1. Карта-схема р. Мокра Сура зі станціями відбору проб.

Примітка: Станції: 1. Нижче шинного заводу. 2. Біля автотраси Дніпро — Запоріжжя. 3. Навпроти правобережних очисних споруд. 4. На 3 км вище гирла. 5. На 2 км вище гирла. 6. Гирло р. Мокра Сура.

На підставі видового складу та розвитку груп зообентосу розраховували комбінований індекс стану угруповання (KICU) [1]. $KICU = (2 \text{ CC} + 1,5 \text{ ОІП} + 1,5 \text{ В} + \text{N} + \text{H} + \text{S})$, де CC — середня сапробність; ОІП — олігохетний індекс Пареле; В — біомаса; N — чисельність; H — індекс Шенона; S — кількість видів. До формули входять не абсолютні значення показників, а їхні ранги.

Оцінку ступеня чистоти води досліджуваних станцій проводили на підставі категорій якості води, які визначали згідно з рекомендаціями [17] та величинами KICU [1]. Для індикації органічного забруднення розраховували індекс сапробності згідно з рекомендаціями [17].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Упродовж періоду дослідження у складі зообентосу р. Мокра Сура було зафіксовано 43 види, з них олігохет — 11, хірономід — 16, молюсків — 6, п’явок — 2, личинок комах — 4, ракоподібних — 4 види. Видовий склад зообентосу річки здебільшого складався з притаманних для водосховищ дніпровського каскаду прісноводних видів північних та помірних широт. Внаслідок

мулонакопичення та відсутності на дні водойми обростань молюсків р. *Dreissena*, кількість видів та розвиток супутніх представників понто-каспійського комплексу були вкрай низькими, поодинокі особини молюсків траплялися лише на каміннях або на стеблах макрофітів. За типом живлення переважали детрито- та сестонофаги. Далі йшли хижакі, що свідчить про високу трофність водойми [16]. Кількість видів коливалась серед станцій від 7 до 30, у середньому – $17,7 \pm 9,7$; найменшу кількість видів було зареєстровано на верхніх ділянках річки: «Біля шинного заводу», «Біля автотраси Дніпро — Запоріжжя» та «Навпроти правобережних очисних споруд» (рис. 2).

Рис. 2. Кількість видів зообентосу на ділянках р. Мокра Сура

Зменшення кількості видів на відзначених ділянках відбувалось в першу чергу за рахунок зникнення видів ракоподібних *Dikerogammarus haemobaphes* Eich., *D. villosus* Sow., *Chaetogammarus tenellus* Sars. та молюсків *Dreissena bugensis* Andr. і *Dr. polymorpha* Pall. на ділянках річки, розташованих вище понтонного мосту. Вірогідно, велика кількість мулових відкладів пригнічує розвиток фільтраторів з ракоподібних та молюсків, тому що фільтратори в таких умовах зазнають засмічення фільтраційного апарату і випадають зі складу ценозу. Також знижувалось видове різноманіття олігохет та хірономід за рахунок випадіння зарослевих форм. Певне, відзначені ділянки відчувають вплив хімічного забруднення промислових стічних вод і викидів чи змивів з автотраси.

Чисельність м'якого зообентосу річки коливалась від 440 до 37880 екз./м², у середньому — 9903 екз./м², біомаса — від 0,9 до 64,4 г/м², у середньому — 24,5 г/м² (табл. 1).

Кількісний розвиток зообентосу річки характеризувався максимальними показниками на ділянках, де значне домінування належало 1–2 видам олігохет, тобто, де видове різноманіття було мінімальне, а саме — «Біля автотраси Дніпро - Запоріжжя» та «Навпроти правобережних очисних споруд». Завдяки мулонакопиченню та великій кількості органічної речовини на ділянці «Біля автотраси Дніпро — Запоріжжя» біомаса зообентосу досягала 64,4 г/м², з яких 99,1% складали олігохети *Limnodrilus hoffmeisteri* та *Tubifex tubifex*, які є індикаторами α-мезосапробних умов. Товщина мулу тут складає більше метра, а глибина не перевищує 0,5 м, що сприяє інтенсивному розмноженню олігохет.

Таблиця 1. Кількісні показники зообентосу на ділянках р. Мокра Сура

Станції	М'який зообен- тос	Оліго- хети	Хіроно- міди	Рако- по- дібні	П'яв- ки	Інші личинки комах	Мо- люски
Нижче шинного заводу	<u>440</u> 0,9	<u>360</u> 0,56	<u>40</u> 0,06	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>40</u> 0,28	<u>0</u> 0
Біля автотраси Дніпро — Запоріжжя	<u>37880</u> 64,4	<u>37800</u> 63,8	<u>40</u> 0,08	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>40</u> 0,52	<u>0</u> 0
Навпроти споруд право- бережної станції аерації	<u>8800</u> 31,3	<u>8400</u> 25,2	<u>280</u> 1,72	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>120</u> 4,38	<u>40</u> 120
На 3 км вище гирла	<u>4880</u> 15,7	<u>4160</u> 11,6	<u>600</u> 2,8	<u>40</u> 0,12	<u>40</u> 1,08	<u>40</u> 0,1	<u>120</u> 12,3
На 2 км вище гирла	<u>4300</u> 16,7	<u>3500</u> 5,4	<u>400</u> 7,5	<u>240</u> 3,58	<u>0</u> 0	<u>160</u> 0,22	<u>200</u> 256
Гирло р. Мокра Сура	<u>3120</u> 18,1	<u>2240</u> 3,4	<u>480</u> 12,4	<u>200</u> 1,72	<u>80</u> 0,44	<u>120</u> 0,24	<u>360</u> 543

Примітка: над рискою — чисельність, екз./м²; під рискою — біомаса, г/м²

Олігохети є стійкими до нестачі кисню, і, крім того, резистентні до дії забруднень, тому витримують надходження до акваторії важких металів (у вигляді свинцевого пилу з автотраси або стоків шинного чи трубопрокатного заводів) та інших токсикантів. Таким чином, домінування олігохет на цій ділянці є наслідком замуленості та забрудненості річки. На ділянці річки «Біля шинного заводу» виявлені низькі показники розвитку олігохет, що пояснюється тим, що мулові відклади тут більшою мірою насичені токсичними речовинами шинного та трубопрокатного заводу, а глибина невелика, і за таких умов потерпають навіть олігохети. На ділянці навпроти очисних споруд зафіксований розвиток мухи-криски *Eristalis tenax*, яка, поряд з олігохетами, є індикатором органічного забруднення. У напрямку гирла збільшувалась частка хірономід, причому в гирлі домінували максимальні за розмірами види *Chironomus plumosus* L., *Ch. thummi* Kieffer, *Ch. semireductus* Lenz. Більшого різноманіття влітку досягала бентофауна на ділянках 2 км і 3 км вище гирла р. Мокра Сура, де, крім олігохет, значною мірою були представлені зарослеві форми *Cricotopus silvestris* F., *Tanytarsus manicus* Wulp., *Cryptochironomus viridulus* F., *C. pararostratus*, *Micropsectra praecox* Mg. Серед молюсків на ділянках річки вище та навпроти очисних споруд мешкали лише червоногі *Viviparus viviparus* L., *Planorbarius corneus* L., *Valvata piscinalis* Mull. У пригирлових ділянках до червоногих приєднувались також *Dreissena bugensis* Andr. і *Dr. polymorpha* Pall., у друзах яких біомаса ракоподібних *Dikerogammarus haemobaphes* Eich., *D. villosus* Sow., *Chaetogammarus tenellus* Sars. складала 1,72–3,58 г/м². Найбільше видове різноманіття у гирлі річки, вірогідно, пов'язане із змішуванням вод річки та водосховища, внаслідок чого видовий склад даної ділянки збагачується.

У видовому складі зоопланктону р. Мокра Сура виявлено 48 видів, з яких 26 — коловертки, 8 — веслоногих, 13 — гіллястовусих ракоподібних та 1 — велігери дрейсени. Кількість видів зоопланктону серед станцій дослідження коливалася від 11 до 27, у середньому — $20 \pm 6,1$ (рис. 3). Найменша кількість видів зоопланктону відзначена на ділянках річки Мокра Сура вище та біля

автотраси Дніпро — Запоріжжя. На цих ділянках зовсім не траплялися фільтратори з гіллястовусих та домінували придонні коловертки з одним яєчником (або бделоїдні) – *Rotaria rotatoria* Pall., *R. citrina* Ehr., *Adineta gracilis* Jonson, *Philodina citrina* Ehr., *Habrotrocha bidens* Gosse, які належать до класу Bdelloidea.

Рис. 3. Кількість видів зоопланктону на ділянках р. Мокра Сура

Ці коловертки мешкають у забрудненому середовищі, де велика кількість мулових відкладів та органічної речовини сприяє їхньому домінуванню завдяки стійкості до нестачі кисню, і тому бделоїдні коловертки є індикаторами ще й довготривалої трансформації гідробіоценозу, яка призводить до накопичення мулових відкладів. Крім того, бделоїдні коловертки є пристосованими до дії забруднюючих компонентів стоків, тому за наявності в мулах навіть важких металів та нафтопродуктів, вони часто є єдиними представниками гідробіоценозу, які мешкають в такому середовищі. Серед механізмів, які сприяють стійкості бделоїдних коловерток до дії забруднень, дослідники відзначають горизонтальний транспорт генів [22]. Фільтратори з планктонних ракоподібних у таких умовах зазнають засмічення фільтраційного апарату та випадають зі складу ценозу. Планктонні коловертки теж потерпають від великої кількості завислих речовин та нестачі кисню. Ці види зовсім зникають зі складу гідробіоценозу або трапляються в незначній кількості. Тому домінування бделоїдних коловерток є наслідком замулення та забруднення відзначених ділянок. Частка цих коловерток від загальної кількості видів зоопланктону на перших двох ділянках складала 83,5–91,2%. Навпроти очисних споруд спостерігалось різке зростання кількості видів коловерток, але здебільшого за рахунок планктонних сапробіонтних коловерток *Asplanchna priodonta* Gosse, *A. brightwellii* Gosse, *A. herricki* Guerne, *Brachionus calyciflorus* Pall., *Br. diversicornis* Daday, *B. urceus* L., частка яких складала тут 53%, у той час як частка придонних коловерток знижувалась до 15%. На ділянці навпроти правобережної станції аерації збільшення розвитку та різноманіття планктонних коловерток-сапробіонтів є показником забруднення річкової води органічною речовиною. Джерелом надходження останньої у річку є очисні споруди станції аерації, розташовані трохи нижче понтонного мосту (на 200 м). Цей вплив стає найбільш помітним під час залпових скидів із відстійників або за великого обсягу повеневих вод, що змивають вміст відстійників очисних споруд у річку. На ділянках 2 км та 3 км вище гирла кількість видів планктонних

коловерток знижувалась та зростала кількість видів ракоподібних, що вказує на поліпшення умов для розвитку фільтраторів. У гирлі р. Мокра Сура кількість видів планктонних коловерток, які є індикаторами сапробності, знову незначно зростала, що зумовлено наявністю тут стоку з очисних споруд через трубу діаметром близько 1 м, яка виходить у водосховище. Із труби надходять уже значною мірою очищені стічні води, до того ж, великий обсяг водної товщі водосховища розбавляє цей стік, завдяки чому його вплив на гідробіоценоз послаблюється.

Біомаса зоопланктону виявилася найбільшою на ділянках навпроти очисних споруд ($191,2 \text{ мг/м}^3$) і в гирлі річки ($178,2 \text{ мг/м}^3$), а найменшою — нижче шинного заводу ($14,3 \text{ мг/м}^3$) й автотраси ($52,9 \text{ мг/м}^3$) (рис. 4).

Рис. 4. Біомаса зоопланктону на ділянках р. Мокра Сура

Коловертки домінували на верхніх ділянках, тоді як біомаса ракоподібних зростала на ділянках, що розташовані неподалік від гирла річки. Низька чисельність зоопланктону (рис. 5), поряд із низькою індивідуальною масою коловерток, порівняно з ракоподібними, була причиною найменшої біомаси зоопланктону на верхніх ділянках річки. Чисельність його нижче шинного заводу складала $12,5 \text{ тис. екз./м}^3$, за середнього значення $52,9 \text{ мг/м}^3$. Частка коловерток від загальної чисельності зоопланктону у зазначеній ділянці складала 89,2%, причому домінували бделоїдні коловертки.

Рис. 5. Чисельність зоопланктону на ділянках р. Мокра Сура.

Слід також відзначити, що серед веслоногих ракоподібних на вищерозташованих ділянках переважали науплії, тоді як на пригирлових — особини 3–4 ступеня метаморфозу (ювенальні форми), що й зумовило їх більшу частку у біомасі зоопланктону. На ділянках з найбільшим розвитком домінували планктонні види коловерток та гіллястовусі ракоподібні, а з найменшим — придонні види коловерток. Навпроти очисних споруд чисельність зоопланктону збільшувалась до 114,3 тис. екз./м³, причому на 88,1% — за рахунок розмноження численних планктонних сапробіонтних коловерток родів *Brachionus*, *Asplanchna*, *Filinia* та ін. Таке явище є відображенням ефекту евтрофікації внаслідок аварійних скидів недоочищених стічних вод правобережної станції аерації. На вищерозташованих ділянках розвиток зоопланктону був зумовлений виключно придонними коловертками, частка яких становила 97% від загальної чисельності зоопланктону. На 3 км та 2 км вище гирла чисельність зоопланктону різко зменшувалась завдяки зниженню розвитку коловерток, серед яких, крім сапробіонтних, траплялись типові для водосховища види: *Euchlanis dilatata*, *Bipalpus hudsoni*, *Keratella cochlearis*, *K. quadrata*. Але на останніх двох ділянках суттєво зростала частка гіллястовусих, серед яких найбільші показники мали види *Chydorus sphaericus*, *Bosmina longirostris*, *Podonevadne trigona*. На цих ділянках біомаса гіллястовусих ракоподібних була вищою, за 5%-им рівнем значущості, у порівнянні з іншими досліджуваними ділянками. Високі показники розвитку гіллястовусих ракоподібних свідчать про поліпшення якості води на цих ділянках. У гирлі річки знову зростала кількість тих самих видів коловерток, що й біля понтонного мосту, але ступінь зростання тут був дещо меншим за рахунок очищення та розбавлення цього стоку. Специфічною рисою гирла р. Мокра Сура, у порівнянні з іншими ділянками річки, є наявність тут значної кількості велігерів дрейсен, які заносяться сюди течією з водосховища. Відзначена риса є наслідком того, що ділянка є зоною змішування вод річки та водосховища.

На підставі показників структури зообентосу досліджувані станції були ранжирувані за комбінованим індексом стану угруповання (КІСУ) і за категоріями якості води (табл. 2). На підставі обох класифікацій найбільш забрудненими виявились ділянки «Біля автотраси Дніпро — Запоріжжя» та «Навпроти правобережних очисних споруд» — «дуже брудні» (7 категорія якості), а найбільш чистими — ділянки «На 2 км вище гирла» та «На 3 км вище гирла».

Індекс сапробності за зоопланктоном виявився найбільшим на ділянках річки «Нижче шинного заводу» та «Біля автотраси Дніпро — Запоріжжя». Індекс сапробності тут дорівнював відповідно 2,64 та 2,53 (табл. 3).

Найбільші значення індексу, отримані для цих ділянок, зумовлені переважанням бделоїдних коловерток, які є сапробіонтами та мають високий індекс сапробності [13]. Навпроти очисних споруд індекс сапробності також був високим — 2,33 — через наявність планктонних коловерток-сапробіонтів, але нижчим, ніж на вищерозташованих ділянках, тому що ці планктонні коловертки мають меншу сапробну валентність, порівняно з придонними коловертками, реагуючи виключно на високу концентрацію у воді органічної речовини. Бделоїдні коловертки на цій ділянці не були домінантами, що вплинуло на їхню частку при розрахунку індексу сапробності. Таким чином, індикація ступеня чистоти ділянок річки за зоопланктоном та зообентосом дещо різнилась, що є відображенням різного характеру забруднень та гідрології досліджених ділянок річки.

Таблиця 2. Показники зообентосу на ділянках річки Мокра Сура

Станції	Ранг станції за КІСУ	Сапробність	Індекс Шенона	Домінуючі види зообентосу	Категорія якості води
Нижче шинного заводу	5	3,60	0,73	<i>Limnodrilus hoffmeisteri</i> , <i>Tubifex tubifex</i>	Дуже брудна
Біля автотраси Дніпро–Запоріжжя	4	3,67	0,91	<i>Limnodrilus hoffmeisteri</i> , <i>Tubifex tubifex</i>	Дуже брудна
Навпроти споруд правобережної станції аерації	6	3,84	1,27	<i>Limnodrilus hoffmeisteri</i> , <i>Eristalis tenax</i>	Дуже брудна
На 3 км вище гирла	2	3,10	2,53	<i>Cricotopus silvestris</i> , <i>Limnodrilus hoffmeisteri</i>	Брудна
На 2 км вище гирла	1	2,93	2,38	<i>Dikerogammarus villosus</i> , <i>Cryptochironomus viridulus</i>	Помірно забруднена
Гирло р. Мокра Сура	3	3,22	2,10	<i>Chironomus plumosus</i> , <i>Ch. semireductus</i>	Брудна

Таблиця 3. Показники зоопланктону на ділянках річки Мокра Сура

Станції	Сапробність	Індекс Шенона	Домінуючі види зоопланктону	Категорія якості води
Нижче шинного заводу	2,64	1,35	<i>Rotaria rotatoria</i> , <i>R. citrina</i>	Помірно забруднена
Біля автотраси Дніпро–Запоріжжя	2,53	1,14	<i>Rotaria rotatoria</i> , <i>Adineta gracilis</i>	Помірно забруднена
Навпроти споруд правобережної станції аерації	2,33	1,62	<i>Asplanchna priodonta</i> , <i>Brachionus calyciflorus</i>	Слабко забруднена
На 3 км вище гирла	2,08	2,49	<i>Euchlanis dilatata</i> , <i>Chydorus sphaericus</i>	Слабко забруднена
На 2 км вище гирла	1,95	3,09	<i>Euchlanis dilatata</i> , <i>Bosmina longirostris</i>	Досить чиста
Гирло р. Мокра Сура	2,17	3,68	<i>Bosmina longirostris</i> , <i>Podonevadne trigona</i>	Слабко забруднена

Ранжирування інших ділянок річки за зоопланктоном та зообентосом співпадало. У гирлі річки, де був виявлений змішаний склад, до якого входили представники з високим та низьким індексом сапробності, цей показник становив 2,17; найбільш чистими виявились ділянки річки на 3 км та на 2 км вище гирла, які мали індекс сапробності відповідно 2,08 і 1,95.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Видовий склад зообентосу та зоопланктону річки Мокра Сура мав багато сапробіонтів з олігохет, хірономід та коловерток, які на окремих ділянках досягали значного розвитку та великого ступеня домінування, що зумовлено евтрофікацією річки, мулонакопиченням та наявністю антропогенного

забруднення. Усі ці процеси викликають пригнічення життєдіяльності фільтраторів з молюсків та ракоподібних, які є найбільш потужними агентами самоочищення з представників зоопланктону та зообентосу. Найбільші показники розвитку зоопланктону ($191,2 \text{ мг/м}^3$) та зообентосу ($31,3 \text{ г/м}^2$) зафіксовані навпроти аварійного скиду правобережних стічних вод (стимулюючий вплив органічного забруднення), найменші — біля шинного заводу (вплив хімічного забруднення промислових стічних вод). На ділянці «Біля автотраси Дніпро — Запоріжжя» показники розвитку зоопланктону були низькими, а зообентосу — високими, завдяки великій біомасі олігохет. Таким чином, найнижчі показники розвитку зоопланктону, відзначені біля шинного заводу й автотраси, можуть бути наслідком впливу як хімічного забруднення, так і замулення цих ділянок. Якщо навпроти скиду стічних вод домінували планктонні сапробіонтні коловертки, то на вищерозташованих ділянках річки — бделоїдні коловертки, домінування планктонних та придонних коловерток-сапробіонтів зумовило найвищі індекси сапробності (2,53–2,64) на цих ділянках. Найчистішими, згідно індексу КІСУ, виявились ділянки річки на 3 км і на 2 км вище гирла, на що вказує найбільший, порівняно з іншими ділянками, розвиток тут фільтраторів і найменші індекси сапробності (1,95–2,08). Отримані результати свідчать про досить ефективну біогенну детоксикацію та осадження токсичних речовин, що надходять до річки на вищерозташованих ділянках (при цьому органічна та хімічна складові антропогенного забруднення проявляють антагоністичний характер, що сприяє нівелюванню дії токсикантів), а також про розбавлювальний вплив великих мас води з річки Дніпро з відповідним поповненням гідробіоценозу на пригирлових ділянках його притоки.

Подальший моніторинг структурно-функціональних показників зоопланктону та зообентосу річки Мокра Сура дозволить запобігти подальшій деградації ділянок річки, які зазнають дії забруднень, а також розраховувати збитки, заподіяні рибному господарству внаслідок впливу стічних вод.

ЛІТЕРАТУРА

1. Баканов А. И. Использование зообентоса для мониторинга пресноводных водоемов (обзор) // Количественные методы экологии и гидробиологии. Тольятти, 2005. С. 68—78.
2. Барановский Б. А. Растительность руслового равнинного водохранилища. Днепропетровск : Днепропетровский университет, 2000. 172 с.
3. Берестов О. І., Приходько В. П. Зообентос заток водосховища // Вісник Дніпропетровської гідробіологічної станції. Т. 7. Зообентос водосховища. Дніпропетровськ, 1941. С. 215—286.
4. Боруцкий Е. В. *Harpacticoidae* пресных вод. Ракообразные. Москва ; Ленинград : АН СССР, 1952. 425 с. (Фауна СССР ; т. 11).
5. Боруцкий Е. В., Степанова Л. А., Кос М. С. Определитель *Calanoida* пресных вод СССР. Ленинград : Наука, 1991. 504 с.
6. Гайдаш Ю. К. Динамика развития донной фауны Запорожского (Днепровского) водохранилища в условиях каскада // Биологические аспекты охраны и рационального использования окружающей среды. Днепропетровск, 1977. С. 31—41.
7. Гриб И. В. Основные направления стратегии защиты и восстановления экосистем малых рек // II Всесоюзная конференция по рыбохозяйственной

- токсикології : тезиси докл. Т. 1. Санкт-Петербург : Росрыбхоз, 1991. С. 135—136.
8. Дыга А. К. Динамика зоопланктона заливов Запорожского водохранилища в связи с их эвтрофированием // Круговорот вещества и энергии в водоемах : сб. науч. тр. Лиственничное на Байкале, 1977. С. 166—169.
  9. Запорожское водохранилище / Дворецкий А. И. и др. Днепропетровск : Днепропетровский университет, 2000. 170 с.
  10. Кораблева А. И. Оценка уровня загрязнения Запорожского водохранилища тяжелыми металлами и предложения по разработке природоохранных мероприятий. Днепропетровск, 1991. 52 с.
  11. Кутикова Л. А. Бделлоидные коловратки фауны России. Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2005. 315 с.
  12. Кутикова Л. А. Коловратки фауны СССР. Ленинград : Наука, 1970. 744 с.
  13. Мануйлова Е. Ф. Ветвистоусые рачки (*Cladocera*) фауны СССР. Москва ; Ленинград : Наука, 1964. 327 с.
  14. Матвий С. Г. Применение бытовых отбеливателей при определении коловраток // Известия Иркутского государственного университета. 2008. № 1. С. 108—113. (Серия «Биология. Экология»).
  15. Мережко А. И. Экологические проблемы эксплуатации малых рек // Гидробиологический журнал. 1987. Т. 23, № 1. С. 3—7.
  16. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : ЛОГОС, 2006. 408 с.
  17. Монченко В. І. Щелепнороті циклоподібні, циклопи. Київ : Наукова думка, 1974. 450 с.
  18. Рожко-Рожкевич С. І. Зоопланктон допливів і водойм балок порожистої частини р. Дніпра та його зміни під впливом побудування греблі Дніпрогесу // Праці Дніпропетровської гідробіологічної станції. 1937. № 2. С. 85—104.
  19. Сучасні проблеми гідробіології. Запорізьке водосховище / Федоненко О. В. та ін. Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2012. 280 с.
  20. Яковенко В. О., Дворецкий А. І. Зообентос Дніпровського водосховища в умовах антропогенного впливу // Рибогосподарська наука України, 2010. № 2. С. 53—59.
  21. Яковенко В. О. Зоопланктон Дніпровського водосховища в умовах антропогенного впливу : автореф. дисс. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.17 «Гідробіологія». Київ, 2009. 26 с.
  22. Divergent gene copies in the asexual class *Bdelloidea* (*Rotifera*) separated before the bdelloid radiation or within bdelloid families / Welch M. D. B. et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2004. Vol. 101. P. 1622—1625.
  23. Phosphorus losses from agricultural areas in river basins: Effects and uncertainties of targeted mitigation measures / Kronvang B. et al. // J. Environ. Qual. 2016. Vol. 34. P. 2129—2144.
  24. Yakovenko V., Fedonenko E. (2016). Zooplankton of Mokraya Sura river // International Letters of Natural Sciences. 2016. Vol. 51. P. 29—35.

REFERENCES

1. Bakanov, A. I. (2005). Ispol'zovaniye zoobentosa dlya monitoringa presnovodnykh vodoyemov (obzor). *Kolichestvennyye metody ekologii i gidrobiologii*. Tolyatti, 68-78.
2. Baranovsky, B. A. (2000). *Rastitel'nost' ruslovogo ravninnogo vodokhranilishcha*. Dnepropetrovsk: Dnepropetrovsky natsional'niy universitet.

3. Berestov, O. I., & Prikhod'ko, V. P. (1941). Zoobentos zatok vodoskhovyshcha. *Visnyk Dnipropetrovs'koyi hidrobiolohichnoyi stantsiyi. (Vol. 1-7; Vol. 7). Zoobentos vodoskhovyshcha.* Dnipropetrovsk, 215-286.
4. Borutsky, E. V. (1952). *Harpacticoidae presnykh vod. Rakoobraznyye. Fauna SSSR. (Vol. 11).* Moskva-Leningrad: AN SSSR.
5. Borutsky, E. V., Stepanova, P. A., & Kos, M. S. (1991). *Opredelitel' Calanoida presnykh vod SSSR.* Leningrad: Nauka.
6. Gaidash, Yu. K. (1977). Dinamika razvitiya donnoy fauny Zaporozhskogo (Dneprovskogo) vodokhranilishcha v usloviyakh kaskada. *Biologicheskiye aspekty okhrany i ratsional'nogo ispol'zovaniya okruzhayushchey sredy.* Dnepropetrovsk, 31-41.
7. Grib, I. V. (1991). Osnovnyye napravleniya strategii zashchity i vosstanovleniya ekosistem malykh rek. *II Vsesoyuznaya konferentsiya po rybokhozyaystvennoy toksikologii. (Vol. 1).* Sankt Peterburg: Rosrybkhooz, 135-136.
8. Dyga, A. K. (1977). Dinamika zooplanktona zalivov Zaporozhskogo vodokhranilishcha v svyazi s ikh evtrofirovaniyem. *Krugovorot veshchestva i energii v vodoyemakh.* Listvennichnoye na Baykale, 166-169.
9. Dvoretzky, A. I., Ryabov, F. P., & Emets, G. P. et al. (2000). *The Zaporizhzhya Reservoir.* Dnepropetrovsk: Dnepropetrovsky natsional'niy universitet.
10. Korableva, A. I. (1991). *Otsenka urovnya zagryazneniya Zaporozhskogo vodokhranilishcha tyazhelymi metallami i predlozheniya po razrabotke prirodookhrannykh meropriyatiy.* Dnepropetrovsk.
11. Kutikova, L. A. (2005). *Bdelloidnyye kolovratki fauny Rossii.* Moskva: Tovarishchestvo nauchnykh izdaniy KMK.
12. Kutikova, L. A. (1970). *Kolovratki fauny SSSR.* Leningrad: Nauka.
13. Manujlova, E. F. (1964). *Cladocerans (Cladocera) of fauna USSR.* Moskva; Leningrad: Nauka.
14. Matviy, S. G. (2008). Primeneniye bytovykh otbelivateley pri opredelenii kolovratok. *Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Biologiya. Ekologiya», Irkutsk, 1, 108 – 113.*
15. Merezhko, A. I. (1987). Ekologicheskiye problemy ekspluatatsii malykh rek. *Gidrobiologicheskij zhurnal, 23, 1, 3-7.*
16. Arsan, O. M., Davidov, O. A., & Djachenko, T. M. et al. (2006). *Metody hidroekolohichnykh doslidzhen' poverkhnevyykh vod.* Kyiv: LOGOS.
17. Monchenko, V. I. (1974). *Shchelepnoroti tsyklopodibni, tsyklopy.* Kyiv: Naukova dumka.
18. Rozhko-Rozhkevych, S. I. (1937). Zooplankton doplyviv i vodoym balok porozhystoyi chastyny r. Dnipra ta yoho zminy pid vplyvom pobuduвання hrebli Dniprohesu. *Pratsi Dnipropetr. hidrobiol. stantsiyi, 2, 85-104.*
19. Fedonenko, O. V. (2012). Suchasni problemy hidrobiolohiyi. Zaporiz'ke vodoskhovyshche. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovs'kyi universytet.
20. Yakovenko, V. O. (2010). Zoobentos Dniprovs'koho vodoskhovyshcha v umovakh antropohennoho vplyvu. *Rybohospodars'ka nauka Ukrainy, 2, 53-59.*
21. Yakovenko, V. O. (2009). Zooplankton Dniprovs'koho vodoskhovyshcha v umovakh antropohennoho presu. *Extended abstract of candidate's thesis.* Kyiv.
22. Welch, M. D. B., Cummings, M. P., Hillis, D. M., Meselson, M. (2004). Divergent gene copies in the asexual class *Bdelloidea* (Rotifera) separated before the bdelloid radiation or within bdelloid families. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 101, 1622-1625.*

23. Kronvang B., Bechmann M., Lundekvam H., Behrendt H., Rubæk G. H., Schoumans O. F., Syversen N., Andersen H. E., Hoffmann C. C. (2016). Phosphorus losses from agricultural areas in river basins: Effects and uncertainties of targeted mitigation measures. *J. Environ. Qual.*, 34, 2129-2144.
24. Yakovenko, V., & Fedonenko, E. (2016). Zooplankton of Mokraya Sura river. *International Letters of Natural Sciences*, 51, 29-35.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗООПЛАНКТОНА И ЗООБЕНТОСА РЕКИ МОКРАЯ СУРА

В.А. Яковенко, yakovenko@ukr.net, кафедра общей биологии и водных биоресурсов Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, г. Днепр

Е. В. Федоненко, hydro-dnu@ukr.net, кафедра общей биологии и водных биоресурсов Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, г. Днепр

Н.И. Тушницкая, n-tushnitska@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Исследовать распределение структурно-функциональных показателей зоопланктона и зообентоса на загрязненных и условно чистых участках реки Мокрая Сура, испытывающей антропогенную нагрузку летом, в период максимального развития гидробиоценоза.

Методика. Во время сбора и дальнейшей лабораторной обработки проб зоопланктона и зообентоса использовались соответствующие стандартные общепринятые гидробиологические методики. Для ранжирования станций на основании структурно-функциональных показателей зообентоса использовали комбинированный индекс состояния сообщества (КИСС).

Результаты. Проведенные исследования показали, что видовой состав зообентоса и зоопланктона реки Мокрая Сура включает много сапробионтов из числа олигохет, хирономид и коловраток, которые на отдельных участках получали значительное развитие под влиянием эвтрофикации, илонакопления и при наличии антропогенного загрязнения — процессов, вызывающих угнетение жизнедеятельности фильтраторов из числа моллюсков и ракообразных, которые являются наиболее мощными агентами самоочищения из представителей зообентоса и зоопланктона. Самые высокие показатели развития зоопланктона и зообентоса зафиксированы напротив аварийного сброса правобережных сточных вод (стимулирующее влияние органического загрязнения), наименьшие — около шинного завода (совместное влияние химического загрязнения сточных вод и заиления). На станции «Около автотрассы Днепр — Запорожье» низкие показатели развития зоопланктона были следствием заиления, тогда как биомасса зообентоса здесь оказалась самой высокой благодаря интенсивному развитию олигохет. Если напротив сброса сточных вод доминировали планктонные сапробионтные коловратки, то на вышерасположенных участках реки — бделлоидные коловратки; доминирование планктонных и придонных коловраток-сапробионтов обусловило высокие индексы сапробиотности на этих участках. Наиболее чистыми, согласно индексу КИСС, оказались участки реки на 3 км и на 2 км выше устья, на что указывает также наибольшее, по сравнению с другими участками, развитие здесь фильтраторов и наименьшие индексы сапробиотности. Данные результаты свидетельствуют о достаточно эффективной биогенной детоксикации и осаждении токсических веществ на вышерасположенных участках, а также о разбавляющем влиянии больших масс воды реки Днепр на приустьевых участках его притоков.

Научная новизна. Впервые проведена оценка экологического состояния участков реки Мокрая Сура на основании результатов комплексного исследования структурно-функциональных показателей зоопланктона и зообентоса в период максимального

розвитку гідробіоценозу.

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы при гидроэкологическом мониторинге для выявления опасного экологического состояния малых рек и предотвращения дальнейшей деградации их экосистем, а также при расчете убытков, причиненных рыбному хозяйству вследствие влияния сточных вод.

Ключевые слова: река Мокрая Сура, эвтрофикация, зоопланктон, зообентос, олигохеты, бделлоидные коловратки.

ZOOPLANKTON AND ZOOBENTHOS OF THE MOKRA SURA RIVER

V. Yakovenko, yakovenko@ukr.net, Department of General Biology and Water Bioresources, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

O. Fedonenko, hydro-dnu@ukr.net, Department of General Biology and Water Bioresources, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

N. Tushnytska, n-tushnitska@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To study the spatial distribution of structural and functional indicators of zooplankton and zoobenthos during the period of maximum development of hydrobiocenosis in the contaminated and conditionally clean sites of the Mokra Sura river being under antropogenic pressure.

Methodology. During the collection and subsequent laboratory processing of zooplankton and zoobenthos samples, we used the standard conventional hydrobiological methods. In order to rank the studied river sites, we used the combined index of the community state (CICS) based on the structural-functional indicators of zoobenthos.

Findings. The research results have shown that the species composition of zoobenthos and zooplankton of the Mokra Sura river included many saprobiontic species such as oligochaetes, chironomids and rotifers, which were developed significantly in some sites under the effect of eutrophication and silt accumulation in the presence of anthropogenic pollution. The above-mentioned processes cause inhibition of the life activity of such filter feeders as mollusks and crustaceans being the most powerful zooplanktonic and zoobenthic agents of self-cleaning. The highest numbers of zooplankton and zoobenthos development were recorded in front of the point of the emergency discharge of right-bank sewage water (stimulating effect of organic pollution) while the lowest numbers were registered near the tire plant (combined effect of both chemical sewage pollution and silt accumulation). In the «Dnipro - Zaporizhzhia highway» site, low numbers of zooplankton development were the result of silt accumulation, whereas the zoobenthos biomass turned out to be the highest due to the intensive development of oligochaetes. Planktonic saprobiontic rotifers dominated in the site located in front of the sewage discharge whereas bdelloid rotifers dominated in the upstream sites of the river. The dominance of planktonic and benthic saprobiontic rotifers caused the highest saprobity indices in these sites. According to CICS index, the sites of 3 km and 2 km upstream from the river mouth were the purest ones as indicated by the greatest development of filter feeding crustaceans and the lowest indices of saprobity compared to the other sites studied. These results indicate a very effective biogenic detoxification and precipitation of toxic substances entering the river in the above-mentioned areas, as well as dilution effects of large water masses from the Dnieper River in the mouth areas of its tributaries

Originality. For the first time, the ecological state of the selected sites of the Mokra Sura River was assessed on the basis of the results of a comprehensive study of the structural and functional indicators of zooplankton and zoobenthos during the maximum development of their hydrobiocenosis.

Practical value. The obtained results can be used for hydroecological monitoring to detect the dangerous ecological state of small rivers and to prevent further degradation of the ecosystems of small rivers as well as for calculation of fish losses caused by sewage water effects.

Keywords: mokra Sura river, eutrophication, zooplankton, zoobenthos, oligochaetes, bdelloid rotifers.

ОЦІНЮВАННЯ ТОКСИЧНОСТІ ЗАБРУДНЕНИХ АМОНІАКОМ ВОД НА *CARASSIUS AURATUS GIBELIO* (BLOCH, 1782) МЕТОДОМ «TIME SAMPLING»

Е. О. Аристархова, ella.aryst@gmail.com, Інститут агроекології і
природокористування НААН, м. Київ

Мета. Визначити можливість проведення експрес-оцінки токсичності вод, забруднених амоніаком, за етологічними показниками карася сріблястого *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) з використанням методу «time sampling».

Методика. Для біотестування у серпні 2017 р. на КП «Житомирводоканал» відібрано проби води з Денишівського водосховища р. Тетерів та водопровідної мережі водоканалу, які переливали у акваріуми (10 дм³) і формували контрольну та дослідні групи за наступною схемою: контрольна група — проби чистої відстояної (24 год.) водопровідної води; дослідна група Д-1 — проби води з Денишівського водосховища з концентрацією загального амоніаку 1,5 мг/дм³; дослідна група Д-2 — проби відстояної (24 год) водопровідної води з додаванням розчину амоніаку до концентрації 1,5 мг/дм³. Тест-об'єкти — самиці карася сріблястого, у яких визначали показники типової і нетипової рухової активності та кормової поведінки. Експонування особин — 12 год. Індекси токсичності вод розраховували за загальноприйнятою формулою.

Результати. У дослідженнях була визначена можливість проведення експрес-оцінки токсичності вод, забруднених амоніаком та іонами амонію, за етологічними показниками карася сріблястого (*C. auratus gibelio*) з використанням методу «time sampling», який полягає у миттєвій фіксації кількості особин, що надають перевагу тому чи іншому акту поведінки. Показано, що самиці карася сріблястого реагували на вміст цих забруднювачів порушенням рухової та кормової поведінки. Відстояна водопровідна вода, штучно забруднена амоніаком (група Д-2), виявилася для особин більш токсичною, ніж вода, забруднена природним шляхом (група Д-1). У групі Д-1 іммобілізація особин була на 6,60% меншою, а виживання — на 11,11% більшою у порівнянні з групою Д-2. На відміну від риб дослідних груп, у особин контрольної групи були виявлені лише поодинокі нетипові етологічні акти. Розрахунок індексів токсичності за вказаними показниками поведінки самиць карася сріблястого засвідчив переважно середній (група Д-1) та високий (група Д-2) рівні гострої токсичності дослідних вод.

Наукова новизна. Вперше проведено експрес-оцінку токсичності вод з підвищеним вмістом амоніаку та іонів амонію (1,5 мг/дм³) шляхом спостереження за руховою активністю та кормовою поведінкою карася сріблястого (*C. auratus gibelio*) методом «time sampling».

Практична значимість. Результати досліджень використовуються для експрес-оцінки токсичності вод водосховищ р. Тетерів.

Ключові слова: експрес-оцінка, токсичність вод, амоніак, амоній, біотестування, поведінка, *C. auratus gibelio*, «time sampling».

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

В останні десятиліття значна кількість водних об'єктів України, переважно невеликі озера, ставки та водосховища, потерпають від підвищеного вмісту

© Е. О. Аристархова, 2017

амоніаку, який утворюється внаслідок активізації процесів гниття відмерлих водоростей, замореної риби та інших загиблих організмів. Швидко розчиняючись у воді, амоніак дисоціює до іонів амонію, що є надзвичайно небезпечним для гідробіонтів та людини [1–3].

Крім природного шляху утворення амоніаку, існує і антропогенний шлях його надходження у водне середовище, основними джерелами якого вважаються поверхневий стік сільськогосподарського походження, що містить залишки амонійних добрив та змиви з тваринницьких ферм і приватних господарств; стічні побутові води, багаті на детергенти, включаючи амоніак та іони амонію; погано очищені зворотні води, а іноді й неочищені стоки підприємств хімічної, харчової та деяких інших видів промисловості тощо.

Особливу небезпеку несуть залпові скиди, у яких амоніак та іони амонію знаходяться у великих концентраціях. Проте надходження у води їх помірних кількостей також може призводити до порушення гідрохімічного режиму водойм та отруєння гідробіонтів [1, 4]. Тому виявлення у воді амоніаку та іонів амонію з перших годин їх утворення або/та надходження у складі стоків є надзвичайно актуальним для збереження екологічної рівноваги вод та захисту водних організмів від загибелі.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Підвищена концентрація іонів амонію, продуктів розщеплення амоніаку, може бути використана у якості індикаторного показника, що відбиває погіршення санітарного стану водного об'єкта і вказує на процеси забруднення поверхневих вод, найімовірніше, побутовими та сільськогосподарськими стоками [1–4].

Вміст амоніаку та іонів амонію у природних водах найчастіше варіює у межах від 0,01 до 0,20 мг/дм³ у перерахунку на нітроген. Присутність у незабруднених поверхневих водах іонів амонію пов'язана з процесами біохімічної деградації білкових речовин, дезамінуванням амінокислот, розкладанням сечовини тощо [1–4]. Тобто амоніак утворюється внаслідок розщеплення органічних речовин, які містять нітроген.

Гранично допустима концентрація амоніаку у водах господарсько-питного і культурно-побутового водокористування (ГДК_В) встановлена на рівні 2 мг/дм³, тобто значно вище, ніж у водах рибогосподарського призначення та у питній воді — 0,5 мг/дм³ [1–4]. Однак іноді гідробіонти виживають за умов багаторазових перевищень ГДК_В, що обумовлено їх адаптаційними властивостями, а також присутністю у водних об'єктах буферних систем, здатних знижувати небезпечну дію амоніаку та іонів амонію. А за руйнування таких систем чи порушення деяких гідрохімічних показників (наприклад, підвищення значення рН) водні організми можуть гинути, коли ГДК_В лише незначно перевищується [4]. Вказані обставини засвідчують необхідність разом з хімічним аналізом вод проводити їх експрес-оцінку за допомогою біотестування на типових для цих вод гідробіонтах — пелагіальних рибах, зокрема на *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782), що повинно сприяти швидшому та ефективнішому отриманню даних про гостру токсичність водного середовища.

Відповідно, метою досліджень є визначення можливості проведення експрес-оцінки токсичності вод, забруднених амоніаком та іонами амонію, за етологічними показниками карася сріблястого (*C. auratus gibelio*) з використанням методу «time sampling».

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Для реалізації мети досліджень проведено порівняльний аналіз токсичності вод, проби яких були відібрані сумісно із співробітниками КП «Житомирводоканал» з водосховищ р. Тетерів та водопровідної мережі водоканалу у серпні 2017 р. у розрахунку 8 дм³ на групу за загальноприйнятою методикою [4]. Після відбору водних проб їх переливали у акваріуми (10 дм³) і формували контрольну та дослідні групи за наступною схемою:

- *контрольна група* — проби чистої відстояної (24 год) водопровідної води;
- *дослідна група Д-1* — проби води з Денишівського водосховища з концентрацією амоніаку 1,5 мг/дм³;
- *дослідна група Д-2* — проби відстояної (24 год) водопровідної води з додаванням розчину амоніаку (25% NH₃) до концентрації 1,5 мг/дм³.

Тест-об'єкти: самиці карася сріблястого (*C. auratus gibelio*), аналоги за віком (3 тижні).

Утримання: в акваріумах на 10 дм³ води, концентрація кисню у якій — не менше 6 мг/дм³, температура — +20±2,5°C, рН — 7,5, а щільність посадки — 1 особина/дм³ в умовах природної освітленості.

Годівля: постійно — рослинами (водорості, листя водних рослин), а на початку кожного тестування — сухим (дафнії) та живим (циклопи, трубочник) тваринним кормом.

Тест-реакції: плавний, стрибкоподібний (векторний) та спіралеподібний рух, контакти з іншими особинами, малорухливий стан, вистрибування з води, іммобілізація та загибель, поїдання корму і детриту, відмова від їжі.

Експонування: на гостру токсичність (acute toxicity) впродовж 12-ти год.

Біотестування: спостереження за етологічними актами особин методом «time sampling» через кожні 4 год.

Уміст загального амоніаку у воді визначали фотометричним методом з реактивом Неслера, концентрацію розчиненого кисню контролювали оксигенометром, значення водневого показника — рН-метром, температуру — водним термометром.

Експерименти проводили у 3-кратній повторності, використовуючи стандартні методики та власні розробки [3, 5—10].

Отримані у дослідних групах дані порівнювали з контролем. Для обох дослідних проб води розраховували індекс токсичності, використовуючи загальноприйняту формулу:

$$T = \frac{I_{\kappa} - I_o}{I_{\kappa}} 100,$$

де: T — індекс токсичності, %;

I_k — величина тест-реакції особин у контролі;

I_o — величина тест-реакції особин у досліді.

Для розрахунку індексу токсичності вод за реакціями риб, що характеризують акти їх нетипової поведінки, формула видозмінюється таким чином, що величини тест-реакції особин у контролі та досліді замінюються на протилежні. Значення індексів токсичності понад 50% вказують на небезпечність вод для живих організмів та людини.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

У дослідженнях була визначена можливість проведення експрес-оцінки токсичності вод, забруднених амоніаком та іонами амонію, за етологічними показниками карася сріблястого (*C. auratus gibelio*) з використанням методу «time sampling», який полягає у миттєвій фіксації кількості особин, що надають перевагу тому чи іншому акту поведінки.

Було показано, що самиці карася сріблястого, яких використовували у тестуванні дослідних проб води, реагували на вміст амоніаку та іонів амонію порушенням рухової та кормової поведінки. Відстояна водопровідна вода, штучно забруднена амоніаком (група Д-2), виявилася для особин більш токсичною, ніж вода, забруднена у природних умовах (група Д-1).

Під час біотестування на рибах (через кожні 4 год. з початку експозиції) найкращі результати було отримано на 12-ту годину. Серед усіх етологічних актів особин виявлено такі, що можуть бути використані для визначення загальної та специфічної токсичності дослідних вод на амоніак та іони амонію: перевага стрибкоподібних (векторних) та спіралеподібних рухів над плавними, вистрибування з води, іммобілізація, відмова від корму.

Основні етологічні показники риб відображено у табл. 1:

Таблиця 1. Біотестування вод з підвищеним вмістом амоніаку та іонів амонію на *C. auratus gibelio* методом «time sampling» (n=30)

Етологічні реакції особин	Відносна кількість особин та індекс токсичності дослідних вод, %				
	К	Д1	Т _{Д1}	Д2	Т _{Д2}
Типова рухова активність	50,00	23,33	53,34	13,33	73,34
плавні рухи	33,33	10,00	70,00	6,67	79,99
контакти з іншими особинами	13,34	10,00	25,04	3,33	75,04
малорухливий стан	3,33	3,33	відсут.	3,33	відсут.
Нетипова рухова активність*	19,99	60,00	66,68	80,01	75,02
векторні рухи*	3,33	16,67	80,02	20,00	83,35
спіралеподібні рухи*	3,33	6,66	50,00	10,00	66,70
вистрибування з води*	3,33	10,00	66,70	13,34	75,04
іммобілізація*	6,67	16,67	59,99	23,33	71,41
загибель*	3,33	10,00	66,70	13,34	75,04

Етологічні реакції особин	Відносна кількість особин та індекс токсичності дослідних вод, %				
	К	Д1	Т _{д1}	Д2	Т _{д2}
Кормова поведінка	30,01	16,67	44,45	6,66	77,81
поїдання корму	16,67	6,67	59,99	3,33	80,02
живлення детритом	13,34	10,00	25,04	3,33	75,04

Примітки: 1) Т_{д1}, Т_{д2} — індекси токсичності дослідних вод, %; відсут. — відсутність токсичності води;

2) * — показники, за якими індекс токсичності розраховується за

видозміненою формулою: $T = \frac{I_o - I_k}{I_o} 100, \%$.

Наведені у таблиці дані свідчать про те, що поведінка риб у обох дослідних групах суттєво відрізнялась від поведінки особин у контролі. Перші п'ятнадцять хвилин перебування у акваріумах дослідні риби знаходились майже на поверхні води, на відміну від контрольних, які досить глибоко занурилися у воду, виявляючи ознаки типової рухової активності. У подальшому особини першої і другої груп часто наближались до поверхні, виконуючи векторні рухи, у тому числі кидки, або декілька особин недовго перебували у малорухливому стані. Нетипова кормова поведінка риб виявлялася у тому, що вони живились детритом, хоча були добре забезпечені кормом, чи взагалі відмовлялись від живлення будь-чим. Впродовж перших 4-х годин знаходження у акваріумах риби дослідних груп вистрибували з води та виконували спіралеподібні рухи. На відміну від контрольних, більшість дослідних риб набували іммобілізованого стану, який часто закінчувався втратою їх життєздатності. У особин першої дослідної групи більшою мірою спостерігались порушення рухової активності (векторний рух у вигляді безладних кидків, переміщення по спіралі, наближення до поверхні і вистрибування з води) та кормової поведінки (байдужість до їжі) порівняно з особинами другої групи. Так, у групі Д-1 іммобілізація риб була на 6,60% меншою, а виживання на 11,11% вищим, ніж у групі Д-2.

Причина подібних етологічних порушень полягає у тому, що в умовах, коли рН води є меншим за 8, а температура підтримується у межах 20±2,5°C, амоніак знаходиться переважно у вигляді іонів амонію. Проте амоній у концентрації 1 мг/дм³ викликає, як відомо, низку патологічних змін у гідробіонтів [4]: знижує спроможність гемоглобіну риб приєднувати кисень, викликає збудження центральної нервової системи, уражає зябровий епітелій тощо. З підвищенням концентрації іонів амонію у воді наслідки отруєння риб стають ще більш чітко вираженими: частина особин внаслідок судом стає малорухливою, а частина продовжує перебувати у збудженому стані, який з часом переходить у стан так званого кисневого стресу, покрови тіла починають виділяти слиз. Особини переміщуються кидками, часто вистрибують з води, відкривають зяброві кришки та намагаються захоплювати ротом повітря [4, 11, 12].

У проведених нами дослідженнях на 12-ту год. експерименту за концентрації загального амоніаку 1,5 мг/дм³ у 2-ій дослідній групі усі поведінкові реакції риб

були досить типовими та відповідали специфічним реакціям щодо дії амоніаку та іонів амонію. У 1-ій дослідній групі тест-реакції риб були менш чіткими, у порівнянні з особинами 2-ої групи, а судоми та загибель риб спостерігались меншою мірою, ніж у воді, штучно забрудненій амоніаком. Це свідчить про наявність у природній воді буферної системи, здатної протистояти токсичній дії вказаних забруднювачів.

Для аналізу результатів біотестування було використано запропоновану нами шкалу рівнів токсичності вод, апробовану у дослідженнях на дафніях, яка цілком може бути використана і для визначення рівнів токсичності вод за тестуванням на *C. auratus gibelio* [3, 5]: 1–25 % — допустимий рівень токсичності; 26–50% — низький рівень токсичності; 51–75% — середній рівень токсичності; 76–100% — високий рівень токсичності. Відповідно до неї, визначено, що води, забруднені амоніаком у природних та штучних умовах, мали хоча і неоднаковий, проте небезпечний рівень токсичності (значення відповідних індексів понад 50%).

Таким чином, аналіз отриманих у дослідженнях даних свідчить про те, що запропонований для проведення експрес-оцінки води, забрудненої амоніаком та іонами амонію, метод «time sampling» за специфічними тест-реакціями самиць карася сріблястого дозволив зафіксувати переважно середній (група Д1) та високий (група Д2) рівні гострої токсичності дослідних вод.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

У дослідженнях було визначено можливість використання методу «time sampling» на самицях карася сріблястого (*C. auratus gibelio*) для експрес-оцінки токсичності вод поверхневих джерел водопостачання м. Житомира, забруднених амоніаком та іонами амонію. Підтверджено перевагу використаних нами етологічних показників у порівнянні з іншими тест-реакціями риб. Показано, що вода, штучно забруднена амоніаком, була для особин більш токсичною, ніж природна вода з такою самою концентрацією цієї речовини. Тобто у Денишівському водосховищі р. Тетерів існує регулююча система, яка здатна певною мірою зменшувати небезпеку від присутності у воді амоніаку та іонів амонію для пелагіальних риб.

У подальшому доцільно провести аналогічні дослідження на більш чутливих до дії амоніаку та іонів амонію тест-об'єктах, у тому числі використати витриману у чистій воді ікру самок карася сріблястого, отриману від протестованих в наших дослідженнях особин, для прижиттєвої оцінки на ній ембріотоксичної і тератогенної дії вод водосховищ р. Тетерів та питної води КП «Житомирводоканал».

ЛІТЕРАТУРА

1. Запольський А. К., Шумигай І. В. Охорона питних вод від виснаження і забруднення // Агроекологічний журнал. 2015. № 3. С. 6—15.
2. Malik A., Grohmann E., Akhtar R. Environmental Deterioration and Human Health: Natural and anthropogenic determinants. Dordrecht ; Heidelber ; London ; New York : Springer, 2014. P. 8—23.
3. ДСанПіН 2.2.4–171–10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. Київ : МОЗ України, 2010. 50 с. (МОЗ України. Державні стандартні норми та правила).

4. Дудник С. В. Водна токсикологія : метод. посіб. Ч. 2 : Іхтіотоксикологія. Київ, 2014. 108 с.
5. Аристархова Е. О. Експрес-оцінка потенційної небезпеки води методом біотестування на *Daphnia magna* S. // Вісник аграрної науки. 2017. № 2. С. 50—54.
6. КНД 211.1.4.057-97. Методика визначення гострої летальної токсичності води на рибах *Poecilia reticulata* Peters. Київ, 1997.
7. ISO 7346-1:1996. Water quality. Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [*Brachydanio rerio* Hamilton-Buchanan (*Teleostei, Cyprinidae*)]. Part 1: Static method.
8. Szczerbinska N., Galczyńska M. Biological methods used to assess surface water quality // Arch. Pol. Fish. 2015. Vol. 43. P. 185—196.
9. Стецюк Л. М. Використання методів біоіндикації та біотестування для оцінки стану водних екосистем // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2013. Вип. 2 (62). С. 175—181. (Сільськогосподарські науки).
10. Комплексна оцінка токсичності водних зразків за допомогою рослинних і тваринних тест-організмів / Осмалений М. С. та ін. // Фактори експериментальної еволюції організмів. 2015. Т. 16. С. 74—77.
11. River watch. Manual for public environmental monitoring. Saint Petersburg : Friends of the Baltics / Coalition Clean Baltics, 2015. 32 p.
12. Jakob U., Reichmann D. Oxidative Stress and Redox Regulation. Dordrecht ; Heidelberg ; London ; New York : Springer, 2013. P. 59—126.

REFERENCES

1. Zapolskyi, A. K., & Shumigay, I. V. (2015). Okhorona vod vid vysnazhennia i sabrudnennia. *Agroecologichnyi zhurnal*, 3, 6-15.
2. Malik, A., Grohmann, E., & Akhtar, R. (2014). *Environmental Deterioration and Human Health: Natural and anthropogenic determinants*. Dordrecht; Heidelberg; London; New York: Springer, 8-23.
3. Higiyenichni vymogy do vody pytnoi, prysnachenoï dlya spo vzhyvannya ludynoiu (2010). *DSanPiN 2.2.4-171-10*. Kyiv: Ministerstvo okhorony sdorovia Ukrainy.
4. Dudnik, S. V. (2014). *Vodna toksykologia: metod. posib.* (Part 2: Ichtiotoksykologia). Kyiv.
5. Arystarkhova, E. O. (2017). Ekspres-otsinka potentsiinoï nebespeky vody metodom biotestuvannia na *Daphnia magna* S. *Visnyk agrarnoi nauky*, 2, 50-54.
6. Metodyka vysnashennia gostroi letalnoi toksyshnosti vody na rybakh *Poecilia reticulata* Peters. (1997). KND 211.1.4.057-97. Kyiv.
7. Water quality. Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [*Brachydanio rerio* Hamilton-Buchanan (*Teleostei, Cyprinidae*)]. (1996). (Part 1: Static method). *ISO 7346-1:1996*.
8. Szczerbinska, N., & Galczyńska, M. (2015). Biological methods used to assess surface water quality. *Arch. Pol. Fish.*, 43, 185-196.
9. Stetsiuk, L. M. (2013). Vykorystannia metodiv bioindycatsii ta biotestuvannia dla otsinky stanu vodnykh system. *Visnyk Nationalnogo universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia*, 2 (62), 175-181.

10. Osmalenyi, M. S., Holovkov, A. M., Nanijeva, A. V., & Vergolias, M. R. (2015). Kompleksna otsinka toksychnosti vodnykh srazkiv za dopomogou roslynnykh i tvarynykh test-orhanizmiv. *Fakty eksperymentalnoi evolutsii orhanismiv*, 16, 74-77.
11. *River watch. Manual for public environmental monitoring* (2015). Saint Petersburg: Friends of the Baltics / Coalition Clean Baltics.
12. Jakob, U., & Reichmann, D. (2013). *Oxidative Stress and Redox Regulation*. Dordrecht; Heidelberg; London; New York: Springer, 59-426.

ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ АММИАКОМ ВОД ДЛЯ *CARASSIUS AURATUS GIBELIO* (BLOCH, 1782) МЕТОДОМ «TIME SAMPLING»

Э. А. Аристархова, ella.aryst@gmail.com, Институт агроэкологии и природопользования НААН, г. Киев

Цель. Определить возможность проведения экспресс-оценки токсичности вод, загрязненных аммиаком, по этологическим показателям карася серебристого *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) с использованием метода «time sampling».

Методика. Для биотестирования в августе 2017 г. отбирали водные пробы с водохранилищ р. Тетерев, переливали их в аквариумы (10 дм³) и формировали контрольную и опытные группы по следующей схеме: контрольная группа — пробы чистой отстоянной (24 ч) водопроводной воды; опытная группа Д-1 — пробы воды из Денишовского водохранилища с концентрацией общего аммиака 1,5 мг/дм³; опытная группа Д-2 — пробы отстоянной (24 ч) водопроводной воды, в которые доливали раствор аммиака до концентрации 1,5 мг/дм³. Тест-объектами были самки *C. auratus gibelio*, у которых определяли показатели типичной и нетипичной двигательной активности и кормового поведения. Экспонирование особей производили в течение 12-ти часов. Индексы токсичности вод рассчитывали по общепринятой формуле.

Результаты. В исследованиях была определена возможность проведения экспресс-оценки токсичности вод, загрязненных аммиаком и ионами аммония, по этологическим показателям карася серебристого *C. auratus gibelio* с использованием метода «time sampling», который заключается в мгновенной фиксации количества особей, которые отдают предпочтение тому или иному акту поведения. Показано, что самки карася серебристого реагировали на содержание этих загрязнителей нарушением двигательной активности и кормового поведения. Отстоянная водопроводная вода, искусственно загрязненная аммиаком (группа Д-2), оказалась для особей более токсичной, чем вода, загрязненная естественным путем (группа Д-1). В группе Д-1 иммобилизация особей была на 6,60% меньшей, а выживание на 11,11% большим по сравнению с группой Д-2. В отличие от рыб опытных групп, у особей контрольной группы были выявлены лишь отдельные нетипичные этологические акты. Расчет по указанным показателям поведения индексов токсичности, которые превышали 50%, засвидетельствовал преимущественно средний (группа Д-1) и высокий (группа Д-2) уровни острой токсичности опытных вод.

Научная новизна. Впервые проведена экспресс-оценка токсичности вод с повышенной концентрацией аммиака и ионов аммония (1,5 мг/дм³) путем наблюдения за двигательной активностью и кормовым поведением карася серебристого (*C. auratus gibelio*) методом «time sampling».

Практическая значимость. Результаты исследований используются для экспресс-оценки токсичности вод водохранилищ р. Тетерев.

Ключевые слова: экспресс-оценка, токсичность вод, аммиак, аммоний, биотестирование, *C. auratus gibelio*, «time sampling».

**EVALUATION OF THE TOXICITY OF AMMONIA POLLUTED
WATERS FOR *CARASSIUS AURATUS GIBELIO* (BLOCH, 1782)
BY THE «TIME SAMPLING» METHOD**

E. Arystarkhova, ella.aryst@gmail.com, Institute of Agrarian Ecology and Nature Use
NAAS, Kyiv

Purpose. To determine the possibility of performing an express-evaluation of the toxicity of ammonia polluted waters based on ethological parameters of *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) with the use «time sampling» method.

Methodology. For biotesting in August 2017, water samples were taken from the Denishevsky reservoir of the Teteriv river and water supply network of the water service company, which were placed in aquaria (10 dm³) and a control and experimental groups of fish were formed according to the following scheme: control group – samples of settled (24 hours) clean tap water; experimental group D-1 – water samples from the Denishevsky reservoir with the total ammonia concentration of 1.5 mg/dm³; experimental group D-2 – samples of settled (24 hours) tap water with the total ammonia concentration of 1.5 mg/dm³. Test-objects were females of *C. auratus gibelio*, in which the parameters of typical and non-typical motor activity and feeding behavior were determined. Fish were exposed for 12 hours. For both experimental groups, water toxicity indexes were calculated in comparison with the control.

Findings. In the studies, we showed the possibility of using the «time sampling» method for rapid assessment of the toxicity of polluted waters with ammonium concentration of 1.5 mg/dm³ based the ethological parameters of Prussian carp (*C. auratus gibelio*), which included the instantaneous fixation of the number of individuals preferring one or another act of behavior. It was shown that *C. auratus gibelio* females reacted on ammonia content by impairing the motor and feeding behavior. Settled tap water artificially pollution with ammonia (group D-2) appeared to be more toxic for fish than water polluted by natural way. Immobilization of individual fish in the group D-1 was 6.60% lower, while their survival rate was 11.11% hogher compared to the group D-1. Unlike fish of the experience groups, fish in the control group exhibited only single untypical ethological acts. The calculation based on the behavioral parameters of Prussian carp females demonstrated mainly medium (group D-1) and high (group D-2) levels of acute toxicity of experimental waters.

Originality. For the first time, the express-evaluation of the toxicity of water with elevated ammonium content (1.5 mg/dm³) was carried out by observing the motor activity and feeding behavior of Prussian carp (*C. auratus gibelio*) by the «time sampling» method.

Practical use. The results of the study are used for the rapid assessment of the toxicity of water of surface water sources of the Teteriv river.

Keywords: express-evaluation, water toxicity, ammonia, ammonium, biotesting, behaviour, *C. auratus gibelio*, «time sampling».

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 42-52
DOI: 10.15407/fsu2017.04.042
УДК 639.2.03:597.5

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАРИБНЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО (ДНІПРОВСЬКОГО) ВОДОСХОВИЩА

О. В. Федоненко, hydrodnu@gmail.com, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
О. М. Маренков, gidrobions@gmail.com, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
О. О. Петровський, hydro-dnu@ukr.net, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
О. С. Нестеренко, Nefesst@gmail.com, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Мета. Розробити екологічно ефективні заходи щодо зарибнення Запорізького (Дніпровського) водосховища цінними видами риб шляхом вивчення біологічних і рибогосподарських аспектів формування та експлуатації їхнього промислового запасу.

Методика. В ході роботи використовували узагальнені результати комплексних гідробіологічних досліджень, що проводилися протягом 2015-2017 рр. Матеріали збирали на акваторії Запорізького (Дніпровського) водосховища стандартними знаряддями для відбору проб. Відбір та опрацювання проб фіто-, зоопланктону та зообентосу здійснювали за загальноприйнятими в гідробіології методами.

Результати. Визначено стан кормової бази Запорізького (Дніпровського) водосховища та його продукційні можливості. На підставі отриманих даних визначено потенційну продуктивність водосховища.

Встановлено, що у Запорізькому (Дніпровському) водосховищі утворені певні резерви кормової бази, які дозволяють проводити численне зарибнення його молоддю промислових видів риб. Розраховано рекомендовані обсяги зарибнення водосховища на 2017 р.: короп 1+ (індивідуальною масою 100–130 г) — 285 тис. екз.; білий товстолобик 1+ (100–130 г) — 1560 тис. екз.; строкатий товстолобик 1+ (100–130 г) — 200 тис. екз.; білий амур (100–130 г) — 220 тис. екз.; лин 0+ (10–20 г) — 135 тис. екз.; щука 0+ (100 г) — 83 тис. екз.; судак 1+ (індивідуальною масою 100 г) — 83 тис. екз.

Наукова новизна. Представлені результати досліджень стану кормової бази водосховища та розраховано обсяги зарибнення водойми, що створює засади раціонального користування водними біоресурсами зі збереженням репродуктивного потенціалу промислових видів риб в умовах ведення промислу на Запорізькому (Дніпровському) водосховищі.

Практична значимість. Реалізація заходів із зарибнення водосховища дозволяє покращити загальний екологічний стан водойми та підвищити його рибопродуктивність в умовах рибогосподарської експлуатації.

Ключові слова: Запорізьке (Дніпровське) водосховище, зарибнення, кормова база, короп, білий товстолобик, строкатий товстолобик.

© О. В. Федоненко, О. М. Маренков, О. О. Петровський, О. С. Нестеренко,
М. Ю. Симон, 2017

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

З утворенням у 1960–1961 рр. Кременчуцького водосховища, а пізніше й останніх чотирьох водосховищ дніпровського каскаду, розпочався новий етап у формуванні іхтіоценозу Запорізького (Дніпровського) водосховища. Фундаментальні дослідження особливостей відтворення риб в умовах каскадності показали, що зі змінами рівневого режиму відбувається значне скорочення нерестових площ, порушуються строки нересту та знижуються репродуктивні показники риб [1, 2].

Перш за все страждають фітофільні риби (сазан, щука), які відкладають ікру на коріння рослин безпосередньо поблизу берегів [2]. Прибій хвиль, коливання рівня води, відсутність відповідного субстрату призводять до щорічної загибелі не менше 70–80% відкладеної ікри [2, 3]. Нестабільний температурний режим спричинює переродження ікри і зменшення абсолютної плодючості. Найбільш пристосованими до коливань рівневого та температурного режиму водосховища виявились фітофіли, які відкладають ікру на глибинах у відкритих акваторіях (плітка, лящ, плоскирка, судак), а також риби, що мають пелагічну ікру (тюлька).

Значне скорочення нерестових площ відбулось після спорудження греблі вищерозташованого Дніпродзержинського водосховища (1963–1964 рр.) [2, 3]. Гідроспороди загородили шляхи риб до нерестовищ, які знаходились вище м. Кам'янське. Практично були знищені нерестові угіддя Курилівських та Миколаївських плавнів, що знаходились нижче греблі Кам'янського гідровузла. Порушення нерестових та нагульних міграцій риб внаслідок зарегулювання верхньої ділянки водосховища спричинило підриб рибних запасів, про що свідчить падіння промислових уловів та зниження рибопродуктивності більш ніж удвічі за відносно короткий період часу.

Антропогенний вплив на екосистему Запорізького (Дніпровського) водосховища значно посилювався з бурхливим ростом гірничорудної, металургійної, хімічної індустрії та сільського господарства, який відбувався у 70–90-х роках минулого століття в таких промислово розвинених регіонах, як Дніпропетровська та Запорізька області. Масштабне забруднення акваторії стічними водами, прибережне будівництво, неконтрольовані аматорські лови разом із сезонними коливаннями рівневого режиму спричиняли підриб репродуктивних можливостей промислових риб, що негативно відображалось на показниках їх уловів [3, 4].

У 1974–1975 рр. іхтіофауна Запорізького (Дніпровського) водосховища налічувала 47 видів риб. Серед них промислове значення мали 20 видів і 1 підвид. У промислі домінували тарань (42,9%) і лящ (23,6%). У цей період іхтіофауну Запорізького (Дніпровського) водосховища поповнили три види риб далекосхідного комплексу — білий і строкатий товстолобики та білий амур [3]. Штучне вселення товстолобиків загальною кількістю 440 тис. екз. відбувалось у 1971 і 1972 рр. З того часу вони регулярно присутні у промислі.

Показники рибопромислу у 70-ті роки залишались досить низькими — на рівні 500 т, головним чином через падіння чисельності ляща, судака, коропа (сазана) та плоскирки, які складали основу промислу. Рибопродуктивність у Запорізькому (Дніпровському) водосховищі на той період складала в середньому 12 кг/га [8, 9].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

З метою збільшення запасів промислово-цінних видів риб групою вчених Дніпропетровського державного університету під керівництвом спочатку проф. Г. Б. Мельникова, а потім В. Л. Булахова розроблявся комплекс рибницько-меліоративних заходів, які передбачали: щорічне зарибнення водосховища молоддю коропа (сазана) у кількості 2–3 млн екз.; будівництво риборозплідника для вирощування та регулярної інтродукції у водосховище молоді аборигенних видів риб (ляща, судака, щуки), а також представників далекосхідної іхтіофауни (білого та чорного амура, товстолобиків); щорічне використання штучних нерестовищ (гнізд); лімітування промислу ляща та судака. Часткове здійснення рекомендованих робіт дозволило підвищити рибопродуктивність водосховища до 18 кг/га.

Взагалі у Запорізькому (Дніпровському) водосховищі, на відміну від інших водосховищ дніпровського каскаду, формування іхтіофауни більш ніж 30 років відбувалося стихійно. Лише наприкінці 60-х років минулого століття почали впроваджуватись заходи з цілеспрямованого формування промислової іхтіофауни, а саме: лімітування вилову цінних в господарському значенні видів риб, проведення меліоративного лову короткоциклових видів риб, зарибнення аборигенними видами та акліматизація нових видів риб [9].

На сьогодні раціональне зарибнення водосховищ екологічно та промислово цінними видами риб є одним з головних шляхів поповнення рибних запасів водоймищ та забезпечення населення високоякісною рибною продукцією [8, 9].

Метою проведених науково-дослідних робіт було розроблення екологічно ефективних заходів щодо зарибнення Запорізького (Дніпровського) водосховища цінними видами риб шляхом вивчення біологічних і рибогосподарських аспектів формування та експлуатації їх промислового запасу.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Відбір та опрацювання проб фіто- і зоопланктону та зообентосу здійснювали за загальноприйнятими в гідробіології методами [5–7, 10]. Проби фітопланктону відбирали батометром Молчанова та сіткою Апштейна. Фіксували проби 4%-им формальдегідом. Визначення видів виконували згідно з класичними методами [5]. Біомасу визначали за об'ємом клітин, приймаючи питому вагу водоростей, яка дорівнює 1. Оцінка домінування відбувалася за біомасою. До числа домінантів включали види, сумарна біомаса яких складала не менше 80% загальної біомаси фітопланктону.

Проби зоопланктону відбирали на різних біотопах водосховища: в пелагіалі, відкритій літоралі, заростях очерету, заростях рдеснику. Визначали якісний склад та кількісний розвиток зоопланктону. Кількісне опрацювання проб проводили за допомогою підрахунку у камері Богорова з урахуванням чисельності організмів різних розмірно-вікових груп.

Проби зообентосу відбирали дночерпаком Екмана-Берджі за стандартною методикою [5]. Проби фіксували у 4%-му розчині формаліну [5]. Грунт промивався крізь сітку з дрібновічкового млинарського газу. Зважування

проводили на торзійних терезах за групами. Визначення видового складу здійснювали за допомогою мікроскопів МБ-1 та МБС-1.

Для розрахунку обсягів зарибнення використовували усереднені дані щодо кормової бази за останні 5 років. Статистичне опрацювання матеріалу здійснювали з використанням програмних пакетів для персональних комп'ютерів «Microsoft Excel» та «STATISTICA 6.0».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Кормова база водосховища. В пробах фітопланктону діатомові водорості за кількістю видів складали 40%, зелені — 32%, синьозелені — 15%, евгленові — 9%, інші — 4%. За біомасою в Запорізькому (Дніпровському) водосховищі переважали синьозелені — 90%. У середньому у водосховищі біомаса фітопланктону складала: у весняний період — 3,5 г/м³, влітку — 16,2 г/м³, восени — 5,1 г/м³.

Весняний максимум біомаси фітопланктону зумовлюється розвитком діатомових: *Melosira italica*, *Melosira granulata*, *Cyclotella meneghiniana*, *Diatoma vulgare* та ін. Літнє цвітіння води зумовлене розвитком синьозелених: *Microcystis aeruginosa*, *Oscillatoria limnetica*, *Anabaena flos-aquae* та інші. Восени в пробах фітопланктону, у зв'язку з поступовим відмиранням синьозелених водоростей, зростає частка видів діатомових водоростей родів *Stephanodiscus*, *Nitzschia*, *Cyclotella*, *Navicula* та інші.

За розрахунками, середня продукція фітопланктону у водосховищі складає 28100 кг/га. Потенційний приріст іхтіомаси за рахунок фітопланктону становить 168,6 кг/га. Приріст іхтіомаси білого товстолобика за вегетаційний період з урахуванням природної смертності може становити 135 кг/га. Стан розвитку фітопланктону в Запорізькому (Дніпровському) водосховищі дозволяє відмітити наявність значного резерву для підвищення його рибопродуктивності за рахунок вселення фітопланктофага — білого товстолобика.

У складі зоопланктону Запорізького (Дніпровського) водосховища було зафіксовано 103 види, з них — 58 коловертків, 13 веслоногих, 31 гіллястовусих ракоподібних, а також зустрічалися велігери дрейсени — 1 вид.

Домінуючими представниками зоопланктону були такі види: *Eurytemora velox*, *Heteroscope caspia*, *Bosmina longirostris*, *Euchlanis dilatata*, *Asplanchna priodonta*, *Thermocyclops oithonoides*, *Chydorus sphaericus*.

Для розрахунку потенційної рибопродуктивності, що створюється у Запорізькому (Дніпровському) водосховищі за рахунок зоопланктону, використано усереднену біомасу зоопланктону за вегетаційний період (від квітня по жовтень) — 221 мг/м³. Подібне значення біомаси відповідає водоймам низької кормності. З урахуванням середньої глибини водосховища 8 м та продукційно-біомасового (Р/В) коефіцієнта для зоопланктону — 20, продукція зоопланктону Запорізького (Дніпровського) водосховища становить 432 кг/га, що відповідає 52,5 кг/га потенційної рибопродукції.

У складі зообентосу Запорізького (Дніпровського) водосховища знайдено 98 видів зообентосу, які належать до 12 груп. Зафіксовано: серед личинок хірономід — 34 види, олігохет — 22, молюсків — 15, ракоподібних — 9, п'явок — 4, інших

груп — 20. Видовий склад бентофауни водосховища є характерним для водосховищ дніпровського каскаду. В обростаннях дрейсени та на біотопах середньої частини водосховища домінували представники понто-каспійського комплексу. Кількість видів коливалась за станціями від 5 до 25, найменша кількість видів відмічена на мулах профундалі та у забруднених ділянках літоралі, найбільша — в заростях літоральної зони.

На слабо замуленому піску спостерігалися біоценози двох видів дрейсени (*Dreissena bugensis*, *Dr. polymorpha*), яку певною мірою споживає плітка. У середній частині водосховища взимку біомаса «м'якого» зообентосу складала в середньому — 19,5 г/м², а в літній період та восени знижувалась до 3,4–5,6 г/м², що пов'язано з активним живленням риби.

Середня біомаса зообентосу профундалі середньої частини водосховища влітку становила 2,2 г/м², та була майже в 5 разів нижчою біомаси зообентосу у нижній частині, де така сягнула 10,8 г/м². Восени середня біомаса зообентосу знизилась у профундалі середньої частини водосховища до 1,2 г/м², у нижній — до 10,4 г/м².

Враховуючи показники розвитку зообентосу в літоральній частині, середня біомаса «м'якого» зообентосу Запорізького (Дніпровського) водосховища сягнула 11,8 г/м². Це відповідає водоймам високої кормності. Виходячи з Р/В-коефіцієнта зообентосу, рівного 6, знаходимо, що продукція зообентосу Запорізького (Дніпровського) водосховища становить 702 кг/га, що відповідає 49,2 кг/га потенційної рибопродуктивності риб-бентофагів (сазан, лящ, карась сріблястий, плітка та ін.).

Розрахунок обсягів зарибнення. У Запорізькому (Дніпровському) водосховищі утворені певні резерви кормової бази, які дозволяють проводити численне зарибнення його молоддю промислових видів риби. При цьому важливим аспектом даних робіт є використання посадкового матеріалу оптимальної індивідуальної маси, від чого будуть залежати такі важливі показники, як виживання та промислове повернення. Досвід штучного відтворення іхтіофауни дніпровських водосховищ свідчить, що оптимальною віковою групою для посадкового матеріалу є однорічки–дволітки масою не менше 100 г.

Розрахунки зарибнення Запорізького (Дніпровського) водосховища на 2017 р. подані у табл. 1. Для розрахунків фактичної рибопродуктивності за окремими видами риби використовували усереднені показники їх фактичного вилову за останні 5 років.

Білий товстолобик:

середня продукція фітопланктону у водосховищі — 28100 кг/га;

потенційний приріст іхтіомаси за рахунок фітопланктону — 168,6 кг/га;

сумарні втрати іхтіомаси від природної смертності — 33,7 кг/га;

приріст іхтіомаси білого товстолобика за вегетаційний період з урахуванням природної смертності — 135 кг/га;

можливий промисловий вилов білого товстолобика складає 30% від приросту, тобто 40,5 кг/га;

різниця між потенційним та фактичним виловом білого товстолобика = $40,5 - 2,5 = 38,0$ кг/га;

густота посадки білого товстолобика за середньосезонного приросту $0,7$ кг складає: $38,0 : 0,7 = 54,3$ екз./га.

Строкатий товстолобик:

середня продукція зоопланктону водосховища — 432 кг/га;

допустиме вилучення зоопланктону — 50% ;

потенційний приріст іхтіомаси за рахунок зоопланктону — $28,8$ кг/га;

сумарні втрати іхтіомаси від природної смертності — $5,8$ кг/га;

приріст іхтіомаси за вегетаційний період з урахуванням природної смертності та конкуренції інших риб-планктофагів — $11,6$ кг/га;

можливий промисловий вилов строкатого товстолобика складає 30% від приросту, тобто — $3,48$ кг/га;

різниця між потенційним та фактичним виловом строкатого товстолобика = $3,48 - 0 = 3,48$ кг/га;

густота посадки строкатого товстолобика за середньосезонного приросту $0,5$ кг складає: $3,48 : 0,5 = 7$ екз./га.

Сазан (короп):

середня продукція зообентосу водосховища — 702 кг/га;

допустиме вилучення зообентосу — 50% ;

потенційний приріст іхтіомаси за рахунок зообентосу — $49,2$ кг/га;

сумарні втрати іхтіомаси від природної смертності — $9,9$ кг/га;

приріст іхтіомаси коропа за вегетаційний період з урахуванням природної смертності та конкуренції інших риб-бентофагів — $17,4$ кг/га;

можливий промисловий вилов коропа складає 30% від приросту, тобто $5,2$ кг/га;

різниця між потенційним та фактичним виловом коропа: $5,2 - 0,5 = 4,7$ кг/га;

густота посадки коропа за середньосезонного приросту $0,5$ кг складає: $4,7 : 0,5 = 9,4$ екз./га.

Білий амур:

загальна продукція макрофітів водосховища — 223502 т;

планується забезпечити приріст білого амура за рахунок 10% біомаси макрофітів — 22350 т;

потенційний приріст іхтіомаси за рахунок макрофітів за $K_k = 30$ становить 745 т;

сумарні втрати іхтіомаси від природної смертності — $223,5$ т;

приріст іхтіомаси білого амура за вегетаційний період з урахуванням природної смертності — $521,5$ т;

можливий промисловий вилов амура складає 30% від приросту, тобто 156 т;

різниця між потенційним та фактичним виловом амура = $156 - 2,1 = 154$ т;
загальна кількість дволіток білого амура за середньосезонного приросту 0,7 кг складає 220 тис. екз. (табл. 1).

Таблиця 1. Рекомендовані обсяги зарибнення Запорізького (Дніпровського) водосховища у 2017 р.

Вид, вік риби	Наваж-ка, г	Кількість, тис. екз.			Загальна маса, тонн		
		Дн-ська обл.	Зап-зька обл.	Усього	Дн-ська обл.	Зап-зька обл.	Усього
Короп, 1+	100–130	200	85	285	20–26	8,5–11,0	28,5–37,0
Білий товсто-лобик, 1+	100–130	910	650	1560	91–118	65–84	156–203
Строкатий товсто-лобик, 1+	100–130	140	60	200	14–180	6–8	20–26
Білий амур, 1+	100–130	148	72	220	15–19	7–9	22–28

Зарибнення необхідно здійснювати на різних ділянках водосховища з метою зменшення показників смертності та збільшення промповернення. У зоні дії Дніпропетровської держрибінспекції рекомендується таке співвідношення:

- верхня ділянка — 30%,
- середня ділянка — 40%,
- Самарська затока — 30% від загального обсягу риборосадкового матеріалу.

Враховуючи критичний стан популяцій шуки та лина у Дніпровському водосховищі, рекомендується здійснити інтродукцію молоді цих видів риб у водоймище у кількості:

лин — вікова група 0+, індивідуальна маса — 10–20 г, загальна кількість — 135 тис. екз., загальна маса посадкового матеріалу — 1,4–2,7 т;

щука — вікова група 0+, індивідуальна маса 100 г, загальна кількість — 83 тис. екз., загальна маса посадкового матеріалу — 8,3 т;

судак — вікова група 1+, індивідуальна маса — 100 г, загальна кількість — 83 тис. екз., загальна маса посадкового матеріалу — 8,3 т.

Для продуктивного використання запасів зоопланктону і вивільнення їх на приріст іхтіомаси цінних видів риб-планктофагів необхідно організувати в осінньо-зимовий період меліоративні лови малоцінних видів (тюлька і верховодка) дрібновічковим тралом або дрібновічковим неводом, і довести обсяги вилову цих видів риб до 200 т/рік.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Продукція фітопланктону в Запорізькому (Дніпровському) водосховищі складає 28100 кг/га. Потенційний приріст іхтіомаси за рахунок фітопланктону становить 168,6 кг/га. Приріст іхтіомаси білого товстолюбика за вегетаційний період з урахуванням природної смертності може становити 135 кг/га. Стан розвитку фітопланктону у водосховищі дозволяє відмітити наявність значного

резерву для підвищення його рибопродуктивності за рахунок вселення білого товстолобика.

Біомаса зоопланктону, яка створюється у водоймі за вегетаційний період, сягає показника 221 мг/м^3 , що відповідає водоймам низької кормності. Продукція зоопланктону Запорізького (Дніпровського) водосховища становить 432 кг/га , що відповідає $52,5 \text{ кг/га}$ потенційної рибопродукції.

Середня біомаса зообентосу профундалі середньої частини водосховища влітку становила $2,2 \text{ г/м}^2$, що було майже в 5 разів нижче біомаси зообентосу в нижній частині, де така сягнула $10,8 \text{ г/м}^2$. Восени середня біомаса зообентосу знизилась у профундалі середньої частини водосховища до $1,2 \text{ г/м}^2$, у нижній — до $10,4 \text{ г/м}^2$. Середня біомаса м'якого зообентосу Запорізького (Дніпровського) водосховища сягнула $11,8 \text{ г/м}^2$, що відповідає водоймам високої кормності. Продукція зообентосу Запорізького (Дніпровського) водосховища становить 702 кг/га , що відповідає $49,2 \text{ кг/га}$ потенційної рибопродуктивності бентофагів.

У Запорізькому (Дніпровському) водосховищі утворені певні резерви кормової бази, які дозволяють проводити численне зарибнення його молоддю промислових видів риб. Розраховано рекомендовані обсяги зарибнення водосховища на 2017 р.: короп 1+ (індивідуальною масою $100\text{--}130 \text{ г}$) — 285 тис. екз.; білий товстолобик 1+ ($100\text{--}130 \text{ г}$) — 1560 тис. екз.; строкатий товстолобик 1+ ($100\text{--}130 \text{ г}$) — 200 тис. екз.; білий амур ($100\text{--}130 \text{ г}$) — 220 тис. екз.; лин 0+ ($10\text{--}20 \text{ г}$) — 135 тис. екз.; щука 0+ (100 г) — 83 тис. екз.; судак 1+ (індивідуальною масою 100 г) — 83 тис. екз.

Зарибнення необхідно здійснювати на різних ділянках водосховища з метою зменшення показників смертності та збільшення промповернення. У зоні дії Дніпропетровської держрибінспекції рекомендується таке співвідношення: верхня ділянка водосховища — 30%, середня — 40%, Самарська затока — 30% від загального обсягу рибопосадкового матеріалу.

Перспективність проведених досліджень полягає в розробленні підходів та реалізації засад раціонального користування водними біоресурсами зі збереженням репродуктивного потенціалу промислових видів риб в умовах ведення промислу на Запорізькому (Дніпровському) водосховищі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Біолого-екологічна та рибогосподарська оцінка малих водойм Дніпропетровської області / Федоненко О. В. та ін. // Вісник Запорізького національного університету. 2013. № 1. С. 68—76.
2. Сучасні проблеми гідроекології: Запорізьке водосховище / Федоненко О. В. та ін. Дніпропетровськ : ЛІРА, 2012. 280 с.
3. Сучасний стан та умови відтворення промислової іхтіофауни Запорізького (Дніпровського) водосховища / Федоненко О. В. та ін. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2011. Вип. 160, ч. 1. С. 92—97. (Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва).
4. Федоненко О. В., Єсіпова Н. Б., Маренков О. М. Біологічні показники основних видів риб Запорізького водосховища та інших рибогосподарських водойм Дніпропетровської області // Рибогосподарська наука України. 2014. № 4. С. 22—34.

5. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. 408 с.
6. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция. Ленинград : ГосНИОРХ, 1984. 52 с.
7. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилову риб з великих водосховищ і лиманів України : затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98, № 166. Київ, 1998. 47 с.
8. Marenkov O. Reproductive Features of Roach, Bream and Common Carp of Zaporozhian (Dnipro) Reservoir in Contemporary Environmental Conditions // International Letters of Natural Sciences. 2016. Vol. 57. P. 26—40.
9. Marenkov O., Fedonenko O. Ways of optimization of breeding conditions of fish by using artificial spawning grounds //World Scientific News. [S. l.], 2016. 58 s.
10. Methods for fish biology / ed. Schreck C. B., Moyle P. B. Bethesda, Maryland, USA, 1990. 685 p.

REFERENCES

1. Fedonenko, O. V., Yesipova, N. B., Shmagaylo, M. O. & Sazanova, N. M. (2013). Biolohe-ekolohichna ta rybohospodars'ka otsinka malykh vodoym Dnipropetrovs'koyi oblasti. *Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu*, 1, 68-76.
2. Fedonenko, O. V., Yesipova, N. B., & Sharamok, T. S. et al. (2012). *Suchasni problemy hidroekolohiyi: Zaporiz'ke vodoskhovyshche*. Dnipropetrovs'k: LIRA.
3. Fedonenko, O. V., Yesipova, N. B., & Marenkov, O. M. et al. (2011). Suchasnyy stan ta umovy vidtvorennya promyslovoyi ikhtiofauny Zaporiz'koho (Dniprovs'koho) vodoskhovyshcha. *Naukovyy visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya: Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnystva*, 160(1), 92-97.
4. Fedonenko, O. V., Yesipova, N. B., & Marenkov, O. M. (2014). Biolohechni pokaznyky osnovnykh vydiv ryb Zaporiz'koho vodoskhovyshcha ta inshykh rybohospodars'kykh vodoym Dnipropetrovs'koyi oblasti. *Rybohospodarsjka nauka Ukrayiny*, 4, 22-34.
5. Arsan, O. M., Davydov, O. A., & Diachenko, T. M. et al. (2006). *Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevyykh vod*. Romanenko, V. D. (Ed.). Kyiv: Lohos.
6. *Metodicheskie rekomendatsii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskikh issledovaniyakh na presnovodnykh vodoemakh. Zoobentos i ego produktsiya* (1984). Leningrad: GosNYORKH.
7. *Metodyka zboru i obrobky ikhtiolohichnykh i hidrobiolohichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoskhovyshch i lymaniv Ukrainy: zatv. nakazom Derzhkomrybhospu Ukrainy 166 vid 15.12.98*. (1998). Kyiv.
8. Marenkov, O. (2016). Reproductive features of roach, bream and common carp of Zaporozhian (Dnipro) Reservoir in contemporary environmental conditions. *International Letters of Natural Sciences*, 57, 26-40.

9. Marenkov, O., & Fedonenko, O. (2016). Ways of optimization of breeding conditions of fish by using artificial spawning grounds. *World Scientific News*.
10. Schreck, C. B., & Moyle, P. B. (1990). *Methods for fish biology*. Bethesda, Maryland, USA.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАРЫБЛЕНИЯ ЗАПОРОЖСКОГО (ДНЕПРОВСКОГО) ВОДОХРАНИЛИЩА

Е. В. Федоненко, hydrodnu@gmail.com, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр

О. Н. Маренков, gidrobions@gmail.com, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр

А. А. Петровский, hydro-dnu@ukr.net, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр

О. С. Нестеренко, Nefesst@gmail.com, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

Цель. Разработать экологически эффективные мероприятия по зарыблению Запорожского (Днепропетровского) водохранилища, ценными видами рыб путем изучения биологических и рыбохозяйственных аспектов формирования и эксплуатации их промыслового запаса.

Методика. В процессе работы использовали обобщенные результаты гидробиологических исследований, которые проводились на протяжении 2015–2017 гг. Материалы собирали на акватории Запорожского (Днепропетровского) водохранилища стандартным снаряжением для отбора проб. Сбор и обработку проб фито-, зоопланктона и зообентоса осуществляли по общепринятым в гидробиологии методам. Расчет зарыбления проводили с использованием классических рыбохозяйственных и ихтиологических методов.

Результаты. Определено состояние кормовой базы Запорожского (Днепропетровского) водохранилища и его продукционные возможности. На основании полученных данных рассчитана потенциальная продуктивность водохранилища. Установлено, что в Запорожском (Днепропетровском) водохранилище образованы определенные резервы кормовой базы, которые позволяют проводить многочисленное зарыбление молодью промысловых видов рыб. Рассчитаны рекомендованные объемы зарыбления водохранилища на 2017 г: карп 1+ (индивидуальной массой 100–130 г) — 285 тыс. экз.; белый толстолобик 1+ (100–130 г) — 1560 тыс. экз.; пестрый толстолобик 1+ (100–130 г) — 200 тыс. экз.; белый амур (100–130 г) — 220 тыс. экз.; линь 0+ (10–20 г) — 135 тыс. экз.; щука 0+ (100г) — 83 тыс. экз.; судак 1+ (индивидуальной массой 100 г) — 83 тыс. экз.

Научная новизна. Представлены результаты исследований состояния кормовой базы водохранилища и рассчитаны объемы зарыбления водоема, что создает основы рационального природопользования водными биоресурсами для сохранения репродуктивного потенциала промысловых видов рыб в условиях ведения рыбного промысла в Запорожском (Днепропетровском) водохранилище.

Практическая значимость. Реализация мероприятий по зарыблению водохранилища позволяет улучшить общее экологическое состояние водоема и повысить рыбопродуктивность в условиях рыбохозяйственной эксплуатации.

Ключевые слова: Запорожское (Днепропетровское) водохранилище, зарыбление, кормовая база, карп, белый толстолобик, пестрый толстолобик.

**BIOLOGICAL FUNDAMENTALS OF STOCKING
THE ZAPORIZHZHIA (DNIPRO) RESERVOIR WITH FISH**

O. Fedonenko, hydrodnu@gmail.com, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

O. Marenkov, gidrobions@gmail.com, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

A. Petrovsky, hydro-dnu@ukr.net, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

O. Nesterenko, Nefesst@gmail.com, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

M. Simon, seemann.sm@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. The main purpose is developing effective measures for stocking the Zaporizhzhia (Dnipro) reservoir with valuable fish species by studying the biological and fishery aspects of the formation and exploitation of their commercial stocks.

Methods. During the work, we used the generalized results of integrated hydrobiological studies performed in 2015-2017. Materials were collected in the Zaporizhzhia (Dnipro) reservoir using standard fishing gears for fish sampling. Collection and processing of phyto-, zooplankton and zoobenthos samples were carried out using conventional hydrobiological methods. Calculation of fish seed amounts was carried out using classical fishery and ichthyological methods.

Findings. The status of fish feed supply of the Zaporizhzhia (Dnipro) reservoir and its production potential was determined. Based on the obtained data, we calculated the potential productivity of the reservoir. It was found that the reservoir had certain feed supply reserves allowing large scale stocking with the juveniles of commercial fish species. The recommended amounts of reservoir stocking in 2017 were calculated as follows: 570 thousand 1+ carp (weight 100-130 g); 1560 thousand 1+ silver carp (weight of 100-130 g); 400 thousand 1+ bighead carp (weight of 100-130 g); 220 thousand 1+ grass carp (weight of 100-130 g); 135 thousand 0+ tench (weight of 10-20 g); 83 thousand 0+ pike (weight of 100 g); 83 thousand 1+ pikeperch (weight 100 g).

Scientific novelty. The presented results of the study of the state of fish feed supply in the reservoir allow stocking with the calculated amounts creating the bases of the rational use of aquatic bioresources with the preservation of the productive potential of commercial fish species exploited by commercial fishery in the Zaporizhzhia (Dnipro) reservoir.

Practical value. Stocking the reservoir with fish allows improving the overall ecological status of the reservoir and increasing fish productivity under the conditions of commercial fishery exploitation.

Keywords: Zaporizhzhia (Dnipro) reservoir, stocking, feed supply, carp, silver carp, bighead carp.

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 53-64
DOI: 10.15407/fsu2017.04.053
УДК 597.541

ПРОМИСЛОВО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЮЛЬКИ (*CLUPEONELLA CULTRIVENTRIS* NORDMANN, 1840) ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКОЇ ГИРЛОВОЇ СИСТЕМИ

К. М. Гейна, geinakonstantin@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН
України, м. Київ

С. С. Шашликова, lanashashlykova@gmail.com, Херсонський державний аграрний
університет, м. Херсон

Мета. Дати біологічну оцінку сучасного промислового стада тюльки (*Clupeonella cultriventris* Nordmann, 1840) Дніпровсько-Бузької гирлової системи в умовах скороченого стоку Дніпра.

Методика. Аналіз біологічного стану промислового стада тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи здійснений на підставі даних з динаміки вікової структури, темпу лінійно-вагового росту та вгодованості. Первинні матеріали отримані з наукових та промислових ловів протягом поточного століття. Польове та камеральне опрацювання іхтіологічних зразків проводилися у відповідності до загальноновизнаних методик.

Результати. Сучасна промислова ситуація у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі характеризується зниженням інтенсивності вилову тюльки. Основний промисел за нашого часу сконцентрований у Миколаївському рибпромисловому районі.

В результаті постійного недолову відмічено поступове зростання середнього виваженого віку через накопичення граничних груп правого крила вікового ряду. На початку досліджень (2001-2004 рр.), коли вікова структура була представлена трьома групами, ядро стада формували однорічки та дворічки — 95,7%. Проте у подальші роки, через збільшення чисельності чотирирічок, відмічено зниження частки модальних груп (однорічок-дворічок) до 76,7%. При цьому частка трирічок та чотирирічок поступово зростала з 15,8% у 2013 р. до 23,2% у 2017 р.

На фоні відносно нестабільної вікової структури темп лінійного росту та росту маси тіла суттєво не змінювався. Найбільша варіабельність лінійних показників відмічена у однорічок. За середньої довжини тіла $40,55 \pm 0,53$ мм ($l_{\text{lim}} = 36,2 - 45,2$ мм) ступінь відхилення від модального значення (C_v) становив 5,10%. Зі збільшенням віку темп лінійного росту закономірно знижувався і суттєвою мінливістю не відрізнявся.

Найбільша варіабельність маси була характерною для однорічок та дворічок (відповідно $C_v = 17,42$ та $C_v = 15,92\%$). Відхилення у темпі росту маси тіла особин правого крила вікового ряду зумовлювалося стабільним переважанням у структурі стада самиць, для яких характерне коливання середньої маси через різницю у розвитку статевих залоз.

Вгодованість тюльки була високою, коефіцієнти за Фультоном змінювалися в межах від 0,85 до 1,04. При цьому відмічалось поступове зростання таких показників у міру збільшення віку. Найбільша мінливість вгодованості відмічена у дворічок та трирічок, варіабельність показників становила $C_v = 12,8 - 15,2\%$

Наукова новизна. Представлені нові, а також суттєво оновлені існуючі дані з основних біологічних характеристик промислового стада тюльки в трансформованих умовах існування іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової системи.

© К. М. Гейна, С. С. Шашликова, 2017

Практична значимість. Отримані результати є науковим підґрунтям раціонального ведення рибного господарства та оптимізації промислового навантаження по відношенню до представників промислової іхтіофауни оселедцевих риб Дніпровсько-Бузької гирлової системи. В сучасних умовах запропонована інформація є доволі актуальною з точки зору покращання трофічної структури цінної рибогосподарської водойми під кутом зниження рівня харчової конкуренції між молоддю напівпрохідної іхтіофауни та типовим зоопланктофагом тюлькою, яка на сьогодні суттєво збільшила свою чисельність.

Ключові слова: Дніпровсько-Бузька гирлова система, тюлька, вікова, розмірно-вагова структура, темп росту, вгодованість.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Одним з найчисленніших представників реліктової лиманної іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової системи є тюлька. Завдяки великій пластичності цей вид досить швидко пристосувався до нових умов існування. До зарегулювання стоку Дніпра греблею Каховської ГЕС ареалом існування дніпровської тюльки були Дніпровський, Бузький лимани та розпрісна ділянка північно-західної частини Чорного моря [1–2]. Впродовж відносно короткого терміну її ареал значно розширився і за нашого часу цей вид реєструється практично по всьому каскаду дніпровських водосховищ [3–4].

Тюлька завжди мала досить важливе промислове значення. Протягом періоду 70–90-х років минулого століття промислові улови риби у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі на 74–77% були представлені цим видом. При цьому промисел тюльки становив у середньому 5 тис. т. на рік. У сучасній структурі промислових уловів частка тюльки збільшилася до 85%, але абсолютні показники її промислу скоротилися до рівня 3–4 тис. т. Характерною рисою є те, що зниження уловів тюльки відбулося не за рахунок зменшення промислового запасу, а виключно за рахунок зниження інтенсивності її уловів [5].

За такої ситуації спостерігається закономірне зростання чисельності тюльки у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі. Як наслідок, у пошуках вільного кормового ресурсу, вона почала мігрувати до заплavnих водойм Дніпра та Південного Бугу, де відбувається нагул молоді промислової іхтіофауни.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

У кінці минулого та на початку поточного століття публікації дослідників щодо біологічних особливостей тюльки стосувалися більшою мірою живлення та встановлення трофологічного статусу виду [6–9] в умовах водосховищ. Дослідження з біології тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи проводилися в менших обсягах, фрагментарно і орієнтувалися на структурні характеристики стада [10–11] та особливості морфологічної будови тіла [12–13]. Проте більш систематизовані відомості щодо динаміки вікової структури, темпу росту, вгодованості та розподілу промислових уловів за риболовними районами Дніпровсько-Бузької гирлової системи у наукових виданнях є обмеженими.

З огляду на вищевказане, вивчення сучасного біологічного стану тюльки за існуючого факту зростання її чисельності в умовах, зниження інтенсивності

промислу, є доцільною і вельми актуальною науково-прикладною проблемою. У зв'язку з цим було сформульовано основну мету і завдання проведеного дослідження.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Основна частина іхтіологічних матеріалів була зібрана в процесі діяльності контрольно-спостережних пунктів Інституту рибного господарства НААН України. При цьому також були задіяні матеріали зборів під час проведення промислових операцій щодо промислу тільки риболовними підприємствами регіону. Науковими дослідженнями був охоплений період 2001–2017 рр.

Промислова ситуація проаналізована за статистичним зведеннями Державного агентства рибного господарства України та його структурних підрозділів у Херсонській та Миколаївській областях.

Збір іхтіологічних матеріалів здійснювався з використанням стандартного комплексу промислових та контрольних знарядь лову. Польові та камеральні опрацювання матеріалів виконувалися у відповідності до загальноновизнаних в практиці іхтіологічних досліджень методик та керівництв [14–15]. Вікова структура та темп росту визначено за методиками В. Л. Брюзгіна [16] та Н. І. Чугунової [17].

Математичне опрацювання отриманих результатів виконано за методикою З. М. Аксютіної [18] з використанням електронних таблиць редактора «Microsoft Office Excel 2003».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Промисел тільки у Дніпровсько-Бузькій гірловій системі характеризується мінімальними уловами у 2001 та 2016 рр., коли загальний вилов становив відповідно 814,6 та 956,0 т. За переважною більшістю інших років поточного століття промислові улови тільки були відносно високими. Максимальний вилов зареєстровано у 2009 р. — 3542,9 т (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка вилову тільки по рибпромислових районах Дніпровсько-Бузької гірлової системи, тонн

Представлена інформація вказує на те, що на початку поточного століття промислове навантаження на стадо тюльки у водоймі було практично рівномірним. Промислові улови у Херсонському та Миколаївському рибпромислових районах суттєво не відрізнялися. Проте з 2003 р. відбулося зниження питомого видобутку тюльки на Херсонському рибпромисловому районі. Найбільш виражено така різниця почала спостерігатися з 2007 р. За загального обсягу вилучення тюльки на рівні 3226,3 т улов у Миколаївському районі складав 2455,8 т., тобто майже 80%. У подальші роки відмічено поступове зниження і абсолютного вилову тюльки у Херсонському районі до 127,4 т (2016 р.).

Отже, основна частка промислу тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи сконцентрована у Миколаївському районі. Аналіз промислової ситуації переконливо вказує на те, що різке зниження уловів тюльки у Херсонському рибпромисловому районі викликано суто організаційними причинами, де головна роль належить відсутності ринку збуту продукції. В умовах, що склалися, досить актуальними є дані щодо динаміки структурних характеристик промислового стада тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи в умовах зростання чисельності внаслідок значного недовикористання сформованого фактичного запасу.

Вікова структура стада тюльки представлена чотирма віковими групами. Найстаршою групою протягом періоду досліджень були чотирирічки. Для риб з коротким життєвим циклом характерна стабільність середнього віку стада. Проте відмічені деякі особливості динаміки цього показника за роками досліджень.

У 2001–2004 рр. спостерігалася поступове зниження середнього виваженого віку з 1,46 до 1,30 року, але останніми роками (2015–2017 рр.) даний показник суттєво зріс до 1,72–1,80 року (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка середнього виваженого віку стада тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи

Представлена на рисунку динаміка середнього віку стада тюльки зумовлювалася відповідними змінами вікової структури протягом досліджень.

Аналіз показав, що зниження середнього віку у 2001–2004 рр. зумовлено кількістю вікових груп, яка на той час дорівнювала трьом з домінуванням однорічок та дворічок — до 95,7% загальної чисельності стада.

Проте у подальші роки відбулося розширення вікового ряду. У стаді почали стало реєструватися чотирирічки, частка яких зростала, і у 2014–2015 рр. становила 7,2–8,5%, а у 2016–2017 рр. вже дорівнювала 9,4–10,1%. При цьому зростала і частка трирічок — до 13,2–13,8% (табл. 1).

Таблиця 1. Вікова структура тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи (частка у загальній кількості, %)

Роки	Вік, років				Чисельність, екз.
	1	2	3	4	
2001	61,4	31,5	7,1	-	328
2002	72,1	21,2	6,7	-	510
2003	70,2	25,5	4,3	-	420
2004	75,8	18,4	5,8	-	390
2005	62,1	29,5	7,1	1,3	320
2006	65,2	23,9	7,1	3,8	290
2007	64,1	23,4	9,1	3,4	410
2008	67,8	19,5	10,6	2,1	440
2009	65,8	20,6	8,5	5,1	516
2010	62,3	24,1	8,3	5,3	581
2011	62,5	22,2	10,1	5,2	316
2012	61,8	20,8	12,3	5,1	350
2013	62,6	21,6	9,4	6,4	425
2014	55,1	23,5	14,2	7,2	385
2015	56,7	22,7	12,1	8,5	365
2016	55,2	21,6	13,8	9,4	415
2017	53,1	23,6	13,2	10,1	620

Наведена інформація вказує на те, що останнім часом частка молодших вікових груп, переважно однорічок, має сталу тенденцію до зниження. Якщо на початку досліджень їхня частка досягала 75,8% від загальної чисельності стада, то у 2014–2017 рр. вона суттєво знизилася до 53,1–56,7%. Збільшення частки старших груп за стабільно високою абсолютною чисельністю поповнення є свідченням зниження промислового навантаження на стадо.

На фоні означених вище змін вікової структури, лінійні розміри та маса тіла у тюльки протягом розглянутих років змінювалися несуттєво. Найбільша варіабельність спостерігалася у однорічок. Середня довжина становила $40,55 \pm 0,53$ мм (lim = 36,2–45,2 мм). При цьому відхилення від середніх значень

(Cv) дорівнювало 5,10%. Лінійні розміри чотирирічок становили в середньому $65,25 \pm 0,92$ мм (lim = 61,4-69,6 мм). Зі збільшенням віку коефіцієнти варіації лінійних розмірів у тюльки незначно знижувалися до 3,74-4,92% (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка вікових змін лінійних розмірів тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи (середні показники)

Середня маса тіла тюльки характеризувалась більшою мінливістю. Як і довжина тіла, так і маса одnorічок та дворічок варіювала більшою мірою. При цьому коефіцієнти варіації поступово знижувалися від 18,01 до 15,79%, а у граничній групі чотирирічок становили 5,97% (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка вікових змін маси тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи (середні показники)

Вгодованість тюльки протягом періоду досліджень була високою, коефіцієнти за Фультоном змінювалися в межах від 0,85 до 1,04. При цьому відмічалася поступове зростання таких показників у міру збільшення віку. Найбільш мінливими коефіцієнти вгодованості виявилися у дворічок та трирічок, варіабельність показників становила $C_v = 12,8\text{--}15,2\%$ (рис. 4).

Рис. 5. Вгодованість тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи (осереднені показники)

Як свідчить інформація, наведена на рис. 5 відхилення від середніх значень вгодованості у дворічок та трирічок були досить значними – $\lim = 0,56\text{--}1,04$ та $\lim = 0,67\text{--}1,06$ відповідно. В граничних вікових групах подібні показники були менш суттєвими.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

На фоні зниження умовів тюльки основна частина загального промислу на теперішній час сконцентрована у Миколаївському рибпромисловому районі. Зменшення обсягів вилову її пов'язане з різким зниженням інтенсивності промислу через низку причин організаційного характеру, де головна роль належить відсутності ринку збуту продукції.

Систематичний недолов зумовлює зростання чисельності тюльки у водоймі, що супроводжується збільшенням частки граничних груп правого крила вікового ряду. Темп лінійно-вагового росту є задовільним, що свідчить про стабільність біотичних параметрів середовища.

Ситуація із динамікою структурних характеристик промислового стада тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи переконливо вказує на актуальну необхідність продовження науково-дослідних робіт з обґрунтування порядку інтенсифікації промислового вилову цього виду.

ЛІТЕРАТУРА

1. Амброз А. И. Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепроовско-Бугского лимана. Киев : АН УССР, 1956. 404 с.
2. Владимиров В. И., Сухойван П. Г., Бугай К. С. Размножение рыб в условиях зарегулированного стока реки (на примере Днепра). Киев : АН УССР, 1963. 395 с.
3. Шевченко П. Г., Мальцев В. И. Изменения в ихтиофауне Днепра в пределах Украины во II половине XX столетия // Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф. : матер. Київ : ІРГ УААН, 2005. С. 291—297.
4. Екологічні трансформації річкових гідроекосистем та актуальні проблеми рибного господарства / Шерман І. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2013. № 4 (26). С. 5—16.
5. Гейна К. М., Шашликова С. С., Топчій О. І. Промислові улови оселедцевих (*Clupeidae*) Дніпровсько-Бузької гирлової системи // Наука і сучасність: Виклики глобалізації : III Міжнар. конф. : матер. Київ : Центр наукових публікацій, 2017. Ч. 1. С. 5—10.
6. Сигиневич Г. П. Оценка запасов тюльки и степени использования ею зоопланктона Каховского водохранилища // Гидробиологический журнал. 1968. Т. 4, № 5. С. 46—54.
7. Шевченко П. Г. Эколого-морфологическая характеристика тюльки *Clupeonella cultriventris cultriventris* (Nordman) и ее роль в экосистеме днепровских водохранилищ : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.10 «ихтиология», 03.00.18 «гидробиология». Киев, 1991. 18 с.
8. Гейна К. М. Шляхи оптимізації харчових взаємовідносин тюльки та товстолобиків Каховського водосховища // Рибне господарство. 2006. Вип. 65. С. 211—220.
9. Гейна К. М. Харчові взаємовідносини тюльки та товстолобиків Каховського водосховища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.10 «іхтіологія». Київ, 2007. 24 с.
10. Гейна К. М., Горбонос В. М. Розмірно-вагова та вікова структура популяції тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи у зв'язку з особливостями ведення її промислу // Природничий альманах. 2006. Вип. 8. С. 18—26.
11. Шашликова С. С., Гейна К. М. Вікова структура тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи у зв'язку з особливостями промислу // Регіональна науково-практична конференція викладачів, молодих вчених, аспірантів та студентів : матер. Херсон : Колос, 2015. С. 73—77.
12. Гейна К. М., Шашликова С. С., Топчій О. І. Просторова мінливість морфологічних ознак тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи // Развитие науки в XXI веке : XXV Междунар. конф. : матер. Харьков : Знание, 2017. Ч. 1. С. 17—22.
13. Гейна К. М., Шашликова С. С. Аналіз морфологічної мінливості тюльки (*Clupeonella cultriventris*, Nordmann, 1840) Дніпровсько-Бузької гирлової системи // ScienceRise: Biological Science. 2017. № 2 (5). С. 9—13.
14. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового виловлення риби з великих водосховищ і

- лиманів України : затв. наказом Держкомрибгоспу України № 166 від 15.12.98. Київ, 1998. 47 с.
15. Визначення коефіцієнтів уловистості контрольних знарядь лову тюльки та молоді інших видів риб у водосховищах Дніпра / Шевченко П. Г. та ін. // Рибне господарство. 1990. Вип. 47. С. 42—44.
  16. Брюзгин В. Л. Методы изучения роста рыб по чешуе, костям и отолитам. Киев : Наукова думка, 1969. 187 с.
  17. Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. Москва : АН СССР, 1959. 164 с.
  18. Аксютин З. М. Элементы математической оценки результатов наблюдений в биологических и рыбохозяйственных исследованиях. Москва : Пищевая промышленность, 1968. 289 с.

REFERENCES

1. Ambroz, A. I. (1956). *Ryby Dnepra, Yuzhnogo Buga i Dneprovsko-Bugskogo limana*. Kiev: AN USSR.
2. Vladimirov, V. I., Sukhoyvan, P. G., & Bugay, K. S. (1963). *Razmnzhenie ryb v usloviyakh zaregulirovannogo stoka reki (na primere Dnepra)*. Kiev: AN USSR.
3. Shevchenko, P. G., & Mal'tsev, V. I. (2005). *Izmeneniya v ikhtiofaune Dnepra v predelakh Ukrainy vo II polovine XX stoletiya. Aktual'ni problemy akvakul'tury ta ratsional'nogo vikoristannya vodnykh bioresursiv: Mizhnarodna naukovopraktychna konferentsiia: materialy*. Kyiv: IRG UAAN, 291-297.
4. Sherman, I. M., Geyna, K. M., Kutishchev, S. V., & Kutishchev, P. S. (2013). *Ekologichni transformatsii rikhkovikh gidroekosistem ta aktual'ni problemi ribnogo gospodarstva. Ribogospodars'ka nauka Ukrainy*, 4, 5-16.
5. Heina, K. M., Shashlykova, S. S., & Topchii, O. I. (2017). *Promyslovi ulovy oseledtsevykh (Clupeidae) Dniprovsko-Buzkoi hyrlovoi systemy. Nauka i suchasnist: Vyklyky hlobalizatsii: III mizhnarodna konferentsiia: materialy*. Kyiv : Tsentr naukovykh publikatsii, 5-10.
6. Siginevich, G. P. (1968). *Otsenka zapasov tyul'ki i stepeni ispol'zovaniya eyu zooplanktona Kakhovskogo vodokhranilishcha. Gidrobiologicheskii zhurnal*, 5, 46-54.
7. Shevchenko, P. G. (1991). *Ekologo-morfologicheskaya kharakteristika tyul'ki Clupeonella cultriventris cultriventris (Nordman) i ee rol' v ekosisteme dneprovskikh vodokhranilishch. Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv.
8. Heina, K. M. (2006). *Shliakhy optymizatsii kharchovykh vzaiemovidnosyn tiulky ta tovtstolobykiv Kakhovskoho vodoshkovyshcha. Rybne hospodarstvo*, 65, 211-220.
9. Heina, K. M. (2007). *Kharchovi vzaiemovidnosyny tiulky ta tovtstolobykiv Kakhovskoho vodoshkovyshcha. Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv.
10. Heina, K. M., & Horbonos, V. M. (2006). *Rozmirno-vahova ta vikova struktura populiatsii tiulky Dniprovsko-Buzkoi hyrlovoi systemy u zviazku z osoblyvostiamy vedennia yii promyslu. Pryrodnychiy almanakh*, 8, 18-26.
11. Shashlykova, S. S., & Heina, K. M. (2015). *Vikova struktura tiulky Dniprovsko-Buzkoi hyrlovoi systemy u zviazku z osoblyvostiamy promyslu. Rehionalna naukovopraktychna konferentsiia vykladachiv, molodykh vchenykh, aspirantiv ta studentiv*. Kherson, 73-77.

12. Heina, K. M., Shashlykova, S. S., & Topchii, O. I. (2017). Prostorova minlyvist morfolohichnykh oznak tiulky Dniprovsko-Buzkoi hyrlovoi systemy. *Razvytye nauky v XXI veke: XXV mezhdunarodnaya konferentsiya: materialy*. Kharkov: Znaniye, 17-22.
13. Heina, K. M., & Shashlykova, S. S. (2017). Analiz morfolohichnoi minlyvosti tiulky (*Clupeonella cultriventris*, Nordmann, 1840) Dniprovsko-Buzkoi hyrlovoi systemy. *ScienceRise: Biological Science*, 2 (5), 9-13.
14. *Metodika zboru i obrobki ikhtiologichnykh i gidrobiologichnykh materialiv z metoyu viznachennya limitiv promislovogo viluchennya ryb z velikikh vodoshkovishch i limaniv Ukraini: zatv. nakazom Derzhkomribgospu Ukraini № 166 vid 15.12.98.* (1998). Kyiv.
15. Shevchenko, P. H., Koval, M. V., Koliesnikov, V. M., & Medyna, T. V. (1990). Vyznachennia koefitsientiv ulovystosti kontrolnykh znariad lovu tiulky ta molodi inshykh vydiv ryb u vodoshkovyshchakh Dnipra. *Rybne hospodarstvo*, 47, 42-44.
16. Bryuzgin, V. L. (1969). *Metody izucheniya rosta ryb po cheshue, kostyam i otolitam*. Kiev: Naukova dumka.
17. Chugunova, N. I. (1959). *Rukovodstvo po izucheniyu vozrasta i rosta ryb*. Moskva: AN SSSR.
18. Aksyutina, Z. M. (1968). *Elementy matematicheskoy otsenki rezul'tatov nablyudeniy v biologicheskikh i rybokhozyaystvennykh issledovaniyakh*. Moskva: Pishchevaya promyshlennost'.

**ПРОМЫСЛОВО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЮЛЬКИ
(*CLUPEONELLA CULTRIVENTRIS* NORDMANN, 1840)
ДНЕПРОВСКО-БУГСКОЙ УСТЬЕВОЙ СИСТЕМЫ**

К. Н. Гейна, geinakonstantin@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН
Украины, г. Киев

С. С. Шашлыкова, lanashashlykova@gmail.com, Херсонский государственный
аграрный университет, г. Херсон

Цель. Дать биологическую оценку промыслового стада тюльки (*Clupeonella cultriventris* Nordmann, 1840) Днепроовско-Бугской устьевой системы в условиях сокращенного стока Днепра.

Методика. Анализ биологического состояния стада тюльки Днепроовско-Бугской устьевой системы осуществлен на основании данных по динамике возрастной структуры, темпа линейно-весового роста и упитанности. Первичные материалы получены с научных и промысловых ловов на протяжении текущего столетия. Полевая и камеральная обработка ихтиологических материалов проводилась в соответствии с общепринятыми методиками.

Результаты. Современная промысловая ситуация в Днепроовско-Бугской устьевой системе характеризуется снижением интенсивности добычи тюльки. В настоящее время основная промысел сконцентрирован в Николаевском рыбопромысловом районе.

В результате постоянного недолова отмечен постепенный рост среднего взвешенного возраста стада в связи с накоплением граничных групп правого крыла возрастного ряда. В начале исследований (2001-2004 гг.), когда возрастная структура была представлена тремя группами, ядро стада формировали годовики и двухгодовики - 95,7%. Однако в последующие годы, в связи с увеличением численности четырехгодовиков, отмечено снижение удельного веса модальных групп (годовиков-двухгодовиков) до 76,7%. При этом доля трехгодовиков и четырехгодовиков постепенно увеличивалась с 15,8% в 2013 г. до 23,2% в 2017 г.

На фоне относительно нестабильной возрастной структуры темп линейного роста и роста массы тела существенно не изменялся. Наибольшая вариабельность линейных показателей отмечена у годовиков. При средней длине тела $40,55 \pm 0,53$ мм ($lim = 36,2-45,2$ мм) отклонения от модального значения (C_v) составляли 5,10%. С увеличением возраста темп линейного роста закономерно снижался и существенной изменчивостью не отличался.

Наибольшая вариабельность массы тела была характерна для годовиков и двухгодовиков (соответственно $C_v = 17,42$ и $C_v = 15,92\%$). Изменчивость показателей массы тела у особей правого крыла возрастного ряда обуславливалась стабильным преобладанием в структуре стада самок, для которых характерны более существенные колебания средней массы в связи с различиями при развитии половых желез.

Упитанность тюльки была высокой, коэффициенты по Фультону изменялись в пределах от 0,85 до 1,04. При этом отмечался постепенный рост упитанности с увеличения возраста. Наиболее изменчивой упитанность была у двух и трехгодовиков – $C_v = 12,8-15,2\%$.

Научная новизна. Представлены новые, а также обновлены существующие данные по основным биологическим характеристикам промыслового стада тюльки в трансформированных условиях обитания ихтиофауны Днепровско-Бугской устьевой системы.

Практическая значимость. Полученные результаты являются научной основой рационального ведения рыбного хозяйства и оптимизации промысловой нагрузки по отношению к представителям сельдевых Днепровско-Бугской устьевой системы. В современных условиях предложенная информация является довольно актуальной с точки зрения улучшения трофологического статуса ценного рыбохозяйственного водоема под углом снижения уровня пищевой конкуренции между молодью полупроходной ихтиофауны и типичным зоопланктофагом тюлькой, которая в настоящее время существенно увеличила свою численность.

Ключевые слова. Днепровско-Бугская устьевая система, тюлька, возрастная, размерно-весовая структура, темп роста, упитанность.

COMMERCIAL-BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TULKA (*CLUPEONELLA CULTRIVENTRIS* NORDMANN, 1840) OF THE DNIEPER-BUG ESTUARY SYSTEM

K. N. Geina, gejnakonstantin@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS of Ukraine, Kyiv
S. S. Shashlykova, lanashashlykova@gmail.com, Kherson State Agrarian University, Kherson

Purpose. To give biological assessment of the commercial stock of tulka (*Clupeonella cultriventris* Nordmann, 1840) of the Dnieper-Bug estuary system in the conditions of the reduced Dnieper flow.

Methodology. Analysis of the biological state of the tulka stock of the Dnieper-Bug estuary system was performed based on the data on the dynamics of its age structure, linear-weight growth and condition factor. Primary materials were obtained from scientific and commercial catches done during the current century. Field and laboratory processing of the ichthyological materials were performed according to generally accepted methods.

Findings. Current commercial fishery situation in the Dnieper-Bug estuary system is characterized by reduced intensity of tulka harvest. Currently, major fish harvest is concentrated in the Mykolaiv fishing ground.

As a result of continuous underfishing, a gradual growth of the mean weighed age of the tulka stock is observed with the accumulation of maximum groups of the right wing of the age series. At the beginning of the study (2001–2004), when age group was represented by three groups, the

nucleus of the population was formed by age-1 and age-2 fish – 95.7%. However, last years, due to an increase in the number of age-4 fish, a reduction in the percentage of modal groups (age-1 and age-2 fish) to 76.7% was observed. At the same time, the share of age-3 and age-4 fish gradually increased from 15.8% in 2013 to 23.2% in 2017.

Against the background of a relatively instable age structure, the linear growth and body weight growth rates did not change significantly. The highest variability of linear parameters was observed in age-1 fish. With a mean body length of 40.55 ± 0.53 mm (lim=36.2–45.2 mm), deviations from the modal value (Cv) were 5.10%. With an increase in the age, the linear growth rate decreased and no significant variability was observed.

The highest variability of body weight was typical for age-1 and age-2 fish (Cv=17.42 and Cv=15.92%, respectively). The variability of body weight in fish of the right wing of the age series depended by a stable prevalence of females in the stock structure, which were characterized by more significant fluctuations of mean weight due to differences during sexual gland development.

The condition factor of tulka was high, Fulton's condition factor values varied from 0.85 to 1.04. At the same time, a gradual growth of the condition factor with an increase in age was observed. The highest variability of the condition factor was typical for age-2 and age-3 fish – Cv=12.8-15.2%.

Originality. The paper contains new as well as updated already existing data on major biological characteristics of the commercial stock of tulka in transformed conditions of fish fauna existence in the Dnieper-Bug estuary system.

Practical value. The obtained results are a scientific basis for rational fishery and optimization of fishing pressure on this clupeid species of the Dnieper-Bug estuary system. Under the current conditions, the provided information is topical from the point of view of the improvement of the trophological status of a valuable fishery water body in the context of the reduction of the level of trophic competition between juveniles of semi-migratory fish species and typical zooplantonivorous species such as tulka, which currently increased its abundance.

Keywords: Dnieper-Bug estuary system, tulka, age, length-weight structure, growth rate, condition factor.

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 65-74

DOI: 10.15407/fsu2017.04.065

УДК 606:62:639.3:639.212

РОЗРОБЛЕННЯ МУЛЬТИПЛЕКСНОЇ ПЛР ДЛЯ ГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПОПУЛЯЦІЙ ВЕСЛОНОСА (*POLYODON SPATHULA WALBAUM, 1792*)

Х. М. Курта, khrystyna.kurta@gmail.com, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК, смт Чабани

О. О. Малишева, malisheva.sirota@gmail.com, Інститут ветеринарної медицини НААН України, м. Київ

В. Г. Спиридонов, spyrydonov@ukr.net, Інститут ветеринарної медицини НААН України, м. Київ

Мета. Розробити та відпрацювати мультиплексну—ПЛР мікросателітної ДНК веслоноса (*Polyodon spathula*) для проведення популяційно-генетичного моніторингу його стад, культивованих в умовах рибницьких господарств України.

Методика. Для проведення досліджень використовували мультиплекс ПЛР для чотирьох мікросателітних ДНК-маркерів: Psp12, Psp21, Psp26 та Psp28. Оцінку результатів ефективності розробленої мультиплексної ПЛР та опрацювання отриманих даних проводили шляхом фрагментного аналізу ДНК на генетичному аналізаторі «ABI Prism 3130» (Applied Biosystem, США).

Результати. За результатами поділу продуктів мультиплексної ПЛР методом капілярного електрофорезу було встановлено, що розміри ампліфікованих фрагментів для кожного з чотирьох досліджуваних локусів Psp12, Psp21, Psp26 та Psp28 в одній ПЛР відповідали очікуванню. Аналіз даних електрофореграми показав, що за локусом Psp21 спостерігалася найвища інтенсивність піку, яка була на рівні 611 флуоресцентних одиниць (ФО), а найнижча інтенсивність піку спостерігалася для локусу Psp26 і була на рівні 105 ФО. У мультиплексній ПЛР після відповідної інтерпретації отриманих даних нами було ідентифіковано алельні варіанти в гетерозиготному стані для локусів Psp12 (218/220 п.н.), Psp26 (144/146 п.н.) та Psp28 (256/258 п.н.). При цьому, локус Psp21 (150/150 п.н.) ідентифіковано в гомозиготному стані.

Наукова новизна. Проведено оптимізацію та розроблено методику мультиплексної ПЛР для генотипування веслоноса за мікросателітними ДНК-маркерами.

Практична значимість. Отримані результати досліджень можуть бути застосовані для генотипування веслоноса при виконанні програм з селекційно-племінної справи та штучного відтворення даного виду риб.

Ключові слова: веслоніс, мікросателіти, ДНК-маркери, мультиплекс, ПЛР, генотипування, генетичний аналіз.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

На сучасному етапі розвитку народного господарства одним із цінних та бажаних об'єктів аквакультури в Україні є представник ряду осетроподібних риб —

© Х.М. Курта, О. О. Малишева, В. Г. Спиридонов, 2017

веслоніс (*Polyodon spathula*). Цей вид риб поєднує цінні господарські та споживчі характеристики, а саме: він є продуцентом дороговартісної осетрової продукції — делікатесного м'яса та чорної ікри, за рахунок чого його культивування у штучних умовах є економічно обґрунтованим [1, 2].

Для нарощування чисельності популяцій веслоноса в умовах рибницьких господарств України в промислових масштабах вимагається ефективне вирішення завдань зі створення продуктивних стад плідників, а також визначення та збереження цінних генотипів [2].

Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень дозволяють ефективно проводити селекційно-племінну роботу щодо штучного відтворення веслоноса шляхом популяційно-генетичного моніторингу цінних генотипів та видової ідентифікації з використанням мікросателітних ДНК-маркерів [3–6]. Мікросателіти — це генетичні маркери з кодомінантним типом успадкування, які ефективно застосовуються для контролю за генетичною різноманітністю та еволюційними процесами у популяціях, а також для картування геномів в процесі роботи з рідкісними видами тварин [7–9]. Генетична ідентифікація за використання мікросателітів дозволяє виявляти індивідуальні відмінності та досліджувати рівень генетичного поліморфізму, що є важливою умовою при розробленні наукових основ для селекційно-племінних програм та розвитку аквакультури в Україні [8–12].

Розроблення протоколів ПЛР з одночасною ампліфікацією декількох локусів ДНК в одній реакції (мультиплекс-ПЛР) є одним із сучасних завдань для проведення масових генетичних досліджень популяцій, що значно зменшує вартість таких досліджень [13, 14]. Кількість локусів, що необхідно проаналізувати для отримання статистично достовірних даних, залежить від біологічної різноманітності та чисельності досліджуваних популяцій [13, 15, 16].

Згідно з результатами тривалої практики лабораторних досліджень, встановлено, що мультиплекс-ПЛР дозволяє знизити ризики контамінації дослідних зразків, скоротити час проведення досліджень та значно зменшити витрати реактивів при аналізі досліджуваних об'єктів [14, 15].

Тому розроблення та оптимізація мультиплекс-аналізу мікросателітної ДНК веслоноса є актуальним завданням для сучасних лабораторій з генетичного контролю з метою отримання достовірних даних в процесі генотипування та ДНК-паспортизації даного виду риб.

ВИДІЛЕННЯ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Для поліпшення якості генетичного матеріалу, контролю рівня інбридингу та зниження його впливу на виробництво товарної продукції необхідно застосовувати молекулярно-генетичні методи контролю [2, 8, 10].

Розроблення мультиплекс-ПЛР мікросателітної ДНК веслоноса дозволить максимально економно здійснювати популяційно-генетичний аналіз штучно відтворюваних популяцій цього виду риб.

Метою представленої роботи було розроблення та відпрацювання мультиплексної ПЛР мікросателітної ДНК веслоноса для проведення популяційно-генетичного моніторингу його штучних стад, культивованих в умовах рибницьких господарств України.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Матеріалом для дослідження була ДНК ($n=16$), виділена з біологічних зразків веслоноса, відібраних на Виробничо-експериментальному Дніпровському осетровому рибовідтворювальному заводі ім. академіка С.Т. Артющика» (Херсонська обл., 2016 р.).

Виділення ДНК проводили за використання методу сорбції ДНК на диоксиді кремнію (SiO_2) [17, 18].

Полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) проводили на ампліфікаторі Veriti 96 Well (Applied Biosystems, США) з попередньо оптимізованими параметрами: початкова денатурація — 5 хв, 95°C ; 30 циклів денатурації — 15 с, 95°C ; відпалювання праймерів — 25 с, 56°C ; елонгація — 5 с, 72°C та пролонгування — 5 хв, 72°C [19].

Реакційна суміш загальним об'ємом $20,0 \text{ мм}^3$ містила наступні компоненти: $50,0 \text{ мМ}$ Трис- HCl ($\text{pH } 8,3$), $1,5 \text{ мМ}$ MgCl_2 , $0,2 \text{ мМ}$ кожного з дезоксинуклеотидтрифосфатів (dNTP), по 5 рМ/мм^3 форвардного і реверсного локус-специфічних праймерів та $1,5$ од. Таq-ДНК-полімерази. Зразки виділеної ДНК вносили в кількості 5 мм^3 .

Продукти ампліфікації денатурували формамідом (Sigma, США) та розділяли шляхом капілярного електрофорезу на генетичному аналізаторі «ABI Prism 3130» Genetic Analyser (Applied Biosystems, США). Розміри алелів визначали за допомогою програми «Gene Mapper 3.7» (Applied Biosystems, США) з використанням стандарту LIZ-500 (Applied Biosystems, США).

Відображені на електрофореграмі показники розмірів алелів зводили до цілих чисел, що відображають розмір алелів у парах нуклеотидів, шляхом математичного округлення отриманих цифрових значень [20]. Визначення спектру частот ідентифікованих алелів проводили за методом підрахунку та аналізу отриманих генотипів досліджуваних особин із застосуванням програми Power Stats V12 (Promega) [21].

Для проведення досліджень використовували панель з чотирьох попередньо підібраних мікросателітних ДНК-маркерів: Psp 12, Psp 21, Psp 26 та Psp 28 (Applied Biosystems, США) [9,19]. Нуклеотидну послідовність для дизайну та синтезу олігонуклеотидних праймерів було взято з генетичної бази даних GenBank [9] (табл. 1).

Кожен із досліджуваних локусів ДНК, для яких проводили оптимізацію мультиплекс-ПЛР, підбирали таким чином, щоб мічені флуоресцентними барвниками ПЛР-продукти одного кольору не перекривалися за довжиною ампліфікованих фрагментів (табл. 1).

Таблиця 1. Мікросателітні ДНК-маркери для генотипування веслоноса [9]

Назва локусу	Структура повтору	Нуклеотидна послідовність праймерів (5' → 3')	Розмір (п.н.)	Флуоресцентний барвник
Psp12	(GA) ₁₅	F:GCATAGTTTTTGGGGGATGGC R:ACAAGTCTTCACCGCATTC	218–228	FAM (синій)
Psp21	(GA) ₂₅	F:TTCAGCAGGTAGTGAGACAGGCAG R:TCAAGTCCCATCCACTCT	142–170	FAM (синій)
Psp26	(GT) ₂₅	F:TCGGTGTGTGTGTGTGTATGC R:TGGTTCAGTTTCGCTCATCC	130–160	TAMRA (жовтий)
Psp28	(GA) ₃₇	F:CAAAGGCATCCCTACCAC R:GCTGGACAAAAAGTATGGAGTGC	224–260	TAMRA (жовтий)

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

В результаті досліджень були оптимізовані умови ПЛР (склад реакційної суміші, умови ампліфікації) для проведення мультиплексного ПЛР-аналізу мікросателітної ДНК веслоноса.

Попередньо оптимізовані умови ПЛР для ампліфікації мікросателітних локусів ДНК з детекцією продуктів ПЛР в агарозному гелі [19] враховували при розробці мультиплекс-ПЛР для детекції методом капілярного електрофорезу. Такий підхід дозволив проводити одночасну ампліфікацію чотирьох локусів мікросателітної ДНК веслоноса в одній реакційній суміші з достатньо високою ефективністю та відтворюваністю.

Наявність у складі ПЛР-суміші більше однієї пари олігонуклеотидних праймерів збільшує ймовірність виникнення неспецифічних вторинних структур — побічних продуктів ампліфікації. Тому, з метою мінімізації неспецифічних взаємодій між досліджуваними мікросателітними ДНК-локусами, нами емпірично було підбрано оптимальне співвідношення олігонуклеотидних праймерів у ПЛР-суміші, з концентрацією кожного по 5 пмоль.

Приклад отриманих даних мультиплекс-ПЛР за досліджуваними мікросателітними ДНК-маркерами веслоноса відображено на рис. 1.

За результатами поділу продуктів мультиплексної ПЛР методом капілярного електрофорезу було встановлено, що розміри ампліфікованих фрагментів для кожного з чотирьох досліджуваних локусів ДНК — Psp12, Psp21, Psp26 та Psp28 — відповідали очікуваним, згідно з табл. 1.

Результатом успішної ампліфікації алеля є наявність основного піку, який відповідає інтенсивності флуоресценції барвника, що асоціюється з наявністю ПЛР-продукту відповідного розміру. Аналіз даних електрофореграми вказує на те, що за локусом Psp21 спостерігалася найвища інтенсивність піку, яка була на рівні 611 флуоресцентних одиниць (ФО), а найнижча інтенсивність піку спостерігалася для локусу Psp26 — 105 ФО.

Рис. 1. Приклад електрофореграми поділу продуктів мультиплексної ПЛР-ампліфікації чотирьох досліджуваних локусів веслоноса: А — FAM (синій) — Psp12, Psp21 та В — TAMRA (жовтий) — Psp26 і Psp28

Кількість основних піків на електрофореграмі залежала від стану алеля відповідного локусу в геномі досліджуваного виду. Так, у мультиплексній ПЛР після відповідної інтерпретації отриманих даних нами було ідентифіковано алельні варіанти в гетерозиготному стані для локусів Psp12 (218/220 п.н.), Psp26 (144/146 п.н.) та Psp28 (256/258 п.н.). При цьому, локус Psp21 (150/150 п.н.) ідентифіковано в гомозиготному стані.

Таким чином, результати проведених досліджень показали, що розроблена мультиплексна ПЛР дозволяє здійснити генотипування одночасно чотирьох поліморфних локусів ДНК, з подальшою ідентифікацією алелів у досліджуваних зразках біологічного матеріалу веслоноса.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розроблено та відпрацьовано мультиплексну ПЛР мікросателітної ДНК веслоноса з подальшою інтерпретацією результатів генотипування на генетичному аналізаторі «ABI Prism 3130» (Applied Biosystems, США).

Розроблена та оптимізована мультиплексна ПЛР дозволила ідентифікувати гетерозиготні алелі для локусів Psp12, Psp26 та Psp28. Локус Psp21 представлений в гомозиготному стані.

Отримані результати досліджень можуть бути застосовані для подальшого популяційно-генетичного моніторингу племінних стад веслоноса, культивованих в умовах рибницьких господарств України.

ЛІТЕРАТУРА

1. Курта Х. М., Малишева О. О., Спиридонов В. Г. Сучасний стан та перспективи досліджень генетичної структури веслоноса (*Polyodon spathula*) // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2016. № 6 (63). URL: <http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/issue/view/308> (21.10.2016).
2. Третяк О. М., Грициняк І. І., Тарасюк С. І. Використання ДНК-маркерів у дослідженнях генетичної структури племінного матеріалу веслоноса (*Polyodon spathula* (Walb.)) // Рибогосподарська наука України. 2012. № 4. С. 117—120.
3. Jennings C. A., Zigler S. J. Ecology and biology of Paddlefish in North America: historical perspectives, management approaches, and research priorities // Reviews in Fish Biology and Fisheries. 2000. Vol. 10. P. 167—181.
4. Status, trends, and management of sturgeon and paddlefish fisheries: correction / Pikitch E. K. et al. // Fish and Fisheries. 2006. Vol. 7. P. 78—79.
5. Mims S. Aquaculture of Paddlefish in the United States Aquat // Living Resour. 2001. Vol. 14. P. 391—398.
6. Genetic structure among four populations of paddlefish, *Polyodon spathula* (*Actinopterygii: Acipenseriformes: Polyodontidae*), based on disomic microsatellite markers / Zheng X. et al. // Acta Ichthyol. Piscat. 2014. Vol. 44(3). P. 213—219.
7. Nuclear Markers of Danube Sturgeons Hybridization / Duda A. et al. // Molecular Sciences. 2011. № 12. P. 6796—6809.
8. Малишева О. О., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. Впровадження генетичної паспортизації осетрових в Україні // Тваринництво України. 2015. № 9. С. 12—15.
9. Microsatellite markers for the paddlefish (*Polyodon spathula*) / Heist E. J. et al. // Conservation Genetics. 2002. Vol. 3. P. 205—207.
10. Heist E. J., Mustapha A. Genetic Structure in Paddlefish Inferred from DNA Microsatellite Loci // Transactions of the American Fisheries Society. 2008. Vol. 137, iss. 3. P. 909—915.
11. Polymorphism of microsatellite loci – a tool in studying biodiversity of paddlefish aquaculture broodstock / Kaczmarczyk D. et al // Environmental Biotechnology. 2007. Vol. 3. P. 44—48.
12. Спиридонов В. Г. Розробка методики ДНК-ідентифікації осетрових видів риб з використанням полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі // Рибогосподарська наука України. 2017. № 2 (40). С. 68—77.
13. Microsatellite multiplex assay for the analysis of Atlantic sturgeon / Panagiotopoulou H. et al. // Appl. Genet. 2014. Vol. 55, iss. 4. P. 505—510.

14. Multiplex PCR: Optimization and Application in Diagnostic Virology / Elnifro E. M. et al. // Clin. Microbiol. Rev. 2000. № 13(4). P. 559—570.
15. Edwards M., Gibbs R. Multiplex PCR: advantages, development and applications // PCR Methods and Applications. 1994. Vol. 3. P. 65—75.
16. Визначення достовірності походження коней української верхової породи та мікросателітний аналіз ДНК / Спиридонов В. Г. та ін. // Біологія тварин. 2009. Т. 11, № 1–2. С. 265—269.
17. Rapid and Simple Method for Purification of Nucleic Acids / Boom R. et al. // Journal of Clinical Microbiology. 1990. Vol. 28. P. 495—503.
18. Carter M. J., Milton I. D. An inexpensive and simple method for DNA purifications on silica particles // Nucleic Acids Res. 1993. Vol. 21. P. 1044—1046.
19. Курта Х. М. Малишева О. О., Спиридонов В. Г. Оптимізація умов полімеразної ланцюгової реакції для дослідження мікросателітної ДНК веслоноса (*Polyodon spathula*) // Біологія тварин. 2017. Т. 19, № 2. С. 56—63.
20. DNA Fragment Analysis by Capillary Electrophoresis : User guide. [S. l.] : Thermo Fisher Scientific Inc., 2014. PN 4474504. P. 219.
21. Statistical confidence for likelihood-based paternity inference in natural populations / Marshall T. C. et al. // Molecular ecology. 1998. P. 639—655.

REFERENCES

1. Kurta, K., Malysheva, O., & Spyrydonov, V. (2016). Suchasnyi stan ta perspektyvy doslidzhen henetychnoi struktury veslonosa (*Polyodon spathula*). *Naukovi dopovidi Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy*, 63, 6. Retrieved from <http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/issue/view/308>.
2. Tretiak, O., Hrytsyniak, I., Tarasiuk, S. (2012). Vykorystannia DNK-markeriv u doslidzhenniakh henetychnoi struktury pleminnoho materialu veslonosa (*Polyodon spathula* (Walb.)). *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 117-120.
3. Jennings, C. A., & Zigler, S. J. (2000). Ecology and biology of Paddlefish in North America: historical perspectives, management approaches, and research priorities. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 10, 167-181.
4. Pikitch, E. K., Doukakis, P., Lauck, L., Chakrabarty P., & Erickson, D. L. (2006). Status, trends, and management of sturgeon and paddlefish fisheries: correction. *Fish and Fisheries*, 7, 78-79.
5. Mims, S. (2001). Aquaculture of Paddlefish in the United States. *Aquat. Living Resour*, 14, 391-398.
6. Zheng, X., Schneider, K., & Lowe, J. et al. (2014). Genetic structure among four populations of paddlefish, *Polyodon spathula* (Actinopterygii: Acipenseriformes: Polyodontidae), based on disomic microsatellite markers. *Acta. Ichthyol. Piscat*, 44 (3), 213-219.
7. Duda, A., Suci, R., & Parashiv, M. et al. (2011). Nuclear Markers of Danube Sturgeons Hybridization. *Molecular Sciences*, 12, 6796-6809.
8. Malysheva, O., Spyrydonov, V., Melnychuk, S. (2015). Vprovadzhennia henetychnoi pasportyzatsii osetrovkykh v Ukraini. *Tvarynnystvo Ukrainy*, 9, 12-15.
9. Heist, E., Nicholson, E., & Sipiorski, J. et al. (2002). Microsatellite markers for the paddlefish (*Polyodon spathula*). *Conservation Genetics*, 3, 205-207.

10. Heist, E. J., & Mustapha, A. (2008). Genetic Structure in Paddlefish Inferred from DNA Microsatellite Loci. *Transactions of the American Fisheries Society*, 137, 3, 909-915.
11. Kaczmarczyk, D., Kohlmann, K., & Kersten, P. et al. (2007). Polymorphism of microsatellite loci – a tool in studying biodiversity of paddlefish aquaculture broodstock. *Environmental Biotechnology*, 3, 44-48.
12. Spyrydonov, V. (2017). Rozrobka metodyky DNK-identyfikatsii osetrovkyh vydiv ryb z vykorystanniam polimeraznoi lantsiuhovoi reaktsii v realnomu chasi. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 68-77.
13. Panagiotopoulou, H., Popovich, D., & Zalewska, K. et al. (2014). Microsatellite multiplex assay for the analysis of Atlantic sturgeon. *Appl. Genet.*, 55 (4), 505-510.
14. Elnifro Elfath, M., & Ashshi Ahmed, M. et al. (2000). Multiplex PCR: Optimization and Application in Diagnostic Virology. *Clin. Microbiol. Rev.*, 13(4), 559-570.
15. Edwards, M., & Gibbs, R. (1994). Multiplex PCR: advantages, development and applications. *PCR Methods and Applications*, 3, 65-75.
16. Spyrydonov, V. H., Shelov, A. V., Melnychuk, S. D., & Ilnytska, T. Ye. (2009). Vyznachennia dostovirnosti pokhodzhennia konei ukrainskoi verkhovoi porody ta mikrosatelitnyi analiz DNK. *Biologhiia tvaryn*, 11(1-2), 265-269.
17. Boom, R., Sol, C. J. A., & Salimans, M. et al. (1990). Rapid and Simple Method for Purification of Nucleic Acids. *Journal of Clinical Microbiology*, 28, 495-503.
18. Carter, M. J., & Milton, I. D. (1993). An inexpensive and simple method for DNA purifications on silica particles. *Nucleic Acids Res.*, 21, 1044-1046.
19. Kurta, K., Malysheva, O., & Spyrydonov, V. (2017). Optymizatsiia umov polimeraznoi lantsiuhovoi reaktsii dlia doslidzhennia mikrosatelitnoi DNK veslonosa (*Polyodon spathula*). *Biologhiia tvaryn*, 19, 2, 56-63.
20. DNA Fragment Analysis by Capillary Electrophoresis: User guide (2014). Thermo Fisher Scientific Inc., PN 4474504, 219.
21. Marshall, T. C. et al. (1998). Statistical confidence for likelihood-based paternity inference in natural populations. *Mol. Ecol.*, 639-655.

РАЗРАБОТКА МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ПЦР ДЛЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОПУЛЯЦИЙ ВЕСЛОНОСА (*POLYODON SPATHULA WALBAUM, 1792*)

Х. М. Курта, khrystyna.kurta@gmail.com, Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК, пгт Чабаны

О. А. Малышева, malisheva.sirota@gmail.com, Институт ветеринарной медицины НААН Украины, г. Киев

В. Г. Спиридонов, spyrydonov@ukr.net, Институт ветеринарной медицины НААН Украины, г. Киев

Цель. Разработать и отработать мультиплексную ПЦР микросателлитной ДНК веслоноса (*Polyodon spathula*) для проведения популяционно-генетического мониторинга его стад, культивируемых в условиях рыбоводных хозяйств Украины.

Методика. Для проведения исследований использовали мультиплексную ПЦР. Разработку и отработку мультиплекс-ПЦР-анализа осуществляли для четырех

мультиплекс–ПЦР микросателлитных ДНК-маркеров: Psp12, Psp21, Psp26 и Psp28. Оценку результатов эффективности разработанной мультиплексной ПЦР и обработку полученных данных проводили путем фрагментного анализа ДНК на генетическом анализаторе "ABI Prism 3130" (Applied Biosystem, США).

Результаты. По результатам разделения продуктов мультиплексной ПЦР методом капиллярного электрофореза было установлено, что размеры амплифицированных фрагментов для каждого из четырех исследуемых локусов Psp12, Psp21, Psp26 и Psp28 в одной ПЦР соответствовали ожидаемым. Анализ данных электрофореграммы показал, что по локусу Psp21 наблюдалась самая высокая интенсивность пика, которая была на уровне 611 флуоресцентных единиц (ФЕ), а самая низкая интенсивность пика наблюдалась для локуса Psp26 — 105 ФЕ. В мультиплексной ПЦР после соответствующей интерпретации полученных данных нами было идентифицировано аллельные варианты в гетерозиготном состоянии для локусов Psp12 (218/220 п.н.), Psp26 (144/146 п.н.) и Psp28 (256/258 п.н.). При этом, локус Psp21 (150/150 п.н.) идентифицирован в гомозиготном состоянии.

Научная новизна. Проведена оптимизация и разработана методика мультиплексной ПЦР для генотипирования веслоноса по микросателлитным ДНК-маркерам.

Практическая значимость. Полученные результаты исследований могут быть применены для генотипирования веслоноса при выполнении программ по селекционно-племенному делу и искусственному воспроизводству данного вида рыб.

Ключевые слова: веслонос, микросателлиты, ДНК-маркеры, мультиплекс, ПЦР, генотипирование, генетический анализ.

DEVELOPMENT OF A MULTIPLEX PCR FOR THE GENETIC ANALYSIS OF PADDLEFISH (*POLYODON SPATHULA* WALBAUM, 1792) POPULATIONS

K. Kurta, khrystyna.kurta@gmail.com, Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products, Chabany village

O. Malysheva, malysheva.sirota@gmail.com, Institute of Veterinary Medicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev

V. Spyrudonov, spyrudonov@ukr.net, Institute of Veterinary Medicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev

Purpose. Paddlefish is commercially important species owing to its biological features and consumer characteristics, namely it produces valuable and delicious fish products, such as high quality meat and black caviar. Consequently, its cultivation under Ukrainian fish farm conditions and further realization in domestic and foreign markets are economically efficient. However, the paddlefish broodstock in Ukraine requires the efficient solution of increasing its productivity, identification and assessment of its genetic variation. Thus, the aim of our study was to develop and implement a multiplex PCR-analysis of paddlefish (*Polyodon spathula*) for population-genetic monitoring of its artificial broodstocks in Ukraine.

Methodology. A multiplex PCR was used for the study. The multiplex PCR development was performed for four microsatellite DNA markers: Psp12, Psp21, Psp26 and Psp28. Each investigated DNA loci, for which the multiplex PCR was optimized, was selected in such a way that the colored PCR products labeled with fluorescent dye did not overlap the length of the amplified fragments. Evaluation of the multiplex PCR effectiveness and processing of the data were performed by fragment analysis of DNA on the genetic analyzer ABI Prism 3130 (Applied Biosystem, USA). The size of the identified alleles was determined using the "Gene Mapper 3.7" program (Applied Biosystems, USA) and LIZ-500 size standard (Applied Biosystems, USA).

Results. Based on the results of capillary electrophoresis of multiplex PCR products, it was found that the amplified fragments for each of the four studied loci: Psp12, Psp21, Psp26 and Psp28 in one PCR reaction were within the expected size range. Data analysis on the electrophoregram

demonstrated that Psp21 had the highest peak intensity at 611 fluorescent units (FU) and the lowest peak intensity at 105 FU was observed for Psp26 locus. In the multiplex PCR after proper interpretation of the data we identified heterozygous allelic variants for Psp12 (218/220 bp), Psp26 (144/146 bp) and Psp28 (256/258 bp). Herewith, the Psp21 locus (150/150 bp) is identified in the homozygous state.

Originality. *The optimization was conducted and a multiplex PCR was developed for paddlefish genotyping using microsatellite DNA markers.*

Practical value. *The obtained results can be used for paddlefish genotyping within selective-breeding programs for artificial reproduction of this fish species.*

Keywords: *paddlefish, microsatellite DNA markers, multiplex, PCR, genotyping, genetic analysis.*

ГІСТО-МОРФОМЕТРИЧНА СТРУКТУРА ГЕПАТОПАНКРЕАСУ ДЕЯКИХ КОРОПОВИХ РИБ (*CYPRINIDAE* *RAFINESQUE, 1810*) ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

Т. С. Шарамок, sharamok@i.ua, Дніпровський національний університет імені
Олеса Гончара, м. Дніпро

В. О. Курченко, kurchenko1995@ukr.net, Дніпровський національний університет
імені Олеса Гончара, м. Дніпро

Н. Л. Колесник, kolenataleo@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН
України, м. Київ

Мета. Дослідити стан гепатопанкреасу сазана (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) та ляща (*Abramis brama* Linnaeus, 1758) з різних за антропогенним навантаженням ділянок Запорізького водосховища за гістологічними та цитометричними показниками.

Методика. Дослідження проводилися в двох зонах Запорізького водосховища з різним ступенем і видами антропогенного впливу — нижній частині, розташованій в аграрній зоні (умовно «екологічно чистій» ділянці), і в Самарській затоці з високим вмістом важких металів у воді. Об'єктами досліджень були чотирирічні особини ляща та сазана. Гепатопанкреас риб для гістологічних досліджень отримували від свіжовивленої риби (у весняно-літній період) шляхом анатомічного розтину. Для фіксації відбирали фрагменти органу розміром 0,3–0,5 см. Для виготовлення гістологічних препаратів тканини фарбували гематоксиліном і еозином. Фотографії гістологічних препаратів робили за допомогою цифрової фотокамери, котра підключалась до мікроскопа. Гістологічні зрізи досліджували при збільшенні об'єктиву мікроскопа 40^x з використанням мікрофотозйомки цифровою камерою «Sciencelab T500 5.17 М».

Результати. Антропогенний вплив на гідроекосистему обумовлює у коропових риб Самарської затоки ознаки гіпертрофії гепатоцитів та ряд гістопатологій. Цитометричний аналіз гепатопанкреасу показав, що площа гепатоцитів риб затоки була більшою порівняно з одновіковими особинами нижньої ділянки водосховища на 20 та 10% у сазана та ляща відповідно. При цьому в гепатоцитах сазана відзначалось збільшення клітин в ширину на 14%, а у ляща — довжини на 10% та площі ядра на 19%. Результати гістологічних досліджень морфологічної структури гепатопанкреасу коропових риб, що мешкають у Самарській затоці, дозволили виявити ряд патологічних змін. У 37% особин ляща та у 12% сазана спостерігалася жирова дистрофія. У 2% особин ляща виявлені некротичні ділянки печінкової паренхіми. У 50% ляща та 25% сазана траплялися початкові стадії некрозу, які проявлялися у змінах ядра і цитоплазми гепатоцитів. Найчастіше спостерігалися каріопікноз та каріолізис, а також порушення цілості клітини, що може свідчити про хронічне ураження та прогресуючий патологічний процес. У риб нижньої ділянки водосховища патології виявлено не було.

Наукова новизна. Вперше здійснено цитометричне та гістологічне дослідження гепатопанкреасу чотирирічок ляща та сазана Запорізького водосховища.

Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для виявлення гістологічних біомаркерів, найбільш чутливих до впливу токсичних речовин.

© Т. С. Шарамок, В. О. Курченко, Н. Л. Колесник, 2017

Печінка (гепатопанкреас) риб є найбільш придатним органом для подібних досліджень, оскільки зміни її цитометричних та гістологічних показників є передумовою до ряду змін в метаболізмі як окремого органу, так і інших взаємопов'язаних систем організму.

Ключові слова: лящ, сазан, Запорізьке водосховище, цитометричні та гістологічні показники, гепатопанкреас, гепатоцити.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

На теперішній час дослідження структурно-функціональних змін в печінці (гепатопанкреас) тварин набувають певного значення для оцінки якості їх середовища існування. Накопичений великий фактичний матеріал з вивчення структурно-функціональних особливостей печінки риб як в нормі, так і за різних зовнішніх впливів [1]. Гістопатологічні зміни в печінці за стресової дії фізичних і хімічних чинників проявляються у вигляді зернистої дистрофії, вакуолізації цитоплазми гепатоцитів, гіпертрофії, некробіозу та деструкції тканин [2–4].

Зміни структури печінки можуть бути успішно використані як біомаркери, які відображають чутливість риб до стресових чинників навколишнього середовища [5]. У кісткових риб печінка (гепатопанкреас) є головним органом біотрансформації органічних ксенобіотиків [6], тому її структурно-функціональні характеристики можуть мати значення для оцінки здоров'я риб [7]. За гістологічними показниками печінки можна успішно і відносно точно судити про якість зовнішніх умов середовища існування тієї чи іншої особини [8].

Проведена значна кількість досліджень, які демонструють гістопатологічні зміни в печінці риб, що знаходяться під впливом широкого діапазону токсикантів органічної [9, 10] і неорганічної природи [11, 12]. Незважаючи на це, таких досліджень поки недостатньо для оцінки стану умов існування риб.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

У комплексній оцінці стану організму риб, що мешкають у водних екосистемах з підвищеним антропогенним навантаженням, використовується цілий ряд методів еколого-фізіологічної індикації [13, 14]. Вже кілька десятиліть забруднення води в прісноводних екосистемах є вагомим екологічним проблемою в усьому світі. Найпоширенішими забруднювачами гідроекосистем є важкі метали. У воді Запорізького водосховища вміст цих поллютантів перевищує рибогосподарські норми у декілька разів. Біомаркери на рівні тканин, такі як гістологічні та цитометричні зміни в різних органах риб дають цінну інформацію про вплив ксенобіотиків на організм основних промислових видів риб [15]. Зміни структури печінки можуть бути використані як біомаркери, що відображають чутливість риб до стресових чинників навколишнього середовища [16].

У зв'язку з цим, метою даної наукової роботи було дослідження стану гепатопанкреасу сазана (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) та ляща (*Abramis brama* Linnaeus, 1758) з різних за антропогенним навантаженням ділянок Запорізького водосховища за гістологічними та цитометричними показниками.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Об'єктами досліджень були чотирирічні самці і самки ляща (*Abramis brama* Linnaeus, 1758) та сазана (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758). У Запорізькому водосховищі риб відловлювали за допомогою зябрових сіток під час проведення науково-дослідних ловів у літньо-осінній період протягом 2015–2016 рр. з двох пунктів водосховища, які відрізняються за гідроекологічними умовами і мають важливе рибопромислове значення: нижньої ділянки та Самарської затоки.

Гепатопанкреас риб для гістологічних досліджень отримували від свіжовиловленої риби шляхом анатомічного розтину. Для фіксації відбирали фрагменти органа розміром 0,3–0,5 см. Фіксацію матеріалу для гістологічних досліджень проводили в 10%-ому водному розчині нейтрального формаліну впродовж 24 год. при кімнатній температурі. Після фіксації матеріал промивали впродовж 24 год. проточною водопровідною водою.

Для заливання в парафін промитий матеріал зневоднювали у спиртах, просвітляли в ксилолі за температури 37°C. Час перебування тканини в кожному з розчинників складав від 2 до 4 год. У подальшому матеріал витримували в парафін-ксилолі (насичений розчин) за температури 54°C впродовж 1 год., у двох змінах парафіну – по 2 год. у кожній за такої ж температури, і заливали у парафінові блоки. Зрізи товщиною 10 мкм виготовляли на мікротомі MC-2 та фарбували гематоксиліном і еозином [17, 18].

Фотографії гістологічних препаратів робили за допомогою цифрової фотокамери «SciencelabT500 5.17M», яка підключалась до мікроскопа фірми «Біолам 70». Обчислення проводили за допомогою програми «ScienceLabView7». На препаратах проглядали по 40 полів зору за збільшення об'єктиву мікроскопа 40х. При цьому визначали такі показники: довжину, ширину та площу гепатоциту, великий повздовжній та малий поперечний діаметри ядра гепатоциту, площу ядра гепатоциту, ядерно-цитоплазматичне співвідношення. Статистичне опрацювання отриманих даних здійснювали за загальноприйнятими методами із застосуванням програми «Microsoft Excel 2010».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Результати досліджень показали, що якість води (за вмістом важких металів) в нижній частині Запорізького водосховища, в основному, відповідала рибогосподарським нормативам, за винятком вмісту міді, який становив 7 ГДК. У воді Самарської затоки концентрація міді перевищувала ГДК у 8,0 разів, мангану — в 1,7; свинцю — в 1,5 і кадмію — в 2,0 рази. Вміст усіх досліджуваних важких металів у воді Самарської затоки вищий порівняно з нижньою ділянкою водосховища. Виявлено статистично вирогідні відмінності між вмістом мангану та кадмію (65 і 75% відповідно, за $p \leq 0,05$) в двох районах водосховища.

Цитометричний аналіз гепатопанкреасу коропових риб Запорізького водосховища показав, що у риб Самарської затоки виявлені ознаки гіпертрофії гепатоцитів (табл. 1).

Гіпертрофія часто проявляється у збільшенні розміру клітин у зв'язку з підготовкою до мітозу або зростанні їх плоідності; збільшення розмірів цитоплазми та ядра без зростання плоідності клітин спостерігається за умов підвищеної функціональної активності клітин та їхнього набухання в умовах патології [1].

Таблиця 1. Результати цитометричних досліджень гепатопанкреасу корошових риб Запорізького водосховища, $M \pm m$ (n=40)

Показники	Сазан		Лящ	
	Нижня ділянка водосховища	Самарська затока	Нижня ділянка водосховища	Самарська затока
Площа гепатоцита, мкм ²	169,17±7,86*	203,76±7,35*	77,12±2,07*	84,50±1,61*
Довжина гепатоцита, мкм	19,60±0,75	19,46±0,44	12,92±0,37*	14,27±0,34*
Ширина гепатоцита, мкм	12,14±0,63*	13,88±0,34*	8,22±0,25	8,21±0,22
Площа ядра, мкм ²	30,02±1,22	28,85±1,00	14,70±0,28*	17,46±0,39*
Великий діаметр ядра, мкм	6,42±0,13	6,34±0,22	4,72±0,07*	5,17±0,11*
Малий діаметр ядра, мкм	5,70±0,15	5,48±0,08	4,02±0,06	4,22±0,08
Ядерно-цитоплазматичне співвідношення	0,18±0,008*	0,14±0,005*	0,19±0,004	0,21±0,010

Примітка. * — різниця між показниками вірогідна, $p \leq 0,05$.

Так, площа гепатоцитів гепатопанкреасу риб Самарської затоки була більшою порівняно з такою одновікових особин нижньої ділянки водосховища на 20 та 10% у сазана та ляща відповідно. При цьому в гепатоцитах сазана відзначалось збільшення ширини клітин на 14%, а у ляща — довжини на 10%. У ляща Самарської затоки спостерігалось збільшення площі ядра на 19%. Збільшення розмірів ядра часто супроводжується зростанням кількості ядерців [1]. У сазана виявлено зниження показника ядерно-цитоплазматичного співвідношення на 22% ($p \leq 0,05$), що може вказувати на пригнічення функціональної активності клітини та припинення синтетичних процесів.

Результати гістологічних досліджень морфологічної структури гепатопанкреасу корошових риб, що мешкають у Самарській затоці, дозволили виявити ряд патологічних змін. У 37% особин ляща та у 12% сазана спостерігалася жирова дистрофія — в цитоплазмі гепатоцитів простежувалися світлі незабарвлені вакуолі різної величини (рис. 1). Цитоплазма клітин із жировими вакуолями іноді являла собою вузьку базofilьну смужку біля плазматичної мембрани.

А

Б

Рис. 1. Вакуолізація цитоплазми гепатоцитів: А — ляща, Б — сазана.

У 2% особин ляща Самарської затоки виявлені некротичні ділянки печінкової паренхіми. У 50% ляща та 25% сазана траплялися початкові стадії некрозу, які проявлялися у змінах ядра і цитоплазми гепатоцитів (рис. 2). Найчастіше спостерігалися каріопікноз та каріолізис, а також порушення цілості клітини, що може свідчити про хронічне ураження та прогресуючий патологічний процес. За даними авторів [19], некрози гепатоцитів в печінці риб трапляються часто і є результатом забруднення води важкими металами або наслідком паразитарних інвазій.

Рис. 2. Некротичні явища в печінці риб: А — ляща, Б — сазана

У проведених дослідженнях такі патологічні явища виявлені у риб, що мешкали у зоні з потужним рівнем антропогенного навантаження. У риб нижньої ділянки водосховища патологій виявлено не було. Таким чином, гістоморфометричні показники гепатопанкреасу сазана та ляща Запорізького водосховища можна використовувати як додатковий біоіндикатор антропогенного забруднення гідроекосистеми.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

У риб Самарської затоки в умовах антропогенного забруднення (рівень вмісту важких металів у воді перевищував рибогосподарські ГДК у 1,5–8,0 разів) виявлені ознаки гіпертрофії гепатоцитів, що може бути раннім компенсаторно-приспосувальним механізмом до несприятливих умов.

Можна припустити, що збільшення розмірів гепатоцитів та наявність ліпідних вакуолей в цитоплазмі клітин печінки сазана та ляща Самарської затоки призводить до зміни метаболізму, порушення ліпідного обміну.

Некротичні явища в гепатопанкреасі коропових риб Самарської затоки свідчать про хронічний токсичний вплив на їхній організм та наявність патологічних процесів.

Зміни гістоморфометричних показників гепатопанкреасу сазана та ляща можуть бути використані як додаткові біоіндикатори при оцінці екологічної ситуації водосховища.

Подальші дослідження спрямовані на вивчення цитометричних показників гепатоцитів інших представників коропових риб, які мешкають у Запорізькому водосховищі, з метою розроблення критеріїв для моніторингу водних об'єктів та оцінки фізіологічного стану риби.

ЛІТЕРАТУРА

1. Крючков В. Н., Дубовская А. В., Фомин И. В. Особенности патологической морфологии печени рыб в современных условиях // Вестник АГТУ. 2006. Вып. 3 (32). С. 94—100.
2. Hadi A. A., Alwan S. F. Histopathological changes in gills, liver and kidney of fresh water fish, *Tilapia zillii*, exposed to aluminum // Int. J. of Pharm. & Life Sci. 2012. Vol. 11. P. 2071—2081.
3. Hued A. C., Oberhofer S., de los Ángeles Bistoni M. Exposure to a commercial glyphosate formulation (Roundup®) alters normal gill and liver histology and affects male sexual activity of *Jenynsia multidentata* (Anablepidae, Cyprinodontiformes) // Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 2012. Vol. 62 (№ 1). P. 107—117.
4. Metal effects on histological and biochemical parameters of common rudd (*Scardinius erythrophthalmus* L.) / Georgieva E. et al. // Archives of Polish Fisheries. 2004. Vol. 22. P. 197—206.
5. Wrona F. G., Cash K. J. The ecosystem approach to environment assessment: moving from theory to practice // J. Aquat. Ecosyst. Health. 1996. Vol. 5. P. 89—97.
6. Hinton D. E., Segner H., Braunbeck T. Toxic responses of the liver // Target Organ Toxicity in Marine and Freshwater Teleosts / eds. D. Schlenk, W. H. Benson. London : Taylor & Francis, 2001. P. 224—268.
7. Histopathological alterations of white seabass (*Lates calcarifer*) in acute and subchronic cadmium exposure // Thophon S. et al. // Environ Pollut. 2003. Vol. 121. P. 307—320.
8. Силкина Н. И., Микряков Д. В., Микряков В. Р. Влияние антропогенного загрязнения на окислительные процессы в печени рыб Рыбинского водохранилища // Экология. 2012. № 5. С. 361—365.
9. Retrospective analysis: Bile hydrocarbons and histopathology of demersal rockfish in Prince William Sound, Alaska, after the Exxon Valdez oil spill. // Marty G.D. and al. Marine Environ Res. 2003. № 56. P. 569 – 584.
10. Agamy E. Histopathological Changes in the Livers of Rabbit Fish (*Siganus canaliculatus*) Following Exposure to Crude Oil and Dispersed Oil // Toxicologic pathology. 2012. Vol. 40. P. 1128—1140.
11. Paris-Palacios S., Biaqianti–Risbourq S., Vernet G. Biochemic and (ultra)structural hepatic perturbations of *Brachydanio rerio* (Teleostei, Cyprinidae) exposed to two sublethal concentrations of copper sulfate // Aquat. Toxicol. 2000. Vol. 50, № 1–2. P. 109—124.
12. Pacheco M., Santos M. A. Biotransformation, genotoxic and histopathological effects of environmental contaminants in European eel (*Anguilla anguilla* L.) // Ecotoxicol. Environ. Saf. 2002. Vol. 53. P. 331—347.
13. Моисеенко Т. И. Водная экотоксикология: Теоретические и прикладные аспекты. Москва : Наука, 2009. 400 с.
14. Handy R. D., Runnalls T., Russell P. M. Histopathologic biomarkers in three spined sticklebacks, *Gasterosteus aculeatus*, from several rivers in Southern England that meet the freshwater fisheries directive // Ecotoxicology. 2002. Vol. 11. P. 467—479.

15. Histological biomarkers in fish as a tool in ecological risk assessment and monitoring programs / Yancheva V. et al. // Applied ecology and environmental research. 2016. Vol. 14(1). P. 47—75.
16. Минеев А. К. Гистопатологии некоторых внутренних органов у леща (*Abramis brama* Linnaeus, 1758) Саратовского водохранилища // Экология и защита окружающей среды : Междунар. научн.-практ. конф., 19-20 марта 2014 г. : тезисы докл. Минск, 2014. С. 173—177.
17. Гисто-морфометрические характеристики печени рыб как биоиндикаторы качества водной среды / Дробот Г. П. и др. // Вестник МарГТУ. 2011. № 3. С. 102—107.

REFERENCES

1. Krjuchkov, V. N., Dubovskaja, A. V., & Fomin, I. V. (2006). Osobennosti patologicheskoy morfologii pecheni ryb v sovremennyh usloviyah. *Vestnik AGTU*, 3 (32), 94-100.
2. Hadi, A. A., & Alwan, S. F. (2012). Histopathological changes in gills, liver and kidney of fresh water fish, *Tilapia zillii*, exposed to aluminum. *Int. J. of Pharm. & Life Sci.*, 11, 2071-2081.
3. Hued, A. C., & Oberhofer, S. (2012). Exposure to a commercial glyphosate formulation (Roundup®) alters normal gill and liver histology and affects male sexual activity of *Jenynsia multidentata* (Anablepidae, Cyprinodontiformes). *Archives of Environmental Contamination and Toxicology*, 62(1), 107-117.
4. Georgieva, E., Stoyanova, S., & Velcheva, I. et al. (2014). Metal effects on histological and biochemical parameters of common rudd (*Scardinius erythrophthalmus* L.). *Archives of Polish Fisheries*, 22, 197- 206.
5. Wrona, F. G., Cash K.J.(1996).The ecosystem approach to environment assessment: moving from theory to practice. *J. Aquat. Ecosyst. Health*.
6. Hinton, D. E., Segner, H., & Braunbeck, T. (2001). Toxic responses of the liver. *Target Organ Toxicity in Marine and Freshwater Teleosts*. London: Taylor & Francis.
7. Thophon, S., Kruatrachue, M., & Upathan, E. S. et al. (2003). Histopathological alterations of white seabass (*Lates calcarifer*) in acute and subchronic cadmium exposure. *Environ. Pollut.*, 121, 307-320.
8. Silkina, N. I., Mikrjakov, D. V., & Mikrjakov, V. R. (2012). Vlijanie antropogennogo zagriznenija na okislitel'nye processy v pecheni ryb Rybinskogo vodohranilishha. *Ekologija*, 5, 361-365.
9. Marty, G. D., Hoffman, A., & Okihiro, K. H. et al. (2003). Retrospective analysis: Bile hydrocarbons and histopathology of demersal rockfish in Prince William Sound, Alaska, after the Exxon Valdez oil spill. *Marine Environ. Res.*, 56, 569-584.
10. Agamy, E. (2012). Histopathological Changes in the Livers of Rabbit Fish (*Siganus canaliculatus*) Following Exposure to Crude Oil and Dispersed Oil. *Toxicologic pathology*, 40, 1128-1140.
11. Paris-Palacios, S., Biaquanti-Risbourq, S., & Vernet, G. (2000). Biochemic and (ultra)structural hepatic perturbations of *Brachydanio rerio* (Teleostei, Cyprinidae) exposed to two sublethal concentrations of copper sulfate. *Aquat. Toxicol.*, 1-2, 109-124.

12. Pacheco, M., & Santos, M. A. (2002). Biotransformation, genotoxic and histopathological effects of environmental contaminants in European eel (*Anguilla anguilla* L.). *Ecotoxicol. Environ. Saf.*, 53, 331-347.
13. Moiseenko, T. I. (2009). *Vodnaja jekotoksikologija: Teoreticheskie i prikladnye aspekty*. Moskva: Nauka.
14. Handy, R. D., Runnalls, T., & Russell, P. M. (2002). Histopathologic biomarkers in three spined sticklebacks, *Gasterosteus aculeatus*, from several rivers in Southern England that meet the freshwater fisheries directive. *Ecotoxicology*, 11, 467-479.
15. Yancheva, V., Velcheva, I., & Stoyanova, S. et al. (2016). Histological biomarkers in fish as a tool in ecological risk assessment and monitoring programs. *Applied ecology and environmental research*, 14(1), 47-75.
16. Mineev, A. K. (2014). Gistopatologii nekotoryh vnutrennih organov u leshha (*Abramis brama* Linnaeus, 1758) Saratovskogo vodohranilishha. *Jekologija i zashhita okruzhajushhej sredy: Mezhdunar. nauchn.-prakt. konf.*, 19-20 marta 2014 g.: tez. dokl. Minsk, 173-177.
17. Drobot, G. P., Trubacheva, V. S., & Maljuta, O. V. et al. (2011). Gisto-morfometricheskie harakteristiki pecheni ryb kak bioindikatory kachestva vodnoj sredy. *Vestnik MarGTU*, 3, 102-107.

**ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГЕПАТОПАНКРЕАСА
НЕКОТОРЫХ КАРПОВЫХ РЫБ (*CYPRINIDAE* *RAFINESQUE*, 1810) ЗАПОРОЖСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА**

Т. С. Шарамок, sharamok@i.ua, Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, г. Днепр

В. А. Курченко, kurchenko1995@ukr.net, Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, г. Днепр

Н. Л. Колесник, kolenataleo@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

Цель. Исследовать состояние гепатопанкреаса сазана (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) и леща (*Abramis brama* Linnaeus, 1758) из разных по антропогенной нагрузке участков Запорожского водохранилища по гистологическим и цитометрическим показателям.

Методика. Исследования проводились в двух точках Запорожского водохранилища с разной степенью и видами антропогенного воздействия — нижнем участке, расположенном в аграрной зоне (условно «экологически чистой» области), и в Самарском заливе с высоким содержанием тяжелых металлов в воде. Объектами исследований были четырехлетние особи леща и сазана. Гепатопанкреас рыб для гистологических исследований получали от свежесловленной рыбы (в весенне-летний период) путем вскрытия. Для фиксации отбирали фрагменты органа размером 0,3–0,5 см. Для изготовления гистологических препаратов ткани окрашивали гематоксилином и эозином. Фотографии гистологических препаратов делали с помощью цифровой фотокамеры, которая подключалась к микроскопу. Гистологические срезы исследовали при увеличении объектива микроскопа 40^x с использованием микрофотоъемки цифровой камерой «Sciencelab T500 5.17 М».

Результаты. Антропогенное влияние на гидрозкосистему обуславливает возникновение у карповых рыб Самарского залива признаков гипертрофии гепатоцитов и ряда гистопатологий. Цитометрический анализ гепатопанкреаса показал, что площадь гепатоцитов рыб залива была больше по сравнению с одновозрастными особями нижнего

участка водохранилища на 20 и 10% у сазана и леща соответственно. При этом в гепатоцитах сазана отмечалось увеличение ширины клеток на 14%, а у леща — длины на 10% и площади ядра на 19%. Результаты гистологических исследований морфологической структуры гепатопанкреаса карповых рыб, обитающих в Самарском заливе, позволили выявить ряд патологических изменений. У 37% особей леща и у 12% сазана наблюдалась жировая дистрофия. У 2% особей леща обнаружены некротические участки печеночной паренхимы. У 50% леща и 25% сазана встречались начальные стадии некроза, которые проявлялись в изменениях ядра и цитоплазмы. Чаще всего наблюдались кариопикноз и кариолизис, а также нарушение целостности клетки, что может свидетельствовать о хроническом поражении и прогрессирующем патологическом процессе. У рыб нижнего участка водохранилища патологий выявлено не было.

Научная новизна. Впервые осуществлен цитометрический и гистологический анализ гепатопанкреаса четырехлеток леща и сазана Запорожского водохранилища.

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы для выявления гистологических биомаркеров, наиболее чувствительных к воздействию токсических веществ. Печень (гепатопанкреас) рыб является наиболее подходящим органом для подобных исследований, поскольку изменения ее цитометрических и гистологических показателей является предпосылкой к ряду изменений в метаболизме как отдельного органа, так и других взаимосвязанных систем организма.

Ключевые слова: лещ, сазан, Запорожское водохранилище, цитометрические и гистологические показатели, гепатопанкреас, гепатоциты.

HISTOLOGICAL-MORPHOMETRIC STRUCTURE OF THE LIVER OF SOME CYPRINIDS (CYPRINIDAE RAFINESQUE, 1810) FROM THE ZAPORIZHZHIA RESERVOIR

T. Sharamok, sharamok@i.ua, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

V. Kurchenko, kurchenko1995@ukr.net, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

N. Kolesnyk, kolenataleo@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To investigate the state of the liver of wild carp (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) and bream (*Abramis brama* Linnaeus, 1758) from sites of the Zaporizhzhia reservoir with different human pressures based on histological and cytometric parameters

Methodology. The study was carried out in two zones of the Zaporizhzhia reservoir with different degrees and types of human impact - the lower part, located in the agrarian zone (conditionally "environmentally clean" site), and in the Samara Bay with high content of heavy metals in water. The objects of the study were age-4 bream and wild carp. The fish livers for histological studies were obtained from freshly caught fish (in the spring-summer period) by anatomical dissection. Fragments of organs of 0.3 – 0.5 cm were taken for preservation. For the preparation of histological preparations, the liver tissue was stained with hematoxylin and eosin. The pictures of histological preparations were made with the aid of a digital camera connected to the microscope. Histologic sections were investigated with 40X magnification using a microscope with the Sciencelab T500 5.17 M digital camera.

Findings. Human impact on the hydroelectric system causes signs of hepatocyte hypertrophy and a number of histopathologies in cyprinids in the Samara Bay. The cytometric analysis of the liver showed that the area of hepatocytes in the bay was larger in comparison with the the individuals of similar age from the lower part of the reservoir by 20 and 10% for the wild carp and bream, respectively. In this case, a 14% increase in the small diameter of cells was observed the in hepatocytes of carp, and a 10% increase in large diameter and a 19% increase in nucleus area was observed in bream. The results of the histological invesatigation of the morphological structure of the

liver of cyprinids inhabiting the Samara Bay have revealed a number of pathological changes. Fatty liver dystrophy was observed in 37% of bream and 12% of wild carp. The bream liver (2%) had necrotic areas of parenchyma. In the 50% of bream and 25% of wild carp, the initial necrosis stages occurred, which were manifested as changes in the nucleus and cytoplasm. Frequently, karyopcnosis and cariolysis and destruction of cellular integrity were observed, which may indicate on a chronic damage and a progressive pathological process. There were no pathologies in the fish inhabiting the lower part of the reservoir.

Originality. *For the first time a cytometric and histological study of the liver of age-4 bream and wild carp from the Zaporizhian reservoir was performed.*

Practical Value. *The obtained results can be used for the detection of histological biomarkers, the most sensitive to the effect of toxic substances. Fish liver is the most appropriate organ for such researches, since changes in its cytometric and histological parameters are a prerequisite for a number of changes in the metabolism as a separate organ and other interconnected systems of fish organism.*

Keywords: *bream, wild carp, Zaporizhzhia reservoir, cytometric and histological parameters, liver, hepatocytes.*

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 85-98
DOI: 10.15407/fsu2017.04.085
УДК 639.3:597.551.2:616.15(477.7)

МОРФОГІСТОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЦЬОГОЛІТОК КАНАЛЬНОГО СОМА (*ICTALURUS PUNCTATUS* RAF., 1818), УТРИМУВАНИХ В УМОВАХ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ ЗИМІВЛІ

Н. Б. Єсіпова, yesipova.natalia@gmail.com, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Г. В. Шварц, hydro-dnu@gmail.com, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Я. В. Тучапський, yartuchapsky@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити вплив екстремально низьких температур води на морфологічні та гістологічні показники молоді каналного сома під час зимівлі в умовах індустриального тепловодного рибного господарства.

Методика. Дослідження проводились під час зимівлі риби (жовтень–березень) 2016–2017 рр. у Придніпровському індустриальному тепловодному басейновому рибному господарстві (м. Дніпро). Температуру води в басейнах контролювали два рази на добу, гідрохімічні параметри — щотижня.

У цьоголіток каналного сома (*Ictalurus punctatus* raf., 1818) визначали індивідуальну масу, довжину, коефіцієнт вгодованості за Фультоном, показник виживання. Щотижня проводили їхтіопатологічні дослідження: визначали колір, наявність слизу, будь-які пошкодження шкіри, стан зябер. Для паразитологічного аналізу робили зіскреби з поверхні тіла та зябер з подальшою їх мікроскопією. При анатомічному розтині риби звертали увагу на патологічні зміни внутрішніх органів.

Для оцінки фізіологічного стану молоді каналного сома під час зимівлі проводили аналіз мікроструктури тканин та органів шляхом виготовлення гістологічних зрізів за загальноприйнятою методикою. Аналіз гістологічних препаратів проводився за допомогою світлового мікроскопа за збільшення об'єктиву 8^х та 40^х, і фотографічної цифрової камери «Sciencelab T500 5.17 М». Цифровий матеріал опрацьований статистичними методами.

Результати. Особливостями зимівлі каналного сома в індустриальних тепловодних рибних господарствах є тривалий період занадто низьких температур води (3–5°C). Дослідження показали, що в цих умовах цьоголітки каналного сома втрачали до 76% своєї маси. Коефіцієнт вгодованості за Фультоном знижувався в середньому на 40%. Показник виживання риб за зимовий період коливався від 51 до 64%, в залежності від індивідуальної маси цьоголіток перед зимівлею. Довготривале зимове голодування молоді каналного сома приводило до пошкодження епідермісу шкіри, обмеження кількості епідермальних залозистих клітин, які виконують захисну функцію; руйнування м'язових волокон і заміни їх фіброзною тканиною, порушення топографії міомерів і міосепт. У виснажених цьоголіток каналного сома з'являлися патологічні зміни у внутрішніх органах: дистрофія гепатоцитів, вакуолізація епітелію жовчних каналців, злуццювання каймистого епітелію кишечника, відмирання або зрощування кишкових ворсинок.

Наукова новизна. Отримані дані щодо мікроструктурного аналізу тканин та органів цьоголіток каналного сома в умовах напруженої зимівлі дозволяють виявити пристосувальні можливості даного виду риб до низьких температур води і можуть бути використані для наукового коригування технології зимового утримання каналного сома в індустриальних тепловодних рибних господарствах.

Практична значимість. Результати виконаної роботи можуть бути використані в індустриальних тепловодних рибних господарствах, які відчувають проблеми з температурним режимом води, пов'язані з нерегулярними обсягами скиду теплих вод

© Н. Б. Єсіпова, Г. В. Шварц, Я. В. Тучапський, 2017

енергетичних об'єктів. Відомості щодо гістологічних змін в організмі молоді каналного сома в умовах тривалої дії низьких температур води можна застосовувати для удосконалення технології годівлі риб перед несприятливою зимівлею.

Ключові слова: каналний сом, індустриальне тепловодне рибне господарство, зимівля, низькі температури води, рибницькі показники, мікроструктура тканин та органів.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

На сучасному етапі розвитку людства однією з основних глобальних проблем є дефіцит продуктів харчування. Необхідність забезпечення населення екологічно безпечною і доступною за ціною рибою в умовах скорочення промислу в морях і океанах зумовлює необхідність інноваційних підходів до розвитку аквакультури.

Занепад спеціалізованих рибних господарств, які раніше забезпечували основні продовольчі потреби населення в живій рибі, є загальнонаціональною проблемою. Застаріла виробнича база рибних господарств не дає змоги виробляти продукцію, яка б відповідала вимогам часу. Назріла гостра необхідність розроблення нових методологічних підходів і технологій раціонального ведення рибного господарства з урахуванням природних умов різних регіонів. Країни в усьому світі, в тому числі й Україна, зосередили свої зусилля на вирішенні цієї проблеми [1–4].

Індустриальне вирощування риби на теплих скидних водах енергетичних об'єктів — це великий резерв для збільшення виробництва риби в Україні. Бурхливий розвиток індустриального тепловодного рибництва випав на 80-ті роки минулого століття. Тоді в країні вирощувалось понад 10 тис. т риби у басейнових рибних господарствах [5]. На жаль, у подальші роки через економічні труднощі відбувався спад розвитку рибного господарства і, в першу чергу, — індустриального — як найенерговитратнішого. Але відродження вітчизняного рибного господарства неможливе без розвитку такого перспективного напрямку, як тепловодне басейнове рибництво. В літературі останніх років з'являється багато повідомлень про необхідність розроблення нових, більш раціональних технологій для індустриального тепловодного вирощування риби з урахуванням теперішніх екологічних, економічних та соціальних умов [6–8].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Однією з основних екологічних проблем сучасного тепловодного рибництва в Україні є підтримання оптимального температурного режиму в басейнах, яка виникає внаслідок нестабільної роботи паливно-енергетичних станцій. Використання в технології риборозведення теплих скидних вод робить рибні господарства заручниками режиму роботи ГЕС і ТЕС. Ця залежність особливо відчувається в зимовий період, коли зниження потужності роботи станції спричиняє небажане падіння температури води у басейнах, що негативно відображається на рибницьких показниках. Виникає необхідність всебічно вивчити зміни, які відбуваються в організмі риб в цих умовах, щоб удосконалити технологію їх підготовки до зимового періоду.

Метою роботи було дослідження впливу екстремально низьких температур

води на морфологічні та гістологічні показники молоді канального сома під час зимівлі у тепловодному рибному господарстві.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проводились у Придніпровському індустріальному тепловодному басейновому рибному господарстві (м. Дніпро) під час зимівлі риби у 2016–2017 рр.

Об'єктом досліджень були цьоголітки канального сома (*Ictalurus punctatus* Raf., 1818). На початку досліду (жовтень) риб розділили на 2 групи за лінійно-ваговими показниками. У першу групу (варіант № 1) увійшли цьоголітки з індивідуальною масою від 5 до 10 г ($8,5 \pm 0,35$ г), у другу групу (варіант № 2) — від 10 до 16 г ($14,2 \pm 0,84$ г). Тобто за середньою масою риби другого варіанту наближались до стандартних значень (15–20 г), і тому розглядались як контрольний варіант. Обидві групи розсадили у різні басейни об'ємом 3 м³ за густоти посадки 1 тис. екз./м³. Підгодівлю цьоголіток здійснювали рибним фаршем 1 раз на добу в кількості 1–2% від маси риби з урахуванням зміни температури води.

Температуру води в басейнах контролювали 2 рази на добу. Щотижня проводили гідрохімічний аналіз за наступними показниками: рН, вміст розчиненого у воді кисню, вміст загального заліза, перманганатна окиснюваність [9].

Морфометричний аналіз риб проводили за загальними в іхтіології методами [10]. У цьоголіток визначали індивідуальну масу, довжину, коефіцієнт вгодованості за Фультоном, показник виживання.

Щотижня проводили іхтіопатологічні дослідження класичним методом повного паразитологічного розтину риб [11]. При цьому визначали колір, наявність слизу, будь-які пошкодження шкіри, стан зябер. Для паразитологічного аналізу робили зіскреби з поверхні тіла та зябер з подальшою їх мікроскопією. При анатомічному розтині риби звертали увагу на патологічні зміни внутрішніх органів.

У грудні відібрали проби тканин і внутрішніх органів риб з метою проведення гістологічного аналізу. Виготовлення гістологічних зрізів проводилось за загальноприйнятою методикою [12]. Аналіз гістологічних препаратів здійснювався за допомогою світлового мікроскопа за збільшення об'єктиву 8^x та 40^x, і фотографічної цифрової камери «Sciencelab T500 5.17 М». Цифровий матеріал оброблено за загальноприйнятими статистичними методами.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Контроль температурного режиму встановленопоказав, що, починаючи з жовтня, температура води в басейнах знизилась до 10°C (рис. 1). За таких умов, як відомо, активність живлення канального сома падає, а за температури 5°C і нижче зовсім припиняється [13, 14]. З рисунку 1 видно, що занадто низькі температури, за яких сом голодував, фіксувалася майже 4 місяці (листопад–березень). Для порівняння, на рис. 1 представлені зміни зимової температури води у 2006 р. Видно, що за 10 років середньомісячна температура води в басейнах знизилась майже на 5°C.

Рис. 1. Середньомісячні значення температури води в басейнах у різні роки

Інші гідрохімічні показники були в межах рибницьких норм (СОУ 05.01-37-385:2006): рН — 7,8–8, розчинений у воді кисень — 7,5–9,0 мг/Одм³, перманганатна окиснюваність — 8–11 мг/дм³.

Відомо, що за умов сприятливих температур та систематичної годівлі цьоголітки каналного сома за осінньо-зимовий період можуть збільшити свою масу на 15–20% [15]. Але в наших дослідженнях, в умовах екстремально низьких зимових температур, цьоголітки каналного сома, навпаки, зменшили свою масу. Найбільше відносне зниження маси відмічалось у грудні. За весь період зимівлі втрати маси у цьоголіток першого варіанту склали 46%, другого варіанту — 32% (табл. 1).

Таблиця 1. Рибницькі показники наприкінці зимівлі цьоголіток каналного сома ($M \pm m$)

Показники	Варіант 1	Варіант 2
Маса риб на початку зимівлі, г	8,5±0,35*	14,2±0,84*
Маса риб наприкінці зимівлі, г	4,6±0,46*	9,6±0,76*
Зниження маси за зимовий період, %	46	32
Коефіцієнт вгодованості за Фультоном	1,50±0,23	1,60±0,12
Вживання риб, %	51	64

Примітка. * — різниця між показниками вірогідна ($p \leq 0,05$).

Коефіцієнт вгодованості за Фультоном також знизився в середньому на 40%. Вживання риб за період зимівлі становило в першому варіанті 51%, в другому — 64%. Різниця в показниках складала близько 20%. За оптимальних умов зимівлі і стандартної середньої маси вихід однорічок каналного сома становить 80–90% [16].

За візуального огляду цьоголіток сома після зимівлі було виявлено ознаки виснаження — тіло стисле з боків, наявність синдрому «гострої спини», непропорційно велика голова. У риб першого варіанта тіло має світліше забарвлення. Зябра анемічні. При розтині добре помітні дистрофічні зміни у внутрішніх органах. Печінка і селезінка зменшені у розмірах і бліді. Жирова

тканина візуально не спостерігалась.

При мікроскопічному дослідженні паразитарних захворювань у риб обох варіантів не були виявлені.

Проби для гістологічного аналізу відбирали наприкінці грудня, тобто в середині періоду зимівлі. У цей період у цьоголіток були незначні залишки жирової тканини на внутрішніх органах. Мікроскопічна будова жирової тканини у риб першого і другого варіантів представлена на рис. 2.

Рис. 2. Жирова тканина цьоголіток каналъного сома першого (а) та другого (б) варіантів, зб. 8^х

На препаратах видно, що адипоцити у риб другого варіанта візуально більші. Місцями вони з'єднуються, утворюючи великі вакуолі. Будь-яких ознак запалення та інших патологій у риб обох варіантів не виявлено.

Особлива увага при гістологічному аналізі приділялася шкірі, оскільки у сомів, як безлускових риб, вона має основну захисну функцію. На рис. 3 показано поперечний зріз шкіри виснажених (а) та умовно нормальних (б) цьоголіток каналъного сома. Верхній шар епідермісу представлений декількома рядами клітин, форма яких поступово змінюється від циліндричної до сплющеної.

Середній шар епідермісу має велику кількість клітин, які виділяють слиз. Така будова характерна саме для так званих «голих» риб, які не мають луски. Видно, що епідерміс у риб першого варіанта не має чіткої структурної будови і місцями сильно пошкоджений (рис. 3, 1а). Навпаки, у риб другого варіанту він чітко виражений (рис. 3, 1б).

За епідермісом знаходиться дерма, яка складалася з трьох шарів: тонкого верхнього сполучнотканинного, товстого середнього шару еластинових і колагенових волокон (саме він добре помітний на фотографіях зрізів) і тонкого базального шару з високих призматичних клітин (рис 3, 2).

Під дермою розташований пухкий шар сполучної тканини з жировими включеннями (підшкірна жирова клітковина). У риб обох варіантів вона була представлена тонким шаром, що пов'язано з тривалим періодом їх голодування (рис. 3, 3)

Рис. 3. Шкіра цьоголіток каналного сома першого (а) та другого (б) варіантів, зб. 8^х: 1 — епідерміс, 2 — дерма, 3 — підшкірна жирова клітковина

Відомо, що у риб середній залозистий шар епідермісу представлений трьома типами клітин — келихоподібними, округлими (серозними) і колбоподібними, які виробляють слизовий секрет. Слиз зменшує тертя риби у воді, має бактерицидні властивості, а також бере участь у згортанні крові під час поранень. У риб, які повільно плавають, наприклад, у сомів, в нормі зустрічаються всі три типи клітин [17].

В наших дослідженнях у риб першого варіанта залозистий шар був представлений лише округлими і келихоподібними клітинами (рис. 4, а). Навпаки, у риб другого варіанта на препаратах чітко видно всі три типи клітин (рис. 4, б). Вони розташовувались рівномірно по всій поверхні тіла. Але колбоподібні клітини більш концентрувались у нижніх шарах епітелію.

Рис. 4. Залозистий шар шкіри цьоголіток каналного сома першого (а) та другого (б) варіантів, зб. 40^х: 1 — келихоподібні клітини, 2 — округлі клітини, 3 — колбоподібні клітини

Колбоподібні клітини не виділяють слиз на поверхню тіла, оскільки залягають глибоко біля дерми. Але вони виробляють секрет сильної біологічної дії, і тому виконують при пораненні риб основну захисну функцію [18].

Таким чином, неповний набір залозистих клітин в епідермісі виснажених цьоголіток каналъного сома вказує на слабку захисну спроможність шкіри. Це робить їх сприйнятливими до збудників хвороб і дії інших зовнішніх небезпечних чинників.

Мікроскопічна картина м'язів молоді каналъного сома представлена на рис. 5. У риб першого варіанта відсутня чітка топографія міомерів і міосепт (рис. 5, а), на відміну від риб другого варіанта, де добре виділяються два міомери, які поділені сполучнотканинними міосептами (рис. 5, б).

Рис. 5. М'язова тканина цьоголіток каналъного сома першого (а) та другого (б) варіантів, зб. 8^х

Дослідження мікроструктури м'язів риб за великого збільшення мікроскопа (40^х) показали, що у цьоголіток з масою меншою 10 г наявні явища дистрофії та некрозу м'язових волокон, поступове заміщення їх фіброзною тканиною. Волокна розташовані безсистемно, не зібрані в пучки. У риб з більшою масою тіла і кращими показниками вгодованості м'язові волокна були зібрані у щільні пучки. Некротичні явища були відсутні. Фіброз м'язової тканини не був помітним.

Очевидно, що довготривале голодування призводило до руйнування структурних білків, з яких складаються м'язові волокна. Тому у риб, які мали більшу м'язову масу і, відповідно, більший запас структурних білків, пошкодження м'язових волокон було менш помітним. Аналогічні зміни у структурі м'язової тканини спостерігались у інших видів риб [19, 20].

Печінка є травною залозою, яка виконує в організмі багато функцій. Завдяки високій функціональній спеціалізації, печінка відіграє значну роль у підтриманні гомеостазу організму. Структурно-функціональний стан печінки часто використовують як індикатор фізіологічного стану риб [21, 22]. Саме печінка риб виконує основне навантаження в умовах підвищеного техногенного пресу і від її функціональної активності залежить здатність організму до виживання.

На зрізах печінки цьоголіток сома першого варіанта паренхіма виглядає пухкою (рис. 6, (а)). Цитоплазма зерниста, вакуолізована. Паренхіму пронизують жовчні капіляри (1). Кровоносні синуси заповнені форменими елементами крові. Окремі синуси злипаються (рис. 5). У деяких синусів оболонка пошкоджена, і є явища крововиливів у тканину. Накопичення жирових вакуоль не спостерігається. Очевидно, що запаси жиру витрачені внаслідок тривалого голодування.

Рис. 6. Печінка цьоголіток каналного сома першого (а) та другого (б) варіантів, зб. 40^x: 1 — жовчний канал, 2 — вакуолізація епітелію жовчного каналу, 3 — некроз епітелію жовчного каналу, 4 — кровоносний синус, 5 — злипання кровоносного синуса

У цьоголіток другого варіанта паренхіма печінки виглядає більш щільною (рис. 6, (б)). Добре виділяються кровоносні синуси (рис. 4). Їх оболонки не пошкоджені, тому інфільтрації лейкоцитів та еритроцитів не спостерігається. Злипання кровоносних синусів є, але незначне. Гепатоцити дрібні, щільно прилягають один до одного.

На рис. 6 (а) видно патологічні зміни у жовчних каналах. У багатьох з них відбуваються процеси вакуолізації епітелію (рис. 2). Це пов'язано з порушеннями вуглеводного обміну, а саме — обміну олігосахаридів [23].

Більшість жовчних проток має великий діаметр просвіту (рис. 1, 3), що може вказувати на тривалий застій жовчі під час голодування. Трапляються також жовчні канали з некрозом епітелію (рис. 2). Гепатоцити зменшені в розмірах, з ознаками дистрофії. Жирові накопичення відсутні.

На препаратах печінки цьоголіток каналного сома другого варіанта (рис. 6 (б)) добре помітно, що у жовчних каналів значно менший просвіт (рис. 1). Епітелій каналів не має наявних патологічних змін, оболонки не пошкоджені. Кровоносний синус на вигляд дещо злиплий, заповнений незначною кількістю еритроцитів (рис. 4). Спостерігалась інфільтрація еритроцитів у паренхіму печінки, що може вказувати на зниження проникності оболонок епітеліальних клітин синусів. Гепатоцити заповнені жировими вакуолями.

Для вивчення впливу низьких зимових температур на молодь каналного сома досліджувалась також мікроструктура шлунково-кишкового тракту. Слизова оболонка кишківника вистелена циліндричним одношаровим епітелієм з мікрворсинками, який містить слизові келихоподібні клітини і травні залози. В цьому відділі травного тракту відбувається всмоктування та перетравлення їжі в лужному середовищі за допомогою травних ферментів. Раніше було встановлено, що у цьогорічок каналного сома взимку в умовах тепловодного вирощування, завдяки підвищеній температурі води, активність травних ферментів залишається досить високою [24]. Це дає змогу здійснювати годівлю і отримувати приріст маси у риб під час зимівлі. Але в умовах екстремальної зимівлі, коли риби

вимушені знаходитись під тривалою дією низьких температур, процеси травлення у них поступово загасають. Тому цікаво було дослідити гістологічні зміни у кишечнику каналного сома різної індустріальної маси і ступеня вгодованості.

На рис. 7 показані зрізи кишечника цьоголіток каналного сома першого варіанта (а), де були більш виснажені риби, та другого варіанта (б), де були більш вгодовані риби.

Візуально видно, що кількість складок кишківника та їх довжина у риб другого варіанта більші, ніж у риб першого. Це свідчило про активну травну роботу кишечника.

Загальновідомо, що кишкові ворсинки — головні структурні елементи, що забезпечують травлення і всмоктування поживних речовин у середній кишці. Основу кожної ворсинки складає кровоносний капіляр, оточений тонким шаром несформованої сполучної тканини. Капіляри заповнені еритроцитами. Епітелій містить слизові бокалоподібні клітини [25].

Дослідження мікроструктури кишкових ворсинок за великого збільшення мікроскопа (40^x) показали, що їх висота і товщина у риб двох варіантів неоднакова. У риб другого варіанта ворсинки довші і чіткіше сформовані. Кількість слизових клітин також була більшою у риб другого варіанта.

Рис. 7. Кишківник цьоголіток каналного сома першого (а) та другого (б) варіантів, зб. 40^x

Відмінністю було також те, що у риб першого варіанта відмічались ділянки каймистого епітелію, повністю позбавленого ворсинок. Тобто довготривале зимове голодування риб призводило до відмирання кишкових ворсинок та злущування епітелію. Характерною гістологічною картиною для кишечника виснажених цьоголіток каналного сома було зрощування ворсинок. Особливо це було помітно у риб першого варіанта. Аналогічну патологію каймистого епітелію у риб за порушень травлення відмічають інші автори [17, 26] і пов'язують її з адаптивно-приспосувальними змінами організму до умов вимушеного довготривалого голодування або дефіциту їжі.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Особливостями зимівлі каналного сома в умовах індустриальних тепловодних рибних господарств є тривалий період занадто низьких для нього температур води (3–5°C). В цих умовах цьоголітки каналного сома втрачали до 76% своєї маси. Коефіцієнт вгодованості за Фультоном знижувався в середньому на 40%. Показник виживання риб за зимовий період коливався від 51 до 64%, відповідно в залежності від індивідуальної маси цьоголіток перед зимівлею. Довготривале зимове голодування молоді каналного сома призводило до пошкодження епідермісу шкіри, обмеження кількості епідермальних залозистих клітин, які виконують захисну функцію; руйнування м'язових волокон і заміни їх фіброзною тканиною, порушення топографії міомерів і міосепт. У виснажених цьоголіток каналного сома відмічаються патологічні зміни у внутрішніх органах: дистрофія гепатоцитів, вакуолізація епітелію жовчних каналців, злушчування каймистого епітелію кишківника, відмирання або зрощування кишкових ворсинок.

Враховуючи актуальність і практичне значення досліджуваної проблеми, перспективними напрямками подальшого розвитку є удосконалення технології годівлі цьоголіток каналного сома перед екстремальною зимівлею та розроблення інноваційної технології зимового утримання каналного сома у басейнових господарствах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры. Рим : ФАО, 2014. 233 с.
2. Asche F., Insignares J., Roheim C. The value of sustainable fisheries: evidence from the retail sector in the U.K. Presentation to North American Association of Fisheries Economists . Newport, 2009. 128 p.
3. Про аквакультуру : Закон України від 18.09.2012 № 5293-VI (чинний з 01.01.2013 р.) // Офіційний вісник України. 2012. № 79.
4. Концепція розвитку рибного господарства Дніпропетровської області на наступні п'ять років / Федоненко О. В. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2015. № 1. С. 16—25.
5. Гринжевський М. В. Аквакультура України. Львів : Вільна Україна, 1998. 364 с.
6. Вдовенко Н. М. Сучасний стан та напрями розвитку рибного господарства в Україні // Економіка АПК. 2010. № 3. С. 15—21.
7. Кваша С. М., Вдовенко Н. М. Наукові засади державного регулювання розвитку аквакультури штучних водойм // Економіка та держава. 2011. № 11. С. 12—16.
8. Current state and development of the fisheries sector of Ukraine in the crisis / Hrytsyniak I. et al. // Рибогосподарська наука України. 2015. № 1. С. 5—15.
9. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / ред. Романенко В. Д. Київ : Інститут гідробіології НАНУ, 2006. 628 с.
10. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва : Пищ. пром-сть, 1966. 376 с.
11. Быховская-Павловская И. Е. Паразитологические исследования рыб. Ленинград : Наука, 1969. 108 с.

12. Роскин Г. И., Левинсон Л. Б. Микроскопическая техника. Москва : Советская наука, 1957. 468 с.
13. Сидоров М. А. Еколого-фізіологічні основи індустріального вирощування канального сома : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 06.00.24 — іхтіологія та рибництво. Київ, 1995. 21 с.
14. Калмыков Л. В. Разведение и выращивание канального сома (*Ictalurus punctatus* (Raf.)) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.10 — ихтиология. Москва, 1989. 28 с.
15. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбководству. Т. 2. Москва : Агропромиздат, 1986. 318 с.
16. Методические рекомендации по биотехнике выращивания канального сома в садках. Львов : УкрНИИРХ, 1983. 26 с.
17. Иванов А. А. Физиология рыб. Москва : Мир, 2003. 284 с.
18. Беляков А. А., Федорова Н. Н., Грушко М. П. Изменения клеток и тканей молоди шемаи (*Chalcalburnus chalcoides*) при искусственном выращивании // Труды ВНИРО. 2016. Т. 162. С. 138—144.
19. Мельникова М. С. Гистологические методы в оценке состояния рыб при искусственном выращивании // Проблемы патологии, иммунологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов : IV Междунар. конф. : расшир. матер. Борок ; Ярославль : Филигрань. 2015. С. 331—336.
20. Єсіпова Н. Б. Структурно-функціональний стан печінки у коропа в умовах тепловодного вирощування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.10 — іхтіологія. Київ, 2003. 20 с.
21. Шуман Л. А. Гистопатологические изменения и репродуктивный потенциал у рыб в водоемах Обь-Иртышского бассейна с различной антропогенной нагрузкой : дис... канд. биол. наук : спец. 03.02.06 — ихтиология. Тюмень, 2014. 203 с.
22. Силкина Н. И., Микряков Д. В., Микряков В. Р. Влияние антропогенного загрязнения на окислительные процессы в печени рыб Рыбинского водохранилища // Экология. 2012. № 5. С. 361—365.
23. Доценко Н. В. Особливості травлення канального сома при вирощуванні на теплих водах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.00.24 — іхтіологія та рибництво. Київ, 1995. 26 с.
24. Козій М. С., Шерман І. М., Лянзберг О. В. Атлас гістології та ембріології промислових риб. Херсон : Грін Д.С., 2011. 404 с.
25. Sharon G., Zilberg D. Atlas of Fish Histology and Histopathology. [S. l.] : Arava Research and Development Centers, 2011. 77 p.

REFERENCES

1. *Sostoyanie mirovogo rybolovstva i akvakulturyi*. (2014). Rim: FAO.
2. Asche, F., Insignares, J., & Roheim, C. (2009). *The value of sustainable fisheries: evidence from the retail sector in the U.K. Presentation to North American Association of Fisheries Economists*. Newport.
3. Закон Ukrainy «Pro akvakul'turu»: vid 18.09.2012 № 5293-VI (chynnyy z 01.01.2013 r.). (2012). *Ofitsiynnyy visnyk Ukrainy*, 79.
4. Fedonenko, O. V., Yesipova, N. B., Marenkov, O. M., & Sharamok, T. S. (2015). Kontseptsiya rozvytku rybnoho hospodarstva Dnipropetrovs'koyi oblasti na nastupni p"yat' rokiv. *Rybohospodars'ka nauka Ukrainy*, 1, 16-25.

5. Hrynzhhevskyy, M. V. (1998). *Akvakul'tura Ukrayiny*. L'viv: Vil'na Ukrayina.
6. Vdovenko, N. M. (2010). Suchasnyy stan ta napryamy rozvytku rybnoho hospodarstva v Ukrayini. *Ekonomika APK*, 3, 15-21.
7. Kvasha, S. M., & Vdovenko, N. M. (2011). Naukovi zasady derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku akvakul'tury shtuchnykh vodoym. *Ekonomika ta derzhava*, 11, 12-16.
8. Hrytsyniak, I., Sharko, D., Shkarban, V., & Plichko, V. (2015). Current state and development of the fisheries sector of Ukraine in the crisis. *Rybohospodars'ka nauka Ukrayiny*, 1, 5-15.
9. Romanenko, V. D. (Ed.). (2006). *Metody hidroekologichnykh doslidzen' poverkhnevyykh vod*. Kyiv: Instytut hidrobiolohiyi NANU.
10. Pravdin, I. F. (1966). *Guide to the study of fish (mainly freshwater)*. Moskva : Pisch. promyshlennost'.
11. Bykhovskaya-Pavlovskaya, I. E. (1969). *Parasitological studies of fish*. Leningrad: Nauka.
12. Roskin, G. I., & Levinson, L. B. (1957). *Microscopic technique*. Moscow: Soviet Science.
13. Sydorov, M. A. (1995). Ekologo-fiziologichni osnovy industrial'noho vyroshchuvannya kanal'noho soma. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv.
14. Kalmykov, L. V. (1989). Dilution and cultivation of duct catfish (*Ictalurus punctatus* (Raf.)). *Extended abstract of candidate's thesis*. Moskva.
15. *Collection of normative and technological documentation for a commodity fish-breeder* (1986). (Vol. 1-2; Vol. 2). Moskva: Agropromizdat.
16. Methodical recommendations on biotechnology of canal catfish cultivation in cages (1983). Lviv: UkrNIIRKh.
17. Ivanov, A. A. (2003). *Physiology of fish*. Moscow: Mir.
18. Belyakov, A. A., Fedorova, N. N., & Grushko, M. P. (2016). Changes in cells and tissues of young shemae (*Chalcalburnus chalcoides*) in artificial cultivation. *Proceedings of VNIRO*, 162, 138-144.
19. Melnikova, M. S. Histological methods in assessing the state of fish in artificial growth. (2015). *Problems of Pathology, Immunology and Protection of Health of Fish and Other Hydrobionts: IV Intern. Conf.: Enhanced Materials*. Borok; Yaroslavl: Filigree, 331-336.
20. Yesipova, N. B. (2003). Strukturno-funktsional'nyy stan pechinky u koropa v umovakh teplovodnoho vyroshchuvannya. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv.
21. Shuman, L. A. (2014). Histopathological changes and reproductive potential in fish in water in the Ob-Irtysh basin with different anthropogenic load. *Candidate's thesis*. Tyumen.
22. Silkina, N. I., Mikryakov, D. V., & Mikryakov, V. R. (2012). Influence of anthropogenic pollution on oxidative processes in the liver of fish of the Rybinsk Reservoir. *Ecology*, 5, 361-365.
23. Dotsenko, N. V. (1995). Osoblyvosti travlennya kanal'noho soma pry vyroshchuvanni na teplykh vodakh. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv.
24. Koziy, M. S., Sherman, I. M., & Lyanzberh, O. V. (2011). Atlas histolohiyi ta embriolohiyi promyslovykh ryb. Kherson: Hrin' D.S.
25. Sharon, G., & Zilberg, D. (2011). *Atlas of Fish Histology and Histopathology*. [S. l.]: Arava Research and Development Centers.

МОРФОГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЕГОЛЕТКОВ КАНАЛЬНОГО СОМА (*ICTALURUS PUNCTATUS* RAF., 1818), СОДЕРЖАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ЗИМОВКИ

Н. Б. Есипова, yesipova.natalia@gmail.com, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара., г. Днепр

А. В. Шварц, hydro-dnu@gmail.com, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара., г. Днепр

Я. В. Тучапский, Yartuchapsky@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Исследовать влияние экстремально низких температур воды на морфологические и гистологические показатели молоди канального сома в период зимовки в индустриальном тепловодном рыбном хозяйстве.

Методика. Исследования проводились в период зимовки рыбы (октябрь–март) 2016–2017 гг. в Приднепровском индустриальном тепловодном бассейновом рыбном хозяйстве (г. Днепр). Температуру воды в бассейнах контролировали два раза в сутки, гидрохимические параметры — еженедельно.

У сеголетков канального сома (*Ictalurus punctatus* raf., 1818) определяли индивидуальную массу, длину, коэффициент упитанности по Фультону, показатель выживания. Еженедельно проводили ихтиопатологические исследования: определяли цвет, наличие слизи, любые повреждения кожи, состояние жабр. Для паразитологического анализа делали соскобы с поверхности тела и жабр с последующей их микроскопией. При анатомическом вскрытии рыбы обращали внимание на патологические изменения внутренних органов.

Для оценки физиологического состояния молоди канального сома в период зимовки проводили анализ микроструктуры тканей и органов путем изготовления гистологических срезов по общепринятой методике. Анализ гистологических препаратов проводился с помощью светового микроскопа при увеличении объектива 8х и 40х, и фотографической цифровой камеры «Sciencelab T500 5.17 М». Цифровой материал обработан статистическими методами.

Результаты. Особенностью зимовки канального сома в индустриальных тепловодных рыбных хозяйствах является длительный период очень низких температур воды (3–5 °С). Исследования показали, что в этих условиях сеголетки канального сома теряли до 76% своей массы. Коэффициент упитанности по Фультону снижался в среднем на 40%. Показатель выживаемости рыб за зимний период колебался от 51 до 64% в зависимости от индивидуальной массы сеголетков перед зимовкой. Длительное зимнее голодание молоди канального сома приводило к повреждению эпидермиса кожи, снижению количества эпидермальных железистых клеток, которые выполняют защитную функцию; разрушению мышечных волокон и замене их фиброзной тканью, нарушению топографии миомеров и миомерт. У истощенных сеголетков канального сома возникали патологические изменения во внутренних органах: дистрофия гепатоцитов, вакуолизация эпителия желчных канальцев, слущивание каемчатого эпителия кишечника, атрофия или сращивание кишечных ворсинок.

Научная новизна. Полученные данные микроструктурного анализа тканей и органов сеголетков канального сома в условиях экстремальной зимовки позволяют выявить приспособительные возможности данного вида рыб к низким температурам воды и могут быть использованы для научной корректировки технологии зимнего содержания канального сома в индустриальных тепловодных рыбных хозяйствах.

Практическая значимость. Результаты выполненной работы представляют интерес для тепловодных рыбных хозяйств, которые испытывают проблемы с температурным режимом воды, связанные с нерегулярными объемами сброса теплых вод энергетических объектов. Сведения о гистологических изменениях в организме молоди канального сома в условиях длительного действия низких температур воды можно использовать для

совершенствования технологии кормления рыб перед неблагоприятной зимовкой.

Ключевые слова: каналный сом, индустриальное тепловодное рыбное хозяйство, зимовка, низкие температуры воды, рыбоводные показатели, микроструктура тканей и органов.

MORPHO-HISTOLOGICAL EVALUATION OF YOUNG-OF-THE-YEAR CHANNEL CATFISH (*ICTALURUS PUNCTATUS* RAF., 1818) IN EXTREMELY WINTERING CONDITIONS

N. Yesipova, yesipova.natalia@gmail.com, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

G. Schwartz, hydro-dnu@gmail.com, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

Y. Turchapsky, Yartuchapsky@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To investigate the effect of extreme low water temperatures on morphological and histological parameters of young-of-the-year (YOY) channel catfish (*Ictalurus punctatus* raf., 1818) during wintering at a warm water fish farm.

Methodology. The study was carried out during fish wintering (October-March) in 2016-2017 in the Pridniprov'sk thermal water tank fish farm (city of Dnipro). Water temperature in tanks was monitored twice a day, the hydrochemical parameters – once a week.

Following parameters were determined in YOY channel catfish: individual weight, body length, Fulton condition factor, survival rate (%). Ichthyopathological studies were performed once a week: color, presence of mucus, any skin damages and the state of gills. For the parasitological analysis, scrubs were taken from the body surface and gills, followed by microscopy. During postmortem examination of fish, special attention was paid to the pathological changes of internal organs.

To evaluate the physiological state of YOY channel catfish during wintering, an analysis of tissue and organ microstructures was carried out with the use of histological sections according to generally accepted methods. The analysis of histological preparations was carried out with the light microscope with 8x and 40x magnification and a photographic digital camera "Sciencelab T500 5.17M" at the DNU Department of General Biology and Aquatic Bioresources. The digital material was processed by statistical methods with the determination of the standard error and Student's test.

Findings. A peculiarity of fish wintering at modern warm water fish farms is a long period of too low water temperatures (3-5 °C). The study showed that under these conditions, YOY channel catfish lost up to 76% of their weight. Fulton's condition factor was reduced on average by 40%. The parameter of fish survival during the winter period varied from 51 to 64% depending on the individual YOY weight before wintering. Long-term winter starvation of YOY channel catfish caused damage to the the skin epidermis, limiting the number of epidermal glandular cells that perform the protective function; the muscle fibers destruction and their replacement with the fibrous tissue, disorders of myometers and miosept topography. The exhausted YOY channel catfish had following pathological changes in the internal organs: hepatocyte dystrophy, vacuolation of the bile duct epithelium, exfoliation of the intestinal epithelium, death or fusion of intestinal villi.

Originality. The obtained data on microstructural analysis of YOY channel catfish tissues and organs in the conditions of extreme wintering allows identifying the adaptive possibilities of this species to low water temperatures and can be used for scientific adjustment of keeping the channel catfish during winter at warm water fish farms.

Practical value. The presented results of the scientific work are intended for warm water fish farms, which experience problems with the water temperature regime associated with irregular amounts of warm water discharges from energetic objects. Information on histological changes in the YOY channel catfish body in the conditions of low water temperatures under prolonged action could be used to improve fish feeding before unfavorable wintering.

Keywords: channel catfish, warm water fish farming, wintering, low water temperatures, fish indicators, microstructure of tissues and organs.

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 99-111
DOI: 10.15407/fsu2017.04.099
UDC 597-1.05:[597.583.1:597.554.3] :628.394.1

PHYSIOLOGICAL-BIOCHEMICAL STATUS OF PERCH (*PERCA FLUVIATILIS* LINNAEUS, 1758) AND ROACH (*RUTILUS RUTILUS* LINNAEUS, 1758) IN CONDITIONS OF EXCESSIVE ANTHROPOGENIC PRESSURE ON THE BODY OF WATER

V. Martseniuk, wmarzenuk@gmail.com, Institute of hydrobiology of Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

A. Potrokhov, alport@bigmir.net, Institute of hydrobiology of Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

O. Zinkovskyi, hydrobiol@igb.ibc.com.ua, Institute of hydrobiology of Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

M. Prichepa, prichepa1987@ukr.net, Institute of hydrobiology of Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

---

Purpose. To establish during the spring and summer period the physiologically-biochemical response of fish to the effect of excessive anthropogenic contamination on the indicators of the maintenance of hormones and glucose in their blood plasma, and the possibility of using these indicators to assess the ecological status of the water body.

Methodology. Two Lakes in the city of Kyiv were selected for research, which are characterized by various hydrochemical and toxicological indices. These water objects were Lake Kyrylivske (Opechen Upper) – a water body from the system of Lakes Opechen (polluted by the water body) and Lake Babyne that is on Trukhanov Island (relatively clean Lake, control). Fishing was carried out in the early spring and in the middle of the summer by hook fishing gear. In laboratory conditions, the total content of thyroxine (T4), triiodothyronine (T3) and cortisol in blood plasma of fish was determined by enzyme immunoassay, using commercial T3-EIA, T4-EIA sets (NPL Granum, Ukraine) and DS-EIA-Steroid-Cortisol ("Diagnostic Systems" NGO, Russia) using the Rayto RT-2100C EIA Analyzer. The glucose content was determined by spectrophotometrically glucose oxidase method using standard commercial kits "Filisit-Diagnostika" (Ukraine).

Statistical data was processed using the programs Statistica 10.0 and Excel programs from the Microsoft Office suite.

Findings. In the spring, excessive anthropogenic pressure on the Lake Kyrylivske causes an energy imbalance in fish, which causes the deceleration of catabolic reactions in their tissues. In this period, the perch and roach react to the conditions of existence in the Lake Kyrylivske increase in the content of cortisol in the blood compared with fish from the Lake. Babyne, what can be their reaction to excessive anthropogenic stress.

Also, during this period, the low content of thyroxin and triiodothyronine in the perch from the Lake Kyrylivske was noted compared with the Lake. Babyne, which is probably caused by changes in the oxygen and temperature regime during spawning.

Increase of thyroxine content in roach from Lake Kyrylivske during the summer period with respect to fish from the Lake Babyne may indicate an increase in the negative effects of toxic substances on the physiological state of fish as water temperature rises. At the perch from the Lake Kyrylivske content of T3 and T4 in 1.19 and 6.22 times, respectively is higher, than that of fish from the Lake Babyne, which is associated with enhanced processes of generating energy in his body, as a result of increased activity of redox reactions, as well as different degrees of oxygen consumption by tissues under complicated conditions of existence.

In the summer, in the roach from the Lake Babyne content of cortisol is 2.05 times higher than

©V. Martseniuk, A. Potrokhov, O. Zinkovskyi, M.Prichepa, 2017

that of roach of Lake Kyrlyvske, which may be the result of a violation of the mobilization of energy compounds by the organism of this species from the Lake Kyrlyvske. The content of glucose in the blood plasma of the perch from the Lake Kyrlyvske was 10.5 mmol/L in the summer, which is 1.43 times higher than that of fish from the Lake Babyne. Such a buildup of glucose can be a mechanism for counteracting toxic substances in the environment. Decrease of glucose content in roach from Lake Kyrlyvske is probably the consequence of increased its utilization to ensure the energy homeostasis of the organism under similar conditions of existence.

Originality. Inter-species and inter-season differences in the content of hormones in perch and roach, which were under the influence of anthropogenic loading on the water bodies of the metropolis, were established.

Practical Value. The obtained results suggest that the characteristics of the thyroxine, triiodothyronine and cortisol content can be characterized by the physiological state of fish, as well as the ecological state of the most water bodies.

Keywords: perch, roach, anthropogenic load, hormones, thyroxine, triiodothyronine, cortisol, glucose.

PROBLEM STATEMENT AND ANALYSIS OF LAST ACHIEVEMENTS AND PUBLICATIONS

One of the reasons for the global environmental crisis, according to international experts, is the accumulation of a huge amount of production and household waste, which ultimately fall into the water bodies [1].

Most of the chemicals entering waters with wastewater and atmospheric precipitation are toxic to aquatic organisms [1-3]. Excess of some substances in the natural environment or the presence of others leads to a change in the ecological state of the water body, inevitably affects the qualitative and quantitative composition of the biota. This can be displayed on such important indicators as biodiversity and water body productivity [4-6]. It was also found that the effect of various toxicants on aquatic ecosystems is complex, and the role of individual components can not always be distinguished and evaluated [3]. In addition, it is known that the degree of toxicity for organisms varies throughout the year, depending on the behavior of fish and their physiological state at different times of the year. This problem is especially acute in cities where in urban conditions, in addition to industrial waste, municipal sewage discharges merge into water bodies, amounting to about 20% of the total proportion of wastewater [1].

Under such conditions, compensatory mechanisms are formed in hydrobionts in response to the action of toxicants of different nature, which is reflected, first of all, in the change in the activity of metabolic processes [3, 7]. Therefore, there is a need to search for reliable methods for diagnosing the physiological state of fish and identify those parameters that would adequately reflect the ecological state of specific water bodies. An important role in the regulation of these processes in fish is played by the hormonal system, which, if necessary, is one of the first to trigger a chain of adaptive reactions that promote the development of stress reactions and restore the body's energy homeostasis [8-10].

HIGHLIGHT OF THE EARLIER UNRESOLVED PARTS OF THE GENERAL PROBLEM. AIM OF THE STUDY

The development of the infrastructure of the city of Kiev inevitably increases the anthropogenic pressure on water bodies, thereby worsening the ecological situation

even in relatively safe hydroecosystems [11-12]. The quality of the aquatic environment is determined by the presence of various toxicants in the water, bottom sediments and organisms of hydrobionts. Chemical methods for measuring the amount of xenobiotics allow us to establish only their compliance with existing norms, but the real biological effect is neglected [5]. In addition, indicators of phytoplankton, macrophytes, bacterioplankton, parasitofauna and a number of others on which water quality assessment is based today, in particular within the city of Kiev, play an important role in assessing the ecological state [6, 11, 13-14]. In this regard, there is a need to develop reliable methods and criteria for the ecological assessment of water bodies, as well as toxicological control over their condition [5]. One of such criteria can be biochemical indicators of hydrobionts. In particular, this concerns indicators such as hormones of the thyroid and interrenal glands that can clarify the understanding of the processes of adaptation of fish to excessive contamination of water bodies in combination with the abiotic component [9-10, 15-16].

Based on the foregoing, the purpose of the study was to establish during the spring and summer period the physiologically-biochemical response of fish to the effect of excessive anthropogenic contamination on the indicators of the maintenance of hormones and glucose in blood plasma, and the possibility of using these indicators to assess the ecological status of the water body.

MATERIALS AND METHODS

Two Lakes in the city of Kyiv were selected for research, which are characterized by various hydrochemical and toxicological indices. These water objects were Lake Kyrilivske (Opechen Upper) – a water body from the system of Lakes Opechen (polluted by the water body) and Lake Babyne that is on Trukhanov Island (relatively clean Lake, control). Fishing was carried out in the early spring and in the middle of the summer by hook fishing gear.

The subjects of the study were perch *Perca fluviatilis* L. and roach *Rutilus rutilus* L. as species that are characteristic of these water bodies and are aboriginal. The average perch mass was 28.8 ± 1.2 g, body length 13.9 ± 0.7 cm; the average weight of the roach was 18.6 ± 0.8 g, and the body length was 10.5 ± 0.7 cm. Blood from the heart was obtained with a heparinized syringe and subsequently it was centrifuged for 15 min at 3000 rpm to isolate the plasma. The blood plasma was stored at a temperature of -18°C .

In laboratory conditions, the total content of thyroxine (T4), triiodothyronine (T3) and cortisol in blood plasma of fish was determined by enzyme immunoassay, using commercial T3-EIA, T4-EIA sets (NPL Granum, Ukraine) and DS-EIA-Steroid-Cortisol («Diagnostic Systems» NGO, Russia) using the Rayto RT-2100C EIA Analyzer. The glucose content was determined by spectrophotometrically glucose oxidase method, using standard commercial kits «Filisit-Diagnostika» (Ukraine).

Statistical data was processed using the programs Statistica 10.0 and Excel programs from the Microsoft Office suite.

STUDY RESULTS AND THEIR DISCUSSION

Lake Kyrilivske (Cave II) - a water body that takes drainage of the urban drainage system. With a surface runoff from industrial sites, as well as from adjacent urban areas and roads, a large number of pollutants enter it [12-14]. The total mineralization in

April fluctuated within 520-640 mg/L, water temperature 12.5-17.2 ° C, dissolved oxygen content 6.5-10.0 mg/L. In July, the mineralization was 520-573 mg/L, the water temperature fluctuated within 25.6-28.2 ° C, the dissolved oxygen content was 8.9-16.8 mg/L.

According to the literature, Lake Kyrylivske for indicator indicators of saprobity belongs to the category «dirty - very dirty», alpha-mesopolysaprobna, VI-VII water quality category [11]. According to the data obtained by the sanitary and epidemiological station and literature sources, the indicated water body is subject to anthropogenic load from the Kurenivka area of the city of Kiev through the collector system and the Syrets River. They are the transit waterways, which with different intensity and depending on the season of the year, the activity of industrial shops pollute the Lake with oil products, synthetic surfactants, heavy metals, pesticides, etc. [2, 12, 14]. In addition, given the great depths of the Lake, as well as the low level of water exchange, various compounds, in particular aluminum, iron, manganese, zinc and biogens accumulate in the lower soil layers [4, 17]. These compounds are capable of entering into complexes with other substances, in particular chlorides or sulfates, thereby changing their toxic effect on hydrobionts [3].

A characteristic feature of Lake Kyrylivske is the uneven distribution of biogens between the upper and lower layers of the water body. It should be noted that in July and August, during the intensive development of blue-green and filamentous algae, the quality of water in the Lake deteriorated, which affected the dissolved oxygen content in the bottom layers of water when it decreased to 0.5-0.9 mg/L.

Lake Babyne is an isolated water body, which, in fact, is not subject to anthropogenic impact through a certain distance from the city. Data on phytoplankton, macrophytes, planktonic bacteria and parasitocenosis indicate the presence of natural «virgin» complexes in the water body and high water quality [6, 11, 14]. The lake completely overgrew with surface and underwater vegetation, which, to a large extent, can indirectly determine the hydrochemical and hydrobiological regimes of the water body [13]. The total mineralization of water in April was 250 mg/L, the water temperature fluctuated within 10-13 ° C, the dissolved oxygen content was 8-12 mg/L, in July the analogous parameters were 281.2 mg/L, 22.1- 24.0 ° C, 8-11 mg/L. According to indicators of saprobity, Lake water belongs to the category «clean - fairly clean», alpha-oligobeta-mesosaprobic zone, I-III category [14]. It should be noted that the concentration of a number of biogens, in particular ammonium and nitrate nitrogen in the surface and near-bottom layers of Lake water, varies within acceptable limits and does not reach significant values. Their content is characterized by a uniform distribution across the water area and depth. The insignificant content of biogens in the water body is obviously primarily associated with assimilation by producers, in particular macrophytes and phytobenthos [13].

Thyroid hormones were chosen for the study. According to a number of authors, their metabolic role is to stimulate oxidative processes and regulate lipid metabolism, form in the fish an adequate response to the entry of toxicants into the tissues of the body. Therefore, their content often assess the physiological state of fish [10, 16].

As a result of the research, it was found that in the spring period the content of triiodothyronine and thyroxine in the blood plasma of perch from Lake Babyne is 4.78 and 1.18 times higher, respectively, than that of the perch from Lake Kyrylivske (Figure

1). Increase level of T3 may indicate an intensification in oxidative processes in the tissues of this fish species, and its low content in perch from Lake Kyrylivske is probably caused by changes in the oxygen and temperature regime during spawning.

It can be assumed that the reduced hormonal background of the perch from Lake Kyrylivske is a consequence of an excessive anthropogenic load on this Lake in combination with fish exhaustion in the spring [19-20]. Also, this indicates a slowing of catabolic reactions in their tissues during this period. As a rule, in the spring period after wintering in fish, all metabolic mechanisms are delayed [18]. This is especially true of the processes associated with the energy supply of the fish organism. It is known that the interconversion of thyroxine and triiodothyronine, to a large extent, depends on the pH of the water and the ionic composition of the aqueous medium [20-21]. Considering that in the Lake the Kyrylivske values of these indicators often fluctuate as a result of anthropogenic contamination of the water area with salts of chlorides and sulphates, the content of thyroid hormones in the fish body changes proportionally.

Fig. 1. The content of triiodothyronine (A) and thyroxine (B) in the blood plasma of perch and roach in the spring and summer periods ($M \pm m$, $n = 5$)

As for roach, it has a reverse reaction to the maintenance of thyroid hormones on the conditions of existence. The content of these hormones in fish from Lake Kyrylivske is significantly ($p \leq 0.05$) higher at 4.53 (T3) and 6.66 (T4) times, respectively, than in roach from Lake Babyne.

Roach for anthropogenic load proved to be more plastic than perch, and obviously actively counteracts unfavorable environment due to activation of metabolic reactions, as evidenced by increased level of thyroid hormones. The increase content of T4 can be explained by elevation water temperature, which is a limiting factor in the synthesis of this hormone [19-20]. In addition, roach, in comparison with perch, spawns later, therefore, given that the Lake Kyrylivske in this period is more warm than Babyne, the water temperature could determine the increase in the level of these hormones. Increase in plasma level of T3 in the spring before spawning can be associated with intensive maturation of gonads [15]. It is known that T4 and T3 in the body of fish can replace one another, because they perform almost identical functions. However, the active form of these hormones in tissues is T3, since it has an inherent greater affinity for hormonal receptors in tissues, than T4 [16, 22].

In summer, the hormonal background of the fish species studied is of a different nature. The content of triiodothyronine T3 and thyroxine T4 in perch from Lake Kyrylivske, respectively, is 1.19 and 6.22 times higher, than that of the perch from Lake

Babyne. In turn, the content of T3 in roach from the Lake of Babyne was 1.1 nmol/L, which is 3.92 times higher, than in fish from Lake Kyrlyvske (Fig. 1). The content of T4 in roach from Lake Kyrlyvske in summer is 8.84 times higher than that of the corresponding species from Lake Babyne. The corresponding redistribution of the values of the obtained indices in the summer period can be caused by an increase in the negative impact of toxicants in the Kyrlyvske Lake and a high water temperature, compared with the spring period [1, 12]. To counteract anthropogenic factors, perch and roach include various compensatory mechanisms. Such physiological changes may be accompanied by an intensification of energy generation as a result of an increase in the activity of redox reactions, as well as by a different degree of oxygen consumption by tissues in complicated conditions of existence, in particular, enhanced by eutrophication of water [16, 21]. It is not excluded that such a reaction may also be related to the different taxonomic status of these species, which determines the type of feeding, behavioural activity and the physiology of these fish. This, in general, can affect the nature of the redistribution of these hormones in the blood plasma. In conditions of intensive eutrophication of the water body (Lake Kyrlyvske), the roach actively reduces the T3 content in the blood plasma.

The total content (T3 + T4) retains the regularities described above (Fig. 2).

Fig. 2. The total content (T3 + T4) (A) and cortisol (B) in the blood of perch and roach in the spring and summer periods ($M \pm m$, $n = 5$)

Our research has shown that the nature of the hormonal response to the sum of the environmental factors in play is essentially dependent on the biology of a particular species [9, 19].

Also, we determined the content of cortisol in the blood plasma of fish under different environmental conditions of their existence. It is known that cortisol is a glucocorticosteroid that takes part in the mobilization of energy compounds, in particular glucose, lipids, fatty acids to maintain homeostasis in post-stress periods to restore energy balance [19, 23]. It exerts a direct influence on the intermediate exchange in reactions developing in response to the occurrence of stress conditions [7-8].

Perch and roach in the spring react to the deterioration of environmental conditions by increasing the level of cortisol in the blood, namely 37.5 nmol/L and 32 nmol/L of cortisol in perch and roach from Kyrlyvske, respectively, against 5 nmol/L and 10 nmol/L, respectively in the studied species from Lake Babyne (Fig. 2). This indicates that the overwhelming anthropogenic load on the water body played a predominant role in the growth of the content of this hormone in the blood plasma of fish [12, 14].

In the summer, the maintenance of cortisol in the blood of the perch in both Lakes increases proportionally in comparison with spring indicators, however, the above-mentioned regularity remains. In the roach of Lake Babyne, the cortisol content in summer is 2.05 times higher than that of the corresponding species from Lake Kyrylivske, which may indicate a violation of the mobilization of energy compounds by the body of roach from Lake Kyrylivske. Obviously, the adaptation of this species to the summer conditions of existence in this Lake is more complicated than that of the perch.

The physiological state of fish for the effects of the sum of environmental factors is also appropriate to study the glucose content as the most accessible source of energy for most animals, and also a reliable indicator of stress [8].

As a result of our studies, it was found that the glucose content in the spring period perch and roach from both Lakes is almost the same (5.85-6.86 mmol/L) (Fig. 3).

Fig. 3. The content of glucose in the blood plasma of perch and roach in the spring and summer periods ($M \pm m$, $n = 5$)

However, in summer, the difference in the level of this indicator among fish from different water bodies was recorded. The content of glucose in the blood of perch from Lake Kyrylivske is 10.5 mmol/L, which is 1.43 times higher than that of fish from Lake Babyne. In roach from the control Lake, on the contrary, the concentration of glucose in the blood plasma is 1.44 times higher than in the corresponding species from Lake Kyrylivske (Fig. 3). Again, the described changes can be related to the different taxonomic status of the investigated species [18]. Obviously, during this period the body of a perch from Kyrylivske is accumulating glucose, that is, a mechanism for counteracting toxic substances of the environment. Reduction of the energy content of the roach from the Kyrylivske Lake can be a consequence of its increased utilization to ensure the energy homeostasis of the organism under similar conditions of existence [7, 18]. In addition, the interspecies difference in glucose content may be related to various methods and intensity of its use by these fish in specific ecological conditions of life, in particular, the ionic composition of water and temperature fluctuations.

CONCLUSION AND PERSPECTIVES OF FURTHER DEVELOPMENT

In the spring, excessive anthropogenic pressure on the Lake Kyrylivske causes an energy imbalance in fish, which causes the deceleration of catabolic reactions in their tissues. In this period, the perch and roach react to the conditions of existence in the

Lake Kyrylivske increase in the content of cortisol in the blood compared with fish from the Lake. Babyne, what can be their reaction to excessive anthropogenic stress.

Also, during this period, the low content of thyroxine and triiodothyronine in the perch from the Lake Kyrylivske was noted compared with the Lake. Babyne, which is probably caused by changes in the oxygen and temperature regime during spawning.

Increase of thyroxine content in roach from Lake Kyrylivske during the summer period with respect to fish from the Lake Babyne may indicate an increase in the negative effects of toxic substances on the physiological state of fish as water temperature rises. At the perch from the Lake Kyrylivske content of T3 and T4 in 1.19 and 6.22 times, respectively is higher, than that of fish from the Lake Babyne, which is associated with enhanced processes of generating energy in his body, as a result of increased activity of redox reactions, as well as different degrees of oxygen consumption by tissues under complicated conditions of existence.

In the summer, in the roach from the Lake Babyne content of cortisol is 2.05 times higher than that of roach of Lake Kyrylivske, which may be the result of a violation of the mobilization of energy compounds by the organism of this species from the Lake Kyrylivske. The content of glucose in the blood plasma of the perch from the Lake Kyrylivske was 10.5 mmol/L in the summer, which is 1.43 times higher than that of fish from the Lake Babyne. Such a buildup of glucose can be a mechanism for counteracting toxic substances in the environment. Decrease of glucose content in roach from Lake Kyrylivske is probably the consequence of increased its utilization to ensure the energy homeostasis of the organism under similar conditions of existence.

The obtained results of the content of hormones allow monitoring the Lakes of the megapolis to assess the physiological state of the background representatives of the ichthyofauna, in particular perch and roach, and to assess the ecological state of the most water bodies.

BIBLIOGRAPHY

1. Білявський Г. О., Фурдуй Р. С., Костіков І. Ю. Основи екології. Київ : Либідь, 2005. 408 с.
2. Акімова О. Р., Кураєва І. В., Злобіна К. С. Літологічна характеристика і геохімічний розподіл важких металів у поверхневих водах і донних відкладах Київського мегаполісу // Екологія і природокористування. 2013. Вип. 17. С. 98—104.
3. Сергеева Н. Р., Лукьяненко В. И. Общая ихтиотоксикология. Краснодар : Наука, 2008. 157 с.
4. Гідрохімічний режим озер системи Опечень (м. Київ) / Линник П. М. та ін. // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. 2016. Вип. 269. С. 59—69.
5. Рощина О. В. Влияние природных и антропогенных факторов на активность ферментов сыворотки крови черноморских рыб (на примере морского ерша): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.16 «Экология». Москва, 2010. 23 с.
6. Щербак В. І., Семенюк Н. Є. Функціональна характеристика фітопланктону водойм мегаполісу // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. 2010. № 2 (43). С. 556—559. (Серія : Біологія).

7. Cortisol response and immunerelated effects of Atlantic Salmon (*Salmo salar* Linnaeus) subjected to short- and long-term stress / Fast M. D. et al. // Fish and Shellfish Immunol. 2008. Vol. 24. P. 194—204.
8. Martínez-Porchas M., Martínez-Córdova L. R., Ramos-Enriquez R. Cortisol and Glucose: Reliable indicators of fish stress? // Pan-American Journal of Aquatic Sciences. 2009. Vol. 4, № 2. P. 158—178.
9. Prychepa M. V., Potrokhov O. S. Hormonal regulation of adaptative processes in fishes to impact of abiotic factors // Hydrobiol. J. 2016. Vol. 52, № 1. P. 86—98.
10. Oliveira M., Pacheco M., Santos M. A. Fish thyroidal and stress responses in contamination monitoring — an integrated biomarker approach // Ecotoxicol. Environ. Sci. 2011. Vol. 74. № 5. P. 1265—1270.
11. Юришинець В. І. Структура симбіоценозу гідробіонтів як показник екологічного стану водних об'єктів урбанізованих територій // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. 2015. № 3—4 (64). С. 764—767. (Серія : Біологія).
12. Якість води у міських водоймах та характер освоєння водоохоронних зон (на прикладі озер системи «Опечень», м. Київ) / Панасюк І. В. та ін. // Екологічна безпека та природокористування. 2015. № 4(20). С. 63—69.
13. Гідрохімічна та мікробіологічна характеристика оз. Бабиного, розташованого в межах м. Києва / Якушин В. М. та ін. // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. 2015. № 3—4 (64). С. 776—779. (Серія : Біологія).
14. Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій / Романенко О. В. та ін. Київ : Наукова думка, 2015. 189 с.
15. Болотовский А. А., Левин В. А. Сезонная изменчивость уровня трийодтиронина у трех видов карповых рыб из Рыбинского водохранилища, бассейн Волги // Всерос. конф. с междунар. участием, 12 сент. 2012 г. : тезисы докл. Борок, 2012. С. 54—57.
16. Metabolic and thyroidal response in air-breathing perch (*Anubus testudineus*) to water-borne kerosene / Peter V. S. et al // Gen. Comp. Endocrinol. 2007. Vol. 152. P. 198—205.
17. Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у вирішенні актуальних проблем / Жежеря В. А. та ін. // III наук.-практ. конф. для молодих вчених, 6—7 жовт. 2016 р. : тези доп. Київ, 2016. С. 20—23.
18. Ананьева Т. В., Федоненко О. В. Біохімічні показники тканин і органів окуня (*Perca fluviatilis* L.) Запорізького водосховища // Питання біоіндикації та екології. 2010. Вип. 15, № 2. С. 223—231.
19. Потрохов О. С., Зінковський О. Г., Худіаш Ю. М. Гормональний статус окуня та плітки за зміни екологічних чинників водного середовища // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. 2015. № 3—4. С. 539—543. (Серія : Біологія).
20. Little A. G. Thyroid hormone actions are temperature-specific and regulate thermal acclimation in zebrafish (*Danio rerio*) // BMC Biology. 2013. P. 15.
21. Farbridge K. J., Leatherland J. F. Temporal changes in plasma thyroid hormone, growth hormone and free fatty acid concentrations, and hepatic 5'-monodeiodinase activity, lipid and protein content during chronic fasting and refeeding in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) // Fish Physiol. Biochem. 1992. Vol. 10. P. 245—257.
22. Effects of cortisol and thyroid hormone on peripheral outer ring deiodination and osmoregulatory parameters in the Senegalese sole (*Solea senegalensis*) / Arjona F. J. et al // Journal of endocrinology. 2011. Vol. 208. P. 323—330.

23. Hopkins T. E., Wood C. D., Walsh P. J. Interactions of cortisol and nitrogen metabolism in the ureogenic gulf toadfish *Opsanus beta* // J. Exper. Biol. 1995. Vol. 198. P. 2229—2235.

REFERENCES

1. Bilyavs'kyy, H. O., Furdy, R. S., & Kostikov, I. Yu. (2005). *Osnovy ekolohiyi*. Kyiv: Lybid'.
2. Akimova, O. R. (2013). Litolohichna kharakterystyka i heokhimichnyy rozpodil vazhkykh metaliv u poverkhnevyykh vodakh i donnykh vidkladakh Kyivs'koho mehapolisu. *Ekolohiya i pryrodokorystuvannya*, 17, 98-104.
3. Sergeeva, N. R., & Luk'janenko, V. I. (2008). *Obshhaja ihtiotoksikologija*. Krasnodar: Nauka.
4. Lynnyk, P. M., Zhezhera, V. A., & Zhezhera, T. P. et al. (2016). Hidrokhimichnyy rezhym ozer systemy Opechen' (m. Kyiv). *Naukovi pratsi Ukrayins'koho naukovo-doslidnoho hidrometeorolohichnoho instytutu*, 269, 59-69.
5. Roshhina, O. V. (2010). Vlijanie prirodnih i antropogennykh faktorov na aktivnost' fermentov syvorotki krovi chernomorskih ryb (na primere morskogo ersha). *Extended abstract of candidate's thesis*. Moskva.
6. Shcherbak, V. I., & Semenyuk, N. Ye. (2010). Funktsional'na kharakterystyka fitoplanktonu vodoym mehapolisu. *Naukovi zapysky Ternop. natsped. u-tu im. V. Hnatyuka. Serii Biolohiya*, 2(43), 556-559.
7. Fast, M. D., Hosoya, S., & Johnson, S. C. et al. (2008). Cortisol response and immunerelated effects of Atlantic Salmon (*Salmo salar* Linnaeus) subjected to short- and long-term stress. *Fish and Shellfish Immunol.*, 24, 194-204.
8. Martínez-Porchas, M., Martínez-Córdova, L. R., & Ramos-Enriquez, R. (2009). Cortisol and Glucose: Reliable indicators of fish stress. *Pan-American Journal of Aquatic Sciences*, 4, 158-178.
9. Prychepa, M. V., & Potrokhov, O. S. (2016). Hormonal regulation of adaptative processes in fishes to impact of abiotic factors. *Hydrobiol. J.*, 52, 1, 86-98.
10. Oliveira, M., Pacheco, M., & Santos, M. A. (2011). Fish thyroidal and stress responses in contamination monitoring – an integrated biomarker approach. *Ecotoxicol. Environ. Sci.*, 74, 1265-1270.
11. Yuryshynets', V. I. (2015). Struktura symbiotsenozu hidrobiontiv yak pokaznyk ekolohichnoho stanu vodnykh ob'yektiv urbanizovanykh terytoriy. *Naukovi zapysky Ternop. natsped. u-tu im. V. Hnatyuka. Serii Biolohiya*, 3-4(64), 764-767.
12. Panasyuk, I. V., Tomil'tseva, A. I., Zub, L. M., & Pohoryelova, Yu. V. (2015). Yakist' vody u mis'kykh vodoymakh ta kharakter osvoyennya vodookhoronnykh zon (na prykladi ozer systemy «Opechen'», m. Kyiv). *Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannya*, 4(20), 63-69.
13. Yakushyn, V. M., Romanyshyn, H. M., Kalenichenko, K. P., & Linchuk, M. I. (2015). Hidrokhimichna ta mikrobiolohichna kharakterystyka oz. Babynoho, roztashovanoho v mezhakh m. Kyjevai. *Naukovi zapysky Ternop. natsped. u-tu im. V. Hnatyuka. Serii Biolohiya*, 3-4(64), 776-779.
14. Romanenko, O. V., Arsan, O. M., Kipnis, L. S., & Sytnyk, Yu. M. (2015). *Ekolohichni problemy kyivs'kykh vodoym i prylehlykh terytoriy*. Kyiv: Naukova dumka.
15. Bolotovskyy, A. A. (2012). Sezonnaja izmenchivost' urovnja trijodtironina u treh

- vidov karpovyyh ryb iz Rybinskogo vodohranilishha, bassejn Volgi. *Vserossijskaja konferenciia s mezhdunarodnym uchastiem: materialy*. Borok, 54-57.
16. Peter, V. S., Joskua, E. K., Wendelaar-Bonga, S. E., & Peter, M. C. S. (2007). Metabolic and thyroidal response in air-breathing perch (*Anubus testudineus*) to water-borne kerosene. *Gen. Comp. Endocrinol.*, 152, 198-205.
  17. Zhezherya, V. A., Zadorozhna, H. M., Batoh, S. V., & Zhezherya, T. P. (2016). Suchasna hidroekolohiya: mistse naukovykh doslidzhen' u vyrishenni aktual'nykh problem. *III nauково-prakt. konf. dlya molodykh vchenykh: zb. materialiv*. Kyiv, 20-23.
  18. Anan'eva, T. V. (2010). Biokhimichni pokaznyky tkanyn i orhaniv okunya (*Perca fluviatilis* L.) Zaporiz'koho vodoshkovyshcha. *Pytannya bioindykatsiyi ta ekolohiyi*, 15, 223-231.
  19. Potrokhov, O. S., Zin'kovs'kyi, O. H., & Khudiyash, Yu. M. (2015). Hormonal'nyy status okunya ta plitky za zminy ekolohichnykh chynnykiv vodnoho seredovyscha. *Naukovi zapysky Ternop. natsped. u-tu im. V. Hnatyuka. Seriya Biolohiya*, 3-4(64), 539-543.
  20. Little, A. G. (2013). Thyroid hormone actions are temperature-specific and regulate thermal acclimation in zebrafish (*Danio rerio*). *BMC Biology*, 15.
  21. Farbridge, K. J., & Leatherland, J. F. (1992). Temporal changes in plasma thyroid hormone, growth hormone and free fatty acid concentrations, and hepatic 5'-monodeiodinase activity, lipid and protein content during chronic fasting and refeeding in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Fish Physiol. Biochem.*, 10, 245-257.
  22. Arjona, F. J., Vargas-Chacoff, L., & Martin del Rio, M. P. et al. (2011). Effects of cortisol and thyroid hormone on peripheral outer ring deiodination and osmoregulatory parameters in the Senegalese sole (*Solea senegalensis*). *Journal of endocrinology*, 208, 323-330.
  23. Hopkins, T. E., Wood, C. D., & Walsh, P. J. (1995). Interactions of cortisol and nitrogen metabolism in the ureogenic gulf toadfish *Opsanus beta*. *J. Exper. Biol.*, 198, 2229-2235.

ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИЙ СТАТУС ОКУНЯ РІЧКОВОГО (*PERCA FLUVIATILIS* LINNAEUS, 1758) ТА ПЛІТКИ ЗВИЧАЙНОЇ (*RUTILUS RUTILUS* LINNAEUS, 1758) В УМОВАХ НАДМІРНОГО АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВОДОЙМУ

В. М. Марценюк, wmarzenuk@gmail.com, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

О. С. Потрохов, alport@bigmir.net, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

О. Г. Зінковський, oleg-zinkovskiy@rambler.ru, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

М. В. Причеп, prichepa1987@ukr.net, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Мета. Встановити у весняний та літній періоди фізіолого-біохімічну відповідь риб на вплив надмірного антропогенного забруднення за показниками вмісту гормонів та глюкози в їх плазмі крові, та можливість використання цих показників для оцінки екологічного стану водойми.

Методика. Для дослідження було обрано два озера м. Києва, які характеризуються різними гідрохімічними та токсикологічними показниками. Цими водоймами були оз. Кирилівське (Опечень Верхнє) — водойма із системи озер Опечень (забруднена водойма) та озеро Бабинє, що знаходиться на Трухановому острові (відносно чисте озеро, контроль). Ловлю риб здійснювали ранньою весною та в середині літа гачковими знаряддями лову. У

лабораторних умовах визначали загальний вміст тироксину (Т4), трийодтироніну (Т3) та кортизолу у плазмі крові риб імуноферментним методом, використовуючи комерційні набори ТЗ-ІФА, Т4-ІФА (НВЛ «Гранум», Україна) та «ДС-ІФА-Стероїд-Кортизол» (НВО «Діагностичні системи», Росія) за допомогою ІФА-аналізатора «Rayto RT-2100С». Вміст глюкози встановлювали спектрофотометрично глюкозооксидазним методом з використанням стандартних комерційних наборів «Філісіт-Діагностика» (Україна).

Статистичну обробку даних проводили з використанням програм Statistica 10.0 та програми «Excel» із пакету «Microsoft Office».

Результати. У весняний період надмірне антропогенне навантаження на оз. Кирилівське викликає енергетичний дисбаланс у риб, який зумовлює сповільнення катаболічних реакцій в їхніх тканинах. У цей період окунь та плітка реагують на умови існування в оз. Кирилівське підвищенням вмісту кортизолу у крові, порівняно з рибами із оз. Бабине, що може бути їх реакцією на надмірне антропогенне навантаження.

Також, в цей період було відмічено нижчий вміст тироксину та трийодтироніну в окуня із оз. Кирилівське порівняно із оз. Бабиною, що, ймовірно, спричинене перепадами кисневого та температурного режиму у періоди нересту.

Підвищення вмісту тироксину у плітки із оз. Кирилівське у літній період відносно риб із оз. Бабиною, може свідчити про посилення негативної дії токсичних речовин на фізіологічний стан риб у міру зростання температури води. У окуня ж із оз. Кирилівське вміст Т3 та Т4 у 1,19 та 6,22 раза відповідно вищий, ніж у риб із оз. Бабиною, що пов'язано із посиленням процесів генерування енергії в його організмі, внаслідок підвищення активності окисно-відновних реакцій, а також із різним ступенем споживання кисню тканинами за ускладнених умов існування.

Влітку ж у плітки із оз. Бабиною вміст кортизолу в 2,05 раза вищий, ніж такої із оз. Кирилівське, що може бути наслідком порушення мобілізації енергетичних сполук організмом цього виду із оз. Кирилівське. Вміст глюкози у плазмі крові окуня із оз. Кирилівське влітку становив 10,5 ммоль/л, що у 1,43 раза вище, ніж у риб із оз. Бабиною. Подібне накопичення глюкози може бути механізмом протидії токсичним речовинам навколишнього середовища. Зниження вмісту глюкози в плітки із оз. Кирилівське, ймовірно, є наслідком підвищеної утилізації цієї сполуки для забезпечення енергетичного гомеостазу організму за подібних умов існування.

Наукова новизна. Встановлено міжвидову та міжсезонну різницю за вмістом гормонів у окуня та плітки, які перебували під впливом антропогенного навантаження на водойми мегаполісу.

Практична значимість. Отримані результати дозволяють стверджувати, що за показниками вмісту тироксину, трийодтироніну та кортизолу можна характеризувати фізіологічний стан риб, а також оцінити екологічний стан самих водойм.

Ключові слова: окунь, плітка, антропогенне навантаження, гормони, тироксин, трийодтиронін, кортизол, глюкоза.

ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС ОКУНЯ РЕЧНОГО (*PERCA FLUVIATILIS* LINNAEUS, 1758) И ПЛОТВЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (*RUTILUS RUTILUS* LINNAEUS, 1758) В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗМЕРНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ВОДОЕМ

В. Н. Марценюк, wmarzenuk@gmail.com, Інститут гідробіології НАН України, г. Київ

А. С. Потрохов, alport@bigmir.net, Інститут гідробіології НАН України, г. Київ

О. Г. Зиньковський, oleg-zinkovskiy@rambler.ru, Інститут гідробіології НАН України, г. Київ

Н. В. Причепа, prichepa1987@ukr.net, Інститут гідробіології НАН України, г. Київ

Цель. Установить в весенний и летний периоды физиолого-биохимический ответ рыб на воздействие чрезмерного антропогенного загрязнения по показателям содержания

гормонов и глюкозы в их плазме крови, и возможность использования этих показателей для оценки экологического состояния водоема.

Методика. Для исследования были выбраны два озера г. Киева, которые характеризуются различными гидрохимическими и токсикологическими показателями. Этими водоемами были оз. Кирилловское (Опечень Верхнее) — водоем из системы озер Опечень (загрязненный водоем), и оз. Бабье, находящееся на Трухановом острове (относительно чистое озеро, контроль). Ловлю рыб осуществляли ранней весной и в середине лета крючковыми орудиями лова. В лабораторных условиях определяли общее содержание тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3) и кортизола в плазме крови рыб иммуноферментным методом, используя коммерческие наборы Т3-ИФА, Т4-ИФА (НПЛ «Гранум», Украина) и «ДС-ИФА-Стероид-Кортизол» (НПО «Диагностические системы», Россия) с помощью ИФА-анализатора «Rayto RT-2100C». Содержание глюкозы устанавливали спектрофотометрически глюкозооксидазным методом с использованием стандартных коммерческих наборов «Филисит-Диагностика» (Украина).

Статистическую обработку данных проводили с использованием программ «Statistica 10.0» и «Excel» пакета «Microsoft Office».

Результаты. В весенний период чрезмерная антропогенная нагрузка на оз. Кирилловское вызывает энергетический дисбаланс у рыб, обуславливающий замедление катаболических реакций в их тканях. В этот период окунь и плотва реагируют на условия существования в оз. Кирилловское повышением содержания кортизола в крови по сравнению с рыбами оз. Бабье, что может быть их реакцией на чрезмерную антропогенную нагрузку.

Также, в этот период было отмечено низкое содержание тироксина и трийодтиронина у окуня из оз. Кирилловское по сравнению с оз. Бабье, что, вероятно, вызвано перепадами кислородного и температурного режима в периоды нереста.

Повышение содержания тироксина у плотвы из оз. Кирилловское в летний период относительно рыб из оз. Бабье может свидетельствовать об усилении негативного воздействия токсичных веществ на физиологическое состояние рыб по мере роста температуры воды. У окуня же из оз. Кирилловское содержание Т3 и Т4 в 1,19 и 6,22 раза соответственно выше, чем у рыб из оз. Бабье, что связано с усилением процессов генерирования энергии в его организме, вследствие повышения активности окислительно-восстановительных реакций, а также с различной степенью потребления кислорода тканями в осложненных условиях существования.

Летом же у плотвы из оз. Бабье содержание кортизола оказалось в 2,05 раза выше, чем у плотвы из оз. Кирилловское, что может быть следствием нарушения мобилизации энергетических соединений организмом этого вида из оз. Кирилловское. Содержание глюкозы в плазме крови окуня из оз. Кирилловское летом составляло 10,5 ммоль/дм³, что в 1,43 раза выше, чем у рыб из оз. Бабье. Подобное накопление глюкозы может быть механизмом противодействия токсичным веществам окружающей среды. Снижение содержания глюкозы у плотвы из оз. Кирилловское, вероятно, является следствием повышенной утилизации этого соединения для обеспечения энергетического гомеостаза организма при подобных условиях существования.

Научная новизна. Установлена межвидовая и межсезонная разница в содержании гормонов у окуня и плотвы, которые находились под влиянием антропогенной нагрузки на водоемы мегаполиса.

Практическая значимость. Полученные результаты позволяют утверждать, что по показателям содержания тироксина, трийодтиронина и кортизола можно характеризовать физиологическое состояние рыб, а также оценить экологическое состояние самих водоемов.

Ключевые слова: окунь, плотва, антропогенная нагрузка, гормоны, тироксин, трийодтиронин, кортизол, глюкоза.

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 112-120
DOI: 10.15407/fsu2017.04.112
УДК 597.443:621.59

ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ КОМБІКОРМУ «ALLER AQUA» НА ВМІСТ ВІЛЬНИХ АМІНОКИСЛОТ У М'ЯЗАХ І ПЕЧІНЦІ СТРУМКОВОЇ (*SALMO TRUTTA LINNAEUS*, 1758) ТА РАЙДУЖНОЇ (*ONCORHYNCHUS* *MYKISS WALBAUM*, 1792) ФОРЕЛЕЙ

Л. Л. Галоян, ecofishua2017@gmail.ru, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

І. І. Грициняк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Л. П. Драган, dragan_l@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити рівень засвоєння амінокислот білка корму, а також встановити амінокислотний склад білків у м'язах і печінці струмкової та райдужної форелей за умов годівлі спеціалізованим продукційним комбікормом фірми «Aller Aqua».

Методика. Загальний амінокислотний склад тканин м'язів та печінки визначали за методом іонообмінної рідинно-колонкової хроматографії.

Результати. Амінокислотний склад дослідженого корму в цілому відповідає спектру амінокислот у тканинах м'язів і печінки струмкової та райдужної форелей. Як в печінці, так і в м'язах риб виявлено істотне переважання глутаміну та глутамінової кислоти. Серед незамінних амінокислот в м'язах та печінці досліджених риб найбільша частка припадає на лейцин, аргінін та лізин.

Наукова новизна. Вперше досліджено вплив штучної годівлі спеціалізованим продукційним кормом «Aller Aqua» на амінокислотний склад тканин струмкової і райдужної форелей, вирощених в умовах індустріальної аквакультури.

Практичне значення. У наш час особливої актуальності набувають дослідження, присвячені всебічній оцінці впливу комбікормів на ріст і розвиток прісноводних риб, зокрема — на амінокислотний склад тканин лососевих риб.

Представлена робота дає можливість визначити співвідношення ступеня білкових компонентів корму та харчових потреб струмкової та райдужної форелей з метою коригування дисбалансу та дефіциту амінокислотного складу кормової рецептури.

Ключові слова: струмкова форель, райдужна форель, індустріальна аквакультура, штучні корми, амінокислотний склад.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПУБЛІКАЦІЙ

Аквакультура в Україні є частиною сектора внутрішнього рибництва і на сьогодні зосереджена на розведенні та вирощуванні прісноводних риб. Їхнє виробництво динамічно розвивається завдяки впровадженню новітніх рибогосподарських технологій, а також використанню систем із замкнутим водопостачанням. Але якщо найбільш поширеним об'єктом рибництва є короп (близько 44%) та рослиноїдні риби (близько 45%), то частка родини лососевих (*Salmonidae*) становить лише близько 7%. Таке співвідношення об'єктів аквакультури не сприяє тому, щоб вітчизняна комбікормова промисловість могла забезпечити зростаючі потреби рибного господарства в повноцінних стартових та

© Л. Л. Галоян, І. І. Грициняк, Л. П. Драган, 2017

продуктивних кормах для лососевих риб. Тому основними постачальниками на ринку лососевих комбікормів залишаються провідні європейські виробники.

Якість комбікормів, їх білкова компонента та амінокислотний склад суттєво впливають на рибницько-біологічні показники риби: виживання, швидкість росту, фізіологічний стан, засвоюваність білків тощо.

Білки є найбільш розповсюдженими з усіх класів біомолекул, вони входять до складу всіх клітинних компонентів рослин, тварин, мікроорганізмів та міжклітинних структур. Всередині клітин та за їх межами білки беруть участь в транспортних і каталітичних процесах, забезпечують захисну функцію, є основою антитіл, беруть участь в процесах регуляції обміну речовин у складі гормонів.

В процесі росту організму білки є головною складовою частиною синтезуючої органічної речовини. І тому при організації годівлі риб питання визначення оптимальної кількості та якості білка в кормі як основного чинника, що забезпечує їх ріст, є найбільш актуальним на сучасному етапі.

Для побудови переважної більшості білків організму потрібні всі 20 протейногенних амінокислот. Більш того, важливою є не лише достатня кількість кожної із незамінних (есенціальних) амінокислот, що надходять з їжею, а й їх співвідношення.

Порушення збалансованості амінокислотного складу харчового білка корму призводить до розпаду синтезу власних білків, дезорганізації динамічної рівноваги білкового анаболізму і катаболізму в бік перевищення розпаду власних білків організму. Нестача тієї чи іншої незамінної амінокислоти лімітує використання інших амінокислот в процесі біосинтезу білка.

Зниження рівня перетравлення та засвоєння амінокислот білка корму призводить до зменшення кількості вільних амінокислот тканин риб, і як наслідок, його неповноцінності. Особливо це стосується незамінних амінокислот у складі корму, нестача яких спричиняє різноманітні порушення в обміні речовин у організмі. Так, за дефіциту незамінних амінокислот можуть виявлятися порушення в рості (аргінін, лізин), анемія (гістидин), коливання в синтезі білків (ізолейцин, лейцин, треонін), в печінці, м'язах, крові (метіонін), гормонах (фенілаланін), розмноженні (триптофан), нервовій системі (валін) [1].

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Об'єктом для досліджень були дворічки струмкової та радужної форелей, які вирощувались у 2012–2014 рр. Розведення риб проводили за технологією, розробленою для радужної форелі [2], на базі фермерського господарства «Ішхан», що розташоване в с. Банилів Вишницького району Чернівецької області. Загальний дебіт води, що надходив до господарства, становив 50 л/с. Джерелом водопостачання були поверхневі джерельні води, спроможні забезпечувати відносно постійний температурний режим води: взимку температура води була не нижче 5°C, а в літку — не вище 17°C. За класифікацією О. О. Альокіна, вода, що постачається на господарство, належить до гідрокарбонатного класу групи кальцію [3].

Концентрація розчиненого у воді кисню на вході до басейнів становила 85%, на виході — не нижче 55% насичення [4]. За основними гідрохімічними

показниками якості вода у господарстві відповідала нормативам [5]. Годівлю риб здійснювали штучним кормом фірми «Aller Aqua». До складу гранульованих кормів входило: рибне, соєве, кров'яне борошно, риб'ячий жир, гідролізований протеїн, ріпак, пшениця, вітаміни та мінерали. Розрахунки щодо необхідної кількості корму проводили відповідно до вимог щодо раціонів, з врахованими показниками індивідуальної маси риб та температури середовища на момент годівлі. Загальний амінокислотний склад тканин м'язів та печінки визначали методом іонообмінної рідинно-колонкової хроматографії [6]. Вміст окремих амінокислот виражали у відсотках від їх сумарної маси. Вміст аспарагіну та глутаміну визначали сукупно з аспарагіною кислотою та глутаміною кислотами відповідно.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

У ході експериментальної годівлі встановлено, що витрати корму за застосування «Aller Aqua» на другому році життя риб становили 1,6 кг/кг, що вказує на певну ефективність використання цього корму для струмкової форелі, однак за цих умов темпи росту її значно повільніші, ніж райдужної форелі, у якій витрати цього корму складають 1,1 кг/кг.

Дослідження показали, що годівля райдужної та струмкової форелей кормом «Aller Aqua» є ефективною, повноцінною і сприятливою для життєдіяльності риб, оскільки в ньому міститься не менше 45% сирого протеїну, оптимальна кількість жирів (20%), вуглеводів (18%), клітковини (2%) та фосфору (1,1%). При цьому корм має достатню загальну енергію (21,9 мДж/кг) та перетравлювану здатність в 17,6 мДж/кг.

При дослідженні амінокислотного складу печінки і м'язів струмкової та радужної форелей виявилось, що максимальне значення незамінних амінокислот (НЗАК) припадає на частку лейцину, лізину, триптофану та фенілаланіну (рис. 1 А, Б).

Усі відзначені НЗАК мають метаболічне значення в організмі. Зокрема, лізин необхідний для регуляції азотного, кальцієвого та вуглеводного обмінів, синтезу нуклеопроїнів, хромопроїнів, впливає на гемопоез, сприяє всмоктуванню Ca^{2+} , прискорює ріст та розвиток молодого організму. Вільний лейцин впливає на імунну систему, є специфічним джерелом енергії на клітинному рівні, забезпечує азотний баланс, який необхідний для процесів обміну білків та вуглеводів, є важливим для побудови та нормального розвитку м'язової тканини.

Відносно тирозину та фенілаланіну необхідно зазначити, що в організмі фенілаланін використовується виключно для синтезу білків, а невикористаний запас цієї амінокислоти перетворюється в тирозин. Тирозин, в свою чергу, окрім участі в синтезі білків, є попередником гормону наднирників адреналіну, медіаторів норадреналіну і дофаліну, гормонів щитовидної залози тироксину і трийодтироніну та пігменту меланіну.

Тирозин відносять до умовно незамінних амінокислот. Це пов'язано з тим, що за нестачі тирозину використовуються незамінні метіонін або фенілаланін і при цьому їх синтез стає більш інтенсивним [7].

Рис. 1. Вміст незамінних амінокислот в м'язах (А) і печінці (Б) форелей та в кормі «Aller Aqua»

Лімітуючою НЗАК в печінці та м'язах риб є ізолейцин. Він є субстратом для синтезу глутаміну та аланіну; одним з головних компонентів росту та синтезу тканин тіла, джерелом енергії в м'язових волокнах [8]. Одна із головних функцій ізолейцину — виробництво протеїнів. Це значить, що амінокислота є матеріалом — основою для білків. Крім того, ізолейцин є незамінним учасником процесу енергообміну, разом з лейцином та валіном складає близько 35% всієї м'язової маси в організмі.

Важливо, що нестача лише однієї із незамінних амінокислот обмежує не тільки ефективність використання інших амінокислот, але і всього білка раціону в цілому. При цьому гальмується утворення м'язової тканини, надлишкові амінокислоти використовуються на енергетичні потреби або після дезамінування перетворюються в ліпіди, або ж виділяються із організму з кінцевими продуктами азотистого обміну у вигляді аміачних солей.

Звичайно, при застосуванні тих чи інших штучних кормів для риб, слід звертати увагу і на кількість та співвідношення замінних амінокислот (ЗАК) в

них. В цілому ЗАК мають велике значення в обміні речовин, оскільки є постачальниками основної кількості обмінного азоту. За нестачі ЗАК відбувається надмірний розпад НЗАК і, як наслідок, знижується продуктивна дія кормів в цілому. Треба враховувати той факт, що в процесі обміну амінокислот в організмі, під час специфічних реакцій ЗАК здатні до взаємоперетворення, наприклад, шляхом зворотного переносу аміногрупи (трансамінування) без проміжного утворення аміаку. Інша частина ЗАК може втрачати аміногрупу (дезамінування), внаслідок чого утворюються відповідні кето- та оксикислоти. Частина ЗАК, що дезамінується, бере участь в анаплеротичних реакціях циклу трикарбонових кислот (глутамін, глутамінова кислота). Оксикислоти здатні надалі перетворюватися на вуглеводи або ліпіди, або частково використовуватися для синтезу інших амінокислот шляхом приєднання до них вільної аміногрупи. З інших реакцій розпаду білка є, наприклад, декарбоксилування амінокислот, продукти яких також можуть бути використані для синтезу вуглеводів та ліпідів.

Годівля струмкової та райдужної форелей кормом, в якому міститься 16% глутаміну та глутамінової кислоти приводить до вмісту такого ж порядку вказаних амінокислот в тканинах риб. До того ж, вміст зазначених амінокислот в тканинах форелі в умовах нашого дослідження істотно перевищує кількість інших ЗАК (рис. 2 А, Б).

Переважаюча кількість глутаміну в тканинах зумовлена його важливістю як переносника енергії, стимулятора синтезу м'язових білків [9], його участі в синтезі глікогену, а також — у регулюванні кислотно-лужного балансу в організмі. Важливо, що при катаболізмі глутамін стає незамінною кислотою, оскільки підтримує синтез білка та стабілізує рівень рідини всередині клітин. За умов використання цієї амінокислоти під час фізичного навантаження, споживання глутаміну сприяє швидкому відновленню та покращенню анаболічних процесів.

Глутамінова кислота є важливим джерелом аміногрупи в метаболічних реакціях і є проміжною ланкою при розщепленні таких амінокислот, як пролін, гістидин, аргінін та орнітин [10]. Глутамінова кислота бере участь у життєвоважливих процесах та у багатьох функціях: біосинтезі вуглеводів, нуклеїнових кислот, ферментів (НАД), серотоніну, знешкодженні та виведенні аміаку, підвищує проникність м'язових тканин для K^+ тощо.

Серед ЗАК лімітуючою амінокислотою в проведених дослідженнях було виявлено гістидин. Ця амінокислота є важливою для метаболічних процесів в організмі, оскільки гістидин здатний за потреби трансформуватися в інші важливі сполуки, в тому числі гістамін та гемоглобін. Гістидин також бере участь у виведенні із організму важких металів, сприяє відновленню тканин та здатний посилювати імунітет і захищати організм від шкідливої дії радіаційних випромінювань.

Досить несподіваним є факт, що серед ЗАК в кормі вміст проліну складає 6,20%, в той же час, в тканинах струмкової та райдужної форелей ці показники є майже в 2 рази меншими — 3,08% в м'язах струмкової форелі та 3,40% — в печінці райдужної форелі. Це пояснюється перше за все, тим, що структурою проліну — є гетероциклічна протейногенна амінокислота, в якій атом азоту входить до складу вторинного, а не первинного аміну.

Рис. 2. Вміст замінних амінокислот в м'язах (А) і печінці (Б) форелі та в кормі «Aller Aqua»

Тому пролін у складі білків здатний сильно вигинати пептидний ланцюг і таким чином створювати умови для незвичної вторинної структури пептиду, до складу якого він власне входить. Не дивно, що особливість будови цієї амінокислоти надає певної структурованості колагену. Чергування проліну та гідроксипроліну в молекулі сприяє створенню стабільної 3–спіральної структури колагену, яка надає молекулі міцності. Колаген виконує важливу пластичну (структурну) функцію, входить до складу сполучної тканини, забезпечуючи її міцність та еластичність. Такі функції виконує колаген кісток, луски риб, хрящів, стінок судин та сполучних тканин.

Вказані особливості будови проліну, його роль та вміст у тканинах форелі надають значимості виявленим фактам в умовах вирощування молоді риб в установках замкнутого водопостачання. Проведені дослідження вказують на те,

що якщо в більшості сучасних кормів, які використовуються для годівлі при вирощуванні риби, за якісним складом НЗАК в основному однакові, то за кількісним співвідношенням різко різняться [11]. Специфічні прояви нестачі окремих НЗАК або ЗАК не мають у більшості випадків яскравого клінічного вираження і, як правило, об'єктивно виявляються як неповноцінна годівля взагалі [12].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Існує пряма залежність між НЗАК та ЗАК в печінці та м'язах струмкової і райдужної форелей та амінокислотним складом гранульованого корму «Aller Aqua». Їхня кореляція зумовлена оптимальним для даного виду риби амінокислотним складом корму, вмістом основних компонентів, енергетичними показниками.

Використання для годівлі лососевих риби спеціалізованого корму «Aller Aqua» є доцільним і ефективним.

Виявлені закономірності є перспективними і можуть бути рекомендовані в наукових розробках та практичному застосуванні кормових рецептур, а також для удосконалення та довершеності їх як в якісному, так і в кількісному відношенні для забезпечення високого ефекту у вирощуванні цінних видів прісноводних риби.

ЛІТЕРАТУРА

1. Канидьев А. Н. Биологические основы искусственного разведения лососевых рыб. Москва : Легкая промышленность, 1984. 215 с.
2. Галасун П. Т., Булатович М. А., Борбат М. О. Технологическая инструкция по производству радужной форели в различных типах хозяйств Украины. Львов, 1987. 17 с.
3. Алекин О. А. Основы гидрохимии : учебное пособие. Ленинград : Гидрометеиздат, 1970. 442 с.
4. Тертерян Л. А., Тертерян Л. Л., Колос О. М. Господарство «Ішхан» — репродуктор з відтворення рідкісних та зникаючих видів лососевих риби // Збереження генофонду та відновлення популяції цінних видів риби. Київ : ДІА, 2011. С. 85—87.
5. Goryczko K. Pstrągi. Chów i hodowla. Olsztyn : IRS, 2005. 162 s.
6. Козаренко Т. Д. Ионообменная хроматография аминокислот. Новосибирск : Наука, 1975. 134 с.
7. Cowey C. B., Walton M. J. Intermediary metabolism // Fish Nutrition. 2nd edn. / ed. Halver J. E. New York : Academic Press. 1989. P. 259—329.
8. Похольченко Л. А. Тканевые белки и липиды у дикой и заводской молодежи атлантического лосося *Salmo salar* Кольского полуострова : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.01.04 «Биохимия». Петрозаводск, 2011. 22 с.
9. New developments in fish amino acid nutrition: towards functional and environmentally oriented aquafeeds / Li P. et al. // Amino Acids. 2009. Vol. 37(1). P. 43—53.
10. Quantitative description of body composition and rates of nutrient deposition in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) / Dumas A. et al. // Aquaculture. 2007. Vol. 263. P. 165—181.

11. Щербина М. А., Гамыгин Е. А. Кормление рыб в пресноводной аквакультуре. Москва : ВНИРО, 2006. 364 с.
12. Luquet P. Tilapia, *Oreochromis* spp. // Handbook of Nutrient Requirements of Finfish. ed. Wilson R. P. Boca Raton, FL : CRC Press, 1991. P. 169—179.

REFERENCES

1. Kanid'ev, A. N. (1984). *Biologicheskie osnovy iskusstvennogo razvedeniya lososevykh ryb*. Moskva: Lehkaya promyshlennost'.
2. Halasun, P. T., Bulatovych, M. A., & Borbat, M. O. (1987). *Tekhnolohichna instruktziya z vyrobnytstva rayduzhnoyi foreli v riznykh typakh hospodarstv Ukrayiny*. L'viv.
3. Alekin, O. A. (1970). *Osnovy gidrokhimii: uchebnoe posobie*. Leningrad: Gidrometeoizdat.
4. Terteryan, L. A., Terteryan, L. L., & Kolos, O. M. (2011). Hospodarstvo «Ishkhan» — reproduktor z vidtvorenniya ridkisnikh ta znikayuchikh vidiv lososevykh ryb. *Zberezhennya henofondu ta vidnovlennya populyatsiyi tsinnykh vidiv ryb*. Kyiv: DIA, 85-87.
5. Goryczko, K. (2005). *Pstrzgi. Chów i hodowla*. Olsztyn: Wydawnictwo IRS, 2005.
6. Kozarenko, T. D. (1975). *Ionoobmennaya khromatografiya aminokislot*. Novosibirsk: Nauka.
7. Cowey, C. B., & Walton, M. J. (1989). Intermediary metabolism. *Fish Nutrition* (2nd edn.). New York: Academic Press, 259-329.
8. Pokhol'chenko, L. A. (2011). Tkanynni bilky i lipidy u dykiy i zavods'koyi molodi atlantychnoho lososya *Salmo salar* Kol's'koho pivostrova. *Extended abstract of candidate's thesis*. Petrozavods'k.
9. Li, P., Mai, K., Trushenski, J., & Wu, G. (2009). New developments in fish amino acid nutrition: towards functional and environmentally oriented aquafeeds. *Amino Acids*, 37 (1), 43-53.
10. Dumas, A., de Lange, C. F. M., France, J., & Bureau, D. P. (2007). Quantitative description of body composition and rates of nutrient deposition in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Aquaculture*, 263, 165-181.
11. Shcherbina, M. A., & Gamygin, E. A. (2006). *Kormlenie ryb v presnovodnoy akvakul'ture*. Moskva: VNIRO.
12. Luquet, P. (1991). Tilapia, *Oreochromis* spp. *Handbook of Nutrient Requirements of Finfish*. Wilson, R. P. (Ed.). Boca Raton, FL: CRC Press, 169-179.

ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ КОМБИКОРМА «ALLER AQUA» НА СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В МЫШЦАХ И ПЕЧЕНИ РУЧЬЕВОЙ (*SALMO TRUTTA LINNAEUS*, 1758) И РАДУЖНОЙ (*ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM*, 1792) ФОРЕЛЕЙ

Л. Л. Галоян, ecofishua2017@gmail.ru, Институт рыбного хозяйства НААН., г. Киев
И. И. Грициняк, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН., г. Киев
Л. П. Драган, dragan_l@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН., г. Киев

Цель. Исследовать уровень усвоения аминокислот белка корма, а также установить аминокислотный состав белков в мышцах и печени ручьевой и радужной форелей в условиях кормления специализированным продукционным комбикормом фирмы «Aller Aqua».

Методика. Общий аминокислотный состав тканей мышц и печени определяли по

методу ионообменной жидкостно-колоночной хроматографии.

Результаты. Аминокислотный состав исследованного корма в целом соответствует спектру аминокислот в тканях мышц и печени ручьевой и радужной форелей. Как в печени, так и в мышцах рыб выявлено существенное преобладание глутамина и глутаминовой кислоты. Среди незаменимых аминокислот в мышцах и печени исследованных рыб наибольшая доля приходится на лейцин, аргинин и лизин.

Научная новизна. Впервые исследовано влияние искусственного кормления специализированным продукционным кормом «Aller Aqua» на аминокислотный состав тканей ручьевой и радужной форелей, выращенных в условиях индустриальной аквакультуры.

Практическое значение. В наше время особую актуальность приобретают исследования, посвященные всесторонней оценке воздействия комбикормов на рост и развитие пресноводных рыб, в частности — на аминокислотный состав тканей лососевых рыб.

Данная работа дает возможность определить соотношение усвоения белковых компонентов корма и пищевых потребностей ручьевой и радужной форелей с целью корректировки дисбаланса и дефицита аминокислотного состава кормовой рецептуры.

Ключевые слова: ручьевая форель, радужная форель, индустриальная аквакультура, искусственные корма, аминокислотный состав.

THE EFFECT OF THE COMBINED FEED "ALLER AQUA" ON THE CONTENT OF FREE AMINO ACIDS IN THE MUSCLES AND LIVER OF BROWN (*SALMO TRUTTA LINNAEUS*, 1758) AND RAINBOW (*ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM*, 1792) TROUT

L. Galoyan, ecofishua2017@gmail.ru, Institute of Fisheries of NAAS, Kyiv

I. Hrytsyniak, info@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

L. Dragan, dragan_l@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To study the level of amino acid assimilation from the protein of the combined feed and also to characterize the amino acid composition of proteins in muscles and liver of the brown and rainbow trout in conditions of feeding them with the specialized production combined feed manufactured by Aller Aqua.

Methodology. The total amino acid composition of muscle and liver tissues was determined by ion-exchange liquid column chromatography.

Findings. The amino acid composition of the investigated feed as a whole corresponds to the spectrum of amino acids in the tissues of muscles and liver of the brown and rainbow trout. Both a significant predominance of glutamine and glutamic acid was detected in the liver and in the muscles of fish. Among the essential amino acids in the muscles and liver of the fish studied, the largest share belongs to leucine, arginine and lysine.

Originality. First investigated the effect of artificial feeding with specialized productional fodder «Aller Aqua» on the amino acid composition of tissues of brown and rainbow trout reared in conditions of industrial aquaculture.

Practical value. Currently, studies devoted to a comprehensive assessment of the effect of mixed feeds on growth and development, and in particular on the amino acid composition of salmon fish tissues, acquire particular attention.

This work makes it possible to investigate the degree of assimilation of protein components of the artificial feed for rainbow trout and discuss the perspectives of the adjustment of the imbalance and deficiency of amino acid composition in the feed.

Keywords: brown trout, rainbow trout, industrial aquaculture, artificial feed, amino acid composition.

СТАН СИСТЕМИ ІМУННОГО ЗАХИСТУ ПЛІДНИКІВ КОРОПА (*CYPRINUS CARPIO LINNAEUS*, 1758) ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ВІТАМІНУ Е ТА СЕЛЕНУ В ЇХ РАЦІОНІ

С. В. Юрчак, Suzanna.8n@gmail.com, Львівська дослідна станція ІРГ НААН, смт Великий Любін

Мета. Оцінка стану імунної системи організму плідників коропа, яким впродовж переднерестового періоду в складі комбікорму згодовували ліпосомальний препарат з вітаміном Е та органічною сполукою мікроелементу Селену.

Методика. Дослід проведено у шести експериментальних садках, в які після зимівлі риб було поміщено самиць та самців коропа. Першій дослідній групі риб до основного раціону додатково вводили ліпосомальну добавку вітаміну Е (фармацевтичний препарат «Альфа-токоферол ацетат») за концентрації 50 мг/кг корму та Селену (препарат «Sel-Plex») — 0,3 мг/кг. Друга дослідна група отримувала добавку вітаміну Е у кількості 100 мг/кг та Селену 0,3 мг/кг. Контрольна група риб отримувала кормосуміш без вітамінно-мінеральної добавки. Ліпосомальну емульсію готували на ультразвуковому диспергаторі за частоти 35 Гц.

Після завершення 30-денної переднерестової годівлі збагаченими комбікормами у риб контрольної та двох дослідних груп було відібрано зразки крові для проведення біохімічних досліджень. Визначення відносної кількості Т-лімфоцитів проводили за допомогою методу спонтанного та індукованого розеткоутворення. При підрахунку кількості Т- і В-лімфоцитів та їх регуляторних субпопуляцій на фіксованих і фарбованих мазках крові визначали лімфоцити з низькою (3–5), середньою (6–10) і високою (М) щільністю рецепторів і функціонально недиференційовані лімфоцити (0).

Результати. З'ясовано, що переднерестова годівля самиць та самців коропа комбікормами у поєднанні із досліджуваною вітамінно-мінеральною добавкою позитивно впливає на вміст Т-, В-лімфоцитів та їх субпопуляцій у крові риб. А саме, встановлено збільшення кількості Т-лімфоцитів та підвищення їх функціональної активності. Також зростає кількість Т- і В-лімфоцитів із середньою і високою щільністю рецепторів та зменшується кількість «нульових» клітин.

Наукова новизна. Вперше досліджено дію ліпосомального препарату з вітаміном Е та мікроелементом Se, який згодовували плідникам коропа в переднерестовий період, на вміст Т-, В-лімфоцитів та їх субпопуляцій у периферичній крові риб.

Практична значимість. Результати роботи можуть використовуватися у племінних рибницьких центрах та повносистемних фермерських господарствах для збалансування переднерестової годівлі плідників коропа.

Ключові слова: плідники коропа, переднерестовий період, ліпосомальний препарат, вітамін Е, мікроелемент Se, Т-, В-лімфоцити.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Період переднерестового дозрівання коропів настає після довгого зимового анабіозу, який в цілому є стресовим чинником, що випробовує функціональний стан імунної системи [1]. Остання зумовлює резистентність організму, впливає на якість дозрівання статевих продуктів та визначає майбутню ефективність нерестових процесів [2, 3]. Встановлено залежність реакції антигенного подразнення у риб від повноцінності годівлі [4]. Отже, особливе значення в переднерестовий період надається збалансованій годівлі статевозрілих особин, яка не лише поповнює пластично-енергетичні ресурси організму для нерестових процесів, але й стимулює захисні процеси, передаючи цей потенціал потомству [5–7].

Для досягнення позитивних результатів у рибництві з якісно збалансованими комбікормами часто використовують комплекси різних біологічно активних речовин, зокрема антиоксидантів. Вагому роль серед них відіграють токоферолі (які входять до складу вітаміну Е) та селен, які проявляють синергічну дію [8-10].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

В науковій літературі недостатньо інформації щодо впливу вітаміну Е та селену на резистентність плідників коропа в переднерестовий період. Виходячи з цього, метою роботи є дослідження окремих аспектів функціонування імунітету коропа за дії вищезгаданих елементів.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проводились на базі Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН в умовах замкнутого водопостачання у шести експериментальних басейнах. У них, після зимівлі риб, було поміщено чотирирічних статевозрілих самиць та самців українського лускатого коропа любінського внутрішньопорідного типу, по шість особин у кожній групі. Риб протягом місяця двічі на день годували збалансованою кормосумішшю, до складу якої входили: рибне борошно, пшениця, житнє борошно, олія. Самицям і самцям коропа першої дослідної групи до основного раціону додатково вводили добавки вітаміну Е з розрахунку 50 мг/кг і препарат «Sel-Plex» з розрахунку на вміст селену — 0,3 мг/кг корму. Друга дослідна група отримувала добавки вітаміну Е у кількості 100 мг/кг та селену — 0,3 мг/кг. Контрольна група риб отримувала вказану кормосуміш без додавання вітамінно-мінеральних добавок.

Нормування годівлі здійснювали за загальноприйнятими у рибництві нормативами, з урахуванням потреб плідників, в залежності від температури та вмісту розчиненого у воді кисню.

Після завершення 30-денної переднерестової годівлі збагаченими комбікормами у риб контрольної та дослідних груп було відібрано зразки крові.

Визначення відносної кількості Т-лімфоцитів проводили за допомогою методу спонтанного та індукованого розеткоутворення з еритроцитами барана як маркерами. Принцип методу полягає в здатності лімфоцитів, за відповідних умов, утворювати так звані «розетки» з гетерогенними еритроцитами, в центрі яких

знаходиться лімфоцит, а по периферії — еритроцити, завдяки наявності на мембранах лімфоцитів специфічних рецепторів. За кількістю еритроцитів, адсорбованих одним лімфоцитом, визначають ступінь активності Т-клітин, оскільки цей феномен зумовлений щільністю рецепторів на поверхні лімфоцитів і характеризує функціональні властивості останніх. Метод ідентифікації В-лімфоцитів ґрунтується на наявності в них мембранних імуноглобулінових рецепторів, що забезпечує приєднання до В-лімфоцитів індикаторних клітин, які на своїй поверхні містять комплемент-антиген-комплекс (ЕАС-РУЛ). Як індикаторні клітини використовували еритроцити барана, сенсibilізовані антитілами і комплементом.

При підрахунку кількості Т- і В-лімфоцитів та їх регуляторних субпопуляцій на фіксованих і фарбованих мазках крові визначали лімфоцити з низькою (3–5), середньою (6–10) і високою (М) щільністю рецепторів і функціонально недиференційовані лімфоцити (0).

Результати досліджень опрацьовані статистично за допомогою програми «Microsoft Excel».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

На підставі одержаних даних встановлено, що згодовування коропам першої і другої дослідних груп додатково до базового корму добавок вітаміну Е та селену впливає на кількість Т- і В-лімфоцитів та їх окремих клітинних популяцій у крові. Зокрема, у коропів першої дослідної групи, яким додатково до основного корму згодовували добавки вітаміну Е з розрахунку 50 мг/кг та селен, кількість загальних Т-лімфоцитів (Е-РУЛ) і теофілін-резистентних (Th) була більшою відповідно на 12,0 і 10,2% ($p < 0,05$), ніж у особин контрольної групи (табл. 1).

Таблиця 1. Вплив вітаміну Е та селену на вміст різного типу лімфоцитів у крові плідників коропа

Показники	Групи риб		
	контроль	дослід 1	дослід 2
Загальні (Е-РУЛ), 0	66,33±0,67	63,50±1,50	65,33±0,88
3–5	18,33±0,67	16,00±0,00	20,33±0,67
6–10	15,33±0,88	19,00±0,67	13,67±0,88
М	1,33±0,33	1,50±0,50	0,67±0,67
%	37,70±0,88	34,67±0,88	33,67±0,67
Активні (А-РУЛ), 0	59,33±0,88	55,00±1,20	58,33±1,20
3–5	24,67±0,88	24,50±1,50	23,33±0,33
6–10	15,00±0,58	18,50±0,50	17,00±1,00
%	40,67±0,88	44,50±0,67	41,67±1,20
Т – хелпери, 0	72,33±0,88	73,50±0,50	71,67±0,33
3–5	16,67±0,88	16,50±0,50	17,00±0,58
6–10	9,33±0,33	8,50±0,50	9,67±0,33
%	27,67±0,88	30,50±0,50	28,33±0,33
Т – супресори	6,00±0,58	7,20±1,0	6,33±0,88

При цьому зростання кількості Е-РУЛ у крові коропів цієї групи відбувалось за рахунок збільшення Т-лімфоцитів з середньою щільністю рецепторів на 23,9% ($p<0,05$) і зниження «нульових», недиференційованих у функціональному відношенні клітин на 4,3%.

Відомо, що популяція Т-лімфоцитів крові риб складається з декількох субпопуляцій, клітини яких відрізняються за функціональним станом. Тому використання у дослідженнях тесту «активного» розеткоутворення дозволяє визначити субпопуляцію Т-клітин, які мають високоафінні рецептори до індикаторних клітин (еритроцитів) і активно взаємодіють з ними без додаткової сенсibilізації.

Проведені дослідження показали, що згодовування коропам першої дослідної групи додатково до основного корму добавок вітаміну Е з розрахунку 50 мг/кг та селену, приводить до збільшення у крові кількості «активних» Т-лімфоцитів ($p<0,05$). При цьому, в особин цієї групи кількість А-РУЛ з середньою щільністю рецепторів була більшою на 23,3% ($p<0,05$), а «нульових» — меншою на 7,3% ($p<0,05$), ніж у контрольної. У коропів другої групи, яким додатково до основного корму згодовували добавки вітаміну Е з розрахунку 100 мг/кг та селену виявлено тенденцію до збільшення кількості Е-РУЛ з низькою щільністю рецепторів (див. табл. 1).

Наведені у табл. 2 дані свідчать про те, що кількість антигенів, які зв'язують В-лімфоцити (ЕАС-РУЛ) у крові коропів контрольної і дослідних груп за період досліджень істотно не відрізнялась ($p<0,05$).

Таблиця 2. Вплив вітаміну Е та селену на вміст В-лімфоцитів у крові плідників коропа

Показники	Групи риб		
	контроль	дослід 1	дослід 2
В-лімфоцити (ЕАС-РУЛ),0	75,00±1,16	71,00±0,50	73,0±1,0
3–5	12,33±0,58	12,50±1,50	15,30±0,88
6–10	11,00±0,58	14,50±1,00	11,00±0,58
М	1,70±0,30	2,0±0,0	0,7±0,3
%	25,0±1,2	26,5±1,5	25,0±1,0

Водночас, у крові коропів, яким додатково до основного раціону введено добавки вітаміну Е з розрахунку 50 мг/кг та селену, виявлено більшу кількість ЕАС-РУЛ з середньою і високою щільністю рецепторів, а саме: на 31,8 ($p<0,05$) та 17,6% ($p<0,05$) відповідно, і меншу на 5,3% «нульових», недиференційованих у функціональному відношенні клітин ($p<0,05$). При цьому у крові коропів другої групи, порівняно з контрольною, встановлено більшу кількість ЕАС-РУЛ з низькою щільністю рецепторів ($p<0,05$).

В останні роки особливе значення надається тесту «активного» Е-розеткоутворення, оскільки він дозволяє виявити порушення Т-системи імунітету і корелює з функціональним станом клітинних ланок імунітету. Проведені дослідження показали, що після згодовування коропам дослідної групи вітаміну Е із розрахунку 50 мг/кг і органічної форми селену у їх крові вірогідно збільшується

кількість Т-лімфоцитів (загальних, активних і теофілін-резистентних) і зростає їхня функціональна активність за рахунок перерозподілу рецепторного апарату імунокомпетентних клітин у бік зміцнення їхньої авідності. Зокрема, зростає кількість Т- і В-лімфоцитів з середньою і високою щільністю рецепторів і зменшується число «нульових», недиференційованих у функціональному відношенні клітин. Водночас, загальна кількість В-лімфоцитів при цьому не змінюється. З цих даних випливає, що вітамін Е і селен позитивно впливають на рецепторний апарат імунокомпетентних клітин. При цьому збільшується кількість Т-лімфоцитів і зростає функціональна активність Т- і В-лімфоцитів крові. Ці зміни були виражені більшою мірою у короїв, яким додатково до основного корму згодовували добавки вітаміну Е з розрахунку 50 мг/кг. Підвищення функціональної активності Т- і В-лімфоцитів у крові короїв, яким згодовували вітамін Е і селен, свідчить про позитивну комплексну дію вказаних чинників на функціонування імунокомпетентних клітин. Зростання функціональної активності Т- і В-лімфоцитів у крові короїв дослідних груп може бути спричинено позитивним впливом вітаміну Е і селену на активність антиоксидантної системи і процеси перекисного окиснення ліпідів, що сприяють нормалізації метаболічних умов імунокомпетентних клітин. Ці результати узгоджуються з наявними у літературі даними про стимулюючий вплив вітаміну Е і селену на синтез білків у різних органах і тканинах, на процеси клітинної проліферації і диференціації.

Отже, згодовування короїв додатково до основного раціону добавок вітаміну Е та селену (препарату «Sel-Plex») впливає на функціональні властивості В-лімфоцитів крові, зокрема, зміцнює рецепторний апарат клітин, активує Т-клітинну ланку імунітету в їхньому організмі, що призводить до збільшення кількості Т-активних лімфоцитів у крові.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Додаткове введення вітаміну Е за концентрації 50 мг/кг та Se до складу раціону самиць та самців коропа в переднерестовий період приводить до вірогідного збільшення кількості Т-лімфоцитів (загальних, активних і теофілін-резистентних) і до зростання їхньої функціональної активності.

Збільшується кількість Т- і В-лімфоцитів з середньою і високою щільністю рецепторів і зменшується число «нульових», недиференційованих у функціональному відношенні клітин, що свідчить про позитивний вплив на рецепторний апарат імунокомпетентних клітин.

ЛІТЕРАТУРА

1. Микряков В. Р. Закономерности формирования приобретенного иммунитета у рыб. Рыбинск, 1991. 154 с.
2. Лукьяненко В. И. Иммунобиология рыб: врожденный иммунитет. Москва : Агропромиздат, 1989. 271 с.
3. Van Muiswinkel W. B. A history of fish immunology and vaccination I. The early days // Fish Shellfish Immunol. 2008. Vol. 25, iss. 4. P. 397–408.
4. Лукьяненко В. И. Иммунобиология рыб. Москва. Агропромиздат, 1970. 369 с.
5. Грициняк І. І., Третяк О. М. Пріоритетні напрями наукового забезпечення рибного господарства України // Рибогосподарська наука України. 2007. №1/С. 5–20

6. Катасонов В. Я., Черфас Н. Б. Селекция рыб и племенное дело в рыбоводстве. Москва : Агропромиздат, 1986. 182 с.
7. Вихман А. А. Иммунофизиологический статус рыб-объектов аквакультуры : автореф. дис. На соискание ученой степени докт. биол. наук : 03.00.10. Москва, 1994. 48 с.
8. Годівля рыб. Шерман І. М. та ін. Київ : Вища освіта, 2001. 269 с.
9. Куртяк Б. М., Янович В. Г. Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині і тваринництві. Львів : Триада плюс, 2004. 226 с.
10. Мовчан В. Основы годівлі ставових рыб. Київ : Видавництво Наркомпостачання УССР, 1934. 88 с.

REFERENCES

1. Mikrjakov, V. R. (1991). *Zakonomernosti formirovanija priobretnogo immuniteta u ryb*. Rybinsk.
2. Luk'janenko, V. I. (1989). *Immunobiologija ryb: vrozhdennyj immunitet*. Moskva. Agropromizdat.
3. Van Muiswinkel, W. B. (2008). A history of fish immunology and vaccination I. The early days. *Fish Shellfish Immunol*, 4, 397–408.
4. Luk'janenko, V. I. (1970). *Immunobiologija ryb*. Moskva : Agropromizdat.
5. Hrytsyniak I. I., & Tretiak O.M. (2007). Priorityetni napriamy naukovoho zabezpechennia rybnogo hospodarstva Ukrainy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy* №1, 5–20.
6. Katasonov, V. Ja., & Cherfas, N.B. (1986). *Selekcija ryb i plemennoe delo v rybovodstve*. Moskva: Agropromizdat.
7. Vihman, A. A. (1994). Immunofiziologicheskij status ryb-obektov akvakul'tury. *Extchded abstraet of doctors Hesis*.
8. Sherman I. M., Hrynzhovskyi, M. V., Zheltov, Yu. O., Pylypenko, Yu. V., & Volichenko, M. I., & Hrytsyniak I. I. (2001). *Hodivlia ryb*. Kyiv : Vyshcha osvita.
9. Kurtiak, B. M., & Yanovych, V. H. (2004). *Zhyrorozchynni vitaminy u veterynarnii medytsyni i tvarynnystvi*. Lviv: Triada plus.
10. Movchan, V. (1934). *Osnovy hodivli stavovykh ryb*. Kyiv. Vydavnytstvo Narkompostachannia USRR.

СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАРПА (*CYPRINUS CARPIO LINNAEUS, 1758*) ПРИ РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ ВИТАМИНА Е И СЕЛЕНА В РАЦИОНЕ

С. В. Юрчак, Suzanna.8n@gmail.com, Львовская опытная станция ИРХ НААН,
пгт. Великий Любень

Цель. Оценка иммунной системы организма производителей карпа, которым в преднерестовый период скармливали с комбикормом липосомальный препарат с витамином Е и органическим соединением микроэлемента Селена.

Методика. Опыт проведен в трех экспериментальных садках, в которые после зимовки были помещены самки и самцы карпа. Первой опытной группе рыб в основной рацион дополнительно вводили добавки витамина Е в концентрации 50 мг/кг корма и Селена — 0,3 мг/кг. Вторая подопытная группа получала добавки витамина Е в количестве 100 мг/кг и селена — 0,3 мг/кг. Контрольная группа рыб получала указанную кормосмесь без добавления витаминно-минеральной добавки. Липосомальную эмульсию готовили на ультразвуковом диспергаторе при частоте 35 Гц.

После завершения 30-дневного преднерестового кормления обогащенными комбикормами у рыб контрольной и двух опытных групп были отобраны образцы крови для проведения биохимических исследований. При подсчете количества Т- и В-лимфоцитов и их регуляторных субпопуляций на фиксированных и окрашенных мазках крови определяли лимфоциты с низкой (3–5), средней (6–10) и высокой (М) плотностью рецепторов и функционально недифференцированные лимфоциты (0).

Результаты. Выяснено, что преднерестовое кормление самок и самцов карпа комбикормами в сочетании с вышеуказанной витаминно-минеральной добавкой положительно влияет на содержание Т-, В-лимфоцитов и их субпопуляций в крови рыб. А именно, наблюдается увеличение количества Т-лимфоцитов и повышение их функциональной активности. Возрастает также количество Т- и В-лимфоцитов со средней и высокой плотностью рецепторов и уменьшается количество «нулевых» клеток.

Научная новизна. Впервые исследовано действие липосомального препарата с витамином Е и микроэлементом Se, который скармливали производителям карпа в преднерестовый период, на содержание Т-, В-лимфоцитов и их субпопуляций в периферической крови рыб.

Практическая значимость. Результаты работы могут использоваться в племенных рыбоводных центрах и полносистемных фермерских хозяйствах для сбалансирования преднерестового кормления производителей.

Ключевые слова: производители карпа, преднерестовый период, липосомальный препарат, витамин Е, микроэлемент Se, Т-, В – лимфоциты.

STATE OF THE IMMUNE PROTECTION SYSTEM OF BROOD CARP (CYPRINUS CARPIO LINNAEUS, 1758) BASED ON VITAMIN E AND SELENIUM LEVELS IN THEIR DIET

S. Yurchak, Suzanna.8n@gmail.com, Lviv Experimental Station, Velykyi Lyubin

Purpose: To assess the state of the immune system of brood carp, which were fed with a combined feed containing a liposomal preparation with vitamin E and organic compound of selenium microelement during pre-spawning period.

Methodology: The study has been performed in three experimental ponds, in which carp females and males were placed after wintering. The first experimental group was fed with a diet supplemented with vitamin E at a concentration of 50 mg/kg of the feed and selenium – 0.3 mg/kg. The second experimental group received the supplement of vitamin E at a concentration of 100 mg/kg and selenium – 0.3 mg/kg. The control group received the mentioned combined feed without addition of the vitamin-mineral supplement. After termination of 30-day pre-spawning feeding with the combined feed supplemented with vitamin E and selenium, blood samples for biochemical tests were collected from fish of the control and both experimental groups.

Findings. It was found that pre-spawning feeding of carp females and males with combined feeds supplemented with the above mentioned vitamin-mineral additive had a positive effect on the contents of T-, B-lymphocytes and their subpopulations in fish blood.

Originality. The effect of the liposomal preparation with vitamin E and microelement Se fed to brood carp during the pre-spawning period on the contents of T-, B-lymphocytes and their subpopulations in fish peripheral blood was studied for the first time.

Practical value. The results of the study can be used in fish breeding centers and full-system fish farms for balanced feeding of brood fish.

Keywords: brood carp, pre-spawning period, liposomal preparation, vitamin E, microelement selenium, T-, B - lymphocytes.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 128-146

DOI: 10.15407/fsu2017.04.128

УДК: 016:[597.554.4:639.371.7]

АФРИКАНСЬКИЙ (КЛАРІЄВИЙ) СОМ (*CLARIAS GARIEPINUS* BURCHELL, 1822). ТЕМАТИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

І. Й. Грициняк, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Т. М. Швець, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Формування довідкового переліку публікацій з окремих питань біології та культивування африканського (кларієвого) сома *Clarias gariepinus* в Україні та за кордоном, а також стосовно впливу умов його утримання на низку фізіолого-біохімічних та рибницьких показників.

Методика. В ході системного пошуку у процесі підготовки тематичного переліку було застосовано як цілісний, так і вибіркового методи. Бібліографічне ядро складали україно-, російсько- та англомовні видання з фонду наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 112 джерел, що охоплюють часовий інтервал з 1978 по 2017 рр., а також включають статтю з журналу «Aquaculture», датовану 2018 роком, та присвячені рибництво-біологічним особливостям представника ряду сомоподібних риб родини кларієвих — африканського (кларієвого) сома. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Підготовлений список публікацій може бути корисним для науковців, практиків, студентів, сфера інтересів яких стосується питань культивування та дослідження біологічних особливостей кларієвого сома.

Ключові слова: африканський (кларієвий) сом, УЗВ, басейни, фізіолого-біохімічні показники, культивування, відтворення.

---

1. Артеменков Д. В. Анализ форменных элементов крови клариевого сома *Clarias gariepinus* при выращивании в УЗВ с использованием пробиотика Субтилис // Проблемы интенсификации животноводства с учетом пространственной инфраструктуры сельского хозяйства и окружающей среды. Falenty : Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą, 2012. С. 22—25.
2. Артеменков Д. В. Выращивание клариевого сома (*Clarias gariepinus*) в УЗВ на комбикормах с добавками пробиотика «Субтилис» : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук : 06.04.01 — рыбное хозяйство и аквакультура. Москва, 2013. 22 с.

© І. Й. Грициняк, Т. М. Швець, 2017

3. Артеменков Д. В., Макашова Т. А. Анализ биохимических показателей сыворотки крови клариевого сома при выращивании в УЗВ с использованием пробиотика Субтилис в сравнении с морфологической характеристикой // Аквакультура Центральной и Восточной Европы: настоящее и будущее : II съезд NACEE (Сети Центров по аквакультуре в Центральной и Восточной Европе) и семинар о роли аквакультуры в развитии села, Кишинёв, 17-19 окт. 2011 г. : матер. Кишинев, 2011. С. 22—25.
4. Артеменков Д. В., Микряков Д. В., Силкина Н. И. Иммунологический анализ сыворотки крови клариевого сома *Clarias gariepinus* в УЗВ при выращивании на комбикорме с добавками пробиотика Субтилис // Развитие аквакультуры в регионах: проблемы и возможности : Междунар. науч.-практ. конф., 10-11 нояб. 2011 г., Москва : докл. Москва : ГНУ ВНИИР, 2011. С. 67—71.
5. Африканский сом перспективный объект аквакультуры в средней полосе России / Мельченков Е. А. и др. // Рыбное хозяйство. 2008. № 6. С. 72—77.
6. Бардач Дж., Ритер Дж., Макларни У. Культивирование *Clarias* spp. в Таиланде // Аквакультура. Разведение и выращивание пресноводных и морских организмов / Бардач Дж., Ритер Дж., Макларни У. Москва : Пищевая промышленность, 1978. С. 49—51.
7. Бардач Дж., Ритер Дж., Макларни У. Разведение клариевых, угрехвостых и обыкновенных сомов в Австралии и Азии // Аквакультура. Разведение и выращивание пресноводных и морских организмов / Бардач Дж., Ритер Дж., Макларни У. Москва : Пищевая промышленность, 1978. С. 51—53.
8. Бондаренко А. Б. Африканский сом перспективный объект для тепловодных хозяйств и приусадебного рыбоводства // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : Междунар. науч.-практ. конф., посвят. 60-летию Московской рыбоводно-мелиоративной опытной станции и 25-летию ее реорганизации в ГНУ ВНИИР, Москва, 11-13 апр. 2005 г. : матер. Т. 1. Москва, 2005. С. 295—298.
9. Бондаренко А. Б., Сычев Г. А., Приз В. В. Клариевый сом // Рыбоводство. 2008. № 1. С. 30—31.
10. Бондаренко А. Б., Сычев Г. А., Приз В. В. Клариевый сом в России и за рубежом. Перспективы его внедрения для тепловодных хозяйств России // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2005. Вып. 80. С. 213—218.
11. Власов В. А. Воспроизводство и выращивание клариевого сома (*Clarias gariepinus*) в установках с замкнутым водообеспечением (УЗВ) // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2012. № 7. С. 26—35.
12. Власов В. А. Воспроизводство и выращивание клариевого сома *Clarias gariepinus* в установках с замкнутым водообеспечением // Развитие аквакультуры в регионах: проблемы и возможности : Междунар. науч.-практ. конф., 10-11 нояб. 2011 г., Москва : докл. Москва : ГНУ ВНИИР, 2011. С. 72—84.
13. Власов В. А. Выращивание клариевого сома (*Clarias gariepinus* Burchell) при различных условиях содержания и кормления // Состояние и перспективы развития пресноводной аквакультуры : Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 5-6 февр. 2013 г. : докл. Москва : РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, 2013. С. 141—150.

14. Власов В. А. Некоторые технологические приемы при выращивании африканского (клариевого) сома (*Clarias gariepinus* Burchell) в УЗВ // Рыбные ресурсы. 2009. № 3. С. 27—30.
15. Власов В. А. Рост и развитие африканского сома (*Clarias gariepinus* Burchell) в зависимости от условий кормления и содержания // Известия ТСХА. 2009. № 3. С. 148—156.
16. Власов В. А., Артеменков Д. В., Панасенко В. В. Использование пробиотика «Субтилис» в качестве добавки в комбикорм при выращивании клариевого сома (*Clarias gariepinus*) // Рыбное хозяйство. 2012. № 5. С. 89—93.
17. Власов В. А., Дернаков В. В. Влияние разноразмерных особей в популяции африканского сома на результаты их выращивания // Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Борок — Москва : РАН, 2007. С. 127—132.
18. Власов В. А., Завьялов А. П., Гордеев А. В. Новый объект аквакультуры России — африканский сом *Clarias gariepinus* // Холодноводная аквакультура: старт в XXI век : Междунар. симпозиум : матер. Москва : Росинформагротех, 2003. С. 176—177.
19. Власов В. А., Завьялов А. П., Есавин Ю. И. Выращивание африканского клариевого сома в бассейнах с различным кислородным режимом // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : Междунар. науч.-практ. конф., посвят. 60-летию Московской рыбоводно-мелиоративной опытной станции и 25-летию ее реорганизации в ГНУ ВНИИР, Москва, 11-13 апр. 2005 г. : матер. Т. 3. Москва, 2005. С. 130—139.
20. Власов В. А., Завьялов А. П., Есавкин Ю. И. Рекомендации по воспроизводству и выращиванию клариевого сома с использованием установок с замкнутым циклом водообеспечения : инструктивно-методическое издание. Москва : Росинформагротех, 2010. 48 с.
21. Гамачкова Н. Я., Коуржил Я. Опыт выращивания нового интродуцированного вида — африканского сома (*Clarias gariepinus*) в Чешской республике // Первый конгресс ихтиологов России : тезисы докл. Москва : ВНИРО, 1997. С. 270—271.
22. Дмитриевич Н. П. Применение суспензий хлореллы и сценедесмуса как добавки в комбикорма для ленского осетра (*Acipenser baeri* Brandt) и клариевого сома (*Clarias gariepinus* Burchell) // Вестник Полесского государственного университета. 2017. № 1. С. 37—48. (Серия природоведческих наук).
23. Долинський В. П. Перспективи рибогосподарського освоєння сомів родини кларієвих (*Clariidae*) в аквакультурі України // Рибне господарство. 2002. Вип. 61. С. 3—9.
24. Заки М., Абдула А. Размножение и развитие *Clarias gariepinus* (Pisces, Clariidae) из озера Манзала (Египет) // Вопросы ихтиологии. 1983. Т. 23, № 6. С. 941—950.
25. Ковалев К. В. Влияние астатичных температурных режимов на рост и развитие клариевого сома при выращивании его в УЗВ // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : Междунар. науч.-практ. конф., посвят. 60-летию Московской рыбоводно-мелиоративной опытной станции и 25-летию ее реорганизации в ГНУ ВНИИР, Москва, 11-13 апр. 2005 г. : матер. Т. 2. Москва, 2005. С. 47—53.

26. Ковалев К. В. Технологические аспекты выращивания клариевого сома (*Clarias gariepinus*) в рыболовной установке с замкнутым циклом водообеспечения (УЗВ) // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2006. № 11. С. 18—26.
27. Ковалёв К. В. Технологические аспекты выращивания клариевого сома (*Clarias gariepinus*) в рыболовной установке с замкнутым циклом водообеспечения (УЗВ) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук. Москва, 2006. 21 с.
28. Ковалев К. В., Наумова А. М., Власов В. А. Оценка состояния здоровья клариевого сома и качества воды при его выращивании в аквариальных условиях // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : Междунар. науч.-практ. конф., посвят. 60-летию Московской рыболовно-мелиоративной опытной станции и 25-летию ее реорганизации в ГНУ ВНИИР, Москва, 11-13 апр. 2005 г. : матер. Т. 3. Москва, 2005. С. 164—169.
29. Курбанов А. Р., Камилов Б. Г. Разведение африканского сома *Clarias gariepinus* в условиях Узбекистана : учебное пособие. Ташкент : Навруз, 2017. 52 с.
30. Лиментарь П. П. Антистрессовое действие препарата «Торфовит» (гумат калия) при выращивании личинки африканского сома // Біорізноманіття водних екосистем: проблеми і шляхи вирішення : Всеукр. науч.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Дніпропетровськ, 2-3 жовт. 2008 р. (до 90-річчя Дніпропетровського національного університету) : матер. Дніпропетровськ, 2008. С. 110—111.
31. Липидный профиль жира африканского сома *Clarias gariepinus* / Смирнова Е. А. и др. // Масложировая промышленность. 2012. № 4. С. 26—29.
32. Мельченков Е. А., Приз В. В., Тансыкбаев Н. Н. Комбинированная технология выращивания африканского сома в первой зоне рыбоводства // Сбалансированное природопользование: современный взгляд, тенденции и перспективы : Междунар. науч.-практ. конф., Херсон, 17-19 мая 2010 г. : матер. Херсон : Колос, 2010. С. 47—49.
33. Мельченков Е. А., Приз В. В., Тансыкбаев Н. Н. Особенности культивирования африканского сома *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) в первой зоне рыбоводства // Таврійський науковий вісник. 2011. № 76. С. 247—251.
34. Никифоров А. И. Особенности морфологического строения африканского сома // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : Междунар. науч.-практ. конф., посвят. 60-летию Московской рыболовно-мелиоративной опытной станции и 25-летию ее реорганизации в ГНУ ВНИИР, Москва, 11-13 апр. 2005 г. : матер. Т. 3. Москва, 2005. С. 215—219.
35. Никифоров А. И. Сом *Clarias gariepinus* — перспективный объект аквакультуры // Инновационные технологии аквакультуры : Междунар. науч. конф., 21-22 сент. 2009 г., Ростов-на-Дону : тезисы докл. Ростов-на-Дону : ЮНЦ РАН, 2009. С. 98—101.
36. Никифоров А. И., Маилкова А. В. Сом *Clarias gariepinus* — строение тела и морфологические особенности мускулатуры // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2008. Вып. 24. С. 170—173.

37. Никифоров А., Маилкова А. Морфологические особенности сома *Clarias gariepinus* // Пресноводная аквакультура: состояние, тенденции и перспективы развития : сборник науч. статей, посвящ. 60-летию Научно-исслед. рыбохозяйственной станции. Кишинев : Есо-TIRAS, 2005. С. 56—58.
38. Овчинникова Т. И. Выращивание африканского сома // Рыбное хозяйство : информ. пакет. 1992. Вып. 1 : Перспективные объекты тепловодного рыбоводства. С. 14—20. (Серия : Аквакультура).
39. Олышанский В. М., Подарин А. В., Касумян А. О. Электрическая активность клариевого сома при различных формах поведения // Поведение рыб : IV Всерос. конф. с междунар. участием, Борок, Россия, 19-21 окт. 2010 г. : матер. докл. Москва : АКВАРОС, 2010. С. 320—324.
40. Олышанский В. М., Солдатова О. А., Тхи Нга Нгуен. Ритуал спаривания клариевого сома *Clarias macrocephalus* // Поведение рыб : IV Всерос. конф. с междунар. участием, Борок, Россия, 19-21 окт. 2010 г. : матер. докл. Москва : АКВАРОС, 2010. С. 316—319.
41. Опыт использования комбикормов с различной нормой содержания протеина при выращивании молоди африканского клариевого сома (*Clarias gariepinus*) в условиях установки замкнутого водоснабжения / Левина О. А. и др. // Вестник АГТУ. 2015. № 3. С. 93—101.
42. Первые результаты применения стартового комбикорма для выращивания личинок африканского сома (*Clarias gariepinus*) / Приз В. В. и др. // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2008. Вып. 24. С. 183—187.
43. Первые результаты применения стартового комбикорма для выращивания личинок африканского сома / Приз В. В. и др. // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2009. № 1/2. С. 55—58.
44. Пирог А. В., Ложниченко О. В. Особенности развития некоторых органов клариевых сомов (*Clariidae*) в раннем онтогенезе // Юг России: экология, развитие. 2015. Т. 10, № 3. С. 92—98.
45. Пронина Г. И., Артеменков Д. В., Петрушин А. Б. Сравнительная характеристика сомов разных видов по гематологическим и биохимическим показателям крови // Труды ВНИРО. 2017. Т. 165. С. 111—117.
46. Рилов В. Г. Досвід вирощування африканського сома в умовах Криму // Таврійський науковий вісник. 2008. Вип. 57. С. 345—349.
47. Романова Е. М., Любомирова В. Н., Мухитова М. Э. Биологический контроль фертильности самок клариевого сома в бассейновой аквакультуре // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2016. № 3. С. 78—84.
48. Сборник методик по разведению и выращиванию обыкновенного (*Silurus glanis* L.) и клариевого (*Clarias gariepinus*) сомов : инструктивно-методическое издание / Петрушин А. Б. и др. Москва : РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 2012. 80 с.
49. Севрюков В. Н., Семьянихин В. В., Лабенец А. В. Первый опыт промышленного культивирования клариевого сома // Итоги тридцатилетнего развития рыбоводства на теплых водах и перспективы на XXI век : Междунар. симпозиум, Москва, 1998 г. : матер. Санкт-Петербург : Росрыбхоз, 1998. С. 200—202.
50. Севрюков В. Н., Семьянихин В. В., Лабенец А. В. Первый опыт промышленного культивирования клариевого сома // Ресурсосберегающие

- технологии в аквакультуре : II Междунар. симпозиум : матер. Адлер, 1999. С. 92.
51. Склярів В. Я., Іванова Е. Е., Басова Е. В. Шармут — новий об'єкт прудового рибоводства // Состояние и перспективы развития пресноводной аквакультуры : Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 5-6 февр. 2013 г. : докл. Москва : РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, 2013. С. 448—450.
  52. Сравнительная характеристика роста сомообразных рыб *Silurus glanis* и *Clarias gariepinus* / Артеменков Д. В. и др. // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2017. № 2. С. 14—19.
  53. Томеди Э. М. Определение качественной характеристики самцов некоторых видов клариевых, осетровых и лососевых рыб // Вестник АГТУ. 2004. № 2(21). С. 29—32. (Серия : Рыбное хозяйство).
  54. Томеди Э. М., Тихомиров А. М. Клариевый сом перспективный объект аквакультуры // Рыбоводство и рыболовство. 2000. № 4. С. 14.
  55. Фаттолахи Мехрдад. Весовой и линейный рост африканского сома (*Clarias gariepinus* Burchell) в зависимости от факторов среды и качества корма : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук. Москва, 2006. 23 с.
  56. Фаттолахи М. Весовой и линейный рост африканского сома в зависимости от факторов среды и качества корма // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2008. № 1. С. 42—53.
  57. Фаттолахи М., Касумян А. О. Роль зрения в пищевом поведении африканского сома *Clarias gariepinus* // Поведение рыб : Междунар. конф., Борок, Россия : матер. докл. Москва, 2005. С. 511—514.
  58. Хрусталева Е. И. Оценка ростовой потенции канального и клариевого сомов, обосновывающая полициклические технологии выращивания // Рыбное хозяйство. 2010. № 4. С. 65—68.
  59. Чебасов Л. В., Подушка С. Б. Африканский сом клариас на приусадебных участках // Рыбоводство и рыболовство. 2001. № 2. С. 40.
  60. Шевченко Д. Г., Приз В. В., Воробьева Г. И. Сравнительная эффективность кормовых белковых продуктов при использовании их в стартовых кормах для африканского сома (*Clarias gariepinus*) // Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов : II науч. школа-конф. с участием стран СНГ : матер. Петрозаводск, 2007. С. 173—174.
  61. Шумак В. В. Выращивание клариевого сома за счет использования потерь тепловой энергии сбросных вод ГРЭС // Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. 2015. № 2. С. 57—63. (Серия прыродазнаўчых навук).
  62. Юшкова Ю. А. Испытание препарата «Нерестин-5КС» при воспроизводстве клариевого сома в условиях УЗВ // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2009. № 4. С. 19—24.
  63. A comparative study on morphology, growth rate and reproduction of *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822), *Heterobranchius longifilis* Valenciennes, 1840 and their reciprocal hybrids (*Pisces*, *Clariidae*) / Legendre M. et al. // J. Fish Biol. 1992. Vol. 40. P. 59—79.
  64. Abu Sayem Md. Ahsan Habib, Dr. Prosannajid Sarkar. Extraction and identification of PUFA from African Catfish (*Clarias gariepinus*) skin // International Journal of Fisheries and Aquatic Studies. 2016. Vol. 4, iss. 4. P. 312—314.
  65. Adesina S. A., Falaye A. E., Ajani E. K. Evaluation of haematological and serum biochemical changes in *Clarias gariepinus* juveniles fed graded dietary levels of

- boiled sunflower (*Helianthus annuus*) seed meal replacing soybean meal // Ife Journal of Science. 2017. Vol. 19, iss. 1. P. 51—68.
66. African catfish (*Clarias gariepinus*, Burchell 1822) production with special reference to temperate zones : a manual / Peteri A. [et al.]. Budapest : FAO, 2015. 85 p.
67. Assessment of *Clarias gariepinus* as a biological control agent against mosquito larvae / Chala B. et al. // BMC Ecol. 2016. Vol. 16. P. 27.
68. Baßmann B., Brenner M., Palm H. W. Stress and welfare of African Catfish (*Clarias gariepinus* Burchell, 1822) in a coupled aquaponic system // Water. 2017. Vol. 9. P. 504.
69. Bozkurt Y., Yavaş İ. Effect of extender compositions, glycerol levels, and thawing rates on motility and fertility of cryopreserved wild African Catfish (*Clarias gariepinus*) sperm // The Israeli Journal of Aquaculture — Bamidgheh. 2017. Vol. 69. P. 1357—1364.
70. Changes in nutritional values induced by butachlor in juvenile diploid and triploid *Clarias gariepinus* / Karami A. et al. // Int. J. Environ. Sci. Technol. 2017. P. 1—12.
71. Chemical composition and antioxidant activities of catfish epidermal mucus / Nurul Mariam Hussin et al. // Journal of Advanced Agricultural Technologies. 2017. Vol. 4, iss. 1. P. 73—77.
72. Cloning, localization and differential expression of Neuropeptide-Y during early brain development and gonadal recrudescence in the catfish, *Clarias gariepinus* / Cheni-Chery Sudhakumari et al. // General and Comparative Endocrinology. 2017. Vol. 251. P. 54—65.
73. Comparative morphometry and histological studies of the cerebellum of catfish (*Clarias gariepinus*) and tilapia (*Oreochromis niloticus*) / Danmaigoro A. et al. // Journal of Applied Life Sciences International. 2016. Vol. 7, iss. 4. P. 1—6.
74. Comparative studies of nutrient composition of wild caught and pond reared african catfish, *Clarias gariepinus* / Ukagwu J. I. et al. // International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences. 2017. Vol. 5, iss. 7. P. 63—68.
75. Complete replacement of fish meal by other animal protein sources on growth performance of *Clarias gariepinus* fingerlings / Djissou A. S. M. et al. // Int. Aquat. Res. 2016. Vol. 8, iss. 4. P. 333—341.
76. Effect of different feeding frequency on the growth and survival of African Catfish (*Clarias gariepinus*) fingerlings / Marimuthu K. et al. // Advances in Environmental Biology. 2010. Vol. 4, iss. 2. P. 187—193.
77. Effect of different fertilization and egg de-adhesion methods on hatching and survival of *Clarias gariepinus* (Burchell 1822) fry / Kareem O. K. et al. // Journal of FisheriesSciences.com. 2017. Vol. 11, iss. 1. P. 21—27.
78. Effect of fish vitellogenin on the growth of juvenile catfish, *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) / Subir Kumar Juin et al. // Aquaculture Reports. 2017. Vol. 7. P. 16—26.
79. Effect of phytase supplementation on the growth, mineral composition and phosphorus digestibility of African Catfish (*Clarias gariepinus*) juveniles / Orisasona O. et al. // Animal Research International. 2017. Vol. 14, iss. 2. P. 2741—2750.
80. Effects of different additives on the survival and haematology of *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) fingerlings during transportation / Idowu T. A. et al. // Nigerian Journal of Tropical Agriculture. 2016. Vol. 16. P. 65—71.

81. Effects of storage conditions on quality characteristics of commercial aquafeeds and growth of African catfish *Clarias gariepinus* / Solomon S. G. et al. // Journal of Fisheries. 2016. Vol. 74. P. 30—37.
82. El-Hawarry W. N., Abd El-Rahman S. H., Shourbela R. M. Breeding response and larval quality of African catfish (*Clarias gariepinus*, Burchell 1822) using different hormones/hormonal analogues with dopamine antagonist // Egyptian Journal of Aquatic Research. 2016. Vol. 42, iss. 2. P. 231—239.
83. Enyidi U. D. *Chlorella vulgaris* as protein source in the diets of African Catfish *Clarias gariepinus* // Fishes. 2017. Vol. 2. P. 17—29.
84. Falaye A., Emikpe B., Ogundipe E. Influence of *Lactobacillus plantarum* supplemented diet on growth response, gut morphometry and microbial profile in gut of *Clarias gariepinus* fingerlings // Journal of Coastal Life Medicine. 2016. Vol. 4, iss. 8. P. 597—602.
85. Formulation of fish feed with optimum protein-bound lysine for african catfish (*Clarias gariepinus*) fingerlings / Siti Nurhafa Imra Naqtahnain Hamid et al. // Procedia Engineering. 2016. Vol. 148. P. 361—369.
86. Githukia C. M., Kembenya E. M., Opiyo M. A. Anaesthetic effects of sodium bicarbonate at different concentrations on African Catfish (*Clarias gariepinus*) juveniles // Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research. 2016. Vol. 2(3). P. 151—158.
87. Gonadosomatic index and some hematological parameters in African Catfish *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) as affected by feed type and temperature level / Al-Deghayem W. A. et al. // Brazilian Archives of Biology and Technology. 2017. Vol. 60. e17160157.
88. Growth performance and feed utilization of African catfish *Clarias gariepinus* fed a commercial diet and reared in the biofloc system enhanced with probiotic / Putra I. et al. // F1000Res. 2017. Vol. 6. P. 1545.
89. Hecht T., Oellermann L., Verheust L. Perspectives on clariid catfish culture in Africa // Aquatic Living Resources. 1996. Vol. 9, iss. 5. P. 197—206.
90. Influence of carbon/nitrogen ratios on biofloc production and biochemical composition and subsequent effects on the growth, physiological status and disease resistance of African catfish (*Clarias gariepinus*) cultured in glycerol-based biofloc systems / Akeem Babatunde Dauda et al. // Aquaculture. 2018. Vol. 483. P. 120—130.
91. It is all in the blood: erythrocyte characterization of triploid and diploid African Catfish, *Clarias gariepinus* / Normala Jalil et al. // J. Fish. Aquat. Sci. 2016. Vol. 11, iss. 6. P. 425—431.
92. Lawal B. M., Adewole H. A., Olaleye V. F. Digestibility study and nutrient re-evaluation in *Clarias gariepinus* fed blood meal-rumen digesta blend diet // Not. Sci. Biol. 2017. Vol. 9, iss. 3. P. 344—349.
93. Micro-morphological investigation of the skin of the larval and adult stages of the African Catfish (*Clarias gariepinus*) / Derbalah A. et al. // Alexandria Journal of Veterinary Sciences. 2017. Vol. 53. P. 1—10.
94. Morphological characterization of wild and cultured *Clarias gariepinus* (Burchell 1822) using principal component and cluster analyses / Ola-Oladimeji F. A. et al. // Not. Sci. Biol. 2016. Vol. 8, iss. 4. P. 428—436.
95. Nwachi Oster Francis, Dasuki Awawu. Culture of diploid and tetraploid (*Clarias gariepinus*) fed with 17 α -methyltestosterone // Fudma — Journal of Agric. and Agric. Tech. 2017. Vol. 3, iss. 1. P. 10—14.

96. Ojonugwa E. B., Solomon R. J. Effects of over stocking on the growth rate of *Clarias gariepinus* // Journal of Animal Science and Veterinary Medicine. 2017. Vol. 2. P. 84—95.
97. Okomoda V. T., Chong Chu Koh I., Shahreza S. Md. A simple technique for accurate estimation of fertilization rate with specific application to *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) // Aquaculture Research. 2017. P. 1—6.
98. Okomoda V. T., Tiamiyu L. O., Iortim M. The effect of water renewal on growth of *Clarias gariepinus* fingerlings // Journal of Fisheries. 2016. Vol. 74. P. 25—29.
99. Okomoda V. T., Tiamiyu L. O., Kwaghger D. Spawning performance of *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) induced with ethanol preserved and fresh catfish pituitary extract // Zygote. 2017. Vol. 25, iss. 3. P. 376—382.
100. Okomoda V. T., Wase G., Tiamiyu L. O. Effects of tank background colour on growth performance and feed utilization of African Catfish *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) fingerlings // Ribarstvo. Croatian Journal of Fisheries. 2017. Vol. 75, iss. 1. P. 5—11.
101. Omolade O., Solomon R. J. Effect of organic and inorganic diet in the growth of *Clarias gariepinus* // Direct Res. J. Vet. Med. Anim. Sci. 2017. Vol. 2, iss. 3. P. 66—81.
102. Optimum light wavelength and light intensity for rearing juvenile African Catfish (*Clarias gariepinus*) / Muhammad Firdaus Sallehudin et al. // International Journal of Aquatic Science. 2017. Vol. 8, iss. 2. P. 107—112.
103. Oyebola O. O., Adekunle O. M., Setufe S. B. Growth rate and disease resistance of inbreds and novel intra-specific crossbreds larva of *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) in response to *Pseudomonas aeruginosa* challenge // Journal of Experimental Agriculture International. 2017. Vol. 16, iss. 6. P. 1—11.
104. Reference intervals for the serum biochemistry and lipid profile of male broodstock African Catfish (*Clarias gariepinus*: Burchell, 1822) at varied ages / Okoye C. N. et al. // Not. Sci. Biol. 2016. Vol. 8, iss. 4. P. 437—443.
105. Rui Diogo. Morphological evolution, adaptations, homoplasies, constraints, and evolutionary trends: Catfishes as a case study on general phylogeny & macroevolution. Enfield : Science Publishers Inc., 2005. 491 p.
106. Shourbela R. M., El-Hawarry W. N., Abd El-Rahman S. H. Interactive effects of stocking density and feed type on growth, survival and cannibalism among African catfish (*C. gariepinus* Burchell 1822). Online J. Anim. Feed Res. 2016. Vol. 6, iss. 3. P. 73—82.
107. Solomon S. G., Okomoda V. T. Effects of photoperiod on the haematological parameters of *Clarias gariepinus* fingerlings reared in water recirculatory system // Journal of Stress Physiology & Biochemistry. 2012. Vol. 8, № 3. P. 247—246.
108. Spawning response of African catfish (*Clarias gariepinus* (Burchell 1822), *Claridae: Teleost*) exposed to different piscine pituitary and synthetic hormone / Gadisa Natea et al. // International Journal of Fisheries and Aquatic Studies. 2017. Vol. 5, iss. 2. P. 264—269.
109. Suleiman M. A., Solomon R. J. Effect of stocking on the growth and survival of *Clarias gariepinus* grown in plastic tanks // Direct Res. J. Vet. Med. Anim. Sci. 2017. Vol. 2, iss. 3. P. 82—92.
110. Sunarma A., Carman O., Alimuddin M. Z., Jr. Improving biomass gain using crossbreeding of distinct farmed population of African catfish *Clarias gariepinus* // AACL Bioflux. 2010. Vol. 10, iss. 5. P. 1001—1010.

111. Testicular morphology and sperm motility in cultured African Catfish (*Clarias gariepinus*) at different stages of development / Okoye C. N. et al. // Not. Sci. Biol. 2016. Vol. 8, iss. 3. P. 281—285.
112. Tilahun G., Dube K., Chtruedi C. S. Assessment of reproductive performance, growth and survival of hybrids of African Catfish (*Clarias gariepinus*) and Indian Catfish (*Clarias batrachus*) compared to their parental lines crosses // Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2016. Vol. 16. P. 123—133.

REFERENCES

1. Artemenkov, D. V. (2012). Analiz formennykh elementov krovi klarieвого soma *Clarias gariepinus* pri vyrashchivanii v UZV s ispol'zovaniem probiotika Subtilis. *Problemy intensifikatsii zhivotnovodstva s uchetom prostranstvennoy infrastruktury sel'skogo khozyaystva i okruzhayushchey sredy*. Falenty: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą, 22-25.
2. Artemenkov, D. V. (2013). Vyrashchivanie klarieвого soma (*Clarias gariepinus*) v UZV na kombikormakh s dobavkami probiotika «Subtilis». *Extended abstract of candidate's thesis*. Moskva.
3. Artemenkov, D. V., & Makashova, T. A. (2011). Analiz biokhimicheskikh pokazateley syvorotki krovi klarieвого soma pri vyrashchivanii v UZV s ispol'zovaniem probiotika Subtilis v sravnenii s morfologicheskimi kharakteristikoy. *Akvakul'tura Tsentral'noy i Vostochnoy Evropy: nastoyashchee i budushchee : II s'ezd NACEE (Seti Tsentrov po akvakul'ture v Tsentral'noy i Vostochnoy Evrope) i seminar o roli akvakul'tury v razvitii sela, Kishinev, 17-19 okt. 2011 g.: mater.* Kishinev, 22-25.
4. Artemenkov, D. V., Mikryakov, D. V., & Silkina, N. I. (2011). Immunologicheskii analiz syvorotki krovi klarieвого soma *Clarias gariepinus* v UZV pri vyrashchivanii na kombikorme s dobavkami probiotika Subtilis. *Razvitie akvakul'tury v regionakh: problemy i vozmozhnosti: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 10-11 noyab. 2011 g., Moskva: dokl.* Moskva: GNU VNIIR, 67-71.
5. Mel'chenkov, E. A., Priz, V. V., Chertikhina, E. A., & Kanid'eva, T. A. (2008). Afrikan'skiy som perspektivnyy ob'ekt akvakul'tury v sredney polose Rossii. *Rybnoe khozyaystvo*, 6, 72-77.
6. Bardach, Dzh., Riter, Dzh., & Maklarni, U. (1978). Kul'tivirovanie *Clarias* spp. v Tailande. *Akvakul'tura. Razvedenie i vyrashchivanie presnovodnykh i morskikh organizmov*. Moskva: Pishchevaya promyshlennost', 49-51.
7. Bardach, Dzh., Riter, Dzh., & Maklarni, U. (1978). Razvedenie klarievykh, ugrekhvostykh i obyknovennykh somov v Avstralii i Azii. *Akvakul'tura. Razvedenie i vyrashchivanie presnovodnykh i morskikh organizmov*. Moskva: Pishchevaya promyshlennost', 51-53.
8. Bondarenko, A. B. (2005). Afrikan'skiy som perspektivnyy ob'ekt dlya teplovodnykh khozyaystv i priusadbnogo rybovodstva. *Akvakul'tura i integrirovannye tekhnologii: problemy i vozmozhnosti: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posvyat. 60-letiyu Moskovskoy rybovodno-meliorativnoy opytной stantsii i 25-letiyu ee reorganizatsii v GNU VNIIR, Moskva, 11-13 apr. 2005 g.: mater. (Vol. 1).* Moskva, 295-298.
9. Bondarenko, A. B., Sychev, G. A., & Priz, V. V. (2008). Klarievyi som. *Rybovodstvo*, 1, 30-31.

10. Bondarenko, A. B., Sychev, G. A., & Priz, V. V. (2005). Klarievyy som v Rossii i za rubezhom. Perspektivy ego vnedreniya dlya teplovodnykh khozyaystv Rossii. *Sbornik nauchnykh trudov VNIIPRKh*, 80, 213-218.
11. Vlasov, V. A. (2012). Vospriizvodstvo i vyrashchivanie klarievogo soma (*Clarias gariepinus*) v ustanovkakh s zamknutym vodoobespecheniem (UZV). *Rybovodstvo i rybnoe khozyaystvo*, 7, 26-35.
12. Vlasov, V. A. (2011). Vospriizvodstvo i vyrashchivanie klarievogo soma *Clarias gariepinus* v ustanovkakh s zamknutym vodoobespecheniem. Razvitie akvakul'tury v regionakh: problemy i vozmozhnosti: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 10-11 noyab. 2011 g., Moskva: dokl. Moskva: GNU VNIIR, 72-84.
13. Vlasov, V. A. (2013). Vyrashchivanie klarievogo soma (*Clarias gariepinus* Burchell) pri razlichnykh usloviyakh soderzhaniya i kormleniya. Sostoyanie i perspektivy razvitiya presnovodnoy akvakul'tury: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Moskva, 5-6 fevr. 2013 g.: dokl. Moskva: RGAU MSKhA im. K.A. Timiryazeva, 141-150.
14. Vlasov, V. A. (2009). Nekotorye tekhnologicheskie priemy pri vyrashchivanii afrikanskogo (klarievogo) soma (*Clarias gariepinus* Burchell) v UZV. *Rybnye resursy*, 3, 27-30.
15. Vlasov, V. A. (2009). Rost i razvitie afrikanskogo soma (*Clarias gariepinus* Burchell) v zavisimosti ot usloviy kormleniya i soderzhaniya. *Izvestiya TSKhA*, 3, 148-156.
16. Vlasov, V. A., Artemenkov, D. V., & Panasenko, V. V. (2012). Ispol'zovanie probiotika «Subtilis» v kachestve dobavki v kombikorm pri vyrashchivanii klarievogo soma (*Clarias gariepinus*). *Rybnoe khozyaystvo*, 5, 89-93.
17. Vlasov, V. A., & Dernakov, V. V. (2007). Vliyanie raznorazmernykh osobey v populyatsii afrikanskogo soma na rezul'taty ikh vyrashchivaniya. *Problemy immunologii, patologii i okhrany zdorov'ya ryb i drugikh gidrobiontov: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater. Borok — Moskva: RAN*, 127-132.
18. Vlasov, V. A., Zav'yalov, A. P., & Gordeev, A. V. (2003). Novyy ob"ekt akvakul'tury Rossii — afrikanskiy som *Clarias gariepinus*. *Kholodnovodnaya akvakul'tura: start v XXI vek: Mezhdunar. simpozium: mater. Moskva: Rosinformagrotekh*, 176-177.
19. Vlasov, V. A., Zav'yalov, A. P., & Esavin, Yu. I. (2005). Vyrashchivanie afrikanskogo klarievogo soma v basseynakh s razlichnym kislorodnym rezhimom. *Akvakul'tura i integrirovannye tekhnologii: problemy i vozmozhnosti: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posvyat. 60-letiyu Moskovskoy rybovodno-meliorativnoy opytnoy stantsii i 25-letiyu ee reorganizatsii v GNU VNIIR, Moskva, 11-13 apr. 2005 g.: mater. (Vol. 3). Moskva*, 130-139.
20. Vlasov, V. A., Zav'yalov, A. P., & Esavkin, Yu. I. (2010). Rekomendatsii po vospriizvodstvu i vyrashchivaniyu klarievogo soma s ispol'zovaniem ustanovok s zamknutym tsiklom vodoobespecheniya: instruktivno-metodicheskoe izdanie. Moskva: Rosinformagrotekh.
21. Gamachkova, N. Ya., & Kourzhil, Ya. (1997). Opyt vyrashchivaniya novogo introdutsirovannogo vida — afrikanskogo soma (*Clarias gariepinus*) v Cheshskoy respublike. *Pervyy kongress ikhtiologov Rossii: tezisy dokl. Moskva: VNIRO*, 270-271.
22. Dmitrovich, N. P. (2017). Primenenie suspenziy khlorelly i stsenedesmusa kak dobavki v kombikorma dlya lenskogo osetra (*Acipenser baeri* Brandt) i klarievogo

- soma (*Clarias gariepinus* Burchell). *Vestnik Polesskogo gosudarstvennogo universiteta*, 1, 37-48.
23. Dolynskiy, V. P. (2002). Perspektyvy rybohospodarskoho osvoiennia somiv rodyiny klariievkykh (*Clariidae*) v akvakulturi Ukrainy. *Rybne hospodarstvo*, 61, 3-9.
  24. Zaki, M., & Abdula, A. (1983). Razmnozhenie i razvitie *Clarias gariepinus* (*Pisces, Clariidae*) iz ozera Manzala (Egipet). *Voprosy ikhtiologii*, 23(6), 941-950.
  25. Kovalev, K. V. (2005). Vliyanie astatichnykh temperaturnykh rezhimov na rost i razvitie klarievogo soma pri vyrashchivaniy ego v UZV. *Akvakul'tura i integrirovannye tekhnologii: problemy i vozmozhnosti: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posvyat. 60-letiyu Moskovskoy rybovodno-meliorativnoy opytnoy stantsii i 25-letiyu ee reorganizatsii v GNU VNIIR, Moskva, 11-13 apr. 2005 g.: mater.* (Vol. 2). Moskva, 47-53.
  26. Kovalev, K. V. (2006). Tekhnologicheskie aspekty vyrashchivaniya klarievogo soma (*Clarias gariepinus*) v rybovodnoy ustanovke s zamknutym tsiklom vodoobespecheniya (UZV). *Rybovodstvo i rybnoe khozyaystvo*, 11, 18-26.
  27. Kovalev, K. V. (2006). Tekhnologicheskie aspekty vyrashchivaniya klarievogo soma (*Clarias gariepinus*) v rybovodnoy ustanovke s zamknutym tsiklom vodoobespecheniya (UZV). *Extended abstract of candidate's thesis*. Moskva.
  28. Kovalev, K. V., Naumova, A. M., & Vlasov, V. A. (2005). Otsenka sostoyaniya zdorov'ya klarievogo soma i kachestva vody pri ego vyrashchivaniy v akvarial'nykh usloviyakh. *Akvakul'tura i integrirovannye tekhnologii: problemy i vozmozhnosti: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posvyat. 60-letiyu Moskovskoy rybovodno-meliorativnoy opytnoy stantsii i 25-letiyu ee reorganizatsii v GNU VNIIR, Moskva, 11-13 apr. 2005 g.: mater.* (Vol. 3). Moskva, 164-169.
  29. Kurbanov, A. R., & Kamilov, B. G. (2017). Razvedenie afrikanskogo soma *Clarias gariepinus* v usloviyakh Uzbekistana : uchebnoe posobie. Tashkent: Navruz.
  30. Limentar', P. P. (2008). Antistressovoe deystvie preparata "Torfovit" (gumat kaliya) pri vyrashchivaniy lichinki afrikanskogo soma. *Bioriznomanittya vodnikh ekosistem: problemi i shlyakhi virishennya: Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastyu, m. Dnipropetrovs'k, 2-3 zhovt. 2008 r. (do 90-richchya Dnipropetrovs'kogo natsional'nogo universitetu): mater.* Dnipropetrovs'k, 110-111.
  31. Smirnova, E. A., Kochetkova, A. A., & Vorobiova, I. N. et al. (2012). Lipidnyy profil' zhira afrikanskogo soma *Clarias gariepinus*. *Maslozhirovaya promyshlennost'*, 4, 26-29.
  32. Mel'chenkov, E. A., Priz, V. V., & Tansykbaev, N. N. (2010). Kombinirovannaya tekhnologiya vyrashchivaniya afrikanskogo soma v pervoy zone rybovodstva. *Sbalansirovannoe prirodoopol'zovanie: sovremennyy vzglyad, tendentsii i perspektivy: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Kherson, 17-19 maya 2010 g.: mater.* Kherson: Kolos, 47-49.
  33. Mel'chenkov, E. A., Priz, V. V., & Tansykbaev, N. N. (2011). Osobennosti kul'tivirovaniya afrikanskogo soma *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) v pervoy zone rybovodstva. *Tavriys'kyi naukovyi visnyk*, 76, 247-251.
  34. Nikiforov, A. I. (2005). Osobennosti morfologicheskogo stroeniya afrikanskogo soma. *Akvakul'tura i integrirovannye tekhnologii: problemy i vozmozhnosti: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posvyat. 60-letiyu Moskovskoy rybovodno-*

- meliorativnoy opytnoy stantsii i 25-letiyu ee reorganizatsii v GNU VNIIR, Moskva, 11-13 apr. 2005 g.: mater. (Vol. 3). Moskva, 215-219.
35. Nikiforov, A. I. (2009). Som *Clarias gariepinus* — perspektivnyy ob"ekt akvakul'tury. *Innovatsionnye tekhnologii akvakul'tury: Mezhdunar. nauch. konf., 21-22 sent. 2009 g., Rostov-na-Donu: tezisy dokl.* Rostov-na-Donu: YuNTs RAN, 98-101.
36. Nikiforov, A. I., & Mailkova, A. V. (2008). Som *Clarias gariepinus* stroenie tela i morfologicheskie osobennosti muskulatury. *Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi*, 24, 170-173.
37. Nikiforov, A., & Mailkova, A. (2002). Morfologicheskie osobennosti soma *Clarias gariepinus*. *Presnovodnaya akvakul'tura: sostoyanie, tendentsii i perspektivy razvitiya: sbornik nauch. statey, posvyashch. 60-letiyu Nauchno-issled. rybokhozyaystvennoy stantsii*. Kishinev: Eco-TIRAS, 56-58.
38. Ovchinnikova, T. I. (1992). Vyrashchivanie afrikanskogo soma. *Rybnoe khozyaystvo: inform. paket*, 1, 14-20.
39. Ol'shanskiy, V. M., Podarin, A. V., & Kasumyan, A. O. (2010). Elektricheskaya aktivnost' klarievogo soma pri razlichnykh formakh povedeniya. *Povedenie ryb: IV Vseros. konf. s mezhdunar. uchastiem, Borok, Rossiya, 19-21 okt. 2010 g.: mater. dokl.* Moskva: AKVAROS, 320-324.
40. Ol'shanskiy, V. M., Soldatova, O. A., & Tkhi Nga Nguen. (2010). Ritual sparivaniya klarievogo soma *Clarias macrocephalus*. *Povedenie ryb: IV Vseros. konf. s mezhdunar. uchastiem, Borok, Rossiya, 19-21 okt. 2010 g.: mater. dokl.* Moskva: AKVAROS, 316-319.
41. Levina, O. A., Ponomarev, S. V., Korchunova, M. A., Fedorovykh, Yu. V., & Bakaneva, Yu. M. (2015). Opyt ispol'zovaniya kombikormov s razlichnoy normoy soderzhaniya proteina pri vyrashchivanii molodi afrikanskogo klarievogo soma (*Clarias gariepinus*) v usloviyakh ustanovki zamknutogo vodosnabzheniya. *Vestnik AGTU*, 3, 93-101.
42. Priz, V. V., Mel'chenkov, E. A., Kanid'eva, T. A., & Shevchenko, D. G. (2008). Pervye rezultaty primeneniya startovogo kombikorma dlya vyrashchivaniya lichinok afrikanskogo soma (*Clarias gariepinus*). *Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi*, 24, 183-187.
43. Priz, V. V., Mel'chenkov, E. A., Kanid'eva, T. A., & Shevchenko, D. G. (2009). Pervye rezultaty primeneniya startovogo kombikorma dlya vyrashchivaniya lichinok afrikanskogo soma. *Rybovodstvo i rybnoe khozyaystvo*, 1/2, 55-58.
44. Pirog, A. V., & Lozhnichenko, O. V. (2015). Osobennosti razvitiya nekotorykh organov klarievyykh somov (*Clariidae*) v rannem ontogeneze. *Yug Rossii: ekologiya, razvitie*, 10(3), 92-98.
45. Pronina, G. I., Artemenkov, D. V., & Petrushin, A. B. (2017). Sravnitel'naya kharakteristika somov raznykh vidov po gematologicheskim i biokhimicheskim pokazatelyam krovi. *Trudy VNIRO*, 165, 111-117.
46. Rilov, V. G. (2008). Dosvid viroshchuvannya afrikans'kogo soma v umovakh Krimu. *Tavriys'kiy naukovyi visnyk*, 57, 345-349.
47. Romanova, E. M., Lyubomirova, V. N., & Mukhitova, M. E. (2016). Biologicheskii kontrol' fertil'nosti samok klarievogo soma v basseynovoy akvakul'ture. *Vestnik Ul'yanovskoy gosudarstvennoy sel'skokhozyaystvennoy akademii*, 3, 78-84.
48. Petrushin, A. B., Maslova, N. I., & Vlasov, V. A. et al. (2012). Sbornik metodik po razvedeniyu i vyrashchivaniyu obyknovennogo (*Silurus glanis* L.) i klarievogo

- (*Clarias gariepinus*) somov: instruktivno-metodicheskoe izdanie. Moskva : RGAU-MSKhA imeni K. A. Timiryazeva.
49. Sevryukov, V. N., Sem'yanikhin, V. V., & Labenets, A. V. (1998). Pervyy opyt promyshlennogo kul'tivirovaniya klarieвого soma. Itogi tridtsatiletnego razvitiya rybovodstva na teplykh vodakh i perspektivy na XXI vek: Mezhdunar. simpozium, Moskva, 1998 g.: mater. Sankt-Peterburg: Rosrybkhoz, 200-202.
  50. Sevryukov, V. N., Sem'yanikhin, V. V., & Labenets, A. V. (1999). Pervyy opyt promyshlennogo kul'tivirovaniya klarieвого soma. *Resursosberegayushchie tekhnologii v akvakul'ture: II Mezhdunar. simpozium: mater.* Adler, 92.
  51. Sklyarov, V. Ya., Ivanova, E. E., & Basova, E. V. (2013). Sharmut — novyy ob"ekt prudovogo rybovodstva. *Sostoyanie i perspektivy razvitiya presnovodnoy akvakul'tury: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Moskva, 5-6 fevr. 2013 g.: dokl.* Moskva: RGAU MSKhA im. K.A. Timiryazeva, 448-450.
  52. Artemenkov D. V., Pronina, G. I., Petrushin, A. B., & Voloshin, G. A. (2017). Sravnitel'naya kharakteristika rosta somoobraznykh ryb *Silurus glanis* i *Clarias gariepinus*. *Rybovodstvo i rybnoe khozyaystvo*, 2, 14-19.
  53. Tomedi, E. M. (2004). Opredelenie kachestvennoy kharakteristiki samtsov nekotorykh vidov klarievykh, osetrovyykh i lososevykh ryb. *Vestnik AGTU, № 2(21)*, 29-32.
  54. Tomedi, E. M., & Tikhomirov, A. M. (2000). Klarievy som perspektivnyy ob"ekt akvakul'tury. *Rybovodstvo i rybolovstvo*, 4, 14.
  55. Fattolakhi, Mekhrdad. (2006). Vesovoy i lineynyy rost afrikanskogo soma (*Clarias gariepinus* Burchell) v zavisimosti ot faktorov sredy i kachestva korma. *Extended abstract of candidate's thesis.* Moskva.
  56. Fattolakhi, M. (2008). Vesovoy i lineynyy rost afrikanskogo soma v zavisimosti ot faktorov sredy i kachestva korma. *Rybovodstvo i rybnoe khozyaystvo*, 1, 42-53.
  57. Fattolakhi, M., & Kasumyan, A. O. (2005). Rol' zreniya v pishchevom povedenii afrikanskogo soma *Clarias gariepinus*. *Povedenie ryb: Mezhdunar. konf., Borok, Rossiya: mater. dokl.* Moskva, 511-514.
  58. Khrustalev, E. I. (2010). Otsenka rostovoy potentsii kanal'nogo i klarieвого somov, obosnovyayushchaya polititsiklichnye tekhnologii vyrashchivaniya. *Rybnoe khozyaystvo*, 4, 65-68.
  59. Chebasov, L. V., & Podushka, S. B. (2001). Afrikanskiy som klarias na priusadebnykh uchastkakh. *Rybovodstvo i rybolovstvo*, 2, 40.
  60. Shevchenko, D. G., Priz, V. V., & Vorob'eva, G. I. (2007). Sravnitel'naya effektivnost' kormovykh belkovykh produktov pri ispol'zovanii ikh v startovykh kormakh dlya afrikanskogo soma (*Clarias gariepinus*). *Sovremennyye problemy fiziologii i biokhimii vodnykh organizmov: II nauch. shkola-konf. s uchastiem stran SNG: mater.* Petrozavodsk, 173-174.
  61. Shumak, V. V. (2015). Vyrashchivanie klarieвого soma za schet ispol'zovaniya poter' teplovy energii sbrosnykh vod GRES. *Vesnik Paleskago dzyarzhavnaga universiteta*, 2, 57-63.
  62. Yushkova, Yu. A. (2009). Ispytanie preparata «Nerestin-5KS» pri vosproizvodstve klarieвого soma v usloviyakh UZV. *Rybovodstvo i rybnoe khozyaystvo*, 4, 19-24.
  63. Legendre, M., Teugels, G. G., Cauty, C., & Jalabert, B. (1992). A comparative study on morphology, growth rate and reproduction of *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822), *Heterobranchus longifilis* Valenciennes, 1840 and their reciprocal hybrids (*Pisces, Clariidae*). *J. Fish Biol.*, 40, 59-79.

64. Abu Sayem Md. Ahsan Habib, & Dr. Prosannajid Sarkar. (2016). Extraction and identification of PUFA from African Catfish (*Clarias gariepinus*) skin. *International Journal of Fisheries and Aquatic Studies*, 4(4), 312-314.
65. Adesina, S. A., Falaye, A. E., & Ajani, E. K. (2017). Evaluation of haematological and serum biochemical changes in *Clarias gariepinus* juveniles fed graded dietary levels of boiled sunflower (*Helianthus annuus*) seed meal replacing soybean meal. *Ife Journal of Science*, 19(1), 51-68.
66. Peteri, A., Moth-Poulsen, T., Kovacs, E., Toth, I., & Woynarovich, A. (2015). *African catfish (Clarias gariepinus, Burchell 1822) production with special reference to temperate zones : a manual*. Budapest : FAO.
67. Chala, B., Erko, B., Animut, A., Degarege, A., & Petros, B. (2016). Assessment of *Clarias gariepinus* as a biological control agent against mosquito larvae. *BMC Ecol.*, 16, 27.
68. Baßmann, B., Brenner, M., & Palm, H. W. (2017). Stress and welfare of African Catfish (*Clarias gariepinus* Burchell, 1822) in a coupled aquaponic system. *Water*, 9, 504.
69. Bozkurt, Y., & Yavaş, İ. (2017). Effect of extender compositions, glycerol levels, and thawing rates on motility and fertility of cryopreserved wild African Catfish (*Clarias gariepinus*) sperm. *The Israeli Journal of Aquaculture — Bamidgeh*, 69, 1357-1364.
70. Karami A., Karbalaei, S., Ebrahimi, M., Ismail, A., & Jahromi, M. F. et al. (2017). Changes in nutritional values induced by butachlor in juvenile diploid and triploid *Clarias gariepinus*. *Int. J. Environ. Sci. Technol.*, 1-12.
71. Nurul Mariam Hussin, Sharifudin Md. Shaarani, Mohd Rosni Sulaiman, Abdul Hamid Ahmad, & Charles S. Vairappan (2017). Chemical composition and antioxidant activities of catfish epidermal mucus. *Journal of Advanced Agricultural Technologies*, 4, 1, 73-77.
72. Cheni-Chery Sudhakumari et al. (2017). Cloning, localization and differential expression of Neuropeptide-Y during early brain development and gonadal recrudescence in the catfish, *Clarias gariepinus*. *General and Comparative Endocrinology*, 251, 54-65.
73. Danmaigoro, A., Hena, S. A., Ibrahim, A. A., Shehu, S. A., & Mahmud, M. A. (2016). Comparative morphometry and histological studies of the cerebellum of catfish (*Clarias gariepinus*) and tilapia (*Oreochromis niloticus*). *Journal of Applied Life Sciences International*, 7, 4, 1-6.
74. Ukagwu, J. I. et al. (2017). Comparative studies of nutrient composition of wild caught and pond reared african catfish, *Clarias gariepinus*. *International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences*, 5(7), 63-68.
75. Djissou, A. S. M., Fiogbe, E. D., Adjahouinou, D. C., & Koshio, S. (2016). Complete replacement of fish meal by other animal protein sources on growth performance of *Clarias gariepinus* fingerlings. *Int. Aquat. Res.*, 8(4), 333-341.
76. Marimuthu K., Ang Chi Cheen, Muralikrishnan, S., & Kumar, D. (2010). Effect of different feeding frequency on the growth and survival of African Catfish (*Clarias gariepinus*) fingerlings. *Advances in Environmental Biology*, 4, 2, 187-193.
77. Kareem, O. K. et al. (2017). Effect of different fertilization and egg de-adhesion methods on hatching and survival of *Clarias gariepinus* (Burchell 1822) fry. *Journal of FisheriesSciences.com.*, 11, 1, 21-27.

78. Subir Kumar Juin et al. (2017). Effect of fish vitellogenin on the growth of juvenile catfish, *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822). *Aquaculture Reports*, 7, 16-26.
79. Orisasona, O. et al. (2017). Effect of phytase supplementation on the growth, mineral composition and phosphorus digestibility of African Catfish (*Clarias gariepinus*) juveniles. *Animal Research International*, 14, 2, 2741-2750.
80. Idowu, T. A. et al. (2016). Effects of different additives on the survival and haematology of *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) fingerlings during transportation. *Nigerian Journal of Tropical Agriculture*, 16, 65-71.
81. Solomon, S. G. et al. (2016). Effects of storage conditions on quality characteristics of commercial aquafeeds and growth of African catfish *Clarias gariepinus*. *Journal of Fisheries*, 74, 30-37.
82. El-Hawarry, W. N., Abd El-Rahman, S. H., & Shourbela, R. M. (2016). Breeding response and larval quality of African catfish (*Clarias gariepinus*, Burchell 1822) using different hormones/hormonal analogues with dopamine antagonist. *Egyptian Journal of Aquatic Research*, 42, 2, 231-239.
83. Enyidi, U. D. (2017). *Chlorella vulgaris* as protein source in the diets of African Catfish *Clarias gariepinus*. *Fishes*, 2, 17-29.
84. Falaye, A., Emikpe, B., & Ogundipe, E. (2016). Influence of *Lactobacillus plantarum* supplemented diet on growth response, gut morphometry and microbial profile in gut of *Clarias gariepinus* fingerlings. *Journal of Coastal Life Medicine*, 4, 8, 597-602.
85. Siti Nurhafa Imra Naqtahnain Hamid et al. (2016). Formulation of fish feed with optimum protein-bound lysine for african catfish (*Clarias gariepinus*) fingerlings. *Procedia Engineering*, 148, 361-369.
86. Githukia, C. M., Kembenya, E. M., & Opiyo, M. A. (2016). Anaesthetic effects of sodium bicarbonate at different concentrations on African Catfish (*Clarias gariepinus*) juveniles. *Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research*, 2(3), 151-158.
87. Al-Deghayem, W. A., Al-Balawi, H. F., Kandeal, S. A., & Suliman, El A. M. (2017). Gonadosomatic index and some hematological parameters in African Catfish *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) as affected by feed type and temperature level. *Brazilian Archives of Biology and Technology*, 60, e17160157.
88. Putra, I., Rusliadi, R., Fauzi, M., Tang, U. M., & Muchlisin, Z. A. (2017). Growth performance and feed utilization of African catfish *Clarias gariepinus* fed a commercial diet and reared in the biofloc system enhanced with probiotic. *F1000Res.*, 6, 1545.
89. Hecht, T., Oellermann, L., & Verheust, L. (1996). Perspectives on clariid catfish culture in Africa. *Aquatic Living Resources*, 9, 5, 197-206.
90. Dauda, A. B., Romano, N., Ebrahimi, M., Ajadi, A., Chou Min Chong et al. (2018). Influence of carbon/nitrogen ratios on biofloc production and biochemical composition and subsequent effects on the growth, physiological status and disease resistance of African catfish (*Clarias gariepinus*) cultured in glycerolbased biofloc systems. *Aquaculture*, 483, 120-130.
91. Jalil, N. et al. (2016). It is all in the blood: erythrocyte characterization of triploid and diploid African Catfish, *Clarias gariepinus*. *J. Fish. Aquat. Sci.*, 11, 6, 425-431.

92. Lawal, B. M., Adewole, H. A., & Olaleye, V. F. (2017). Digestibility study and nutrient re-evaluation in *Clarias gariepinus* fed blood meal-rumen digesta blend diet. *Not. Sci. Biol.*, 9, 3, 344-349.
93. Derbalah, A. et al. (2017). Micro-morphological investigation of the skin of the larval and adult stages of the African Catfish (*Clarias gariepinus*). *Alexandria Journal of Veterinary Sciences*, 53, 1-10.
94. Ola-Oladimeji, F. A., Awodira, M. O., Fagbuaro, O., & Akomolafe, A. O. (2016). Morphological characterization of wild and cultured *Clarias gariepinus* (Burchell 1822) using principal component and cluster analyses. *Not. Sci. Biol.*, 8, 4, 428-436.
95. Nwachi Oster Francis, & Dasuki Awawu. (2017). Culture of diploid and tetraploid (*Clarias gariepinus*) fed with 17 α methyltestosterone. *Fudma — Journal of Agric. and Agric. Tech.*, 3, 1, 10-14.
96. Ojonugwa, E. B., & Solomon, R. J. (2017). Effects of over stocking on the growth rate of *Clarias gariepinus*. *Journal of Animal Science and Veterinary Medicine*, 2, 84-95.
97. Okomoda, V. T., Chong Chu Koh, I., & Shahreza, S. Md. (2017). A simple technique for accurate estimation of fertilization rate with specific application to *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822). *Aquaculture Research*, 1-6.
98. Okomoda, V. T., Tiamiyu, L. O., & Iortim, M. (2016). The effect of water renewal on growth of *Clarias gariepinus* fingerlings. *Journal of Fisheries*, 74, 25-29.
99. Okomoda, V. T., Tiamiyu, L. O., & Kwaghger, D. (2017). Spawning performance of *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) induced with ethanol preserved and fresh catfish pituitary extract. *Zygote*, 25, 3, 376-382.
100. Okomoda, V. T., Wase, G., & Tiamiyu, L. O. (2017). Effects of tank background colour on growth performance and feed utilization of African Catfish *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) fingerlings. *Ribarstvo. Croatian Journal of Fisheries*, 75, 1, 5-11.
101. Omolade, O., & Solomon, R. J. (2017). Effect of organic and inorganic diet in the growth of *Clarias gariepinus*. *Direct Res. J. Vet. Med. Anim. Sci.*, 2, 3, 66-81.
102. Muhammad Firdaus Sallehudin et al. (2017). Optimum light wavelength and light intensity for rearing juvenile African Catfish (*Clarias gariepinus*). *International Journal of Aquatic Science*, 8, 2, 107-112.
103. Oyebola, O. O., Adekunle, O. M., & Setufe, S. B. (2017). Growth rate and disease resistance of inbreds and novel intra-specific crossbreds larva of *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) in response to *Pseudomonas aeruginosa* challenge. *Journal of Experimental Agriculture International*, 16(6), 1-11.
104. Okoye, C. N., Dan-Jumbo, S. O., Agina, O. A., Eze, U. U., & Udoumoh, A. F. (2016). Reference intervals for the serum biochemistry and lipid profile of male broodstock African Catfish (*Clarias gariepinus*: Burchell, 1822) at varied ages. *Not. Sci. Biol.*, 8, 4, 437-443.
105. Rui, D. (2005). *Morphological evolution, adaptations, homoplasies, constraints, and evolutionary trends: Catfishes as a case study on general phylogeny & macroevolution*. Enfield : Science Publishers Inc.
106. Shourbela, R. M., El-Hawarry, W. N., & Abd El-Rahman, S. H. (2016). Interactive effects of stocking density and feed type on growth, survival and cannibalism among African catfish (*C. gariepinus* Burchell 1822). *Online J. Anim. Feed Res.*, 6, 3, 73-82.

107. Solomon, S. G., & Okomoda, V. T. (2012). Effects of photoperiod on the haematological parameters of *Clarias gariepinus* fingerlings reared in water recirculatory system. *Journal of Stress Physiology & Biochemistry*, 8(3), 247-246.
108. Gadisa, Natea, Mulugeta, Wakjira, Tokuma, Negisho, & Megerssa, Endebu. (2017). Spawning response of African catfish (*Clarias gariepinus* (Burchell 1822), *Claridae: Teleost*) exposed to different piscine pituitary and synthetic hormone. *International Journal of Fisheries and Aquatic Studies*, 5(2), 264-269.
109. Suleiman, M. A., & Solomon, R. J. (2017). Effect of stocking on the growth and survival of *Clarias gariepinus* grown in plastic tanks. *Direct Res. J. Vet. Med. Anim. Sci.*, 2, 3, 82-92.
110. Sunarma, A., Carman, O., & Alimuddin, M. Z., Jr. (2010). Improving biomass gain using crossbreeding of distinct farmed population of African catfish *Clarias gariepinus*. *AACL Bioflux*, 10, 5, 1001-1010.
111. Okoye, C. N., Igwebuike, U. M., Udoumoh, A. F., & Okereke, C. T. (2016). Testicular morphology and sperm motility in cultured African Catfish (*Clarias gariepinus*) at different stages of development. *Not. Sci. Biol.*, 8(3), 281-285.
112. Tilahun, G., Dube, K., & Chtruvedi, C. S. (2016). Assessment of reproductive performance, growth and survival of hybrids of African Catfish (*Clarias gariepinus*) and Indian Catfish (*Clarias batrachus*) compared to their parental lines crosses. *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 16, 123-133.

**АФРИКАНСКИЙ (КЛАРИЕВЫЙ) СОМ
(CLARIAS GARIEPINUS BURCHELL, 1822).
ТЕМАТИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ**

Ир. И. Грициняк, library@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
Т. М. Швець, library@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Формирование справочного перечня публикаций по отдельным вопросам биологии и культивирования африканского (клариевого) сома *Clarias gariepinus* в Украине и за рубежом, а также влияния условий его содержания на ряд физиолого-биохимических и рыбоводных показателей.

Методика. В ходе системного поиска в процессе подготовки тематического перечня применялись как целостный, так и выборочный методы. Библиографическое ядро составляли украино-, русско- и англоязычные издания из фонда научной библиотеки Института рыбного хозяйства НААН Украины.

Результаты. Сформирован тематический библиографический перечень публикаций в количестве 112 источников, охватывающих временной интервал с 1978 по 2017 гг., а также включающих статью из журнала «Aquaculture», датированную 2018 годом, и посвященных рыбоводно-биологическим особенностям представителя отряда сомообразных рыб семейства клариевых — африканского (клариевого) сома. Литературные источники размещены в алфавитном порядке по автору или названию, описаны согласно ДСТУ 8302:2015 «Информация и документация. Библиографическая ссылка. Общие положения и правила составления», с учетом поправок (код УКНД 01.140.40), а также в соответствии с требованиями к оформлению списка литературы по международному стандарту APA style.

Практическая значимость. Подготовленный список публикаций может быть полезным для ученых, практиков, студентов, сфера интересов которых касается вопросов культивирования и исследования биологических особенностей клариевого сома.

Ключевые слова: африканский (клариевый) сом, УЗВ, бассейны, физиолого-биохимические показатели, культивирование, воспроизводство.

**AFRICAN CATFISH *CLARIAS GARIEPINUS* BURCHELL, 1822).
THEMATIC BIBLIOGRAPHY**

Ir. Hrytsyniak, library@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

T. Shvets, library@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Forming a thematic bibliographic list of publications on certain issues of African catfish (*Clarias gariepinus*) biology and cultivation in Ukraine and abroad, as well as concerning the effects of rearing conditions on physiological, biochemical and fish-breeding characteristics of clariids.

Methods. The complete and selective methods were applied in the process of the systematic search. The bibliographic core have been formed with the publications in Ukrainian, Russian and English from the fund of scientific library of the Institute of Fisheries NAAS of Ukraine.

Results. There was composed the thematic list of publications with a total quantity of 112 sources covering the time interval from 1978 to 2017, as well as an article from the "Aquaculture" journal, dated 2018, and including the fish-biological characteristics of African catfish as representative of Siluriformes order, Clariidae family. The literary sources are arranged in alphabetical order by author or title, and described according to DSTU 8302:2015 "Information and documentation. Bibliographic reference. General principles and rules of composition", with the amendments (code UKND 01.140.40), as well as in accordance with the requirements of APA style — international standard of references.

Practical value. The list may be useful for scientists, practitioners, students, whose area of interests covers the questions of cultivation and study of the biological features of African catfish.

Keywords: African catfish, closed water systems, tanks, physiological and biochemical indicators, cultivation, reproduction.

ОГОЛОШЕННЯ

В Інституті рибного господарства НААН працює **ПЛР-лабораторія, діяльність якої спрямована на діагностику інфекційних захворювань риб**. На сьогодні в арсеналі лабораторії є діагностикими для вірусних, бактеріальних та паразитарних захворювань, які, за даними Міжнародного Епізоотичного Бюро (OIE), є найбільш небезпечними для об'єктів сучасної аквакультури. При розробленні діагностичних тест-систем зверталась увага на тенденції розвитку вітчизняного рибництва та інфекційні агенти, які циркулюють в Україні або можуть проникнути у вітчизняні рибогосподарські підприємства із сусідніх країн.

Ми пропонуємо молекулярну діагностику вірусних захворювань коропових, лососевих, осетрових та інших видів риб.

Лососеві: вірус інфекційного панкреатичного некрозу IPNV; вірусна геморагічна септицемія VHSV; вірус інфекційного гемопоетичного некрозу IHNV.

Коропові: вірус весняної віремії SVCV; герпесвірус CyHV та KHV.

Осетрові: герпесвірус AcHV; іридовірус AcIV; аденовірус AcAdV.

Іctalурові: герпесвірус каналного сома CCV.

Для бактеріальних хвороб риб підібрані тест-системи для діагностики фурункульозу форелі (*Aeromonas salmonicida*), геморагічної септицемії (*Aeromonas hydrophila*), хвороби нирок лососевих (BKD) (*Renibacterium salmoninarum*), ентеричної хвороби «червоного рота» (*Yersinia ruckeri*), флавобактеріозу (*Flavobacterium columnarum* і *Flavobacterium psychrophila* (BCWD) та септицемії сома (*Edwardsiella ictaluri*).

Присутні також тест-системи ідентифікації ендопаразитів *Tetracapsuloides bryosalmonae* (проліферативна хвороба нирок) та *Myxobolus cerebralis*, що інфікують райдужну форель.

Для отримання додаткової інформації можна звертатися за адресою:

Інститут рибного господарства НААН, вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164. Лабораторія біотехнологій у рибництві.

Завідувач лабораторії: к.б.н., с.н.с. Рудь Юрій Петрович.

Тел. (097) 953-80-80 або e-mail: rud@if.org.ua.

З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!!

Шановні колеги та читачі нашого журналу!

*Хай Новий рік з добром прийде,
Здоров'я, сміх і радість принесе,
І Жовтий Собака в гості зайде,
Ща безліч подарунків принесе:
Радість для серця і спокій душі,
Піднесений настрій для всієї сім'ї!
Різдво з колядою най завітає,
Щастям безмежним Вас благословляє!*

Вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим!

*Головний редактор,
директор Інституту рибного господарства НААН,
доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, професор
Грициняк Ігор Іванович*

FISHERIES SCIENCE OF UKRAINE

“Fisheries Science of Ukraine” — a scientific journal, has been published in Ukraine since 2007. “Fisheries Science of Ukraine” included in the List of Specialized Publications of Ukraine, which can be used for publishing results of doctor’s and candidate’s thesis (biological and agricultural sciences), was approved in 08.07.2009, recertification of 06.11.2014 (Ministry of Education and Science of Ukraine №1279)

Founder and publisher of the journal — Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

State registration certificate KB № 20934-10734 PR of 18.08.2014

EDITOR-IN-CHIEF

Ihor Hrytsyniak, Doctor of Sciences, Professor, Academician of the NAAS of Ukraine, Director, Institute of Fisheries of the NAAS

DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF

Oleksandr Tretiak, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Deputy Director in scientific works, Institute of Fisheries of the NAAS

Natalia Kolesnyk, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of International Scientific and Technical Cooperation and Intellectual Property, Institute of Fisheries of the NAAS

EDITORIAL BOARD

BIOLOGICAL SCIENCES

Boris Gomelsky, Doctor of Biological Sciences, Professor, Kentucky State University, UNITED STATES OF AMERICA

Daniel Patrick, Doctor of Biological Sciences, Head of Biology Department Laboratories of the Pyrenees and Landes, FRENCH REPUBLIC

Gautam V. Zodape, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Zoology of Shivaji University Kolhapur, REPUBLIC OF INDIA

Vasyl Sondak, Doctor of Sciences, Head of “Water Bioresources”, National University of Water Management and Natural Resources, UKRAINE

Oleksandr Litvinenko, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director General, Federal State Unitary Enterprise “Gosrybtsentr”, RUSSIA

Oleksandr Potrokhov, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Biology of reproduction of fish, Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, UKRAINE

Leonid Buchatskyi, Doctor of Sciences, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Leading Research Scientist of the Laboratory of Biotechnologies in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Ihor Buzevych, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Valentyna Solomatina, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Leading research scientist of the department of feeds and fish feeding, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

AGRICULTURAL SCIENCES

XU Pao, Doctor, Professor, Director of Freshwater Fisheries Research Center, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Jedrzej Krupinski, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director, National Research Institute of Animal Production, POLAND

Mykhailo Efymenko, Doctor of Sciences, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head Research Scientist, Institute of Animal Breeding and Genetics of the NAAS, UKRAINE

Serhiy Tarasiuk, Doctor of Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head of the Molecular-Genetic Research Department, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Ryszard Kolman, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Ichthyology Department, The Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute in Olsztyn, POLAND

Vitaliy Bekh, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Fish Selection, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Isaak Sherman, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Aquaculture Department, Kherson State Agrarian University, UKRAINE

Oleksandr Kostenko, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Veterinary Medicine and Zootechnics Department, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, UKRAINE

SCIENTIFIC EDITORS OF SECTIONS

are staff employees of the Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine: **Natalia Tushnytska**, PhD, Senior Research Scientist, Scientific Secretary of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Deren**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Feeds and Fish Feeding of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yaroslav Tuchapskyi**, PhD, Head of the Carp Breeding Laboratory of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Zaloilo**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Molecular-Genetic Studies of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Zabytyvskyi**, PhD, Senior Research Scientist of Section of Sturgeon of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Anatoliy Melnyk**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Ecological Investigation of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Antonina Mruk**, Head of the Laboratory Salmonids Culture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Tetiana Hryhorenko**, PhD, Head of the Laboratory of Hydrobiology and Technology of Invertebrates Cultivation of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Rud'**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Bio-technology in Aquaculture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Natalia Matvienko**, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Ichthyopathology of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Oleksandr Didenko**, PhD, Senior Research Scientist of the Department of Study Reservoirs Bioresources of the Institute of Fisheries of the NAAS.

Editorial board of the Journal “Fisheries Science of Ukraine”, Institute of Fisheries NAAS, 135, Obukhivska St, Kiev-164, Ukraine, 03164; tel/fax: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, fsu.journal@gmail.com

Layout design: Natalia Kolesnik, Serhiy Shinkar, Oleksandr Bezusyi; **Making-up:** Yevheniy Arkhanhelskyi; **Literature editing:** Oleksandr Oleksiienko, Tetiana Shvets; **Correctors:** Maria Simon, Hanna Kovalchuk

ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НААН
вул. Обухівська, 135 м. Київ-164, 03164, Україна
тел./факс: +38(044) 423-74-62, тел.: +38(044) 423-74-65

<http://fsu.ua>

info@fsu.ua