ISSN 2312-9581 (Online)

ISSN 2075-1508 (Print)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

1 / 2018

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські науки), переатестація від 06.11.2014 (наказ Міністерства освіти і науки України №1279)

Засновник та видавник — Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20934-10734 ПР від 18.08.2014

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ГРИЦІНЯК Ігор Іванович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, директор Інституту рибного господарства НААН

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

КОЛЕСНИК Наталія Леонідівна, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності, Інститут рибного господарства НААН

ТРЕТЯК Олександр Михайлович, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Гомельський Борис, доктор біол. наук, професор, Державний Університет Кентуккі, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Патрік Даніель, доктор біол. наук, Голова департаменту біології Лабораторії Піренеїв, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА

Зодапе Гаутам В., доктор біол. наук, професор, декан факультету зоології Державного Університету Шиваджи в Колхатурі, РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ

Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, зав. кафедрою водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА

Потрохов Олександр Спиридонович, доктор біол. наук, с.н.с., керівник лабораторії біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, УКРАЇНА

Бучацький Леонід Петрович, доктор біол. наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), провідний науковий співробітник лабораторії біотехнологій в рибництві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Бузевич Ігор Юрійович, доктор біол. наук, с.н.с., завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Соломатіна Валентина Дмитрівна, доктор біол. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник відділу кормів та годівлі риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Ху Пао, доктор наук, професор, директор Центру прісноводного рибного господарства, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

Крупінський Єджей, доктор наук, професор, іноземний член Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут зоотехнії Польщі, ПОЛЬЩА

Єфименко Михайло Якович, доктор с.-г. наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник, Інститут розведення і генетики тварин НААН, УКРАЇНА

Тарасюк Сергій Іванович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, зав. відділу молекулярно-генетичних досліджень, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Бех Віталій Валерійович, доктор с.-г. наук, професор, зав. відділу селекції риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Шерман Ісаак Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедри рибництва, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

Костенко Олександр Іванович, канд. с.-г. наук, с.н.с., нач. відділу ветеринарної медицини та зоотехнії, Національна академія аграрних наук України, УКРАЇНА

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

є штатними працівниками Інституту рибного господарства НААН України: **Тушницька Наталія Йосифівна**, канд. ветерин. наук, с.н.с., вчений секретар ІРГ НААН; **Дерень Ольга Володимирівна**, канд. с.-г. наук, с.н.с., зав. лабораторії кормів і годівлі риб ІРГ НААН; **Тучапський Ярослав Васильович**, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу селекції риб ІРГ НААН; **Залоїло Ольга Василівна**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ІРГ НААН; **Забитівський Юрій Михайлович**, канд. біол. наук, старший науковий співробітник сектору осетрівництва ІРГ НААН; **Мрук Антоніна Іванівна**, зав. лабораторії лососівництва ІРГ НААН; **Григоренко Тетяна Володимирівна**, канд. с.-г. наук, зав. лабораторії гідробіології та технологій культивування цінних безхребетних ІРГ НААН; **Рудь Юрій Петрович**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії біотехнологій в рибництві ІРГ НААН; **Матвієнко Наталія Миколаївна**, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу іхтіопатології ІРГ НААН; **Діденко Олександр Володимирович**, канд. біол. наук, с.н.с., старший науковий співробітник відділу вивчення біоресурсів водосховищ; **Чернік Віктор Васильович**, зав. лабораторії менеджменту в рибництві ІРГ НААН

Редакція журналу «Рибогосподарська наука України», вул. Обухівська, 135, м. Київ-164, 03164

тел.: +38 (044) 223-84-34, тел./факс: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Підписано до друку 15.03.2017 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 7,1. Наклад 500 прим.

Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту рибного господарства НААН

(Протокол №2 від 21 березня 2018 р.)

Дизайн макету: Колесник Н. Л., Шинкар С. В., Безусий О. Л. **Верстка:** Симон М. Ю., Архангельський Є. Ю. **Літературне редагування:** Швець Т. М. **Коректор:** Ковальчук Г. В.

Друкарня ТОВ «Наш Формат», пр-т Миру, 7, м. Київ, 02105, тел.: +38 (044) 353-85-58

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

1/2018(43)

Заснований у 2007 р.
Виходить 4 рази на рік

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 1-108
DOI: 10.15407/fsu2018.01

З М І С Т

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 5-14
DOI: 10.15407/fsu2018.01.005

О. В. Охріменко

Оцінка токсичності водного середовища водойми-охолоджувача
Запорізької АЕС за результатами біотестування 5

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 15-25
DOI: 10.15407/fsu2018.01.015

З. В. Бур'ян, В. П. Гандзюра, В. М. Трохимець

Структурно-функціональна організація угруповань літорального
зоопланктону верхів'я Кременчуцького водосховища 15

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 26-35
DOI: 10.15407/fsu2018.01.026

Е. О. Аристархова

Вплив амоніаку на формування токсичності вод поверхневих
джерел водопостачання, визначеної на *Carassius auratus gibelio*
(Bloch, 1782) 26

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 36-42
DOI: 10.15407/fsu2018.01.036

І. І. Грициняк, В. В. Гурбик

Оцінка зимостійкості дволіток галицького коропа в ставах
Прикарпаття 36

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 43-53
DOI: 10.15407/fsu2018.01.043

Є. О. Барило

Екстер'єрні та вагові характеристики дволіток струмкової форелі
(*Salmo trutta* Linnaeus, 1758), райдужної форелі (*Oncorhynchus*
mykiss Walbaum, 1792) та американської палії (*Salvelinus fontinalis*
Mitchill, 1814) 43

© Інститут рибного господарства НААН України, 2018

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 54-64 DOI: 10.15407/fsu2018.01.054 <i>О. В. Гончарова, Н. Й. Тушницька</i> Фізіологічне обґрунтування використання нетрадиційного методу обробки сировини в аквакультурі.....	54
--	----

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 65-75 DOI: 10.15407/fsu2018.01.065 <i>А. В. Ващенко, Н. М. Матвієнко, Я. В. Тучапський</i> Гематологічні показники дволіток коропа (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758) за введення до їхнього раціону кормових добавок «БІО-МОС» та «НУПРО»	65
--	----

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 76-101 DOI: 10.15407/fsu2018.01.076 <i>Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон</i> Тиляпії (<i>Tilapia</i>). Тематична бібліографія.....	76
Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 102-106 DOI: 10.15407/fsu2018.01.102 <i>Р. В. Кононенко</i> Нове методичне керівництво з культивування кормових та їстівних безхребетних	102

СОДЕРЖАНИЕ

БИОРЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ ВОДОЕМОВ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 5-14
DOI: 10.15407/fsu2018.01.005

А. В. Охрименко

Оценка токсичности водной среды водоема-охладителя Запорожской АЭС по результатам биотестирования 5

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 15-25
DOI: 10.15407/fsu2018.01.015

З. В. Бурьян, В. П. Гандзюра, В. Н. Трохимец

Структурно-функциональная организация сообществ литорального зоопланктона верховья Кременчугского водохранилища 15

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 26-35
DOI: 10.15407/fsu2018.01.026

Э. А. Аристархова

Влияние аммиака на формирование токсичности вод поверхностных источников водоснабжения, определенной на *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) 26

ТЕХНОЛОГИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 36-42
DOI: 10.15407/fsu2018.01.036

И. И. Грициняк, В. В. Гурбик

Оценка зимостойкости двухлеток галицийского карпа в прудах Прикарпатья 36

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 43-53
DOI: 10.15407/fsu2018.01.043

Е. А. Барило

Экстерьерные и весовые характеристики двухлеток ручьевой форели (*Salmo trutta* Linnaeus, 1758), радужной форели (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum, 1792) и американской палии (*Salvelinus fontinalis* Mitchell, 1814) 43

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 54-64
DOI: 10.15407/fsu2018.01.054

Е. В. Гончарова, Н. И. Тушницкая

Физиологическое обоснование использования нетрадиционного метода обработки сырья в аквакультуре 54

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 65-75
DOI: 10.15407/fsu2018.01.065

А. В. Ващенко, Н. Н. Матвиенко, Я. В. Тучапский

Гематологические показатели двухлеток карпа (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) при введении в их рацион кормовых добавок «БИО-МОС» и «НУПРО» 65

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 76-101
DOI: 10.15407/fsu2018.01.076

Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон

Тиляпии (*Tilapia*). Тематическая библиография 76

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 102-106
DOI: 10.15407/fsu2018.01.102

Р. В. Кононенко

Новое методическое руководство по культивированию кормовых и съедобных беспозвоночных 102

CONTENTS

BIORESOURCES AND ECOLOGY OF WATER BODIES

- Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 5-14
DOI: 10.15407/fsu2018.01.005
- O. Okhrimenko*
Toxicity assessment of the cooling reservoir of the Zaporizhzhia nuclear power plant based on biotesting results 5
- Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 15-25
DOI: 10.15407/fsu2018.01.015
- Z. Burian, V. Gandziura, V. Trokhymets*
Structural-functional organization of the littoral zooplankton communities of the Kremenchutskiy reservoir..... 15
- Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 26-35
DOI: 10.15407/fsu2018.01.026
- E. Arystarkhova*
Influence of ammonia on forming the toxicity of waters from the surface sources of water supply determined on *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782)..... 26

TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE

- Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 36-42
DOI: 10.15407/fsu2018.01.036
- I. Hrytsynyak, V. Gurbyk*
Evaluation of winter resistance of age-1+ galician carp in Prikarpattya ponds 36
- Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 43-53
DOI: 10.15407/fsu2018.01.043
- Ye. Barylo*
Exterior and weight characteristics of age-1+ brown trout (*Salmo trutta* Linnaeus, 1758), rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum, 1792) and brook trout (*Salvelinus fontinalis* Mitchell, 1814) 43
- Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 54-64
DOI: 10.15407/fsu2018.01.054
- O. Honcharova, N. Tushnytska*
Physiological justification for using an unconventional method for processing raw material in aquaculture 54

PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

- Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 65-75
DOI: 10.15407/fsu2018.01.065
- A. Vaschenko, N. Matvienko, Y. Tuchapsky*
Changes in hematological parameters of 1+ carp (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) when introducing the feed supplements "BIO-MOS" and "NUPRO" them into their ration..... 65

CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

- Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 76-101
DOI: 10.15407/fsu2018.01.076
- N. Kolesnyk, M. Simon*
Tilapia (*Tilapia*). Thematic bibliography..... 76
- Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 102-106
DOI: 10.15407/fsu2018.01.102
- R. Kononenko*
New methodological guidelines for the cultivation of fodder and edible invertebrates 102

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 5-14

DOI: 10.15407/fsu2018.01.005

УДК 628.394.1.08 (282.247.326.8)

Received 04.10.2017

Received in revised form 18.11.2017

Accepted 09.01.2018

ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ВОДОЙМИ-ОХОЛОДЖУВАЧА ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ БІОТЕСТУВАННЯ

О. В. Охріменко, o.okhrimenko_nubip@ukr.net, Національний університет
біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Мета. Дослідити можливу токсичність водного середовища водойми-охолоджувача Запорізької АЕС для контролю і запобігання забруднення її екосистеми.

Методика. При проведенні досліджень було використано метод біологічного тестування для встановлення хронічної токсичності води досліджуваної водойми з використанням в якості тест-об'єкта *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg (Cladocera, Crustacea).

Результати. У статті представлено результати визначення токсичності води водойми-охолоджувача Запорізької АЕС методом біотестування на *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg шляхом встановлення достовірної різниці між показниками виживання та плодючості в контрольній і дослідній пробах води. Передумовою вивчення екотоксичності водного середовища досліджуваного водного об'єкта став підвищений вміст у ньому міді (Cu) та цинку (Zn), що було встановлено попередніми дослідженнями гідрохімічного режиму водойми.

Протягом періоду постановки дослідів патологічних змін у піддослідних дафній виявлено не було. Проведене дослідження дозволило зробити висновок про відсутність токсичної дії водного середовища на біоту водойми та можливість використання методу біологічної меліорації для забезпечення стабілізації її екосистеми.

Наукова новизна. Проведено оцінку потенційної токсичності води водойми-охолоджувача Запорізької АЕС в умовах істотного антропогенного навантаження та встановлено її відсутність.

Практична значимість. Отримані дані можуть бути використані при розробці та обґрунтуванні методів стабілізації екосистем водойм-охолоджувачів та управління біопродуктивністю з метою їх господарського освоєння.

Ключові слова: біотестування, токсичність, тест-об'єкт, атомна електростанція, водойма-охолоджувач.

TOXICITY ASSESSMENT OF THE COOLING RESERVOIR OF THE ZAPORIZHZHIA NUCLEAR POWER PLANT BASED ON BIOTESTING RESULTS

O. Okhrimenko, o.okhrimenko_nubip@ukr.net, National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Purpose. To investigate the possible toxicity of the aquatic environment of the cooling reservoir of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant to control and prevent pollution of its ecosystem.

Methodology. During the study, a biological test method was used to determine the chronic water toxicity of the cooling reservoir using *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) as a test object. The criterion for chronic toxicity was a statistically significant decrease in survival and

© О. В. Охріменко, 2018

fertility of the Ceriodaphnia in the experiment compared to control over the three consecutive litters for 7 days. The reliability of the differences between the control and the study was determined by the methods of variation statistics.

Findings. *The article presents the results of the determination of the toxicity of water in the cooling reservoir of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant by the method of biotesting on Ceriodaphnia affinis Lilljeborg by establishing a reliable difference between survival and fertility in the control and experimental water samples. The prerequisite for studying the ecotoxicity of the aquatic environment of the investigated water body was the increased copper content in water, which was established by preliminary studies of the hydrochemical regime of the reservoir.*

During the experimental period, no pathological changes in the experimental daphnia were found. The conducted study allowed making a conclusion that there was no toxic effect of the aquatic environment on the biota of the cooling reservoir and the possibility of using the method of biological amelioration to ensure the stabilization of its ecosystem.

Originality. *The potential toxicity of the aquatic environment of the cooling reservoir of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant was estimated in conditions of significant anthropogenic pressure and its absence was established.*

Practical value. *The obtained data can be used in the development and justification of methods for stabilizing the ecosystems of cooling reservoirs and managing bioproductivity for the purpose of their economic development.*

Keywords: *biotesting, toxicity, test facility, nuclear power station, cooling reservoir.*

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Важливим резервом рибицтва є водойми-охолоджувачі енергетичних об'єктів. Особливості їх термічного і гідробіологічного режимів зумовлюють їх високу потенційну продуктивність.

Одним із головних факторів антропогенного впливу на екологічний стан водойм є їх забруднення хімічними сполуками, які здатні чинити токсичну дію на водні біоценози, що призводить до зниження їх біопродуктивності, порушення процесів самоочищення та погіршення якості водного середовища. Серед різноманіття токсикантів, що потрапляють до природних вод, найбільш негативний вплив мають важкі метали, пестициди та детергенти. Величина токсичної дії вказаних речовин визначається їхньою концентрацією та експозицією дії [1].

Поряд з цим, водойми-охолоджувачі значною мірою підлягають дії зростаючого антропогенного навантаження, яке впливає на стан їхніх екосистем. Зокрема, знижується їхня біопродуктивність, погіршується санітарний стан і гігієнічна якість води, що ускладнює їх господарське використання. Одним із шляхів подолання цих негативних явищ є інтродукція риб-біомеліораторів, зокрема рослинної риби далекогосхідного комплексу [2].

Наявність або відсутність токсичних властивостей води визначають методом біотестування, який дає змогу оцінити сукупний токсичний ефект всіх розчинених у воді хімічних речовин з урахуванням різних проявів їх взаємодії. Метою біотестування водного середовища є встановлення на гідробіонтах ступеня та характеру токсичності води, забрудненої біологічно небезпечними речовинами, та оцінка її потенційної небезпеки для водних та інших організмів.

Такий інтегральний метод оцінки токсичності є необхідним доповненням до

гідрохімічного аналізу водних об'єктів. Нормативом гранично допустимого рівня токсичності поверхневих вод є відсутність хронічної токсичності, що характеризує здатність водного середовища забезпечити умови нормального функціонування гідробіонтів та їх відтворювальної функції впродовж ряду поколінь [3].

Біотест являє собою певну систему, що містить в собі тест-об'єкт, методи фіксації досліджуваної реакції та методи обробки одержаної в результаті експерименту інформації [4]. Використання в якості тест-об'єкта ракоподібних *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg має ряд переваг. Як найбільш чутливий до дії широкого спектру хімічних речовин тест-організм, вони дають можливість визначати рівень гострої і хронічної токсичності водного середовища в оперативному режимі [5].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Додаткове забруднення водойм-охолоджувачів АЕС можливе під час проведення профілактичних промивок зі сторони другого контуру парогенераторів ВВЕР з метою попередження корозійного зносу їх теплообмінних трубок. Для цього використовують наступні миючі розчини:

- суміш ацетату амонію, нітриту натрію та водного аміаку;
- суміш ЕДТК, гідразину і водного аміаку [6].

Так, ацетат амонію сприяє розчиненню сполук, що містять мідь. До того ж, в якості превентивних заходів для попередження корозійних пошкоджень колекторів парогенераторів передбачено періодичне додавання до води гідроксиду літію [7].

Разом з тим, проведені протягом 2008–2011 рр. гідрохімічні дослідження на водоймі-охолоджувачі Запорізької АЕС (ЗАЕС) виявили перевищення ГДК для рибогосподарських водойм за показниками вмісту міді та цинку, що є одним з токсичних важких металів [8]. Металам властива стійкість до руйнування під дією природних факторів, вони здатні поширюватись на значних територіях та мають велику зовнішню поверхню поглинання. Крім того, важкі метали можуть бути біологічно активними.

Потрапляючи внаслідок антропогенної діяльності до водного середовища у міграційно-активному стані, вони долучаються до біологічного кругообігу і за певної концентрації діють токсично на організм гідробіонтів. Поряд з цим, мідь та цинк є есенціальними елементами, які входять до складу білків. Зокрема, мідь у безхребетних міститься в дихальному пігменті гемоціаніні. Проте надмірний її вміст порушує в організмі транспорт заліза та утворення гемоглобіну [9].

Таким чином, метою нашої роботи стало дослідження можливої токсичності води водойми-охолоджувача ЗАЕС для контролю і запобігання забруднення її екосистеми.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Запорізька АЕС (ЗАЕС) є найбільшою електростанцією в Україні та Європі. Розташована вона поблизу м. Енергодар Запорізької області, на лівому березі

Каховського водосховища. Для охолодження конденсаторів турбін та теплообмінного обладнання енергоблоків станції використовується водойма-охолоджувач, що має загальну площу 8,2 км² та середню глибину 5 м (рис. 1).

Рис. 1. Схема водойми-охолоджувача Запорізької АЕС та станції відбору проб

Fig. 1. The scheme of the reservoir-cooler of the Zaporizhzhya NPP and the sampling station

Дослідження концентрації важких металів у воді водойми здійснювали за допомогою спектрофотометра в еколого-хімічній лабораторії ЗАЕС.

Визначення рівня екотоксичності води водойми-охолоджувача ЗАЕС проводилось в 2011 р. за показником її хронічної токсичності. При цьому було використано методику біотестування на ракоподібних *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg, що ґрунтується на встановленні різниці між рівнем виживання та плодючістю церіодафній у досліджуваній воді та у воді, в якій церіодафнії утримуються (контроль).

Відбір проб здійснювали на 5 станціях, які охоплювали більшість основних біотопів водойми. Застосовували ємності з широкою шийкою. Описували назву

водойми, місце відбору проби, дату та час, метеорологічні дані, характеристику відібраного зразка. Проби не підлягали консервуванню. Об'єм проби складав 1 дм³, температура — 20±2°C, концентрація кисню — не менше 6 мг/дм³.

Біотестування проводили не пізніше ніж за 6 годин після відбору проб. Тривалість світлового періоду відповідала природній. Щільність посадки однодобових періодафній в досліді та контролі складала 10 екз./100 см³. Їх швидко переносили скляною трубкою діаметром 5–7 мм, зануривши її у воду. Застосовували трикратну повторність.

У якості тест-об'єкта використовували лабораторну культуру *C. affinis* L., яку вирощували у скляному посуді ємністю до 2 дм³. Посуд мили харчовою содою і ретельно споліскували дистильованою водою. Для біотестування використовували періодафній у віці до 24 годин, яких годували за 2–3 години до початку біотестування.

Тривалість біотестування становила 7 діб. Щодоби у кожній посудині проводили заміну проби на свіжу. Новонароджену молодь підраховували і вилучали. Біотестування завершили після того, як 60% самок у контролі дали три послідовні вимети.

Критерієм хронічної токсичності було статистично значиме зменшення рівня виживання та плодючості періодафній у досліді порівняно з контролем впродовж трьох послідовних пометів за 7 діб. Достовірність різниць між контролем та дослідом визначали методами варіаційної статистики [10, 11].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Водойма-охолоджувач ЗАЕС розташована в степовій зоні України, тому характерними для неї є високі рівні температури води в літній період (31,7–32,8°C), які перевищують допустиму норму для риборозведення — +28°C. Середньосезонні показники температури у водоймі-охолоджувачі сягають 25,1±1,34°C. Вміст розчиненого у воді кисню відповідав нормативним значенням і коливався в межах 6,9–9,2 мг/дм³.

Проведеними дослідженнями встановлено, що гідрохімічні показники води водойми-охолоджувача ЗАЕС знаходились у межах нормативних величин (СОУ – 05.01.-37-385:2006), проте спостерігалось періодичне збільшення вмісту нітратів до 4,5 мг/дм³ (взимку) та сульфатів — до 60,9 мг/дм³ (упродовж року). Крім того, відмічено високі показники БСК₅ (близько 2,68 мг/дм³O₂), що свідчить про значний вміст у воді легкоокиснюваної органічної речовини. Джерелом надходження біогенних речовин до водойми є очищені господарсько-побутові стоки м. Енергодара.

Вміст заліза загального (Fe²⁺ + Fe³⁺) у водоймі коливався в межах 0,16–0,18 мг/дм³, не перевищуючи нормативних значень (до 2,00 мг/дм³). Сірководень, вільний хлор та метан у водоймі були відсутніми [8].

Протягом періоду досліджень вміст у воді водойми-охолоджувача високотоксичних полютантів свинцю (Pb) та кадмію (Cd) не перевищував ГДК для рибогосподарських водойм. Так, концентрація Pb коливалась в межах 0,001±0,001–0,002±0,002 мг/дм³, вміст Cd знаходився на рівні 0,0002±0,0001 мг/дм³.

Поряд з цим, показники концентрації небезпечних важких металів міді та цинку були високими та перевищували рибогосподарські нормативи. Концентрація цинку за період досліджень коливалась в межах $0,043 \pm 0,0003 - 0,045 \pm 0,0003$ мг/дм³ (за нормативного показника 0,010 мг/дм³). Вміст у водоймі цинку як біогенного металу регулюється його активним засвоєнням фітопланктоном, оскільки він бере участь в основних реакціях фотосинтезу, тому найвищі його показники відмічено в зимовий період. Загалом, підвищені концентрації Zn є властивими саме для водойм з високими температурами водного середовища, що є характерним і для водойми-охолоджувача ЗАЕС. Небезпечні концентрації цинку в природних водоймах майже не зустрічаються.

Щодо міді, то її вміст знаходився на рівні $0,021 \pm 0,0002 - 0,025 \pm 0,0002$ мг/дм³ (нормативний показник — 0,001 мг/дм³). Так, найвища концентрація міді у воді водойми-охолоджувача спостерігалась в літньо-осінній період, зменшуючись взимку та навесні (рис. 2).

Рис 2. Сезонна динаміка вмісту міді у воді водойми-охолоджувача

* Примітка: I — 2008 р.; II — 2009 р.; III — 2010 р.; IV — 2011 р.

Fig. 2. Seasonal dynamics of copper content in water of a reservoir-cooler

* Notes: I — 2008; II — 2009; III — 2010; IV — 2011.

Слід зазначити, що особливістю цього елемента є його здатність до утримання в розчиненому стані, незважаючи на значну тенденцію до седиментації, оскільки процеси комплексоутворення та появи розчинених гідроксидів перебігають досить швидко. Підвищений вміст Cu у водоймі можна пояснити її надходженням з теплообмінного обладнання, а саме — конденсаторів турбін енергоблоків, трубний пучок яких виготовлено із сплавів, що містять мідь.

Проведеними дослідженнями з біотестування води водойми-охолоджувача ЗАЕС встановлено, що рівень виживання самок церіодафній у дослідній воді протягом 7 діб перебував у межах від 80 до 100% (рис. 3).

Середня кількість молоді однієї самки *C. affinis* L. та їх індивідуальна плодючість у досліді та контролі суттєво не відрізнялась (рис. 4). Так, мінімальна

середня кількість молоді однієї самки у досліді становила $10 \pm 2,50$ екз., а у контролі цей показник склав $12 \pm 0,74$ екз. відповідно.

Рис. 3. Показники виживання самок *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg, 2011 p.
Fig. 3. Survival rates of females *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg, 2011

Рис. 4. Біотестування на *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg, 2011 p.
Fig. 4. Biotesting on *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg, 2011

Критерії достовірності відхилень дослідних даних від контрольних виявились статистично недостовірними ($1,73-1,81$ при $P > 0,05$, що свідчить про відсутність токсичної дії дослідних зразків водного середовища на показники плодючості та виживання тест-об'єктів. Це підтверджується і гідрохімічними показниками води, які, у загальному, не перевищували гранично допустимих концентрацій.

Відсутність токсичної дії міді та цинку, вміст яких у воді водойми-охолоджувача перевищував ГДК, можна пояснити утворенням нетоксичних сполук у результаті антагоністичних реакцій між хімічними речовинами.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

За результатами досліджень гідрохімічного режиму водойми-охолоджувача ЗАЕС встановлено перевищення ГДК для рибогосподарських водойм за вмістом важких металів (Cu та Zn). Це явище можна пояснити також збільшенням їх міграційних властивостей за рахунок утворення органомінеральних комплексів, що зумовлюється високою концентрацією органічних речовин у водоймі. Крім того, джерелом надходження міді є теплообмінне обладнання електростанції.

Проведена токсикометрична оцінка якості води водойми-охолоджувача ЗАЕС з використанням державного стандарту зі встановлення хронічної токсичності показала відсутність токсичної дії досліджуваного водного середовища на тест-об'єкт *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg. Таким чином, використання в технологічних процесах миючих розчинів та підвищений вміст міді та цинку у воді не впливає на загальний екологічний стан досліджуваної водойми та умови життєдіяльності у ній гідробіонтів.

Це дозволяє рекомендувати використання методу біологічної меліорації, що передбачає регулювання продукційно-деструкційних процесів завдяки вилученню органічної речовини трофічними ланцюгами живлення та отримання рибної продукції з метою стабілізації екосистеми водойми.

ЛІТЕРАТУРА

1. Екологічна оцінка стану довкілля в зоні аеропорту методами біотестування / Франчук Г. М. та ін. // Вісник НАУ. 2006. № 2. С. 114—117.
2. Егоров Ю. А., Суздалева А. Л. Оценка состояния экосистем водоемов-охладителей // Известия Таганрогского государственного радиотехнического университета. 2002. Т. 29, вып. 6. С. 12—13.
3. Крайнюков О. М. Критерії оцінки чутливості організмів та ефективності методик біотестування для визначення токсичних властивостей води // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2013. № 1054, вип. 8. С. 80—85.
4. Брагинский Л. П. Теоретические аспекты проблем «нормы и патологии» в водной токсикологии // Теоретические вопросы водной токсикологии : 3-й сов.-амер. симпоз. : матер. Ленинград : Наука, 1981. С. 29—40.
5. Biological Test Method: Test of Reproduction and Survival Using the Cladoceran *Ceriodaphnia dubia* // Environmental Protection Conservation and Protection Environment Canada : report EPS 1/RM/21. February, 1992. (Environmental Protection Series).
6. Кишневский В. А., Буравчук Ю. П., Силютин А. А. Тестовая оценка эффективности моющих растворов при промывках парогенераторов от шламовых отложений // Труды Одесского политехнического университета. 2004. Вып. 1 (21). С. 1—4.
7. Тяпков В. Ф., Шарафутдинов Р. Б. Состояние, основные проблемы и направления совершенствования водно-химического режима АЭС // Вестник Госатомнадзора России. 2003. № 4. С. 8—19.
8. Бабич О. В., Вовк Н. І. Особливості гідрохімічного та термічного режимів водойми-охолоджувача Запорізької АЕС // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. 2011. Вип. 1. С. 313—319.
9. Принципы и методы экологической токсикологии / Гелашвили Д. Б. и др. Нижний Новгород : Нижегородский госуниверситет, 2015. 745 с.
10. ДСТУ 4174:2003. Визначення хронічної токсичності хімічних речовин та води

на *Daphnia magna* Straus та *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg (*Cladocera*, *Crustacea*). Київ, 2004. С. 1—9.

11. Методика визначення рівнів токсичності поверхневих і зворотних вод для контролю відповідності їх якості встановленим нормативним вимогам. Київ : Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, 2000. 28 с.

REFERENCES

1. Franchuk, G. M., Kipnis, L. S., Madzhd, S. M., & Zagoruj, Ya. V. (2006). Ekologichna ocinka stanu dovkilliya v zoni aeroportu metodamy biotestuvannya. *Visnyk NAU*, 2, 114-117.
2. Egorov, Ju. A., & Suzdaleva, A. L. (2002). Ocenka sostojanija jekosistem vodoemov-ohladitelej. *Izvestija Taganrofskogo gosudarstvennogo radiotekhnicheskogo universiteta*, 29, 6, 12-13.
3. Krajnyukov, O. M. (2013). Kryteriyi ocinky chutlyvosti organizmiv ta efektyvnosti metodyk biotestuvannya dlya vyznachennya toksychnyx vlastyvostej vody. *Visnyk XNU imeni V.N. Karazina*, 1054, 8, 80-85.
4. Braginskij, L. P. (1981). Teoreticheskie aspekty problem «normy i patologii» v vodnoj toksikologii. *Teoreticheskie voprosy vodnoj toksikologii: III sov.-amer. simpoz. : materialy*. Leningrad: Nauka, 29-40.
5. Biological Test Method: Test of Reproduction and Survival Using the Cladoceran *Ceriodaphnia dubia* (1992). *Environmental Protection Conservation and Protection Environment Canada*. Report EPS 1/RM/21.
6. Kishnevskij, V. A., Buravchuk, Ju. P., & Siljutin, A. A. (2004). Testovaja ocenka jeffektivnosti mozhushhih rastvorov pri promyvках parogeneratorov ot shlamovyh otlozhenij. *Trudy Odesskogo politehnicheskogo universiteta*, 1 (21), 1-4.
7. Tjapkov, V. F., & Sharafutdinov, R. B. (2003). Sostojanie, osnovnye problemy i napravlenija sovershenstvovaniya vodno-himicheskogo rezhima AJeS. *Vestnik Gosatomnadzora Rossii*, 4, 8-19.
8. Babych, O. V., & Vovk, N. I. (2011). Osoblyvosti gidrohimichnogo ta termichnogo rezhymiv vodojmy-oxolodzhuvacha Zaporiz'koyi AES. *Problemy` zooinzhenieriyi ta veterynarnoyi medycyny*, 1, 313-319.
9. Gelashvili, D. B., Bezel', V. S., Romanova, E. B., Bezrukov, M. E., Silkin, A. A., & Nizhegorodcev, A. A. (2015). *Principy i metody jekologicheskoy toksikologii*. Nizhnij Novgorod: Nizhegorodskij gosuniversitet.
10. Vyznachennya hronichnoyi toksychnosti himichnyh rehovyn ta vody na *Daphnia magna* Straus та *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg (*Cladocera*, *Crustacea*). (2004). *DSTU 4174:2003. Natsionalnyi standart Ukrainy*. Kyiv.
11. *Metodyka vyznachennya rivniv toksychnosti poverxnevyyh i zvorotnyh vod dlya kontrolyu vidpovidnosti yih yakosti vstanovlenym normatyvnyim vymogam*. (2000). Kyiv: Ukrayins'kyi naukovo-doslidnyj instytut ekologichnyh problem.

ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ВОДНОЙ СРЕДЫ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ

А. В. Охрименко, o.okhrimenko_nubip@ukr.net, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

Цель. Исследовать возможную токсичность водной среды водоема-охладителя Запорожской АЭС для контроля и предотвращения загрязнения его экосистемы.

Методика. При проведенні досліджень був використаний метод біологічного тестування для визначення хронічної токсичності води досліджуваного водоему з використанням в якості тест-об'єкта *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg (Cladocera, Crustacea).

Результати. В статті представлені результати визначення токсичності води водоему-охладителя Запорізької АЕС методом біотестування на *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg шляхом встановлення достовірної різниці між показателями виживаємості і плодючості в контрольній і опытній пробах води. Передумовою вивчення екотоксичності водної середовища досліджуваного водного об'єкта стало підвищене вміст в ній міді і цинку, що було встановлено попередніми дослідженнями гідрохімічного режиму водоему.

В період постановки опыта патологічних змін у підопитних дафній виявлено не було. Проведене дослідження дозволило зробити висновок про відсутність токсичного впливу водної середовища на біоту водоему і можливість використання методу біологічної меліорації для забезпечення стабілізації екосистеми.

Наукова новизна. Проведена оцінка потенційної токсичності води водоему-охладителя Запорізької АЕС в умовах суттєвої антропогенної навантаження і встановлено її відсутність.

Практична значимість. Отримані дані можуть бути використані при розробці і обґрунтуванні методів стабілізації екосистем водоему-охладителів і управління біопродуктивністю з метою їх господарського освоєння.

Ключові слова: біотестування, токсичність, тест-об'єкт, атомна електростанція, водоему-охладитель.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ УГРУПОВАНЬ ЛІТОРАЛЬНОГО ЗООПЛАНКТОНУ ВЕРХІВ'Я КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

З. В. Бур'ян, ke7sha1991@gmail.com, ННЦ «Інститут біології та медицини», КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ

В. П. Гандзюра, gandzyura@gmail.com, ННЦ «Інститут біології та медицини», КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ

В. М. Трохимець, realwolf@univ.kiev.ua, ННЦ «Інститут біології та медицини», КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ

Мета. З'ясувати сучасний стан структурно-функціональної організації угруповань літорального зоопланктону верхів'я Кременчуцького водосховища в районі Канівського заповідника.

Методика. Матеріал відібрано у літній період 2016 р. в межах шести дослідних станцій літоралі верхів'я Кременчуцького водосховища. Збір та аналіз проводився на основі загальноприйнятих методик. Об'єктами досліджень були представники трьох основних груп зоопланктону (коловертки, гіллястовуси і веслоногі ракоподібні), а також черепашкові ракоподібні та личинки двостулкових молюсків. Статистичне опрацювання даних здійснювалось в програмі MS Excel 2013.

Результати. Представлено результати досліджень сучасного стану видового багатства літорального зоопланктону верхів'я Кременчуцького водосховища, яке нараховувало 48 видів. Коловерток зареєстровано 20 видів, гіллястовусих ракоподібних — 18 і веслоногих — 10. Встановлено, що за таксономічним складом переважали представники ротаторно-кладоцерного комплексу, що пояснюється збереженням у верхній частині водосховища річкового режиму та реофільних умов. В ході аналізу виявлено, що за екологічним спектром в угрупованнях зоопланктону переважали представники пелагічної групи — 47,92%, за типом живлення — мирні зоопланктери — 64,58%. Проаналізувавши кількісні показники (щільність і біомаса) зоопланктону, встановили, що для зарослих біотопів вони були нижчі середніх (112580 ± 129914 екз./м³ і $1,83 \pm 2,07$ г/м³), а для чистоводдя — низькі (26160 ± 19161 екз./м³ і $0,82 \pm 0,86$ г/м³).

Наукова новизна. З'ясовано сучасний стан структурно-функціональної організації угруповань літорального зоопланктону верхів'я Кременчуцького водосховища.

Практична значимість. Проведені дослідження дають уявлення про структурно-функціональну організацію угруповань літорального зоопланктону верхів'я Кременчуцького водосховища в районі Канівського заповідника, що уможливило прогнозування подальших змін угруповань зоопланктону, оцінювання стану екосистем та розрахунок кормової бази молоді риб.

Ключові слова: структурно-функціональна організація, угруповання, літоральний зоопланктон, Кременчуцьке водосховище, Канівський заповідник, Україна.

STRUCTURAL-FUNCTIONAL ORGANIZATION OF THE LITTORAL ZOOPLANKTON COMMUNITIES OF THE KREMENCHUTSKIY RESERVOIR

Z. Burian, ke7sha1991@gmail.com, ESC "Institute of Biology and Medicine", Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

V. Gandziura, gandzyura@gmail.com, ESC "Institute of Biology and Medicine", Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

V. Trokhymets, realwolf@univ.kiev.ua, ESC "Institute of Biology and Medicine", Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Purpose. To find out the present state of the structural and functional organization of the littoral zooplankton communities of the upper Kremenchuk reservoir in the area of the Kaniv Nature Reserve.

Methodology. The material was collected in the summer time of 2016 at six stations of the littoral zone of the upper Kremenchug reservoir. The collection and analysis were carried out using generally accepted methods. The objects of the research were representatives of three main groups of zooplankton (rotifers, cladocerans, copepods), as well as ostracods and larvae of bivalve molluscs. Statistical data processing was done in MS Excel 2013.

Findings. The results of the study represent the present state and organisation of littoral zooplankton. The species richness of the littoral zooplankton of the upper Kremenchug reservoir was presented by 48 species. There are 20 species of monogonont rotifers, 18 cladocerans species and copepods – 10. The representatives of the rotifer-cladoceran complex dominated in the taxonomic composition that can be explained by the preservation of the river regime and the rheophilic conditions in this part of the reservoir. The analysis showed that according to the ecological spectrum of zooplankton groups, the representatives of the pelagic group dominated – 47.92%. As for the feeding type, the largest share was represented by the non-predatory group – 64.58%. After analyzing of the quantitative indices (density and biomass) of zooplankton, it was found that they were lower than average for overgrown biotopes ($112580 \pm 129914 \text{ ind./m}^3$ i $1.83 \pm 2.07 \text{ g/m}^3$) and low for open water ($26160 \pm 19161 \text{ ind./m}^3$ i $0,82 \pm 0,86 \text{ g/m}^3$).

Originality. The present state of structural and functional organization of the littoral zooplankton communities of the upper Kremenchug reservoir has been revealed.

Practical significance. The conducted studies give the information about the structural and functional organization of the littoral zooplankton groups of the upper Kremenchug reservoir in the Kaniv Nature Reserve region that allows predicting further changes in zooplankton communities, assessment of the ecosystem and the calculation of the natural feed supply for juvenile fish.

Keywords: structural and functional organization, group, littoral zooplankton, Kremenchug reservoir, Kaniv Nature Reserve, Ukraine.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Промислова діяльність людини безпосередньо та опосередковано впливає на природні екосистеми, спричиняючи їх масштабні трансформацію та перебудову. При вивченні сучасного стану екосистем особливе місце займають водні екосистеми, які характеризуються значним рівнем антропогенного навантаження: забруднення поверхневих і підземних вод, осушення водойм, перетворення річок на водосховища тощо [1]. Все це викликає помітну зміну їх гідрологічних і гідрохімічних умов, впливає на стан різних таксономічних і екологічних груп гідробіонтів, якісні і кількісні зміни угруповань та сприяє виробленню пристосувальних особливостей до змін умов середовища існування [2–4]. Прикладом таких перебудов є річка Дніпро, на акваторії якої побудовано низку гідроелектростанцій (ГЕС), що перетворило її русло на каскад водосховищ [5].

Особливу увагу привертає евтрофне Кременчуцьке водосховище, яке створене та заповнене протягом 1959–1961 рр., є одним із найбільших серед дніпровського каскаду та межує з Канівським природним заповідником. Зоопланктон належить до однієї з фонових екологічних груп гідробіонтів-біоіндикаторів цього водосховища, а також займає важливе місце у трофічних ланцюгах водних екосистем, оскільки є основною кормовою базою молоді риб та риб-планктофагів [6, 7]. Вивченню літорального зоопланктону Кременчуцького водосховища приділяли значну увагу, що висвітлено у багатьох працях [6–14]. Протягом 1960–1985 рр. вчені-гідробіологи зареєстрували 119 видів зоопланктону. Літоральний зоопланктон верхів'я Кременчуцького водосховища в районі Канівського заповідника не вивчали протягом останніх трьох років [1, 15].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Антропогенне навантаження на гідроекосистему водосховища викликає істотні трансформації угруповань зоопланктону, що відображається і на рибопродуктивності, яка формується за його рахунок [9]. Дослідження зоопланктону особливо важливі для акваторій, у межах яких раніше їх не проводили, а також тих, які межують із заповідними територіями, оскільки саме в таких водоймах можна прослідкувати динаміку змін угруповань в залежності від рівня антропогенного навантаження.

З огляду на те, що дослідження літорального зоопланктону верхів'я Кременчуцького водосховища не проводились протягом останніх трьох років, важливо з'ясувати сучасний стан зоопланктону, що має стати точкою відліку для оцінки його подальших змін в умовах істотних трансформацій екосистем водосховищ, що конче необхідно як для прогнозування подальших змін стану екосистем, так і оцінки його ролі в кормовій базі риб.

Метою роботи було з'ясування сучасного стану структурно-функціональної організації угруповань літорального зоопланктону верхів'я Кременчуцького водосховища в районі Канівського заповідника.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Об'єктами дослідження були представники трьох основних груп зоопланктону: коловертки (клас *Eurotatoria*), гіллястовусі ракоподібні (клас *Branchiopoda*, ряд *Cladocera*), різні вікові стадії розвитку веслоногих ракоподібних (клас *Copepoda*), а також черепашкові ракоподібні (клас *Ostracoda*) та личинки двостулкових молюсків (клас *Bivalvia*). Основні групи визначали до виду, бделоїдних коловерток (підклас *Bdelloidea*), черепашкових ракоподібних та личинок двостулкових молюсків — до надвидового рангу вищих таксономічних груп.

Матеріалом послуговував зоопланктон, зібраний протягом світлої частини доби влітку 2016 р. в межах шести дослідних станцій літоралі верхів'я Кременчуцького водосховища в районі Канівського природного заповідника: I — N 49°43.854' E 31°31.360', II — N 49°43.496' E 31°32.130', III — N 49°44.269' E 31°31.508', IV — N 49°44.296' E 31°32.027', V — N 49°43.699' E 31°32.549', VI — N 49°43.245' E 31°33.035' (рис. 1). Вивчали літоральний зоопланктон в межах зарослих біотопів (формації вищих водяних рослин): очерету звичайного (*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., 1841), елодеї канадської (*Elodea*

canadensis Michx. 1803) і на чистоводді. Збір, обробку та опрацювання матеріалу проводили згідно загальновідомих методик [16–23]. Всього зібрано та проаналізовано 12 проб. Статистичне опрацювання даних здійснювалось у програмі MS Excel 2013.

Рис. 1. Станції (I–VI) відбору проб літорального зоопланктону верхів'я Кременчуцького водосховища в районі Канівського заповідника

Fig. 1. Sampling stations (I–VI) of littoral zooplankton in the upper Kremenchuk reservoir in the area of the Kaniv nature reserve

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

В межах літоральної зони верхів'я Кременчуцького водосховища літній зоопланктон характеризувався середніми показниками видового багатства, яке нараховувало 48 видів.

Коловертки були представлені 20 видами: *Asplanchna priodonta* Gosse, 1850; *A. sieboldii* (Leydig, 1854); *Brachionus calyciflorus* Pallas, 1766; *Br. diversicornis* Daday, 1883; *Br. quadridentatus* Hermann, 1783; *Euchlanis deflexa* Gosse, 1851; *E. dilatata* Ehrenberg, 1832; *E. lyra* Hudson, 1886; *E. oropha* Gosse, 1887; *Lecane luna* O. F. Müller, 1776; *Platytas quadricornis* Ehrenberg, 1832; *Ploesoma hudsoni* Imhof, 1891; *Pl. truncatum* Levander, 1894; *Polyarthra dolicoptera* Idelson, 1925; *P. vulgaris* Carlin, 1943; *Ptygura melicerta* Ehrenberg, 1832; *Synchaeta pectinata* Ehrenberg, 1832; *S. stylata* Wierzejski, 1893; *Testudinella patina* Hermann, 1783; *Trichotria pocillum* O. F. Müller, 1776 і *Bdelloidea* Hudson, 1884.

Гіллястовусі ракоподібні нараховували 18 видів: *Acroperus harpae* Baird 1834; *Bosmina longirostris* O. F. Müller, 1776; *Camptocercus rectirostris* Schoedler, 1862; *Cercopagis pengoi* Ostroumov, 1891; *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg, 1900; *Chydorus piger* Sars, 1862; *Ch. sphaericus* O. F. Müller, 1785; *Corniger maeoticus* Pengo, 1879; *Diaphanosoma brachyurum* Lievin, 1848; *Disparalona rostrata* Koch, 1841; *Eurycercus lamellatus* O. F. Müller, 1776; *Graptoleberis testudinaria* Fischer, 1848; *Moina rectirostris* Leydig, 1860; *Pleuroxus aduncus* Jurine, 1820; *Polyphemus pediculus* Linnaeus, 1761; *Scapholeberis mucronata* O. F. Müller, 1776; *Sida crystalline* O. F. Müller, 1776; *Simocephalus vetulus* O. F. Müller, 1776.

Веслоногі ракоподібні були представлені 10 видами: *Acanthocyclops americanus* Marsh, 1893; *Diacyclops bicuspidatus* Claus, 1857; *Eucyclops denticulatus* Graeter, 1903; *E. serrulatus* Fischer, 1851; *Macrocyclops albidus* Jurine, 1820; *Mesocyclops leuckarti* Claus, 1857; *Thermocyclops crassus* Fischer, 1853; *Eurytemora affinis* Poppe, 1880; *E. velox* Lilljeborg, 1853; *Heterocope caspia* Sars, 1897.

За таксономічним спектром в угрупованнях зоопланктону переважав ротаторно-кладоцерний комплекс, що обумовлено збереженням у верхів'ї Кременчуцького водосховища річкового режиму.

Видове багатство літорального зоопланктону водосховища характеризувалось наявністю трьох класів, п'яти рядів, 17 родин і 36 родів. Моногононтичних коловерток — до двох рядів (*Ploima*, *Flosculariaceae*), 8 родин і 11 родів (табл. 1). Високими показниками видового складу характеризувались родини *Synchaetidae* (6 видів), *Euchlanidae* (4) та *Brachionidae* (4). Гіллястовусі ракоподібні належали до 7 родин і 17 родів. Найбільш численні за видовою представленістю були родини *Daphniidae* (4 види) і *Chydoridae* (8). Веслоногі ракоподібні, що об'єднують в собі два ряди (*Calanoida*, *Cyclopoida*) були представлені у водосховищі 2 родинами і 8 родами. Родина *Cyclopidae* нараховувала 7 видів.

Таблиця 1. Таксономічний склад літорального зоопланктону верхів'я Кременчуцького водосховища, літо 2016 р.

Tab. 1. Taxonomic composition of the littoral zooplankton in the upper Kremenchuk reservoir, summer 2016

Класи / Class	Ряди / Order	Родини / Family	Роди (кількість видів) / Genus (number of species)
<i>Eurotatoria</i>	<i>Ploima</i>	<i>Synchaetidae</i>	<i>Synchaeta</i> (2), <i>Polyarthra</i> (2), <i>Ploesoma</i> (2)
		<i>Asplanchnidae</i>	<i>Asplanchna</i> (2)
		<i>Lecanidae</i>	<i>Lecane</i> (1)
		<i>Euchlanidae</i>	<i>Euchlanis</i> (4)
		<i>Brachionidae</i>	<i>Brachionus</i> (3), <i>Platytias</i> (1)
		<i>Trichotriidae</i>	<i>Trichotria</i> (1)
	<i>Flosculariaceae</i>	<i>Testudinellidae</i>	<i>Testudinella</i> (1)
		<i>Flosculariidae</i>	<i>Ptygura</i> (1)
<i>Branchiopoda</i>	<i>Cladocera</i>	<i>Sididae</i>	<i>Diaphanosoma</i> (1), <i>Sida</i> (1)
		<i>Daphniidae</i>	<i>Simocephalus</i> (1), <i>Moina</i> (1), <i>Ceriodaphnia</i> (1), <i>Scapholeberis</i> (1)
		<i>Cercopagididae</i>	<i>Cercopagis</i> (1)
		<i>Podonidae</i>	<i>Corniger</i> (1)
		<i>Chydoridae</i>	<i>Acroperus</i> (1), <i>Graptoleberis</i> (1), <i>Chydorus</i> (2), <i>Eurycercus</i> (1), <i>Pleuroxus</i> (1), <i>Camptocercus</i> (1), <i>Disparalona</i> (1)
		<i>Bosminidae</i>	<i>Bosmina</i> (1)
		<i>Polyphemidae</i>	<i>Polyphemus</i> (1)
<i>Copepoda</i>	<i>Calanoida</i>	<i>Temoridae</i>	<i>Eurytemora</i> (2), <i>Heterocope</i> (1)
	<i>Cyclopoida</i>	<i>Cyclopidae</i>	<i>Macrocyclops</i> (1), <i>Eucyclops</i> (2), <i>Acanthocyclops</i> (1), <i>Diacyclops</i> (1), <i>Mesocyclops</i> (1), <i>Thermocyclops</i> (1)

Схожість видового складу зоопланктону різних біотопів дослідних станцій (за індексом Жаккара) характеризувалась невисокою подібністю — $J = < 44,44\%$. Низькі показники зумовлені утворенням у літній період більш складних формацій вищих водяних рослин, які створюють більше різноманіття умов існування, що і призводить до зростання різноманіття літорального зоопланктону у зарослому біотопі.

Літоральний зоопланктон характеризувався значним різноманіттям, у його складі було відмічено представників трьох екологічних груп: пелагічної — 23 види із 48, або 47,92%, фітофільної — 18 (37,50%) та придонної — 7 (14,58%). Серед коловороток переважала пелагічна група — 10 видів із 20 (50%), гіллястовусих — фітофільна — 10 із 18 (55,56%), веслоногих — пелагічна — 6 із 10 (60%). Домінування пелагічної групи пояснюється тим, що у верхів'ї водосховища зберігається річковий режим і наявна сильна течія, внаслідок чого відбувається перемішування різних шарів води.

Також види літорального зоопланктону розрізняють за типом живлення та відносять до трьох трофічних груп: всеїдні — 8 (16,68%), мирні — 31 (64,58%) і хижаки — 9 (18,75%). Значну частку серед коловороток — 16 видів із 20 (80%) і гіллястовусих ракоподібних — 15 із 18 (83,33%) склали представники мирної групи. Веслоногі ракоподібні представлені всеїдними — 5 (50%) і хижими — 5 (50%) видами.

За загальноприйнятою класифікацією [16], показники щільності зоопланктону для зарослих біотопів верхів'я Кременчуцького водосховища були нижчі середніх (112580 ± 129914 екз./м³), а на чистоводді вони характеризувались як низькі (26160 ± 19161 екз./м³).

За щільністю у зарослих біотопах водосховища в залежності від станції дослідження переважали представники коловороток та веслоногих ракоподібних (рис. 2).

Коловертки переважали за чисельністю в межах дослідних станцій II — 48,08 % (90000 із сумарних 187200 екз./м³) та III — 45,65 % (75600 із 165600 екз./м³). На станції IV за щільністю переважали дві групи зоопланктону — копеподи (114400 екз./м³) і коловертки (104800 із сумарних 300000 екз./м³). В межах станцій I, V та VI високу щільність формували веслоногі ракоподібні, яка варіювала від 3120 до 5400 екз./м³ із сумарних $6480 - 12000$ екз./м³ (рис. 2).

На чистоводді за щільністю в залежності від станції дослідження водосховища переважали різні групи зоопланктону (рис. 2). Так, на станції IV за щільністю домінували коловертки, складаючи 68,97% (4000 із 5800 екз./м³). Гіллястовусі ракоподібні високу чисельність формували на станції II — 25020 із 48020 екз./м³, або 52,10%, і V — 10080 із 24000 екз./м³, або 42,00%. Веслоногі переважали на станції I (2240 із 3840 екз./м³) і IV (21900 із 35700 екз./м³). На станції III при домінуванні веслоногих ракоподібних — 13800 екз./м³ за щільністю також високих показників набули і коловертки — 13200 із 39600 екз./м³.

На деяких досліджених нами біотопах спостерігалось суттєве домінування одного чи декількох видів. Так, зарослий біотоп станції II характеризувався олігодомінантністю коловоротки *Euchlanis dilatata*, щільність якої склала 76800 екз./м³, або 41%.

Рис. 2. Щільність (N) літорального зоопланктону верхів'я Кременчуцького водосховища в районі Канівського заповідника

* Примітка: З — зарослий біотоп, Н — чистоводдя; I–VI — станції відбору проб.

Fig. 2. Density (N) of the littoral zooplankton in the upper Kremenchuk reservoir in the area of the Kaniv nature reserve

* Notes: O — overgrown biotope, NO — not overgrown biotope, I–VI — research stations

У незарослому біотопі прослідковувалась мезодомінантність, переважали представники коловерток — *Asplanchna priodonta* — 14500 екз./м³ (30,19%) та гіллястовусих — *Corniger maeoticus* — 22500 екз./м³ (46,86%). На станції III зарослого біотопу домінантним видом був *E. dilatata*, на частку якого припало 41,3% (68400 екз./м³). В межах зарослого біотопу станції IV з показниками щільності 96800 екз./м³ (32,26%) та на чистоводді станції VI — 3800 екз./м³ (65,51%) переважала також коловертка *E. dilatata*. Для інших дослідних станцій характерна відсутність домінування окремих видів зоопланктону.

Біомаса літорального зоопланктону, згідно загальноприйнятої класифікації [16], для зарослих біотопів була нижча середньої ($1,83 \pm 2,07$ г/м³) та низькою ($0,82 \pm 0,86$ г/м³) для чистоводдя.

Гіллястовусі та веслоногі ракоподібні за біомасою переважали на обох біотопах (рис. 3). В заростях вищих водних рослин станцій I, IV та VI високі показники біомаси формували представники групи гіллястовусих ракоподібних, які варіювали від 0,05760 до 2,54000 із 0,10032–4,53160 г/м³. На інших трьох станціях переважала група веслоногих, біомаса яких коливалася в межах 0,01900–2,05800 із 0,04100–3,59172 г/м³. На чистоводді станцій II, III та V переважали гіллястовусі ракоподібні, біомаса яких варіювала від 70,17 до 78,37% (0,95700–1,17600 із 1,36372–1,500552 г/м³), а веслоногі — на станціях I та IV (0,02670 із 0,03776 і 0,15450 із 0,17730 г/м³). Як виключення, на станції VI домінували представники коловерток (0,00800) та гіллястовусих (0,00800 із 0,04060 г/м³).

За біомасою у зарослому біотопі станції I домінував *Scapholeberis mucronata* — 0,048 г/м³ (47,87%). Значну частку у заростях вищих водних рослин станції II формував *Eucyclops serrulatus* — 44,10% (1,584 г/м³), а на чистоводді — *Corniger maeoticus* — 62,72% (1,125 г/м³). У незарослому біотопі станції III домінували два представники зоопланктону — *Eurycercus lamellatus* — 33,00% (0,45 г/м³) і *Simocephalus vetulus* — 30,79% (0,42 г/м³). Для зарослого біотопу станції IV домінантним видом була *Sida crystallina* — 31,77% (1,44 г/м³). У межах

чистоводдя станції V з високим показником біомаси — 60,77% (0,912 г/м³) та заростей вищих водяних рослин станції VI — 52,33% (0,12 г/м³) домінував *S. vetulus*. Для інших дослідних станцій та біотопів характерна відсутність домінування окремих видів зоопланктону.

Рис. 3. Біомаса (B) літорального зоопланктону верхів'я Кременчуцького водосховища в межах Канівського заповідника

* Примітка: З — зарослий біотоп, Н — чистоводдя; I–VI — станції відбору проб.

Fig. 3. Biomass (B) of the littoral zooplankton in the upper Kremenchuk reservoir in the area of the Kaniv nature reserve

* Notes: O – overgrown biotope, NO – not overgrown biotope, I–VI — research stations

Схожість (за індексом Жаккара) видів-домінантів у різних біотопах дослідних станцій за щільністю і біомасою відсутня ($J = 0$). Це означає, що в межах різних біотопів домінували представники різних видів.

Інші групи зоопланктону мали незначні показники щільності та біомаси. Черепашкові ракоподібні не зареєстровані на жодній із станцій. Щільність личинок двостулкових молюсків варіювала від 160 до 1200 екз./м³, а біомаса — 0,00048–0,0036 г/м³.

Кількісні показники для верхів'я водосховища були нижче середніх і низькі, що корелює із середнім видовим багатством літорального зоопланктону. Для стабільних водойм є нормою невисокі показники щільності та біомаси. Домінування за біомасою гіллястовусих і веслоногих ракоподібних значною мірою обумовлено їх високою індивідуальною масою.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Літоральний зоопланктон верхів'я Кременчуцького водосховища в районі Канівського природного заповідника був представлений 48 видами: коловертки — 20, гіллястовуси — 18 і веслоногі ракоподібні — 10. За таксономічним складом переважали представники ротаторно-клагоцерного комплексу. За екологічним спектром в угрупованнях зоопланктону переважали представники пелагічної групи — 23 (47,92%), за типом живлення — мирні зоопланктери — 31 (64,58%). Щільність і біомаса зоопланктону зарослих біотопів була нижча середньої (112580 ± 129914 екз./м³ і $1,83 \pm 2,07$ г/м³), а на чистоводді — низька (26160 ± 19161 екз./м³ і $0,82 \pm 0,86$ г/м³).

Перспективність проведених досліджень обумовлена роллю даних груп

зоопланктону в трофічних ланцюгах і мережах як важливого компонента раціону молоді риб і невід'ємної складової досліджених екосистем. За складом, кількісним розвитком зоопланктону та динамікою цих показників у часі можна здійснювати діагностику стану гідроекосистем та прогнозувати ступінь розвитку кормової бази молоді риб.

ЛІТЕРАТУРА

1. Трохимець В. М., Алексієнко В. Р. Розподіл та поведінка прибережної зони Кременчуцького та Канівського водосховищ // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2002. Вип. 36. С. 61—63. (Серія «Біологія»).
2. Еколого-фауністичний аналіз літорального зоопланктону Олесандрівського водосховища / Трохимець В. М. та ін. // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2012. Вип. 17. С. 171—174. (Серія «Біологія»).
3. Бур'ян З. В., Подобайло А. В., Трохимець В. М. Анотований список видів літорального зоопланктону різнотипних водойм-об'єктів природно-заповідного фонду України в межах Середнього Подніпров'я // Заповідна справа. 2016. Вип. 1 (22). С. 68—72.
4. Burian Z., Trokhymets V. Structural and faunistic organization of the Uday river's littoral zooplankton in the National Nature Park «Pyriatynskiy» // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2016. Вип. 2 (72). С. 56—59. (Серія «Біологія»).
5. Мішина Л. Гідрографічне дослідження річки Дніпро: минуле, сучасне, майбутнє // Вісник держгідрографії. 2006. № 1. С. 9—14.
6. Продуктивность планктонных сообществ на разных трофических уровнях в Кременчугском водохранилище / Приймаченко А. Д. и др. // Гидробиологический журнал. 1978. Т. 14, № 4. С. 3—13.
7. Богданова Л. Н. Характеристика зоопланктону Кременчуцького водосховища // Рибе господарство. 1993. Вип. 47. С. 58—60.
8. Зимбалева Л. Н. Литоральный зоопланктон // Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ. Киев : Наукова думка, 1989. С. 5—21.
9. Кружиліна С. В., Діденко О. В. Структурно-функціональні характеристики зоопланктону Кременчуцького водосховища в сучасний період та його взаємозв'язки з деякими компонентами фітопланктону // Рибогосподарська наука України. 2007. № 2. С. 71—76.
10. Підгайко М. Л. Прибрежный зоопланктон в условиях «цветения» воды в Кременчугском водохранилище // Гидробиологический журнал. 1969. Т. 5, № 3. С. 26—34.
11. Владимирова К. С., Зимбалева Л. Н., Пикуш Н. В. Мелководья Кременчугского водохранилища. Киев : Наукова думка, 1979. 284 с.
12. Трохимець В. М. Методика комплексних моніторингових досліджень гідробіонтів у водоймах різного типу // Рибогосподарська наука України. 2011. № 1. С. 16—23.
13. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : ЛОГОС, 2006. 408 с.
14. Березина Н. А. Практикум по гидробиологии. Москва : Агропромиздат, 1989. 208 с.
15. Боруцкий Е. В., Степанова Л. А., Кос М. С. Определитель *Calanoida* пресных вод СССР. Ленинград : Наука, 1991. 504 с.

16. Жадин В. Н. Методы гидробиологического исследования. Москва : Высшая школа, 1960. 192 с.
17. Мануйлова Е. Ф. Ветвистоусые рачки (*Cladocera*) фауны СССР. Москва ; Ленинград : Наука, 1964. 327 с.
18. Монченко В. И. Вольноживущие циклоповидные копеподы Понто-Каспийского бассейна. Киев : Наукова думка, 2003. 351 с.
19. Песенко Ю. А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. Москва : Наука, 1982. 287 с.
20. Кутикова Л. А. Коловатки фауны СССР. Ленинград : Наука, 1970. 744 с.

REFERENCES

1. Trokhymets', V. M., & Alekseyenko, V. R. (2002). Rozpodil ta povedinka pryberezhnoyi zony Kremenchuts'koho ta Kanivs'koho vodoskhovyshch. *Visnyk Kyiv's'koho natsional'noho universytetu im. T. Shevchenka. Seriya «Biolohiya»*, 36, 61-63.
2. Trokhymets', V. M., Buryan, Z. V., Marchenko, I. S., Bohun, Zh. O. Sydorenko, M. V., & Fesyanyov, B. P. (2012). Ekoloho-faunistychnyy analiz litoral'noho zooplanktonu Oleskandriivs'koho vodoskhovyshcha. *Visnyk Prykarpats'koho natsional'noho universytetu imeni Vasylya Stefanyka. Seriya «Biolohiya»*, 17, 171-174.
3. Buryan, Z. V., Podobaylo, A. V., & Trokhymets', V. M. (2016). Anotovanyy spysok vydiv litoral'noho zooplanktonu riznotypnykh vodoym ob'yektiv pryrodno-zapovidnoho fondu Ukrayiny v mezhakh Seredn'oho Podniprov'ya. *Zapovidna sprava*, 1(22), 68-72.
4. Burian, Z., & Trokhymets, V. (2016). Structural and faunistic organization of the Uday river's littoral zooplankton in the National Nature Park "Pyriatynskiy". *Visnyk Kyiv's'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya «Biolohiya»*, 2 (72), 56-59.
5. Mishyna, L. (2006). Hidrografichne doslidzhennya richky Dnipro: mynule, suchasne, maybutnye. *Visnyk derzhhidrografiyi*, 1, 9-14.
6. Priymachenko, A. D., Mikhaylenko, L. E., Gusinskaya, S. L., & Nebrat, A. A. (1978). Produktivnost' planktonnykh soobshchestv na raznykh troficheskikh urovnnyakh v Kremenchugskom vodokhranilishche. *Gidrobiologicheskyy zhurnal*, 14(4), 3-13.
7. Bohdanova, L. N. (1993). Kharakterystyka zooplanktonu Kremenchuts'koho vodoskhovyshcha. *Rybne hospodarstvo*, 47, 58-60.
8. Zimbalevskaya, L. N. (1989). Litoral'nyy zooplankton. *Bespozvonochnye i ryby Dnepra i ego vodokhranilishch*. Kiev: Naukova dumka, 5-21.
9. Kruzhylina, S. V., & Didenko, O. V. (2007). Strukturno-funktsional'ni kharakterystyky zooplanktonu Kremenchuts'koho vodoskhovyshcha v suchasnyy period ta yoho vzayemoz'yazky z deyakymy komponentamy fitoplanktonu. *Rybohospodars'ka nauka Ukrayiny*, 2, 71-76.
10. Pidgayko, M. L. (1969). Pribrezhnyy zooplankton v usloviyakh «tsveteniya» vody v Kremenchugskom vodokhranilishche. *Gidrobiologicheskyy zhurnal*, 5(3), 26-34.
11. Vladimirova, K. S., Zimbalevskaya, L. N., & Pikush, N. V. (1979). *Melkovod'ya Kremenchugskogo vodokhranilishcha*. Kiev: Naukova dumka.
12. Trokhymets', V. M. (2011). Metody kompleksnykh monitorynhovykh doslidzhen' hidrobiontiv u vodoymakh riznogo typu. *Rybohospodars'ka nauka Ukrayiny*, 1, 16-23.
13. Arsan, O. M., Davydov, O. A., Diachenko, T. M., Yevtushenko, M. Y., & Zhukins'kiy, V. M. (2006). *Metody hidroekologichnykh doslidzhen poverkhnevyykh vod*. Romanenko V. D. (Ed.). Kyiv: LOHOS.
14. Berezina, N. A. (1989). *Praktikum po gidrobiologii*. Moskva: Agropromizdat.

15. Borutskiy, E. V., Stepanova, L. A., & Kos, M. S. (1991). *Opredelitel' Calanoida presnykh vod SSSR*. Leningrad: Nauka.
16. Zhadin, V. N. (1960). *Metody gidrobiologicheskogo issledovaniya*. Moskva: Vysshaya shkola.
17. Manuylova, E. F. (1964). *Vetvistousye rachki (Cladocera) fauny SSSR*. Moskva; Leningrad: Nauka.
18. Monchenko, V. I. (2003). *Vol'nozhivushchie tsiklopovidnye kopepody Ponto-Kaspiys'kogo basseyna*. Kiev: Naukova dumka.
19. Pesenko, Yu. A. (1982). *Printsipy i metody kolichestvennogo analiza v faunisticheskikh issledovaniyakh*. Moskva: Nauka.
20. Kutikova, L. A. (1970). *Kolovratki fauny SSSR*. Leningrad: Nauka.

**СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СООБЩЕСТВ
ЛИТОРАЛЬНОГО ЗООПЛАНКТОНА ВЕРХОВЬЯ
КРЕМЕНЧУГСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА**

З. В. Бурьян, ke7sha1991@gmail.com, УНЦ «Институт биологии и медицины», КНУ им. Тараса Шевченко, г. Киев

В. П. Гандзюра, gandzyura@gmail.com, УНЦ «Институт биологии и медицины», КНУ им. Тараса Шевченко, г. Киев

В. Н. Трохимец, realwolf@univ.kiev.ua, УНЦ «Институт биологии и медицины», КНУ им. Тараса Шевченко, г. Киев

Цель. Выяснить современное состояние структурно-функциональной организации сообществ литорального зоопланктона верховья Кременчугского водохранилища в районе Каневского заповедника.

Методика. Материал отобран в летний период 2016 г. в пределах шести исследовательских станций литорали верховья Кременчугского водохранилища. Сбор и анализ проводился на основе общепринятых методик. Объектами исследований были представители трех основных групп зоопланктона (коловратки, ветвистоусые и веслоногие ракообразные), а также ракушковые ракообразные и личинки двустворчатых моллюсков. Статистическая обработка данных осуществлялась в программе MS Excel 2013.

Результаты. Представлены результаты исследований современного состояния видового богатства литорального зоопланктона верховья Кременчугского водохранилища, которое насчитывало 48 видов. Коловраток зарегистрировано 20 видов, ветвистоусых ракообразных — 18 и веслоногих — 10. Установлено, что по таксономическому составу преобладали представители ротаторно-клядоцерного комплекса, что объясняется сохранением в водохранилище речного режима и реофильных условий. В ходе анализа выявлено, что по экологическому спектру сообществ зоопланктона преобладали представители пелагической группы — 47,92%, по типу питания — мирные зоопланктеры — 64,58%. Проанализировав количественные показатели (плотность и биомасса) зоопланктона, установили, что для заросших биотопов они были ниже средних (112580 ± 129914 экз./м³ и $1,83 \pm 2,07$ г/м³), а для чистоводья — низкие (26160 ± 19161 экз./м³ и $0,82 \pm 0,86$ г/м³).

Научная новизна. Выяснено современное состояние структурно-функциональной организации сообществ литорального зоопланктона верховья Кременчугского водохранилища.

Практическая значимость. Проведенные исследования дают представление о структурно-функциональной организации сообществ литорального зоопланктона верховья Кременчугского водохранилища в районе Каневского заповедника, давая возможность прогнозирования дальнейших изменений сообществ зоопланктона, оценки состояния экосистем и расчета кормовой базы молоди рыб.

Ключевые слова: структурно-функциональная организация, сообщество, литоральный зоопланктон, водохранилище, Каневский заповедник, Украина.

ВПЛИВ АМОНІАКУ НА ФОРМУВАННЯ ТОКСИЧНОСТІ ВОД ПОВЕРХНЕВИХ ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВИЗНАЧЕНОЇ НА *CARASSIUS AURATUS GIBELIO* (BLOCH, 1782)

Е. О. Аристархова, ella.aryst@gmail.com, Інститут агроекології і
природокористування НААН, м. Київ

Мета. Виявлення впливу амоніаку у водах поверхневих джерел водопостачання м. Житомира на формування токсичності цих вод, визначеної за тест-реакціями нетипової рухової активності карася сріблястого *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) з використанням методу «time sampling» впродовж 2012–2014 рр.

Методика. Для біотестування на КП «Житомирводоканал» у період досліджень один раз на місяць відбирали водні проби об'ємом 8 дм³ на групу з водосховищ р. Тетерів та водопровідної мережі водоканалу, які переливали у акваріуми (10 дм³) і формували контрольну та дослідні групи за наступною схемою: контрольна група — проби відстояної (24 год) водопровідної води; дослідна група Д-1 — проби води з водосховища Денишівського; дослідна група Д-2 — проби води з водозабору Відсічне. Тест-об'єкти — самиці карася сріблястого. Біотестування проводили методом «time sampling» з експонуванням особин протягом 12 год ($n = 30$). Індекси токсичності вод розраховували за наступними тест-реакціями: спіралеподібні та векторні рухи, вистрибування з води, іммобілізація та загибель особин. Для статистичної обробки результатів досліджень використовували кореляційний і регресійний аналіз за програмами Microsoft Office Excel 2007 та Statistica-6.

Результати. У дослідженнях виявлено вплив амоніаку на токсичність вод водосховищ р. Тетерів, визначену за показниками нетипової рухової активності карася сріблястого з використанням методу «time sampling», який полягає у миттєвій фіксації кількості особин, що надають перевагу тому чи іншому акту поведінки. Показано, що неадаптовані до дії амоніаку самиці карася сріблястого реагували на його концентрацію у воді понад 0,55 мг/дм³ порушенням рухливості. На відміну від риб дослідних груп, у особин контрольної групи були виявлені лише поодинокі нетипові рухові акти. Між вмістом амоніаку у водах поверхневих джерел водопостачання та токсичністю цих вод у 2012 р. визначено позитивний кореляційний зв'язок середнього ступеня, який мав тенденцію до посилення, і у 2014 р. досяг сильного ступеня ($r = 0,6773$ — у водосховищі Денишівському та $r = 0,6685$ — у водозаборі Відсічне). Побудовані за отриманими даними рівняння прямолінійної регресії дозволяють прогнозувати окремо для водосховища і водозабору токсичність поверхневих вод за концентрацією у них амоніаку.

Наукова новизна. Вперше виявлена залежність токсичності вод поверхневих джерел водопостачання м. Житомира, що була визначена методом «time sampling» з використанням тест-реакцій нетипової рухової активності карася сріблястого (*C. auratus gibelio*), від вмісту амоніаку у цих водах. За наведеними рівняннями прямолінійної регресії визначено небезпечну межу концентрації амоніаку (0,58 мг/дм³), за якої досягається 50%-ва токсичність вод по відношенню до карася сріблястого.

Практична значимість. Результати досліджень використовуються для проведення біологічного моніторингу токсичності вод водосховищ р. Тетерів.

Ключові слова: токсичність вод, *C. auratus gibelio*, амоніак, біотестування, нетипова рухова активність, метод «time sampling».

INFLUENCE OF AMMONIA ON FORMING THE TOXICITY OF WATERS FROM THE SURFACE SOURCES OF WATER SUPPLY DETERMINED ON *CARASSIUS AURATUS GIBELIO* (BLOCH, 1782)

E. Arystarkhova, ella.aryst@gmail.com, Institute of Agrarian Ecology and Nature Use NAAS, Kyiv

Purpose. Determination of the influence of ammonia in waters from surface sources of water supply of Zhytomyr city on forming the toxicity of these waters determined by test-reactions of atypical motor activity of *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) with the use of the «time sampling» method during 2012–2014.

Methodology. Biotesting was performed at the Municipal Enterprise "Zhytomyrvodokanal". Water samples were taken once a month time from the Teteriv river reservoirs and tap water network and then placed into aquaria (8 dm³ on a group). Control and experimental groups of fish were formed according to the following scheme: control group — samples of settled (24 hours) tap water; experimental group D-1 — water samples from the Denyshivske reservoir; experimental group D-2 — water samples from the Vidsichne water intake. Test specimens were females of *C. auratus gibelio*. Biotesting was conducted using the «time sampling» method by keeping fish (n=30) in water for 12 hours. The toxicity indexes of waters were calculated on the basis of the following test-reactions: spiral-like and vector movements, jumping out from water, immobilization and death of fish. Statistical processing of study results were performed using cross-correlation and regression analysis in MS Excel 2007 and Statistica-6.

Findings. The study showed an effect of ammonia on the toxicity of waters from reservoirs of the Teteriv river that was determined by atypical motor activity with the use of the «time sampling» method, which consisted in the instantaneous fixation of the number of individuals that favored one or another act of behavior. It was shown that females not adapted to the action of ammonia reacted to its concentration in water of more than 0.55 mg/dm³ by disorders in movements. Unlike fish of experience groups, only single pathological acts were observed in the control group. A positive moderate relationship, which had a tendency to an increase, was found between the ammonium content water of surface sources of water supply and their toxicity in 2012, and it reached high degree in 2014 ($r=0.6773$ in Denyshivske reservoir and $r=0.6685$ in Vidsichne water intake). The linear regression equations built from obtained data allow forecasting the toxicity of surface waters by ammonium concentration separately for the reservoir and water intake.

Originality. Dependence of the toxicity of waters from the surface sources of water supply of Zhytomyr city on ammonium content in these waters was first determined by test-reaction of atypical motor activity of *C. auratus gibelio* with the use of the «time sampling» method. The linear regression equations allowed determining the dangerous threshold of ammonia concentration (0.58 mg/dm³) which resulted in 50% water toxicity for *C. auratus gibelio*.

Practical value. Results of the study are used for biological monitoring of water toxicity of Teteriv river reservoirs.

Keywords: water toxicity, *C. auratus gibelio*, ammonia, biotesting, atypical motor activity, «time sampling» method.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

У водному середовищі внаслідок розщеплення органічних азотвмісних речовин (амоніфікації) утворюється вільний амоніак, який, маючи високу дисоціюючу здатність, розчиняється у воді з утворенням іонів амонію, запускаючи таким чином процес нітрифікації, завдяки якій нейтралізуються токсичні сполуки нітрогену (амоній, нітрити та нітрати). Однак у деяких випадках перетворення амоніаку гальмується, і тоді у водних об'єктах виявляється його

підвищена концентрація, що є індикатором свіжих органічних забруднень і негативно відбивається на якості води та стані водного населення.

У літературі з'являється все більше даних про те, що перевищення ГДК амоніаку, надзвичайно небезпечної для біоти речовини [1–4], стає у останнє десятиліття типовим явищем для поверхневих вод. Доволі часто перевищуються навіть значення нормативів, які обмежують концентрацію амоніаку у воді джерел водопостачання, що є менш жорсткими, ніж для вод культурно-побутового та рибогосподарського призначення. Більшість вчених стурбовані такою ситуацією і перш за все вказують на невідповідність між нормативною базою України та ЄС відносно вмісту амоніаку у воді, призначеній для питного користування [3–6]. Оскільки існує подібне розходження у нормативних показниках, ряд авторів пропонують проводити додаткове оцінювання якості цих вод на представниках хребетних тварин, зокрема на рибах, щодо виявлення негативних впливів вод, забруднених амоніаком, на живі організми [5–9].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Амоніак є вкрай токсичним для більшості видів риб. Одночасно у водному середовищі він розглядається як стрес-фактор, який викликає порушення деяких фізіологічних процесів в організмі риби. За дії його підвищеного вмісту відбувається ураження зябрового епітелію та порушується дихальна функція особин, у системі крові спостерігається гемоліз еритроцитів тощо. У концентрації 0,2–1,0 мг/дм³ амоніак може призводити до летальних наслідків більшості видів риби. Однак у водоймах з підвищеним вмістом амоніаку здатні виживати навіть деякі чутливі до цієї речовини види [4, 6–9]. З одного боку, це пов'язано з особливостями буферної ємності водойм щодо залучення амоніаку у процеси нітрифікації (тобто його знезараження у ланцюзі перетворень від іонів амонію до нітратів та вільного азоту), а з іншого — із здатністю риби адаптуватися до умов забрудненого середовища, у тому числі до присутності у ньому багатьох небезпечних азотистих сполук. Тому, враховуючи зазначені особливості, для біотестування токсичності вод джерел водопостачання доцільно обрати вид риби, який є стійким до амоніаку, щоб запобігти сильному ураженню та швидкій загибелі особин. Таким видом є карась сріблястий *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) — типовий представник поліських водойм. Проте для ефективного проведення досліджень тест-організми, задіяні у них, мають бути неадаптованими до підвищеного вмісту цієї речовини у водному середовищі, щоб за порушеннями рухових актів риби можна було визначити рівні токсичності дослідних вод. Тобто, середовище, у якому здійснюється утримання риби перед проведенням досліджень, повинно бути значно чистішим за дослідне, наприклад, за використання дехлорованої водопровідної води. Це сприятиме не тільки чіткому визначенню рівнів небезпечності вод, але й дозволить з'ясувати, наскільки токсичність цих вод обумовлена вмістом амоніаку. Для підвищення вірогідності отриманих експериментальних даних доцільно проаналізувати їх за тривалий період часу — декілька років.

Відповідно, метою досліджень є виявлення впливу амоніаку у водах поверхневих джерел водопостачання м. Житомира на формування токсичності цих вод, визначеної за тест-реакціями нетипової рухової активності карася сріблястого (*C. auratus gibelio*) з використанням методу «time sampling» впродовж 2012–2014 рр.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Для біотестування сумісно із співробітниками КП «Житомирводоканал» впродовж 2012–2014 рр. один раз на місяць відбирали водні проби у розрахунку 8 дм³ на групу за загальноприйнятою методикою [3–5] з водосховища Денишівського і водозабору Відсічне р. Тетерів, а також водопровідної мережі водоканалу, які переливали у акваріуми (10 дм³) і формували контрольну та дослідні групи за наступною схемою:

- контрольна група — проби відстояної (24 год) водопровідної води;
- дослідна група Д-1 — проби води з водосховища Денишівського;
- дослідна група Д-2 — проби води з водозабору Відсічне.

Тест-об'єкти: самиці карася сріблястого (*C. auratus gibelio*), аналоги за віком (3 тижні).

Утримання: в акваріумах на 10 дм³ води, концентрація кисню у якій не менша ніж 6 мг/дм³, температура +20±2,5°C, водневий показник рН — не нижчий ніж 7,0, а щільність посадки — 1 особина/дм³ в умовах природної освітленості.

Годівля: постійно — рослинами (водорості, листя водних рослин), а на початку кожного тестування — сухим (дафнії) та живим (циклопи, трубочник) тваринним кормом.

Тест-реакції: нетипової рухової активності (спіралеподібні рухи та вистрибування з води, перевага векторних рухів над плавними, іммобілізація та загибель особин).

Експонування: на гостру токсичність (acute toxicity) впродовж 12-ти год.

Біотестування: спостереження за особинами через кожні 4 год методом «time sampling» (тобто миттєва фіксація кількості риб, що надають перевагу певному нетиповому акту поведінки).

Вміст загального амоніаку у воді визначали фотометричним методом з реактивом Неслера, концентрацію розчиненого кисню контролювали оксигенометром, значення водневого показника — рН-метром, температуру — водним термометром.

Експерименти проводили у 3-кратній повторності, використовуючи стандартні методики та власні розробки [3, 5–10].

Отримані у дослідних групах дані порівнювали з контролем. Оскільки значення показників нетипової рухової активності риб були вищими, ніж контрольні, для розрахунку індексу токсичності використовували загальноприйняту формулу [3], видозмінену нами таким чином, що величини тест-реакції особин у контролі та досліді були замінені на протилежні:

$$T = \frac{I_o - I_k}{I_o} 100\%,$$

де: T — індекс токсичності, %;

I_o — величина тест-реакції особин у досліді;

I_k — величина тест-реакції особин у контролі.

На небезпечність вод для живих організмів вказували індекси токсичності, значення яких перевищували 50%.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Однією з причин появи амоніаку у річках і водоймах може бути його присутність у стоках промислового, комунально-побутового та сільськогосподарського походження [1, 9–11]. За умов постійного потрапляння таких стоків у поверхневі води амоніак також часто утворюється з їх азотвмісних складових (білків, амінокислот тощо) безпосередньо у водних об'єктах. Іншою, досить розповсюдженою причиною надходження амоніаку до поверхневих вод є розкладання планктонних водоростей, угруповання яких після інтенсивного росту і нарощування значної біомаси зазнають деструкції. Це призводить до зниження концентрації розчиненого кисню (РК) і спричиняє задухи риби та інших гідробіонтів [12], внаслідок процесів гниття яких вміст амоніаку у воді зростає ще більше. А за комбінування різних джерел, що сприяють зростанню вмісту амоніаку, як це відбувається впродовж багатьох років у водосховищах р. Тетерів, коли одночасно він утворюється з гниючої маси фітопланктону за умов уповільненого руху води та ще й постійно додається із стоками, виникає ситуація, яка вимагає негайного вирішення.

У зв'язку з цим, проведені нами дослідження дозволили виявити силу впливу амоніаку на формування токсичності вод поверхневих джерел водопостачання м. Житомира, визначену за показниками нетипової рухової активності самиць карася сріблястого (*C. auratus gibelio*) з використанням методу «time sampling», а також обґрунтувати на основі отриманих результатів небезпечність присутності у цих водах у межах ГДК амоніаку по відношенню до виду риб, що є стійким до дії токсикантів.

Так, показано, що особини, яких застосовували у тестуванні дослідних проб води, реагували на вміст амоніаку порушенням рухомості, у тому числі виявляли до дії даної речовини специфічні етологічні акти (спіралеподібні рухи та вистрибування з води). Для визначення токсичності дослідних вод за допомогою методу біотестування «time sampling» фіксували відносну кількість особин з проявами нетипової рухової активності, на основі тест-реакцій яких розраховували індекси токсичності.

Основні взаємозв'язки вмісту амоніаку у водах поверхневих джерел водопостачання м. Житомира з індексом токсичності цих вод, визначеним на самицях карася сріблястого, відображено у таблиці 1.

Дані таблиці вказують на наявність позитивної кореляції середнього (впродовж 2012–2013 рр.) та сильного (у 2014 р.) ступенів, що існує між концентрацією амоніаку у водах джерел водопостачання, та токсичністю цих вод, визначеною за тест-реакціями порушення рухомості самиць карася сріблястого. Починаючи з 2012-го і до кінця 2014 р. спостерігалось посилення кореляційного зв'язку між вказаними показниками, яке свідчить про суттєвий вплив амоніаку на формування токсичності вод.

Наявності амоніаку у обох водосховищах р. Тетерів сприяють також деякі фактори середовища. Основним з них є водневий показник (рН), значення якого перевищують 7 од.

Таблиця 1. Кореляційні зв'язки між концентрацією амоніаку у водах поверхневих джерел водопостачання м. Житомира та індексом токсичності цих вод, визначеним на карасі сріблястому (n = 30)

Tab. 1. Correlation between the concentration of ammonia in waters of surface water sources in Zhytomyr and the toxicity index of these waters, determined on a silver carp (n = 30)

Дослідні групи / Experimental groups	Період дослідження, роки / The period of research, years		
	2012	2013	2014
Коефіцієнти кореляції / Correlation coefficients (r)			
Д-1 (водосховище Денишівське / Denishivsky reservoir)	0,6105 ± 0,2505*	0,6245 ± 0,2470*	0,6773 ± 0,2327*
Д-2 (водозабір Відсічне / water intakes Vidsichne)	0,4165 ± 0,2875	0,4962 ± 0,2875	0,6685 ± 0,2352*
Коефіцієнти детермінації / Determination coefficients (R ²)			
Д-1 (водосховище Денишівське / Denishivsky reservoir)	0,3727	0,3900	0,4587
Д-2 (водозабір Відсічне / water intakes Vidsichne)	0,1735	0,2462	0,4469

Примітка. Вірогідність кореляційного зв'язку: * — $p \leq 0,05$.

Notes. Probability of correlation connection: * — $p \leq 0,05$.

Тобто, за таких умов у деякій мірі затримується перетворення амоніаку на амоній у ланцюзі нітрифікації, тому ця речовина своєчасно не піддається детоксикації. І хоча загалом перевищення ГДК амоніаку (2 мг/дм³) у водах водосховищ р. Тетерів у період 2012–2014 рр. не спостерігалось, за отриманими результатами досліджень переконливо доведено, що у певні періоди сезону з підвищенням концентрації амоніаку понад 0,55 мг/дм³ дослідні особини, на відміну від контрольних, знаходились у дискомфортних умовах. Про це свідчить їхня поведінка та розраховані на її основі індекси токсичності, значення яких наближались до 50% або перевищували їх.

Наскільки сильним виявився вплив амоніаку на рівень токсичності вод джерел водопостачання м. Житомира вказують коефіцієнти детермінації (R²), визначені за кожен рік дослідного періоду (табл. 1) та загалом за три роки (рис. 1).

У водосховищі Денишівському частка амоніаку у загальній токсичності вод складала 37,27; 39,00 та 45,87% відповідно у 2012, 2013 та 2014 рр. і 38,50% впродовж трьох років. У водозабір Відсічне цей показник був у 2012-му і 2013-му роках значно нижчим (17,35 і 24,62%) порівняно з водосховищем. Проте тенденція щодо посилення ролі амоніаку у формуванні токсичності вод і у цій водоймі чітко прослідковувалась у 2014-му р. (44,69%), а за три роки залежність токсичності води від амоніаку складала 27,17%.

Взаємозв'язки концентрації амоніаку у водах водосховищ р. Тетерів з

індексами токсичності цих вод описуються рівняннями прямолінійної регресії (рис. 1), що дозволяє прогнозувати коливання загальної токсичності вод, визначеної за тест-реакціями нетипової рухової активності самиць карася сріблястого, відносно змін у воді концентрації амоніаку. За наведеними рівняннями прямолінійної регресії визначено небезпечну межу концентрації амоніаку (0,58 мг/дм³), за якої досягається 50%-ва токсичність вод по відношенню до карася сріблястого.

Рис. 1. Рівняння прямолінійної регресії між концентрацією амоніаку та токсичністю вод, визначеною на карасі сріблястому, у водосховищі Денишівському (А) та водозаборі Відсічне (В) р. Тетерів впродовж 2012–2014 рр.

Fig. 1. The equation of rectilinear regression between the ammonia concentration and the toxicity of water, determined on a silver carp, in the Denishivsky (A) reservoir and the water intakes of Vidsichne (B) river Teterev during 2012–2014.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

У проведених дослідженнях встановлено, що одним із важливих факторів впливу на формування токсичності вод поверхневих джерел водопостачання м. Житомира, визначеної на карасі сріблястому (*C. auratus gibelio*) методом «time

sampling» впродовж 2012–2014 рр., був амоніак, концентрація якого за цей період тим не менш жодного разу не перевищила гранично допустиму норму. Між зазначеними показниками у 2012 р. виявлено позитивний кореляційний зв'язок середнього ступеня, який мав тенденцію до посилення, і у 2014 р. набув найбільших значень (0,6773 — у водосховищі Денишівському та 0,6685 — у водозаборі Відсічне), власне досяг сильного ступеня, що вказує на суттєве підвищення сили впливу амоніаку на токсичність дослідних вод, основною причиною якого, наймовірніше його свіже надходженням у водосховища.

Побудовані за отриманими даними рівняння прямолінійної регресії дозволяють прогнозувати окремо для водосховища і водозабору загальну токсичність поверхневих вод за вмістом у них амоніаку. Відповідно до рівнянь, 50%-ий рівень токсичності водного середовища, який є небезпечним для карася сріблястого, стійкого до токсичних забруднень виду, досягається за концентрації у воді амоніаку 0,58 мг/дм³, що не відповідає нормативному показнику (2,00 мг/дм³). Отже, існуючі в Україні нормативи відносно ГДК амоніаку у водах поверхневих джерел водопостачання необхідно привести у відповідність до нормативної бази ЄС щодо врахування фізіологічних потреб риб та інших гідробіонтів, включаючи більш чутливі види, ніж карась сріблястий.

У подальшому доцільно провести моніторингові дослідження на водних організмах, які виявляють різну чутливість до дії амоніаку для визначення його безпечних рівнів в умовах водосховищ р. Тетерів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Запольський А. К., Шумигай І. В. Охорона питних вод від виснаження і забруднення // Агроекологічний журнал. 2015. № 3. С. 6—5.
2. Malik A., Grohmann E., Akhtar R. Environmental Deterioration and Human Health : Natural and anthropogenic determinants. Dordrecht ; Heidelberg ; London ; New York : Springer, 2014. Р. 8—23.
3. ДСанПіН 2.2.4–171–10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. Київ : МОЗ України, 2010. 50 с. (МОЗ України. Державні санітарні норми та правила).
4. Дудник С. В. Водна токсикологія : метод. посіб. Ч. 2 : Іхтіотоксикологія. Київ, 2014. 108 с.
5. Аристархова Е. О. Експрес-оцінка потенційної небезпеки води методом біотестування на *Daphnia magna* S. // Вісник аграрної науки. 2017. № 2. С. 50—54.
6. КНД 211.1.4.057-97. Методика визначення гострої летальної токсичності води на рибах *Poecilia reticulata* Peters. Київ, 1997. 21 с.
7. ISO 7346-1 : 1996. Water quality. Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [*Brachydanio rerio* Hamilton-Buchanan (*Teleostei, Cyprinidae*)]. Part 1 : Static method. 11 p.
8. Szczerbinska N., Galczyńska M. Biological methods used to assess surface water quality // Arch. Pol. Fish. 2015. Vol. 43. Р. 185—196.
9. Стецюк Л. М. Використання методів біоіндикації та біотестування для оцінки стану водних екосистем // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2013. Вип. 2 (62). С. 175—181. (Сільськогосподарські науки).

10. Комплексна оцінка токсичності водних зразків за допомогою рослинних і тваринних тест-організмів / Осмалений М. С. та ін. // Фактори експериментальної еволюції організмів. 2015. Т. 16. С. 74—77.
11. River watch. Manual for public environmental monitoring. Saint Petersburg : Friends of the Baltics / Coalition Clean Baltics, 2015. 32 p.
12. Jakob U., Reichmann D. Oxidative Stress and Redox Regulation. Dordrecht ; Heidelberg ; London ; New York : Springer, 2013. P. 59—126.

REFERENCES

1. Zapolskyi, A. K., & Shumigay, I. V. (2015). Okhorona vod vid vysnazhennia i sabrudnennia. *Agroecologichnyi zhurnal*, 3, 6-15.
2. Malik, A., Grohmann, E., & Akhtar R. (2014). *Environmental Deterioration and Human Health: Natural and anthropogenic determinants*. Dordrecht; Heidelberg; London; New York: Springer, 8-23.
3. Higiyenichni vymogy do vody pytnoi, prysnachenoї dlya spozhyvannya ludynoiu (2010). *DSanPiN 2.2.4-171-10*. Kyiv: Ministerstvo okhorony sdorovia Ukrainy.
4. Dudnik, S. V. (2014). *Vodna toksykologia : metod. posib.* (Part 2: Ichtiotoksykologia). Kyiv.
5. Arystarkhova, E. O. (2017). Ekspres-otsinka potentsiinoї nebespeky vody metodom biotestuvannia na *Daphnia magna* S. *Visnyk agrarnoi nauky*, 2, 50-54.
6. Metodyka vysnashennia gostroi letalnoi toksyshnosti vody na rybach *Poecilia reticulata* Peters. (1997). *KND 211.1.4.057-97*. Kyiv.
7. Water quality. Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [*Brachydanio rerio* Hamilton-Buchanan (*Teleostei, Cyprinidae*)]. (1996). (Part 1: Static method). *ISO 7346-1:1996*.
8. Szerbinska, N., & Galczyńska, M. (2015). Biological methods used to assess surface water quality. *Arch. Pol. Fish.*, 43, 185-196.
9. Stetsiuk, L. M. (2013). Vykorystannia metodiv bioindycatsii ta biotestuvannia dla otsinky stanu vodnykh system. *Visnyk Nationalnogo universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia*, 2 (62), 175-181.
10. Osmalenyi, M. S., Holovkov, A. M., Nanijeva, A. V., & Vergolas, M. R. (2015). Kompleksna otsinka toksyshnosti vodnykh srazkiv za dopomogou roslынnykh i tvarynnykh test-orhanizmiv. *Faktory eksperymentalnoi evolutsii orhanismiv*, 16, 74-77.
11. River watch. Manual for public environmental monitoring (2015). Saint Petersburg: Friends of the Baltics / Coalition Clean Baltics.
12. Jakob, U., & Reichmann, D. (2013). *Oxidative Stress and Redox Regulation*. Dordrecht; Heidelberg; London; New York: Springer, 59-126.

ВЛИЯНИЕ АММИАКА НА ФОРМИРОВАНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ВОД ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ НА *CARASSIUS AURATUS GIBELIO* (BLOCH, 1782)

Э. А. Аристархова, ella.aryst@gmail.com, Институт агроэкологии и природопользования НААН, г. Киев

Цель. Выявление влияния аммиака в водах поверхностных источников водоснабжения г. Житомира на формирование токсичности этих вод, определенной по тест-реакциям

нетипичной двигательной активности карася серебристого (*C. auratus gibelio*) с использованием метода «time sampling» в течение 2012–2014 гг.

Методика. Для биотестирования на КП «Житомирводоканал» во время исследований один раз в месяц отбирали водные пробы объемом 8 дм³ на группу с водохранилищ р. Тетерев и водопроводной сети водоканала, которые переливали в аквариумы (10 дм³) и формировали контрольную и опытные группы по следующей схеме: контрольная группа — пробы отстаиванной (24 ч) водопроводной воды; опытная группа Д-1 — пробы воды из водохранилища Денишевского; опытная группа Д-2 — из водозабора Отсечное. Тест-объекты — самки карася серебристого. Биотестирование проводили методом «time sampling» с экспозицией особей 12 часов ($n = 30$). Индексы токсичности вод рассчитывали по следующим тест-реакциям: спиралевидные и векторные движения, выскакивание из воды, иммобилизация и гибель особей. Для статистической обработки результатов исследований использовали корреляционный и регрессионный анализ с помощью программ Microsoft Office Excel 2007 и Statistica-6.

Результаты. В исследованиях выявлено влияние аммиака на токсичность вод водохранилищ р. Тетерев, определенную по показателям нетипичной двигательной активности карася серебристого (*C. auratus gibelio*) с использованием метода «time sampling», который заключается в мгновенной фиксации количества особей, отдающих предпочтение тому или иному акту поведения. Показано, что неадаптированные к действию аммиака самки карася серебристого реагировали на его концентрацию в воде выше 0,55 мг/дм³ нарушением двигательной активности. В отличие от рыб опытных групп, у особей контрольной группы были выявлены лишь отдельные нетипичные двигательные акты. Между содержанием аммиака в водах поверхностных источников водоснабжения и токсичностью этих вод в 2012 г. была определена положительная корреляционная связь средней степени, которая имела тенденцию к усилению, и в 2014 г. достигла высокой степени ($r = 0,6773$ — в водохранилище Денишевском и $r = 0,6685$ — в водозаборе Отсечное). Построенные по полученным данным уравнения прямой регрессии позволяют прогнозировать отдельно для водохранилища и водозабора токсичность поверхностных вод по концентрации в них аммиака.

Научная новизна. Впервые выявлена зависимость токсичности вод поверхностных источников водоснабжения г. Житомира, определенной методом «time sampling» с использованием тест-реакций нетипичной двигательной активности карася серебристого, от содержания аммиака в этих водах. По приведенным уравнениям прямой регрессии рассчитана опасная граница концентрации аммиака (0,58 мг/дм³), после которой достигается 50%-ая токсичность вод по отношению к карасю серебристому.

Практическая значимость. Результаты исследований используются для проведения биологического мониторинга токсичности вод водохранилищ р. Тетерев.

Ключевые слова: токсичность вод, *C. auratus gibelio*, аммиак, биотестирование, нетипичная двигательная активность, метод «time sampling».

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 36-42
DOI: 10.15407/fsu2018.01.036
УДК 639.371.52(477)

Received 30.10.2017
Received in revised form 13.11.2017
Accepted 28.11.2017

ОЦІНКА ЗИМОСТІЙКОСТІ ДВОЛІТОК ГАЛИЦЬКОГО КОРОПА В СТАВАХ ПРИКАРПАТТЯ

І. І. Грициняк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. В. Гурбик, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Оцінити зимостійкість дволіток галицького коропа у ставових умовах Прикарпаття.

Методика. Аналіз зимостійкості дволіток галицького коропа проводили на базі фермерського господарства «Короп» протягом 2015–2017 рр. Зимівля проходила у ставу площею 2,5 га. Гідрохімічні показники визначали за допомогою загального хімічного аналізу. Температурний та кисневий режими води у ставах визначали термооксиметром. Матеріалом для дослідження були дволітки галицького коропа. Визначення рибогосподарських показників підготовленості до зимівлі галицького коропа проводили згідно з інструкцією щодо організації зимівлі рибопосадкового матеріалу в ставах. Для аналізу фізіологічної підготовленості коропа до зимового утримання застосовували методику зоотехнічного аналізу.

Результати. Густота посадки дволіток галицького коропа в зимувальний став становила 1000 кг/га. Середня індивідуальна маса рибопосадкового матеріалу коливалась в межах від 1650 г у сезон 2015–2016 рр. та 1760 г у 2016–2017 рр. Коефіцієнт вгодованості дволіток галицького коропа знаходився в межах нормативних значень. Під час посадки на зимівлю хімічний склад м'яса-філе галицького коропа на другому році вирощування знаходився в межах нормативних показників.

Протягом зимівлі екологічні умови відповідали необхідним рибницьким вимогам. Вміст розчиненого у воді кисню в період зимового утримання не виходив за критичні межі. Температура води коливалась від 1 до 8°C.

В результаті обловів зимувального ставу відповідно за роками отримали 1483 екз. та 1291 екз. дворічок галицького коропа. Середня індивідуальна маса риб становила 1450 ± 191 та 1528 ± 124 г. Загальний вихід з зимівлі перевищив 90%.

Наукова новизна. Надано оцінку зимостійкості галицького коропа на другому році життя в ставових умовах Прикарпаття.

Практична значимість. Результати роботи будуть використані при плануванні промислового вирощування галицького коропа в ставових умовах.

Ключові слова: дволітки, галицький короп, рибопосадковий матеріал, зимівля, коефіцієнт вгодованості.

EVALUATION OF WINTER RESISTANCE OF AGE-1+ GALICIAN CARP IN PRIKARPATTYA PONDS

I. Hrytsynyak, info@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
V. Gurbyk, info@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To evaluate the winter resistance of age-1+ Galician carp in pond conditions of the Prykarpattya region.

© І. І. Грициняк, В. В. Гурбик, 2018

Methodology. Analysis of the winter resistance of age-1+ Galician carp was carried out at the base of the fish farm “Korop” during 2015–2017. Wintering took place in a 2.5 ha pond. Hydrochemical parameters were determined using general chemical tests. The temperature and oxygen regimes of water in ponds were determined by a thermo-oximeter. The material for the study were age-1+ Galician carp. Determination of fish culture parameters of the preparedness for wintering of the Galician carp was carried out according to the instructions for organizing the wintering of fish seeds in ponds. To analyze the physiological preparedness of carp for wintering, the method of zootechnical analysis was used.

Findings. The stocking density of age-1+ Galician carp in the wintering pond was 1000 kg/ha. The average individual weight of fish seeds ranged from 1650 g during 2015–2016 season and 1760 g during 2016–2017. The condition factor of age-1+ Galician carp was within the normative values. During the wintering season, the chemical composition of the meat-fillet of the Galician carp at the second year of culturing was within the normative parameters.

During wintering, the environmental conditions corresponded to the necessary fish culture requirements. The dissolved oxygen content in water during the winter period did not exceed the critical limits. The water temperature ranged from 1 °C to 8 °C.

As a result of fish harvesting in the wintering pond, 1483 and 1291 specimens of age-2 Galician carp were obtained in 2016 and 2017, respectively. The average individual weight of fish was 1450 ± 191 g and 1528 ± 124 g. The total yield from wintering exceeded 90%.

Originality. For the first time, an evaluation of winter resistance of age-1+ Galician carp in pond conditions of the Prykarpattia region was carried out.

Practical value. The results of the work will be used for planning the industrial rearing of the Galician carp.

Keywords: age-1+ fish, Galician carp, fish seeds, wintering, condition factor.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Згідно з останніми тенденціями, основу споживчого попиту становлять коропи з рамчастим або голим лусковим покривом, які повинні мати підвищені вагові кондиції. Збільшення індивідуальної маси риби можна досягти вирощуванням її за трилітнього циклу. При цьому перехід на вирощування малолускатих коропів, які користуються підвищеним попитом у населення, забезпечує стабільний збут вирощеної продукції [1–3].

Галицького коропа використовували як об'єкт ставового рибиництва ще у 80-х рр. XIX століття. Цей масив набув свого розповсюдження у багатьох рибних господарствах Європи, завдяки своїй високоспинній формі та дзеркальному розміщенню лускового покриву. На даний час представники галицького коропа залишилися лише у декількох господарствах Львівської області [4].

Для отримання товарної рибної продукції з підвищеними ваговими кондиціями в умовах трилітнього циклу необхідна зимівля рибопосадкового матеріалу двох вікових категорій — цьоголіток та дволіток. Цьоголітки галицького коропа в умовах ставів Прикарпаття відзначаються високою зимостійкістю, яка за кількісними показниками перевищує нормативні для цієї зони рибиництва. Втрати їх маси за період зимівлі не перевищили межі нормативних показників [5].

Для оцінки зимостійкості галицького коропа необхідним є проведення аналізу фізіологічної підготовленості до впливу низьких температур та виходу з зимівлі посадкового матеріалу на другому році життя.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Галицький короп є перспективним об'єктом для ставового вирощування в умовах Прикарпаття. Одним з етапів технологічного процесу за промислового вирощування коропа є зимівля. Під час зимового утримання на рибопосадковий матеріал впливають різні абіотичні чинники. Однак, основним критерієм для оцінки готовності коропа до зимівлі є фізіологічна підготовка риби, яка, в свою чергу, залежить від порідних характеристик та вгодованості риби. Ці два чинники є визначальними для оцінки майбутнього виходу коропа з зимового утримання. А від кількості та якості майбутнього рибопосадкового матеріалу залежать і обсяги отримання рибної продукції [6].

Тому метою нашого дослідження була оцінка зимостійкості дволіток галицького коропа та аналіз впливу абіотичних чинників на рибопосадковий матеріал.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження зимостійкості дволіток галицького коропа проводили на базі фермерського господарства «Короп» протягом 2015–2017 рр. Джерелом водопостачання є р. Рата. Зимівля проходила у ставу площею 2,5 га. Перед посадкою дволіток галицького коропа в стави на зимове утримання проводили рибиничко-меліоративні профілактичні заходи. Метою таких процесів стала деструкція накопичених органічних речовин протягом вирощувального сезону. Дезінфекцію ложа ставу проводили шляхом внесення 250 кг/га хлорного вапна. Гідрохімічні показники виявляли за допомогою загального хімічного аналізу. Температурний та кисневий режими води у ставах визначали термооксиметром [7].

Матеріалом дослідження були дволітки галицького коропа. Визначення рибогосподарських показників підготовленості до зимівлі галицького коропа на другому році життя проводили згідно з інструкцією щодо організації зимівлі рибопосадкового матеріалу в ставах [8]. Для аналізу фізіологічної підготовленості коропа до зимового утримання використовували біохімічну характеристику скелетних м'язів [9].

Опрацювання отриманих експериментальних даних проводили за програмою MS Excel.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

В кінці вегетаційного сезону у зимувальний став площею 2,5 га пересаджували дволіток галицького коропа. Густота посадки знаходилась на рівні 1000 кг/га. Середня індивідуальна маса риб відповідно за роками становила 1650 ± 182 та 1760 ± 140 г. Коефіцієнт вгодованості дволіток галицького коропа знаходився в межах нормативних значень. Наприкінці 2015 р. він становив $3,5 \pm 0,4$; 2016 р. — $4,3 \pm 0,6$.

Для оцінки фізіологічної підготовки дволіток до зимового утримання проведено біохімічне дослідження скелетних м'язів. Під час посадки на зимівлю

хімічний склад м'яса-філе галицького коропа на другому році вирощування знаходився в межах нормативних показників (табл. 1).

Таблиця 1. Загальний хімічний склад скелетних м'язів дволіток галицького коропа, 2016 р.

Tab. 1. General chemical composition of skeletal muscles of two-year-olds of Galician carp, 2016

Показник / Indices	Частка, % / Share, %	Нормативні показники, % [8] / Normative indicators, %
Волога / Water substance	$73,0 \pm 1,0$	72–76
Суха речовина / Dry substance	$26,9 \pm 1,0$	24–28
Жир / Fat	$8,3 \pm 0,2$	6–8
Протеїн / Protein	$16,2 \pm 0,8$	16–17

З даних таблиці видно, що дволітки коропа мали задовільний фізіологічний стан перед посадкою на зимове утримання в стави [10, 11].

Протягом зимівлі екологічні умови відповідали необхідним рибицьким вимогам. Вміст розчиненого у воді кисню в період зимівлі не виходив за критичні межі. Протягом зимового утримання температура води коливалась від 1 до 8°C (рис. 1).

Рис. 1. Термічний та кисневий режими води зимувального ставу

Fig. 1. Thermal and oxygen regime of the water of the wintering pond

В результаті обловів зимувального ставу відповідно за роками отримали 1483 та 1291 екз. дворічок галицького коропа. Середня індивідуальна маса риб становила 1450 ± 191 та 1528 ± 124 г. Загальний вихід із зимівлі перевищив 90%.

**ОЦІНКА ЗИМОСТІЙКОСТІ ДВОЛІТОК ГАЛИЦЬКОГО КОРОПА
В СТАВАХ ПРИКАРПАТТЯ**

Втрати маси риб за зимовий період склали 17% у 2015–2016 рр. та 14% у 2016–2017 рр., що дещо вище нормативних показників, та пов'язано з підвищеною температурою води в обидва зимові періоди (табл. 2).

Таблиця 2. Результати зимівлі цьоголіток галицького коропа
Tab. 2. Results of wintering of this year's Galician carp

		2015–2016	2016–2017
Посаджено / stock up	Кількість, кг/га / Number, kg/ga	1000	1000
	Середня маса, г / Average mass, g	1650 ± 182	1760 ± 140
	Загальна кількість, екз. / Total number, specimen	1562	1388
	Коефіцієнт вгодованості / Fattening coefficient	3,5 ± 0,4	4,3 ± 0,6
Виловлено / caught	Кількість, екз. / Number, specimen	1483	1291
	Вихід із зимівлі, % / Outlet from winter pond, %	95	93
	Середня маса, г / Average mass, g	1450 ± 191	1528 ± 124
	Загальна маса, кг / Total mass, kg	2150	1973
	Коефіцієнт вгодованості / Fattening coefficient	3,0 ± 0,3	3,7 ± 0,27
Втрата маси / mass loss	Абсолютна, г / Absolute, g	200	232
	Відносна, % / Average, %	17	14

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

У ставових умовах Прикарпаття галицький короп відзначається високою зимостійкістю. Втрати індивідуальної маси дволіток в період зимового утримання були дещо вищими нормативних показників, що пов'язано з підвищеною температурою води в зимові періоди, однак кількісний вихід дворічок із зимівлі знаходився на досить високому рівні для ґрунтово-кліматичної зони Прикарпаття.

З метою вивчення галицького коропа в умовах промислового вирощування у ставах Прикарпаття необхідна подальша рибогосподарська оцінка товарних тріліток.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гурбик В. В., Грициняк І. І. Оцінка товарних кондицій різновікових груп галицького коропа // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. 2017. Т. 19, № 74. С. 29—32.
2. Поддубная А. В. Карп как продукт питания. Ориентиры для селекции // Генетика, селекция, племенное дело и воспроизводство рыб : Междунар. конф. : мат. Санкт-Петербург, 2008. С. 67—68.
3. Рибницько-біологічна оцінка цьоголіток галицького коропа в умовах промислового вирощування у ставах Прикарпаття / Гурбик В. В. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2017. № 1. С. 40—51.

4. Гурбик В. В., Грициняк І. І. Історичні аспекти рибогосподарського використання масиву галицького коропа (огляд) // Рибогосподарська наука України. 2016. № 3. С. 77—87.
5. Гурбик В. В. Зимостійкість цьоголіток галицького коропа у ставових умовах Прикарпаття // Рибогосподарська наука України. 2016. № 4. С. 95—102.
6. Канаев А. И. Новая технология зимовки рыб. Москва : Колос, 1976. 127 с.
7. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеиздат, 1970. 480 с.
8. Шульман Г. Е. Физиолого-биохимические особенности годовых циклов рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1972. 367 с.
9. Лиманский В. В., Яржомбек А. А., Белина Е. Н. Инструкция по физиолого-биохимическим анализам рыбы. Москва : ВНИИПРХ, 1984. 60 с.
10. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. Т. 1. Москва : Агропромиздат, 1986. 252 с.
11. Маслова Н. И. Биохимические признаки-индикаторы при оценки сезонной изменчивости обмена веществ у карпов // Сельскохозяйственное рыбоводство: возможности развития и научное обеспечение инновационных технологий : Междунар. науч.-практ. конф. : доклады. Москва, 2012. С. 92—106.

REFERENCES

1. Ghurbyk, V. V., & Hrytsyniak, I. I. (2017). Ocinka tovarnykh kondycij riznovikovykh ghrup ghalycjkoqho koropa. *Naukovyj visnyk LNUVMBT imeni S. Z. Gzhycjkogho*, 19 (74), 29-32.
2. Poddubnaya, A. V. (2008). Karp kak produkt pitaniya. Orientiry dlya selektsii. *Genetika, selektsiya, plemennoe delo i vosproizvodstvo ryb: Mezhdunar. konf.: mat.* Sankt Peterburg.
3. Ghurbyk, V. V., Hhrycynjak, I. I., Bazajeva, A. M., & Chuzhma, N. P. (2017). Rybnycjko-biologichna ocinka cjogholitok ghalycjkoqho koropa v umovakh promyslovogho vyroshhuvannja u stavakh Prykarpattja. *Rybohospodarsjka nauka Ukrainy*, 1, 40-51.
4. Ghurbyk, V. V., & Ghrycynjak, I. I. (2016). Istorychni aspekty rybohospodarsjkogho vykorystannja masyvu ghalycjkoqho koropa (oghljad). *Rybohospodarsjka nauka Ukrainy*, 3, 77-87.
5. Ghurbyk, V. V. (2016). Zymostijkistj cjogholitok ghalycjkoqho koropa u stavovykh umovakh Prykarpattja. *Rybohospodarsjka nauka Ukrainy*, 4, 95-102.
6. Kanaev, A. I. (1976). *Novaya tekhnologiya zimovki ryb*. Moskva: Kolos.
7. Alekin, O. A. (1970). *Osnovy gidrokhimii*. Leningrad: Gidrometioizdat.
8. Shulman, G. E. (1972). *Fiziologo-biokhimicheskie osobennosti godovykh tsiklov ryb*. Moskva: Pishchevaya promyshlennost.
9. *Instruktsiya po fiziologo-biokhimicheskim analizam ryby* (1984). Moskva: VNIIPRKh.
10. *Sbornik normativno-tekhnologicheskoy dokumentatsii po tovarnomu rybovodstvu* (1986). (Part 1). Moskva: Agropromizdat.
11. Maslova, N. I. (2012). Biokhimicheskie priznaki-indikatory pri otsenki sezonnoy izmenchivosti obmena veshchestv u karpov. *Sel'skokhozyaystvennoe rybovodstvo: vozmozhnosti razvitiya i nauchnoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologiy: Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya: doklady* Moskva, 92-106.

ОЦЕНКА ЗИМОСТОЙКОСТИ ДВУХЛЕТОК ГАЛИЦИЙСКОГО КАРПА В ПРУДАХ ПРИКАРПАТТЯ

И. И. Грициняк, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

В. В. Гурбик, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Оценить зимостойкость двухлеток галицийского карпа в прудовых условиях Прикарпаття.

Методика. Исследование зимостойкости двухлеток галицийского карпа проводили на базе фермерского хозяйства «Короп» в течение 2015–2017 гг. Зимовка проходила в пруду площадью 2,5 га. Гидрохимические показатели изучали с помощью общего химического анализа. Температурный и кислородный режимы воды в прудах определяли термооксиметром. Материалом для исследования были двухлетки галицийского карпа. Определение рыбохозяйственных показателей подготовленности к зимовке галицийского карпа проводили согласно инструкции по организации зимовки рыбопосадочного материала в прудах. Для анализа физиологической подготовленности карпа к зимнему содержанию применяли методику зоотехнического анализа.

Результаты. Плотность посадки двухлеток галицийского карпа в зимовальный пруд составляла 1000 кг/га. Средняя индивидуальная масса рыбопосадочного материала колебалась в пределах от 1650 г в сезон 2015–2016 гг. и 1760 г — в 2016–2017 гг. Коэффициент упитанности двухлеток галицийского карпа находился в пределах нормативных значений. Во время посадки на зимовку химический состав мяса-филе галицийского карпа на втором году выращивания находился в пределах нормативных показателей.

В течение зимовки экологические условия соответствовали необходимым рыбоводным требованиям. Содержание растворенного в воде кислорода в период зимнего содержания не выходило за критические пределы. Температура воды колебалась от 1 до 8°C.

В результате обловов зимовального пруда соответственно по годам получили 1483 и 1291 экз. двухлеток галицийского карпа. Средняя индивидуальная масса рыб составляла 1450 ± 191 и 1528 ± 124 г. Общий выход из зимовки превысил 90%.

Научная новизна. Впервые дана оценка зимовки галицийского карпа на втором году жизни в прудах Прикарпаття.

Практическая значимость. Результаты работы будут использованы при планировании и промышленном выращивании галицийского карпа.

Ключевые слова: двухлетки, галицийский карп, рыбопосадочный материал, зимовка, коэффициент упитанности.

ЕКСТЕР'ЕРНІ ТА ВАГОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВОЛІТОК СТРУМКОВОЇ ФОРЕЛІ (*SALMO TRUTTA* LINNAEUS, 1758), РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ (*ONCORHYNCHUS MYKISS* WALBAUM, 1792) ТА АМЕРИКАНСЬКОЇ ПАЛІЇ (*SALVELINUS FONTINALIS* MITCHILL, 1814)

Є. О. Барило, y.bachuk.lv@ukr.net, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, м. Львів

Мета. Дослідити та проаналізувати фенотипові показники і темпи лінійного та вагового росту дволіток трьох видів лососевих риб (*Salmo trutta* m. *fario*, *Oncorhynchus mykiss*, *Salvelinus fontinalis*), вирощених у басейнах господарства «Рибний Потік» Закарпатської області.

Методика. Матеріалом для досліджень слугували дволітки струмкової, райдужної форелі та американської палії. Морфометричні проміри риб здійснювали за загальноприйнятими методиками для лососевих риб (І. Ф. Правдіна). Дослідження маси проводились на електронних аналітичних вагах.

Статистичне опрацювання матеріалу здійснювали в Microsoft Office Excel (2007). Аналіз величин виконано за системою абсолютних значень. Критеріями аналізу показників були їхні середня величина та похибка ($M \pm m$).

Результати. На основі отриманих результатів проведено порівняльний аналіз морфометричних даних, екстер'єрних індексів та темпів росту досліджуваних видів риб. Встановлено, що найвищий коефіцієнт вгодованості був у американської палії — 1,52, дещо нижчим — у райдужної форелі та найнижчим — у струмкової форелі — 1,33 та 1,26. Індекс великоголовості найнижчим був у струмкової та райдужної форелі — 21,2 і 21,42 відповідно. Індекс висоти тіла у райдужної форелі та американської палії був майже однаковий та досить низький, що вказує на їхню м'ясистість. При детальному дослідженні масонакопичення та середньодобового приросту, було встановлено, що у дволітньому віці найвища кінцева маса була у американської палії, становивши 288,56 г, що на 10,1 та 118,5% більше відносно райдужної та струмкової форелі. У середньому з квітня по вересень середньодобовий приріст у американської палії, райдужної та струмкової форелі становив 1,48, 1,37 та 0,67 г відповідно.

Наукова новизна. Вперше в умовах господарства «Рибний Потік» проведено дослідження морфометричних параметрів та темпів росту дволіток цінних об'єктів форелівництва.

Практична значимість. Результати отримані у процесі вирощування лососевих видів риб при безперервному вивченні вагових, морфометричних та морфофізіологічних особливостей, можна використовувати для удосконалення рибницько-технологічної та селекційної роботи у бік збільшення виробництва м'яса та підвищення ефективності виробництва певних видів лососевих риб.

Ключові слова: струмкова форель, райдужна форель, американська палія, маса, індекси тіла.

EXTERIOR AND WEIGHT CHARACTERISTICS OF AGE-1+ BROWN TROUT (*SALMO TRUTTA* LINNAEUS, 1758), RAINBOW TROUT (*ONCORHYNCHUS MYKISS* WALBAUM, 1792) AND BROOK TROUT (*SALVELINUS FONTINALIS* MITCHILL, 1814)

Ye. Barylo, y.bachuk.lv@ukr.net, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lviv

© Є. О. Барило, 2018

Purpose. To study and analyze the results of the phenotypic parameters and the rate of linear and weight growth of 1+ salmonids (*Salmo trutta m. fario*, *Oncorhynchus mykiss*, *Salvelinus fontinalis*) grown in the tanks of the farm "Fish Stream" in the Transcarpathian region.

Methodology. Material for the study were 1+ brown trout, rainbow trout and brook trout served. Morphometric measurements of fish were carried out according to generally accepted techniques for salmonids. Weighing of fish was conducted on electronic analytical scales.

Processing of the obtained data was performed in Microsoft Office Excel (2007). The analysis of variables was performed in the system of absolute values. The criteria for the analysis of parameters were their mean value and standard error ($M \pm m$).

Findings. Based on the obtained results, a comparative analysis of morphometric measurements, exterior indices and growth rates of the investigated fish species was conducted.

It was found that the highest condition factor was in brook trout — 1.52, somewhat lower it was in rainbow trout and the lowest in brown trout — 1.33 and 1.26, respectively. The big head index was the lowest in brown and rainbow trout — 21.2 and 21.42, respectively. The body height index of rainbow trout and brook trout was almost the same and quite low, indicating on their stockiness.

When performing a detailed study of weight accumulation and average daily gain, it was found out that at age-1+, the highest final weight was in brook trout — 288.56 g, which is 10.01% and 118.5% more relative to rainbow trout and brown trout.

On average, from April to September, the average daily gain in brook trout, rainbow trout and brown trout was 1.48 g, 1.37 and 0.67 g, respectively.

Originality. For the first time in Western Ukraine, a study of morphometric parameters and growth rates of age-1+ fish of valuable species of trout farming was conducted.

Practical Value. In the process of salmonid rearing with continuous study of their weights, morphometric, morphological and physiological features, the obtained results can be used to improve fish-technological and breeding work in the direction of increasing meat production and improving the production efficiency of certain salmonid species.

Keywords: brown trout, rainbow trout, brook trout, weight, body indices.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Багато країн світу у секторі аквакультури займаються збільшенням виходу рибної продукції високої якості в умовах максимальної ефективності. У цьому контексті лососівництво є однією з найважливіших галузей рибного господарства [1].

Райдужна форель — вид з Північної Америки, який адаптувався до умов вирощування у багатьох прісноводних господарствах світу завдяки високій екологічній пластичності та високим темпам росту [2].

Американська палія — голец — не такий розповсюджений вид в аквакультурі, як райдужна форель, але його смакові якості викликають великий споживчий інтерес [3]. Збільшення об'ємів вирощування та маркетинг цієї риби можуть підвищити різноманітність продукції лососевих [4].

Струмкова форель дуже вибаглива до умов навколишнього середовища, що слід урахувати, адже екологічна ситуація з кожним роком погіршується внаслідок антропогенного впливу [5, 6]. За даними досліджень деяких науковців, рівні споживання корму та виживання струмкової форелі не мають суттєвої різниці порівняно з райдужною фореллю, хоча приріст нижчий [7]. Однак, струмкова форель є одним з бажаних видів прісноводних риб через свою харчову цінність та попит у спортивній та аматорській риболовлі [8]. Також відтворення запасів струмкової форелі допоможе вирішити в певній мірі не тільки продовольчу

проблему, але й питання збереження біорізноманіття наших річок [9].

Екологічні параметри середовища здійснюють значний вплив на динаміку росту різних видів форелі [10, 11]. Тож у процесі удосконалення технологічних та селекційних методів вирощування лососевих варто враховувати взаємозв'язок між спадковими особливостями та факторами навколишнього середовища, що можливо досягти за умови постійного моніторингу відповідних морфо-фізіологічних особливостей даних риб [12].

Вивчення окремих морфологічних ознак риби за допомогою біометрії є часто використовуваним методом, який полягає у визначенні мінливості характеристик в окремих видів шляхом прямого вимірювання, зважування та статистичної обробки отриманих даних [13].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Дослідження лососевих риб у різних напрямках з урахування видової специфіки розвитку, дасть змогу застосовувати відповідні технологічні елементи у процесі їх вирощування та максимально диверсифікувати і реалізувати їх генетичний потенціал.

Процеси взаємодії між генотипом, абіотичними та біотичними факторами середовища призводять до найбільш різноманітних адаптацій риб, за яких змінюється і їхній фізіологічний стан та екстер'єрні показники.

Проведення вимірювань та зважування тіла риб використовується для визначення змін морфометричних показників та оцінки загального фізіологічного стану. На підставі лінійних та вагових досліджень можна розрахувати серію індексів тіла, в якій міститься інформація про стан утримання риб та форму тіла, що дасть змогу оцінити популяцію риб та в подальшому застосовувати дані знання для селекційної роботи.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проводились на дволітках (1+) трьох видів лососевих риб (*Salmo trutta morpha fario* Linnaeus, 1758, *Oncorhynchus mykiss* Walbaum, 1792, *Salvelinus fontinalis* Mitchell, 1814), вирощених у бетонованих басейнах, кожен об'ємом 120 м³, господарства «Рибний Потік». Щільність посадки дволіток становила: американської палії — 28,00, райдужної форелі — 25,42, струмкової форелі — 11,96 кг/м³. Годівлю на даному етапі проводили штучним продукційним кормом фірми «Aller Aqua». Корми вносили в кількостях, рекомендованих виробником із врахуванням індивідуальної маси особин та температури води.

Вода у басейні надходить із гірської річки. Температура води басейнів змінювалась протягом всього періоду досліджень від максимальних значень у літні сезони — 17,2–19,5 °C — до мінімального — 2,4 °C у зимовий період. Рівень кисню був відносно стабільним, діапазон коливань знаходився у межах 7–10 мг/дм³ [14]. У загальному гідрохімічні показники відповідали державному стандарту СОУ 05.01-37-385:006. Один раз на місяць проводилися контрольні облови. Виловлені риби зважували та вимірювали. Зважування здійснювалось на електронних аналітичних вагах, результат виражали у грамах (г).

Для характеристики інтенсивності росту використовувались показники масонакопичення риб та середньодобові їх прирости.

Визначення окремих морфометричних промірів проводили за загальноприйнятими методиками для лососевих [15] при застосуванні електронного штангельциркуля та сантиметрової стрічки (загальна довжина риби, довжина тіла, довжина тулуба, довжина хвоста, найбільша та найменша висота тіла, довжина голови, висота голови, довжина рила, діаметр ока, позаоковий відділ голови). Схему промірів наведено на рис. 1. Також проводили розрахунок екстер'єрних індексів.

Рис. 1. Схема промірів лососевих (*Salmonidae*) риб

Fig. 1. Scheme of measurements of salmon (*Salmonidae*) fish

Коефіцієнт вгодованості за Фультоном обчислювали за формулою Фультона у сучасній модифікації:

$$K_b = g \cdot 100 / l^3, \text{ де } g \text{ — маса тіла; } l \text{ — довжина тіла. [16].}$$

Індекс великоголовості — виражає відношення довжини голови до довжини тіла. Для розрахунку даного індекса була використана наступна формула:

$$I_v = l_c \cdot 100 / l, \text{ де } l_c \text{ — довжина голови, см; } l \text{ — довжина тіла, см.}$$

Індекс висоти тіла (високоспинності) показує форму тіла риб. Обчислювали даний показник за формулою:

$$I_{BT} = l / H, \text{ де } l \text{ — довжина тіла, см; } H \text{ — максимальна висота тіла, см.}$$

Індекс обхвату тіла розраховувався за формулою:

$$I_O = C / l, \text{ де } C \text{ — обхват тіла, см; } l \text{ — довжина тіла, см.}$$

Статистичне опрацювання матеріалу проводили в Microsoft Office Excel (2007). Аналіз величин пластичних ознак виконано за системою абсолютних значень. Критеріями аналізу показників були їх середня величина та середнє відхилення ($M \pm m$).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Результати дослідження морфометричних показників обраних видів риб представлені в таблиці 1.

Таблиця 1. Морфометричні показники дволіток трьох видів лососевих (*Salmonidae*) (см), $M \pm m$, $n=20$

Tab. 1. Morphometric indices of two-year-olds of three species of salmon (*Salmonidae*) (cm), $M \pm m$, $n = 20$

Показники / Indices	Струмкова форель (<i>Salmo trutta</i>) / Brown trout (<i>Salmo trutta</i>)	Райдужна форель (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) / Rainbow trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	Американська палія (<i>Salvelinus fontinalis</i>) / Brook trout (<i>Salvelinus fontinalis</i>)
Довжина риби / Length of fish (L)	24,34 $\pm$ 1,221	30,53 $\pm$ 0,176	29,67 $\pm$ 0,184
Довжина тіла / Length of body (l)	21,88 $\pm$ 0,646	27,03 $\pm$ 0,147	26,64 $\pm$ 0,193
Довжина тулуба / Length of torso (ad)	15,08 $\pm$ 0,520	19,51 $\pm$ 0,146	18,78 $\pm$ 0,365
Довжина хвоста / Tail length (cd)	6,80 $\pm$ 0,333	7,53 $\pm$ 0,104	7,86 $\pm$ 0,177
Найбільша висота тіла / The greatest body height (H)	5,10 $\pm$ 0,300	7,17 $\pm$ 0,082	7,30 $\pm$ 0,129
Найменша висота тіла / The smallest body height (h)	1,84 $\pm$ 0,167	2,49 $\pm$ 0,063	2,49 $\pm$ 0,057
Обхват тіла / The circumference of the body (C)	12,90 $\pm$ 0,164	17,73 $\pm$ 0,276	17,96 $\pm$ 0,332
Довжина голови / Head length (lc)	4,64 $\pm$ 0,376	5,79 $\pm$ 0,080	5,88 $\pm$ 0,063
Висота голови / Head height (Hc)	3,76 $\pm$ 0,374	3,97 $\pm$ 0,077	4,05 $\pm$ 0,056
Довжина рила / The length of the snout (r)	1,29 $\pm$ 0,249	1,77 $\pm$ 0,048	1,91 $\pm$ 0,033
Діаметр ока / The diameter of the eye (o)	1,14 $\pm$ 0,039	0,99 $\pm$ 0,011	1,08 $\pm$ 0,012
Позаоковий відділ голови / Department of head behind ones back (o-op)	2,21 $\pm$ 0,134	3,04 $\pm$ 0,042	2,89 $\pm$ 0,035

При дослідженні струмкової форелі було встановлено, що за середньої маси тіла 132,07 г, яка є межах літературних даних [17], її загальна довжина становила 24,34 см.

При середній масі дволіток райдужної форелі 262,12 г її довжина становила 30,53 см. У порівнянні із струмковою фореллю, у райдужної форелі довжина тіла була більшою на 23,54%, тулуба — на 29,37%, також були більшими довжина голови, довжина рила, найбільша та найменша висота на 24,78; 37,2; 40,59 та 35,32% відповідно. У загальному морфометричні проміри досліджуваної райдужної форелі були в межах літературних даних [18].

У американської палії більшість морфометричних показників були значно вищими відносно струмкової форелі. При порівнянні з райдужною фореллю у гольця були більшими довжина хвоста, найбільша висота тіла, обхват тіла, висота голови, довжина голови та рила — на 4,38; 1,81; 1,29; 2,01; 1,55 та 7,9% відповідно.

На основі соматичних вимірювань можна розрахувати кілька екстер'єрних індексів, які забезпечують інформацію щодо стану технічного обслуговування, а також здатність риб адаптуватися до умов навколишнього середовища [13].

Коефіцієнт вгодованості за Фультоном інформує про загальне утримання риби та якість її годівлі; вищі значення даного показника можуть характеризувати хороший функціональний стан організму риби та умови вирощування. У нашому

дослідженні (табл. 2) найвищі значення даного коефіцієнта були у американської палії — 1,52, дещо нижчі — у райдужної форелі та найнижчі — у струмкової форелі — 1,33 та 1,26 відповідно. Кормовий коефіцієнт у гольця та райдужної форелі перебував на рівні 1,0, а у струмкової форелі — 1,4.

Таблиця 2. Екстер'єрні індекси дволіток лососевих (*Salmonidae*) риб
Tab. 2. Exterior indices of two-year-old of three species salmon (*Salmonidae*) fish

Показники / Indices	Струмкова форель (<i>Salmo trutta</i>) / Brown trout (<i>Salmo trutta</i>)	Райдужна форель (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) / Rainbow trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	Американська палія (<i>Salvelinus fontinalis</i>) / Brook trout (<i>Salvelinus fontinalis</i>)
Коефіцієнт вгодованості / Fattening coefficient	1,26	1,33	1,52
Кормовий коефіцієнт / Fodder coefficient	1,4	1,0	1,0
Індекс обхвату тіла / Index of the circumference of the body	1,7	1,52	1,48
Індекс великоголовості / Index of the head size	21,2	21,42	22,07
Індекс висоти тіла / Index of the body height	4,29	3,77	3,65

Індекс обхвату тіла є дуже важливим показником у оцінці темпів росту риб. Є кращими риби з найменшими значеннями даного індекса, оскільки це підтверджує добрий розвиток риби. У досліджуваних видів найнижчим індекс обхвату був у американської палії та дещо вищим — у райдужної форелі.

При дослідженні індексу великоголовості було встановлено, що найнижчим даний показник був у струмкової та райдужної форелей — 21,2 і 21,42 відповідно. За літературними даними, є кращими найнижчі значення індексу великоголовості, оскільки це вказує на відносно високу частку тіла [19].

Індекс високоспинності відображає виражену опуклість верхньої лінії тіла риби. На практиці є кращими форелі з найменшим даним індексом, тому що вигнута форма спини позитивно корелює з високою м'язовою масою [19]. У райдужної форелі та американської палії значення даного індексу були майже однаковими та досить низькими, що вказує на їхню м'ясистість.

Показники вищенаведених індексів є в межах літературних даних, зокрема для струмкової [17] та для райдужної форелей [19].

Наступним завданням у нашому дослідженні було визначення та аналіз темпів росту струмкової, райдужної форелей та американської палії.

Як видно з вищенаведеного рис. 2, у березні, після зимівлі, досліджувані об'єкти мали досить низьку масу тіла, зокрема, струмкова форель — 11,05 г, райдужна форель — 15,57 г та американська палія — 22,13 г. У подальшому встановлено тенденцію до збільшення маси.

У вересні кінцева маса гольця становила 288,56 г, що на 10,1 та 118,5% більше відносно райдужної та струмкової форелі відповідно. Порівняння райдужної та струмкової форелей виявило різницю маси тіла на рівні — 98,47%.

В американської палії найбільш інтенсивне зростання середньодобового приросту (рис. 3) виявлено з квітня по липень — 2,11 г, тоді як у райдужної та струмкової форелей — 0,99 та 0,67 г відповідно. З липня по серпень у гольця середньодобовий приріст знижується до 1,46 г, що пояснюється підвищенням температури води. У вересні середньодобовий приріст у американської палії становив 3,29 г, що на 0,92 г менше, ніж у райдужної форелі, та на 1,49 г більше відносно струмкової форелі.

Рис. 2. Динаміка масонакопичення дволіток трьох видів лососевих (Salmonidae) риб

Fig. 2. The dynamics of mass accumulation of two-year-old salmon (Salmonidae) fish

Рис. 3. Середньодобовий приріст маси тіла трьох видів лососевих (Salmonidae) риб

Fig. 3. The average daily weight gain of two-year-old salmon (Salmonidae) fish

Подальше зниження приросту у гольця також пояснюється тим, що у даний період починають інтенсивно формуватись статеві продукти, на які витрачається велика кількість енергії.

У райдужної форелі середньодобовий приріст зростав за весь період. Проте різке підвищення встановлено в серпні. У вересні цей показник становив 4,2 г. Інтенсивне зростання приросту маси риб даного виду наприкінці сезону вирощування (серпень—вересень) пояснюється найбільш оптимальною температурою води басейнів, яка в середньому становила у цей період 17,95⁰C, що сприяло максимальному споживанню корму та швидкому метаболізму і, відповідно, збільшенню приросту риби.

Струмкова форель у всі вікові періоди мала найнижчий середньодобовий приріст порівняно з іншими досліджуваними видами.

У середньому з квітня по вересень середньодобовий приріст найвищим був у гольця — 1,48 г, у райдужної форелі він становив 1,37, а у струмкової форелі — 0,67 г.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Аналіз морфометричних показників та індексів засвідчив, що досліджувані види лососевих риб характеризуються задовільним екстер'єрним розвитком.

При детальному дослідженні масонакопичення та середньодобового приросту було встановлено, що у дволітньому віці найвища кінцева маса була у гольця. Варто відзначити, що його середньодобовий приріст на кінець досліджуваного періоду дещо знизився, однак в середньому характеризувався високими значеннями.

У райдужної та струмкової форелей встановлено динамічне збільшення маси тіла. Максимальне зростання маси відмічалось у серпні та вересні.

Отже, вищенаведені різниці морфометричних показників та приростів досліджуваних видів лососевих риб, вирощених в однакових умовах, демонструють видову специфіку, фізіолого-біологічні особливості та хорошу адаптацію до технологічних та кліматичних умов вирощування.

ЛІТЕРАТУРА

1. The State of World Fisheries and Aquaculture Opportunities and challenges. Rome : FAO, 2014.
2. The Effects of Folic Acid Treatment on Biometric and Blood Parameters of Fingerling Rainbow Trout Fishes (*Oncorhynchus mykiss*) / Firouz A. et al. // J. Aquac. Res. Development. 2013. Vol. 175, № 4. doi:10.4172/2155-9546.1000175.
3. Comparison of chemical contents and consumer acceptance of albino rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum, 1782) with brook trout (*Salvelinus fontinalis* Mitchill, 1814) and normal pigmented rainbow trout / Köse S. et al. // Journal of Fisheries and Aquatic Science. 2001. № 18. P. 81—86.
4. Rasmussen R. S., Ostensfeld T. H. Effect of growth rate on quality traits and feed utilisation of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) and brook trout (*Salvelinus fontinalis*) // Aquaculture. 2000. Vol. 184, № 3. P. 327—337. [https://doi.org/10.1016/S0044-8486\(99\)00324-5](https://doi.org/10.1016/S0044-8486(99)00324-5).

5. Kukuła K. A low stone weir as a barrier for the fish in a mountain stream // Pol. J. Environ. Stud. 2006. № 15. P. 132—137.
6. Productive characteristics of age-3 brood brown trout (*Salmo trutta*) reared in the conditions industrial aquaculture / Haloyan L. et al. // Fisheries science of Ukraine. 2017. № 1(39). P. 64—72. doi: <https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.064>.
7. A comparison of the survival and growth performance in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) and brown trout (*Salmo trutta fario*) fry / Kizak V. et al. // African Journal of Agricultural Research. 2011. № 6(5). P. 1274—1276.
8. Kaya Y., Erdem M. E. Seasonal comparison of wild and farmed brown trout (*Salmo trutta morpha fario* L., 1758): crude lipid, gonadosomatic index and fatty acids // International Journal of Food Sciences and Nutrition. 2009. № 60(5). P. 413—423. doi:10.1080/09637480701777886.
9. Мрук А. І., Устич В. І., Бузевич І. Ю. Відтворення та поповнення природного ареалу струмковою фореллю на прикладі р. Іршава // Рибогосподарська наука України. 2011. № 3. С. 40—46.
10. Growth of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) in warm-temperate lakes: implications for environmental change / Blair J. M. et al. // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2013. № 70(5). P. 815—823.
11. Барило Є. О. Біохімічні та морфометричні показники передличинок трьох видів лососевих в однодобовому віці // Рибогосподарська наука України. 2016. № 2(36). С. 38—47.
12. Peștii din apele reci / Bud I. et al. Păstrăvii : Ed. Risoprint Cluj-Napoca, 2007. 198 p.
13. Simeanu C., Păsărin B., Simeanu D. The study of some morphological characteristics of the sturgeon species of *Polyodon spathula* in different development stages // Lucrări Științifice, seria Zootehnie. 2010. Vol. 54(15). P. 244—247.
14. Барило Є. О. Сезонні зміни абіотичних показників води при вирощуванні лососевих риб // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. 2017. № 19(79). С. 78—82.
15. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Ленинград, 1939. 246 с.
16. Шерман І. М., Рилов В. Г. Технологія виробництва продукції рибиництва : підручник. Київ : Вища освіта, 2005. 351 с.
17. Моніторинг росту струмкової форелі в індустріальних у мовах господарства «Ішхан» / Мрук А. І. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2013. № 1. С. 31—37.
18. Мендришора П. Д., Мрук А. І., Куріненко Г. А. Морфометрична характеристика ремонтно-маточного стада райдужної форелі вирощеної в умовах індустріального господарства «Слобода Банилів» // Рибогосподарська наука України. 2017. № 3(41). С. 65—75.
19. Using body size indices for selection of future rainbow trout breeding (*Oncorhynchus mykiss*, Walbaum 1792) / Mireșan V. et al. // Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies. 2010. № 67(1-2).

REFERENCES

1. FAO (2014). The State of World Fisheries and Aquaculture Opportunities and challenges.
2. Firouz, A., Soheil, L., Hossein, K., Shabanali, N., & Mohammad, B. et al. (2013).

- The Effects of Folic Acid Treatment on Biometric and Blood Parameters of Fingerling Rainbow Trout Fishes (*Oncorhynchus mykiss*). *J. Aquac. Res. Development*, 4(175), doi:10.4172/2155-9546.1000175.
3. Köse, S., Erkebany, C., Kurtoglu, I. Z., Bascina, N., & Degirmenci, A. (2001). Comparison of chemical contents and consumer acceptance of albino rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum, 1782) with brook trout (*Salvelinus fontinalis* Mitchill, 1814) and normal pigmented rainbow trout. *Journal of Fisheries and Aquatic Science*, 18, 81-86.
 4. Rasmussen, R. S., & Ostefeld, T. H. (2000). Effect of growth rate on quality traits and feed utilisation of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) and brook trout (*Salvelinus fontinalis*). *Aquaculture*, 184(3), 327-337.
 5. Kukula, K. (2006). A low stone weir as a barrier for the fish in a mountain stream. *Pol. J. Environ. Stud.*, 15, 132-137.
 6. Haloyan, L., Mruk, A., Kucheruk, A., & Terteryan, L. (2017). Productive characteristics of age-3 brood brown trout (*Salmo trutta*) reared in the conditions industrial aquaculture. *Fisheries science of Ukraine*, 1(39), 64-72.
 7. Kizak, V., Guner, Y., Turel, M., Can, E., & Kayim, M. A. (2011). Comparison of the survival and growth performance in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) and brown trout (*Salmo trutta fario*) fry. *African Journal of Agricultural Research*, 6(5), 1274-1276.
 8. Kaya, Y., & Erdem, M. E. (2009). Seasonal comparison of wild and farmed brown trout (*Salmo trutta morpha fario* L., 1758): crude lipid, gonadosomatic index and fatty acids. *International Journal of Food Sciences and Nutrition*, 60(5), 413-423.
 9. Mruk, A. I., Ustych, V. I., & Buzevych, I. Yu. (2011). Vidtvorennya ta popovnennia pryrodnoho arealu strumkovoju forelliu na prykladi r. Irshava. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 3, 40-46.
 10. Blair, J. M., Ostrovsky, I., Hicks, B. J., Pitkethley, R. J., & Scholes, P. (2013). Growth of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) in warm-temperate lakes: implications for environmental change. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 70(5), 815-823.
 11. Barylo, Je. O. (2016). Biokhimichni ta morfometrychni pokaznyky peredlychynok trjokh vydiv lososevykh v odnodobovomu vici. *Rybohospodarsjka nauka Ukrainy*, 2(36), 38-47.
 12. Bud, I., Ionescu, O., Vlădău, V. V., & Pop, S. N. (2007). *Peștii din apele reci. Păstrăvii*: Ed. Risoprint Cluj-Napoca.
 13. Simeanu, C., Păsărin, B., & Simeanu, D. (2010). The study of some morphological characteristics of the sturgeon species of *Polyodon spathula* in different development stages. *Lucrări Științifice, seria Zootehnie*, 54(15), 244-247.
 14. Barylo, Je. O. (2017). Sezonni zminy abiotychnykh pokaznykiv vody pry vyroshhuvanni lososevykh ryb. *Naukovyy visnyk LNUVMBT imeni Ghzhyckoghho*, 19(79), 78-82.
 15. Pravdin, I. F. (1939). *Rukovodstvo po yzucheniju ryb*. Leninghrad.
 16. Sherman, I. M., & Rylov, V. Gh. (2005). *Tekhnologhija vyrobnyctva produkciji rybnyctva: pidruchnyk*. Kyiv: Vyshha osvita.
 17. Mruk, A. I., Terterjan, L. L., Khandozhivsja, A. I., & Terterjan, L. A. (2013). Monitoryng rost strumkovoju foreli v industrialnykh u movakh ghospodarstva "Ishkhan". *Rybohospodarsjka nauka Ukrainy*, 1, 31-37.

18. Mendryshora, P. D., Mruk, A. I., & Kurinenko, Gh. A. (2017). Morfometrychna kharakterystyka remontno-matochnogho stada rajduzhnoji foreli vyroshhenoji v umovakh industrialjnogho ghospodarstva «Sloboda Banyliv». *Rybohospodarsjka nauka Ukrainy*, 3(41), 65-75.
19. Mireșan, V., Cocan, D., Constantinescu, R., Răducu, C., Feștilă, I., & Sărmas, I. (2010). Using body size indices for selection of future rainbow trout breeding (*Oncorhynchus mykiss*, Walbaum 1792). *Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies*, 67(1-2).

ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХЛЕТОК РУЧЬЕВОЙ ФОРЕЛИ (*SALMO TRUTTA* LINNAEUS, 1758), РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ (*ONCORHYNCHUS MYKISS* WALBAUM, 1792) И АМЕРИКАНСКОЙ ПАЛИИ (*SALVELINUS FONTINALIS* MITCHILL, 1814)

Е. А. Барило, y.bachuk.lv@ukr.net, Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого, г. Львов

Цель. Исследовать и проанализировать результаты фенотипических показателей и темпы линейного и весового роста двухлеток трех видов лососевых рыб (*Salmo trutta m. fario*, *Oncorhynchus mykiss*, *Salvelinus fontinalis*) выращенных в бассейнах хозяйства «Рыбный Поток» Закарпатской области.

Методика. Материалом для исследований послужили двухлетки ручьевой, радужной форелей и американской палии. Морфометрические промеры рыб осуществляли по общепринятым методикам для лососевых рыб (И. Ф. Правдина). Исследования массы проводили на электронных аналитических весах.

Статистическая обработка материала осуществлялась в Microsoft Office Excel (2007). Анализ величин выполнено по системе абсолютных значений. Критериями анализа показателей были их средняя величина и погрешность ($M \pm m$).

Результаты. На основе полученных результатов проведен сравнительный анализ морфометрических промеров, экстерьерных индексов и темпов роста исследуемых видов рыб.

Установлено, что высокий коэффициент упитанности был у американской палии — 1,52, несколько ниже — у радужной форели и самым низким — у ручьевой форели — 1,33 и 1,26 естественно. Индекс крупноголовости низким был у ручьевой и радужной форелей — 21,2 и 21,42 соответственно. Индекс высоты тела радужной форели и американской палии был почти одинаков и достаточно низкий, что указывает на их мясистость.

При детальном исследовании масонакопления и среднесуточного прироста было установлено, что в двухлетнем возрасте самая высокая конечная масса была у американской палии, составив 288,56 г, что на 10,01 и 118,5% больше относительно радужной и ручьевой форелей.

В среднем с апреля по сентябрь среднесуточный прирост массы американской палии, радужной и ручьевой форелей составил 1,48; 1,37 и 0,67 г соответственно.

Научная новизна. Впервые в условиях хозяйства «Рыбный Поток» проведено исследование морфометрических параметров и темпов роста двухлеток ценных объектов форелеводства.

Практическая значимость. Результаты полученные в процессе выращивания лососевых видов рыб при непрерывном изучении весовых, морфометрических и морфофизиологических особенностей, можно использовать для совершенствования рыбоводно-технологической и селекционной работы в сторону увеличения производства мяса и повышения эффективности производства определенных видов лососевых рыб.

Ключевые слова: ручьевая форель, радужная форель, американская палия, масса, индексы тела.

ФІЗІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОГО МЕТОДУ ОБРОБКИ СИРОВИНИ В АКВАКУЛЬТУРІ

О. В. Гончарова, anelsatori@gmail.com, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Н. Й. Тушницька, n-tushnitska@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Вивчити ефективність введення до складу раціону коропа і тиляпії спіруліни (*Spirulina platensis*), підданої попередній обробці нетрадиційним методом, на перебіг фізіолого-біохімічних процесів в організмі гідробіонтів. Проаналізувати швидкість розвитку українського лускатого коропа та тиляпії на тлі впливу кормового чинника.

Методика. Експериментальні дослідження проводилися в умовах лабораторії водних біоресурсів та аквакультури ДДАЕУ. В ході дослідів проводили клінічний огляд гідробіонтів, контроль темпів росту, виживання шляхом фіксації результатів у робочому журналі. Фізіологічні дослідження та аналіз морфофункціональних показників крові здійснювали згідно загальноприйнятих методів.

Результати. Встановлено, що запропонований метод попередньої нетрадиційної обробки спіруліни впродовж періоду її культивування та введення її до складу раціону коропа та тиляпії сприяє активації метаболічних процесів, поліпшенню показників розвитку риб протягом 60-ти діб. При культивуванні *Spirulina platensis* з використанням плазмохімічно активованої води спостерігається позитивний вплив на динамічність її розвитку, про що свідчить більш активніший процес фотосинтезу та вища загальна біомаса в дослідній групі.

Наукова новизна. В роботі вперше представлено удосконалений спосіб попередньої обробки культури *Spirulina platensis* плазмохімічно активованою водою для подальшого її згодування досліджуванім гідробіонтам. Встановлений позитивний вплив такого способу підгодівлі на функціональний стан організму коропа і тиляпії, перебіг адаптаційно-компенсаторних реакцій в онтогенезі.

Практична значимість. Запропонований метод надасть можливість прискорити темпи росту гідробіонтів, поліпшити перебіг фізіолого-біохімічних процесів з максимальним використанням потенціалу організму риб на етапах росту, а також знизити собівартість комбікормів.

Ключові слова: спіруліна, обробка плазмохімічно активованою водою, короп, тиляпія, швидкість росту в онтогенезі, гематологічні показники.

PHYSIOLOGICAL JUSTIFICATION FOR USING AN UNCONVENTIONAL METHOD FOR PROCESSING RAW MATERIAL IN AQUACULTURE

O. Honcharova, anelsatori@gmail.com, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

N. Tushnytska, n-tushnitska@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To study the influence of *Spirulina platensis*, which was previously treated by a non-traditional method, on physiological and biochemical processes in the organism of hydrobionts. To analyze the growth rate of Ukrainian scaly carp and tilapia under the influence of the feeding factor.

© О. В. Гончарова, 2018

Methodology. Experimental studies were carried out in the laboratory of biological resources and aquaculture. Following was performed during the experiments: clinical examination of hydrobionts, control of growth rates, survival rate by recording the results in a working journal, physiological studies, analysis of morphological and functional blood indices, which were performed according to generally accepted methods.

Findings. It was found that the proposed method of non-traditional processing of feed resource for hydrobionts promoted the activation of metabolic processes, contributed to the improvement of fish development indices. During the process of cultivation of *Spirulina platensis*, the use of plasma-chemically activated water had a positive effect on the dynamics of development.

Originality. This article presents for the first time the results of a positive effect of the pretreatment of *Spirulina Platensis* culture with plasma-chemically activated water for its feeding to hydrobionts. A positive effect of this method of feeding on the functional status of fish organism and the process of adaptation-compensatory mechanisms in ontogenesis has been found.

Practical value. The proposed method will provide an opportunity to improve the rate of the development of hydrobionts, physiological and biochemical processes with the maximum utilization of the potential of fish organism at the stages of active growth, and also to reduce the cost of artificial feeds.

Keywords: feed factor, processing with plasma-chemically activated water, hydrobionts, growth rate in ontogenesis, functional status of organism.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Сьогодні в умовах техногенного навантаження в більшості регіонів перед науковцями, практиками, виробниками постає питання, яке вимагає нагального вирішення – забезпечення якості та екологічної безпеки рибної продукції для населення. В європейських країнах інтеграція структур, що реалізують цілу сукупність заходів щодо удосконалення технологічних аспектів контролю якості вже готової біологічної продукції, відбувається послідовно та стрімко. Наприклад, у м. Basque, Toulouse (Франція)¹ домінуючими є відносно невеликі масштаби фермерських господарств, де вирощують рибу з дотриманням вимог «bien-être» (добре доглянута), АВ (agriculture biologique — сільськогосподарська біологічна продукція) та ін. Це передбачає комплекс методологічних підходів до забезпечення організму гідробіонтів повноцінним раціоном на основі біологічно активних та органічних компонентів [1, 2]. Як правило, така продукція при реалізації у ринковій системі має вдвічі вищу цінову політику, оскільки характеризується відповідними якісними характеристиками. В цьому секторі більшість підприємців співпрацює з науковими установами, що здійснюють науковий супровід: обґрунтовані лабораторні дослідження, органолептичний аналіз рибної продукції. Прикладом є установа Institut national de la recherche agronomique (INRA, національний інститут сільськогосподарських досліджень)¹ [1].

В умовах сьогодення в Україні також відбувається євроінтеграція у всіх сферах аграрного виробництва, в тому числі і аквакультурі. Проте, питання розвитку власного виробництва якісної рибної продукції у відповідності до європейських стандартів з раціональним використанням технологічних прийомів, інноваційних енергозберігаючих технологій, матеріально-технічної бази та ін. залишається актуальним [3, 4]. Про встановлення провідних пріоритетних напрямків наукового забезпечення рибного господарства в Україні свідчить

¹ Автор статті робить посилання на основі власного стажування

функціонування науково-технічної програми «Рибництво» в межах тематичного плану провідної наукової установи України — Інституту рибного господарства — «Наукове забезпечення розвитку аквакультури та підвищення ефективності використання водних біоресурсів внутрішніх водойм України» [5].

Визначальним чинником отримання якісної високобілкової харчової сировини, продукції є стан фізіолого-адаптаційних компенсаторних механізмів в організмі риб. Тому актуальними є розробка та пошук оптимальних технологічних заходів. Завдяки науковим дослідженням відбувається постійне удосконалення умов вирощування, рецептів комбікормів, введення до їхнього складу поживних речовин з різноманітними характеристиками. Всі ці заходи надають можливість вирішити поставлену перед галуззю рибництва задачу щодо раціонального використання кормів, кормової бази з огляду на екологічні умови середовища, вирощування. В процесі наукових досліджень розроблені способи підвищення рибопродуктивності, виживання, темпів росту гідробіонтів на тлі використання різних добавок до загального раціону [6].

За проведення досліджень з даного напрямку в першу чергу приділяють увагу середовищу вирощування, тому експериментальні дослідження спрямовані на покращення гідрохімічного режиму фізичними, хімічними, фізико-хімічними методами [7]. В даному аспекті перспективним може бути застосування технологій харчової і кормової продукції. Саме нетрадиційним методам обробки сировини на сьогодні приділяється увага. Прикладом є результати отримані в ході експериментальних досліджень, де встановлено, що плазмохімічно активована вода позитивно впливає на якісні характеристики фітопланктону *Riccia fluitans* і *Lemna minor* L., який використовують в раціоні гідробіонтів. Як свідчать дослідження авторів, не лише гідрохімічний режим водойм, але й кормовий чинник впливає на формування морфометричних показників гідробіонтів [3, 8].

Обробка води контактною нерівноважною низькотемпературною плазмою дозволяє змінювати властивості води у напрямку підвищення проникаючої здатності за рахунок наявності дрібнокластерної структури [12]. Активну кислотність води також можливо змінювати внаслідок обробки плазмою, при цьому при обробці магістральної води рН переходить у лужний бік, а дистильованої — у кислий. При культивуванні спіруліни такі технологічні характеристики мають позитивну дію, оскільки є сприятливими для умов її розвитку. Проведеними вже раніше експериментальними дослідженнями показано, що спіруліна піддана дії плазмохімічно активованої води, за хімічним складом мала вищі показники протеїну [8]. В аквакультурі є чимало експериментальних робіт щодо аналізу та вивчення впливу біологічно активних добавок різного походження, нетрадиційних кормових добавок при годівлі риб на швидкість їхнього розвитку, меристичні та пластичні параметри тощо [9, 10].

В літературних джерелах є результати використання різних способів обробки спіруліни з метою досягнення її максимальної поживності [11]. Відомо, що біомаса спіруліни після надходження до організму чинить біопротекторну і біостимулюючу дію, що обумовлено її хімічним складом. Спіруліна за структурою має стінку, утворену мукополісахаридами, що при надходженні до організму риб сприяє полегшенню процесів її перетравлення за участі ферментних комплексів у порівнянні, наприклад, з одноклітинними водоростями (хлорела), що містить неперетравну целюлозу у складі стінки [11].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

На сьогодні повною мірою не вирішеним лишається питання розробки способів зниження собівартості рибної продукції за рахунок введення до складу рецептів комбікормів локальних нетрадиційних компонентів. Рівень ефективності розроблених технологій можна оцінити лише при науково обґрунтованому вивченні впливу нетрадиційних способів обробки компонентів у складі комбікорму на функціональний стан організму та продуктивні показники риб. Наукову та практичну зацікавленість являють дослідження щодо вдосконалення існуючих та розробки нових технологій годівлі риб шляхом збагаченням кормів біологічно активними речовинами природного походження з мінімальними затратами на виробництво таких добавок.

Вирішення даної проблеми дозволить використовувати запропонований метод для стимулювання фізіолого-біохімічних процесів в організмі риб на початкових стадіях розвитку, коли відбувається формування продуктивних властивостей, з одночасним отриманням органічної продукції (без використання синтетичних, гормональних стимуляторів росту та ін.). Додатковим позитивним чинником застосування плазмохімічно активованої води при культивуванні гідробіонтів є поява активного кисню у вигляді пероксидних і надперекисних сполук водню за рахунок спеціального методу обробки такої води [8]. Це дозволяє забезпечити прояв антисептичних властивостей такого водного середовища. В Україні культивування спіруліни у промислових масштабах має обмежений характер через недосконалість технологічних підходів, знижену ефективність отримання водоростей через кліматичні умови, матеріально-технічну базу, попит на місцевому рівні.

Окрему роль відіграє і відсутність практичного та наукового досвіду щодо використання спіруліни, культивованої на плазмохімічно активованій воді, як компоненту кормів в аквакультурі. Відомості щодо використання плазмохімічно активованої води в аквакультурі відсутня, зокрема, при культивуванні спіруліни, яку після обробки можна використовувати при виробництві кормів для риб. У зв'язку з цим, метою представленої роботи було виявлення впливу кормового чинника на фізіолого-біохімічні процеси в організмі риб, а також проведення порівняльної характеристики темпів розвитку риб та аналіз функціонального статусу організму на тлі використання *Spirulina platensis*, підданої попередній обробці нетрадиційним методом.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження в цьому напрямку є складовою держбюджетної теми БМ-15 ДДАЕУ «Розробка методів обробки сировини для ресурсозберігаючих технологій переробки сільськогосподарської продукції та підвищення її продовольчої безпеки» (ДР № 0116U007412, 2016–2018 рр.) та наукової тематики кафедри водних біоресурсів та аквакультури ДДАЕУ «Вивчення сучасного стану водойм Придніпров'я з метою визначення їх рибогосподарського використання» (2016–2020 рр.). Клінічний огляд риби та дослідження виробничих показників проводили систематично. Відбір проб для визначення гематологічних показників здійснили впродовж експерименту, у крові коропа визначали основні морфо-функціональні показники згідно загальноприйнятих методів. Лабораторний експеримент

проводили з використанням акваріумів об'ємом 200 л. Об'єктами досліджень були український лускатий короп (перша дослідна група) та тилapia (друга дослідна група). Впродовж досліджень контролювали гідрохімічні показники. Температура води становила 22–24°C для першої дослідної групи та 26–28°C для другої. Годівлю риб здійснювали два рази на добу. На початку експерименту в кожному акваріумі було по 30 екз. риб (перша дослідна група) та по 40 екз. риб (друга дослідна група). Дослідним групам додатково до корму вводили спіруліну, що попередньо була піддана обробці плазмохімічно активованою водою за схемою 1.

Схема 1. Структура проведення експериментального дослідження

Примітка. * Загальногосподарський раціон

Scheme 1. The structure of conducting an experimental research

Notes. * General ration

Воду обробляли на лабораторній установці дискретного типу [8, 12]. Розвиток спіруліни контролювали візуально, із застосуванням світлової мікроскопії; окремо оцінювали рівень пігментації фітопланктону. Функціональні властивості культивованої спіруліни визначали шляхом її використання у якості корму для риб. Введення спіруліни у раціон риб здійснювали двічі на добу з розрахунку в середньому 1,25 г сирової культури на 1 кг маси тіла риби. Зазначена кількість була встановлена раніше експериментальним шляхом як оптимальна в порівнянні з іншими дозами [8]. Обробку отриманих даних здійснювали за допомогою програми Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Оскільки основні результати експериментальної частини роботи базуються на попередньому етапі — обробки культури спіруліни плазмохімічно активованою водою — доцільним буде представити результати аналізу розвитку культури, зокрема зміни її пігментації (рис. 1). У дослідній групі процеси фотосинтезу відбувалися активніше, ніж у контрольній; окрім цього, були відмічені більш активніші процеси накопичення біомаси. Три-кратність експерименту дозволила отримати більш вірогідні результати вже у попередніх дослідженнях [8]. Очевидно, такі результати вказують на позитивний вплив плазмохімічно активованої води на метаболічні процеси та розвиток спіруліни. Це надало підстави продовжити експеримент і почати вводити до раціону тилapia та коропа вже оброблений фітопланктон.

Показники середньої маси риб дослідних і контрольних груп вірогідно не відрізнялися між собою. Додавання до раціону тилapia спіруліни, культивованої у воді, підданій дії контактної нерівноважної плазми, сприяло активації

метаболических процессов в организме рыбы, что позитивно позначилося на показниках маси тіла (рис. 2).

Рис. 1. Зміни розвитку *Spirulina platensis* за використання плазмохімічно активованої води: а — культивування культури (ліворуч — контрольна група, праворуч — дослідна); б — аналіз пігментації в контрольній групі та дослідній групах, візуальна оцінка; с — підготовчий період фільтрації перед висушуванням культури та введення до раціону гідробіонтів

Fig. 1. Changes in the development of *Spirulina platensis* for use in plasma chemically activated water: a - cultivation of culture (on the left - control group, on the right - experimental); b - pigmentation analysis in the control group and experimental groups, visual assessment; c - preparatory filtration period before drying the culture and introducing into the ration of hydrobionts

Рис. 2. Вивчення впливу кормового чинника та використання плазмохімічно активованої води при культивуванні спіруліни (*Spirulina platensis*) на швидкість розвитку тиляпії (n=30)

Fig. 2. Investigation of the influence of the fodder factor and the use of plasma-chemically activated water when cultivating *Spirulina platensis* on the rate of development of tilapia (n = 30)

Так, у дослідній групі середня маса тіла тиляпії складала 80,7 г, у той час як у контрольній групі значення даного показника виявилося на 11,9% меншим. Індивідуальний розподіл маси тіла і середні значення цього показника в кожній групі експерименту відображені на рис. 2. В дослідній групі показники швидкості росту були більш рівномірними, ніж у риб з контрольної групи. Це може свідчити про сталість показників катаболічних реакцій в організмі дослідної групи.

При аналізі показника використання корму гідробіонтами в кожній групі

було встановлено, що риба, яка щоденно отримувала в складі раціону спіруліну, культивовану на плазмохімічно активованій воді, мала вищий рівень засвоєння корму: показник швидкості росту і витрат корму на 1 кг приросту на 12,5% відрізнявся від значень для контрольної групи. У групі, де впродовж 60 діб згодовували спіруліну, культивовану на додатково обробленій воді, середня маса тіла перевищувала контрольні значення на 11,9% (рис. 3).

Вихід з вирощування у контрольній групі склав 90%, в той час як у дослідній, де гідробіонти додатково споживали оброблену спіруліну, становив 97%.

Рис. 3. Аналіз перерозподілу середньої маси тіла на початку та в кінці експерименту споживання тилапії спіруліни (*Spirulina platensis*), культивованої на плазмохімічно активованій воді ($n_{k1} = 30$, $n_{k2} = 27$; $n_{d1} = 30$, $n_{d2} = 29$)

Fig. 3. Analysis of the redistribution of the average body weight at the beginning and at the end of the experiment of tilapia consumption spirulina (*Spirulina platensis*) cultivated on plasma-chemically activated water ($n_{k1} = 30$, $n_{k2} = 27$; $n_{d1} = 30$, $n_{d2} = 29$)

Отже, за введення до основного загального раціону тилапії спіруліни, культивованої у воді, попередньо підданій дії контактної нерівноважної плазми, якісні та кількісні показники росту риб покращуються. Це у цілому здатне сприяти збільшенню обсягів харчової продукції, багатой на білок, оскільки якість і складові раціону риб при вирощуванні корегують їхню швидкість росту та формують хімічний склад готової продукції, що надходить до споживача. Тому наступною метою експериментальних робіт буде саме дослідження хімічних характеристик м'язової структури тилапії.

Наступні експериментальні дослідження надають можливість проаналізувати вплив кормового чинника на функціональний стан організму українського лускатого коропа. На початку експерименту середня маса личинок у контролі та досліді відповідно становила $7,15 \pm 0,447$ та $7,15 \pm 0,468$ мг. Впродовж 14 діб додавання спіруліни сприяло збільшенню маси тіла в дослідній групі на 12,7% відповідно до контрольної (рис. 4).

Рис. 4. Вивчення впливу кормового чинника на розвиток коропа в онтогенезі ($M \pm m$, $n_{k1} = 40$, $n_{k2} = 37$, $n_{k3} = 33$; $n_{д1} = 40$, $n_{д2} = 39$, $n_{д3} = 36$)

Fig. 4. Investigation of the influence of the fodder factor on the development of carp in ontogenesis

Відповідні позитивні зміни відбулися відносно рівня виживання: в дослідній групі він на 3,3% перевищував значення в контролі. Абсолютно логічними є підстави дискусії щодо інтерпретації впливу вивченого кормового чинника як стимулятора росту шляхом прискорення активності перебігу метаболічних процесів в організмі риб, фізіолого-біохімічних процесів. У зв'язку з цим було проведено вивчення морфофункціональних показників крові риб, результати якого представлені в таблиці 1. Еритроцитарна картина циркулюючої крові є достатньо інформативним дослідженням, оскільки вона відображає результат взаємодії регенеративних та дегенеративних процесів у крові та кровотворних органах, дозволяє проаналізувати перебіг адаптаційних процесів організму гідробіонтів за дії певного чинника [13, 14]. Показники, представлені в таблиці 1, інформують щодо наявності різниці за деякими параметрами в групах експерименту.

Таблиця 1. Морфофункціональні показники крові українського лускатого коропа на тлі впливу кормового чинника ($M \pm m$, $n=6$)

Table 1. Morphofunctional blood indices of the Ukrainian scaly carp against the background of the influence of the fodder factor ($M \pm m$, $n = 6$)

Показники / Indices	Контроль / Control	Дослід / Experiment
Еритроцити, Т/л / Erythrocytes, RBC/l	1,15±0,02	1,26±0,01**
Гемоглобін, г/л / Hemoglobin, g/l	107,79±2,61	120,10±2,34**
Гематокрит, % / Hematocrit, %	24,15±1,28	29,07±0,95*
МСН, пг / pg	94,35±3,46	95,67±1,76
МСНС, % / %	45,05±1,99	41,58±2,00
MCV, мкм ³ / mkm ³	211,54±14,24	231,73±8,63

Примітка. * — $p < 0,05$; ** — $p < 0,01$ по відношенню до показників контрольної групи.

Notes. * — $p < 0,05$; ** — $p < 0,01$ in relation to the indices of the control group.

Вміст еритроцитів у крові дослідної риби на 9,6% ($p < 0,01$) перевищує значення в контролі. Чим більша загальна кількість еритроцитів, у межах фізіологічної норми, тим вищі окиснювальні властивості крові. Тому це можна інтерпретувати як позитивні зміни. Як відомо, вміст гемоглобіну у крові коливається в певних межах та залежить від виду, віку, породи риб, умов годівлі тощо. Гемоглобін є основною білковою частиною крові, провідна функція якої полягає у постачанні кисню у тканини, органи із легенів та у видаленні вуглекислого газу. Така вірогідна різниця за цим параметром між групами експерименту свідчить про активніший перебіг процесів окиснення щодо кисневої ємності крові в організмі дослідної риби. Дані, отримані в ході досліджень, показали, що вміст гемоглобіну, за аналогією з кількістю еритроцитів в крові, дослідної риби вірогідно перевищував значення контрольної групи. У результаті проведених гематологічних досліджень щодо індексів еритроцитів вірогідної різниці між групами не було встановлено. Гематокритний показник свідчить про загальний стан гомеостазу організму, зокрема функціональну стабільність червоного кісткового мозку.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Отримані дані свідчать про позитивний ефект запропонованого методу обробки культури спіруліни та введення її до раціону коропа та тилapia. Це сприяє активації фізіолого-біохімічних механізмів регуляторної системи, яка корегує швидкість росту та загальний розвиток організму. З огляду на отримані результати, можна зробити припущення, що впровадження запропонованого методу у виробництво за умов позитивної технологічної перевірки є перспективним та економічно обґрунтованим.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гончарова О. В., Astre P., Astre M. Перспективи розвитку аквакультури в Україні з огляду європейського досвіду // Бистришен. 2016. № 4 (297). С. 24—26.
2. Дудар О. Т. Органічне агропродукування у системі еколого-спрямованого розвитку сільського господарства. URL: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2009_4/26.pdf (дата звернення: 05.01.2018).
3. Гончарова О. В., Пугач А. М. Гармонізація та біотехнологічне оновлення методів детермінації якості біологічної продукції // Молодий вчений. 2016. № 9 (36). С. 111—114. (Сільськогосподарські науки).
4. Грициняк І. І., Третяк О. М. До питання розроблення програми виробництва продукції аквакультури з використанням вторинних енергетичних ресурсів у теплоенергетиці України // Рибе господарство. 2006. Вип. 65. С. 3—8.
5. Грициняк І. І., Третяк О. М. Пріоритетні напрями наукового забезпечення рибного господарства України // Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 5—20.
6. Годівля риб / Шерман І. М. та ін. Київ : Вища освіта, 2001. 268 с.
7. Миколенко С. Ю., Гончарова О. В., Пугач А. М. Інноваційні методи обробки продовольчої сировини. Дніпро : Журфонд, 2017. 224 с.
8. Pivovarov A., Mykolenko S., Honcharova O. Biotesting of plasma-chemically activated water with the use of hydrobionts // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Т. 4, № 10 (88). С. 44—50.

9. Желтов Ю. О., Олексієнко О. О., Грех В. І. Використання деяких нетрадиційних кормів в годівлі різновікових груп коропа // Рибогосподарська наука України. 2016. № 1. С. 102—105.
10. Спосіб підвищення продуктивності та якості продукції ставкових риб : пат. 111576 Україна. № у 201606064 ; заявл. 03.06.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.
11. Голодний І. М. Руйнування клітин водорості спіруліни за допомогою електрогідроефекту // Енергетика і автоматика. 2016. № 2. С. 57—63.
12. Пивоваров А. А., Тищенко А. П. Неравновесная плазма: процессы активации воды и водных растворов. Днепропетровск, 2006. 225 с.
13. Серпунин Г. Г. Гематологические показатели адаптаций рыб : дис. ... доктора биол. наук. Калининград, 2002. 482 с.
14. Шарамок Т. С., Єсіпова Н. Б. Вплив антропогенних факторів на гематологічні показники риб // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. 2015. № 3–4 (64). С. 722—726. (Серія : Біологія. Спецвипуск : Гідроєкологія).

REFERENCES

1. Honcharova, O. V., Astre, P., & Astre, M. (2016). Perspektyvy rozvytku akvakultury v Ukraini z ohliadu yevropeiskoho dosvidu. *Borysten*, 4 (297), 24-26.
2. Dudar, O. T. (2018). Orhanichne ahrovyrobnytstvo u systemi ekolohospriamovanoho rozvytku silskoho hospodarstva. www.nbu.gov.ua. Retrieved from www.nbu.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2009_4/26.pdf.
3. Honcharova, O. V., & Puhach, A. M. (2016). Harmonizatsiia ta biotekhnolohichne onovlennia metodiv determinatsii yakosti biolohichnoi produktsii. *Molodyi vchenyi*, 9 (36), 111-114.
4. Hrytsyniak, I. I., & Tretiak, O. M. (2006). Do pytannia rozroblennia prohramy vyrobnytstva produktsii akvakultury z vykorystanniam vtorynnnykh enerhetychnykh resursiv u teploenerhetytsi Ukrainy. *Rybne hospodarstvo*, 65, 3-8.
5. Hrytsyniak, I. I., & Tretiak, O. M. (2007). Priorytetni napriamy naukovoho zabezpechennia rybnoho hospodarstva Ukrainy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 5-20.
6. Sherman, I. M., Hrynzhovskyi, M. V., & Zheltov, Iu. O. et al. (2001). Hodivlia ryb. Kyiv : Vyshcha osvita.
7. Mykolenko, S. Yu., Honcharova, O. V., & Puhach, A. M. (2017). *Innovatsiini metody obrobky prodovolchoi syrovyny*. Dnipro : Zhurfond.
8. Pivovarov, A., Mykolenko, S., & Honcharova O. (2017). Biotesting of plasma-chemically activated water with the use of hydrobionts. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 4, 10 (88), 44-50.
9. Zheltov, Yu. O., Oleksiienko, O. O., & Hrehk, V. I. (2016). Vykorystannia deiakykh netradytsiinykh kormiv v hodivli riznovikovykh hrup koropa. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 102-105.
10. Kobecz, A. S., Goncharova, O. V., & Pugach, A. M. (2016). Sposib pidvyshchennia produktyvnosti ta yakosti produktsii stavkovykh ryb. Patent of Ukraine №111576.
11. Holodnyi, I. M. (2006). Ruinuvannia klityn vodorosti spiruliny za dopomohoiu elektrohdroefektu. *Enerhetyka i avtomatyka*, 2, 57-63.

12. Pivovarov, A. A., & Tishchenko, A. P. (2006). *Neravnovesnaya plazma: protsessy aktivatsii vody i vodnykh rastvorov*. Dnepropetrovsk.
13. Serpunin, G. G. (2002). *Gematologicheskie pokazateli adaptatsiy ryb. Doctor's thesis*. Kaliningrad.
14. Sharamok, T. S., & Yesipova, N. B. (2015). Vplyv antropohennykh faktoriv na hematologichni pokaznyky ryb. *Naukovi zapysky Ternopil's'koho nats. ped. un-tu im. V. Hnatyuka*, 3-4 (64), 722-726.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО МЕТОДА ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ В АКВАКУЛЬТУРЕ

Е. В. Гончарова, anelsatori@gmail.com, Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепр

Н. И. Тушницкая, n-tushnitska@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Изучить эффективность введения в состав рациона карпа и тиляпии спирулины (*Spirulina platensis*), обработанной предварительно нетрадиционным методом, на физиолого-биохимические процессы в организме рыб. Проанализировать скорость развития украинского чешуйчатого карпа и тиляпии на фоне влияния кормового фактора.

Методика. Экспериментальные исследования проводились в условиях лаборатории водных биоресурсов и аквакультуры ДГАЭУ. В процессе опытов проводили клинический осмотр гидробионтов, контроль темпов роста, выживания путем фиксации результатов в рабочем журнале. Физиологические исследования, анализ морфофункциональных показателей крови осуществляли согласно общепринятым методам.

Результаты. Установлено, что предложенный метод предварительной нетрадиционной обработки спирулины на протяжении периода ее культивирования и введения ее в рацион карпа и тиляпии способствует активации метаболических процессов, улучшению показателей развития рыб на протяжении 60 суток. При культивировании *Spirulina platensis* с использованием плазмохимически активированной воды происходит позитивное влияние на динамичность развития, о чем свидетельствует более активный процесс фотосинтеза и большая общая биомасса в опытной группе.

Научная новизна. В работе впервые представлен усовершенствованный способ предварительной обработки культуры *Spirulina platensis* плазмохимически активированной водой для ее скармливания опытным гидробионтам. Установлено позитивное влияние такого способа подкормки на функциональный статус организма карпа и тиляпии, развитие адаптационно-компенсаторных механизмов в онтогенезе.

Практическая значимость. Предложенный метод даст возможность повысить темпы роста гидробионтов, оптимизировать течение физиолого-биохимических процессов с максимальным использованием потенциала организма рыб на этапах роста, а также снизить себестоимость комбикормов.

Ключевые слова: спирулина, обработка плазмохимически активированной водой, карп, тиляпия, скорость роста в онтогенезе, гематологические показатели.

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДВОЛІТОК КОРОПА (*CYPRINUS CARPIO* LINNAEUS, 1758) ЗА ВВЕДЕННЯ ДО ЇХНЬОГО РАЦІОНУ КОРМОВИХ ДОБАВОК «БІО-МОС» ТА «НУПРО»

А. В. Ващенко, ichth-path@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. М. Матвієнко, mnarine73@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Я. В. Тучапський, yartuchapsky@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити вплив кормових добавок «НУПРО» та «БІО-МОС» на основні гематологічні показники коропа (*Cyprinus carpio* L.).

Методика. Гематологічні дослідження щодо впливу кормових добавок «НУПРО» та «БІО-МОС» на показники дволіток нивківського лускатого внутрішньопородного типу коропа виконані за загальноприйнятою методологією.

Досліди проводилися в умовах ДП ДГ «Нивка» Інституту рибного господарства НААН. Для досліджень використовувалися стави площею 0,5 га, які були зарибнені однорічками коропа. Щільність посадки становила 3,0 тис. екз./га.

Результати. Встановлено, що при згодовуванні дволіткам коропа збалансованого комбікорму рецепту ПКС 111–2/2/4 з додаванням до його складу 5% кормової добавки «НУПРО» та 2% «БІО-МОС», в порівнянні з контрольною групою, якій згодовували комбікорм цього ж складу без добавок, у піддослідних риб покращується розмірність основних гематологічних показників, препарати позитивно впливають на дані лейкоцитарної формули та стимулюють фагоцитарну активність нейтрофілів, що значно підвищує імунний статус коропа.

Гідрохімічні показники в експериментальних ставах перебували в межах норми, температурний режим був оптимальним для росту та обміну речовин в організмі коропа.

Отже, можна рекомендувати введення до складу раціону дволіток коропа дані кормові добавки для підвищення імунного статусу організму, що, в свою чергу, приводить до отримання вищого виходу риби з вирощування та додаткового приросту маси тіла.

Наукова новизна. Вперше здійснено аналіз впливу кормових добавок «НУПРО» та «БІО-МОС» на гематологічні показники при вирощуванні дволіток нивківського лускатого коропа.

Практична значимість. З метою підвищення імунного статусу запропоновано використовувати в годівлі дволіток коропа кормові добавки «НУПРО» та «БІО-МОС».

Ключові слова: дволітки коропа, кормові добавки, «НУПРО», «БІО-МОС», гематологічні показники, імунітет.

CHANGES IN HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF 1+ CARP (*CYPRINUS CARPIO* LINNAEUS, 1758) WHEN INTRODUCING THE FEED SUPPLEMENTS "BIO-MOS" AND "NUPRO" THEM INTO THEIR RATION

A. Vaschenko, ichth-path@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
N. Matvienko, mnarine73@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
Y. Turchapsky, yartuchapsky@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

© А. В. Ващенко, Н. М. Матвієнко, Я. В. Тучапський, 2018

Purpose. To investigate the effect of feed supplements "NUPRO" and "BIO-MOS" on basic hematological indices of the carp (*Cyprinus carpio* L.).

Methodology. Hematological studies on the effect of feed supplements "NUPRO" and "BIO-MOS" on the indices of age-1+ Nyvkiv scaly intrabreed type carp have been performed according to the generally accepted methodology.

Experiments were conducted in the conditions of DPDG "Nyvka" of the Institute of Fisheries of the National Academy of Sciences of Ukraine. Fish ponds with an area of 0.5 hectares stocked with age-1 carp were used for the study. The stocking density was 3.0 thousand fish / ha.

Findings. The study showed that feeding of age-1+ carp with a balanced PKC 111 - 2/2/4 feed formula with the addition of 5% feed supplement "NUPRO" and 2% "BIO-MOS®" in comparison with the control group, which was fed with the same feed formula but without feed supplement, resulted in the improvement of basic hematological parameters in the experimental fish. These preparations had a positive effect on leukocyte formula and stimulated phagocytic activity of neutrophils, which greatly increased the immune status of the carp.

At the same time, the hydrochemical parameters in the experimental ponds were within the normal limits and the temperature regime was optimal for growth and metabolism of carp organism.

Thus, it can be recommended to introduce these feed supplements to the diet of age-1+ carp to enhance the immune status of the organism, which in turn will result in higher yields from growing and additional weight gains of fish.

Originality For the first time, an analysis of the effect of feed supplements "NUPRO" and "BIO-MOS" on hematological parameters of age-1+ Nyvka scaly carp was performed.

Practical value. In order to increase the immune status of the carp, it is proposed to use feed supplements "NUPRO" and "BIO-MOS" when rearing age-1+ carp/.

Keywords: 1+ carp, feed supplements, "NUPRO", "BIO-MOS", hematological indices, immunity.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Ресурси морів та океанів не можуть забезпечити зростаючий попит на рибну продукцію на фоні зростаючого населення планети. Тому в останні кілька десятиліть у світі активно розвивається аквакультура. Все більшого значення набувають складні в технологічному відношенні методи найвищої інтенсифікації рибиництва — індустріальні форми вирощування риб в садках, басейнах, замкнутих ємкостях, що передбачає високу концентрацію риб на одиницю площі [1, 2].

Підвищення продуктивності рибогосподарських ставів, поряд з використанням інших методів інтенсифікації рибиництва (вирощування відселекціонованих високопродуктивних груп риб, удобрення ставів тощо), здійснюється також за рахунок годівлі риб штучно виготовленими кормами [3, 4].

Виникає актуальна проблема пошуку та розроблення системи застосування біологічно активних добавок до корму, що чинять позитивний вплив на обмін речовин та фізіологічні функції організму, і виступають у ролі набору мікроелементів, які характеризуються антиоксидантною та ферментною дією [5].

Поряд з цим, існує думка, що застосування таких препаратів з лікувальною метою є особливо раціональним, оскільки вони стимулюють пригнічену імунну систему і не впливають на позитивного стану організму [6].

В якості засобів для профілактичної терапії та збереження здоров'я в даний час широко використовуються пробіотичні препарати, які містять живі

мікроорганізми та їх метаболіти [7, 8]. Більшість бактерій, що характеризуються пробіотичними властивостями, є представниками родів *Lactobacillus* і *Bifidobacterium*. Ними можуть бути *Propionibacterium*, *Enterococcus*, *Escherichia*, *Leuconostoc*, *Pediococcus*, дріжджі *Saccharomyces*. Ефективність біопрепаратів посилюється при комбінуванні декількох видів мікроорганізмів, що належать до різних родів [9].

Перспективність застосування кормових пробіотиків визначається потребами в стимуляторах продуктивності риби, а також погіршенням екологічної та санітарно-епідеміологічної ситуації. З 2007 р. в країнах Євросоюзу введено заборону на використання антибіотиків у складі кормів для тварин [10].

Ширше використання пробіотиків у даний час пов'язано антибіотикорезистентністю риб, що призводить до пошуку альтернативних більш фізіологічних та безпечних засобів для профілактики та лікування інфекцій [11]. Використання комбікормів з пробіотичними добавками дозволяє господарствам зменшити до 25% витрати кормів на вирощування риб [12].

Значна увага при цьому приділяється дослідженню економічно доступних кормових компонентів, що підвищують біологічну цінність штучних кормів для риб. Основним чинником, що обмежує в даний час розвиток товарного рибництва, є дефіцит і висока вартість білкових компонентів, що входять до складу повноцінних комбікормів. Одним з найбільш перспективних способів компенсації дефіциту кормового білка в раціонах риб є використання продуктів мікробіологічного синтезу [9].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Останніми роками важливим напрямком досліджень є пошук альтернативних джерел білка для годівлі риб, зокрема, заміна тваринного білка на збільшені частки дешевого рослинного білка. Проте слід врахувати, що багато джерел рослинного білка мають суттєві недоліки — низький вміст поживних речовин, значна частка вуглеводів, низькі смакові якості, істотно незбалансований вміст амінокислот та жирних кислот [13].

Варіантами заміни є кормові добавки «БІО-МОС» та «НУПРО». Проводилось дослідження впливу препаратів «БІО-МОС», «НУПРО» та «СЕЛ-ПЛЕКС» на деякі гематологічні, біохімічні та біометричні показники американської палії (*Salvelinus fontinalis* М.) [14]. Результати досліджень вказують на те, що найкращий рибницький ефект був отриманий при застосуванні добавки «БІО-МОС» — на 11,49% порівняно з контрольною групою, у інших препаратів рибницькі показники були також вищими у порівнянні з контролем, але нижчими, ніж при застосуванні «БІО-МОС». Аналіз гематологічних і біохімічних показників фізіологічного стану риб, виживання та економічних втрат свідчать про доцільність використання запропонованих добавок.

Відомо, що кормові добавки «НУПРО» і «БІО-МОС» використовують у складі кормів для птиці, свиней, телят, корів, дрібних домашніх тварин і риб більше ніж у 80 країнах світу: вони довели свою ефективність і безпеку в різних господарських і кліматичних умовах.

Ці кормові добавки є єдиними науково обґрунтованими, затвердженими в Євросоюзі і США (країнах з найбільш ефективними та об'єктивними правилами реєстрації кормових добавок та лікарських засобів), безпечною альтернативою антибіотикам, і слугують надійним інструментом контролю субклінічних інфекцій шлунково-кишкового тракту [15].

Кормова добавка «БІО-МОС» — продукт переробки клітинної стінки відібраного штаму дріжджів з використанням унікальних технологій компанії «Alltech». Препарат «БІО-МОС» містить набір мананолігосахаридів із вмістом глюкомананопротейну не менше 25%. Мананолігосахариди за допомогою залишків манози зв'язуються з бактеріальними рецепторами. Бактерії із заблокованими рецепторами не можуть закріплюватися на поверхні епітеліальних клітин кишечника і виводяться з шлунково-кишкового тракту. Практика показує, що застосування препарату «БІО-МОС» сприяє збільшенню приросту маси тварин та покращує конверсію корму [16, 17].

Кормова добавка «НУПРО» виробництва «Alltech» являє собою сухий екстракт дріжджових клітин *Saccharomyces cerevisiae*, біологічні властивості яких обумовлені високим вмістом легкодоступного протеїну (до 50%). Крім того, в «НУПРО», на відміну від звичайних кормових дріжджів, міститься більша кількість амінокислот, вітамінів та мікроелементів [18]. До складу природного екстракту дріжджів цієї кормової добавки входять нуклеотиди, інозит (вітамін В8), легкоперетравлюваний білок з біологічно доступними амінокислотами та пептидами. Деякі пептиди мають антимікробні або антивірусні властивості, інші здатні покращувати смакові властивості кормів, стимулювати роботу імунної системи. Препарат містить нуклеотиди — найважливіші складові (будівельні блоки) ДНК, що беруть участь у синтезі тканин і органів які інтенсивно ростуть в період раннього постембріогенезу. Наявність у «НУПРО» також біодоступних біотину (вітамін В7), інозиту (вітаміну В8), незамінних амінокислот, макро- (сірка, калій, фосфор, кальцій, магній тощо) та мікроелементів (залізо, мідь, цинк, марганець, кобальт, селен тощо) сприяє підтриманню нормальної функції нервової та імунної систем, обміну речовин, що, у свою чергу, підвищує енергію для росту й розвитку організму [19].

Дослідження ефективності «БІО-МОС» проводились також на нільській тиліпії (*Oreochromis niloticus*) [20]. Встановлено, що застосування даного препарату сприяло кращому засвоєнню кормів, підвищувало рибопродуктивність: було відзначено покращення рівня гемоглобіну, еритроцитів, гематокриту, загального білка, концентрації альбуміну в сироватці крові та глобуліну, при цьому відбувалося зменшення вмісту креатиніну, сечовини, аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази. Встановлено, що «БІО-МОС» виявив антибактеріальну активність, антагоністичну до патогенної інфекції *Aeromonas hydrophila* у риби.

Метою нашої роботи було експериментальне обґрунтування доцільності використання кормових добавок «НУПРО» та «БІО-МОС» при вирощуванні дволіток нивківського коропа в умовах ДП ДГ «Нивка».

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Досліди проводилися в ставових умовах ДП ДГ «Нивка» Інституту рибного господарства НААН протягом двох років: перший рік — дослід 1, другий рік —

дослід 2. Для досліджень використовувались по три стави кожного року площею по 0,5 га. Один став враховувався в якості контролю, в якому риби отримували стандартний комбікорм, а в другому проводилась годівля комбікормом з додаванням 2% біологічно активної кормової добавки «БІО-МОС», в третьому ставу застосовували вигодовування риби комбікормом з додаванням 5% добавки «НУПРО». Дослідження тривали з початку червня і до кінця вересня.

Стави були зариблені однорічками нивківського лускатого внутрішньопорідного типу коропа. Щільність посадки риб становила 3,0 тис. екз./га. Початкова маса коропа складала $23,2 \pm 5,70$ г в перший рік досліджень та $25,6 \pm 4,52$ г — в другий.

Годівлю коропа проводили 6 разів на тиждень (двічі на добу) за встановленими схемами годівлі [21].

У контрольному ставу рибам згодовували базовий комбікорм рецепту ПКС 111-2/2/4 (Дніпропетровський завод рибних гранкормів).

Дослідні групи отримували комбікорм з додаванням до його складу 2% біологічно активної добавки «БІО-МОС» та 5% добавки «НУПРО». Кормова добавка вводилася в корми на заміщення кормових дріжджів.

Гідрохімічні дослідження проводилися згідно із загальноприйнятими методикам [22].

Аналіз крові дволіток проводили на початку досліду (П) — у червні та по завершенню вегетаційного сезону — у вересні. Кров для гематологічних досліджень відбирали з серця пастерівською піпеткою, та з хвостової вени одноразовим шприцом з дотриманням правил асептики. Для оцінки морфофункціонального стану організму визначали наступні показники крові: кількість еритроцитів (підрахунок здійснювався в камері Горяєва), концентрацію гемоглобіну (за методом Салі) з використанням гемометра, вміст білка за методом Лоурі, гематокритне число (відношення об'єму формених елементів крові до об'єму крові), проводили диференційний підрахунок лейкоцитів у пофарбованих за Паппенгеймом мазках периферичної крові [23, 24]. Фагоцитарну активність нейтрофілів риб оцінювали за вмістом неферментного катіонного білка в лізосомах (метод М. Г. Шубича [25] та адаптований для риб [26]). Середній цитохімічний коефіцієнт (СЦК) розраховували за формулою:

$$\text{СЦК} = (0 \times \text{H0} + 1 \times \text{H1} + 2 \times \text{H2} + 3 \times \text{H3}) / 100,$$

де H0, H1, H2, H3 — кількість нейтрофілів з активністю 0, 1, 2 та 3 бали відповідно.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Рибне господарство ДП ДГ «Нивка» розташоване в зоні Українського Полісся. Цей район характеризується відносно спекотним літом і холодною зимою. Середньомісячна температура повітря протягом року є позитивною і становить $6,6^{\circ}\text{C}$. Вегетаційний період в коропівництві на господарстві триває близько 160 днів. Переважаючими ґрунтами є торф'янисті та підзолисті піщані, тому природна кормова база ставів даного регіону слабо розвинена [27]. Лабораторний контроль гідрохімічного режиму дослідних ставів показав, що температура води та вміст у ній розчиненого кисню залежали від сезонних змін,

але достовірно не відрізнялися в дослідному і контрольних ставах протягом усього сезону вирощування ($P < 0,05$). Температура води у ставах в червні коливалася в межах 25,7–27,5°C, у серпні — 27,9–28,5°C, а у вересні — 21,3–22,3°C. Показник насичення води киснем не опускався нижче 84,2% від можливого за даних показників температури води.

Введення кормових добавок до раціону дволіток коропа наклало відбиток на гематологічні показники дослідної риби. Вони значно відрізнялися порівняно з контрольними значеннями. Гематологічні показники дволіток коропа при введенні до раціону препарату «БІО-МОС» на рівні 2% від маси корму представлені в таблиці 1.

Таблиця 1. Гематологічні показники дволіток коропа за введення до раціону препарату «БІО-МОС» ($M \pm m$, $n=10$)

Tab. 1. Hematological indices of two-year-old carp for the introduction into the ration of the preparation "BIO-MOS" ($M \pm m$, $n = 10$)

Показники / Indices	Дослід 1 / Experiment 1			Дослід 2 / Experiment 2		
	Початок / Start	Кінець / End		Початок / Start	Кінець / End	
		К	БМ		К	БМ
Вміст гемоглобіну, г% / Hemoglobin content, g%	12,5 ± 0,03	13,2 ± 0,05	14,0 ± 0,08	11,8 ± 0,04	12,8 ± 0,03	14,0 ± 0,04
Концентрація еритроцитів, млн/мм ³ / The concentration of erythrocytes, mln/mm ³	1,27 ± 0,010	1,15 ± 0,006	1,31 ± 0,007	1,15 ± 0,002	1,23 ± 0,004	1,33 ± 0,004
Гематокритне число, % / Hematocrit number, %	33,12 ± 0,67	33,50 ± 0,53	35,68 ± 0,74	32,24 ± 0,95	34,01 ± 0,74	35,74 ± 0,61
Вміст білка в сироватці крові, г% / The content of protein in the blood serum, g%	4,13 ± 0,02	4,35 ± 0,02	4,66 ± 0,01	4,17 ± 0,02	4,28 ± 0,04	4,62 ± 0,02

Примітка. П — початок дослідів; К — контроль; БМ — «БІО-МОС»

Notes. C – control, BM – BIO-MOS

Як видно з наведених даних, концентрація гемоглобіну у дволіток коропа за годівлі їх препаратом «БІО-МОС» у першому досліді збільшилась на 5,8%, а у другому варіанті цей показник зріс на 9,4% відповідно до контролю. При цьому концентрація еритроцитів збільшилась на 13,9 та 8,1%, гематокритне число — на 6,5 та 5,1%, а вміст білка в сироватці крові — на 7,1% у першому варіанті та на 7,9% у другому відповідно до контролю.

При додаванні до раціону 5 % «НУПРО» також був відмічений позитивний ефект. Гематологічні показники дволіток коропа за умов введення до раціону препарату «НУПРО» представлено в таблиці 2.

В кінці дослідів вміст гемоглобіну зріс на 7,1% у першому та на 10,4% — у другому варіанті дослідів відповідно до контролю, при цьому концентрація еритроцитів збільшилась 15,6 та 9,7%, гематокритне число — на 7,8 та 8,0%, а вміст білка в сироватці крові — на 5,2% у першому варіанті та на 5,4% у другому варіанті відповідно до контролю.

Таблиця 2. Гематологічні показники дволіток коропа за введення до раціону препаратів «НУПРО» ($M \pm m, n=10$)

Tab. 2. Hematological indices of two-year-old carp for the introduction into the ration of the preparation "NUPRO" ($M \pm m, n = 10$)

Показники / Indices	Дослід 1 / Experiment 1			Дослід 2 / Experiment 2		
	Початок / Start	Кінець / End		Початок / Start	Кінець / End	
		К	НУ		К	НУ
Вміст гемоглобіну, г% / Hemoglobin content, g%	12,5 ± 0,03	13,1 ± 0,05	14,0 ± 0,05	11,9 ± 0,04	13,3 ± 0,05	13,9 ± 0,05
Концентрація еритроцитів, млн/мм ³ / The concentration of erythrocytes, mln/mm ³	1,27 ± 0,01	1,15 ± 0,01	1,33 ± 0,01	1,17 ± 0,02	1,23 ± 0,01	1,35 ± 0,01
Гематокритне число, % / Hematocrit number, %	33,12 ± 0,67	33,52 ± 0,28	36,16 ± 0,72	32,45 ± 0,53	33,14 ± 0,54	35,79 ± 0,63
Вміст білка в сироватці крові, г% / The content of protein in the blood serum, g%	4,13 ± 0,05	4,37 ± 0,07	4,60 ± 0,06	4,24 ± 0,06	4,42 ± 0,05	4,66 ± 0,04

Примітка. П — початок досліджу; К — контроль; НУ — «НУПРО»

Notes. С – control, N – NUPRO

Також встановлені зміни в лейкоцитарній формулі під впливом дії препаратів «БІО-МОС» та «НУПРО». Лейкоцитарна формула крові коропа, вирощуваного в контрольному і дослідному варіантах, представлена в таблиці 3.

Таблиця 3. Лейкоцитарна формула крові коропа за введення препаратів «БІО-МОС» та «НУПРО» до раціону, % ($M \pm m, n=10$)

Tab. 3. Leukocytic formula of blood of a carp for introduction of preparations "BIO-MOS" and "NUPRO" into the ration,% ($M \pm m, n = 10$)

Форма лейкоцитів / Leukocytes form	Дослід 1 / Experiment 1			Дослід 2 / Experiment 2		
	К	БМ	НУ	К	БМ	НУ
Нейтрофільні мієлоцити / Neutrophilic myelocytes	2,6 ± 0,6	0,8 ± 1,0	0,8 ± 0,1	1,9 ± 0,3	0,6 ± 0,4	1,1 ± 0,3
Нейтрофільні метамієлоцити / Neutrophilic metamyelocytes	2,8 ± 0,5	—	1,8 ± 0,1	3,0 ± 0,2	—	1,6 ± 0,4
Паличкоядерні нейтрофіли / Banded neutrophils	1,2 ± 0,4	0,6 ± 0,5	—	1,4 ± 0,3	—	0,2 ± 0,1
Сегментноядерні нейтрофіли / Segmentonuclear neutrophils	3,8 ± 0,3	1,0 ± 1,0	2,4 ± 0,5	3,6 ± 0,4	1,1 ± 0,2	1,3 ± 0,5
Еозинофіли і псевдоеозинофіли / Eosinophils & pseudo-eosinophils	4,2 ± 0,7	0,6 ± 0,5	2,0 ± 1,0	4,5 ± 0,6	0,3 ± 0,3	1,6 ± 0,5
Моноцити / Monocytes	4,4 ± 0,5	0,8 ± 0,4	—	4,2 ± 0,3	0,8 ± 0,4	2,7 ± 0,4
Базофіли і псевдобазофіли / Basophils & pseudo-basophils	2,8 ± 0,6	—	1,0 ± 0,7	3,1 ± 0,6	0,1 ± 0,2	1,6 ± 0,6
Лімфоцити / Lymphocytes	77,4 ± 2,0	97,2 ± 2,5	93,4 ± 1,5	82,7 ± 1,2	97,1 ± 2,1	92,6 ± 1,6

Примітка. К — контроль; БМ — «БІО-МОС»; НУ — «НУПРО»

Notes. С – control, N – NUPRO, BM – BIO-MOS

З наведених у таблиці 3 даних виходить, що кількість лімфоцитів при застосуванні препаратів зросла. Так, за введення кормової добавки «БІО-МОС» їх кількість збільшилася на 25,6% у першому досліді та на 17,4% — у другому відповідно до контролю. А при додаванні до корму препарату «НУПРО» цей показник зріс на 20,6 та 12% відповідно до контролю.

Введення кормових добавок «БІО-МОС» та «НУПРО» до складу кормів для коропа за його ставового вирощування позначилося не лише на показниках лейкоцитарної формули крові, а й на фагоцитарній активності нейтрофілів (НСТ-тест, %). Так, у риб в контрольному варіанті досліді в кінці періоду вирощування величина цього показника склала $12,7 \pm 0,6$, а в досліді за додавання препарату «БІО-МОС» цей показник збільшився до $24,4 \pm 1,0$, «НУПРО» — до $26,5 \pm 1,3$. Тобто введення даної кормової добавки стимулювало фагоцитарну активність нейтрофілів у досліді з «БІО-МОС» на 92,1%, а з препаратом «НУПРО» — на 108,7% відповідно до контролю.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Встановлено, що за введення до раціону дволіток нивківського лускатого внутрішньопородного типу коропа добавок «НУПРО» та «БІО-МОС» в складі збалансованого комбікорму рецепту ПКС 111-2/2/4 підвищуються основні гематологічні показники червоної крові, а також збільшується кількість лімфоцитів, зростає фагоцитарна активність нейтрофілів (НСТ-тест, %), що свідчить про підвищення імунного статусу коропа в дослідних варіантах у порівнянні з контролем.

Отже, дані кормові добавки можна рекомендувати для підвищення імунного захисту організму, внаслідок чого зростає відсоток виходу з вирощування та отримання додаткового приросту маси тіла.

ЛІТЕРАТУРА

1. Остроумова И. Н. Биологические основы кормления рыб. Изд. 2-ое, испр. и доп. Санкт-Петербург, 2012. 559 с.
2. Годівля риб : підручник / Шерман І. М. та ін. Київ : Вища освіта, 2001. 269 с.
3. Грициняк І. І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб. Київ, 2007. 237 с.
4. Желтов Ю. А., Алексеенко А. А. Кормление племенных карпов разных возрастов в прудовых хозяйствах. Киев : ИНКОС, 2006. 169 с.
5. Вовк Д. М. Рослинні засоби у ветеринарній медицині. Київ : Урожай, 1966. 200 с.
6. Ognean L., Barbu A. The estimation of the biostimulator potential of some fodder additives based on the main hematological and biometrical indices of brook trout (*Salvelinus fontinalis* M.) // Annals of RSCB. 2009. Vol. XIV, iss. 2. P. 292—296.
7. Ноздрин Г. А., Иванова А. Б., Ноздрин А. Г. Пробиотики на основе *Vac. subtilis* и их роль в поддержании здоровья животных разных видов // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2006. № 4. С. 67—69.
8. Пробиотики и функциональное питание / Шендеров Б. А. и др. // Антибиотики и химиотерапия. 1997. Т. 42, № 7. С. 30—34.
9. Fish meal, fish oil replacements in sea bream, sea bass diets need nutritional compensation / Ceulemans S. et al. // Global Aquacult. Adv. Vol. 6, iss. 1. P. 46—51.
10. Пробиотики на основе живых культур микроорганизмов / Смирнов В. В. и др. // Микробиологический журнал. 2002. Т. 64, № 4. С. 62—78.

11. Пробиотики в аквакультуре / Котова Е. А. и др. // Сборник научных трудов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. 2012. Т. 3, № 1–1. С. 100—103.
12. Влияние препарата пробиотического действия «Биоконс» на физиолого-биохимические показатели сеголеток радужной форели / Бадрызлова Н. С. и др. // Естественные науки. 2016. № 4 (57). С. 36—43.
13. Mycotoxins — a rising threat to aquaculture? / Spring, P., Fegan D. F. // Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries : Alltech's 21st Annual Symposium : proceedings. Nottingham : University Press, UK, 2005. P. 323—332.
14. Fegan D. F. Functional foods for aquaculture: benefits of NuPro® and dietary nucleotides in aquaculture feeds // Nutritional biotechnology in the feed and food industries : Alltech's 22nd Annual Symposium, Lexington, Kentucky, USA, 23-26 April 2006 : proceedings. Lexington, Kentucky, USA, 2006. P. 419—432.
15. Есенбаева К. С. Влияние кормовой добавки Био-Мос на продуктивность кроликов : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук. Тюмень, 2005. 42 с.
16. Miguel J. C., Rodriguez-Zas S. L., Pettigrew J. E. Efficacy of a mannan oligosaccharide (Bio-Mos) for improving nursery pig performance // J. Swine Health Prod. 2004. Vol. 12, № 6. P. 296—307.
17. Єгоров Б. В., Макаринська А. В. Сучасні альтернативи кормовим антибіотикам // Зернові продукти і комбікорми. 2010. № 3. С. 27—34.
18. Пластинина Ю. В. Эффективность применения пробиотиков в птицеводстве // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. 2010. С. 147—153.
19. Дерень О. В. Вплив згодовування преміксу ВМА і кормових дріжджів на продуктивні характеристики та гематохімічні показники крові дволіток коропа // Рибогосподарська наука України. 2014. № 4. С. 78—85.
20. Evaluation of Bio-Mos® as a feed additive on growth performance, physiological and immune responses of Nile tilapia, *Oreochromis niloticus* (L.) / Ahmad M. H. et al. // Journal of applied sciences research. 2013. Vol. 9(10). P. 6441—6449.
21. Желтов Ю. О. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб / Желтов Ю. О. // Рибне господарство. 2003. Вип. 62. С. 23—28
22. Алёкин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеиздат, 1970. 440 с.
23. Инструкция по физиолого-биохимическим анализам рыбы / Лиманский В. В. и др. Москва : ВНИИПРХ, 1986. 52 с.
24. Лебедев П. Т., Усович А. Т. Методы исследования кормов, органов и тканей животных. Москва : Россельхозиздат, 1976. 267 с.
25. Шубич М. Г. Выявление катионного белка в цитоплазме лейкоцитов с помощью бромфенолового синего // Цитология. 1974. № 10. С. 1321—1322.
26. Пронина Г. И. Использование цитохимических методов для определения фагоцитарной активности клеток крови или гемолимфы разных видов гидробионтов для оценки состояния их здоровья // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2008. № 4 (20). С. 160—163.
27. Фермерське рибицтво / Грициняк І. І. та ін. Київ, 2008. 556 с.

REFERENCES

1. Ostroumova, I. N. (2012). *Biologicheskie osnovy kormleniya ryb*. Sankt-Peterburg.
2. Sherman, I. M., Hrynzhovskyi, M. V., & Zheltov, Iu. O. et al. (2001). *Hodivlia ryb*. Kyiv : Vyshcha osvita.

3. Hrytsyniak, I. I. (2006). *Naukovo-praktychni osnovy ratsionalnoi hodivli ryb*. Kyiv.
4. Zheltov, Ju. A., & Alekseenko, A. A. (2006). *Kormlenie plemennyh karpov raznyh vozrastov v prудovyh hozjajstvah*. Kiev : INKOS.
5. Vovk, D. M. (1966). Roslynni zasoby u veterynarnij medycyni. Kyiv : Urozhaj,
6. Ognean, L., & Barbu, A. (2009). The estimation of the biostimulator potential of some fodder additives based on the main hematological and biometrical indices of brook trout (*Salvelinus fontinalis* M.). *Annals of RSCB*, XIV(2), 292-296.
7. Nozdrin, G. A., Ivanova, A. B., & Nozdrin, A. G. (2006). Probiotiki na osnove *Bac. subtilis* i ih rol' v podderzhanii zdorov'ja zhivotnyh raznyh vidov. *Sibirskij vestnik sel'skohozjajstvennoj nauki*, 4, 67-69.
8. Shenderov, B. A. et al. (1997). Probiotiki i funkcional'noe pitanie. *Antibiotiki i himioterapija*, 42(7), 30-34.
9. Ceulemans, S., Coutteau, P., Van Halteren, A. et al. (2003). Fish meal, fish oil replacements in sea bream, sea bass diets need nutritional compensation. *Global Aquacult. Adv.*, 6(1), 46-51.
10. Smirnov, V. V. et al. (2002). Probiotiki na osnove zhivyh kul'tur mikroorganizmiv. *Mikrobiologicheskij zhurnal*, 64(4), 62-78.
11. Kotova, E. A. et al. (2012). Probiotiki v akvakul'ture. Sbornik nauchnyh trudov Vserossijskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta ovcevodstva i kozovodstva, 3(1-1), 100-103.
12. Badryzlova, N. S. et al. (2016). Vlijanie preparata probioticheskogo dejstvija «Biokons» na fiziologo-biohimicheskie pokazateli segoletok raduzhnoj foreli. *Estestvennye nauki*, 4(57), 36-43.
13. Spring, P., & Fegan, D. F. (2005). Mycotoxins – a rising threat to aquaculture? *Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries: Alltech's 21st Annual Symposium: proceedings*. Nottingham University Press, UK, 323-332.
14. Fegan, D. F. (2006). Functional foods for aquaculture: benefits of NuPro® and dietary nucleotides in aquaculture feeds. *Nutritional biotechnology in the feed and food industries: Alltech's 22nd Annual Symposium, Lexington, Kentucky, USA, 23-26 April 2006: proceedings*. Lexington, Kentucky, USA, 419-432.
15. Esenbaeva, K. S. (2005). Vlijanie kormovoj dobavki Bio-Mos na produktivnost' krolikov. *Extended abstracts of candidate's thesis*. Tjumen'.
16. Miguel, J. C., Rodriguez-Zas, S. L., & Pettigrew, J. E. (2004). Efficacy of a mannan oligosaccharide (Bio-Mos) for improving nursery pig performance. *J. Swine Health Prod.*, 12(6), 296-307.
17. Yegorov, B. V., & Makarynska, A. V. (2010). Suchasni alternatyvy kormovym antybiotykom. *Zernovi produkty i kombikormy*, 3, 27-34.
18. Plastinina, Ju. V. (2010). Jeftektivnost' primenenija probiotikov v pticevodstve. *Uchenye zapiski Kazanskoj gosudarstvennoj akademii veterinarnoj medicyny im. N. Je. Baumana*, 147-153.
19. Deren', O. V. (2014). Vplyv zgodovuvannya premiksu VMA i kormovyh drizhdzhiv na produktyvni harakterystyky ta gematohimichni pokaznyky krovi dvolitok koropa. *Rybogospodarska nauka Ukrainy*, 4, 78-85.
20. Ahmad, M. H. et al. (2013). Evaluation of Bio-Mos® as a feed additive on growth performance, physiological and immune responses of Nile tilapia, *Oreochromis niloticus* (L.). *Journal of applied sciences research*, 9(10), 6441-6449.
21. Zheltov, Yu. O. (2003). Metodychni vказivky z provedennya doslidiv po godivli ryb. *Rybne gospodarstvo*, 62, 23-28.
22. Aljokin, O. A. (1970). *Osnovy gidrohimii*. Leningrad : Gidrometeoizdat.

23. Limanskij, V. V., Jarzhombek, A. A., Bekina, E. N. et al. (1986). *Instrukcija po fiziologo-biohimicheskim analizam ryby*. Moskva : VNIIPRH.
24. Lebedev, P. T., & Usovich, A. T. (1976). *Metody issledovanija kormov, organov i tkanej zhivotnyh*. Moskva : Rossel'hozizdat.
25. Shubich, M. G. (1974). Vyjavlenie kationnogo belka v citoplazme lejkcitov s pomoshh'ju bromfenolovogo sinego. *Tsitologija*, 10, 1321-1322.
26. Pronina, G. I. (2008). Ispol'zovanie citohimicheskikh metodov dlja opredelenija fagocitarnoj aktivnosti kletok krovi ili gemolimfy raznyh vidov gidrobiontov dlja ocenki sostojanija ih zdorov'ja. *Izvestija Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*, 4 (20), 160-163.
27. Hrytsyniak, I. I., Hrynzhhevskiy, M. V., Tretyak, O. M. (2008). *Fermerske rybnytstvo*. Kyiv.

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДВУХЛЕТОК КАРПА (*CYPRINUS CARPIO* LINNAEUS, 1758) ПРИ ВВЕДЕНИИ В ИХ РАЦИОН КОРМОВЫХ ДОБАВОК «БИО-МОС» И «НУПРО»

А. В. Ващенко, ichth-path@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Н. Н. Матвиенко, mnarine73@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Я. В. Тучапский, yartuchapsky@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Исследовать влияние кормовых добавок «НУПРО» и «БИО-МОС» на основные гематологические показатели карпа (*Cyprinus carpio* L.).

Методика. Гематологические исследования, влияния кормовых добавок «НУПРО» и «БИО-МОС» на показатели двухлеток нивчанского чешуйчатого внутривидового типа карпа выполнены по общепринятым методикам.

Опыты проводились в условиях ГП ОХ «Нивка» Института рыбного хозяйства НААН. Для исследований использовались пруды площадью 0,5 га, которые были зарыблены годовиками карпа. Плотность посадки составляла 3,0 тыс. экз./га.

Результаты. Установлено, что при скормливаннн двухлеткам карпа сбалансированного комбикорма рецепта ППС 111 - 2/2/4 с добавлением в его состав 5% кормовой добавки «НУПРО» и 2% «БИО-МОС», по сравнению с контрольной группой, которой скормливали комбикорм этого же состава без добавок, у опытных рыб улучшается размерность основных гематологических показателей; препараты положительно влияют на данные лейкоцитарной формулы и стимулируют фагоцитарную активность нейтрофилов, что значительно повышает иммунный статус карпа.

Гидрохимические показатели в экспериментальных прудах находились в пределах нормы, температурный режим был оптимальным для роста и обмена веществ в организме карпа.

Следовательно, можно рекомендовать введение в состав рациона двухлеток карпа данные кормовые добавки для повышения иммунного статуса организма, что, в свою очередь, приведет к получению более высокого выхода рыбы по итогам выращивания и дополнительного прироста массы тела.

Научная новизна. Впервые осуществлен анализ влияния кормовых добавок «НУПРО» и «БИО-МОС» на гематологические показатели при выращивании двухлеток нивчанского чешуйчатого карпа.

Практическая значимость. С целью повышения иммунного статуса предложено использовать в кормлении двухлеток карпа кормовые добавки «НУПРО» и «БИО-МОС».

Ключевые слова: двухлетки карпа, кормовые добавки, «НУПРО», и «БИО-МОС», гематологические показатели, иммунитет.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 76-101
DOI: 10.15407/fsu2018.01.076
УДК: 016:[597.58:639.371.9]

Received 15.01.2018
Received in revised form 29.01.2018
Accepted 12.02.2018

ТИЛЯПІЇ (*TILAPIINAE*). ТЕМАТИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

Н. Л. Колесник, kolesnik@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Мета. Формування довідкового бібліографічного переліку публікацій з питань особливостей біотехніки культивування риб з триби тиліпій, відповідно до специфіки функціонування аквакультури в умовах різноманітних типів господарств країн Європи, Азії та Африки.

Методика. У процесі підготовки тематичного списку, в ході системного пошуку було застосовано цілісний та вибірковий методи. Бібліографічне ядро склали літературні джерела з фонду наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН та наукової електронної бібліотеки «КіберЛенінка».

Результати. Сформовано бібліографічний перелік основних робіт: тематичних наукових збірників, матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій, наукових статей і авторефератів дисертацій. Він налічує 202 джерела, з яких 85 — англomовні. Представлені публікації охоплюють часовий інтервал з 1965 по 2017 рр., але більшість з них видана після 1991 р. В наукових джерелах висвітлено результати досліджень стосовно годівлі, селекції, екології, технологій культивування та рибоводно-біологічної характеристики представників однієї з найбільш поширених триб в світовому рибництві — тиліпій (*Tilapia*). Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Підготовлений перелік може бути корисним для науковців, практиків, студентів, сфера інтересів яких стосується питань культивування та дослідження біологічних особливостей риб з триби тиліпій.

Ключові слова: тиліпії, аквакультура, садки, басейни, установки замкненого водопостачання (УЗВ), акліматизація, геотермальні води, важкі метали, гібридизація.

TILAPIA (*TILAPIINAE*). THEMATIC BIBLIOGRAPHY

N. Kolesnyk, kolesnik@if.org.ua, Institute of Fisheries, NAAS, Kyiv

M. Simon, seemann.sm@gmail.com, Institute of Fisheries, NAAS, Kyiv

Purpose. Forming a thematic bibliographic list of publications on certain issues of the biotechnics of the cultivation of tilapia (*Tilapia*) in accordance with the specificity of aquaculture in the conditions of different types of fish farms of Europe, Asia, and Africa.

© Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон, 2018

Methodology. In the process of the preparation of the thematic list, both holistic and selective methods have been used. The bibliographic core was formed by Ukrainian, Russian and English literature sources from the stock of the scientific library of the Institute of Fisheries NAAS and scientific electronic library "CyberLeninka".

Findings. A thematic bibliographic list of major publication was formed: thematic collections of research papers, proceedings of international scientific and practical conferences, scientific works, articles and dissertation abstracts. It is composed of 202 sources, 85 of which are in English. The listed publications cover a time period from 1965 to 2017. However, the majority of them are after 1991. The scientific sources illustrate the studies on feeding, selective breeding, ecology, culture technologies and aquaculture-biological characteristics of the most widespread fish in world aquaculture – tilapia. The literary sources are arranged in alphabetical order by author or title, and described according to DSTU 8302:2015 "Information and documentation. Bibliographic reference. General principles and rules of composition", with the amendments (code UKND 01.140.40), as well as in accordance with the requirements of APA style — international standard of references.

Practical value. The list may be useful for scientists, practitioners, students, whose area of interests covers the questions of the cultivation and study of the biological features of tilapia.

Keywords: tilapia, cages, ponds, recirculating aquaculture systems (RAS), acclimatization, geothermal waters, heavy metals, hybridization.

1. Айман А. Перспективы товарного выращивания тилпии в садках в реке Нил (Египет) // Вестник Астраханского государственного технического университета. 1994. № 1. С. 79—80.
2. Аль-Халиф-Маута, Маркин В. И., Чурилов М. М. Влияние добавок витаминов А, D, Е на рост, жизнеспособность и использование корма молодью тилпии // Ресурсосберегающие технологии в рыбоводстве. Москва, 1993. С. 58—61.
3. Арутюнов О. Д., Якубов Ш. А., Суворова Т. Ф. О некоторых аспектах усовершенствования биотехники выращивания объектов аквакультуры. Астрахань : Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1991. 7 с.
4. Бакир М. Из опыта развития рыбоводства в Египте // Вестник Астраханского государственного технического университета. 1996. № 2. С. 113—118.
5. Балабанова Л. В. Функциональная морфология иммунокомпетентных клеток мозамбикской тилпии при действии кадмия // 8 Научная конференция по экологической физиологии и биохимии рыб : тез. докл. Т. 1. Петрозаводск, 1992. С. 15—16.
6. Балабанова Л. В. Воздействие дихлофоса на ультраструктуру иммунокомпетентных клеток мозамбикской тилпии // Итоги научно-практических работ в ихтиологии. Москва, 1997. С. 39.
7. Балабанова Л. В. Влияние кадмия на ультраструктуру иммунокомпетентных клеток мозамбикской тилпии *Oreochromis mossambicus* // Цитология. 1997. Т. 39, № 8. С. 677—680.
8. Боронецкая О. И. Использование тилпии (*Tilapiinae*) в мировой и отечественной аквакультуре // Известия ТСХА. 2012. № 1. С. 164—173.
9. Боронецкая О. И. Репродуктивные показатели мозамбикской тилпии (*Oreochromis mossambicus*) в зависимости от pH реакции водной среды // Известия ТСХА. 2010. № 6. С. 131—137.

10. Боронеекая О. И., Тетдоев В. В. Рыбоводная и морфофизиологическая характеристика нильской тилляпии (*Oreochromis niloticus* L.) // Вестник РУДН. 2008. № 1. С. 12—15. (Серия : Агрономия и животноводство).
11. Боронеекая О. И., Привезенцев Ю. А. Биологические особенности и продуктивные качества рыб тилляпии породы тимирязевская // Известия ТСХА. 2001. № 4. С. 131—137.
12. Боронеекая О. И. Технология выращивания тилляпии в прудах с геотермальной водой : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук. Москва : ТСХА, 1993. 16 с.
13. Боронеекая О. И. Морфологическая характеристика маточного стада голубой тилляпии // 4-е Всесоюзное совещание по рыбохозяйственному использованию тёплых вод : тез. докл. Москва, 1990. С. 116—118.
14. Бугаец С. А. Продуктивные и биологические особенности нильской и красной тилляпии и их реципрокных гибридов: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук. Москва, 1999. 24 с.
15. Васильева Е. Г., Быстрякова Е. А. Изменение показателей крови тилляпии под влиянием электромагнитного поля // Вестник АГТУ. 2009. № 1. С. 119—120. (Серия : Рыбное хозяйство).
16. Владовская С. Использование африканского сома для контроля «дикого» нереста тилляпии // Рыбное хозяйство. 1997. С. 20—23. (Серия : Аквакультура).
17. Владовская С. Влияние плотности посадки на результаты выращивания колоссомы и тилляпии полунтенсивным методом в поликультуре // Рыбное хозяйство. 1997. С. 24—31. (Серия : Аквакультура).
18. Влияние лечебно-профилактического препарата ЭС-2 на функциональное состояние гибрида тилляпии *Oreochromis* spp. / Ширина Ю. М. и др. // Вестник АГТУ. 2017. № 2. С. 130—136. (Серия : Рыбное хозяйство).
19. Выращивание тилляпии на рыбоводном предприятии с замкнутым циклом водоснабжения / Тетдоев В. В. и др. // Природообустройство. 2013. № 1. С. 56—59.
20. Гдовский П. А., Мензиков С. А., Ружинская Н. Н. АТФазы жабр тилляпий при адаптации к солености // 8 Научная конференция по экологической физиологии и биохимии рыб : тез. докл. Т. 1. Петрозаводск, 1992. С. 65.
21. Гербильский Н. Л. Функциональная корреляция между ростом и репродукцией в искусственных популяциях тилляпии // Физиологические основы экологии животных : науч. совещание : тез. докл. Москва, 1965. С. 26—27.
22. Гибридная тилляпия — новый объект рыбоводства в тепловодных системах с замкнутым циклом водоснабжения / Ивойлов А. А. и др. // Вестник Ленинградского университета. 1988. № 3 (1). С. 10—16. (Серия : Биология).
23. Гистологическая характеристика мускулатуры товарной голубой тилляпии (*Oreochromis aureum*) / Сидорова М. В. и др. // Ресурсосберегающие технологии в рыбоводстве. Москва, 1993. С. 67—72.
24. Глинкин И. О. Биохимические маркеры сыворотки крови и белых мышц трех видов тилляпий р. *Oreochromis* // Интенсивные технологии в рыбоводстве. Москва : МСХА, 1989. С. 115—120.
25. Голованова И. Л., Кузьмина В. В. Влияние дихлофоса, нафталина и кадмия на морфофункциональные характеристики кишечника тилляпии *Oreochromis mossambicus* Peters // Биология внутренних вод. 1998. № 1. С. 80—87.

26. Дюндик О. Б. Сравнительная оценка различных продуктов микробиосинтеза в качестве основного источника протеина в стартовых кормах для тилапии *Oreochromis mossambicus* Peters. Иркутск : Иркутский университет, 1990. 7 с.
27. Жигин А. В. Выращивание тилапий в индустриальной аквакультуре // Прибрежное рыболовство и аквакультура. 2005. № 2. — 32 с.
28. Зайцев В. Ф., Кычанова А. В. Влияние кислотного стресса на функциональное состояние рыб (на примере тилапии) // Юг России: экология, развитие. 2008. № 3. С. 71—74. (Серия : Экология животных).
29. Зайцев В. Ф., Герштанский Н. Д. Влияние некоторых факторов среды на репродуктивную функцию тилапий // Экологические проблемы сельского и водного хозяйства Поволжья : науч.-практ. конф. : тез. докл. Саратов, 1992. С. 25—26.
30. Зеленников О. В. Влияние закисления воды на оогенез мозамбикской тилапии. Воздействие на рыб на этапе дифференцировки пола // Онтогенез. 1994. Т. 25, № 2. С. 31—36.
31. Зеленников О. В., Чмилевский Д. А. Влияние закисления воды на рост и развитие половых желез тилапии // Труды Биологического НИИ СПбГУ. 1997. Вып. 44. С. 77—83.
32. Золотова А. В., Панов В. П., Есавкин Ю. И. Рост соматических структур и морфометрическая характеристика скелетной мускулатуры нильской тилапии (*Oreochromis niloticus* L.) // Известия ТСХА. 2013. № 2. С. 76—87.
33. Ивойлов А. А. Модельные группировки тилапий и анализ их размножения в связи с проблемой полициклического выращивания в установках с замкнутым циклом водоснабжения : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук. Ленинград : ЛГУ, 1988. 19 с.
34. Ивойлов А. А. Фенотипическая инверсия пола у самок мозамбикской тилапии *Oreochromis mossambicus* (Peters) в результате применения некачественных кормов // Труды Биологического НИИ СПбГУ. 1997. № 44. С. 74—76.
35. Изотов Г. П., Соусь С. М. Биотехника воспроизводства и выращивания тилапии в установке с оборотным водообеспечением. Новосибирск : Биологический институт СО РАН, 1992. 49 с.
36. Изучение способности молоди мозамбикской тилапии (*Oreochromis niloticus* (Peters)) к усвоению целлюлозы, входящей в состав кормов / Дюндик О. Б. и др. // Биологические науки. 1991. № 2. С. 51—56.
37. Изучение влияния продукционных кормов на микробиоценоз органов тилапии (*Tilapia*) в установках замкнутого водообеспечения / Шалгимбаева С. М. и др. // Вестн. Астрахан. гос. техн. ун-та. Сер.: Рыбное хозяйство. 2016. № 3. С. 94—99.
38. Ильин Н. Н. Тилапия // Рыбное хозяйство. 1991. № 10. С. 92.
39. Использование препарата «иммуновит» для кормления молоди тилапии / Привезенцев Ю. А. и др. // Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре : Междунар. симпозиум : тез. докл. Краснодар, 1996. С. 26.
40. Кассил Дж. Аквакультура в Израиле // Рыбоводство и рыболовство. 1997. № 1. С. 27—29.
41. Козлов А. И. Тилапии — перспективные объекты выращивания в индустриальной аквакультуре Беларуси // Европейская аквакультура и

- кадровое обеспечение отрасли : междунар. симпоз., Горки, 29-30 марта 2001 г. : матер. Горки, 2001. С. 21—26.
42. Козлов А. И. Экспериментальное разведение и выращивание голубой тилляпии (*Oreochromis aureus* Steindacher) в лаборатории-аквариальной БГСХА // Европейская аквакультура и кадровое обеспечение отрасли : междунар. симпоз. Горки, 29-30 марта 2001 г. : матер. Горки, 2001. С. 31—33.
43. Колобова И. Ю. Экспериментальное выращивание тилляпии // Вестник Астраханского технического института рыбной промышленности и хозяйства. 1993. № 1. С. 78—79.
44. Костюрина А. Н., Мельник И. В. Энергетические показатели молоди тимирязевской тилляпии при различной освещённости // Вестник АГТУ. 2011. № 1. С. 90—93. (Серия : Рыбное хозяйство).
45. Костюрина А. Н., Мельник И. В. Значение колебаний температуры при выращивании молоди тимирязевской тилляпии // Вестник АГТУ. 2009. № 2. С. 88—90. (Серия : Рыбное хозяйство).
46. Краев Н. П. Тилляпия в прудах-охладителях ГРЭС // Рыбное хозяйство. 1966. № 3. С. 24—25.
47. Кузьмина В. В., Голованова И. Л. Гидролитические функции пищеварительного тракта тилляпии *Oreochromis mossambicus* Peters // Биология внутренних вод. 1992. № 97.
48. Кузьмина В. В., Голованова И. Л. Влияние некоторых антропогенных факторов на пищеварительные гидролазы тилляпии // 8 Научная конференция по экологической физиологии и биохимии рыб : тез. докл. Т. 1. Петрозаводск, 1992. С. 174—175.
49. Лаврентьева Н. М. Биологические особенности и хозяйственно полезные качества голубой тилляпии (*Oreochromis aureus*) при выращивании в системе с замкнутым циклом водоснабжения: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Москва : РГАЗУ, 2002. 25 с.
50. Ланге М. А., Новиков Г. Г. Экспериментальные исследования механизмов роста костной (эласмоидной) чешуи у тилляпий // Возрастная и экологическая физиология рыб : тез. докл. Всероссийского симпозиума. Борок, 1998. С. 61—62.
51. Магди М. А. Потребность молоди тилляпий в протеине и эффективность его использования // Известия ТСХА. 2007. № 4. С. 132—136.
52. Магди М. А. Рост тилляпии мозамбика *Oreochromis mossambicus* и эффективность использования азота при различном уровне протеина в рационе // Известия ТСХА. 1992. № 2. С. 187—190.
53. Магди М. А. Выращивание молоди тилляпии на комбикормах с различным уровнем протеина // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1991. Вып. 64. С. 81—82.
54. Маркин В. И. Особенности репродуктивного цикла у тилляпий // Сб. науч. тр. МСХА. 1995. С. 29—30.
55. Маркин В. И. Рыбоводная и морфофизиологическая характеристика мозамбикской и голубой тилляпий, выращенных в садках на теплых водах // Пути повышения эффективности пресноводной аквакультуры. Москва, 1991. С. 58—69.
56. Матей В. Е., Павлов Д. Ф., Чуйко Г. М. Влияние кадмия на структуру жабр тилляпии // Цитология. 1993. Т. 35, № 10. С. 13—19.

57. Мельник И. В., Костюрина А. Н. Влияние продолжительности фотопериода на скорость роста и энергетические показатели молоди тимирязевской тилляпии // Вестник АГТУ. 2010. № 2. С. 112—115. (Серия : Рыбное хозяйство).
58. Менькин В. К., Привезенцев Ю. А., Магди М. А. Влияние уровня протеина на рост и эффективность утилизации азота тилляпией мозамбика // Ресурсосберегающие технологии в рыбоводстве. Москва, 1993. С. 61—67.
59. Миронова Н. В. Рост тилляпий (*Tilapia mossambica* Peters) в аквариальных условиях // Доклады АН СССР. 1965. Т. 165, № 5. С. 179—181.
60. Миронова Н. В. О возможном темпе нарастания численности и суммарной биомассы тилляпии (*Tilapia mossambica* Peters) // Доклады АН СССР. 1966. Т. 166, № 4. С. 968—969.
61. Миронова Н. В. Сравнительная оценка роста тилляпий (*Tilapia mossambica* Peters) при питании их хлореллой и другими кормами // Проблемы космической биологии. 1967. Т. 7. С. 505—512.
62. Михайличенко Д. В., Пономарёв С. В., Куракин И. В. Современная генетически улучшенная порода тилляпии // Вестник АГТУ. 2015. № 2. С. 69—75. (Серия : Рыбное хозяйство).
63. Непомнящих В. А., Гремячих В. А. Влияние зрительного раздражителя на траекторию движения *Oreochromis mossambicus* Peters (*Cichlidae*) // Научные доклады высшей школы. 1992. № 10. С. 55—60. (Биологические науки).
64. Непомнящих В. А., Гремячих В. А. Связь между структурой траектории и асимметрией выбора направления движения у тилляпии *Oreochromis mossambicus* Peters (*Cichlidae*) // Журнал общей биологии. 1993. Т. 54, № 5. С. 619—626.
65. О влиянии уровня солености озера на жабры тилляпий / Д'Альмейда А.-Ф. и др. // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1992. Вып. 66. С. 90—92.
66. Опыт выращивания товарной продукции тилляпии в прудах ТОО «Чиликское прудовое хозяйство» Алматинской области / Жаркенов Д. К. и др. // Вестник АГТУ. 2017. № 2. С. 86—95. (Серия : Рыбное хозяйство).
67. Опыт выращивания нильской тилляпии в условиях рыбного хозяйства ленинградской атомной электростанции / Чмилевский Д. А. и др. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2004. № 2. С. 3—9. (Серия : Биология).
68. Особенности химического состава тела тилляпии, кефали и карпа / Афифи Е. А. и др. // 40 науч.-техн. конф. профессорско-преподавательского состава АГТУ : тез. докл. Астрахань, 1996. С. 239—240.
69. Павлов Д. Ф., Чуйко Г. М. Динамика активности ацетилхолинэстеразы и содержания водорастворимой фракции белка в мозгу мозамбикской тилляпии в процессе привыкания к хроническому действию кадмия и нафталина // 8 научная конференция по экологической физиологии и биохимии рыб : тез. докл. Т. 2. Петрозаводск, 1992. С. 33—34.
70. Панов В. П., Привезенцев Ю. А., Парфенов Ф. В. Морфофизиологические особенности двух видов тилляпии (*Oreochromis sp.* и *O. niloticus*) и их реципрокных гибридов в онтогенезе // Известия ТСХА. 1998. № 1. С. 173—182.
71. Парфенов Ф. В. Гистоструктура глубокой боковой мышцы молоди тилляпий красной, нильской и их реципрокных гибридов // Проблемы индивидуального развития с.-х. животных : сб. научн. тр. Украинского национального аграрного университета. Киев, 1997. С. 54.

72. Парфенов Ф. В. Морфофизиологические особенности красной тилляпии (*Oreochromis sp.*), нильской тилляпии (*O. niloticus*) и их реципрокных гибридов : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Москва, 1998. 16 с.
73. Перспективы выращивания товарной тилляпии в условиях припятского Полесья / Козлова Т. В. и др. // Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. 2014. № 1. С. 38—43. (Серія прыродазнаўчых навук).
74. Плиева Т. Х., Лаврентьева Н. М., Тетдоев В. В. Эколого-физиологические особенности голубой тилляпии // Вестн. РГАЗУ. 2004. С. 50—51.
75. Подушка С. Б. Новая литература о тилляпиях на русском языке (библиографический указатель) // Научно-технический бюллетень лаборатории ихтиологии ИНЭНКО. 2006. № 11. С. 34—49.
76. Полонский А. С. Тилляпии в аквариумистике // Рыбоводство и рыболовство. 1994. № 2. С. 27—30.
77. Привезенцев Ю. А. Тилляпии (систематика, биология, хозяйственное использование). Москва : РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 2011. 122 с.
78. Привезенцев Ю. А. Тилляпии (систематика, биология, хозяйственное использование). Москва : Столичная типография, 2008. 80 с.
79. Привезенцев Ю. А., Бородецкая О. И., Плиева Т. Х. Методические рекомендации по воспроизводству и выращиванию тилляпий рода *Oreochromis*. Москва : МСХ РФ, 2006. С. 33—34.
80. Привезенцев Ю. А., Бородецкая О. И., Богерук А. К. Методические рекомендации по воспроизводству и выращиванию тилляпий рода *Oreochromis*. Москва : РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 2006. 23 с.
81. Привезенцев Ю. А. Современное состояние и перспективы использования тилляпии в рыбоводстве России // Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре : 2-й Междунар. симпоз. : матер. докл. Краснодар : Здравствуйте, 1999. 83 с.
82. Привезенцев Ю. А. Тилляпии в рыбоводстве России // Рыбное хозяйство. 1994. № 3. С. 46—47.
83. Привезенцев Ю. А., Савушкина С. И., Али М. М. Некоторые показатели крови тилляпии в зависимости от условий кормления // Рыбное хозяйство. 1991. № 12. С. 56.
84. Привезенцев Ю. А. Эффективность выращивания тилляпии на технических и естественных теплых водах // Изв. МСХА. 1987. № 2. С. 147—154.
85. Привезенцев Ю. А. Тилляпия в тепловодном рыбоводстве // Рыбоводство и рыболовство. 1978. № 3. С. 10—12.
86. Пырников А. С., Власов В. А., Ревякин А. О. Выращивание нильской тилляпии (*O. niloticus*) на комбикорме с добавкой «Метаболит плюс» // Природообустройство. 2017. № 1. С. 127—135.
87. Результаты исследований по акклиматизации и рыбохозяйственному использованию тилляпий в России / Привезенцев Ю. А. и др. // Первый конгресс ихтиологов России : тез. докл. Москва : ВНИРО. 1997. С. 294.
88. Рецепт кормов для тилляпии, выращиваемой в промышленных условиях / Куракин И. В. и др. // Вестник Оренбургского государственного университета 2015. № 6 (181). С. 49—56.
89. Сальников Н. Е., Салах А. Применение стероидного гормона и гибридизации для получения самцов популяции тилляпии // Проблемы развития

- пресноводной аквакультуры : Всерос. совещ. : тез. докл. Москва, 1993. С. 109—111.
90. Сальников Н. Е., Нтамуганга И. Из опыта работы интегрированных фермерских рыбоводных хозяйств // Проблемы развития пресноводной аквакультуры. Всерос. совещ. : тез. докл. Москва, 1993. С. 63—65.
 91. Севастьянов А. В., Ивойлов А. А., Чмилевский Д. А. Влияние искусственных кормов на репродуктивные способности мозамбикской тиляпии (*Oreochromis mossambicus* Peters) // Вестник С.-Петербургского университета. 1995. Вып. 4. № 24. С. 30—35. (Серия : Биология).
 92. Скляр В. Я., Дюндик О. Б. Корма для тиляпии // Рыбоводство и рыболовство. 1995. № 2. С. 28.
 93. Современное состояние рыбоводной отрасли Израиля (Обзор) / Озиранский Ю. и др. // Рибогосподарська наука України. 2017. № 1 (40). Р. 6—28.
 94. Степень повреждения тканей личинок *Oreochromis mossambicus* (Peters) под влиянием температурного фактора / Д'Альмейда А.-Ф. и др. // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1992. Вып. 66. С. 35—40.
 95. Степанова В. М., Павлов Д. Ф., Чуйко Г. М. Хроническое действие кадмия и ДДВФ на ретикулолимфоидную ткань мозамбикской тиляпии // 8 научная конференция по экологической физиологии и биохимии рыб : тез. докл. Т. 2. Петрозаводск, 1992. С. 113.
 96. Степанова В. М., Чуйко Г. М., Павлов Д. Ф. Морфологическая структура периферической крови мозамбикской тиляпии при адаптации к хроническому действию токсических веществ // 8 Научная конференция по экологической физиологии и биохимии рыб : тез. докл. Т. 2. Петрозаводск, 1992. С. 114—115.
 97. Тетдоев В. В. Воспроизводство и выращивание тиляпии в водоемах с разными экологическими условиями: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Москва : РГАЗУ, 2009. 35 с.
 98. Тетдоев В. В. Размножение и выращивание тиляпии в естественных водоёмах и в условиях промышленных рыбоводных хозяйств. Москва : РГАЗУ, 2009. 102 с.
 99. Тетдоев В. В., Плиева Т. Х. Экологические условия различных типов водоемов для выращивания тиляпии // Вестник РУДН. 2009. № 3. С. 47—51. (Серия : Агрономия и животноводство).
 100. Тетдоев В. В., Боронецкая О. И. Экологические условия прудов с геотермальным водоснабжением для выращивания тиляпии // Вестник РГАЗУ. 2008. № 4(9). С. 98—100.
 101. Тетдоев В. В. Потребность нильской тиляпии (*Oreochromis niloticus*) в кислороде при экстремальных факторах среды // Вестник РУДН. 2007. № 3. С. 10—15. (Серия : Агрономия и животноводство).
 102. Тетдоев В. В. Влияние кислой реакции среды на рост и репродуктивную систему мозамбикской тиляпии (*Oreochromis mossambicus*) // Вестник РУДН. 2009. № 3. С. 16—19. (Серия : Агрономия и животноводство).
 103. Тетдоев В. В. Внешняя среда и гематологические показатели голубой тиляпии // Аграрная наука. 2004. № 1. С. 10—12.
 104. Тиляпия тимирязевская : пат. № 1952 Российская Федерация.

105. Филатов В. И., Киселев А. Ю., Слепнев В. А. Состояние и перспективы развития в СССР рыбоводства в замкнутых системах // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1990. Вып. 59. С. 46—56.
106. Фомичев А. М. Рыбоводная и морфофизиологическая характеристика реципрокных гибридов мозамбикской (*Oreochromis mossambicus*) и голубой (*O. aureus*) тилапий // Пути повышения эффективности пресноводной аквакультуры. Москва, 1991. С. 115—120.
107. Фомичев А. М. Рыбохозяйственная характеристика реципрокных гибридов мозамбикской, голубой и красной тилапии рода *Oreochromis* // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 1991. № 1. С. 173—180.
108. Устинов А. С. Технология совместного выращивания карпа и голубой тилапии в индустриальном рыбоводстве: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук. Москва : РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 2005. 40 с.
109. Чернокожева И. С., Чмилевский Д. А. Формирование теплоустойчивости тилапий второго поколения путем воздействия пониженной температуры на разные этапы оогенеза родителей // 8 научная конференция по экологической физиологии и биохимии рыб : тез. докл. Т. 2. Петрозаводск, 1992. С. 157—158.
110. Чернокожева И. С., Чмилевский Д. А. Анализ теплоустойчивости тилапий первого поколения после воздействия пониженной температуры на самок с гонадами третьей стадии зрелости // Известия РАН. 1993. № 4. С. 535—541. (Серия : Биология).
111. Чмилевский Д. А., Иосифова Т. Е. Морфология и динамика числа половых клеток в раннем онтогенезе мозамбикской тилапии // Цитология. 1999. Т. 41, № 2. С. 135—139.
112. Чмилевский Д. А. Влияние пониженной температуры на рост тилапии *Oreochromis mossambicus* // Вопросы ихтиологии. 1998. Т. 38, № 1. С. 92—99.
113. Чмилевский Д. А. Оогенез тилапии (*Oreochromis mossambicus* Peters) при повышенной температуре // Первый конгресс ихтиологов России : тез. докл. Москва : ВНИРО, 1997. С. 260—261.
114. Чмилевский Д. А. Влияние пониженной температуры на оогенез тилапии (*Oreochromis mossambicus* Peters). 4. Воздействие на рыб в возрасте 106 суток после вылупления // Вопросы ихтиологии. 1996. Т. 36, № 5. С. 647—652.
115. Чмилевский Д. А. Влияние рентгеновского облучения на развитие гонад тилапии // Радиобиологический съезд : тез. докл. Пущино, 1993. С. 1116—1117.
116. Чмилевский Д. А. Влияние пониженной температуры на оогенез тилапии (*Oreochromis mossambicus* Peters). 2. Воздействие на рыб в возрасте 22 суток после вылупления // Вопросы ихтиологии. 1994. Т. 34, № 5. С. 675—680.
117. Щербаков Д. А. Рост и морфологические показатели красной тилапии (*Oreochromis mossambicus* × *O. niloticus*), выращиваемой при различных значениях pH воды : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Москва, 2000. 20 с.

118. Akinrotimi O. A., Uedeme A. B., Agokei E. O. Effects of acclimation on haematological parameters of *Tilapia guineensis* (Bleeker, 1862) // Science World Journal. 2010. Vol. 4 (5). P. 1—4.
119. Asian Development Bank. An Impact Evaluation of the Development of Genetically Improved Farmed Tilapia and Their Dissemination in Selected Countries // Manila, Philippines : Asian Development Bank, 2005.
120. Asian Development Bank. Overview of Freshwater Aquaculture of Tilapia in the Philippines // Manila, Philippines : Asian Development Bank, 2004.
121. Babiker M. M., Ibrahim H. Studies on the biology of reproduction in the cichlid *Tilapia nilotica* (L.): Gonadal maturation and fecundity // J. Fish. Biol. 1979. Vol. 14. P. 437—447.
122. Balshine-Earn S. The Costs of Parental Care in Galilee St. Peter's Fish, *Sarotherodon galilaeus* // Animal Behaviour. 1995. Vol. 50 (1) P. 1—7.
123. Barlow G. W. The Cichlid Fishes. Cambridge, MA : Perseus Publishing, 2000. 352 p.
124. Bene C., Heck S. Fish and food security in Africa // NAGA, WorldFish Center Q. 2005. P. 8—13.
125. Breakthrough in genetic improvement of tropical finfish through partnership between ICLARM, ASI and developing country NARS / Gupta M. V. et al. URL: http://www.fao.org/docs/eims/upload/206603/3_8_cases.PDF.
126. Bruce M. An impact evaluation of the development of genetically improved farmed tilapia and their dissemination in selected countries. Manila, Philippines : Asian Development Bank, 2005.
127. Bwanika G., Murie D., Chapman L. Comparative Age and Growth of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus* L.) in Lakes Nabugabo and Wamala, Uganda // Hydrobiologia. 2007. Vol. 589. P. 287—301.
128. Caulton M. S. The effect of temperature on routine metabolism to *Tilapia rendalli* // Journal Fish Biol. 1977. P. 549—553.
129. Chervinski J. Environmental physiology of tilapias // ICLARM Conf. Philippines. Manila, 1982. P. 119—128.
130. Coppens Tilapia Feed. 2009. 13 p.
131. Courtenay W. Tilapias as non-indigenous species in the Americas: Environmental, regulatory and legal issues // Tilapia Aquac. Am. 1997. Vol. 1. P. 18—33.
132. Dey M. M., Gupta M. V. Socioeconomics of disseminating genetically improved Nile tilapia in Asia: An introduction // Aquac. Econ. Manag. 2000. Vol. 4. P. 5—11.
133. Eknath A. E., Acosta B. Genetic Improvement of Farmed Tilapias (GIFT) Project // Final Report, March 1988 to December 1997. Penang, Malaysia : World Fish Center, 1998.
134. El-Shazly A. Biological Studies On Four Cichlid Fishes (*Tilapia nilotica*, *Tilapia galilae*, *Tilapia zillii*, *Tilapia aurea*) : thesis M. Sc. Fac. Sci. Egypt : Zagazig Univ., 1993. 227 p.
135. El-Saidy A., Gaber M. Intensive culture of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) in Egypt // First Scientific Conference of the Egyptian Agriculture Society. Suez Canal University, 2002.
136. El-Sayed A. F. M. Tilapia Culture // Cambridge, MA, USA : CABI, 2006.
137. Tilapias: Biology and Exploitation / ed. M. C. M. Beveridge, B. J. McAndrew. Dordrecht, Netherlands : Kluwer Academic Publishers, 2000. 505 p. (Fish and Fisheries Series ; 25).

138. Farmer G. I., Beamish F. M. Oxygen consumption of *Tilapia nilotica* in relation to swimming speed and salinity // J. Fish Res. Canada. 1969. P. 2807—2821.
139. Feeding behaviour and food utilisation in tilapia, *Oreochromis niloticus*: Effect of sex ratio and relationship with the endocrine status / Toguyeni A. et al. // Physiology & Behavior. 1997. Vol. 62 (2). P. 273—279.
140. Fernandes Y. Natural mating in Nile tilapia (*Oreochromis niloticus* L.). Implications for reproductive success, inbreeding and cannibalism. Wageningen, Netherlands : Wageningen UR, 2006. 150 p.
141. Fessehaye M. N., Rantin F. T. Lethal temperatures of *Oreochromis niloticus* (Pisces, Cichlidae) // Rev. Brasil. Biol. 1986. Vol. 46 (3). P. 589—595.
142. First International Symposium on Tilapia in Aquaculture : proceed. / eds. L. Fishelson, Z. Yaron. Nazareth, Israel : Tel Aviv University, 1983. 624 p.
143. Fitzsimmons K., Ramotor P., Lerozi B. Tilapias // 10 International Symposium on Tilapia in Aquaculture, October 6-10, 2013, Crowne Plaza Hotel, Jerusalem, Israel. Jerusalem, Israel, 2013. P. 22.
144. Fitzsimmons K. Potential to increase global tilapia production // Global Outlook for Aquaculture Leadership : GOAL Conference : proceed. Kuala Lumpur, Malaysia, 2010.
145. Food and Agriculture Organization. The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome, Italy : Food and Agriculture Organization (United Nations), 2010. P. 218.
146. Genetic improvement of farmed tilapias: The growth performance of eight strains of *Oreochromis niloticus* tested in different farm environments / Eknath A. E. et al. // Aquaculture. 1993. Vol. 111. P. 171—188.
147. Genetic improvement of farmed tilapias: Genetic parameters for body weight at harvest in Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) during five generations of testing in multiple environments / Bentsen H. B. et al. // Aquaculture. 2012. Vol. 338. P. 56—65.
148. Genetic improvement of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) with special reference to the work conducted by the Worldfish Center with the GIFT strain // Ponzoni R. W. et al. // Rev. Aquac. 2011. Vol. 3. P. 27—41.
149. Gohar H., Latif A., El-Saady B. Reproduction in *Tilapia nilotica* Linn. Morphological peculiarities of the gonad // Proc. Egypt. Acad. Sci. 1972. Vol. 25. P. 107—123.
150. Habel M. L. Overwintering of the cichlid, *Tilapia aurea*, produces fourteen tons of harvestable size fish in a south Alabama bass-bluegill public fishing lake // Progressive Fish-Culturist. 1975. № 37. P. 31—32.
151. Hales L. S., Jr. Occurrence of an introduced African cichlid, the blue tilapia, *Tilapia aurea* (Perciformes: Cichlidae), in a Skidaway River tidal creek : unpublished mimeograph. [S. l.] : Department of Zoology and Institute of Ecology, University of Georgia, Athens, and Marine Extension Service Aquarium, Georgia Sea Grant College Program, Savanna, GA., 1989. 12 p.
152. Hauser W. J. An unusually fast growth rate for *Tilapia zillii* // California Department of Fish and Game. 1975. Vol. 61, iss. 1. P. 54—56.
153. Hepatic tissue lipid profiles in freshwater fish (*Oreochromis mossambicus* Trewavas) acclimated to acidic and alkaline media / Bhaskar M. et al. // Geobios. 1985. Vol. 5 (12). P. 200—233.
154. Hickling Ch. The cultivation of tilapia // Scientific American. 1963. Vol. 208 (5). P. 143—152.

155. Jensen K. W. Determination of age and growth of *Tilapia nilotica* L., *T. galilaea* Art., *T. zillii* Gerv. and *Lates niloticus* C. et V. by means of their scales // K. Norske Vidensk. Selsk. Forh. 1957. № 30. P. 150—157.
156. Job S. V. The respiratory metabolism of *Tilapia mossambicus*. The effect of size, temperature, salinity and partial pressure of oxygen // Mar. Biol. 1969. P. 222—226.
157. Kausik R. J. Parental influences on egg quality, fry production and fry performance in *Oreochromis niloticus* (Linnaeus) and *O. mossambicus* (Peters) // Aquacult. Fish. Manage. 1986. Vol. 20. P. 49—57.
158. Khallaf E. A., Alne-na-ei A. A. Feeding ecology of *Oreochromis niloticus* (Linnaeus) & *Tilapia zillii* (Gervais) in a Nile Canal // Hydrobiologia. 1987. Vol. 146. P. 57—62.
159. Kutty M. N. Respiratory quotient on the and ammonia excretion in *Tilapia mossambicus* // Mar. Biol. 1972. Vol. 16. P. 126—133.
160. Landau R. Growth and population studies on *Tilapia galilaea* in Lake Kinneret // Freshwat. Biol. 1979. Vol. 9. P. 23—32.
161. Latif A. A., Saady B. E. Reproduction in the Nile Bolti, *Tilapia nilotica* // Bull. Inst. Ocean. Fish. 1973. Vol. 3. P. 120—142.
162. Lim Chorn E., Webster Carl D. *Tilapia: Biology, Culture, and Nutrition* // Food products press, 2006. 704 p.
163. Loran R. Adaptability of *Tilapia nilotica* to various salinite conditions // Bamidgeh. 1960. Vol. 12(4). P. 96—99.
164. Lowe-McConnel R. H. The biology and culture of Tilapias. Manila, Phillipines : Inter. Cent. For Living Aquatic Resor. Manag., 1982. 432 p.
165. Macintosh D. J., Silva S. S. The influence of dosage and time of treatment on the effect of metyltestosteron fed fry of *O. mossambicus* // Aquaculture. 1982. Vol. 12.
166. Magid A. M., Babiker G. N. Oxygen consumption of *Tilapia nilotica* // Hydrobiologia. 1975. № 33. P. 513—522.
167. McDonald E. M. Interactions between a phytoplanktivorous fish, *Oreochromis aureus*, and two unialgal forage populations // Environmental Biology of Fishes. 1987. № 18. P. 229—234.
168. Melard C., Philippart J. C. Pisciculture intensive *S. niloticus* // Aquaculture. 1980. P. 11—28.
169. Payne A. I., Collinson R. I. A comparison of the biological characteristics of *Sarotherodon niloticus* (L.) with those of *S. aureus* (Steindachner) and other tilapia of the delta and lower Nile // Aquaculture. 1983. Vol. 30 (1—4). P. 335—351.
170. Philippart J. C., Melard Ch. Belgian power station heats in tilapia tanks // Fish Farming International (U.K.). 1980. № 7. P. 14—15.
171. Ponzoni R. W., Nguyen N. H., Khaw H. L. Investment appraisal of genetic improvement programs in Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) // Aquaculture. 2007. Vol. 269. P. 187—199.
172. Poompuang S., Hallerman E. M. Toward detection of quantitative trait loci and marker-assisted selection in fish // Rev. Fish. Sci. 1997. Vol. 5. P. 253—277.
173. Popma T. *Tilapia Life History and Biology* // Southern Region Aquaculture Center. 1999. 920 p.
174. Pullin R. *Tilapia: Everyman's fish* // Biologist. 1985. Vol. 32. P. 84—88.

175. Rothbard S., Peretz Y. Tilapia culture in Neger // Fish Breeding center. Israel, 2002.
176. Schwanck E., Rona K. Male-female parental roles in *Sarotherodon galilaeus* (*Pisces: Cichlidae*). // Ethology. 1991. Vol. 89. P. 229—243.
177. Second International Symposium on Tilapia in Aquaculture : ICLARM Conference 15 : proceed. Vol. 1 / eds. R. S. V. Pullin et al. Bangkok, Thailand ; Philippines, Manila : Department of Fisheries, 1988. 623 p.
178. Shelton W. L. Tilapia culture in the 21 st century. Philippines. Philippines Fisheries Society, 2002.
179. Siddiqui A. Q. Reproductive biology of *Tilapia zillii* (Gervais) in Lake Naivasha, Kenya // Environmental Biology of Fishes. 1979. № 4(3). P. 257—262.
180. Sixth International Symposium on Tilapia in Aquaculture : proceedings / eds. R. B. Bolivar, G. C. Mair, K. Fitzsimmons. Manila, Philippines : Bureau of Fisheries & Aquatic Resources, 2004. 682 p.
181. Skinner W. F. *Oreochromis aureus* (Steindachner; *Cichlidae*), an exotic fish species, accidentally introduced to the lower Susquehanna River, Pennsylvania // Proceedings of the Pennsylvania Academy of Science. 1984. № 58. P. 99—100.
182. Spatar Dadzie S. Laboratory experiment on the fecundity and frequency of spawning in *Tilapia aurea* // Bamidgeh. 1970. № 22. P. 14—18.
183. Spataru P. Food and feeding habits of *Tilapia zillii* (Gervais) (*Cichlidae*) in Lake Kinneret (Israel) // Aquaculture. 1978. № 14. P. 327—338.
184. Spataru P., Zorn M. Food and feeding habits of *Tilapia aurea* (Steindachner) (*Cichlidae*) in Lake Kinneret (Israel) // Aquaculture. 1978. № 13 (1). P. 67—79.
185. Suresh A. V., Lin C. K. Tilapia culture in saline waters: a review // Aquaculture. 1992. Vol. 106. P. 201—226.
186. Tacon P. Relationships between the expression of maternal behaviour and ovarian development in the mouthbrooding cichlid fish *Oreochromis niloticus* // Aquaculture. 1996. Vol. 146 (3—4). P. 261—275.
187. Taiwans tilapia farming industry // Eurofish. 2005. № 2. P. 92—93.
188. The intensive culture of tilapia in tanks, raceways and cages. Recent Advances in Aquaculture / eds. Balarin J. D. et al. Boulder, Colorado, USA : Westview Press, 1982. P. 265—355.
189. Tilapia Aquaculture : Fourth International Symposium on Tilapia in Aquaculture : proceed. / ed. Fitzsimmons K. Orlando, Florida, USA : Northeast Regional Agricultural Engineering Service-106, 1997. 808 p.
190. Tilapia Aquaculture in the Americas. Vol. 1. / eds. B. A. Costa-Pierce, J. E. Rakocy. USA, Louisiana, Baton Rouge : World Aquaculture Society, 1997. 258 p.
191. Tilapia Aquaculture in the Americas. Vol. 2. / ed. B. A. Costa-Pierce, J. E. Rakocy. Louisiana, USA : World Aquaculture Society, 2000. 264 p.
192. Tilapia Aquaculture in the 21st Century : Fifth International Symposium on Tilapia in Aquaculture : proceed. / ed. K. Fitzsimmons, F. J. Carvalho. Rio de Janeiro, Brazilia : Ministerio de Agricultura, Departamento de Pesca e Aquicultura, 2000. 682 p.
193. Tilapia European market report // Eurofish. 2004. № 4. P. 75—77.
194. Tilapia Genetic Recources for Aquaculture // Workshop on Tilapia Genetic Resources for Aquaculture, 23-24 March, 1987, Bangkok, Thailand : proceed. / ed. Pullin R. S. V. Manila, Philippines : ICLARM, 1987. 108 p.

195. Tilapia: production, marketing and technical development : Tilapia 2001 : International technical and trade conference on tilapia : proceed. / ed. Subasinghe S., Singhe T. Kuala Lumpur. Malaysia : Infofish, 2001. 852 p.
196. Tilapia production systems in the Americas: technical advances, trends, and challenges / Watanabe W. O. et al. // Reviews in Fisheries Sciences. 2002. Vol. 10 (3–4). P. 65—98.
197. Tilapias as Alien Aquatics in Asia and the Pacific / De Silva S. S. et al. Rome, Italy : Food and Agriculture Organization. Vol. 453. 2004.
198. Teichert-Coddington D., Popma T., Lovshin L. Attributes of tropical pond-cultured fish // Dynamics of Pond Aquaculture. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 1997. P. 183—198.
199. Trewavas E. Tilapiine fish of the genera *Sarotherodon*, *Oreochromis* and *Danakilia*. London : British Museum (Natural History), 1983. 604 p.
200. Tys van den Auenarde D. F. E. Natural distribution of Tilapias and it's consequences for the possible protection of genetic resources // Tilapia genetic resources for aquaculture / ed. Pullin R. Manila, 1988. P. 1—12.
201. Wanghead C., Geater A., Tanasakul R. Effect of acid water on survival and growth rate of Nile tilapia // The second international symposium on tilapia in aquaculture : proceed. Bangkok, Thailand, 1988.
202. Wohlfarth G. W., Hulata G. Applied genetics of tilapias // ICLARM Studies and Reviews 6 : proceed. Manila, Philippines : International Center for Living Aquatic Resources Management, 1983.

REFERENCES

1. Ayman, A. (1994). Perspektivy tovarного vyrashchivaniya tilyapii v sadkakh v reke Nil (Egipet). *Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta*, 1, 79-80.
2. Al'-Khalif, M., Markin, V. I., & Churilov, M. M. (1993). Vliyanie dobavok vitaminov A, D, E na rost, zhiznesposobnost' i ispol'zovanie korma molod'yu tilyapii. *Resursosberegayushchie tekhnologii v rybovodstve*, 58-61.
3. Arutyunov, O. D., Yakubov, Sh. A., & Suvorova, T. F. (1991). *O nekotorykh aspektakh usovershenstvovaniya biotekhniki vyrashchivaniya ob"ektov akvakul'tur*. Astrakhan': Astrakhanskiy tekhnicheskii institut rybnoy promyshlennosti i khozyaystva, 7.
4. Bakir, M. (1996). Iz opyta razvitiya rybovodstva v Egipte. *Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta*, 2, 113-118.
5. Balabanova, L. V. (1992). Funktsional'naya morfologiya immunokompetentnykh kletok mozambikskoy tilyapii pri deystvii kadmiya. *8 Nauchnaya konferentsiya po ekologicheskoy fiziologii i biokhimii ryb*. Petrozavodsk, 15-16.
6. Balabanova, L. V. (1997). Vozdeystvie dikhlofosa na ul'trastrukturu immunokompetentnykh kletok mozambikskoy tilyapii. *Itogi nauchno-prakticheskikh rabot v ikhtiologii*. Moskva, 39.
7. Balabanova, L. V. (1997). Vliyanie kadmiya na ul'trastrukturu immunokompetentnykh kletok mozambikskoy tilyapii *Oreochromis mossambicus*. *Tsitologiya*, 39, 8, 677-680.
8. Boronetskaya, O. I. (2012). Ispol'zovanie tilyapii (*Tilapiinae*) v mirovoy i otechestvennoy akvakul'ture. *Izvestiya TSKhA*, 1, 164-173.

9. Boronetskaya, O. I. (2010). Reproduktivnye pokazateli mozambikskoy tilyapii (*Oreochromis mossambicus*) v zavisimosti ot pH reaktsii vodnoy sredy. *Izvestiya TSKhA*, 6, 131-137.
10. Boronetskaya, O. I., & Tetdoev, V. V. (2008). Rybovodnaya i morfofiziologicheskaya kharakteristika nil'skoy tilyapii (*Oreochromis niloticus* L.). *Vestnik RUDN*, 1, 12-15.
11. Boronetskaya, O. I., & Privezentsev, Yu. A. (2001). Biologicheskie osobennosti i produktivnye kachestva ryb tilyapii porody timiryazevskaya. *Izvestiya TSKhA*, 4, 131-137.
12. Boronetskaya, O. I. (1993). Tekhnologiya vyrashchivaniya tilyapii v prudakh s geotermal'noy vodoy. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moskva.
13. Boronetskaya, O. I. (1990). Morfologicheskaya kharakteristika matochnogo stada goluboy tilyapii. *4-e Vsesoyuznoe soveshchanie po rybokhozyaystvennomu ispol'zovaniyu teplykh vod*. Moskva, 116-118.
14. Bugaets, S. A. (1999). Produktivnye i biologicheskie osobennosti nil'skoy i krasnoy tilyapii i ikh retsiproknnykh gibridov. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moskva.
15. Vasil'eva, E. G., & Bystryakova, E. A. (2009). Izmenenie pokazateley krovi tilyapii pod vliyaniem elektromagnitnogo polya. *Vestnik AGTU*, 1, 119-120.
16. Vladovskaya, S. (1997). Ispol'zovanie afrikanskogo soma dlya kontrolya «dikogo» neresta tilyapii. *Rybnoe khozyaystvo*, 20-23.
17. Vladovskaya, S. (1997). Vliyanie plotnosti posadki na rezul'taty vyrashchivaniya kolossomy i tilyapii poluintensivnym metodom v polikul'ture. *Rybnoe khozyaystvo*, 24-31.
18. Shirina, Ju. M., Kotel'nikov, A. V., Ableev, D. R., Ponomarjov, S. V., & Fjodorovyh, Ju. V. (2017). Vliyanie lechebno-profilakticheskogo preparata ES-2 na funktsional'noe sostoyanie gibrida tilyapii *Oreochromis* spp. *Vestnik AGTU*, 2, 130-136.
19. Tetdoev, V. V., Plieva, T. Kh., Lavrent'eva, N. M., & Mikhaleva, T. A. (2013). Vyrashchivanie tilyapii na rybovodnom predpriyatii s zamknutym tsiklom vodosnabzheniya. *Prirodoobustroystvo*, 1, 56-59.
20. Gdovskiy, P. A., Menzikov, S. A., & Ruzhinskaya, N. N. (1992). ATFazy zhabr tilyapii pri adaptatsii k solenosti. *8 Nauchnaya konferentsiya po ekologicheskoy fiziologii i biokhimii ryb*. Petrozavodsk, 65.
21. Gerbil'skiy, N. L. (1965). Funktsional'naya korrelyatsiya mezhdu rostom i reproduksiey v iskusstvennykh populyatsiyakh tilyapii. *Fiziologicheskie osnovy ekologii zhivotnykh*. Moskva, 26-27.
22. Ivoylov, A. A., Mukhametshina, E. N., Pal'velev, I. V., Kiselev, E. G., & Galasun, V. P. (1988). Gibridnaya tilyapiya — novyy ob"ekt rybovodstva v teplovodnykh sistemakh s zamknutym tsiklom vodosnabzheniya. *Vestnik Leningradskogo universiteta*, 3 (1), 10-16.
23. Sidorova, M. V., Smirnov, A. N., Smirnova, L. A., Sokolov, V. B., Fomichev, A. M., & Glinkin, I. O. Gistologicheskaya kharakteristika muskulatury tovarnoy goluboy tilyapii (*Oreochromis aureum*). *Resursosberegayushchie tekhnologii v rybovodstve*. Moskva, 1993, 67-72.
24. Glinkin, I. O. (1989). Biokhimicheskie markery syvorotki krovi i belykh myshts trekh vidov tilyapiy r. *Oreochromis*. *Intensivnaya tekhnologiya v rybovodstve*. Moskva: MSKhA, 115-120.

25. Golovanova, I. L., & Kuz'mina, V. V. (1998). Vliyanie dikhlofosa, naftalina i kadmiya na morfofunktsional'nye kharakteristiki kishechnika tilyapii *Oreochromis mossambicus* Peters. *Biologiya vnutrennikh vod*, 1, 80-87.
26. Dyundik, O. B. (1990). *Sravnitel'naya otsenka razlichnykh produktov mikrobiosinteza v kachestve osnovnogo istochnika proteina v startovykh kormakh dlya tilyapii Oreochromis mossambicus* Peters. Irkutsk : Irkutskiy universitet, 7.
27. Zhigin, A. V. (2005). Vyrashchivanie tilyapiy v industrial'noy akvakul'ture. *Pribyrezhnoe rybovodstvo i akvakul'tura*, 2, 32.
28. Zaytsev, V. F., & Kychanova, A. V. (2008). Vliyanie kislotnogo stressa na funktsional'noe sostoyanie ryb (na primere tilyapii). *Yug Rossii: ekologiya, razvitie*, 3, 71-74.
29. Zaytsev, V. F., & Gershtanskiy, N. D. (1992). Vliyanie nekotorykh faktorov sredy na reproduktivnuyu funktsiyu tilyapiy. *Ekologicheskie problemy sel'skogo i vodnogo khozyaystva Povolzh'ya*. Saratov, 25-26.
30. Zelennikov, O. V. (1994). Vliyanie zakisleniya vody na oogenezu mozambikskoy tilyapii. Vozdeystvie na ryb na etape differentsirovki pola. *Ontogenez*, 25(2), 31-36.
31. Zelennikov, O. V., & Chmylevskiy, D. A. (1997). Vliyanie zakisleniya vody na rost i razvitie polovykh zhelez tilyapii. *Trudy Biologicheskogo NII SPbGU*, 44, 77-83.
32. Zolotova, A. V., Panov, V. P., & Esavkin, Yu. I. (2013). Rost somaticheskikh struktur i morfometricheskaya kharakteristika skeletnoy muskulatury nil'skoy tilyapii (*Oreochromis niloticus* L.). *Izvestiya TSKhA*, 2, 76-87.
33. Ivoylov, A. A. (1988). Model'nye gruppirovki tilyapiy i analiz ikh razmnozheniya v svyazi s problemoy politsiklicheskogo vyrashchivaniya v ustanovkakh s zamknutym tsiklom vodosnabzheniya. *Extended abstract of candidate's thesis*. Lenigrad.
34. Ivoylov, A. A. (1997). Fenotipicheskaya inversiya pola u samok mozambikskoy tilyapii *Oreochromis mossambicus* (Peters) v rezul'tate primeneniya nekachestvennykh kormov. *Trudy Biologicheskogo NII SPbGU*, 44, 74-76.
35. Izotov, G. P., & Sous', S. M. (1992). *Biotehnika vosproizvodstva i vyrashchivaniya tilyapii v ustanovke s oborotnym vodoobespecheniem*. Novosibirsk: Biologicheskii institut SO RAN, 49.
36. Dyundik, O. B., Gil', T. A., Salovarova, V. P., & Shul'gina, O. L. (1991). Izuchenie sposobnosti molodi mozambikskoy tilyapii (*Oreochromis niloticus* (Peters)) k usvoeniyu tsellyulozy, vkhodyashchey v sostav kormov. *Biologicheskie nauki*, 2, 51-56.
37. Shalgimbaeva, S. M., Asylbekova, S. Zh., Sadvakasova, A. K., Sarmoldaeva, G. R., Kenzheeva, A. N., & Dzhumakhanova, G. B. (2016). Izuchenie vliyaniya produktsionnykh kormov na mikrobiotsenoz organov tilyapii (*Tilapia*) v ustanovkakh zamknutogo vodoobespecheniya. *Vestn. Astrakhan. gos. tekhn. un-ta*, № 3, 94-99.
38. Il'in, N. N. (1991). Tilyapiya. *Rybnoe khozyaystvo*, 10, 92.
39. Privezentsev, Yu. A., Boronetskaya, O. I., Plieva, T. Kh. & Rodoman, V. E. (1996). Ispol'zovanie preparata «Immunovit» dlya kormleniya molodi tilyapii. *Resursosberegayushchie tekhnologii v akvakul'ture*. Krasnodar, 26.
40. Kassil, Dzh. (1997). Akvakul'tura v Izraile. *Rybovodstvo i rybolovstvo*, 1, 27-29.

41. Kozlov, A. I. (2001). Tilyapii — perspektivnye ob"ekty vyrashchivaniya v industrial'noy akvakul'ture Belarusi. *Evropeyskaya akvakul'tura i kadrovoe obespechenie otryasli*. Gorki, 21-26.
42. Kozlov, A. I. (2001). Eksperimental'noe razvedenie i vyrashchivanie goluboy tilyapii (*Oreochromis aureus* Steindacher) v laboratorii-akvarial'noy BGSKhA. *Evropeyskaya akvakul'tura i kadrovoe obespechenie otryasli*. Gorki, 31-33.
43. Kolobova, I. Yu. (1993). Eksperimental'noe vyrashchivanie tilyapii. *Vestnik Astrakhanskogo tekhnicheskogo instituta rybnoy promyshlennosti i khozyaystva*, 1, 78-79.
44. Kostyurina, A. N., & Mel'nik, I. V. (2011). Energeticheskie pokazateli molodi timiryazevskoy tilyapii pri razlichnoy osveshchennosti. *Vestnik AGTU*, 1, 90-93.
45. Kostyurina, A. N., & Mel'nik, I. V. (2009). Znachenie kolebaniy temperatury pri vyrashchivanii molodi timiryazevskoy tilyapii. *Vestnik AGTU*, 2, 88-90.
46. Kraev, N. P. (1966). Tilyapiya v prudakh-okhladitelyakh GRES. *Rybnoe khozyaystvo*, 3, 24-25.
47. Kuz'mina, V. V., & Golovanova, I. L. (1992). Gidroliticheskie funktsii pishchevaritel'nogo trakta tilyapii *Oreochromis mossambicus* Peters. *Biologiya vnutrennikh vod*, 97.
48. Kuz'mina, V. V., & Golovanova, I. L. (1992). Vliyanie nekotorykh antropogennykh faktorov na pishchevaritel'nye gidrolazy tilyapii. 8 *Nauchnaya konferentsiya po ekologicheskoy fiziologii i biokhimii ryb*. Petrozavodsk, 174-175.
49. Lavrent'eva, N. M. (2002). Biologicheskie osobennosti i khozyaystvenno-poleznye kachestva goluboy tilyapii (*Oreochromis aureus*) pri vyrashchivanii v sisteme s zamknutym tsiklom vodosnabzheniya. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moskva : RGAZU.
50. Lange, M. A., & Novikov, G. G. (1998). Eksperimental'nye issledovaniya mekhanizmov rosta kostnoy (elasmoidnoy) cheshui u tilyapiy. *Vozrastnaya i ekologicheskaya fiziologiya ryb*. Borok, 61-62.
51. Magdi, M. A. (2007). Potrebnost' molodi tilyapiy v proteine i effektivnost' ego ispol'zovaniya. *Izvestiya TSKhA*, 4, 132-136.
52. Magdi, M. A. (1992). Rost tilyapii mozambika *Oreochromis mossambicus* i effektivnost' ispol'zovaniya azota pri razlichnom urovne proteina v ratsione. *Izvestiya TSKhA*, 2, 187-190.
53. Magdi, M. A. (1991). Vyrashchivanie molodi tilyapii na kombikormakh s razlichnym urovnem proteina. *Sbornik nauchnykh trudov VNIIPRKh*, 64, 81-82.
54. Markin, V. I. (1995). Osobennosti reproduktivnogo tsikla u tilyapiy. *Sbornik nauchnykh trudov MSKhA*, 29-30.
55. Markin, V. I. (1991). Rybovodnaya i morfofiziologicheskaya kharakteristika mozambikskoy i goluboy tilyapiy, vyrashchennykh v sadkakh na teplykh vodakh. *Puti povysheniya effektivnosti presnovodnoy akvakul'tury*. Moskva, 58-69.
56. Matey, V. E., Pavlov, D. F., & Chuyko, G. M. (1993). Vliyanie kadmiya na strukturu zhabr tilyapii. *Tsitologiya*, 35 (10), 13-19.
57. Mel'nik, I. V., & Kostyurina, A. N. (2010). Vliyanie prodolzhitel'nosti fotoperioda na skorost' rosta i energeticheskie pokazateli molodi timiryazevskoy tilyapii. *Vestnik AGTU*, 2, 112-115.
58. Men'kin, V. K., Privezentsev, Yu. A., & Magdi, M. A. (1993). Vliyanie urovnya proteina na rost i effektivnost' utilizatsii azota tilyapiy mozambika. *Resursosberegayushchie tekhnologii v rybovodstve*. Moskva, 61-67.

59. Mironova, N. V. (1965). Rost tilyapiy (*Tilapia mossambica* Peters) v akvarial'nykh usloviyakh. *Doklady AN SSSR*, 165 (5), 179-1181.
60. Mironova, N. V. (1966). O vozmozhnom tempe narastaniya chislennosti i summarnoy biomassy tilyapii (*Tilapia mossambica* Peters). *Doklady AN SSSR*, 166 (4), 968-969.
61. Mironova, N. V. (1967). Sravnitel'naya otsenka rosta tilyapiy (*Tilapia mossambica* Peters) pri pitanii ikh khlorelloy i drugimi kormami. *Problemy kosmicheskoy biologii*, 7, 505-512.
62. Mikhaylichenko, D. V., Ponomarev, S. V., & Kurakin, I. V. (2015). Sovremennaya geneticheski uluchshennaya poroda tilyapii. *Vestnik AGTU*, 2, 69-75.
63. Nepomnyashchikh, V. A., & Gremyachikh, V. A. (1992). Vliyanie zritel'nogo razdrazhitelya na traektoriyu dvizheniya *Oreochromis mossambicus* Peters (*Cichlidae*). *Nauchnye doklady vysshey shkoly. Biologicheskie nauki*, 10, 55-60.
64. Nepomnyashchikh, V. A., & Gremyachikh, V. A. (1993). Svyaz' mezhdu strukturoy traektorii i asimmetriey vybora napravleniya dvizheniya u tilyapii *Oreochromis mossambicus* Peters (*Cichlidae*). *Zhurnal obshchey biologii*, 54 (5), 619-626.
65. D'Al'meyda, A.-F., Fedorova, N. N., Zaytsev, V. F., & Gershtanskiy, N. D. (1992). O vliyani urovnya solenosti ozer na zhabry tilyapiy. *Sbornik nauchnykh trudov VNIIPRKh*, 66, 90-92.
66. Zharkenov, D. K., Isbekov, K. B., Asylbekova, S. Zh., Koyshybaeva, S. K., Badryzlova, N. S., & Fedorov, E. V. (2017). Opyt vyrashchivaniya tovarnoy produktsii tilyapii v prudakh TOO "Chilikskoe prудovoe khozyaystvo" Almatinskoy oblasti. *Vestnik AGTU*, 2, 86-95.
67. Chmilevskiy, D. A., Stadnik, M. A., Ivoylov, A. A., & Tsvetkov, I. B. (2004). Opyt vyrashchivaniya nil'skoy tilyapii v usloviyakh rybovodnogo khozyaystva leningradskoy atomnoy elektrostantsii. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta*, 2, 3-9.
68. Afifi, E. A., Khafiz, F. A., Abdel'-Khakim, N. F., & Abdella, M. M. (1996). Osobennosti khimicheskogo sostava tela tilyapii, kefali i karpa. 40 *Nauch.-tekhn. konf. professorsko-prepodavatel'skogo sostava AGTU. Astrakhan'*, 239-240.
69. Pavlov, D. F., & Chuyko, G. M. (1992). Dinamika aktivnosti atsetilkholinesterazy i sodержaniya vodorostvorimoy fraktsii belka v mozgu mozambikskoy tilyapii v protsesse privykaniya k khronicheskomu deystviyu kadmiya i naftalina. 8 *Nauchnaya konferentsiya po ekologicheskoy fiziologii i biokhimii ryb. Petrozavodsk*, 33-34.
70. Panov, V. P., Privezentsev, Yu. A., & Parfenov, F. V. (1998). Morfofiziologicheskie osobennosti dvukh vidov tilyapii (*Oreochromis* sp. i *O. niloticus*) i ikh retsiproknykh gibridov v ontogeneze. *Izvestiya TSKhA*, 1, 173-182.
71. Parfenov, F. V. (1997). Gistostruktura glubokoy bokovoy myshtsy molodi tilyapii krasnoy, nil'skoy i ikh retsiproknykh gibridov. *Problemy individual'nogo razvitiya s.-kh. zhivotnykh : sb. nauchn. tr. Ukrainskogo natsional'nogo agrarnogo universiteta. Kiev*, 54.
72. Parfenov, F. V. (1998). Morfofiziologicheskie osobennosti krasnoy tilyapii (*Oreochromis* sp.), nil'skoy tilyapii (*O. niloticus*) i ikh retsiproknykh gibridov. *Extended abstract of candidate's thesis. Moskva*.

73. Kozlova, T. V., Kozlov, A. I., Bubyр', I. V., Raylyan, N. M., & Sholomitskiy, V. P. (2014). Perspektivy vyrashchivaniya tovarnoy tilyapii v usloviyakh pripyatskogo Poles'ya. *Vesnik Paleskaga dzyarzhaynaga universiteta*, 1, 38-43.
74. Plieva, T. Kh., Lavrent'eva, N. M., & Tetdoev, V. V. (2004). Ekologo-fiziologicheskie osobennosti goluboy tilyapii. *Vestn. RGAZU*, 50-51.
75. Podushka, S. B. (2006). Novaya literatura o tilyapiyakh na russkom yazyke (bibliograficheskiy ukazatel'). *Nauchno-tekhnicheskiiy byulleten' laboratorii ikhtiologii INENKO*, 11, 34-49.
76. Polonskiy, A. S. (1994). Tilyapii v akvariumistike. *Rybovodstvo i rybolovstvo*, 2, 27-30.
77. Privezentsev, Yu. A. (2011). *Tilyapii (sistematika, biologiya, khozyaystvennoe ispol'zovanie)*. Moskva: RGAU-MSKhA imeni K. A. Timiryazeva, 122.
78. Privezentsev, Yu. A. (2008). *Tilyapii (sistematika, biologiya, khozyaystvennoe ispol'zovanie)*. Moskva: Stolichnaya tipografiya, 80.
79. Privezentsev, Yu. A., Boronetskaya, O. I., & Plieva, T. Kh. (2006). Metodicheskie rekomendatsii po vosproizvodstvu i vyrashchivaniyu tilyapiy roda *Oreochromis*. Moskva: MSKh RF, 34.
80. Privezentsev, Yu. A., Boronetskaya, O. I., & Bogeruk, A. K. (2006). *Metodicheskie rekomendatsii po vosproizvodstvu i vyrashchivaniyu tilyapiy roda Oreochromis*. M.: RGAU-MSKhA imeni K. A. Timiryazeva. 23.
81. Privezentsev, Yu. A. (1999). Sovremennoe sostoyanie i perspektivy ispol'zovaniya tilyapii v rybovodstve Rossii. *Resursosberegayushchie tekhnologii v akvakul'ture*. Krasnodar: Zdravstvuyte, 83.
82. Privezentsev, Yu. A. (1994). Tilyapii v rybovodstve Rossii. *Rybnoe khozyaystvo*, 3, 46-47.
83. Privezentsev, Yu. A., Savushkina, S. I., & Ali, M. M. (1991). Nekotorye pokazateli krovi tilyapii v zavisimosti ot usloviy kormleniya. *Rybnoe khozyaystvo*, 12, 56.
84. Privezentsev, Yu. A. (1987). Effektivnost' vyrashchivaniya tilyapii na tekhnicheskikh i estestvennykh teplykh vodakh. *Izv. MSKhA*, 2, 147-154.
85. Privezentsev, Yu. A. (1978). Tilyapiya v teplovodnom rybovodstve. *Rybovodstvo i rybolovstvo*, 10-12.
86. Pyrsikov, A. S., Vlasov, V. A., & Revyakin, A. O. (2017). Vyrashchivanie nil'skoy tilyapii (*O. niloticus*) na kombikorme s dobavkoy "Metabolit plus". *Prirodoobustroystvo*, 1, 127-135.
87. Privezentsev, Yu. A., Boronetskaya, O. I., Plieva, T. Kh., & Pulina, G. A. (1997). Rezul'taty issledovaniy po akklimatizatsii i rybokhozyaystvennomu ispol'zovaniyu tilyapiy v Rossii. *Pervyy kongress ikhtologov Rossii*. Moskva: VNIRO, 294.
88. Kurakin, I. V., Mikhaylichenko, D. V., Ponomarev, S. V., Fedorovykh, Yu. V., Bakaneva, Yu. M., & Miroshnikova, E. P. (2015). Retseptura kormov dlya tilyapii vyrashchivaemoy v industrial'nykh usloviyakh. *Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta*, 6 (181), 49-56.
89. Sal'nikov, N. E., & Salakh, A. (1993). Primenenie steroidnogo gormona i gibridizatsii dlya polucheniya samtsovoy populyatsii tilyapii. *Problemy razvitiya presnovodnoy akvakul'tury*. Moskva, 109-111.
90. Sal'nikov, N. E., & Ntamuganga, I. (1993). Iz opyta raboty integrirovannykh fermerskikh rybovodnykh khozyaystv. *Problemy razvitiya presnovodnoy akvakul'tury*. Moskva, 63-65.

91. Sevast'yanov, A. V., Ivoylov, A. A., & Chmylevskiy, D. A. (1995). Vliyanie iskusstvennykh kormov na reproduktivnye sposobnosti mozambikskoy tilyapii (*Oreochromis mossambicus* Peters). *Vestnik S.-Peterburgskogo universiteta*, 4 (24), 30-35.
92. Sklyarov, V. Ya., & Dyundik, O. B. (1995). Korma dlya tilyapii. *Rybovodstvo i rybolovstvo*, 2, 28.
93. Oziransky, Yu., Kolesnyk, N., Shcherbak, S., Kononenko, R., Fedorenko, M., Mosnitsky, V., & Nekrasov, S. (2017). Sovremennoe sostoyanie rybokhozyaystvennoy otrasli Izrailiya (Obzor). *Rybohospodars'ka nauka Ukrainy*, 1 (40), 6-28.
94. D'Al'meyda, A.-F., Zaytsev, V. F., & Fedorova, N. N. (1992). Stepen' povrezhdeniya tkaney lichinok *Oreochromis mossambicus* (Peters) pod vliyaniem temperaturnogo faktora. *Sbornik nauchnykh trudov VNIIPRKh*, 66, 35-40.
95. Stepanova, V. M., Pavlov D. F., & Chuyko, G. M. (1992). Khronicheskoe deystvie kadmiya i DDVF na retikulolimfoidnuyu tkan' mozambikskoy tilyapii. 8 *Nauchnaya konferentsiya po ekologicheskoy fiziologii i biokhimii ryb*. Petrozavodsk, 113.
96. Stepanova, V. M., Chuyko, G. M., & Pavlov, D. F. (1992). Morfologicheskaya struktura perifericheskoy krovi mozambikskoy tilyapii pri adaptatsii k khronicheskomu deystviyu toksicheskikh veshchestv. 8 *Nauchnaya konferentsiya po ekologicheskoy fiziologii i biokhimii ryb*. Petrozavodsk, 114-115.
97. Tetdoev, V. V. (2009). Vospriizvodstvo i vyrashchivanie tilyapii v vodoemakh s raznymi ekologicheskimi usloviyami. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moskva: RGAZU.
98. Tetdoev, V. V. (2009). *Razmnzhenie i vyrashchivanie tilyapii v estestvennykh vodoemakh i v usloviyakh industrial'nykh rybovodnykh khozyaystv*. Moskva: RGAZU, 102.
99. Tetdoev, V. V., & Plieva, T. Kh. (2009). Ekologicheskie usloviya razlichnykh tipov vodoemov dlya vyrashchivaniya tilyapii. *Vestnik RUDN*, 3, 47-51.
100. Tetdoev, V. V., & Boronetskaya, O. I. (2008). Ekologicheskie usloviya prudov s geotermal'nym vodosnabzheniem dlya vyrashchivaniya tilyapii. *Vestnik RGAZU*, 4 (9), 98-100.
101. Tetdoev, V. V. (2007). Potrebnost' nil'skoy tilyapii (*Oreochromis niloticus*) v kislorode pri ekstremal'nykh faktorakh sredy. *Vestnik RUDN*, 3, 10-15.
102. Tetdoev, V. V. (2009). Vliyanie kisloy reaktsii sredy na rost i reproduktivnuyu sistemu mozambikskoy tilyapii (*Oreochromis mossambicus*). *Vestnik RUDN*, 3, 16-19.
103. Tetdoev, V. V. (2004). Vneshnyaya sreda i gematologicheskie pokazateli goluboy tilyapii. *Agrarnaya nauka*, 1, 10-12.
104. Privezentsev, Yu. A., Boronetskaya, O. I., Zhigin, A. V., et al. *Tilyapiya timiryazevskaya*. Patent of Russian Federation. №1952.
105. Filatov, V. I., Kiselev, A. Yu., & Slepnev, V. A. (1990). Sostoyanie i perspektivy razvitiya v SSSR rybovodstva v zamknutykh sistemakh. *Sbornik nauchnykh trudov VNIIPRKh*, 59, 46-56.
106. Fomichev, A. M. (1991). Rybovodnaya i morfofiziologicheskaya kharakteristika retsiproknykh gibridov mozambikskoy (*Oreochromis mossambicus*) i goluboy (*O. aureus*) tilyapiy. *Puti povysheniya effektivnosti presnovodnoy akvakul'tury*. Moskva, 115-120.

107. Fomichev, A. M. (1991). Rybokhozyaystvennaya kharakteristika retsiproknykh gibridov mozambikskoy, goluboy i krasnoy tilyapii roda *Oreochromis*. *Izvestiya Timiryazevskoy sel'skokhozyaystvennoy akademii*, 1, 173-180.
108. Ustinov, A. S. (2005). Tekhnologiya sovmestnogo vyrashchivaniya karpa i goluboy tilyapii v industrial'nom rybovodstve. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moskva: RGAU-MSKhA imeni K. A. Timiryazeva.
109. Chernokozheva, I. S., & Chmilevskiy, D. A. (1992). Formirovanie teploustoychivosti tilyapiy vtorogo pokoleniya putem vozdeystviya ponizhennoy temperatury na raznye etapy oogeneza roditeley. 8 *Nauchnaya konferentsiya po ekologicheskoy fiziologii i biokhimii ryb*. Petrozavodsk, 157-158.
110. Chernokozheva, I. S., & Chmilevskiy, D. A. (1993). Analiz teploustoychivosti tilyapiy pervogo pokoleniya posle vozdeystviya ponizhennoy temperatury na samok s gonadami tret'ey stadii zrelosti. *Izvestiya RAN*, 4, 535-541.
111. Chmilevskiy, D. A., & Iosifova, T. E. (1999). Morfologiya i dinamika chisla polovykh kletok v rannem ontogeneze mozambikskoy tilyapii. *Tsitologiya*, 2, 135-139.
112. Chmilevskiy, D. A. (1998). Vliyanie ponizhennoy temperatury na rost tilyapii *Oreochromis mossambicus*. *Voprosy ikhtiologii*, 38 (1), 92-99.
113. Chmilevskiy, D. A. (1997). Oogenez tilyapii (*Oreochromis mossambicus* Peters) pri povyshennoy temperature. *Pervyy kongress ikhtologov Rossii*. Moskva: VNIRO, 260-261.
114. Chmilevskiy, D. A. (1996). Vliyanie ponizhennoy temperatury na oogenez tilyapii (*Oreochromis mossambicus* Peters). 4. Vozdeystvie na ryb v vozraste 106 sutok posle vylupleniya. *Voprosy ikhtiologii*, 36 (5), 647-652.
115. Chmilevskiy, D. A. (1993). Vliyanie rentgenovskogo oblucheniya na razvitie gonad tilyapii. *Radiobiologicheskyy s"ezd*. Pushchino, 1116-1117.
116. Chmilevskiy, D. A. (1994). Vliyanie ponizhennoy temperatury na oogenez tilyapii (*Oreochromis mossambicus* Peters). 2. Vozdeystvie na ryb v vozraste 22 sutok posle vylupleniya. *Voprosy ikhtiologii*, 34 (5), 675-680.
117. Shcherbakov, D. A. (2000). Rost i morfologicheskie pokazateli krasnoy tilyapii (*Oreochromis mossambicus* × *O. niloticus*), vyrashchivaemoy pri razlichnykh znacheniyakh pH vody. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moskva.
118. Akinrotimi, O. A., Uedeme, A. B., & Agokei, E. O. (2010). Effects of acclimation on haematological parameters of *Tilapia guineensis* (Bleeker, 1862). *Science World Journal*, 4 (5), 1-4.
119. *An Impact Evaluation of the Development of Genetically Improved Farmed Tilapia and Their Dissemination in Selected Countries*. (2005). Manila, Phillippines: Asian Development Bank.
120. *Overview of Freshwater Aquaculture of Tilapia in the Philippines*. (2004). Manila, Phillippines: Asian Development Bank.
121. Babiker, M. M., & Ibrahim, H. (1979). Studies on the biology of reproduction in the cichlid *Tilapia nilotica* (L.): Gonadal maturation and fecundity. *J. Fish. Biol.*, 14, 437-447.
122. Balshine-Earn, S. (1995). The costs of parental care in Galilee St. Peter's Fish, *Sarotherodon galilaeus*. *Animal Behaviour*, 50 (1), 1-7.
123. Barlow, G. W. (2000). The Cichlid Fishes. *Cambridge, MA: Perseus Publishing*.
124. Bene C., & Heck, S. (2005). Fish and food security in Africa. *NAGA, WorldFish Center Q*, 28, 8-13.

125. Gupta, M. V., Acosta, B. O., Eknath, A. E., & Dey, M. M. Breakthrough in genetic improvement of tropical finfish through partnership between ICLARM, ASI and developing country NARS. [www.fao.org](http://www.fao.org/docs/eims/upload/206603/3_8_cases.PDF). Retrived from http://www.fao.org/docs/eims/upload/206603/3_8_cases.PDF.
126. Bruce, M. (2005). An impact evaluation of the development of genetically improved farmed tilapia and their dissemination in selected countries. *Asian Development Bank*.
127. Bwanika, G., Murie, D., & Chapman, L. (2007). Comparative age and growth of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus* L.) in lakes Nabugabo and Wamala, Uganda. *Hydrobiologia*, 589, 287-301.
128. Caulton, M. S. (1977). The effect of temperature on routine metabolism to *Tilapia rendalli*. *Journal Fish Biol*, 549-553.
129. Chervinski, J. (1982). Environmental physiology of tilapias. *ICLARM Conf.: proceed*. Manila, Philippines.
130. *Tilapia Feed* (2009). Coppens.
131. Courtenay, W. (1997). Tilapias as non-indigenous species in the Americas: Environmental, regulatory and legal issues. *Tilapia Aquac. Am. I*, 18-33.
132. Dey, M. M., & Gupta, M. V. (2000). Socioeconomics of disseminating genetically improved Nile tilapia in Asia: An introduction. *Aquac. Econ. Manag*, 4, 5-11.
133. Eknath, A., & Acosta, B. (1998). Genetic Improvement of Farmed Tilapias (GIFT) Project. *Final Report, March 1988 to December 1997*. Penang, Malaysia: World Fish Center.
134. El-Shazly, A. (1993). Biological Studies On Four Cichlid Fishes (*Tilapia nilotica*, *Tilapia galilae*, *Tilapia zillii*, *Tilapia aurea*). *Thesis M. Sc*. Egypt: Fac. Sci. Zagazig Univ.
135. El-Saidy, M., & Gaber, M. (2002). Intensive culture of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) in Egypt. *First Scientific Conference of the Egyptian Agriculture Society: proceed*. Suez Canal University.
136. El-Sayed, A. F. M. (2006). *Tilapia Culture*. Cambridge, MA, USA: CABI, 277.
137. Beveridge, M. C. M., & McAndrew, B. J. (Eds.). (2000). *Tilapias: Biology and Exploitation. Fish and Fisheries Series 25*. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
138. Farmer, G. I., & Beamish, F. M. (1969). Oxygen consumption of *Tilapia nilotica* in relation to swimming speed and salinity. *J. Fish Res.*, 2807-2821.
139. Toguyeni, A., Fauconneau, B., Boujard, T., Fostier, A., Kuhn, E., Mol, K., & Baroiller, J. (1997). Feeding behaviour and food utilisation in tilapia, *Oreochromis niloticus*: Effect of sex ratio and relationship with the endocrine status. *Physiology & Behavior*, 62 (2), 273-279.
140. Fernandes Y. (2006). *Natural mating in Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) Implications for reproductive success, inbreeding and cannibalism*. Wageningen, Netherlands.
141. Fessehay, Y., & Rantin, F. T. (1986). Lethal temperatures of *Oreochromis niloticus* (Pisces, Cichlidae). *Rev. Brasil. Biol.*, 46 (3), 589-595.
142. Fishelson, L., & Yaron, Z. (Eds.) (1983). *Proceedings of the First International Symposium on Tilapia in Aquaculture*. Nazareth, Israel: Tel Aviv University.
143. Fitzsimmons, K., Ramotor, P., & Lerozi, B. (2013). *10 International Symposium on Tilapia in Aquaculture*. Jerusalem, Israel, 22.
144. Fitzsimmons, K. (2010). Potential to increase global tilapia production. *Global Outlook for Aquaculture Leadership*. Kuala Lumpur, Malaysia.

145. *The State of World Fisheries and Aquaculture*. (2010). Rome, Italy: Food and Agriculture Organization (United Nations).
146. Eknath, A. E., Tayamen, M. M., Palada-de Vera, M. S., Danting, J. C., Reyes, R. A., et al. (1993). Genetic improvement of farmed tilapias: The growth performance of eight strains of *Oreochromis niloticus* tested in different farm environments. *Aquaculture*, 111, 171-188.
147. Bentsen, H. B., Gjerd B., Nguyen, N. H., Rye, M., Ponzoni, R. W., et al. (2012). Genetic improvement of farmed tilapias: Genetic parameters for body weight at harvest in Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) during five generations of testing in multiple environments. *Aquaculture*, 338, 56-65.
148. Ponzoni, R. W., Nguyen, N. H., Khaw, H. L., Hamzah, A., Bakar, K. R. A., & Yee, H. Y. (2011). Genetic improvement of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) with special reference to the work conducted by the Worldfish Center with the GIFT strain. *Rev. Aquac.*, 3, 27-41.
149. Gohar, H., Latif, A., & El-Saady, B. (1972). Reproduction in tilapia nilotica Linn. Morphological peculiarities of the gonad. *Proc. Egypt. Acad. Sci.*, 25, 107-123.
150. Habel, M. L. (1975). Overwintering of the cichlid, *Tilapia aurea*, produces fourteen tons of harvestable size fish in a south Alabama bass-bluegill public fishing lake. *Progressive Fish-Culturist*, 37, 31-32.
151. Hales, L. S., (1989). Occurrence of an introduced African cichlid, the blue tilapia, *Tilapia aurea* (Perciformes: Cichlidae), in a Skidaway River tidal creek: Unpublished mimeograph. Athens: Department of Zoology and Institute of Ecology, University of Georgia; Savanna, GA: Marine Extension Service Aquarium, Georgia Sea Grant College Program.
152. Hauser, W. J. (1975). An unusually fast growth rate for *Tilapia zillii*. *California Department of Fish and Game*, 61(1), 54-56.
153. Bhaskar, M., Sobha Rani, P., Chalapathy Rao, M., Redanna, P., & Govindappa, S. (1985). Hepatic tissue lipid profiles in freshwater fish (*Oreochromis mossambicus* Trewavas) acclimated to acidic and alkaline media. *Geobios* 5 (12), 200-233.
154. Hickling, Ch. (1963). The cultivation of tilapia. *Scientific American*, 208 (5), 143-152.
155. Jensen, K. W. (1957). Determination of age and growth of *Tilapia nilotica* L., *T. galilaea* Art., *T. zillii* Gerv. and *Lates niloticus* C. et V. by means of their scales. *K. Norske Vidensk. Selsk. Forh.*, 30, 150-157.
156. Job, S. V. (1969). The respiratory metabolism of *Tilapia mossambicus*. The effect of size, temperature, salinity and partial pressure of oxygen. *Mar. Biol.*, 222-226.
157. Kausik, R. J. (1986). Parental influences on egg quality, fry production and fry performance in *Oreochromis niloticus* (Linnaeus) and *O. mossambicus* (Peters). *Aquacult. Fish. Manage.*, 20, 49-57.
158. Khallaf, E. A., & Alne-na-ei, A. A. (1987). Feeding ecology of *Oreochromis niloticus* (Linnaeus) & *Tilapia zillii* (Gervais) in a Nile Canal. *Hydrobiologia*, 146, 57-62.
159. Kutty, M. N. (1972). Respiratory quotient on the and ammonia excretion in *Tilapia mossambicus*. *Mar. Biol.*, 16, 126-133.
160. Landau, R. (1979). Growth and population studies on *Tilapia galilaea* in Lake Kinneret. *Freshwat. Biol.* 9, 23-32.
161. Latif, A. A., & Saady, B. E. (1973). Reproduction in the Nile Bolti, *Tilapia nilotica*. *Bull. Inst. Ocean. Fish.*, 3, 120-142.

162. Lim, C. E., & Webster, C. D. (2006). *Tilapia: Biology, Culture, and Nutrition*. Food products press.
163. Loran, R. (1960). Adaptability of *Tilapia nilotica* to various salinite conditions. *Bamidgeh*, 12 (4), 96-99.
164. Lowe-McConnel, R. H. (1982). *The biology and culture of Tilapias*. Conf. Proc.-7. Manila, Phillipines: Inter. Cent. For Living Aquatic Resor. Manag.
165. Macintosh, D. J., & Silva, S. S. (1982). The influence of dosage and time of treatment on the effect of metyltestosteron fed fry of *O. mossambicus*. *Aquaculture*, 12.
166. Magid, A. M., & Babiker, G. N. (1975). Oxygen consumption of *Tilapia nilotica*. *Hydrobiologia*, 33, 513-522.
167. McDonald, E. M. (1987). Interactions between a phytoplanktivorous fish, *Oreochromis aureus*, and two unialgal forage populations. *Environmental Biology of Fishes*, 18, 229-234.
168. Melard, C., & Philippart, J. C. (1980). Pisciculture intensive de *S. niloticus*. *Aquaculture*, 11-28.
169. Payne, A. I., & Collinson, R. I. (1983). A comparison of the biological characteristics of *Sarotherodon niloticus* (L.) with those of *S. aureus* (Steindachner) and other tilapia of the delta and lower Nile. *Aquaculture*, 30 (1-4), 335-351.
170. Philippart, J. C., & Melard, Ch. (1980). Belgian power station heats in tilapia tanks. *Fish Farming International (U.K.)*, 7, 14-15.
171. Ponzoni, R. W., Nguyen, N. H., & Khaw, H. L. (2007). Investment appraisal of genetic improvement programs in Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*). *Aquaculture*, 269, 187-199.
172. Poompuang, S., & Hallerman, E. M. (1997). Toward detection of quantitative trait loci and marker-assisted selection in fish. *Rev. Fish. Sci.*, 5, 253-277.
173. Popma, T. (1999). *Tilapia Life History and Biology*. Southern Region Aquaculture Center.
174. Pullin, R. (1985). Tilapia: Everyman's fish. *Biologist*, 32, 84-88.
175. Rothbard, S., & Peretz, Y. *Tilapia culture in Neger*. Fish Breeding center. Israel, 2002.
176. Schwanck, E., & Rona, K. (1991). Male-female parental roles in *Sarotherodon galilaeus* (Pisces: Cichlidae). *Ethology*, 89, 229-243.
177. Pullin, R. S. V., Bhukaswan, T., Tonguthai, K., & Maclean, J. L. (Eds.). (1988). *Proceedings of the Second International Symposium on Tilapia in Aquaculture. ICLARM Conference Proceedings 15*. Bangkok, Thailand: Department of Fisheries.
178. Shelton, W. L. (2002). *Tilapia culture in the 21 st century*. Philippines: Philippines Fisheries Society.
179. Siddiqui, A. Q. (1979). Reproductive biology of *Tilapia zillii* (Gervais) in Lake Naivasha, Kenya. *Environmental Biology of Fishes*, 4(3), 257-262.
180. Bolivar, R. B., Mair, G. C., & Fitzsimmons, K. (Eds.). (2004). *Proceedings of the Sixth International Symposium on Tilapia in Aquaculture, September, 2004*. Manila, Philippines: Bureau of Fisheries & Aquatic Resources.
181. Skinner, W. F. (1984). *Oreochromis aureus* (Steindachner; Cichlidae), an exotic fish species, accidentally introduced to the lower Susquehanna River, Pennsylvania. *Proceedings of the Pennsylvania Academy of Science*, 58, 99-100.

182. Spatar, Dadzie S. (1970). Laboratory experiment on the fecundity and frequency of spawning in *Tilapia aurea*. *Bamidgeh*, 22, 14-18.
183. Spataru, P. (1978). Food and feeding habits of *Tilapia zillii* (Gervais) (Cichlidae) in Lake Kinneret (Israel). *Aquaculture*, 14, 327-338.
184. Spataru, P., & Zorn, M. (1978). Food and feeding habits of *Tilapia aurea* (Steindachner) (Cichlidae) in Lake Kinneret (Israel). *Aquaculture*, 13(1), 67-79.
185. Suresh, A. V., & Lin, C. K. (1992). Tilapia culture in saline waters: a review. *Aquaculture*, 106, 201-226.
186. Tacon, P. (1996). Relationships between the expression of maternal behaviour and ovarian development in the mouthbrooding cichlid fish *Oreochromis niloticus*. *Aquaculture*, 146 (3-4), 261-275.
187. Taiwans tilapia farming industry. (2005). *Eurofish*, 2, 92-93.
188. Balarin, J. D., & Haller, R. D. (1982). *The intensive culture of tilapia in tanks, raceways and cages*. Recent Advances in Aquaculture. Muir, J. F., & Roberts, R. J. (Eds.). Boulder, Colorado, USA: Westview Press.
189. Fitzsimmons, K. (Ed.). (1997). *Tilapia Aquaculture: Proceedings of the Fourth International Symposium on Tilapia in Aquaculture*. Orlando, Florida, USA: Northeast Regional Agricultural Engineering Service-106.
190. Costa-Pierce, B. A., & Rakocy, J. E. (Eds.). (1997). *Tilapia Aquaculture in the Americas*. (Vol. 1). Baton Rouge, Louisiana, USA: World Aquaculture Society.
191. Costa-Pierce, B. A., & Rakocy, J. E. (Eds.). (2000). *Tilapia Aquaculture in the Americas*. (Vol. 2). Baton Rouge, Louisiana, USA: World Aquaculture Society.
192. Fitzsimmons, K., & Filho, J. C. (Eds.). (2000). *Tilapia Aquaculture in the 21st Century: Proceedings of the Fifth International Symposium on Tilapia in Aquaculture*. Rio de Janeiro, Brazil: Ministério de Agricultura.
193. Tilapia European market report. (2004). *Eurofish*, 4, 75-77.
194. Tilapia Genetic Resources for Aquaculture. (1988). *Workshop on Tilapia Genetic Resources for Aquaculture*. ICLARM. Manila, Philippines.
195. Tilapia: production, marketing and technical development: Proceedings of the Tilapia 2001 — International technical and trade conference on tilapia. (2001). Malaysia, Kuala Lumpur: Infofish.
196. Watanabe, W. O., Losordo, T. M., Fitzsimmons, K., & Hanley, F. (2002). Tilapia production systems in the Americas: technical advances, trends, and challenges. *Reviews in Fisheries Sciences*, 10 (3-4), 465-498.
197. De Silva, S. S., Subasinghe, R. P., Bartley, D. M., & Lowther, A. (2004). Tilapias as Alien Aquatics in Asia and the Pacific: A Review. *FAO Fisheries Technical Paper*, 453.
198. Teichert-Coddington, D., Popma, T., & Lovshin, L. (1997). Attributes of tropical pond-cultured fish. *Dynamics of Pond Aquaculture*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 183-198.
199. Trewavas, E. (1983). *Tilapiine fish of the genera Sarotherodon, Oreochromis and Danakilia*. London: British Museum (Natural History).
200. Tys van den Auenaerde, D. F. E. (1988). Natural distribution of Tilapias and it's consequences for the possible protection of genetic resources. *Tilapia genetic resources for aquaculture*. Manila.
201. Wanghead, C., Geater, A., & Tanasakul, R. (1988). Effect of acid water on survival and growth rate of Nile tilapia. *The second international symposium on tilapia in aquaculture*. Bangkok, Thailand.

202. Wohlfarth, G. W., & Hulata, G. (1983). Applied genetics of tilapias. *ICLARM Studies and Reviews 6 International Center for Living Aquatic Resources Management*. Manila, Philippines.

ТИЛЯПИИ (TILAPIINAE). ТЕМАТИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Н. Л. Колесник, kolesnik@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

Цель. Формирование справочного библиографического перечня публикаций по вопросам особенностей биотехники культивирования рыб из трибы тилапий (Tilapiinae), в соответствии со спецификой функционирования аквакультуры в условиях различных типов хозяйств стран Европы, Азии и Африки.

Методика. В процессе подготовки тематического библиографического перечня, в ходе системного поиска были применены целостный и выборочный методы. Библиографическое ядро составляли литературные источники из фонда научной библиотеки Института рыбного хозяйства НААН и научной электронной библиотеки «КиберЛенинка».

Результаты. Сформирован библиографический перечень основных работ: тематических научных сборников, материалов международных научно-практических конференций, научных статей и авторефератов диссертаций. Он насчитывает 202 источника, из которых 85 — англоязычные. Представленные публикации охватывают временной интервал с 1965 по 2017 гг., однако большинство из них издано после 1991 г. В научных источниках освещены результаты исследований по вопросам кормления, селекции, экологии, технологии культивирования и рыбоводно-биологических характеристик одной из самых распространенных в мировой аквакультуре триб рыб — тилапий. Литературные источники размещены в алфавитном порядке по автору или названию, описаны по ГОСТ 8302:2015 «Информация и документация. Библиографическая ссылка. Общие положения и правила составления», с учетом поправок (код УКНД 01.140.40), а также в соответствии с требованиями к оформлению списка литературы по международному стандарту APA style.

Практическая значимость. Подготовленный перечень может быть полезным для ученых, практиков, студентов, сфера интересов которых касается вопросов культивирования и исследования биологических особенностей рыб из трибы тилапий.

Ключевые слова: тилапии, аквакультура, садки, пруды, установки замкнутого водоснабжения (УЗВ), акклиматизация, геотермальные воды, тяжелые металлы, гибридизация.

НОВЕ МЕТОДИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО З КУЛЬТИВУВАННЯ КОРМОВИХ ТА ЇСТІВНИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ

Р. В. Кононенко, ruslan_kononenko@ukr.net, Національний університет
біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Рецензія на монографію: Basics of aquaculture and hydrobiotechnology / [Fedonenko O., Marenkov O., Sharamok T., Kolesnik N., Grygorenko T., Symon M.] //World Scientific News. 2017. Vol. 88, № 1. P. 1—57.

Загальновідомо, що населення планети Земля зростає, а ресурсів, зокрема води та їжі, стає дедалі менше. І якщо на теренах України екологічний аспект не є різуче гострим, то беззаперечно, що таким є економічний. Отже, головною метою як науковця, так і підприємця є пошук шляху, що дозволить би вирішити проблему мінімізації витрачених ресурсів при максимізації отриманої високоякісної продукції. Саме тут у пригоді стануть знання з культивування кормових та їстівних гідробіонтів, як у промислових масштабах, так і з огляду на дрібне фермерське підприємство.

З давніх часів людство розвивається в напрямку тотального культивування всіх необхідних для задоволення його потреб організмів. Останні дослідження аквакультури та гідробіології дозволяють реалізувати проект високоефективного та екологічно безпечного господарства, спираючись саме на методологічні засади біотехнологій.

Кормові організми (мікроводорості, найпростіші, коловертки, гіллястовусі, веслоногі, нематоди, каліфорнійський та інші черви, личинки хірономід) є не лише повноцінними живими кормами, які забезпечать молодь риб всіма необхідними поживними речовинами, а й запорукою фінансової незалежності господарства. Більшість з них невибагливі, здатні довго зберігатись, не втрачаючи своїх властивостей, та можуть бути реалізовані як на інших господарствах, так і через мережу магазинів для рибалок і акваріумістів.

Їстівні гідробіонти (гігантські креветки, раки, виноградний та інші слимаки) є не тільки джерелом високоцінного білка, а й делікатесною продукцією, що завжди користується попитом. Крім того, при використанні для їх культивування установок замкненого водопостачання (УЗВ) ресурси площі та водопостачання витрачаються вкрай економно.

У Передмові монографії розглядаються основні засади технологій культивування безхребетних організмів в умовах господарств, чия діяльність знаходиться в царині аквакультури.

Підкреслюється необхідність забезпечення молоді риб живими кормами як джерелом легкозасвоюваного білка, у тому числі для формування адекватної поведінки, що забезпечить високу рибопродуктивність у подальшому.

© Р. В. Кононенко, 2018

Розділ I присвячено біотехнології культивування мікроводоростей, зокрема *Spirulina*, *Botryococcus*, *Scenedesmus obliquus*, *Chlorella vulgaris*, *Chlorella pyrenoidosa*, *Chlorella obliquus*, *Chlorella* spp. як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях. Слід відзначити, що спіруліна завдяки своєму особливому біохімічному складу використовується для нормалізації фізіологічних функцій організму та профілактики різних хвороб, а також сприяє підвищенню рівня гемоглобіну і зниженню рівня цукру в крові. Хлорелові водорості є основним об'єктом масового культивування, що започаткували фікотехнологію, в першу чергу завдяки своїй поживній цінності. У перерахунку на суху речовину вони містять 40% і більше повноцінних білків, ліпідів — до 20%, вуглеводів — до 35%, зольних речовин — до 10%. Крім того, вони багаті вітамінами групи В, аскорбіною кислотою (вітамін С) та філохінонами (вітамін К). Крім того, у них знайдено речовину, яка має антибіотичну активність — «хлорелін». Таким чином, у багатьох країнах світу мікроводорості використовують не лише у тваринництві, а й у харчовій та косметологічній промисловостях. У цьому розділі авторами розглянуті всі необхідні умови для отримання якісної продукції мікроводоростей в залежності від типу господарства.

Розділ II надає основні методологічні засади біотехнології культивування найпростіших, зокрема *Paramecium caudatum*, *Paramecium bursaria*, *Paramecium aurelia*, *Colpoda steinii*, *Stylonychia pustulata*. Живлячись бактеріями, ці найпростіші очищують воду та є основним компонентом «живого пилу», адже їх суха речовина містить 58,1% білка, 31,7% жиру та лише 3,4% золи. В зазначеному розділі особливу увагу автори звернули на метод С. Корнієнка. Крім того, наведені всі необхідні значення параметрів навколишнього середовища для успішного культивування цих організмів.

У III розділі дано біологічну характеристику коловерток (*Rotifers*), зокрема *Brachionus calyciflorus* — одного з найпопулярніших видів корму для молоді риб, що входить до так званого «живого пилу». Особливих перспектив надає здатність коловерток розмножуватись у м'якій та дистильованій воді. Отже, у розділі описана біотехнологія їх культивування та детально розібрані особливості оптимальної годівлі та температурного режиму.

Розділ IV містить інформацію стосовно біологічної характеристики та біотехнології культивування гіллястовусих ракоподібних (*Cladocera*). Докладно описані умови, що необхідні для ефективного культивування *Daphnia magna*, *Daphnia cucullata*, *Daphnia longispina*, *Daphnia pulex*, *Moina* spp. як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях. Вищенаведені кормові організми незамінні при годівлі молоді риб як джерело незамінних вітамінів і мінеральних речовин. В акваріумістиці ці рачки набули широко використання як стимулятор нересту та для покращення забарвлення риб. У розділі особливу увагу приділено технології годівлі молоді риб цими організмами, надані рекомендації в залежності від маси личинок.

Розділ V описує біотехнологію культивування веслоногих (*Copepoda*) ракоподібних, зяброні (*Branchiopoda*) на прикладі *Artemia salina* та *Streptocephalus torvicornis*. Цінність артемії як кормового об'єкта обумовлена наступним: можливістю збагачення вітамінами та поліненасиченими жирними кислотами, тим самим підвищуючи показники росту та розвитку молоді риб; хімічним складом жиру, який на 88% представлений насиченими і

мононенасиченими та на 12% — поліненасиченими жирними кислотами; високим вмістом протеїну (60%); наявністю понад 50% незамінних амінокислот; високим вмістом вітаміну B₁₂ (ціанкобаламіну) — до 7,2 мкг/г; доброю перетравністю декапсульованих яєць личинками; невеликими розмірами (0,3–0,5 мм), які дозволяють розпочинати годівлю личинок риб на ранніх стадіях розвитку; повільним рухом, що забезпечує доступність здобичі для личинок; здатністю до інтенсивного росту за високих щільностей посадки (понад 10 тисяч особин на 1 дм³ солоної води); високою плодючістю (понад 100 наупліїв кожні 4 дні); вражаючими можливостями адаптації до солоності, температури чи кисневого режиму; здатністю зберігатися, не втрачаючи своїх якостей тривалий час. Авторами покроково розписана вся технологія культивування, надана детальна інформація та схеми необхідного обладнання, розібрана технологія пробудження та зберігання яєць, а також отримання наупліїв. Подані оптимальні умови для їх культивування на господарствах різних потужностей.

Розділ VI надає інформацію стосовно біотехнології культивування гігантської прісноводної креветки *Macrobrachium rosenbergii*. Їй притаманні високі темпи росту: за 4 місяці вона досягає маси 50 г (товарної маси), за 9 місяців — 100 г, а за рік — 150 г. Характеризуючись високими смаковими якостями, ця креветка вважається делікатесним продуктом у всіх країнах і користується необмеженим попитом. У вищезазначеному розділі детально розібрана технологія її культивування в басейнах з підвищеною щільністю посадки. Особлива увага приділена розділенню самців і самиць, а також відбору яєць.

Розділ VII проілюстровано кресленнями як басейнів, так і ставів для повного циклу культивування вищих раків. Матеріал подано на прикладі європейського або широкопалого (*Astacus astacus*), та дунайського, або довгопалого (*Astacus leptodactylus*), раків. Обидва види вже багато століть є популярним дієтичним продуктом харчування, завдяки ніжному м'ясу, хімічний склад якого багатий вітамінами і корисними мінералами, за відсутності холестерину. Лікарями-дієтологами доведено, що вживання цього продукту стимулює роботу жовчовивідних шляхів і покращує роботу печінки. При систематичному введенні в меню він допомагає налагодити роботу шлунку. В народній медицині широко застосовуються панцирі цих членистоногих, зокрема для прискорення загоювання ран, позбавлення від наслідків шкідливих звичок тощо. Автори докладно розбирають специфічні хвороби та проблемні моменти розмноження цих безхребетних.

У розділі VIII надано інформацію стосовно біотехніки культивування каліфорнійського черв'яка (*Eisenia andrei*) — виду інтенсивного типу, вимогливого до умов годівлі та утримання, але високопродуктивного. Зокрема, з 70-х років ХХ ст. він широко використовується в США, країнах Західної Європи та Японії. Зокрема, традиційно його застосовують для: переробки органічних відходів і отримання білкового борошна, виробництва біогумусу та рідких добрив, як високобілковий корм в рибористві та тваринництві, а також у якості сировини для фармацевтичної галузі (лікування тромбозів, раку, трипаносомних інфекцій, мікробних інфекцій, а також захворювань імунної системи і запалень) або рухомої наживки в аматорській риболовлі. Суха маса каліфорнійського черв'яка на 70% складається з білка з більшою, ніж м'ясні та рибні продукти,

кількістю незамінних амінокислот, серед яких особливо превалює лізин (8%) і метіонін (3%). У якості кормового організму він містить 67–72% білка, 7–19% жирів, 18–20% вуглеводів, 2–3% мінеральних речовин, а також біологічно активні речовини. Цінність кормів при додаванні його біомаси збільшується на 20–25%. З біомаси каліфорнійського черв'яка також виготовляють білкове борошно, що містить 67% білка та 20% жиру. Автори наводять оптимальну технологію його культивування з метою отримання як високоцінного корму, так і біогумусу в умовах одного господарства, з мінімальним використанням площ та потужностей.

Розділ IX стосується особливостей культивування нематод на прикладі панагели (*Panagrellus redivivus* Goodej) та оцтової нематода (*Turbatrix aceti*). Висока репродуктивна здатність, короткий життєвий цикл і стійкість до змін умов середовища визначають високу ефективність культивування цих червів. Крім того, оцтова нематода витримує солоність до 40‰ впродовж 8 годин, що пояснює її повсюдне застосування у якості стартового живого корму для личинок морських риб. Цей розділ містить схематичні ілюстрації ємностей для утримання та рецептуру кормів, а також перелік всіх необхідних умов для успішного культивування.

Розділ X містить докладну інформацію та схеми обладнання, необхідного для оптимального культивування червів (на прикладі білого енхітрея *Enchytraeus albidus* і трубочника *Tubifex tubifex*) та личинок комах (на прикладі личинок хірономід *Chironomidae*, зокрема мотиля *Chironomus plumosus*). Ці види дістали повсюдного застосування як цінний живий корм, що використовується і рибалками-аматорами, і в акваріумістиці, і на рибних господарствах. Зокрема, харчова цінність енхітреуса залежить від складу того корму, яким він живиться, що дає змогу вітамінізувати його перед згодовуванням молоді риб та дрібним рибам. Крім того, завдяки високій калорійності його введення в переднерестовий період приводить до тривалого позитивного ефекту. Слід зазначити, що трубочник (*Tubifex tubifex*), є цінним кормовим об'єктом для вирощування молоді риб, оскільки містить близько 76% води та 24% сухої речовини, яка складається з 40% білка та 19,5% жиру (порівняно з іншими безхребетними, вміст жиру є дуже високим). Личинки хірономід у водоймах відіграють важливу роль: вони переробляють органічну речовину в мінеральну і тим самим сприяють самоочищенню водойм, крім того є основним кормом багатьох видів риб та використовуються як індикаторні організми для оцінки трофності озер і чистоти води. Поряд із цим, в ядрах клітин їхніх слинних залоз є політенні хромосоми, завдяки яким вони широко застосовуються в лабораторних дослідженнях з цитогенетики і молекулярної біології, як в якості моделей для вивчення процесів біосинтезу та аналізу морфогенетичної основи внутрішньовидової дивергенції, так і в якості об'єктів цитогенетичних досліджень. А мотиль за вмістом поживних речовин перевершує коретру (*Chaoborus*, або *Corethra*) і трубочника. Отже, в цьому розділі подані оптимальні методи культивування вищенаведених безхребетних в різних масштабах.

Розділ XI надає біологічну характеристику виноградному слимаку (*Helix pomatia*), м'ясо якого є високоцінним делікатесом і використовується у високій кухні, переважно в таких країнах як Франція, Італія, Німеччина, Бельгія та Швейцарія. Крім того, екстракти з виноградного слимака все активніше застосовують у фармацевтичній та косметологічній промисловостях. У

вищезазначеному розділі детально викладена високоефективна біотехнологія його культивування в різних типах господарств. Особливу увагу звернуто на специфіку годівлі та розмноження.

Розділ XII присвячений технології культивування таких слимаків як австралійська ампулярія (*Ampullaria australis*) та гігантська ампулярія (*Ampullaria gigas*). Обидва види набули широкої популярності в акваріумістиці. Останнє пояснюється тим, що, окрім привабливого зовнішнього вигляду (широка палітра кольорів забарвлення тулуба та панцира), вони поїдають залишки корму, таким чином очищуючи воду, а при збалансованому раціоні не шкодять рослинам та ікрі риб. В цьому розділі детально описані необхідні їм умови утримання та годівлі, зосереджена увага на впливі температурного режиму.

Досліджувана монографія написана простою для сприйняття, класичною англійською мовою, що може бути використано для підвищення рівня володіння цією іноземною мовою.

Слід зазначити, що монографія ілюстрована не лише технологічними схемами та кресленнями обладнання, а й зображеннями об'єктів культивування, що істотно полегшує сприйняття, засвоєння та подальше використання інформації. Крім того, в кінці кожного розділу наведені питання для самостійної перевірки засвоєних знань, що стане корисним в навчально-координаційному процесі закладів з вивченням дисциплін, суміжних із галуззю аквакультури (гідробіології, іхтіології, годівлі тощо).

Таким чином, ця монографія, спрямована на тезисне подання основних засад культивування як кормових організмів, так і їстівних гідробіонтів, є важливою та цікавою працею. Вона стане у пригоді і досліднику, і студенту або викладачу, а також представникам бізнесу в галузі аквакультури.

ОГОЛОШЕННЯ

В Інституті рибного господарства НААН працює **ПЛР–лабораторія, діяльність якої спрямована на діагностику інфекційних захворювань риб**. На сьогодні в арсеналі лабораторії є діагностикуми для вірусних, бактеріальних та паразитарних захворювань, які, за даними Міжнародного Епізоотичного Бюро (OIE), є найбільш небезпечними для об'єктів сучасної аквакультури. При розробленні діагностичних тест-систем зверталась увага на тенденції розвитку вітчизняного рибництва та інфекційні агенти, які циркулюють в Україні або можуть проникнути у вітчизняні рибогосподарські підприємства із сусідніх країн.

Ми пропонуємо молекулярну діагностику вірусних захворювань коропових, лососевих, осетрових та інших видів риб.

Лососеві: вірус інфекційного панкреатичного некрозу IPNV; вірусна геморагічна септицемія VHSV; вірус інфекційного гемопоетичного некрозу IHNV.

Коропові: вірус весняної віремії SVCV; герпесвірус CyHV та KHV.

Осетрові: герпесвірус AcHV; іридовірус AcIV; аденовірус AcAdV.

Іctalурові: герпесвірус каналного сома CCV.

Для бактеріальних хвороб риб підібрані тест-системи для діагностики фурункульозу форелі (*Aeromonas salmonicida*), геморагічної септицемії (*Aeromonas hydrophila*), хвороби нирок лососевих (BKD) (*Renibacterium salmoninarum*), ентеричної хвороби «червоного рота» (*Yersinia ruckeri*), флавобактеріозу (*Flavobacterium columnare* і *Flavobacterium psychrophila* (BCWD) та септицемії сома (*Edwardsiella ictaluri*).

Присутні також тест-системи ідентифікації ендопаразитів *Tetracapsuloides bryosalmonae* (проліферативна хвороба нирок) та *Myxobolus cerebralis*, що інфікують райдужну форель.

Для отримання додаткової інформації можна звертатися за адресою:

Інститут рибного господарства НААН, вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164.
Лабораторія біотехнологій у рибництві.

Завідувач лабораторії: к.б.н., с.н.с. Рудь Юрій Петрович.

Тел. (097) 953-80-80 або e-mail: rud@if.org.ua.

З МІЖНАРОДНИМ ЖІНОЧИМ ДНЕМ!

Любі жінки!

*Прийміть сердечні привітання з нагоди чудового
весняного свята — 8 березня!*

*Бажаю щастя і тепла,
Весни, усмішок, сонця,
Щоб доля світла увійшла
До кожного вікця.
Хай навкруги цвіте бузок,
Та небо буде ясным,
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в душі у вас
Горів вогонь кохання,
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання!*

*Головний редактор,
директор Інституту рибного господарства НААН,
доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, професор
Грициняк Ігор Іванович*

FISHERIES SCIENCE OF UKRAINE

"Fisheries Science of Ukraine" — a scientific journal, has been published in Ukraine since 2007. "Fisheries Science of Ukraine" included in the List of Specialized Publications of Ukraine, which can be used for publishing results of doctor's and candidate's thesis (biological and agricultural sciences), was approved in 08.07.2009, recertification of 06.11.2014 (Ministry of Education and Science of Ukraine №1279)

Founder and publisher of the journal — Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

State registration certificate KB № 20934-10734 PR of 18.08.2014

EDITOR-IN-CHIEF

Ihor Hrytsyniak, Doctor of Sciences, Professor, Academician of the NAAS of Ukraine, Director, Institute of Fisheries of the NAAS

DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF

Natalia Kolesnyk, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of International Scientific and Technical Cooperation and Intellectual Property, Institute of Fisheries of the NAAS

Oleksandr Tretiak, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Deputy Director in scientific works, Institute of Fisheries of the NAAS

EDITORIAL BOARD

BIOLOGICAL SCIENCES

Boris Gomelsky, Doctor of Biological Sciences, Professor, Kentucky State University, UNITED STATES OF AMERICA

Daniel Patrick, Doctor of Biological Sciences, Head of Biology Department Laboratories of the Pyrenees and Landes, FRENCH REPUBLIC

Gautam V. Zodape, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Zoology of Shivaji University Kolhapur, REPUBLIC OF INDIA

Vasyl Sondak, Doctor of Sciences, Head of "Water Bioresources", National University of Water Management and Natural Resources, UKRAINE

Oleksandr Potrokhov, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Biology of reproduction of fish, Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, UKRAINE

Leonid Buchatskyi, Doctor of Sciences, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Leading Research Scientist of the Laboratory of Biotechnologies in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Ihor Buzevych, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Valentyna Solomatina, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Leading research scientist of the department of feeds and fish feeding, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

AGRICULTURAL SCIENCES

XU Pao, Doctor, Professor, Director of Freshwater Fisheries Research Center, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Jedrzej Krupinski, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director, National Research Institute of Animal Production, POLAND

Mykhailo Efymenko, Doctor of Sciences, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head Research Scientist, Institute of Animal Breeding and Genetics of the NAAS, UKRAINE

Serhiy Tarasiuk, Doctor of Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head of the Molecular-Genetic Research Department, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Vitaliy Bekh, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Fish Selection, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Isaak Sherman, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Aquaculture Department, Kherson State Agrarian University, UKRAINE

Oleksandr Kostenko, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Veterinary Medicine and Zootechnics Department, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, UKRAINE

SCIENTIFIC EDITORS OF SECTIONS

are staff employees of the Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine: **Natalia Tushnytska**, PhD, Senior Research Scientist, Scientific Secretary of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Deren**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Feeds and Fish Feeding of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yaroslav Tuchapskyi**, PhD, Head of the Carp Breeding Laboratory of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Zaloilo**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Molecular-Genetic Studies of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Zabytivskyi**, PhD, Senior Research Scientist of Section of Sturgeon of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Antonina Mruk**, Head of the Laboratory Salmonids Culture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Tetiana Hryhorenko**, PhD, Head of the Laboratory of Hydrobiology and Technology of Invertebrates Cultivation of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Rud'**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Bio-technology in Aquaculture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Natalia Matvienko**, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Ichthyopathology of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Oleksandr Didenko**, PhD, Senior Research Scientist of the Department of Study Reservoirs Bioresources of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Viktor Chernik**, Head of the Laboratory of Management in Aquaculture of the Institute of Fisheries of the NAAS

Editorial board of the Journal "Fisheries Science of Ukraine", Institute of Fisheries NAAS, 135, Obukhivska St, Kiev-164, Ukraine, 03164; tel.: +38 (044) 223-84-34; tel/fax: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Layout design: Natalia Kolesnik, Serhiy Shinkar, Oleksandr Bezusyi; **Making-up:** Maria Simon, Yevheniy Arkhanhelskyi;

Literature editing: Tetiana Shvets; **Corrector:** Hanna Kovalchuk

ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НААН
вул. Обухівська, 135 м. Київ-164, 03164, Україна
тел./факс: +38(044) 423-74-62, тел.: +38(044) 423-74-65

<http://fsu.ua>

info@fsu.ua