ISSN 2312-9581 (Online)

ISSN 2075-1508 (Print)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

2 / 2018

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські науки), переатестація від 06.11.2014 (наказ Міністерства освіти і науки України №1279)

Засновник та видавник — Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20934-10734 ПР від 18.08.2014

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

БУЧАЦЬКИЙ Леонід Петрович, доктор біол. наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), провідний науковий співробітник лабораторії біотехнологій в рибицтві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ГРИЦІНЯК Ігор Іванович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, директор Інституту рибного господарства НААН
КОЛЕСНИК Наталія Леонідівна, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності, Інститут рибного господарства НААН

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Гомельський Борис, доктор біол. наук, професор, Державний Університет Кентуккі, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Патрік Даніель, доктор біол. наук, Голова департаменту біології Лабораторії Піренеїв, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА
Зодапе Гаутам В., доктор біол. наук, професор, декан факультету зоології Державного Університету Шиваджи в Колхатурі, РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ
Бузевич Ігор Юрійович, доктор біол. наук, с.н.с., завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА
Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, зав. кафедрою водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА
Рудь Юрій Петрович, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії біотехнологій в рибицтві ІРГ НААН, УКРАЇНА
Потрохов Олександр Спирidonович, доктор біол. наук, с.н.с., керівник лабораторії біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, УКРАЇНА
Третяк Олександр Михайлович, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН
Соломатіна Валентина Дмитрівна, доктор біол. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник відділу кормів та годівлі риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Ху Пао, доктор наук, професор, директор Центру прісноводного рибного господарства, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
Крупінські Єджей, доктор наук, професор, іноземний член Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут зоотехнії Польщі, ПОЛЬЩА
Єфименко Михайло Якович, доктор с.-г. наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник, Інститут розведення і генетики тварин НААН, УКРАЇНА
Тарасюк Сергій Іванович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, зав. відділу молекулярно-генетичних досліджень, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА
Бех Віталій Валерійович, доктор с.-г. наук, професор, зав. відділу селекції риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА
Шерман Ісаак Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедри рибицтва, Херсонський державний аграрний університет, Україна
Матвієнко Наталія Миколаївна, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу іхтіопатології ІРГ НААН, УКРАЇНА
Костенко Олександр Іванович, канд. с.-г. наук, с.н.с., нач. відділу ветеринарної медицини та зоотехнії, Національна академія аграрних наук України, УКРАЇНА

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

є штатними працівниками Інституту рибного господарства НААН України: **Тушницька Наталія Йосифівна**, канд. ветерин. наук, с.н.с., вчений секретар ІРГ НААН; **Дерень Ольга Володимирівна**, канд. с.-г. наук, с.н.с., зав. лабораторії кормів і годівлі риб ІРГ НААН; **Тучапський Ярослав Васильович**, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу селекції риб ІРГ НААН; **Заліло Ольга Василівна**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ІРГ НААН; **Забитівський Юрій Михайлович**, канд. біол. наук, старший науковий співробітник сектору осетрівництва ІРГ НААН; **Мрук Антоніна Іванівна**, зав. лабораторії лососівництва ІРГ НААН; **Григоренко Тетяна Володимирівна**, канд. с.-г. наук, зав. лабораторії гідробіології та технологій культивування цінних безхребетних ІРГ НААН; **Діденко Олександр Володимирович**, канд. біол. наук, с.н.с., старший науковий співробітник відділу вивчення біоресурсів водосховищ.

Редакція журналу «Рибогосподарська наука України», вул. Обухівська, 135, м. Київ-164, 03164

тел.: +38 (044) 223-84-34, тел./факс: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Підписано до друку 11.06.2018 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 7,1. Наклад 500 прим.

Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту рибного господарства НААН

(Протокол №3 від 11 червня 2018 р.)

Дизайн макету: Колесник Н. Л., Шинкар С. В., Архангельський Є. Ю., Безусий О. Л. **Верстка:** Архангельський Є. Ю., Симон М. Ю. **Літературне редагування:** Швець Т. М. **Коректор:** Ковальчук Г. В.

Друкарня ТОВ «ПРО ФОРМАТ», 02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 45 Б, оф.16, тел.: +38(044) 353-85-58

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

2/2018(44)

Заснований у 2007 р.
Виходить 4 рази на рік

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 1-144
DOI: 10.15407/fsu2018.02

З М І С Т

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 7-29
DOI: 10.15407/fsu2018.02.007

- Й. В. Гриб, В. В. Сондак, О. В. Волкошовець, Д. Й. Войтишина
Формування ризиків виживання іхтіофауни у річкових басейнах
України. Концепція науки «Ризикологія» 7

БЮРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 30-42
DOI: 10.15407/fsu2018.02.030

- К. М. Гейна, С. С. Шашикова, М. С. Козій
Статевий диморфізм та мікроанатомічні показники тюльки
Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) Бузького лиману
під час нерестової міграції 30

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 43-57
DOI: 10.15407/fsu2018.02.043

- А. В. Ляшенко, О. Є. Слєпньов, В. В. Маковський, Ю. М. Ситник,
Т. В. Григоренко
Макрозообентос водних об'єктів зони впливу південноукраїнського
енергокомплексу 43

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 58-70
DOI: 10.15407/fsu2018.02.058

- Б. О. Ганкевич, О. М. Третьак, О. М. Колос
Важкі метали в органах і тканинах веслоноса *Polyodon spathula*
(Walbaum) у рибогосподарських ставах Лісостепу та Полісся
України 58

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 71-80
DOI: 10.15407/fsu2018.02.071

- П. Д. Мендришора, Г. А. Куріненко
Характеристика вперше нерестуючих плідників райдужної
форелі *Oncorhynchus mykiss* (Walbaum), вирощеної в умовах
індустріального господарства «Слобода-Банилів» 71

© Інститут рибного господарства НААН України, 2018

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 81-88 DOI: 10.15407/fsu2018.02.081	
<i>М. М. Пашко, О. М. Третяк, О. М. Колос</i> Результати експериментів зі штучного отримання овульованої ікри від плідників стерляді <i>Acipenser ruthenus</i> (Linnaeus) у нетрадиційні строки.....	81
Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 89-102 DOI: 10.15407/fsu2018.02.089	
<i>Г. В. Білик, Н. О. Грудко, І. М. Шерман</i> Вплив щільності посадки на ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу стерляді <i>Acipenser ruthenus</i> (Linnaeus) та веслоноса <i>Polyodon</i> <i>spathula</i> (Walbaum) в умовах півдня України	89
КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ	
Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 103-115 DOI: 10.15407/fsu2018.02.103	
<i>Р. А. Паламарчук, О. В. Дерень</i> Визначення ефективності використання амаранту (<i>Amaranthus</i>) в годівлі коропа за різних умов вирощування	103
ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ	
Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 116-129 DOI: 10.15407/fsu2018.02.116	
<i>Ю. О. Коваленко, М. Т. Примачов, О. С. Потрохов, О. Г. Зіньковський</i> Деякі адаптивні реакції карася сріблястого <i>Carassius auratus gibelio</i> (Bloch) за надмірного навантаження амонійним азотом	116
Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 130-136 DOI: 10.15407/fsu2018.02.130	
<i>Б. О. Грішин, І. І. Грициняк, І. А. Особа</i> Фізіолого-біохімічна оцінка помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи	130
Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 137-143 DOI: 10.15407/fsu2018.02.137	
<i>М. Ю. Симон, І. І. Грициняк, Ю. М. Забитівський</i> Вплив пекарських дріжджів на ліпідний обмін молоді російського осетра (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i> Brandt)	137

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 7-29

DOI: 10.15407/fsu2018.02.007

И. В. Гриб, В. В. Сондак, О. В. Волкошовец, Д. И. Войтышина

Формирование рисков выживания ихтиофауны в речных бассейнах Украины.

Концепция науки «Рискология» 7

БИОРЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ ВОДОЕМОВ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 30-42

DOI: 10.15407/fsu2018.02.030

К. Н. Гейна, С. С. Шаплыкова, М. С. Козий

Половой диморфизм и микроанатомические показатели тюльки *Clupeonella**cultriventris* (Nordmann, 1840) Бугского лимана во время нерестовой миграции 30

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 43-57

DOI: 10.15407/fsu2018.02.043

А. В. Ляшенко, О. Е. Слепнёв, В. В. Маковский, Ю. М. Сытник, Т. В. Григоренко

Макрзообентос водных объектов зоны влияния южноукраинского

энергокомплекса 43

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 58-70

DOI: 10.15407/fsu2018.02.058

Б. А. Ганкевич, А. М. Третьяк, Е. Н. Колос

Тяжелые металлы в органах и тканях веслоноса *Polyodon spathula* (Walbaum)

в рыбохозяйственных прудах Лесостепи и Полесья Украины 58

ТЕХНОЛОГИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 71-80

DOI: 10.15407/fsu2018.02.071

П. Д. Мендришора, А. А. Куриненко

Характеристика впервые нерестящихся производителей радужной форели

Oncorhynchus mykiss (Walbaum), выращенной в условиях индустриального

хозяйства «Слобода-Банилов» 71

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 81-88

DOI: 10.15407/fsu2018.02.081

М. М. Пашко, А. М. Третьяк, Е. Н. Колос

Результаты экспериментов по искусственному получению овулированной

икры от производителей стерляди *Acipenser ruthenus* (Linnaeus)

в нетрадиционные сроки 81

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 89-102

DOI: 10.15407/fsu2018.02.089

А. В. Билык, Н. А. Грудко, И. М. Шерман

Влияние плотности посадки на эффективность выращивания сеголетков стерляди

Acipenser ruthenus (Linnaeus) и веслоноса *Polyodon spathula* (Walbaum)

в условиях юга Украины 89

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 103-115

DOI: 10.15407/fsu2018.02.103

Р. А. Паламарчук, О. В. Дерень

Определение эффективности использования амаранта (*Amaranthus*) в кормлении

карпа при разных условиях выращивания 103

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 116-129

DOI: 10.15407/fsu2018.02.116

Ю. А. Коваленко, М. Т. Примачёв, А. С. Потрохов, О. Г. Зиньковский

Некоторые адаптивные реакции карася серебряного *Carassius auratus gibelio*

(Bloch) при чрезмерной нагрузке аммонийным азотом 116

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 130-136

DOI: 10.15407/fsu2018.02.130

Б. О. Гришин, И. И. Грициняк, И. А. Особа

Физиолого-биохимическая оценка помесных карпов первого поколения от скрещивания антонинско-зозуленецкого и любеньского внутривидовых типов

украинской рамчатой породы..... 130

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 137-143

DOI: 10.15407/fsu2018.02.137

М. Ю. Симон, И. И. Грициняк, Ю. М. Забытиевский

Влияние пекарских дрожжей на липидный обмен молоди русского осетра

(*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt)..... 137

CONTENTS

ACTUAL PROBLEMS AND PROSPECTS

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 7-29
DOI: 10.15407/fsu2018.02.007

- Y. Gryb, V. Sondak, O. Volkoshovetz, D. Voityshyna*
Formation of risks of fish fauna survival in ecosystems of river basins
of Ukraine. The concept of the science “Riskology” 7

BIORESOURCES AND ECOLOGY OF WATER BODIES

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 30-42
DOI: 10.15407/fsu2018.02.030

- K. Geina, S. Shashlykova, M. Koziy*
Sexual dimorphism and microanatomical parameters of the Black
sea sprat *Clupeonella cultriventris* (Nordmann, 1840)
of the Bug lagoon during its spawning migration 30

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 43-57
DOI: 10.15407/fsu2018.02.043

- A. Lyashenko, O. Slepnev, V. Makovsky, Yu. Sytnyk, T. Grigorenko*
Macrozoobenthos of water objects affected by the South-Ukrainian
electric power-producing complex 43

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 58-70
DOI: 10.15407/fsu2018.02.058

- B. Gankevych, O. Tretyak, O. Kolos*
Heavy metals in organs and tissues of the paddlefish *Polyodon spathula*
(Walbaum) in fish ponds of the Forest-Steppe and Forest area of Ukraine 58

TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 71-80
DOI: 10.15407/fsu2018.02.071

- P. Mendryshora, H. Kurinenko*
Characteristics of firstly spawning brood rainbow trout *Oncorhynchus*
mykiss (Walbaum) reared in the conditions of the industrial fish farm
Sloboda-Banyliv 71

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 81-88
DOI: 10.15407/fsu2018.02.081

- M. Pashko, O. Tretiak, O. Kolos*
Results of the experiments on artificial production of ovulated eggs from
brood sterlet *Acipenser ruthenus* (Linnaeus) at non-traditional terms 81

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 89-102
DOI: 10.15407/fsu2018.02.089

- A. Bilyk, N. Grudko, I. Sherman*
Effect of stocking density on the efficiency of rearing of sterlet *Acipenser*
rutenus (Linnaeus) and paddlefish *Polyodon spathula* (Walbaum) in the
conditions of Southern Ukraine 89

FEEDS AND FEEDING

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 103-115

DOI: 10.15407/fsu2018.02.103

R. Palamarchuk, O. Deren

Determination of the efficiency of the use of amaranth (*Amaranthus*)
in feeding of carp under different rearing conditions 103

PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 116-129

DOI: 10.15407/fsu2018.02.116

Yu. Kovalenko, M. Primachev, A. Potrokhov, O. Zinkovskyi

Some adaptive reactions of the prussian carp *Carassius auratus gibelio*
(Bloch) based on the excessive load of ammonium nitrogen 116

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 130-136

DOI: 10.15407/fsu2018.02.130

B. Grishyn, I. Hrytsyniak, I. Osoba

Physiological-biochemical evaluation of cross-bred carps of the first
generation from crossing Antoninsko-Zozulenets and Lubin intrabreed
types of Ukrainian framed breed 130

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 137-143

DOI: 10.15407/fsu2018.02.137

M. Simon, I. Hrytsyniak, Yu. Zabytivskyi

Influence of baker's yeast on lipid metabolism of Russian sturgeon
(*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt) fingerling..... 137

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 7-29
DOI: 10.15407/fsu2018.02.007
УДК 597-19:[574.4:504.455](477)

Received 27.04.18
Received in revised form 24.05.18
Accepted 05.06.18

ФОРМУВАННЯ РИЗИКІВ ВИЖИВАННЯ ІХТІОФАУНИ У РІЧКОВИХ БАСЕЙНАХ УКРАЇНИ. КОНЦЕПЦІЯ НАУКИ «РИЗИКОЛОГІЯ»

Й. В. Гриб, kaf.vb@nuvm.edu.ua, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

В. В. Сондак, kaf.vb@nuvm.edu.ua, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

О. В. Волкошовець, kaf.vb@nuvm.edu.ua, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Д. Й. Войтишина, kaf.vb@nuvm.edu.ua, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Мета. Виявити джерела появи ризиків у водних басейнах та наслідки від їх формування для довкілля та іхтіофауни. Розробка концептуальних основ еколого-економічної та соціальної науки «ризикологія».

Методика. В ході роботи використовувались узагальнені результати іхтіоекологічних дослідження та контрольних ловів риб у зимувальних ямах гідрографічної мережі рівнинної частини території України, зокрема басейну р. Дніпро в середній течії: рр. Трубіж, Удай; рр. Стир, Іква, руслові водосховища Хрінницьке (р. Стир), Млинівське (р. Іква); рр. Горинь, Случ, Басівкутське на р. Устя (п.п. р. Горинь); Шацькі озера в басейні р. Прип'ять.

Результати. Накопичена за тисячоліття післяльодовикового періоду органічна маса в довкіллі є стабілізатором клімату і, одночасно, використовується у господарській діяльності: ґрунти, запаси прісної питної води, лісові насадження, осушені болота, корисні копалини, річкові екосистеми — первинні комірки синтезу органічної речовини, погіршена якість води, стічні води тощо. Все це рани на тілі живої планети.

Ніхто не знає, до якої межі порушена мегаекосистема може відтворюватись, який рівень протидії можливий з боку довкілля. Негативні наслідки господарського використання природних багатств спостерігаються вже сьогодні. Разом з кліматичними та геофізичними чинниками, парниковий ефект викликає зміни теплового балансу Землі, впливає на формування кількості вуглекислого газу та кисню в атмосфері, призводить до зміни кліматичних поясів, вимирання чутливих до забруднення видів флори та фауни, дефіциту прісної питної води.

Наукова новизна. Розглянута концепція формування ризиків у водних екосистемах природного та антропогенного походження. Обґрунтована необхідність опрацювання наукового напрямку «ризикологія» у розвитку ноосферології — науки про гармонізацію природокористування за сучасних умов, з можливістю прогнозу непередбачуваних наслідків для довкілля від господарської діяльності людини.

Практична цінність. Концепція ноосфери як планети розуму вимагає появи і утвердження науки «ризикологія» для створення загальнодержавних норм і регламентів сучасної поведінки людини у довкіллі, з метою збереження свого середовища існування та мешкання.

Ключові слова: ноосфера, іхтіофауна, іхтіоекосистема, кризові ситуації, оцінка ризиків, екологічне нормування, екоекономіка, економічні збитки.

© Й. В. Гриб, В. В. Сондак, О. В. Волкошовець, Д. Й. Войтишина, 2018

FORMATION OF RISKS OF FISH FAUNA SURVIVAL IN ECOSYSTEMS OF RIVER BASINS OF UKRAINE. THE CONCEPT OF THE SCIENCE "RISKOLGY"

Y. Gryb, kaf.vb@nuvm.edu.ua, National University of water and Environmental Engineering, Rivne

V. Sondak, kaf.vb@nuvm.edu.ua, National University of water and Environmental Engineering, Rivne

O. Volkoshovetz, kaf.vb@nuvm.edu.ua, National University of water and Environmental Engineering, Rivne

D. Voityshyna, kaf.vb@nuvm.edu.ua, National University of water and Environmental Engineering, Rivne

Purpose. To detect the sources of the appearance of risks in water basins and consequences from their formation for environment and fish fauna. Development of conceptual foundations of environmental-economic and social science "riskology".

Methodology. During the work, we used general ichthyological studies and results of monitoring fish surveys in wintering grounds of the hydrographic network of the lowland part of Ukrainian territory including Dnieper River basin in the middle part: Trubizh, Udai; Styr, Ikva, channel reservoirs: Khrinnyske (Styr River), Mlynivske (Ikva River); Goryn, Sluch, Basivkutske on the Ustia River (a right tributary of the Goryn River); Shatsky lakes in the Prypiat River basin.

Findings. A mass of organic substance accumulated for thousand years of the postglacial period is a stabilizer of climate and at the same time is used in economic activity – soils, reserves of drinking water, forest ranges, drained wetlands, mineral deposits, river ecosystems, as primary cells of organic substance synthesis, water quality, sewage waters. All these are wounds of the living planet.

No one knows to what extent the mega-ecosystem is disturbed, what level of resistance is possible from the environment. Negative consequences of the economic use of natural resources are already observed today. Together with climatic and geophysical factors, the greenhouse effect causes changes in the heat balance of the Earth, affects the formation of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere, causes changes in climatic zones, extinction of flora and fauna species sensitive to pollution, and shortage of drinking water.

Originality. A concept of the formation of risks in aquatic ecosystems of natural and anthropogenic origin has been examined. The article justifies the necessity for the advance of research area "riskology" in the development of the noospherology – a science on the harmonization of nature management under current conditions, with the possibility of predicting unpredictable consequences to the environment from human activities.

Practical value. The development of the concept of the noosphere as a planet of mind requires the emergence and approval of the science of "riskology" for the creation of national standards and regulations for modern human behavior in the environment for the preservation of its habitat and existence.

Key words: noosphere, fish fauna, ichthyological ecological system, crisis situations, risk assessment, environmental regulations, ecoeconomy, environmental losses.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

За останні десятиліття ми стали свідками формування численних кризових ситуацій у водних екосистемах річок України природного та антропогенного походження. Зокрема, спостерігали літні та зимові задухи риб внаслідок евтрофікації у руслових водосховищах Дніпровського каскаду (весна 2010 р.), притоках Прип'яті та Дніпра — рр. Горинь, Стир, Іква, Устя, особливо нижче урбанізованих територій (р. Устя — липень 2011 р., червень 2016 р.), регіональні

задухи риб за профілем річок при аварійних ситуаціях на цукрових заводах, локальні токсичні явища задухи риб від дії гербіцидів після обробки ними сільськогосподарських угідь, розташованих поблизу водних об'єктів, за відсутності прируслових захисних смуг і недотриманні режиму природокористування водоохоронних зон.

Кліматичні зміни значно погіршили ситуацію через зростання вмісту антропогенних домішок при зменшенні водності та порушенні кисневого режиму водойм, за високих температур атмосферного повітря та води. Останні часто призводили до зростання вмісту розчинених токсичних домішок та формування сірководневих зон у придонних шарах.

Розроблені нормативи для ідеальних умов водного середовища 50–60 pp. XX ст. (початок формування ноосфери) та екологічна оцінка стану водних об'єктів, яка ведеться за постфатальними наслідками як реєстрація збитків у сучасних реаліях, не дають відповіді на запитання, як діяти в нових умовах і як попередити ризики та загрози, що виникають. Сьогодні у моніторингу довкілля провідне місце повинна займати конценція ризиків і наслідків від їх виникнення, концепція екологічних вибухів у гідроекосистемах і заходів із їх попередження [8].

Проблемі антропогенної ризикології почали надавати більш серйозну увагу наприкінці XX ст., коли природа почала втрачати рівень самодостатнього відтворення і довкілля увійшло в хронічну екологічну кризу. За прогнозами Римського клубу, наростання існуючих тенденцій у природокористуванні призведе вже в першій половині XXI ст. до руйнування основ індустріального суспільства, через проблеми з нестачею прісної питної води, чистого повітря та продуктів харчування. Це, в свою чергу викличе проблеми демографічного навантаження, економічні втрати та капіталовкладення на компенсаційні заходи для виживання суспільства у порушеному природному середовищі.

Крім екологічних порушень, в умовах індустріального суспільства посиляться проблеми в агросекторі, де стан не кращий: зростання викидів CO₂ та забруднення атмосферного повітря, неконтрольована розробка корисних копалин, все зростаючий рівень споживання свіжої прісної води, слабо контрольована хімізація агровиробництва.

Україна йде шляхом, який вже пройшли і перебороли негативні наслідки розвинуті країни Західної Європи та Америки:

– розорювання басейнів річок вище 30%, а для вразливих регіонів Степу та Полісся цифри значно вищі;

– використання виснажливої монокультури соняшника, кукурудзи, сої, зернових культур та ріпаку з інтенсивним застосуванням гербіцидів та пестицидів;

– вирубування зрілих лісів на протидію Програмі заліснення території України — вдвічі проти існуючих характеристик та, як наслідок зміни рівня ґрунтових і підземних вод, що призвело до всихання у лісах коренів дерев;

– осушення у 60–80pp. XX ст. боліт у Поліському регіоні в заплавах річок до знищення природних нерестовищ.

Наслідком стало зростання чисельності «гарячих точок» забруднення, погіршення якості води та збіднення біорізноманіття аборигенної іхтіофауни,

зниження рибопродуктивності природних водойм і, як результат, припинення промислового лову риб в річково-озерній мережі і руслових водосховищах (рр. Припять, Стир, Горинь, Хрінницьке, Млинівське водосховища тощо).

Незважаючи на розвиток та вдосконалення технологій промислового та аграрного виробництва, антропогенне навантаження на довкілля продовжує зростати. Суспільство при цьому на реабілітацію малих річок, як джерела і місця формування якості води та відтворення молоді риб, кошти виділяє недостатні і не приділяє їй належної уваги. Як стверджує І. П. Дрозд з Інституту ядерних досліджень НАН України, ризик життєдіяльності стає невід'ємним елементом довкілля. Сьогодні, за думкою соціолога У. Бека, ми формуємо суспільство ризику, де будь-яка діяльність людини є ризикованою. Причому, це стосується як діяльності, так і бездіяльності [1, 2]. Виникає гостра необхідність переорієнтації рівня природокористування, оскільки інакше формуватиметься гостра екологічна криза.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Розглядаючи ризик як об'єктивно існуючу небезпеку за існуючого рівня природокористування, ми оперуємо поняттям шкоди, визначаємо її кількісні характеристики та обсяги. За виразом соціолога С. А. Красикова «ризик є продуктом ймовірності виникнення небезпеки і масштабу її наслідків». З іхтіоекологічної точки зору, — це повна стерилізація річкової мережі від іхтіофауни, перетворення річок в технічні водотоки. Ми постійно стикаємось з регіональними задухами риб, аж до повної стерилізації водного середовища. Прикладом можуть бути явища задухи риб у рр. Стир, Горинь нижче створів аварійного скидання транспортно-миючих вод цукрозаводів, під час сезону цукроваріння у 90-х роках минулого століття.

У практиці меліоративного будівництва концепція ризику визначалась за оцінкою впливу на навколишнє середовище (ОВНС), яка була детально розглянута нами у відповідній монографії [7]. Концепція наукової праці базується на оцінці екологічних, економічних та гідрологічних наслідків від впливу масштабного осушення. Так, за даними Укрземпроекту, сьогодні сумарно в сільськогосподарському використанні знаходиться 722,2 тис. га торфових родовищ, з яких 280,6 тис. га — осушені сільгоспугіддя, а 153,6 тис. га зосереджені в лісовому господарстві [6]. Значна частка осушених торфовищ зосереджена в заплавах річок та басейнах річково-озерної мережі. В минулому це були заплавні луки — природні нерестовища. Включення торфових масивів в осушувальні системи призвело до їх спрацювання, пониження рівня донної поверхні та повторного заболочування. Це, особливо, помітно в Поліському регіоні де пониження рівня ґрунтових вод складає в період межені 0,7 м., а подекуди — 1,5 м.

Відпрацьовані меліоративні системи (Копаївська — басейн оз. Луки, Трубежанська — рр.Трубіж, Удай — басейн р. Дніпро) стали депонентами річкового стоку. Необхідно звернути увагу на самозагоряння переосушених торфів, на їх негативну роль у формування парникового ефекту через постачання вуглекислого газу. Водночас, виробництво сільськогосподарської продукції не повинно формувати проблему ризику для водних екосистем, а саме це відбувається, що неприпустимо навіть з гуманної точки зору.

На сьогодні сумарна токсичність водного середовища України стала практично фоновією і залежить від виду та рівня природокористування, виходячи з карти-схеми переважаючої токсичності та формування ризиків у водному середовищі (рис.1–3).

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Об'єктом дослідження була гідрографічна мережа рівнинної частини території України зокрема, верхів'я р. Прип'ять: русла рр. Стир, Іква (нижче м. Млинів), руслові водосховища Хрінницьке (р. Стир), Млинівське (р. Іква); рр. Горинь, Случ (нижче водосховища в мікрорайоні «Смолка» м. Новоград-Волинський), Басівкутське на р. Устя (ліва притока р. Горинь) в районі м. Рівне; середня течія р. Дніпро: рр. Трубіж, Удай; Шацькі озера в басейні р. Прип'ять.

Дослідження (контрольні наукові лови риб у зимувальних ямах) здійснювались на виконання дослідної програми Інституту рибного господарства НААН України (№ державної реєстрації 0196U023118) шляхом відбору і опрацювання іхтіологічного матеріалу із застосуванням загальноприйнятих методик на основі дозволів на спеціальне використання риби та інших водних живих ресурсів № 002 від 17.08.07 р, № 007 від 18.03.08 р. виданих Держрибагенством України.

Дослідження здійснювались з метою оцінки ситуації. Через падіння рівня рибопродуктивності в регіоні на цілий порядок було припинено промисловий лов риб у річково-озерній мережі та руслових водосховищах — Хрінницькому, Млинівському.

В цілому було відібрано більше 4,5 тис. екз. різних видів риб, обробка яких і дала можливість дослідити сучасний видовий склад та стан іхтіоценозу досліджуваних басейнів.

Примітка. Промисловий лов риб у річково-озерній мережі та руслових водосховищах Волинської та Рівненської областей за останні 10 років не відновлено. Відповідно, більш достовірні дані про структуру та склад іхтіоценозу досліджуваних басейнів відсутні, а опитування рибалок-любителів показує, що ситуація суттєво не покращилася.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Вчені І. П. Дрозд та С. А. Красиков розглядаючи концепцію ризику у довкіллі відзначали, що він (ризик) є продуктом ймовірності виникнення небезпеки і масштабу її наслідків [7, 8].

Розглядаючи діяльність людини у довкіллі, ми можемо стверджувати, що вона супроводжується ризиками місцевого, регіонального та глобального рівнів (табл. 1; рис. 1, 2).

Ми пам'ятаємо випадки регіональної загибелі риб у каскаді Дніпровських водосховищ — Київському, Кременчуцькому, Хрінницькому (р. Стир), Краснооскольському (р. Оскіл), в Азовському морі.

Стійкою системою є тоді, коли сума ризиків менша відтворювальних можливостей екосистеми за наявності численних проміжних екотонів — резервних систем відтворення аборигенної іхтіофауни.

Таблиця 1. Джерела формування ризиків для довкілля у водних басейнах
Table 1. Sources of the formation of environmental risks in water basins

Джерела / Sources	Наслідки / Consequences	Ризики / Risks
А — природні / A — natural		
Екстремальні значення 11-річних циклів сонячної активності / Extreme values of 11-year cycles of solar activity	Значна товщина промерзання ґрунтів та водної поверхні, мала кількість атмосферних опадів, низькі витрати води / Considerable thickness of freezing of soils and water surface, low rainfall, low water consumption	Дефіцит розчиненого кисню, задухи риби в заплавах / Deficiency of dissolved oxygen, fish suffocation in flood waters and intermediate ecotones
Парниковий ефект / Greenhouse effect	Горіння лісів, торфовищ, виділення в атмосферу значних концентрацій CO ₂ / The burning of forests, peatlands, the release of significant concentrations of CO ₂ into the atmosphere	Зміна клімату, умов відтворення, стану флори та фауни / Changes of climate, conditions of reproduction, flora and fauna
Евтрофікація мілководь / Eutrophication of shallow water	Порушення газового режиму / Violation of the gas regime	Літні задухи риби / Summer fish suffocation
Б — антропогенні / B — anthropogenic		
Комунальний та зливовий стік з урбанізованих територій / Municipal and drain runoff from urbanized areas	Надходження до 60% домішок біогенного походження у водне середовище / Acceptance of up to 60% impurities of biogenic origin in the aquatic environment	Погіршення споживчих характеристик річкової води, евтрофікація, задухи риби / Deterioration of the consumer characteristics of river water, fish suffocation, eutrophication
Стік вод промислових підприємств / Industrial enterprises waste	Зміна рН, редокс-потенціалу, надходження важких металів у водне середовище / Changes in pH, redox potential, intake of heavy metals in the aquatic environment	Інтоксикація аборигенної іхтіофауни, задухи риби, погіршення смакових якостей риби / Intoxication of aboriginal ichthyofauna, fish suffocation, worsening of fish's taste
Сільськогосподарський стік / Agricultural waste	До 30% у воді складають: твердий стік, мінеральні добрива та отрутохімікати / Up to 30% in water are: solid waste, mineral fertilizers and poisons	Замулення водойм, задуха риби, евтрофікація, погіршення смаку риби / Reservoirs silting, fish suffocation, eutrophication, worsening of fish's taste
Продукти життєдіяльності тваринництва, захоронені відходи радіоактивних і гальванічних виробництв / Livestock products, buried waste from radioactive and electroplating industries	Поява териконів, вимивання токсичних домішок, зміна рівнів радіації та рН водного середовища / Appearance of waste heaps, washing of toxic impurities, change of levels of radiation and pH of aqueous medium	Забруднення ґрунтових та поверхневих вод, екологічні кризи різних рівнів / Pollution of soil and surface waters, environmental crises of different levels
Викиди CO ₂ від автотранспорту, загоряння торфовищ та лісів, технологічні викиди / CO ₂ emissions from motor vehicles, burning of peatlands and forests, technological emissions	Явища парникового ефекту, знищення природних локалітетів відтворення аборигенної іхтіофауни / The greenhouse effect and destruction of natural localities of aboriginal ichthyofauna reproduction	Ріст температури приземних шарів атмосфери, підтоплення мілководних ділянок суші / The growth of the temperature of the surface layers of the atmosphere, the flooding of the shallow areas of land
Аварійні ситуації на сховищах агресивних відходів / Emergency situations in the storage of aggressive waste	Вимивання забруднень в ґрунтові та поверхневі води / Leaching of contaminants in groundwater and surface water	Погіршення якості ґрунтових та поверхневих вод, загибель іхтіофауни / Deterioration of soil and surface water quality, loss of ichthyofauna

Джерела / Sources	Наслідки / Consequences	Ризики / Risks
Людський фактор (помилки) та демографічне навантаження / Human factor (errors) and demographic load	Непередбачувані (емерджентні) наслідки / Unexpected (emergent) effects	Інфекції, зміна біотичних умов, глобальні та регіональні кризи / Infections, changes in biotic conditions, global and regional crises
Сміттєвалища з відходами життєдіяльності людини і виробництва / Garbage landfills with waste of human life and production	Забруднення ґрунтових та підземних вод, атмосферного повітря / Contamination of subsoil water and groundwater, atmospheric air	Отруєння води шахтних колодязів, поверхневих ґрунтових вод / Poisoning of water from mine wells, surface groundwater
Сумація джерел забруднення / Summation of pollution sources	Хронічна екологічна криза / Chronic ecological crisis	Загибель чутливих видів флори та фауни / The loss of sensitive species of flora and fauna

Рис. 1. Карта-схема переважальної токсичності та формування ризиків у водному середовищі гідроекологічних коридорів України [1]: 1. Карпатська гірська країна та коридори гірських рік. Токсичні речовини: нафтопродукти. 2. Кримська гірська країна та коридори гірських рік. Токсичні речовини: нафтопродукти. 3. Меридіальний Дунайський ГЕК. Токсичні речовини: ціаніди, важкі метали, феноли; дефіцит розчиненого кисню. 4. Меридіальний Дністровський ГЕК. Токсичні речовини: теплове забруднення, важкі метали, феноли. 5. Меридіальний Південно-Бузький ГЕК. Токсичні речовини: сірководень, феноли; дефіцит розчиненого кисню. 6. Меридіальний Дніпровський ГЕК. Токсичні речовини: нафтопродукти, синтетичні поверхнево активні речовини (СПАР), сірководень, феноли; дефіцит розчиненого кисню. 7. Меридіальний Сіверськодонецький ГЕК. Токсичні речовини: важкі метали шахтних вод, ціаніди. 8. Меридіальний Донський гідроекологічний коридор (Азовське море). Токсичні речовини: феноли, фосфати, мінеральні добрива, пестициди; дефіцит розчиненого кисню. 9. Меридіальний Південно-Кримський ГЕК (Північно-Кримський зрошувальний канал). Токсичні речовини: феноли, нафтопродукти, СПАР, сірководень; дефіцит розчиненого кисню. 10. Широтний Північно-Західний Поліський (Прип'ятський) ГЕК. Токсичні речовини: важкі метали, марганець, закисне залізо, феноли, пестициди, радіонукліди; дефіцит розчиненого кисню. 11. Широтний Східно-Деснянський Поліський ГЕК. Токсичні речовини: радіонукліди,

нафтопродукти. 12. Широтний Лісостеповий ГЕК (зона цукроваріння). Токсичні речовини: сапоніни, пестициди, нафтопродукти, СПАР, радіонукліди. 13. Широтний Південний гідроекологічний коридор (гирлові ділянки річок — приток Чорного та Азовського морів). Токсичні речовини: важкі метали, пестициди, мінеральні добрива, мінералізація. 14. Широтний Морський ГЕК. Токсичні речовини: важкі метали, мінеральні добрива, пестициди, нафтопродукти. 15. Широтний Степовий ГЕК. Токсичні речовини: сапоніни, пестициди, нафтопродукти, мінеральні добрива, СПАР, мінералізація.

Fig. 1. Quick-map of prevailing toxicity and formation of risks in the aquatic environment of hydroecological corridors (HEC) of Ukraine [1]: 1. Carpathian mountain country and mountain river corridors. Toxic substances: *petroleum products*. 2. Crimean mountain country and mountain river corridors. Toxic substances: *petroleum products*. 3. Meridian Danubian HEC. Toxic substances: *cyanides, heavy metals, phenols; lack of dissolved oxygen*. 4. Meridian Dniester HEC. Toxic substances: *thermal pollution, heavy metals, phenols*. 5. Meridian Southern Bug HEC. Toxic substances: *hydrogen sulfide, phenol, deficiency of dissolved oxygen*. 6. Meridian Dniester HEC. Toxic substances: *petroleum products, synthetic surfactants (SSA), hydrogen sulfide, phenols, deficiency of dissolved oxygen*. 7. Meridian Siverskiy Donets HEC. Toxic substances: *heavy metals of mine waters, cyanides*. 8. Meridian Don (Sea of Azov) HEC. Toxic substances: *phenols, phosphates, mineral fertilizers, pesticides; deficiency of dissolved oxygen*. 9. Meridian South-Crimean (North-Crimean irrigation canal) HEC. Toxic substances: *phenols, petroleum products, spar, hydrogen sulfide; deficiency of dissolved oxygen*. 10. Latitudinal North-Western Polissya HEC. Toxic substances: *heavy metals, manganese, iron oxide, phenols, pesticides, radionuclides; deficiency of dissolved oxygen*. 11. Latitudinal East-Desna HEC. Toxic substances: *radionuclides, petroleum products*. 12. Latitudinal Forest-Steppe HEC. Toxic substances: *saponins, pesticides, petroleum products, SSA, radionuclides*. 13. Latitudinal Southern (estuaries of rivers — tributaries of Black and Azov seas) HEC. Toxic substances: *heavy metals, pesticides, mineral fertilizers, mineralization*. 14. Latitudinal Sea HEC. Toxic substances: *heavy metals, mineral fertilizers, pesticides, petroleum products*. 15. Latitudinal Steppe HEC. Toxic substances: *saponins, pesticides, petroleum products, mineral fertilizers, SSA, mineralization*.

Умовні позначення:

★ — нафтопродукти / petroleum products; ⊗ — ціаніди / cyanides; ⊕ — важкі метали / heavy metals; ☆ — розчинений кисень / dissolved oxygen; ▽ — теплове забруднення / thermal pollution; ◇ — мінеральні добрива / mineral fertilizers; ◐ — мінералізація / mineralization; ◊ — синтетичні поверхнево активні речовини (СПАР) / synthetic surfactants (SSA); ⚡ — сірководень / hydrogen sulfide; □ — пестициди / pesticides; △ — шахтні води (важкі метали) / mine water (heavy metals); ☼ — фосфати / phosphates; ☆ — сапоніни / saponins; ✱ — феноли / phenols; ⊙ — радіонукліди / radionuclides; ◑ — закисне залізо Fe^{2+} / iron oxide Fe^{2+} ; ◒ — марганець Mn^{2+} / manganese Mn^{2+} .

Загроза появи екологічних ризиків виникає у випадку, коли сума ризиків більша суми відтворювальних можливостей екосистеми, або її приймальної (буферної) ємності, коли наявні токсичні домішки, їх концентрації водне середовище не може нейтралізувати та утилізувати.

Вживання суспільства можливе при запровадженні безстічних систем водокористування, наявності капіталовкладень на їх безперебійну роботу, за існування розгалуженої та численної мережі «природних локалітетів відтворення» для аборигенної іхтіофауни.

Для урбанізованих територій необхідні безстічні системи із замкнутим циклом водопостачання та водовідведення, як у космічному кораблі, особливо, коли до русла річки прив'язаний цілий ланцюг урбанізованих територій.

Рис. 2. Формування екологічної ситуації та ризиків у басейні р. Дніпро під впливом антропогенних чинників

Fig. 2. Formation of ecological situation and risks in the Dnipro river basin under the influence of anthropogenic factors

Концепція буферності річкових басейнів у ризикології

Стан водного середовища річкових басейнів залежить, у більшості випадків, від біомаси синтезованої органічної речовини на поверхні водозбору (фітостроми) та множинності екотонів за профілем русла.

Вміст гумусу в ґрунтах формує їх структуру, покращує утримання вологи і супутніх токсичних домішок, що зменшує поверхневу ерозію в річкових басейнах. Попередньо вміст гумусу в ґрунтах України був на рівні 12,0%, в сучасних умовах його залишилось не більше 2,5–3,0%.

Межові екотони дають можливість зберігати аборигенну іхтіофауну при стресових ситуаціях у основних руслах річок-водоприймачів. Риби у таких умовах використовують для свого збереження ніші та біоту водного середовища прилягаючої бічної додаткової мережі.

Екологічна стійкість річкових басейнів може бути виражена через **екологічну ємність**, яка дорівнює **сумі** переробної здатності компонентів суходолу еталонного басейну за домішками «С₁», приросту біомаси та приймальної ємності біоценозу досліджуваного басейну за домішками «С₂».

Сумарною характеристикою приймальної ємності басейнів річок щодо домішок є **гідроекологічна валентність** — відношення маси синтезованої органічної речовини на поверхні водозбору (у природних і антропогенно трансформованих ландшафтах) до маси поверхневого стоку (1).

$$ГЕВ = \Sigma B / F k, \quad (1)$$

де: **ГЕВ** — гідроекологічна валентність, **ΣB** — сумарна маса синтезованої органічної речовини (т), **F** — площа поверхні водозбору річкового басейну (км²), **k** — маса поверхневого стоку (л/с/км²).

Стійкість (Stk) водного середовища річкового басейну, відповідно **вартості**, визначають за **відношенням суми стресових чинників природного і антропогенного походження до суми межових зон-екотонів** (приток I і II порядків за наявності заплавних луків, озер, стариць, боліт, джерел, коридорів середовища, порогів, перекатів), тобто:

$$Stk = \Sigma Str / \Sigma N, \quad (2)$$

де: **Stk** — стійкість річкового басейну, **ΣStr** — сума стресів, **ΣN** — сума межових зон-екотонів.

До стресових чинників нами віднесені як природні (газовий та гідрологічний режими, тривалість затоплення заплав в нерестовий період, забезпечення живим кормом молоді риб), так і антропогенні (надходження стічних вод від промислових підприємств, браконьєрство, наявність токсичних домішок, урбанізований стік, який постачає до 60% загальної маси домішок).

Очевидно, необхідним є використання біопродукційного потенціалу стічних вод після комунальних очисних споруд для відтворення кормової бази риб у річковій мережі, що могло б стати одним з основних кроків до реабілітації біопродуктивності річкової мережі, порушеної господарською діяльністю людини.

Таким чином, басейн річки при господарському освоєнні слід розглядати як біокосну кібернетичну самоврегульовану екосистему з усім різноманіттям екотонів. Лише в цьому випадку можна очікувати на природне відтворення аборигенної іхтіофауни. Відповідно, не можна ототожнювати магістральний канал меліоративної системи та басейн природної річки з численними проміжними екотонами.

За існуючої ситуації в річкових екосистемах розвиток біорізноманіття йде не знизу до верху, а навпаки — зверху донизу. Тобто система деградує і вимагає компенсаційних заходів та реабілітації.

За даними моніторингу, основними чинниками формування несприятливої екологічної ситуації в басейнах річок є стічні води комунального сектору та промислових підприємств, зливовий стік з урбанізованих територій та поверхневий стік з сільськогосподарських угідь. При цьому, їх частка у внесенні домішок залежить від стану природокористування та водокористування. Так, стічні води комунального сектору, промислових підприємств та зливовий стік з урбанізованих територій дають до 68,0% від маси домішок, формуючи «гарячі точки» забруднень. Вони формують до 50,0% токсичності водного середовища (табл. 1, рис. 1, 2) [2, 3].

Стік із сільгоспугідь за привнесеним органічним вуглецем, мінеральним азотом та фосфором дає 30,0% від маси домішок, формуючи 38% токсичності - аміак, гербіциди, пестициди, фосфід цинку.

Негативну роль справляють і зависі, до 75,0% загальної маси яких надходить поверхневим стоком із урбанізованих територій, крім випадків локальних замулень, в т.ч. до рібницьких ставів, за відсутності обвідних каналів.

Слід відмітити, що за окремими басейнами річок ситуація ще гірша. Так, в басейні р. Тетерів привнесення органічного вуглецю у водне середовище здійснюється у 95% випадках, фосфору мінерального — у 71%, азоту мінерального — у 82%.

У природних умовах компоненти річкового стоку складають лише 2,8% від середньої маси домішок, а співвідношення органічного вуглецю, мінерального азоту та фосфору складає: С (4,0) : N (0,7) : Р (1,0), тобто, є залежним від оптимального співвідношення цих елементів при «цвітінні води» 106:16:1.

Таким чином, на формування ризиків особливо впливають біогенні елементи (С, N, Р), зависі та токсичні домішки котрі формують пряму токсичність водного середовища (рис.1).

Екоекономіка річкових іхтіосистем

За часів Київської Русі в Поліссі щільність населення становила одну людину на квадратний кілометр території, на сьогодні — в середньому 30 чоловік, а в місцях рекреації — близько 100 і більше.

Території, які раніше не використовувались або були заповідними, на сьогодні відкриті для добування ресурсів, виробництва продуктів харчування, в тому числі вилову і використання іхтіофауни. Втручання людини в іхтіоценози порушує місця нересту та існування риб, а забруднення веде до деградації «природних локалітетів» і зникнення навіть тих видів, які стійкі до стану

середовища (карась звичайний, в'юн). Змінюється структура іхтіоценозу (табл. 2).

В цих умовах ми можемо записати рибопродуктивність річкової мережі і вартість річкової риби як суму факторних ризиків [$f(W)$ — вартість річкової риби — функція від суми ризиків]:

$$\Sigma R = f(Ie, Me^{2+}, Ne, Str, P_{mat}, m, Q, L, V, B) = f(W), \quad (3)$$

де: ΣR — сума ризиків; Ie — якість водного середовища; Me^{2+} — присутність іонів важких металів; Str — чисельність стресових ситуацій; P_{mat} — наявність маточного поголів'я; m — маса живого корму риби; Q — гідрологічний режим сприятливий для затоплення заплави у весняну повінь; L — відкриті шляхи для міграції риби (нерестові, кормові); V — рівень демографічного навантаження рекреантів та величина любительського вилову риби; B — браконьєрський вилов у гирлах досліджуваних річок.

Таким чином, відповідно до концепції формування ризиків у водному середовищі вірогідність економічних збитків можна записати як відношення суми фактичних ризиків до суми оптимальних:

$$\Sigma R_{факт} / \Sigma R_{опт} = f(W). \quad (4)$$

Складові формул (3), (4) показують, що при наявності 10 чинників впливу, якщо прийняти їх рівнозначними, можливість виживання іхтіофауни у річковій мережі не перевищує 10%, а коли врахувати, що нерестовий вік у риби настає в 3–4 роки, то виходить, що виживання не перевищує 2,5–3,0%. Відповідно, формування ціноутворення вартості річкової риби, що відбувається в залежності від попиту та пропозиції, має прирівнюватися до вартості червоної риби.

Дослідження формування кризових ситуацій у каскаді водосховищ Дніпра та аналіз осінньо-зимових задух риби в басейнах рр. Стир і Горинь показав, що відтворення популяцій промислово цінних риби відбувається за рахунок бічної мережі, де ризик антропогенного впливу менший, а можливості відродження роботи екосистеми «русло-заплава» значно більші [1, 6, 7].

Таким чином, є необхідність підтримання ідеї створення природного трилатерального резервату «Західне Полісся», до якого необхідно включити придаткові гирлові ділянки річок, які впадають в р. Прип'ять з боку України, Польщі та Білорусії з центром у Київському водосховищі. В такому випадку ризик виживання (R) був би максимальним і залежав би від якості води та гідрометеорологічних циклів [8]:

$$R = F(Ie, Hгидромет.), \quad (5)$$

де: Ie — якість водного середовища, $Hгидромет.$ — гідромеліоративний чинник, що обумовлює водний режим та теплові умови; R — рибопродуктивність, Ie — якість води, Ni — незарегульовані притоки річок I порядку, ΣN — сумарна чисельність проміжних зон (екотонів), F — площа освоєних заплави і осушених земель, W — вартість 1 кг риби).

Просторова реабілітація повинна йти за рахунок збільшення частки непорушених територій до бажаного співвідношення 50 : 50, як стабілізуючого чинника (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка вилову риби у природних водоймах Західного Полісся України (на прикладі озер Шацького національного природного парку)

Згідно екологічних засад, сумарна маса органічної речовини на планеті Земля збалансована з масою косної речовини і є сталою величиною в усі геологічні періоди. Якщо прийняти цю концепцію для території України за регіонами, то гідроекологічна валентність тут нижча від природної щодо формування якості поверхневого стоку. Крім того, тут не враховується акумуляція і депонування токсичних домішок фітостромою та депонування CO_2 за рахунок фотосинтезу органічної речовини (рис. 4) [2, 4].

Рис. 4. Динаміка рибопродуктивності р. Горинь та чинниками впливу
Fig. 4. Dynamics of the Goryn river fish productivity by factors of influence

Бажане співвідношення 50 : 50% між непорушеними та порушеними територіями різко не співпадає, особливо в промислово розвинених степових регіонах України (рис. 4, 5; табл. 3).

Потепління клімату значно змінило умови відтворення для іхтіофауни. Вплинули на це скорочення чисельності проміжних екотонів, погіршення гідрологічного режиму, зниження біомаси фітостроми на поверхні водозбору, просування аридної зони України на північ. Відповідно, змінилась кореляційна залежність і значимість чинників впливу на формування іхтіоценозу природних та штучних водойм. Не випадково у водоймах переважають фітофільні види риб, а літо-реофільні види знаходяться серед рідкісних, зменшили свою чисельність чи перебувають серед зникаючих (табл. 2; рис. 6).

Рис. 5. Просторова реабілітація річкових басейнів території України
Fig. 5. Spatial rehabilitation of river basins of Ukraine

Таблиця 2. Зміни структури іхтіоценозу річок басейну Прип'яті (рр. Стир, Іква, Горинь, Случ)

Table 2. Changes in the structure of the rivers ichthyocenosis on the Pripyat basin (Styr, Ikva, Goryn, Sluch)

Види риб, популяції яких складають основу вилову / Fish species, whose populations form the majority of catches	Види риб, які у відловах не зустрічаються / Fish species not observed in catches	Зникаючі види риб, у т.ч. чисельність яких різко скоротилась / Endangered fish species, including those the number of which dropped sharply
Плітка <i>Rutilus rutilus</i> / Common roach <i>Rutilus rutilus</i>	Мінога українська <i>Eudontomyzon mariae</i> / Ukrainian brook lamprey <i>Eudontomyzon mariae</i>	Головень <i>Leuciscus cephalus</i> / Chub <i>Leuciscus cephalus</i>
Плоскирка <i>Blicca bjoerkna</i> / White bream <i>Blicca bjoerkna</i>	Марена дніпровська <i>Barbus borysthenticus</i> (Червона книга України) / <i>Barbus borysthenticus</i> (Red Book of Ukraine)	Білизна <i>Aspius aspius</i> / Asp <i>Aspius aspius</i>
Лящ <i>Abramis brama</i> / Common bream <i>Abramis brama</i>	Ялець <i>Leuciscus leuciscus</i> / Common dace <i>Leuciscus leuciscus</i>	Короп (сазан) <i>Cyprinus carpio</i> / Common carp <i>Cyprinus carpio</i>
Карась сріблястий <i>Carassius auratus gibelio</i> / Silver crucian carp <i>Carassius auratus gibelio</i>		Минь <i>Lota lota</i> (Червона книга України) / Burbot <i>Lota lota</i> (Red Book of Ukraine)
Верховодка <i>Alburnus alburnus</i> / Common bleak <i>Alburnus alburnus</i>	Гольян озерний <i>Phoxinus phoxinus</i> / Eurasian minnow <i>Phoxinus phoxinus</i>	Сом європейський <i>Silurus glanis</i> / Wels catfish <i>Silurus glanis</i>
Краснопірка <i>Scardinius erythrophthalmus</i> / Common rudd <i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Бистрянкa звичайна <i>Alburnoides bipunctatus rossicus</i> / Riffle minnow <i>Alburnoides bipunctatus rossicus</i>	Судак <i>Sander lucioperca</i> / Zander <i>Sander lucioperca</i>
Окунь звичайний <i>Perca fluviatilis</i> / European perch / <i>Perca fluviatilis</i>		В'язь <i>Leuciscus idus</i> / Ide <i>Leuciscus idus</i>
Щука <i>Esox lucius</i> / Northern pike <i>Esox lucius</i>	Чехонь <i>Pelecus cultratus</i> / Sichel <i>Pelecus cultratus</i>	Підуст <i>Chondrostoma nasus</i> / Common nase <i>Chondrostoma nasus</i>
Лин <i>Tinca tinca</i> / Tench <i>Tinca tinca</i>	Слих європейський <i>Nemacheilus barbatulus</i> / Stone loach <i>Nemacheilus barbatulus</i>	Рибекa <i>Vimba vimba</i> / Vimba bream <i>Vimba vimba</i>
Бичок-пісочник <i>Neogobius fluviatilis</i> / Monkey goby <i>Neogobius fluviatilis</i>		Карась звичайний <i>Carassius carassius</i> (Червона книга України) / Crucian carp (Red Book of Ukraine)
10 видів / 10 species	7 видів / 7 species	11 видів / 11 species

Аналіз складу іхтіоценозу, порівняно з описом В.С. Пенязя. (1957 р.), для басейну Прип'яті показав, що відсоток фіто-лімnofільних видів риб зріс у 2 рази, при цьому літо-реофільна іхтіофауна зменшилась у 3 рази (табл. 2; рис. 6).

Складена карта-схема екологічного стану поверхні водозбору річкових басейнів території України за кількісними показниками засвідчує, що перевантаження річкових басейнів здійснюється через екологічно небезпечну

індустріалізацію, урбанізацію та розорювання території України (антропогенні чинники), за низького рівня залісеності та залугованості (природні чинники), а також низької ефективності факторів управління (недостатнього очищення стічних вод, низької економії свіжої води, невисокої ефективності компенсаційних природоохоронних заходів) на фоні недостатньої кількості заповідних та резервних територій. Як наслідок, екосистеми річок перевантажені навіть у гирлових ділянках, а в місцях скиду та локалізованого надходження стічних вод значно перевантажені — «гарачі точки забруднення» (рис. 7; табл. 2).

Рис. 6. Динаміка змін складу іхтіоценозу природних водоемів Західного Полісся України (на прикладі р. Стир)

Fig. 6. Dynamics of changes in the ichthyocenosis of natural water bodies in the Western Polissya of Ukraine (e.g., Styr River)

Частково зберегли рекреаційну цінність та природний стан басейни річок Закарпатської, Чернівецької та Львівської областей.

Після аварії на ЧАЕС сформувались нові умови утворення річкового стоку у північних районах Рівненської, Волинської, Житомирської та Київської областей.

Вимагають відновлення екологічної рівноваги басейни річок, що традиційно використовуються для рекреації, особливо у південних областях України. Так, в

Одеській обл. річкові басейни перевантажені в 2–3 рази через високий рівень щільності населення, перерозорювання земель, слабку залісненість та залуженість. У Миколаївській обл. і Республіці Крим відмічається слабка екологічна забезпеченість індустріалізації.

Кризовий стан склався в басейнах річок з широко розвиненою гірничодобувною та металопереробною промисловістю — Луганська, Дніпропетровська, Запорізька області, де $K_e = 5,51\text{--}15,55$.

Просторовий аналіз чинників формування екологічного стану поверхневих вод та антропогенної трансформації поверхні водозбору річкових басейнів вказав на їх просторову тотожність (рис. 6, 7; табл. 3).

Таблиця 3. Узагальнені характеристики стану річкових басейнів та екологічної якості води гірлових ділянок річок

Table 3. Generalized characteristics of the status of river basins and ecological quality of water in estuarine areas

Річка, область / River, region	Якість води, I_e / Water quality, I_e	Факторні характеристики поверхні водозбору / Factor characteristics of the water catchment surface			Стан поверхні водозбору, K_e / State of the water catchment area, K_e
		$K_{\text{природні}}$ / K_{nature}	$K_{\text{антропогенні}}$ / $K_{\text{anthropogenic}}$	$K_{\text{управління}}$ / $K_{\text{management}}$	
Південний Буг, Вінницька / Pivdennyi Buh, Vinnytska	12,50	4,9	21,10	2,00	3,05
Стир, Волинська / Styr, Volynska	1,80	9,28	14,10	2,14	1,23
Дніпро, Дніпропетровська / Dnipro, Dnipropetrovska	11,00	3,47	51,21	2,58	8,55
Кальміус, Донецька / Kalmius, Donetska	27,00	3,88	86,41	2,00	19,69
Тетерів, Житомирська / Teteriv, Zhytomyrska	8,00	8,43	15,04	1,56	1,50
Латориця, Закарпатська / Latorytsia, Zakarpatska	3,30	36,38	11,17	1,83	0,30
Дніпро, Запорізька / Dnipro, Zaporizka	12,40	3,49	28,15	2,08	5,05
Дністер, Івано-Франківська / Dnister, Ivano-Frankivska	5,20	11,26	29,13	2,80	2,08
Дніпро, Київська / Dnipro, Kyivska	23,70	4,44	35,03	2,20	5,27
Інгул, Кіровоградська / Inhul, Kirovohradska	3,80	4,67	13,00	2,15	2,08

Річка, область / River, region	Якість води, I_e / Water quality, I_e	Факторні характеристики поверхні водозбору / Factor characteristics of the water catchment surface			Стан поверхні водозбору, K_e / State of the water catchment area, K_e
		$K_{\text{природні}}$ / K_{nature}	$K_{\text{антропогенні}}$ / $K_{\text{anthropogenic}}$	$K_{\text{управління}}$ / $K_{\text{management}}$	
Салгир, АР Крим / Salhyr, AR Krym	5,81	4,55	13,00	2,0	1,98
Сіверський Донець, Луганська / Siverskyi Donets, Luhanska	12,10	4,21	34,68	2,19	5,42
Західний Буг, Львівська / Zakhidnyi Buh, Lvivska	9,90	1,87	19,18	2,38	1,72
Інгул, Миколаївська / Inhul, Mykolaivska	4,30	3,77	17,48	2,09	3,00
Когильник, Одеська / Kohylnyk, Odeska	6,70	3,77	12,35	1,81	2,65
Ворскла, Полтавська / Vorskla, Poltavska	7,30	5,29	13,61	2,02	2,86
Горинь, Рівненська / Horyn, Rivnenska	9,90	9,0	17,02	2,95	1,42
Псьол, Сумська / Psol, Sumska	8,30	8,07	13,42	2,04	1,33
Серет, Тернопільська / Seret, Ternopilska	11,00	9,39	16,39	2,26	1,41
Сіверський Донець, Харківська / Siverskyi Donets, Kharkivska	14,00	4,84	27,60	2,29	3,87
Дніпро, Харківська / Dnipro, Kharkivska	7,90	3,57	13,92	2,31	2,36
Горинь, Хмельницька / Horyn, Khmelnytska	7,00	6,82	15,39	1,71	1,80
Рось, Черкаська / Ros, Cherkaska	3,30	3,71	10,00	2,32	1,66
Десна, Чернігівська / Desna, Chernihivska	6,30	10,16	15,10	1,86	1,27
Дністер, Чернівецька / Dnister, Chernivetska	6,70	8,68	9,73	3,00	0,83
Україна в цілому / Ukraine as a whole	9,50	9,38	21,74	2,17	1,88

Примітка. При умовному екологічному фоні $I_e = 1,0$ перевантаження екологічної ємності по території України зростає в 3–4 рази.

Note. Under conditional environmental background $I_e = 1.0$ overload of environmental capacity on the territory of Ukraine increases by 3–4 times.

Рис. 7. Карта-схема оцінки якості поверхневих вод України за трофо-сапробіологічними показниками [2]

Fig. 7. A map of the assessment of the surface water quality in Ukraine according to trophic-saprobial parameters [2]

Рис. 8. Карта-схема екологічного стану поверхні водозбору річкової мережі території України [2]

Fig. 8. A map of the ecological state for surface water catchment of the river network on the territory of Ukraine [2]

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Ризики — це сучасний складовий елемент ноосфери. Вони формуються в ній внаслідок екологічної і економічно необґрунтованої господарської діяльності, супроводжуються непередбачуваними кризовими явищами у водних екосистемах локального та глобального характеру.

У водних екосистемах (біологічних системах) надходження енергії супроводжується її розсіюванням на водообмін, синтез органічної речовини та депонування за трофічними ланцюгами. Причому, розвиток живих організмів відбувається в певних фізіологічно обумовлених коридорах — за температурою, мінералізацією, газовим режимом, реакцією середовища (рН), вмістом біогенних елементів та токсичними домішками. Значна зміна цих параметрів є причиною виникнення стресових ситуацій, а їх сумація веде до гідроекологічного вибуху та формування кризових явищ. Ризик у іхтіоекосистемах — це наслідок впливу порушених характеристик стану водного середовища.

У сучасних реаліях життя постає необхідність розробки та опрацювання нового наукового напрямку «ризикологія», який включав би проблемні питання екології, іхтіології, ноосферології, стратегій природокористування для аналізу стану з подальшою розробкою заходів з попередження формування ризиків і кризових ситуацій у водних екосистемах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Відновна іхтіоекологія (реабілітація аборигенної іхтіофауни природних водойм України) / ред. Й. В. Грив, В. В. Сондак. Рівне : Волинські обереги, 2007. 630 с.
2. Грив Й. В. Екологічна оцінка стану екосистем річкових басейнів рівнинної частини території України (охорона, відновлення, управління) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. біол. наук. Дніпро, 2002. 40 с.
3. Сондак В. В. Іхтіофауна природних водойм Стир-Горинського рибовідтворювального комплексу (стан та умови відтворення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. біол. наук. Київ, 2010. 44 с.
4. Грив Й. В., Клименко М. О., Сондак В. В. Відродження екосистем трансформованих басейнів річок та озер. Рівне : НУВГП, 2012. 246 с.
5. Грив Й. В., Сондак В. В., Волкошовець О. В. Іхтіофауна руслових водосховищ малих річок // Рибогосподарська наука України. 2012. № 3. С. 31—38.
6. Грив Й. В., Сондак В. В., Козлов В. И. Комплексная оценка условий воспроизводства в бассейнах рек // Рибогосподарська наука України. 2012. № 2. С. 44—59.
7. Сондак В. В., Кравченко В. В., Волкошовець О. В. Нормирование аллохтонных нагрузок на водную среду речных бассейнов в пределах урбанизированных территорий // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. 2013. № 4 (63). С. 24—34. (Серія : Сільськогосподарські науки).
8. Грив Й. В., Сондак В. В., Волкошовець О. В. О формировании трансграничного ихтиозоэкологического резервата «Верхний Днепр» // Проблеми Західного Полісся та прилеглих територій. 2014. № 11. С. 24—34.

9. Дрозд І. П. Концепція прийнятно ризику та проблеми забезпечення техногенної безпеки в Україні // Радіоекологія – 2017 : наук.-практ. конф., Київ, 24-26.04.2017 р. : матер. Київ, 2017. С. 94—97.
10. Красиков С. А. Исследование рисков в западной рискологии // Социологические исследования. 2008. № 9. С. 12—19.
11. Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя. Москва : Академкнига, 2007. 342 с.

REFERENCES

1. Gryb, J. V., & Sondak, V. V. (Eds.). (2007). *Vidnovna ihtioekologija (reabilitacija aborygennoi' ihtiofauny pryrodnyh vodojm Ukrai'ny)*. Rivne: Volyns'ki oberegy.
2. Gryb, J. V. (2002). *Ekologichna ocinka stanu ekosystem richkovykh basejnyv rivnyynnoi' chastyny terytorii' Ukrainy (ohorona, vidnovlennja, upravlinnja). Extended abstract of doctor's thesis*. Dnipro.
3. Sondak, V. V. (2010). *Ihtiofauna pryrodnyh vodojm Styr-Goryns'kogo rybovidtvorjuval'nogo kompleksu (stan ta umovy vidtvorennja). Extended abstract of doctor's thesis*. Kyiv.
4. Gryb, J. V., Klymenko, M. O., & Sondak, V. V. (2012). *Vidrodzhennja ekosystem transformovanykh basejnyv richok ta ozer*. Rivne: NUVGP.
5. Gryb, J. V., Sondak, V. V., & Volkoshovec', O. V. (2012). Ihtiofauna ruslovykh vodoshovyshh malych richok. *Rybogospodars'ka nauka Ukrainy*, 3, 31-38.
6. Grib, Y. V., Sondak, V. V., & Kozlov, V. I. (2012). Kompleksnaya otsenka usloviy vosproizvodstva v basseynakh rek. *Rybogospodars'ka nauka Ukrainy*, 2, 44-59.
7. Sondak, V. V., Kravchenko, V. V., & Volkoshovets, O. V. (2013). Normirovanie allokhtonnykh nagruzok na vodnuyu sredu rechnykh basseynov v predelakh urbanizirovannykh territoriy. *Visnyk natsionalnogo universitetu vodnogo gospodarstva ta prirodokoristuvannya*, 4 (63), 24-34.
8. Grib, Y. V., Sondak, V. V., & Volkoshovets', O. V. (2014). O formirovanii transgranichnogo ikhtioekologicheskogo rezervata «Verkhniy Dnepr». *Problemy Zakhidnogo Polissya ta prileglikh teritoriy*, 11, 24-34.
9. Drozd, I. P. (2017). Kontseptsiya priyinatno riziku ta problemi zabezpechennya tekhnogennoi bezpeky v Ukraini. *Radioekologiya – 2017: nauk.-prakt. konf.*, Kyiv, 24-26.04.2017 r.: mater. Kyiv, 94-97.
10. Krasikov, S. A. (2008). Issledovanie riskov v zapadnoy riskologii. *Sotsiologicheskie issledovaniya*, 9, 12-19.
11. Medouz, D. (2007). *Predely rosta. 30 let spustya*. Moskva: Akademkniga.

ФОРМИРОВАНИЕ РИСКОВ ВЫЖИВАНИЯ ИХТИОФАУНЫ В РЕЧНЫХ БАСЕЙНАХ УКРАИНЫ. КОНЦЕПЦИЯ НАУКИ «РИСКОЛОГИЯ»

И. В. Гриб, kaf.vb@nuvm.edu.ua, Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно

В. В. Сондак, kaf.vb@nuvm.edu.ua, Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно

О. В. Волкошовец, kaf.vb@nuvm.edu.ua, Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно

Д. И. Войтышина, kaf.vb@nuvm.edu.ua, Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно

Цель. Выявление источников формирования рисков в водных бассейнах и последствий от их появления для окружающей среды и ихтиофауны. Разработка концептуальных основ эколого-экономической и социальной науки «**рискология**».

Методика. В ходе работы использовались обобщенные ихтиоэкологические исследования и результаты контрольных ловов рыб в зимовальных ямах гидрографической сети равнинной части территории Украины, в частности, бассейна р. Днепр в среднем течении: рр. Трубиж, Удай; рр. Стырь, Иква, русловые водохранилища Хринницкое (р.Стырь), Млыновское (р. Иква); рр. Горынь, Случ, Басовкутское на р. Устье (п.п. р. Горынь); Шацкие озера в бассейне р. Припять.

Результаты. Накопленная за тысячелетия послеледникового периода масса органического вещества окружающей среды является стабилизатором климата и одновременно, используется в хозяйственной деятельности — почвы, запасы пресной питьевой воды, лесные насаждения, осушенные болота, полезные ископаемые, речные экосистемы — первичные ячейки синтеза органического вещества, ухудшение качество воды, сточные воды. Все это раны на теле живой планеты.

Никто не знает, до какого предела нарушенная мегаэкосистема может восстанавливаться, какой уровень противодействия возможен со стороны окружающей среды. Отрицательные последствия хозяйственного использования природных богатств наблюдаются уже сегодня. Вместе с климатическими и геофизическими факторами, парниковый эффект вызывает изменения теплового баланса Земли, влияет на формирование углекислого газа и кислорода в атмосфере, вызывает изменение климатических поясов, дефицит пресной питьевой воды, вымирание чувствительных к загрязнению видов флоры и фауны.

Научная новизна. Рассмотрена концепция формирования рисков в водных экосистемах природного и антропогенного происхождения. Обоснована необходимость разработки научного направления «**рискология**» в развитии ноосферологии — науки о гармонизации природопользования в современных условиях, с возможностью прогнозирования непредсказуемых последствий хозяйственной деятельности человека для окружающей среды.

Практическая ценность. Концепция ноосферы как планеты разума требует появления и утверждения науки «**рискология**» для создания общегосударственных норм и регламентов современного поведения человека в окружающей среде для сохранения его среды обитания и существования.

Ключевые слова: ноосфера, ихтиофауна, ихтиоэкосистема, кризисные ситуации, оценка рисков, экологическое нормирование, экоэкономика, экономический ущерб.

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 30-42
DOI: 10.15407/fsu2018.02.030
УДК 597-14:597.553.1

Received 03.04.18
Received in revised form 30.05.18
Accepted 04.06.18

СТАТЕВИЙ ДИМОРФІЗМ ТА МІКРОАНАТОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТЮЛЬКИ *CLUPEONELLA CULTRIVENTRIS* (NORDMANN, 1840) БУЗЬКОГО ЛИМАНУ ПІД ЧАС НЕРЕСТОВОЇ МІГРАЦІЇ

К. М. Гейна, Geina_k@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН України,
м. Київ

С. С. Шашликова, lanashashlykova@gmail.com, Херсонський державний аграрний
університет, м. Херсон

М. С. Козій, kozij67@gmail.com, Чорноморський національний університет ім.
Петра Могили, м. Миколаїв

Мета. Проаналізувати статевий диморфізм тюльки *Clupeonella cultriventris* (Nordmann, 1840) Бузького лиману в сучасних умовах. Дослідити динаміку змін структури мезонефросу під час нерестової міграції з лиману у р. Південний Буг. Визначити перспективу використання даних гістологічного моніторингу в іхтіологічній практиці для оцінки морфофункціонального статусу риб.

Методика. Первинні матеріали отримані з наукових та промислових ловів, які здійснювалися на акваторіях Дніпровсько-Бузької гирлової системи. Облікові станції були розташовані по ходу нерестової міграції виду з Бузького лиману у р. Південний Буг. Польова та камеральна обробка іхтіологічних зразків виконана у відповідності до загальноновизнаних методик та керівництв. Гістологічні дослідження здійснені з використанням авторського обладнання та оригінальних методик, спеціально призначених для діагностики тканин риб.

Результати. Дослідження показали існування досить суттєвого статевого диморфізму у стадії тюльки *Clupeonella cultriventris* (Nordmann, 1840) Бузького лиману. За результатами порівняльного аналізу двадцяти чотирьох пластичних ознак встановлено, що самиці тюльки є більш високоспинними ($t_d = 6,11$; $p < 0,05$) з меншим тулубом ($t_d = 8,62$; $p < 0,05$) та хвостовим стеблом ($t_d = 7,64$; $p < 0,05$). Також у самиць виявлено зміщення плавців у каудальному напрямку, що проявилось у достовірній різниці між показниками антедорсальної, антепектральної, антеветральної, антеанальної, пектровентральної та вентроанальної відстаней ($t_d = 4,39$ – $9,67$; $p < 0,05$). Лінійні параметри плавців (довжина, висота) також достовірно відрізнялися ($t_d = 3,96$ – $11,23$; $p < 0,05$). При цьому важливо наголосити, що у самиць показники даних ознак були більшими, ніж у самців. Виключенням виступала висота анального плавця — у самців вона була достовірно вищою, ніж у самиць ($t_d = 6,85$; $p < 0,05$). За довжиною черевних плавців достовірної різниці не виявлено ($t_d = 0,03$; $p < 0,05$), що характерно і для довжини голови ($t_d = 0,15$; $p < 0,05$). У відділі голови суттєвих розбіжностей не виявлено. Достовірна різниця існує лише за діаметром ока та позаоковою відстанню ($t_d = 4,15$ – $7,99$; $p < 0,05$).

Дослідження мікроанатомічних показників виявили, що коливання осмоларності водного середовища достовірно впливають на зміни гістоструктури та функціональних особливостей нефрогенної тканини у вигляді зменшення діаметра капсули Боумена-Шумлянського на 7,0 мк. Про зниження функціональної активності ниркової конволюти свідчить зменшення висоти клітин кубічного епітелію проксимальних звитих каналців на 3,0 мк. Локалізація груп іонотранспоруючих клітин поблизу васкулярних елементів та

© К. М. Гейна, С. С. Шашликова, М. С. Козій, 2018

епітелію каналців свідчить про участь мезонефросу в іонорегуляторних процесах, що підвищує стійкість особин по відношенню до змін солоності води. При зниженні осмолярності навколишнього середовища у середній нирці тільки змінюється функціональна активність нефрона, що супроводжується зменшенням діаметра ниркових тілець і висоти епітелію проксимальних звитих каналців.

Наукова новизна. Представлені нові, а також суттєво оновлені існуючі дані зі структури нерестового стада тільки Дніпровсько-Бузької гирлової системи. Вперше проведений гістологічний аналіз структури мезонефросу статевозрілих особин тільки. Уточнена та доповнена інформація стосовно таксономічних особливостей адаптаційних змін нефрогенної тканини таксону в умовах нерестової міграції.

Практична значимість. Отримана інформація являє цінність у морфофізіологічних дослідженнях, а також в іхтіологічній практиці у зв'язку з існуючою сучасною проблемою пониження життєвого статусу особин через скорочення запасів ряду цінних промислових видів риб в дельтових акваторіях річкових систем України.

Ключові слова: Бузький лиман, р. Південний Буг, тюлька, пластичні ознаки, статевий диморфізм, мезонефрос, осморегуляція.

SEXUAL DIMORPHISM AND MICROANATOMICAL PARAMETERS OF THE BLACK SEA SPRAT *CLUPEONELLA CULTRIVENTRIS* (NORDMANN, 1840) OF THE BUG LAGOON DURING ITS SPAWNING MIGRATION

K. Geina, Geina_k@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS of Ukraine, Kyiv

S. Shashlykova, lanashashlykova@gmail.com, Kherson State Agrarian University, Kherson

M. Koziiy, kozii67@gmail.com, Petro Mogyla Black Sea National University, Mykolaiv

Purpose. To analyze sexual dimorphism of the Black Sea sprat *Clupeonella cultriventris* (Nordmann, 1840) of the Bug lagoon under current conditions. To study the dynamics of changes in mesonephros structure during spawning migration from the estuary to the Southern Bug River. To determine the prospect of using the data of histological monitoring in ichthyological practice for the assessment of fish morphofunctional status.

Methodology. Primary materials were obtained during scientific and commercial fishery surveys carried out in the Dnieper-Bug estuary system. Control stations were located along the spawning migration pathways of the Black Sea sprat from the Bug lagoon to the South Bug River. Field and laboratory processing of ichthyological samples was performed according to generally accepted methods and guidelines. Histological studies were performed using author's equipment and original methods specially intended for fish tissue diagnostics.

Findings. The studies indicated on the presence of a significant sexual dimorphism in the Black Sea sprat *Clupeonella cultriventris* (Nordmann, 1840) of the Bug lagoon. The comparative analysis of twenty-four plastic features showed that sprat females had a higher body depth ($t_d = 6.11$; $p < 0.05$), shorter body ($t_d = 8.62$; $p < 0.05$) and caudal peduncle ($t_d = 7.64$; $p < 0.05$). Females also had the displacement of fins in the caudal direction that that was manifested as a significant difference between antedorsal, antepectral, anteventral, anteanal, pectoventral, and ventroanal distances ($t_d = 4.39-9.67$; $p < 0.05$). Linear parameters of fins (length, height) also differed significantly ($t_d = 3.96-11.23$; $p < 0.05$). It is important to mention that these features in females were larger than those in males. An exception was the anal fin height, which was significantly higher in males than in females ($t_d = 6.85$; $p < 0.05$). No differences were detected for abdominal fin length ($t_d = 0.03$; $p < 0.05$) that was also typical for head length ($t_d = 0.15$; $p < 0.05$). No significant differences were detected in the head area. A significant differences was observed only for eye diameter and postorbital distance ($t_d = 4.15-7.99$; $p < 0.05$).

Studies of microanatomical feature showed that osmolarity fluctuations of aquatic environment had a significant effect on changes in the histological structure and functional peculiarities of the

nephrogenic tissue through the reduction in the diameter of Bowman-Shumlyansky's capsule by 7.0 μm . The reduction in the functional activity of renal convolute was demonstrated by the reduction in the height of cubic epithelium cells of convoluted tubules by 3.0 μm . Localization of ion-transporting cell groups near vascular elements and tubular epithelium indicate on the participation of mesonephros in ion-regulating processes that increase the resistance of fish to the changes in water salinity. If osmolarity of aquatic environment reduces, functional nephron activity in sprat kidney changes that is manifested as a reduction in the diameter of renal bodies and height of the epithelium of proximal convoluted tubules.

Originality. The paper contains new and significantly updated already existing data on the structure of the Black Sea sprat spawning stock of the Dnieper-Bug estuary system. A histological analysis of the mesonephros structure of mature Black Sea sprat was performed for the first time. Information on taxonomic peculiarities of adaptation changes in the nephrogenic tissue in the condition of spawning migration was specified and complemented.

Practical value. The obtained information is valuable for morpho-physiological studies as well as for ichthyological practice due to the existing current problem of the decrease in the vital status of sprat because of the reduction in the stocks of a number of valuable commercial fish species in delta areas of the river systems of Ukraine.

Key words: Bug lagoon, Southern Bug River, plastic features, sexual dimorphism, mesonephros, osmoregulation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

У Дніпровсько-Бузькій гирловій системі тюлька є найчисленнішим представником реліктової лиманної іхтіофауни. Вона характеризується досить значною пластичністю по відношенню до абіотичних параметрів середовища існування, що сприяло розселенню виду в процесі трансформації природного стоку Дніпра [1–2].

Спеціальні дослідження свідчать про зростання чисельності тюльки у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі внаслідок зниження інтенсивності промислу через низку об'єктивних причин організаційного сенсу [3]. Тривалий систематичний недолов обумовив зміни структури стада тюльки, що втілювалося у подовшанні вікового ряду і закономірному збільшенні частки граничних груп правого крила. При цьому, темп лінійно-вагового росту був задовільним, що свідчить про лабільність біотичних параметрів середовища [4]. Одночасно, автори вказують на зростання напруженості у харчових стосунках між різновіковою тюлькою та молоддю представників промислової іхтіофауни [5].

Загальновідомо, що з'ясування механізму адаптації риб до факторів різного походження є одним з ключових моментів у вирішенні проблеми взаємодії організму і зовнішнього середовища. В іхтіологічних дослідженнях найбільш затребуваними є морфологічні та гістологічні показники. Поряд з відомими маркерами, мезонефрос риб є важливим індикатором стану організму. В умовах помірних навантажень на акваторії мезонефросу риб характерна певна реактивність, що, в свою чергу, узгоджується з резервами функціональної здатності. Як правило, активізується функціональна здатність ренальної тканини у вигляді різнопланових морфологічних перебудов [6]. В іхтіологічних дослідженнях дана складова має теоретичну значимість, що дає можливість використовувати її при оцінюванні функціонального статусу риб.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Дослідження з вивчення біологічних особливостей тільки Дніпровсько-Бузької гирлової системи здійснюються досить тривалий час. У минулому та на початку поточного століття увага дослідників більшою мірою була прикута до біології та трофологічного статусу тільки в екосистемі дніпровських водосховищ [7–12]. Питанням характеристики промислового стада тільки у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі приділялося дещо менше уваги. Дослідження мали несистемний характер, орієнтувалися на вивчення вікової, розмірно-вагової структури стада, особливостей морфології та промислового навантаження [13–16].

Відомості щодо статевого диморфізму тільки з Бузького лиману у доступних літературних джерелах є досить обмеженими. А інформація стосовно змін в паренхімі мезонефроса під час нерестової міграції взагалі відсутня.

З огляду на вищевказане, вивчення сучасного стану нерестового стада тільки, встановлення можливого існування статевого диморфізму у сукупності з дослідженнями щодо гістологічної будови осморегуляторної системи, має велике теоретичне та науково-прикладне значення. Означені вище концепції сформулювали основну мету та задачі дослідження.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Збір іхтіологічних зразків здійснено на акваторії Дніпровсько-Бузької гирлової системи під час діяльності контрольно-спостережних пунктів Інституту рибного господарства НААН України. При цьому, також були використані матеріали з промислових знарядь лову (тількикові бурила, конусні пастки).

Польова та камеральна обробка матеріалів виконувалася у відповідності до загальноновизнаних в практиці іхтіологічних досліджень методик та керівництв [17–18]. Структура стада та морфологічні характеристики вивчалися за І. Ф. Правдіним [19]. Статевий диморфізм проаналізований за t-критерієм Стьюдента (t_d) з урахуванням об'єму вибірки (n) та рівня значимості ($p < 0,05$). Критичне значення критерію Стьюдента для даного числа ступеней свободи (f) визначалося з урахуванням фактичного об'єму вибірки.

За основу гістологічної оцінки отриманих матеріалів була обрана структура тканини тулубної нирки. Камеральну обробку матеріалів здійснювали за допомогою авторського обладнання і оптимізованих методик. При цьому була задіяна оптична апаратура «E. Leitz «diaplan» Wetzlar» [20–21]. Коректуюча обробка мікрознімків виконана за допомогою комп'ютерних програм «Microsoft Office Picture Manager», «F S Viewer».

Математична обробка отриманих результатів виконана за З. М. Аксютіною [22] з використанням електронних таблиць редактора «Microsoft Office Excel 2003».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Попередні дослідження морфологічних ознак тільки Дніпровсько-Бузької гирлової системи показали, що статевий диморфізм у даного виду виражений досить суттєво. З проаналізованих двадцяти пластичних ознак достовірна різниця

відмічена за дванадцятьма [16]. Було доведено, що найбільш суттєвою різниця спостерігалася за висотою тіла, антепектральною відстанню та довжиною черевних плавців ($t_d = 4,5-6,8$; $p < 0,05$).

Аналіз пластичних ознак тюльки з Бuzького лиману під час нерестових міграцій останніх років вказав на наявність суттєвішого статевго диморфізму у стаді. Серед проаналізованих двадцяти чотирьох ознак достовірної різниці не виявлено лише за шістьма.

Самиці тюльки виявилися високоспиннішими ($t_d = 6,11$; $p < 0,05$), але з меншою довжиною тулубу ($t_d = 8,62$; $p < 0,05$) та хвостового стебла ($t_d = 7,64$; $p < 0,05$). При цьому важливо наголосити, що варіабельність довжини тулуба (l_{cor}) як у самців, так і у самиць була незначною ($C_v = 2,2-2,6\%$). Низьким рівнем мінливості характеризувалися і показники найбільшої висоти тіла (H): $C_v = 7,5-7,6\%$. Варіабельність (C_v) довжини хвостового стебла ($p-l$) змінювалася в межах від 13,7% у самиць до 16,0% у самців (табл. 1).

Таблиця 1. Аналіз статевго диморфізму тюльки Бuzького лиману
Table 1. Analysis of sprat sex dimorphism in the Bug's estuary

Ознака / Sign	♀, n = 73			♂, n = 73			t_d
	M	$\pm m$	C_v	M	$\pm m$	C_v	
Lc, cm / Lc, cm	7,2	0,12	14,5	7,5	0,10	11,9	2,03
У % до Lc / in % for Lc							
l_{cor}	70,6	0,21	2,6	73,0	0,19	2,2	8,62
H	24,5	0,22	7,5	22,7	0,20	7,6	6,11
h	8,9	0,10	9,5	8,5	0,08	8,0	3,30
iH	9,4	0,12	10,4	7,8	0,09	9,3	11,18
aD	45,5	0,28	5,2	42,6	0,39	7,8	5,92
PD	37,7	0,21	4,8	37,7	0,22	4,9	0,11
aP	22,8	0,17	6,5	21,0	0,36	14,7	4,39
aV	49,8	0,31	5,3	47,1	0,45	8,2	4,85
aA	68,3	0,34	4,3	65,2	0,44	5,8	5,55
PV	27,7	0,26	8,0	24,3	0,23	8,2	9,67
VA	20,0	0,27	11,5	18,0	0,22	10,6	5,88
l-D	12,9	0,17	11,5	11,8	0,22	15,8	3,96
h-D	15,3	0,16	8,9	12,7	0,25	16,8	8,68
l-A	16,2	0,19	10,0	12,7	0,25	16,8	11,23
h-A	4,7	0,07	12,3	5,5	0,10	15,0	6,85
l-P	15,5	0,17	9,3	14,1	0,30	18,1	4,13
l-V	10,9	0,10	8,2	10,9	0,15	12,1	0,03
p-l	4,9	0,08	13,7	6,0	0,11	16,0	7,64
lc	24,2	0,16	5,6	24,2	0,11	4,0	0,15

Ознака / Sign	♀, n = 73			♂, n = 73			t _d
	M	±m	Cv	M	±m	Cv	
У % до Іс / in % for Lc							
ar	33,3	0,38	9,7	33,4	0,20	5,2	0,24
do	27,3	0,39	12,3	25,5	0,21	7,0	4,15
pc	39,3	0,57	12,4	34,4	0,21	5,3	7,99
hc	65,4	0,72	9,4	65,4	0,22	2,8	0,004
lo	15,3	0,31	17,4	14,7	0,28	16,0	1,42

У розміщенні плавців також відмічена достовірна різниця. Спинний плавець самиць є більш зміщеним у каудальному напрямку ($t_d = 5,92$; $p < 0,05$). Також у них більшими виявилися відстані aP ($t_d = 4,39$; $p < 0,05$), aV ($t_d = 4,85$; $p < 0,05$), aA ($t_d = 5,55$; $p < 0,05$), PV ($t_d = 9,67$; $p < 0,05$) та VA ($t_d = 5,88$; $p < 0,05$).

Для непарних плавців самців і самиць найбільш суттєвою достовірною різницею була відмічена за довжиною анального ($t_d = 11,23$; $p < 0,05$) та висотою спинного ($t_d = 8,68$; $p < 0,05$). Встановлено, що у самиць лінійні розміри плавців були переважно більшими, а за довжиною черевного плавця достовірної різниці взагалі не виявлено ($t_d = 0,03$; $p < 0,05$). У самців лише висота анального плавця переважала такий показник у самиць ($t_d = 6,85$; $p < 0,05$), що пов'язується з біологією відтворення.

За довжиною голови достовірної різниці не виявлено ($t_d = 0,15$; $p < 0,05$). Проте у самців меншим є діаметр ока ($t_d = 4,15$; $p < 0,05$) та значно коротша позаокова відстань ($t_d = 7,99$; $p < 0,05$). За іншими пластичними ознаками відділу голови самців і самиць тільки достовірної різниці не виявлено.

Певну зацікавленість викликає інформація щодо окремих мікроанатомічних показників тільки, які характеризують морфобіологічний стан об'єкта досліджень у природному середовищі. Загальновідомо, що функціонування і будова мезонефроса у особин, які здійснюють нерестові міграції з осолонених лиманних ділянок до прісноводних річкових, пов'язані з особливостями осморегуляції у певний сезон. На початок нерестової міграції (район Волоської коси у Бузькому лимані) у нефрогенній та гемопоетичній тканині мезонефроса тільки встановлені наступні ознаки (рис. 1).

Представлена інформація вказує на те, що простір між листками капсули Боумена-Шумлянського широкий, що, в свою чергу, є свідченням присутності в порожнині капсули значного об'єму первинного фільтрату. Отже, нирковий фільтр посилено компенсує втрати води з тканин.

В мезонефросі особин тільки з Бузького лиману спостерігаються іонотранспортуючі клітини з характерними для них секреторними гранулами. Ступінь насиченості цитоплазми такими гранулами свідчить про вищий рівень енерговитрат на підтримання обміну речовин. Встановлено, що слиз, який виділяється келихоподібними клітинами, запобігає злущуванню епітелію, що є складовою механізму регенерації каналців. Гемопоетичну тканину складають ретикуло-лімфомієлоїдні елементи і кровоносні судини. Більша частина формених елементів крові представлена еритроцитами і групами лімфоцитів.

Рис. 1. Мезонефрос трирічної особини тюльки з акваторії Бугського лиману: 1 — капсула Боумена-Шумлянського; 2 — каналці конволюти; 3 — вставний відділ нефрона; 4 — вивідна трубка; 5 — гемопоетична тканина.

Fig. 1. Mesonephros of three-year-old sprat from the waters of the Bug's estuary: 1 — Bowman-Shumlyansky capsule; 2 — convolute tubules; 3 — insertion department of the nephron; 4 — excretory tube; 5 — hemopoietic tissue.

Переслідуючи мету порівняння гістологічної будови тулубних нирок тюльки у зв'язку зі змінами осмолярності середовища існування, був досліджений мезонефрос у особин з акваторії Південного Бугу, де відмічається прісна вода (рис. 2).

Представлена інформація вказує на те, що стінки капсули Боумена-Шумлянського складаються з двох листків, з яких найбільш виразним є парієтальний. Вісцеральний листок подекуди тісно зрощений з клубочком капілярів. Первинний фільтрат скупчується у просторі між листками капсули. Структури розташовані поодинокі і знаходяться у тісному контакті з кровоносними капілярами.

Епітеліоцити каналців конволюти мають кубічну форму з опуклими ядрами. Цитоплазма клітин мутна, з темно-рожевим відтінком, що є переконливим свідченням протікання процесів реабсорбції у даному відділі нефрону.

На апікальному кінці епітеліоцитів присутня чітко виражена облямівка, яка суттєво збільшує площу всмоктування. Встановлено, що епітелій в єднальному відділі втрачає виражене специфічне щіточне обрамлення, каналні конволюти переходять у порівняно короткий дистальний відділ. Цитоплазма клітин світла, а ядра округлі.

Рис. 2. Мезонефрос трирічної особини тюльки з акваторії Південного Бугу: 1 — капсула Боумена-Шумлянського; 2 — каналці конволюти; 3 — вставний відділ нефрона; 4 — вивідна трубка.

Fig. 2. Mesonephros of three-year-old sprat from the Southern Bug water area: 1 — Bowman-Shumlyansky capsule; 2 — convolute tubules; 3 — insertion department of the nephron; 4 — excretory tube.

Вставні відділи входять у збиральні трубки. Діаметр просвіту в них значно ширший, внутрішня поверхня вистелена призматичним епітелієм. Цитоплазма клітин прозора, світло-рожевого кольору, ядра еліптичної форми. За збиральними трубками знаходяться відвідні трубки — каналці з найбільш широким діаметром просвіту і світлим епітелієм.

Аналіз гістологічних препаратів ниркової паренхіми тюльки з дослідної акваторії дозволив встановити наявність добре розвинутого фільтраційного апарату. Можна зробити висновок, що закономірні коливання показників осмолярності в межах акваторії від Волоської коси (осолонені води Бузького лиману) до с. Баловне (прісні води р. Південний Буг) достовірно впливають на зміни гістологічної структури та функціональних особливостей нефрогенної тканини представника родини оселедцевих Дніпровсько-Бузької гирлової системи — тюльки (табл. 2).

Як свідчать дані таблиці 2, в найяскравішому випадку досить очевидним є факт зменшення діаметра капсули Боумена-Шумлянського (на 7,0 мк), що відповідає другому рівню статистичної достовірності. На користь факту напруженості функціональної активності конволюти свідчить також і зменшення висоти епітеліоцитів проксимальних звитих каналців (на 3,0 мк відповідно).

Показник кількості ретикуло-лімфомієлоїдних елементів в мезонефросі особин тюльки з Бузького лиману відрізняється високим рівнем достовірності. Співвідношення гемопоетичної тканини і структурних одиниць конволюти в мезонефросі особин на початку і в кінці міграційного шляху відрізняється на 15%, що відповідає нормальному фізіологічному статусу риб.

Таблиця 2. Зміни структури мезонефроса тюльки в залежності від коливання показників осмоларності середовища існування, $M \pm m$ ($n=20$)

Table 2. Changes in mesonephric structure of sprat, depending on the habitat osmolality oscillation, $M \pm m$ ($n = 20$)

Акваторія / Water area	Нефрогенна тканина / Nephrogenic tissue			Гемопоетич на тканина, % / Hemopoietic tissue, %
	капсула Боумена- Шумлянського, діаметр, мк / Bowman- Shumlyansky capsule, diameter, microns	епітелій проксимальних звитих канальців, мк / epithelium of proximal convoluted tubules, microns	епітелій дистальних звитих канальців, мк / epithelium of distal convoluted tubules, microns	
Бузький лиман / Bug's estuary	42,0 ± 16,35*	9,0 ± 2,06*	5,0 ± 1,08	52 ± 8,35**
р. Південний Буг / River Southern Bug	35,0 ± 12,21	6,0 ± 1,27	5,0 ± 1,06	37 ± 6,20

Примітка. * $P < 0,01$; ** $P < 0,001$.

Notes. * $P < 0,01$; ** $P < 0,001$.

Таким чином, у міру переміщення риб з осолонених лиманних акваторій до більш розпріснених річкових ділянок у нирковій паренхімі поступово зменшується кількість гемопоетичної тканини. Відповідним чином збільшується кількість ренальних елементів — ступінь розвитку лімфоїдної тканини в мезонефросі тюльки знаходиться у зворотній залежності від кількості нефрогенної тканини.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

У тюльки Бузького лиману відмічений досить суттєвий статевий диморфізм у нерестовому стаді. Серед проаналізованих двадцяти чотирьох пластичних ознак достовірної різниці не виявлено лише за шістьма. У самиць плавці є більш зміщеними у каудальному напрямку. Лінійні розміри плавців у самиць є більшими, ніж у самців. Виключенням є висота анального плавця, яка у самців є більшою, що пов'язується із біологією відтворення. У відділі голови суттєвих розбіжностей не виявлено. Достовірна різниця існує лише за діаметром ока та поза оковою відстанню.

Участь мезонефросу в іонорегуляторних процесах підвищує стійкість особин по відношенню до змін солоності води під час нерестової міграції. При переміщенні плідників тюльки до прісноводної річкової системи у нирці тюльки змінюється функціональна активність нефрона, що супроводжується зменшенням діаметра ниркових тілець і висоти епітелію проксимальних звитих канальців.

Представлена фактична інформація дає можливість використання отриманого матеріалу не тільки в морфологічних дослідженнях, але також і в практиці іхтіології у зв'язку з існуючою проблемою зниження життєвого статусу особин.

ЛІТЕРАТУРА

1. Шевченко П. Г., Мальцев В. И. Изменения в ихтиофауне Днепра в пределах Украины во II половине XX столетия // Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф.

- : матер. Київ : ІРГ УААН, 2005. С. 291—297.
2. Екологічні трансформації річкових гідроєкосистем та актуальні проблеми рибного господарства / Шерман І.М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2013. № 4 (26). С. 5—16.
3. Гейна К. М., Шашликова С. С., Топчій О. І. Промислові улови оселедцевих (*Clupeidae*) Дніпровсько-Бузької гирлової системи // Наука і сучасність: Виклики глобалізації : III Міжнар. конф. : матер. Ч. 1. Київ : Центр наукових публікацій, 2017. С. 5—10.
4. Гейна К. М., Шашликова С. С. Промислово-біологічна характеристика тюльки (*Clupeonella cultriventris* Nordmann, 1840) Дніпровсько-Бузької гирлової системи // Рибогосподарська наука України. 2017. № 4(42). С. 53—64.
5. Гейна К. М., Шашликова С. С. Живлення молоді промислової іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової системи // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). 2017. Т. 9, вип. 2. С. 219—225.
6. Козий М. С. Гистоморфологические особенности ихтиофауны юга Украины : монография. Херсон : Олди-плюс, 2011. 310 с.
7. Сальников Н. Е., Суховайван П. Г. Тюлька в Каховском водохранилище // Зоол. журн. 1959. Т. XXXVIII (38). Вып. 9. С. 1375—1382.
8. Симонова Л. Г. Некоторые данные о развитии чехони и тюльки в Каховском водохранилище // Тр. совещ. ихтиолог. комиссии АН СССР. 1961. Вып. 10. С. 290—292.
9. Сигиневич Г. П. Оценка запасов тюльки и степени использования ею зоопланктона Каховского водохранилища // Гидробиол. журн. 1968. Т. IV, № 5. С. 46—54.
10. Шевченко П. Г. Эколого-морфологическая характеристика тюльки *Clupeonella cultriventris cultriventris* (Nordman) и ее роль в экосистеме днепровских водохранилищ : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Киев, 1991. 18 с.
11. Гейна К. М. Харчові взаємовідносини тюльки та товстолобиків Каховського водосховища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.10 «Іхтіологія». Київ, 2007. 24 с.
12. Гейна К. М. Динаміка змін вікової структури промислових стад тюльки та товстолобиків Каховського водосховища // Рибогосподарська наука України. 2008. № 4. С. 31—34.
13. Гейна К. М., Горбонос В. М. Розмірно-вагова та вікова структура популяції тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи у зв'язку з особливостями ведення її промислу // Природничий альманах. 2006. Вип. 8. С. 18—26.
14. Шашликова С. С., Гейна К. М. Вікова структура тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи у зв'язку з особливостями промислу // Регіональна науково-практична конференція викладачів, молодих вчених, аспірантів та студентів. Херсон : Колос, 2015. С. 73—77.
15. Гейна К. М., Шашликова С. С., Топчій О. І. Просторова мінливість морфологічних ознак тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи // Развитие науки в XXI веке : XXV Междунар. конф. : матер. Харьков : Знание, 2017. Ч. 1. С. 17—22.
16. Гейна К. М., Шашликова С. С. Аналіз морфологічної мінливості тюльки (*Clupeonella cultriventris*, Nordmann, 1840) Дніпровсько-Бузької гирлової системи // ScienceRise: Biological Science. 2017. № 2 (5). С. 9—13.

17. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилову риби з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України № 166 від 15.12.98. Київ, 1998. 47 с.
18. Визначення коефіцієнтів уловистості контрольних знарядь лову тюльки та молоді інших видів риби у водосховищах Дніпра / Шевченко П. Г. та ін. // Рибне господарство. 1990. Вип. 47. С. 42—44.
19. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1966. 375 с.
20. Козий М. С. Оценка современного состояния гистологической техники и пути усовершенствования изучения ихтиофауны : монография. Херсон, Олди-плюс, 2009. 310 с.
21. Козий М. С. Перспективи впровадження методики діоксанового зневоднення у процесі викладання гістології // Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2008. Вип. 4 (47). С. 176—179.
22. Аксютин З. М. Элементы математической оценки результатов наблюдений в биологических и рыбохозяйственных исследованиях. Москва : Пищевая промышленность, 1968. 289 с.

REFERENCES

1. Shevchenko, P. G., & Mal'tsev, V. I. (2005). *Izmeneniya v ikhtiofaune Dnepra v predelakh Ukrainy vo II polovine XX stoletiya. Aktual'ni problemi akvakul'turi ta ratsional'nogo vikoristannya vodnikh bioresursiv: Materiali mizhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferentsii*. Kyiv: UAAN IRG, 291-297.
2. Sherman, I. M., Geyna, K. M., Kutishchev, S. V., & Kutishchev, P. S. (2013). *Ekologichni transformatsii richkovikh gidroekosistem ta aktual'ni problemi ribnogo gospodarstva. Ribogospodars'ka nauka Ukrainy*, 4, 5-16.
3. Heina, K. M., Shashlykova, S. S., & Topchii, O. I. (2017). *Promyslovi ulovy oseledtsevykh (Clupeidae) Dniprovsko-Buzkoi hyrlovoi systemy. Nauka i suchasnist: Vykyky hlobalizatsii: Materialy III mizhnarodnoi konferentsii*. Kyiv: Tsentr naukovykh publikatsii, 5-10.
4. Geyna, K. M., & Shashlikova, S. S. (2017). *Promislovo-biologichna kharakteristika tyul'ki (Clupeonella cultriventris, Nordmann, 1840) Dniprovsko-Buz'koi girlovoi sistemi. Ribogospodars'ka nauka Ukrainy*, 4(42), 53-64.
5. Geyna, K. M., & Shashlikova, S. S. (2017). *Zhivlennya molodi promislovoi ikhtiofauni Dniprovsko-Buz'koi girlovoi sistemi. Naukoviy visnik Chernivets'kogo universitetu. Biologiya (Biologichni sistemi)*, 9, 2, 219-225.
6. Koziy, M. S. (2011). *Gistomorfologicheskie osobennosti ikhtiofauny yuga Ukrainy*. Kherson: Oldi-plyus.
7. Sal'nikov, N. E., & Sukhovayvan, P. G. (1959). *Tyul'ka v Kakhovskom vodokhranilishche. Zool. zhurn.*, XXXVIII (38), 9, 1375-1382.
8. Simonova, L. G. (1961). *Nekotorye dannye o razvitii chekhoni i tyul'ki v Kakhovskom vodokhranilishche. Tr. soveshch. ikhtiol. komissii AN SSSR*, 10, 290-292.
9. Siginevich, G. P. (1968). *Otsenka zapasov tyul'ki i stepeni ispol'zovaniya eyu zooplanktona Kakhovskogo vodokhranilishcha. Gidrobiologicheskyy zhurnal*, 5, 46-54.
10. Shevchenko, P. G. (1991). *Ekologo-morfologicheskaya kharakteristika tyul'ki Clupeonella cultriventris cultriventris (Nordman) i ee rol' v ekosisteme*

- dneprovskikh vodokhranilishch. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv.
11. Heina, K. M. (2007). Kharchovi vzaiemovidnosyny tiulky ta tovtolobykyv Kakhovskoho vodoshkovyshcha. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv.
 12. Geina, K. M. (2008). Dinamika zmin vikovoї strukturi promislovikh stad tyul'ki ta tovtolobikyv Kakhovs'kogo vodoshkovyshcha. *Ribogospodars'ka nauka Ukrainy*, 4, 1-34.
 13. Heina, K. M., & Horbonos, V. M. (2006). Rozmirno-vahova ta vikova struktura populiatsii tiulky Dniprovsko-Buzkoї hyrlovoi systemy u zviazku z osoblyvostiamy vedennia yii promyslu. *Pryrodnychiy almanakh*, 8, 18-26.
 14. Shashlykova, S. S., & Heina, K. M. (2015). Vikova struktura tiulky Dniprovsko-Buzkoї hyrlovoi systemy u zviazku z osoblyvostiamy promyslu. *Rehionalna naukovo-praktychna konferentsiia vykladachiv, molodykh vchenykh, aspirantiv ta studentiv*. Kherson, 73-77.
 15. Heina, K. M., Shashlykova, S. S., & Topchii, O. I. (2017). Prostorova minlyvist morfolohichnykh oznak tiulky Dniprovsko-Buzkoї hyrlovoi systemy. *Razvytye nauky v XXI veke: XXV mezhdunarodnaya konferentsiya*. Kharkov: Znanye, 17-22.
 16. Heina, K. M., & Shashlykova, S. S. (2017) Analiz morfolohichnoi minlyvosti tiulky (*Clupeonella cultriventris*, Nordmann, 1840) Dniprovsko-Buzkoї hyrlovoi systemy. *ScienceRise: Biological Science*, 2 (5), 9-13.
 17. *Metodika zboru i obrobki ikhtiologichnykh i gidrobiologichnykh materialiv z metoyu viznachennia limitiv promislovogo viluchennia ryb z velikikh vodoshkovyshch i limaniv Ukrainy: Zatv. nakazom Derzhkomribgospu Ukrainy № 166 vid 15.12.98.* (1998). Kyiv.
 18. Shevchenko, P. H., Koval, M. V., Koliesnikov, V. M., & Medyna, T. V. (1990). Vyznachennia koefitsientiv ulovystosti kontrolnykh znariad lovu tiulky ta molodi inshykh vydiv ryb u vodoshkovyshchakh Dnipra. *Rybne hospodarstvo*, 47, 42-44.
 19. Pravdin, I. F. (1966). *Rukovodstvo po izucheniyu ryb*. Moskva: Pishchevaya promyshlennost'.
 20. Kozij, M. S. (2009). *Otsenka sovremennogo sostoyaniya gistologicheskoy tekhniki i puti usovershenstvovaniya izucheniya ikhtiofauny*. Kherson: Oldi-plyus.
 21. Kozij, M. S. (2008). Perspektyvy vprovadzhennja metodyky dioksanovogo znevodnennja u procesi vykladannja gistologii'. *Visnyk agrarnoi' nauky Prychornomor'ja*, 4 (47), 176-179.
 22. Aksyutina, Z. M. (1968). *Elementy matematicheskoy otsenki rezul'tatov nablyudeniy v biologicheskikh i rybokhozyaystvennykh issledovaniyakh*. Moskva: Pishchevaya promyshlennost'.

**ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ И МИКРОАНАТОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ТЮЛЬКИ *CLUPEONELLA CULTRIVENTRIS* (NORDMANN, 1840)
БУГСКОГО ЛИМАНА ВО ВРЕМЯ НЕРЕСТОВОЙ МИГРАЦИИ**

К. Н. Гейна, Geina_k@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев
С. С. Шашлыкова, lanashashlykova@gmail.com, Херсонский государственный аграрный университет, г. Херсон
М. С. Козий, kozij67@gmail.com, Черноморский национальный университет им. Петра Могилы, г. Николаев

*Цель. Проанализировать половой диморфизм тюльки *Clupeonella cultriventris* (Nordmann, 1840) Бугского лимана в современных условиях. Исследовать динамику изменений структуры*

мезонефроса во время нерестовой миграции из лимана в р. Южный Буг. Определить перспективу использования данных гистологического мониторинга в ихтиологической практике для оценки морфофункционального статуса рыб.

Методика. Первичные материалы получены в результате научных и промысловых ловов, которые осуществлялись на акваториях Днепровско-Бугской устьевой системы. Учетные станции были расположены по ходу нерестовой миграции вида из Бугского лимана в р. Южный Буг. Полевая и камеральная обработка ихтиологических проб выполнена в соответствии с общепризнанными методиками и руководствами. Гистологические исследования осуществлены с использованием авторского оборудования и оригинальных методик, специально предназначенных для диагностики тканей рыб.

Результаты. Исследования указали на существование довольно значительного полового диморфизма в стаде тюльки *Clupeonella cultriventris* (Nordmann, 1840) Бугского лимана. По результатам сравнительного анализа двадцати четырех пластических признаков установлено, что самки тюльки являются более высокоспинными ($t_d = 6,11$; $p < 0,05$), с коротким туловищем ($t_d = 8,62$; $p < 0,05$) и хвостовым стеблем ($t_d = 7,64$; $p < 0,05$). Также у самок обнаружено смещение плавников в каудальном направлении, что проявилось в достоверной разнице между показателями антедорсального, антепектрального, антеветрального, антеанального, пектровентрального и вентроанального расстояний ($t_d = 4,39-9,67$; $p < 0,05$). Линейные параметры плавников (длина, высота) также достоверно отличались ($t_d = 3,96-11,23$; $p < 0,05$). При этом важно подчеркнуть, что у самок значения данных признаков были большими, чем у самцов. Исключением выступал показатель высоты анального плавника — у самцов он был достоверно выше, чем у самок ($t_d = 6,85$; $p < 0,05$). По длине брюшных плавников достоверного различия не выявлено ($t_d = 0,03$; $p < 0,05$), что характерно и для длины головы ($t_d = 0,15$; $p < 0,05$). В головном отделе существенных различий не выявлено. Достоверная разница наблюдается только по диаметру глаза и заглазничному расстоянию ($t_d = 4,15-7,99$; $p < 0,05$).

Исследования микрoанатомических показателей выявили, что колебания осмолярности водной среды достоверно влияют на изменения гистоструктуры и функциональных особенностей нефрогенной ткани через уменьшение диаметра капсулы Боумена-Шумлянского на 7,0 мк. О снижении функциональной активности почечной конволюты свидетельствует уменьшение высоты клеток кубического эпителия проксимальных извитых канальцев на 3,0 мк. Локализация групп ионотранспортирующих клеток вблизи васкулярных элементов и эпителия канальцев свидетельствует об участии мезонефроса в ионорегуляторных процессах, что повышает устойчивость особей по отношению к изменениям солёности воды. При снижении осмолярности окружающей среды в почке тюльки меняется функциональная активность нефрона, что выражается в уменьшении диаметра почечных телец и высоты эпителия проксимальных извитых канальцев.

Научная новизна. Представлены новые, а также существенно обновлены существующие данные о структуре нерестового стада тюльки Днепровско-Бугской устьевой системы. Впервые проведен гистологический анализ структуры мезонефроса половозрелых особей тюльки. Уточнена и дополнена информация относительно таксономических особенностей адаптационных изменений нефрогенной ткани таксона в условиях нерестовой миграции.

Практическая значимость. Полученная информация представляет ценность в морфофизиологических исследованиях, а также в ихтиологической практике в связи с существующей современной проблемой снижения жизненного статуса особей вследствие сокращения запасов ряда ценных промысловых видов рыб в дельтовых акваториях речных систем Украины.

Ключевые слова: Бугский лиман, р. Южный Буг, тюлька, пластические признаки, половой диморфизм, мезонефрос, осморегуляция.

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 43-57
DOI: 10.15407/fsu2018.02.043
УДК 574.587:621.311.21(28)

Received 23.10.17
Received in revised form 02.12.18
Accepted 09.04.18

МАКРОЗООБЕНТОС ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ ЗОНИ ВПЛИВУ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО ЕНЕРГОКОМПЛЕКСУ

А. В. Ляшенко, artemlyashenko@bigmir.net, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

О. Є. Слепньов, a.slepa@ukr.net, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

В. В. Маковський, vmakovskiy@gmail.com, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Ю. М. Ситник, sytnik_yu@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Т. В. Григоренко, grygorenko-@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Мета. Аналіз змін структурних характеристик макрзообентосу водних об'єктів зони впливу Південноукраїнського енергокомплексу в зв'язку з масштабним гідротехнічним будівництвом.

Методика. При проведенні досліджень були використані загальноприйняті в гідробіології методи відбору та опрацювання зообентосних проб.

Результати досліджень. Проведені дослідження макрзообентосу водних об'єктів зони впливу Південноукраїнського енергокомплексу показали, що діяльність людини досить суттєво змінила природний розвиток гідробіоценозів річки Південний Буг, і, як наслідок, Бузького лиману. Посилене антропогенне навантаження та евтрофікація призвели до уніфікації фауни пониззя ріки, що проявляється в зникненні та заміщенні специфічних понто-каспійських видів гідробіонтів на види широкого поширення та стійкі до забруднення. Зміна гідрологічного режиму та антропогенне забруднення призвели до випадіння цілої низки видів, насамперед, це стосується ендеміків та реліктів, за наявності яких Дніпровсько-Бузьке межиріччя мало свої індивідуальні риси. Звільнення екологічної ніші, яку раніше займали ці види, дає можливість іншим видам, нерідко — досить агресивним “вселенцям” — займати вільні біотопи. Цьому сприяє створення водних об'єктів, що завдяки специфічним умовам, а саме — цілорічному термічному режиму, близькому до субтропічного, сприяють розмноженню та успішній акліматизації чужорідних видів.

Наукова новизна. Представлено порівняльну характеристику структурних показників макрзообентосу водних об'єктів в зоні впливу Південноукраїнського енергокомплексу за багаторічний період.

Практична значимість. Результати досліджень можуть бути використані для прогнозу можливих змін в екосистемах окремих водойм та для оцінки їх сучасного екологічного стану.

Ключові слова: макрзообентос, р. Південний Буг, Ташлицьке водосховище-охолоджувач, Олександрівське водосховище.

© А. В. Ляшенко, О. Є. Слепньов, В. В. Маковський, Ю. М. Ситник,
Т. В. Григоренко, 2018

MACROZOOBENTHOS OF WATER OBJECTS AFFECTED BY THE SOUTH-UKRAINIAN ELECTRIC POWER-PRODUCING COMPLEX

A. Lyashenko, artemlyashenko@bigmir.net, Institute of Hydrobiology NAS, Kyiv

O. Slepnev, a.slepa@ukr.net, Institute of Hydrobiology NAS, Kyiv

V. Makovsky, vmakovskiy@gmail.com, Institute of Hydrobiology NAS, Kyiv

Yu. Sytnyk, sytnik_yu@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

T. Grigorenko, grygorenko-@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Analysis of changes in the structural characteristics of macrozoobenthos of water objects affected by the South-Ukrainian Electric Power-Producing Complex in connection with large-scale hydrotechnical construction.

Methodology. Conventional hydrobiological methods of sampling and processing of zoobenthos samples were used for the study.

Findings. The performed studies of macrozobenthos of water objects affected by the South-Ukrainian Electric Power-Producing Complex shown that human activity very significantly changed the natural development of the hydrobiocenoses of the Yuzhny Bug River and, as a consequence, the Bug estuary. The intensified human impact and eutrophication led to the unification of the fauna in the lower reaches of the river, which manifested in the disappearance and replacement of specific Ponto-Caspian species of hydrobionts by species of wide distribution and resistant to pollution. The change in the hydrological regime and anthropogenic pollution led to the disappearance of a number of species, primarily of endemic and relic ones, with which the Dnieper-Bug interfluvium had its own individual features. The liberation of the ecological niche previously occupied by these species allows other species, often quite aggressive "invaders", to occupy free biotopes. This is facilitated by the creation of water objects, thanks to specific conditions such as the year-round thermal regime close to the subtropical one, which promotes reproduction and successful acclimatization of alien species.

Originality. A comparative characteristic of the structural parameters of the macrozoobenthos of water objects affected by the South-Ukrainian Electric Power-Producing Complex has been presented.

Practical value. The results of the study can be used for forecasting possible changes in the ecosystems of some water bodies and for the assessment of their ecological state.

Key words: macrozoobenthos, Southern Bug River, Tashlyk reservoir cooler, Oleksandrivske reservoir.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Південний Буг — одна з великих річок України. Його водозбірна площа повністю розташована в межах країни. Довжина становить 806 км, площа басейну — 63700 км². Разом з тим, річка Південний Буг найбільш зарегульована серед великих річок України. В її басейні побудовано 197 водосховищ і 6,9 тисяч ставів, з сумарним об'ємом близько 1,5 км³ води [1].

У першій половині ХХ ст. пониззя Південного Бугу вирізнялось самобутнім тваринним населенням. Дослідниками того часу відзначалось багатство регіону щодо зосередження реліктових видів. Наявність значних глибин та постійний режим солоності робили Бузький лиман найсприятливішим для розвитку реліктової понто-каспійської фауни, яка підіймалась вверх проти течії ріки до порогів. Так, О. А. Остроумов, виходячи з гідрологічного, гідрохімічного та гідробіологічного режимів Бузького лиману, розглядав його як «куточок пліоценового басейну, закинутий в середину материка і дещо оновлений» [2].

У другій половині ХХ ст. в пониззі Південного Бугу почалося гідротехнічне будівництво. В 1958 р. була створена Олександрівська ГЕС з однойменним водосховищем, а в 1980 р. на місці балки Ташлик створюють Ташлицьку водойму-охолоджувач атомної електростанції, будується та вводиться в дію Ташлицька гідроакумулююча станція (ГАЕС). Збудовано верхню гідроакумулюючу водойму Ташлицької ГАЕС. Таке масштабне будівництво і експлуатація гідротехнічних об'єктів майже повністю змінили гідрологічний режим ріки, що призвело до змін структурних показників донних безхребетних.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Основною метою даної роботи було проведення аналізу змін у структурній організації угруповань макрзообентосу водних об'єктів зони впливу Південноукраїнського енергокомплексу в зв'язку з масштабним гідротехнічним будівництвом.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Збір матеріалу проводився у весняний період 2003 р., осінній 2005 р., літній та осінній періоди 2006 і 2009 рр. та влітку 2010 р. згідно загальноприйнятих в Україні гідробіологічних методик [3] на наступних водних об'єктах:

- ділянка р. Південний Буг, від с. Панкратове до с. Олександрівка (включаючи Олександрівське водосховище);
- Ташлицьке водосховище охолоджувач АЕС (включаючи струмок Ташлик);
- верхня гідроакумулююча водойма Ташлицької ГАЕС.

Основою порівняльного аналізу стали результати досліджень проведені науковцями у попередні роки: Л. А. Журавля, Ю. М. Марковського, Б. Ф. Григор'єва та інших [4–17].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Перші відомості про дослідження донної фауни Південного Бугу датуються 1897–1898 рр. [2]. Подальші дослідження відносяться до 20–30-х років минулого століття: це рукопис Д. О. Белінга, В. І. Жадіна, М. Я. Кирпиченка [9–11]. Впродовж 50-х років минулого сторіччя фауна донних безхребетних пониззя Південного Бугу досліджувалась Л. А. Журавлем [4], Ю. М. Марковським [5], у 60-х — Б. Ф. Григор'євим [6–8]. Макрзообентос середньої течії Південного Бугу, в зв'язку з будівництвом Ладизинського водосховища досліджувався на початку 70-х рр. ХХ ст. [12].

У 1980–90-х роках проводились дослідження водних об'єктів в районі Південноукраїнського енергетичного комплексу [13–19].

Починаючи з 2003 року, в рамках гідробіологічного моніторингу Інститутом гідробіології НАН України проводяться дослідження водних об'єктів басейну Південного Бугу в зоні впливу Південноукраїнського енергокомплексу [20–29].

Всього за період досліджень було зареєстровано 115 видів донних безхребетних із 19 таксономічних груп. З них найбільша кількість була зареєстрована на річкових (незарегульованих) ділянках, і налічувала 84 види.

В Олександрівському водосховищі було знайдено 76 видів макрозообентосу. Загалом на ділянці від с. Панкратове до с. Олександрівка було зареєстровано 108 видів. У Ташлицькому водосховищі охолоджувачі АЕС відмічено 35 видів. У струмку Ташлик до греблі водосховища було зареєстровано 15 видів. Також проводились дослідження на верхній гідроаккумуляційній водоймі Ташлицької ГАЕС, де було виявлено 14 видів макробезхребетних.

Аналізуючи макрозообентос р. Південний Буг та Олександрівського водосховища на ділянці від с. Панкратове до с. Олександрівка у фауністичному відношенні, слід відмітити, що серед зареєстрованих видів 5 відносилися до понто-каспійського комплексу, 3 — до широко розповсюджених солонуватоводних видів, інші знайдені види відносились до прісноводних. У своїх дослідженнях Л. А. Журавель тільки в Олександрівському водосховищі відмічав 11 видів понтокаспійців, а на ділянці від м. Нова Одеса до Олександрійського водосховища ним було знайдено 22 види. Згідно наших досліджень, в Олександрівському водосховищі було знайдено 4 види цього комплексу.

Проведеними в 1949–1951 рр. дослідженнями Ю. М. Марковського [5] на ділянці ріки від м. Первомайськ до м. Вознесенськ було зазначено 25 видів понто-каспійського комплексу із 62 зареєстрованих у всьому Бузькому лимані (табл. 1).

Таблиця 1. Таксономічні групи понто-каспійського комплексу річки Південний Буг у різні роки досліджень

Table 1. Taxonomic groups of the Ponto-Caspian complex of the Southern Bug River in different years of research

Таксони безхребетних / Taxones of invertebrates	1950-ті роки / 1950s years	2000-ні роки / 2000s years
<i>Bivalvia</i>	3	2
<i>Corophiidae</i>	4	–
<i>Cumacea</i>	2	–
<i>Decapoda</i>	–	1
<i>Gammaridae</i>	6	1
<i>Gastropoda</i>	1	–
<i>Izopoda</i>	1	–
<i>Mysidae</i>	7	1
<i>Polychaeta</i>	1	–
<i>Всього</i>	25	5

Тобто, наші дослідження свідчать про значне зменшення кількості видів понто-каспійського комплексу. В складі макрозообентосу нами не було зафіксовано такі таксони понтокаспійців, як корофіїди, кумові та рівноногі ракоподібні, черевоногі молюски та багатощетинкові черви, хоча деякі з них реєструвались у фауні обростань. Кількість видів з інших таксонів істотно зменшилась. Дослідженнями Б. Ф. Григор'єва [6] ділянки Південного Бугу від м. Нова Одеса до дамби Олександрівського водосховища було показано, що серед бокоплавів домінуючими за показниками розвитку видами були корофіїди

каспійського комплексу — *Corophium nobile* G. O. Sars та *Corophium robustum* Sars. Показники чисельності першого становили 8900 екз./м² за біомаси 26 г/м², другого — 89820 екз./м² та 150,4 г/м² відповідно.

У наших зборах корофіїди зустрічались епізодично, середня чисельність їх в Олександрівському водосховищі становила 50 екз./м² за біомаси — 0,1 г/м².

Однією з фауністичних особливостей досліджуваної ділянки річки вважався масовий розвиток на глинистих ґрунтах личинок одноденок (*Ephemeroptera*) *Palingenia longicauda* Olivier, чисельність яких досягала 180 екз./м² та біомаси 107 г/м². У 60-х роках минулого століття цей вид входив до домінуючого на цій ділянці ріки ценозу *Corophium curvispinum* Sars або *Corophium robustum* Sars + *P. longicauda* Oliv. [8]. В період наших досліджень даний вид не був зареєстрований, що може свідчити про погіршення якості вод, оскільки він відноситься до олігосапробів. На сьогоднішній день палінгенія довгохвоста має статус зникаючого виду та занесена до Червоної книги України [30].

У порівнянні з 60-ми роками минулого століття, видовий та таксономічний склад донних безхребетних досліджуваної ділянки ріки досить суттєво змінився (рис. 1).

Рис. 1. Порівняльна характеристика таксономічного складу макрозообентосу р. Південний Буг у різні роки досліджень

Fig. 1. Comparative characteristics of the macrozoobenthos taxonomic composition in the Southern Bug River in different years of research

Загальна кількість видів макрозообентосу за період з 2003 по 2010 рр. становила 108 видів, проти 222, зареєстрованих у 1963–1965 рр. Зменшення кількості видів відбулося у всіх таксономічних групах, крім олігохет, кількість видів яких збільшилась у 2 рази. Найбільші зміни стосуються класу ракоподібних, кількість видів яких зменшилась майже в 7 разів. Чисельність видів з групи комахи (за виключенням родини *Chironomidae*) зменшилась у 6 разів, молюсків — у 2 рази. В наших зборах не було виявлено таких груп, як багатощетинкові черви, кумові та рівноногі ракоподібні, личинки жуків та ін.

Слід відзначити відсутність у наших зборах низки видів, зазначених раніше

[31]: це рівноногі ракоподібні (*Jaera sarsi* і *Halophilosci ficorum*), що зустрічалися на ділянках перекатів, кумових ракоподібних із Олександрівського водосховища та ділянки Південного Бугу нижче його греблі, поліхет, деяких видів п'явок, двостулкових та червононогих молюсків, личинок жуків та деяких інших видів.

Зарегулювання ріки, а особливо створення дамби Олександрівської ГЕС, спричинило зміну гідрологічного режиму пониззя ріки та Бузького лиману. Так, внаслідок зарегулювання в маловодні роки лиман стає значно солонішим, і, як наслідок, відбувається осолонення біотопів, що супроводжується докорінною перебудовою фауністичних комплексів. Зменшення швидкості течії в річковій частині сприяє осадженню детриту та органічних речовин, і, як наслідок, замуленню піщаних біотопів, які є домівкою для більшості видів понто-каспійського реліктового комплексу, в першу чергу, це стосується класу ракоподібних.

Істотних змін зазнала донна фауна і Олександрівського водосховища. В порівнянні з даними попередніх років досліджень [5], в районі с. Олександрівка було зареєстровано 15 видів понто-каспійського комплексу проти 4, знайдених нами. Така ж ситуація спостерігалася і в іхтіофауні водосховища. Дослідження, проведені в 2006–2008 рр. [32] та в 2009 р. [33], показали, що з 50 видів риб, зазначених для даного регіону в літературі, нами було зареєстровано лише 19 та 18 видів відповідно. В уловах були відсутні прохідні, реофільні види риб (вирезуб, марена, рибець, пічкурі тощо). Натомість, з'являються види, нехарактерні для даного регіону — такі як сонячний окунь, який є видом-вселенцем, і може складати харчову конкуренцію звичайному окуню.

Таким чином, аналіз багаторічних даних показав, що зарегулювання ріки Південний Буг та створення Олександрівського водосховища, яке, в зв'язку з підняттям рівня води, проходить черговий етап становлення, стали основною причиною змін, які відбуваються у формуванні не тільки фауни донних безхребетних, але й усього населення даного водного об'єкта.

Гідробіологічні дослідження Ташлицького водосховища проводяться Інститутом гідробіології НАН України з моменту його створення [13–19] і до теперішнього часу. До спорудження Ташлицького водосховища в макрозообентосі балки Ташлик вчені фіксували наявність представників 14 систематичних груп. Після спорудження водосховища в 1979–1980 рр., у зв'язку з різкою зміною умов існування, аборигенна фауна балки Ташлик майже повністю зникла. В подальшому, до 5-го року існування водосховища були зареєстровані угруповання макрозообентосу з новими структурними характеристиками. Так, у 1980 р. у водосховищі було виявлено тільки 2 групи донних організмів: олігохети та личинки хірономід з одним видом — *Procladius ferrugineus*, який, за результатами попередніх досліджень, зустрічався в балці Ташлик. У 1981 р. були зареєстровані організми 5-ти систематичних груп, у 1983 р. — 9-ти, в 1984 р. — 12-ти і в 1985 р. — 15-ти. Починаючи з 1983 р., макрозообентос водосховища складався з трьох домінуючих груп: личинок хірономід, олігохет та молюска дрейсени, при цьому останній на 5 рік становлення водосховища досягав біомаси 350,6 г/м² [19]. Це були, переважно, групи організмів, привнесені з ріки Південний Буг, та комахи, що мають у своєму циклі розвитку повітряну і водну стадії. В 1986 р. високі літні температури води (до 38°C) призвели до скорочення числа видів, показників розвитку донної фауни і зміни її складу. Так, внаслідок

температурного фактору в Ташлицькому водосховищі повністю зник молюск *Dreissena*. Дослідження, проведені в 1987–1992 рр. [34], показали часткове відновлення цих молюсків, але, починаючи з 1997 р. не було відмічено відновлення популяцій дрейсени у водоймі-охолоджувачі.

У результаті наших досліджень у водосховищі було зареєстровано 35 видів донних безхребетних з 9 таксономічних груп. У порівнянні з даними першої половини 1980-их рр. у період становлення водосховища було відмічено 49 видів з 15 таксономічних груп [19, 34] (табл. 2).

Таблиця 2. Представленість таксономічних груп макрозообентосу Ташлицького водосховища в багаторічному аспекті

Table 2. Representation of taxonomic groups of macrozoobenthos of Tashlyk reservoir in the long-term aspect

Таксони безхребетних / Taxones of invertebrates	Перша половина 1980-х рр. / The first half of the 1980's	Перша половина 2000-х рр. / The first half of the 2000's.
<i>Hydrozoa</i>	+	+
<i>Bryozoa</i>	+	
<i>Turbellaria</i>	+	+
<i>Acarina</i>		+
<i>Nematoda</i>	+	+
<i>Oligochaeta</i>	+	+
<i>Hirudinea</i>	+	
<i>Ostracoda</i>	+	
<i>Corophiidae</i>	+	
<i>Gammaridae</i>	+	
<i>Cumacea</i>	+	
<i>Ephemeroptera</i>	+	
<i>Trichoptera</i>	+	+
<i>Chironomidae</i>	+	+
<i>Ceratopogonidae</i>		+
<i>Heleidae</i>	+	
<i>Mollusca</i>	+	+
<i>Всього</i>	15	9

У наших зборах не було знайдено жодного представника класу ракоподібних, моховаток, п'явок, личинок одноденок та гелєїд, які були знайдені в 1980–х рр. Молюски в наших дослідженнях були представлені червоногими.

Ташлицьке водосховище сьогодні являє собою великий тепловодний «акваріум» де домінантом за біомасою, а подекуди і чисельністю, в бентосі виступає тропічний молюск-вселенець *Melanoides tuberculata* Muller, 1774 [20], а аборигенна фауна безхребетних збіднена внаслідок систематичного термічного

впливу. Досить високі впродовж року температури води (влітку максимальні можуть досягати 35–38°C) формують сприятливі умови існування в даній водоймі не тільки безхребетних видів-вселенців, але й представників чужорідної іхтіофауни: сонячного окуня, каналного сома, білого і строкатого товстолобів, амурського чебачка та ін. [35]. Таким чином, сьогодні ми спостерігаємо за формуванням під дією високих температур водного об'єкта із специфічним складом біоти, характерним, переважно, для водойм із субтропічним кліматом.

Верхня гідроаккумуляційна водойма Ташлицької ГАЕС являє собою суто технічну споруду. Основним її призначенням є накопичення водної маси в нічні години особливими вертикальними турбінами — електронасосами з нижче розташованого Олександрівського водосховища через спеціальні водоводи, а в денні години пікової потреби в електроенергії — спрацювання накопиченої води через ті ж водоводи для вироблення додаткової електроенергії.

Упродовж доби відбувається підйом води з нижнього б'єфа (Олександрівського водосховища) у верхній (гідроаккумуляційна водойма) на висоту понад 100 м і, відповідно, спуск з верхнього в нижній б'єф. Під час скиду води деяка частина її залишається у водоймі, що не дає змоги їй пересихати. Таким чином, у гідроаккумуляційній верхній водоймі ГАЕС розвивається своєрідна флора і фауна, здатна витримувати екстремальний режим накачування та спускання води.

Дослідження верхньої гідроаккумуляційної водойми проводились у 2006 р. після створення та заповнення її водою. У відібраних пробах нами не було зареєстровано донних безхребетних. Наступні спостереження були проведені в 2009 р. після 4-ох років експлуатації водойми. Загалом, у бентосі було ідентифіковано 14 видів безхребетних із 5 таксономічних груп. За представленістю домінували черевоногі молюски — 5 видів, по 3 види личинок комарів-дзвінців та малощетиноквих черв'яків, 2 види двостулкових молюсків, 1 вид корофід (рис. 2).

Рис. 2. Структура макробентосу верхньої гідроаккумуляційної водойми Ташлицької ГАЕС у 2009 р.

Fig. 2. Structure of macrobenthos of the upper hydroaccumulation reservoir of Tashlyk PSEPP in 2009

Тобто, формування макробоентосу відбулося за рахунок видів, що

потрапили з нижнього б'єфу Олександрівського водосховища. Значного розвитку тут набувають двостулкові молюски *Dreissena polymorpha* Pallas та *Dreissena bugensis* Andrusov, біомаса яких досягає 1150 г/м².

Такий екстремальний гідрологічний режим при якому у водному об'єкті один раз на добу відбувається заміна майже 80% води, сприяє розвитку таких молюсків-фільтраторів, як дрейсена. Із заміною води відбувається привнесення поживних речовин та видалення продуктів життєдіяльності організмів, а також збагачення води киснем, що також позитивно впливає на розвиток біоти даного водного об'єкта.

Іхтіологічні дослідження гідроаккумуляційної водойми також показали, що розмірно-вагові характеристики риб були дуже високими [33].

На даний час, на жаль, недостатньо вивчений процес переносу гідробіонтів через турбіни Ташлицької ГАЕС, та ступінь їх травматизму, адже не всі організми можуть протидіяти течії. Досвід експлуатації гідроаккумуляційного басейну Київської ГАЕС свідчить, що у разі необхідності він може повністю звільнитися від води, а в звичайному режимі експлуатації спрацьовується щонайменше 75% його корисного об'єму. Під час закачування води по водоводах із швидкістю 3–4 м/с виникають перепади тиску до 7 атмосфер. Такий режим експлуатації Київської ГАЕС дуже несприятливий для планктонних організмів. Зокрема, для зоопланктону він є згубним: у результаті перекачування води знизу (з Київського водосховища) вгору, в гідроаккумуляційний басейн, навесні гине 91%, влітку — 69%, а восени — 43% зоопланктону.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Проведені дослідження макрзообентосу водних об'єктів зони впливу Південноукраїнського енергокомплексу показали, що своєю діяльністю людина досить суттєво змінила природний розвиток гідробіоценозів річки Південний Буг, і, як наслідок, Бузького лиману. Посилене антропогенне навантаження та евтрофікація призвели до уніфікації фауни пониззя ріки. Це проявляється в зникненні та заміщенні специфічних понто-каспійських видів гідробіонтів на види широкого поширення, стійкі до забруднення. Зміна гідрологічного режиму та антропогенне забруднення призвели до випадіння цілої низки видів, насамперед, це стосується ендеміків та реліктів, за наявності яких Дніпровсько-Бузьке межиріччя мало свої індивідуальні риси. Звільнення екологічної ніші, яку раніше займали ці види, дає можливість іншим видам — нерідко, досить агресивним «вселенцям» займати вільні біотопи. Цьому сприяє створення водних об'єктів, що завдяки специфічним умовам, а саме — цілорічному термічному режиму, близькому до субтропічного, сприяють розмноженню та успішній акліматизації чужорідних видів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вишневський В. І. Річки і водойми України. Стан і використання. Київ : Віпол, 2000. 376 с.
2. Остроумов А. А. Краткий отчет о гидробиологических исследованиях в 1897 году // Изв. Импер. Академии наук. 1898. Т. 7, № 2. С. 78—91.
3. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. ; ред. В. Д. Романенко. Київ : Логос, 2006. 408 с.

4. Журавель Л. А. О фауне беспозвоночных лиманного комплекса нижней части Ю. Буга и Александровского водохранилища // Зоологический журнал. 1953. Т. 32, № 3. С. 380—384.
5. Марковский Ю. М. Фауна беспозвоночных низовьев рек УССР, условия ее существования и пути использования. Ч. 3 : Днепроовско-Бугский лиман. Киев : АН УССР, 1954. 208 с.
6. Григорьев Б. Ф. Гидробиологическое районирование низовьев Южного Буга по составу и динамике численности донной фауны // Гидробиол. журн. 1965. Т. 1, № 5. С. 20—28.
7. Григорьев Б. Ф. О составе и количественном распределении моллюсков в низовьях Южного Буга // Вопр. теорет. и приклад. малакологии. 1965. С. 86—89.
8. Григорьев Б. Ф. Фауна донных беспозвоночных низовьев Южного Буга : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук. Одесса, 1966. 30 с.
9. Белінг Д. О. Бентос нижньої течії П. Буга (1925), рукопис // Пр. гідробіол. ст. АН УРСР. 1937. № 14. С. 177—224.
10. Жадин В. И. Моллюски бассейна Южного Буга // Труды Дніпрянської гідробіологічної станції. 1931. № 6. С. 3—47.
11. Кирпиченко М. Дно та бентичне тваринне населення р. П. Буг в районі м. Вінниці // Пр. гідробіол. ст. АН УРСР. 1937. № 14. С. 177—224.
12. Кафтаникова О. Г. Проблемы гидробиологии и альгологии // Итоги изучения влияния сбросных подогретых вод тепловых электростанций на биологический режим их водоемов-охладителей (в пределах Украины). Киев : Наукова думка, 1978. С. 198—212.
13. Прогноз гидрохимического и гидробиологического режимов водоемов Южно-Украинского энергокомплекса, возникновения биопомех и рекомендации по их устранению / Кафтаникова О. Г. и др. // Энергетика и окружающая среда : Всесоюз. совещ. : тезисы докл. Минск, 1982. С. 47—49.
14. Кафтаникова О. Г., Сергеева О. А., Протасов А. А. Прогноз влияния сбросных подогретых вод АЭС на санитарно-биологический режим Южно-Украинского энергокомплекса // II Всесоюз. совещ. Энергетика и экология : тезисы докл. Москва, 1982. С. 71—73.
15. Исследования гидрохимического и гидробиологического режимов Южно-Украинского энергокомплекса / Кафтаникова О. Г. и др. // Опыт проектирования и строительства ЮУЭ. Ленинград, 1984. С. 55—58.
16. Гидробиологическая характеристика водоемов строящегося Южно-Украинского энергокомплекса / Кафтаникова О. Г. и др. // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке : 5 конф. Укр. фил. ВГБО : тезисы докл. Киев, 1987. С. 104—105.
17. Экологическая характеристика водоема-охладителя Южно-Украинской АЭС : рукопись, деп. в ВИНТИ 1988. № 1730-B88 / Протасов А. А. и др. ; ред. «Гидробиологического журнала». Киев, 1988. С. 17.
18. Гидробиологический режим и кормовая база рыб Ладыжинского водохранилища и сбросного канала ГРЭС : рукопись, деп. в ВИНТИ 07.06.93. № 1529-B93 / Парчук Г. В. и др. ; ред. «Гидробиологического журнала». Киев, 1993.
19. Протасов А. А., Сергеева О. А., Кошелева С. И. и др. Гидробиология водоемов-охладителей тепловых и атомных электростанций Украины. Киев : Наукова думка, 1991. 192 с.

20. Ляшенко А. В., Слепнёв А. Е. Находка *Melanoides tuberculata* (Muller, 1774) в водоёме-охладителе Южно-Украинской атомной электростанции // Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища : збірник наукових праць. Вип. 2. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2006. С. 187—190.
21. Ляшенко А. В., Воликов Ю. Н., Слепнев А. Е. Макрозообентос водных объектов зоны влияния Южно-Украинского энергокомплекса (ЮУ ЭК) // Рибне господарство. 2006. Вип. 65. С. 134—144.
22. Ляшенко А. В., Слепньов О. Е. Характеристика гідроекологічного стану водойм зони впливу південноукраїнського енергокомплексу (ПУЕК) за показниками макрозообентосу // Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища. 2007. Вип. 15. С. 69—72.
23. Слепнев А. Е., Ляшенко А. В., Воликов Ю. Н. Биоразнообразии и развитие ценозов макрозообентоса водных объектов зоны влияния Южноукраинского энергокомплекса в летний период // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах : IV Міжнар. конф., 9-12 жовт. 2007 р., м. Дніпропетровськ : матер. Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. С. 108—111.
24. Слепнев А. Е., Ляшенко А. В., Воликов Ю. Н. Оценка качественных и количественных показателей развития донной макрофауны водных объектов зоны влияния Южно-Украинского энергокомплекса (ЮУ ЭК) // Сучасні проблеми охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів та очистки природних і стічних вод : Міжнар. наук.-практ. конф., 23-27 квіт. 2007 р., м. Миргород : труди. Київ : Знання, 2007. С. 124—127.
25. Слепнев А. Е., Силаева А. А. Зообентос водойма-охладителя Южноукраинской АЭС // Озера та штучні водойми України: сучасний стан й антропогенні зміни : I Міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 трав. 2008 р. : матер. Луцьк : Вежа, 2008. С. 342—345.
26. Слепнев А. Е., Ляшенко А. В., Воликов Ю. Н. Качественные и количественные показатели развития донной макрофауны Александровского водохранилища и прилегающих участков р. Южный Буг // Современное состояние рыбного хозяйства: проблемы и пути решения : Междунар. науч.-педагог. конф. : матер. Херсон : Олди-плюс, 2008. С. 116—119.
27. Слепньов О. Е., Воликов Ю. М. Макрозообентос струмка Ташлик малого водопостачальника водойми-охолоджувача Південноукраїнської атомної електростанції // Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути методы решений-2: II Междунар. науч. конф. : матер. Херсон, 2008. С. 427—432.
28. Слепнев А. Е., Воликов Ю. Н. Характеристика макрозообентоса р. Южный Буг и Александровского водохранилища в весенний период // Вода та Довкілля : наук.-практ. конф. VII Міжнародного Водного Форуму «AQUA UKRAINE-2009», 10-13 лист. 2009 р. : матер. Київ : Міжнародний виставковий центр, 2009. С. 96—97.
29. Слепньов О. Є. Макрозообентос Олександрівського водосховища // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2010. № 2 (43). С. 448—450. (Серія : Біологія. Спеціальний випуск : Гідроекологія).
30. Червона книга України. Тваринний світ / ред. Акімов І. А. Київ : Глобалконсалтинг, 2009. 600 с.

31. Планктон, бентос и перифитон р. Южный Буг, Александровского и Ташлыкского водохранилищ (район строительства Ташлыкской ГАЭС) : рукопись, деп. в ВНИИТИ 1991 г., N 3356 – В 91 / Сергеева О. А. и др. Киев, 1991.
32. Алексієнко В. Р., Руднєв М. В., Гупало О. О. Результати іхтіологічних досліджень в прибережній зоні Олександрійського водосховища в період підняття його рівня // Зоологічна наука у сучасному суспільстві : Всеукр. наук. конф., присвяч. 175-річчю заснування кафедри зоології КНУ. Київ – Канів, 15-18 вер. 2009 р. : матер. Київ : Фітосоціоцентр, 2009. С. 26—31.
33. Кирилюк О. П., Гончаренко Н. И. Видовой состав рыб и их распределение в зоне действия Ташлыцкой гидроаккумулирующей электростанции // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2010. Вип. 2 (43). С. 233—236. (Серія : Біологія. Спеціальний випуск : Гідроєкологія).
34. Силаева А. А., Протасов А. А., Синицина О. О. Многолетние изменения в сообществах зообентоса в условиях влияния подогретых сбросных вод АЭС // Проблемы гидроэкологии на рубеже веков : Междунар. конф., Санкт-Петербург, 23–30 окт. 2000 г. : матер. Санкт-Петербург, 2000. С. 239—241.
35. Шевченко П. Г., Гонта О. Б. Видовий склад та стан іхтіофауни водойм Південно-українського гідроенергетичного енергокомплексу р. Південний Буг // Рибне господарство. 2004. Вип. 63. С. 237—240.

REFERENCES

1. Vyshnevskiy, V. I. (2000). *Richky i vodoimy Ukrainy. Stan i vykorystannia*. Kyiv: Vipol.
2. Ostroumov, O. A. (1898). Kratkii otchiot o gidrobiologicheskikh issledovaniyah v 1897 godu. *Izvestiya Imperatorsoi Akademii nauk*, 7 (2), 78-91.
3. Arsan, O. M., Davydov, O. A., Diachenko, T. M. et. al. (2008). *Metody hidroekologichnykh doslidzhen poverkhnevyykh vod*. Kyiv: Lohos.
4. Zhuravel', L. A. (1953). O faune bespozvonochnykh limannogo kompleksa nizhney chasti Yu. Buga i Aleksandrovskogo vodokhranilishcha. *Zoologicheskii zhurnal*, 32 (3), 380-384.
5. Markovskiy, Yu. M. (1954). *Fauna bespozvonochnykh nizov'ev rek USSR, usloviya ee sushchestvovaniya i puti ispol'zovaniya. Ch. 3. Dneprovsko-Bugskiy liman*. Kyiv: AN USSR.
6. Grigor'ev, B. F. (1965). Gidrobiologicheskoe rayonirovanie nizov'ev Yuzhnogo Buga po sostavu i dinamike chislennosti donnoy fauny. *Gidrobiol. zhurn.*, 1(5), 20-28.
7. Grigor'ev, B. F. (1965). O sostave i kolichestvennom raspredelenii mollyuskov v nizov'yakh Yuzhnogo Buga. *Vopr. teoret. i priklad. Malakologii*, 86-89.
8. Grigor'ev, B. F. (1966). Fauna donnykh bespozvonochnykh nizov'ev Yuzhnogo Buga. *Extended abstract of candidate's thesis*. Odessa.
9. Belinh, D. O. (1937). Bentos nyzhnoi techii P. Buha (1925). *Pr. hidrobiol. st. AN URSR*, 14, 177-224.
10. Zhadin, V. I. (1931). Molyuski basseyna Yuzhnogo Buga. *Trudy Dniprianskoi hidrobiologichnoi stantsii*, 6, 3-47.

11. Кырпыченко, М. (1937). Dno ta bentychnе tvarynne naselennia r. P. Buh v raioni m. Vinnytsi. *Pr. hidrobiol. st. AN URSR*, 14, 177-224.
12. Kaftannikova, O. G. (1978). Itogi izucheniya vliyaniya sbrosnuh podogretuh vod teploelektrostantsiy na biologicheskiiy rezhim ih vodoimov-okhladiteley (v predelakh Ukrainy). *Problemy gidrobiologii i algologii*. Kyiv: Naukova dumka, 198 - 212.
13. Kaftannikova, O. G., Kosheleva S. I., & Protasov A. A. et al. (1982). Prognoz gidrokhimicheskogo i gidrobiologicheskogo rezhimov vodoemov Yuzhno-Ukrainskogo energokompleksa, vzniknoveniya biopomekh i rekomendatsii po ikh ustraneniyyu. *Energetika i okruzhayushchaya sreda: tez. dokl. Vsesoyuzn. soveshch.*, 47-49.
14. Kaftannikova, O. G., Sergeeva, O. A., & Protasov, A. A. (1982). Prognoz vliyaniya sbrosnykh podogretykh vod AES na sanitarno-biologicheskiiy rezhim Yuzhno-Ukrainskogo energokompleksa. *Energetika i ekologiya: tez. dokl. II Vsesoyuz. soveshch.*, 71-73.
15. Kaftannikova, O. G., Kosheleva, S. I., Sergeeva, O. A., Protasov A. A. et al. (1984). Issledovaniya gidrokhimicheskogo i gidrobiologicheskogo rezhimov Yuzhno-Ukrainskogo energokompleksa. *Opyt proektirovaniya i stroitel'stva YuUE*. Leningrad, 155-158.
16. Kaftannikova, O. G., Protasov, A. A., Sergeeva, O. A. et al. (1987). Gidrobiologicheskaya kharakteristika vodoemov stroyashchegosya Yuzhno-Ukrainskogo energokompleksa. *Gidrobiologicheskie issledovaniya na Ukraine v XI pyatiletke: Tez. dokl. 5 konf. Ukr. fil. VGBO*, 104-105.
17. Protasov, A. A., Sergeeva, O. A., Kosheleva, S. I. et al. (1988). Ekologicheskaya kharakteristika vodoyma-okhladiteley Yuzhno-Ukrainskoy AES. *Deposited manuscript*, 1730-V88, 17.
18. Parchuk G. V., Shevtcova L. V., Karpezo Yu. I., Golovko, T. V. et al. (1993). Gidrobiologicheskiiy rezhim i kormovaya baza ryb Ladyzhinskogo vodohranilisha i sbrosnogo kanala GRES. *Deposited manuscript*, № 1529-B93, 72.
19. Protasov, A. A., Sergeeva, O. A., Kosheleva, S. I. et al. (1991). *Gidrobiologiya vodoemov-okhladiteley teplovikh i atomnikh elektrostantsiy Ukraini*. Kiev: Naukova dumka.
20. Lyashenko, A. V., & Slepnev, A. E. (2006). Nakhodka *Melanoides tuberculata* (Muller, 1774) v vodoeme-okhladiteley Yuzhno-Ukrainskoy atomnoy elektrostantsii. *Ekologo-funktsionalni ta faunistychni aspekty doslidzhennia moliuskiv, yikh rol u bioindikatsii stanu navkolyshnoho seredovyshcha: Zbirnyk naukovykh prats*. Vol. 2. Zhytomyr: ZhDU im. I. Franka, 187-190.
21. Lyashenko, A. V., Volikov, Yu. N., & Slepnev, A. E. (2006). Makrozoobentos vodnykh ob'ektov zony vliyaniya Yuzhno-Ukrainskogo energokompleksa (YuU EK). *Rybne gospodarstvo*, 65, 134-144.
22. Liashenko, A. V., & Slepnev, O. E. (2007). Kharakterystyka hidroekologichnoho stanu vodoim zony vplyvu pivdennoukrainskoho enerhokompleksu (PUK) za pokaznykamy makrozoobentosu. *Zbirnyk naukovykh prats Instytutu heokhimii navkolyshnoho seredovyshcha*, 15, 69-72.
23. Slepnev, A. E., Lyashenko, A. V., & Volikov, Yu. N. (2007). Bioraznoobrazie i razvitie tsenozov makrozoobentosu vodnykh ob'ektov zony vliyaniya Yuzhnoukrainskogo energokompleksa v letniy period. *Bioriznomanittia ta rol tvaryn v ekosystemakh: Materialy IV Mizhnarodnoi konferentsii, 9-12 zhovtnia 2007 r., m. Dnipropetrovsk*. Dnipropetrovsk: DNU, 108-111.

24. Slepnev, A. E., Lyashenko, A. V., & Volikov, Yu. N. (2007). Otsenka kachestvennykh i kolichestvennykh pokazateley razvitiya donnoy makrofauny vodnykh ob'ektov zony vliyaniya Yuzhno-Ukrainskogo energokompleksa (YuU EK). *Suchasni problemy okhorony dovkilla, ratsionalnogo vykorystannia vodnykh resursiv ta ochystky pryrodnykh i stichnykh vod: trudy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii*, 23-27 kvit. 2007 r., m. Myrhorod. Kyiv: Znannia, 124-127.
25. Slepnev, A. E., & Silaeva, A. A. (2008). Zoobentos vodoema-okhladitelya Yuzhnoukrainskoy AES. *Ozera ta shtuchni vodoimy Ukrainy: suchasnyi stan y antropohenni zminy: materialy I Mizhnar. nauk. prakt. konf.*, 22-24 trav. 2008 r. Luts'k: Vezha, 342-345.
26. Slepnev, A. E., Lyashenko, A. V., & Volikov, Yu. N. (2008). Kachestvennye i kolichestvennye pokazateli razvitiya donnoy makrofauny Aleksandrovskogo vodokhranilishcha i prilegayushchikh uchastkov r. Yuzhnyy Bug. *Sovremennoe sostoyanie rybnogo khozyaystva: problemy i puti resheniya: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-pedagogicheskoy konferentsii*. Kherson: Oldi-plyus, 116-119.
27. Slepnev, O. E., & Volikov, Yu. M. (2008). Makrozoobentos strumka Tashlyk maloho vodopostachalnyka vodoimy-okholodzhuvacha Pivdennoukrainskoi atomnoi elektrostantsii. *Sovremennye problemy hydrobiologii. Perspektivy, puty metody resheniya-2: materialy vtoroi Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsyy*. Kherson, 427-432.
28. Slepnev, A. E., & Volikov, Yu. N. (2009). Kharakteristika makrozoobentosa r. Yuzhnyy Bug i Aleksandrovskogo vodokhranilishcha v vesenniy period. Voda ta dovkillya: *Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii: VII Mizhnarodnogo Vodnogo Forumu „AQUA UKRAINE-2009”, 10-13 listopada 2009*. Kyiv: Mizhnarodniy vystavkoviy tsentr, 96-97.
29. Slepnev, O. Ye. (2010). Makrozoobentos Oleksandriivskoho vodoskhovyscha. *Naukovi zapysky Ternopil'skoho natsionalnogo pedahohichnogo universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriya: Biologiya. Spetsialnyi vypusk: Hidroekologiya*, 2 (43), 448-450.
30. Akimov, I. A. (2009). *Chervona knyha Ukrainy. Tvarynni svit*. Kyiv: Hlobalkonsaltnykh.
31. Sergeeva, O. A., Kalinichenko, R. A., Protasov, A. A. et al. (1991). Plankton, bentos i perifiton r. Yuzhnyy Bug, Aleksandrovskogo i Tashlyk'skogo vodokhranilishch (rayon stroitel'stva Tashlyk'skoy GAES). *Deposited manuscript*, 3356 - B 91. Kyiv.
32. Aleksiienko, V. R., Rudniov, M. V., & Hupalo, O. O. (2009). Rezultaty ikhtiolohichnykh doslidzhen v pryberezhnii zoni Oleksandriivskoho vodoskhovyscha v period pidniattia yoho rivnia. *Zoolohichna nauka u suchasnomu suspilstvi: Materialy Vseukrainskoi naukovoï konferentsii, prysviachenoï 175-richchiu zasnovannia kafedry zoolohii KNU, Kyiv- Kaniv, veresnia 15-18, 2009*. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 26-31.
33. Kirilyuk, O. P., & Goncharenko, N. I. (2010). Vidovoy sostav ryb i ikh raspredelenie v zone deystviya Tashlytskoy gidroakkumuliruyushchey elektrostantsii. *Naukovi zapysky Ternopil'skoho natsionalnogo pedahohichnogo universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriya: Biologiya. Spetsialnyi vypusk: Hidroekologiya*, 2 (43), 233-236.

34. Silaeva, A. A., Protasov, A. A., & Sinitsina, O. O. (2000). Mnogoletnie izmeneniya v soobshchestvakh zoobentosa v usloviyakh vliyaniya podogretykh sbrosnykh vod AES. *Problemy gidroekologii na rubezhe vekov: Materialy Mezhdunar. konf., Sankt-Peterburg, 23-30 okt. 2000 g.* Sankt-Peterburg, 239-241.
35. Shevchenko, P. H., & Honta, O. B. (2004). Vydovyi sklad ta stan ikhtiofauny vodoim Pivdenno-ukrainskoho hidroenerhetychnoho enerhokompleksu r. Pivdennyi Buh. *Rybne hospodarstvo*, 63, 237-240.

МАКРОЗООБЕНТОС ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ ЮЖНОУКРАИНСКОГО ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА

А. В. Ляшенко, artemlyashenko@bigmir.net, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

О. Е. Слепнёв, a.slepa@ukr.net, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

В. В. Маковский, vmakovskiy@gmail.com, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

Ю. М. Сытник, sytnik_yu@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

Т. В. Григоренко, grygorenko-@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

Цель. Анализ изменений структурных характеристик макрозообентоса водных объектов зоны влияния Южноукраинского энергокомплекса в связи с масштабным гидротехническим строительством.

Методика. При проведении исследований были использованы общепринятые в гидробиологии методы отбора и обработки зообентосных проб.

Результаты исследований. Проведенные исследования макрозообентоса водных объектов зоны влияния Южноукраинского энергокомплекса показали, что деятельность человека весьма существенно изменила естественное развитие гидробиоценозов реки Южный Буг, и, как следствие, Бугского лимана. Усиленная антропогенная нагрузка и эвтрофикация привели к унификации фауны низовья реки, что проявляется в исчезновении и замещении специфических понто-каспийских видов гидробионтов видами широкого распространения и устойчивыми к загрязнению. Изменение гидрологического режима и антропогенное загрязнение привели к выпадению целого ряда видов, прежде всего, это касается эндемиков и реликтов, присутствие которых придавало Днепроовско-Бугскому междуречью его индивидуальные черты. Освобождение экологической ниши, ранее занимаемой видами, дает возможность другим видам, нередко — довольно агрессивным «вселенцам» занимать свободные биотопы. Этому способствует создание водных объектов, благодаря специфическим условиям, а именно — круглогодичному термическому режиму, близкому к субтропическому, что способствует размножению и успешной акклиматизации чужеродных видов.

Научная новизна. Представлена сравнительная характеристика структурных показателей макрозообентоса водных объектов в зоне влияния Южноукраинского энергокомплекса за многолетний период.

Практическая значимость. Результаты исследований могут быть использованы для прогнозирования возможных изменений в экосистемах отдельных водоемов и для оценки их современного экологического состояния.

Ключевые слова: макрозообентос, р. Южный Буг, Ташлыкское водохранилище-охладитель, Александровское водохранилище.

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 58-70
DOI: 10.15407/fsu2018.02.058
УДК [597–1.044:577.118]:597.443

Received 13.03.18
Received in revised form 23.05.18
Accepted 07.06.18

ВАЖКІ МЕТАЛИ В ОРГАНАХ І ТКАНИНАХ ВЕСЛОНОСА *POLYODON SPATHULA* (WALBAUM) У РИБОГОСПОДАРСЬКИХ СТАВАХ ЛІСОСТЕПУ ТА ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Б. О. Ганкевич, veslonos-ua@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Третяк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Колос, kolos-en@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити особливості накопичення важких металів (Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Co, Pb, Cd) в органах і тканинах інтродукованого у внутрішні водойми України північноамериканського представника ряду *Acipenseriformes* — веслоноса *Polyodon spathula* (Walbaum).

Методика. Об'єктом досліджень були 4–7-літки веслоноса, вирощені у ставах Лісостепу та Полісся України. Для порівняльної оцінки особливостей накопичення важких металів у м'язовій тканині риб досліджували 3-літок коропа і гібрида товстолобів, вирощених у полікультурі з експериментальними групами веслоноса. Дослідження вмісту важких металів у воді ставів, органах і тканинах риб виконували з використанням загальноприйнятих у токсикології методик. Кількісне визначення вмісту важких металів здійснювали за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра С–115–М1.

Результати. Токсикологічний стан дослідних ставів характеризувався перевищенням нормативних значень за вмістом у воді Mn (у 8,5–8,9 раза), Cu (у 2,1–3,9 раза) та Pb (у 1,5–1,8 раза). Концентрація решти важких металів у воді не перевищувала нормативний рівень. За характером розподілу та накопичення важких металів в органах і тканинах веслоноса виявлено схожі закономірності, відмічені для коропа і рослиноїдних риб. Перевищення ГДК за вмістом важких металів у м'язовій тканині веслоноса не виявлено. Серед усіх досліджуваних видів риб, що вирощувались у полікультурі, веслоніс відрізнявся найменшим умістом у м'язах Cu, Co, Pb та Cd. Середній вміст важких металів у м'язах веслоноса у ставах Лісостепу і Полісся перебував у межах (мг/кг сирої маси): Fe — 4,64–29,60; Zn — 1,20–5,54; Mn — 0,10–0,23; Cu — 0,09–0,44; Ni — 0,28–2,15; Co — 0,10–0,13; Pb — 0,63–0,94; Cd — 0,031–0,037.

Наукова новизна. Вперше досліджено особливості розподілу і накопичення важких металів в органах і тканинах північноамериканського веслоноса, вирощеного в умовах типових ставових господарств України.

Практична значимість. Результати досліджень є складовою частиною матеріалів для формування бази даних з визначення якості продукції осетрівництва, зокрема щодо особливостей накопичення важких металів рибами.

Ключові слова: веслоніс, ставове рибництво, полікультура риб, накопичення важких металів, органи і тканини риб.

HEAVY METALS IN ORGANS AND TISSUES OF THE PADDLEFISH *POLYODON SPATHULA* (WALBAUM) IN FISH PONDS OF THE FOREST-STEPPE AND FOREST AREA OF UKRAINE

B. Gankevych, veslonos-ua@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
O. Tretyak, info@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
O. Kolos, kolos-en@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

© Б. О. Ганкевич, О. М. Третяк, О. М. Колос, 2018

Purpose. To investigate the peculiarities of heavy metal (Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Co, Pb, Cd) accumulation in organs and tissues of the North American paddlefish *Polyodon spathula* (Walbaum) introduced into inland water bodies of Ukraine.

Methodology. The objects of the study were age-4-7 paddlefish reared in ponds of the forest-steppe and forest area of Ukraine. Age-3 carp as well as hybrids between the bighead and silver carps reared in polyculture with experimental groups of the paddlefish were used for comparative evaluation of the peculiarities of heavy metal accumulation in fish muscular tissues. The studies of the heavy metal content in pond water, fish organs and tissues were performed with the use of generally accepted toxicological methods. The quantitative contents of heavy metals were determined with the aid of the atomic-absorption spectrophotometer C-115-M1.

Findings. The toxicological state of the experimental ponds was characterized by elevated values of the contents of Mn (by 8.5-8.9 times), Cu (by 2.1-3.9 times) and Pb (by 1.5-1.80 in water). The concentration of other heavy metals in water did not exceed the allowed values. Similar patterns were found regarding the heavy metal distribution and accumulation in paddlefish organs and tissues as for carps. No maximum allowable concentrations of heavy metals were detected in the muscular tissues of the paddlefish. Among all studied fish reared in polyculture, the paddlefish had the lowest content of Cu, Co, Pb and Cd in muscles. The mean heavy metal contents in paddlefish muscles in the studied ponds of forest-steppe and forest area were: Fe (4.64-29.60), Zn (1.20-5.54), Mn (0.10-0.23), Cu (0.09-0.44), Ni (0.28-2.15), Co (0.10-0.13), Pb (0.63-0.94), Cd (0.031-0.037).

Originality. The peculiarities of the distribution and accumulation of heavy metals in organ and tissues of the North American paddlefish reared in the conditions of pond farms of Ukraine have been studied for the first time.

Practical value. The study results is an essential component of the material for the creation of a database for the determination of product quality of domestic sturgeon culture, in particular regarding the peculiarities of heavy metal accumulation in fish.

Key words: paddlefish, pond fish farming, fish polyculture, heavy metal accumulation, fish organs and tissues.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Повсюдне різке скорочення чисельності популяцій осетрових риб, що створило загрозу їхнього зникнення, спонукає до введення в аквакультуру нетрадиційних об'єктів риборозведення, здатних компенсувати втрати осетрової продукції та зменшити промислове навантаження на осетрові види у водоймах природного походження. Одним з найцінніших прісноводних видів риб, визнаним перспективним для рибогосподарського освоєння в Україні, є північноамериканський представник ряду осетроподібних — веслонос [1, 2].

Веслоноса включено до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи у статусі вразливого виду, що зумовлює доцільність всебічного його вивчення як у водоймах нативного ареалу, так і в умовах інтродукції [2–4]. З посиленням антропогенного впливу на біогеоценози континентальних водойм значний інтерес викликають дослідження особливостей реагування організму веслоноса на зміни умов середовища, насамперед у водоймах різних місць переселення виду. Зважаючи на можливість генотоксичного впливу та важливе значення йонів важких металів для процесів обміну речовин в організмі риб, привертають увагу комплексні токсикологічні, цитогенетичні та імунологічні дослідження веслоноса в умовах ставової аквакультури України. Зокрема, встановлено, що за наявності в окремих ставах екологічних чинників, здатних справляти негативний вплив на життєдіяльність гідробионтів, за частотою

виявлених еритроцитів і лейкоцитів з мікроядрами, двоядерних лейкоцитів та апоптозів рівень зареєстрованих цитогенетичних аномалій у клітинах периферичної крові веслоноса перебував у межах допустимих значень, характерних для інших видів риб. Загалом, отримані дані вказують на задовільний стан хромосомного апарату досліджуваних груп веслоноса. Дослідження показали, що вирощування цього представника осетроподібних в умовах переущільнення посадок, недостатньої забезпеченості кормом та за несприятливих фізико-хімічних чинників середовища не створювало істотного негативного впливу на імунний потенціал веслоноса, проте викликало підвищення інтенсивності процесів ПОЛ в організмі риб [2, 5].

Визначення вмісту важких металів в органах і тканинах веслоноса, вирощеного у ставах Лісостепу і Полісся України, раніше не проводили, що зумовлює новизну та актуальність проведених досліджень з точки зору розширення даних щодо біологічних особливостей інтродуцента та оцінки якості цього виду нової продукції вітчизняного осетрівництва, отриманої в умовах типових ставових господарств.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

За впливом на екологічний стан водойм та життєдіяльність гідробіонтів важкі метали мають пріоритетне значення, що постійно викликає підвищений науковий інтерес. Проте, до останнього часу основний обсяг токсикологічних досліджень з вивчення розподілу і накопичення важких металів в органах і тканинах прісноводних риб України було присвячено поширеним об'єктам аквакультури та основним промисловим видам [6–9]. Такі ж систематичні дослідження у вітчизняному осетрівництві, втім числі щодо нових об'єктів аквакультури, не проводились. Зважаючи на це, основною метою досліджень було визначення особливостей накопичення важких металів в органах і тканинах завезеного в Україну нового об'єкта товарного осетрівництва — північноамериканського веслоноса, якого можна вважати одним з найперспективніших серед осетроподібних риб для вітчизняного ставового рибництва.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проводили в період 2012–2013 р. Відбір проб для виконання гідрохімічних та токсикологічних досліджень здійснювали в умовах повносистемних ставових господарств «Гірський Тікич» (Лісостеп) та «Нивка» (Полісся).

Об'єктом досліджень були 4–7-літки веслоноса масою 2540–7000 г (в середньому $4613,0 \pm 605,5$ г). Для порівняльної оцінки особливостей накопичення важких металів у м'язовій тканині риб одночасно досліджували 3-літок коропа і гібрида товстолобів середньою масою відповідно $1308,0 \pm 110,9$ та $1672,0 \pm 85,2$ г, вирощених на природній кормовій базі в полікультурі з експериментальними групами веслоноса в ідентичних умовах ставів зазначених господарств.

У дослідженнях використано товарну рибу, призначену для переробки на харчову продукцію в період осіннього облову ставів (вересень-жовтень).

Дослідження вмісту важких металів у воді ставів, органах і тканинах риб виконували з використанням загальноприйнятих у токсикології методик [10–12].

Кількісне визначення вмісту важких металів здійснювали прямим всмоктуванням розчину у пропан-бутан-повітряне полум'я за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра С-115-М1 в умовах лабораторії екологічних досліджень Інституту рибного господарства НААН.

У процесі вирощування риби досліджували температурний режим та основні хімічні показники води ставів за загальноприйнятими в рибництві та гідрохімії методиками [13, 14].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Впродовж періоду збирання досліджуваних даних (2012 р.) середньодобова температура води ставів влітку переважно перебувала на рівні 20–24°C з періодичним зростанням до 25–27°C. Середньосезонна величина вмісту розчиненого у воді кисню становила 4,1–4,6 мгО₂/дм³, за нетривалого зменшення цього показника в окремі дні до 1,5 мг О₂/дм³.

Загалом, гідрохімічні показники дослідних ставів істотно не відрізнялись і були характерними для ставових господарств Лісостепу та Полісся України. Величини водневого показника (рН) води перебували на рівні 7,9–8,2, що відповідає слаболужному середовищу. Концентрація мінеральних форм азоту змінювалась у межах: амонійного — 0,59–0,99 мгN/дм³, нітритного — 0,01–0,06 мгN/дм³, нітратного — 0,08–0,21 мгN/дм³. Мінеральний фосфор та загальне залізо виявлені у кількості відповідно 0,09–0,33 мгP/дм³ та 0,05–0,91 мгFe /дм³. Перманганатна окиснюваність води становила від 9,9 до 16,8 мгО/дм³, що вказує на відсутність надходження у стави надмірної кількості легкорозчинних органічних речовин. Загальна твердість води була в межах 3,9–7,6 мг-екв./дм³. Вода ставів характеризувалась середнім ступенем мінералізації із сумою йонів 377,1–649,8 мг/дм³. Серед аніонів у воді ставів обох господарств переважали гідрокарбонати (183,1–451,5 мг/дм³), а серед катіонів — Ca²⁺ (56,3–80,2 мг/дм³). Отже, за наведеними хімічними показниками воду ставів господарств «Гірський Тікич» і «Нивка» можна вважати придатною для вирощування різних вікових груп досліджуваних видів риб.

Дані досліджень щодо вмісту йонів важких металів у воді ставів з експериментальними групами риб наведені в таблиці 1. Представлені результати вказують на близький рівень зареєстрованих показників у воді ставів обох господарств. Відмічено перевищення нормативних значень за вмістом у воді марганцю (у 8,5–8,9 раза), міді (у 2,1–3,9 раза) та свинцю (у 1,5–1,8 раза). Вміст решти важких металів у воді за показниками осіннього періоду не перевищував існуючий нормативний рівень.

Таблиця 1. Вміст важких металів у воді, мкг/дм³

Table 1. The content of heavy metals in water, µg/dm³

Важкі метали / Heavy metals							
Fe	Zn	Mn	Cu	Ni	Co	Pb	Cd
Господарство «Гірський Тікич» / Fish farm "Hirskiy Tikych"							
434,4	8,4	84,9	3,9	8,1	5,4	18,0	1,4
Господарство «Нивка» / Fish farm "Nivka"							
565,5	3,6	88,7	2,1	9,0	4,5	15,2	1,6
Нормативні значення / Normative values							
1000,0	10,0	10,0	1,0	10,0	10,0	10,0	5,0

Визначення вмісту важких металів в органах і тканинах риб дало змогу виявити певні особливості їх розподілу та накопичення в організмі досліджуваних об'єктів риборозведення.

Найбільший вміст заліза у веслоноса з обох господарств виявлено у печінці. Середнім рівнем його накопичення характеризувались зябра, шкіра і нирки риб. Найменший вміст заліза зареєстровано у м'язах (табл. 2).

Таблиця 2. Вміст заліза в органах і тканинах веслоноса*
Table 2. Content of iron in the organs and tissues of the paddlefish*

Господарство / Fish farm	Вміст Fe, мг/кг сирової маси ($M \pm m$, $n = 5$) / Fe content, mg / kg of crude mass ($M \pm m$, $n = 5$)				
	м'язи / muscle	печінка / liver	нирки / kidney	зябра / gills	шкіра / skin
«Гірський Тікич» / “Hirskyi Tikych”	29,60±7,25	148,86±37,90	40,24±5,65	104,56±20,63	86,08±16,94
«Нивка» / “Nivka”	4,64±0,85	869,54±94,77	43,28±5,80	14,16±2,89	16,88±2,36

Примітка.* ГДК — не встановлено

Note: * MAC is not installed

За ступенем зменшення накопичення цього елемента в органах і тканинах веслоноса їх можна розмістити у такі ряди: печінка > зябра > шкіра > нирки > м'язи «Гірський Тікич» та печінка > нирки > шкіра > зябра > м'язи «Нивка». Підвищення вмісту феруму в печінці риб насамперед можна пояснити його спрямованим накопиченням (резервуванням) для використання у кровотворних процесах в організмі. Цілком обґрунтованим є і помітне накопичення феруму у зябрах, шкірі та нирках, які відіграють важливу роль в обміні хімічними елементами між організмом риб і навколишнім середовищем.

За вмістом цинку найбільшим рівнем його накопичення відрізнялась шкіра веслоноса. Дещо меншу кількість цього елемента виявлено у зябрах і печінці інтродукта. Найменший вміст цинку зареєстровано у м'язах (табл. 3). У порядку зменшення накопичення цинку в органах і тканинах веслоноса їх можна розмістити у такі ряди: шкіра > зябра > печінка > нирки > м'язи «Гірський Тікич» та шкіра > печінка > зябра > нирки > м'язи «Нивка». Загалом, за винятком м'язів та шкіри риб з господарства «Гірський Тікич», можна відмітити досить рівномірний розподіл цинку, вміст якого у печінці, нирках і зябрах не перевищував допустимий рівень.

За середніми величинами накопичення марганцю найбільший його вміст відмічено у зябрах веслоноса. Значною мірою виявлену закономірність можна пояснити особливостями будови зябрового апарату, зокрема значною площею і високою проникністю епітелію зябрових пелюсток та, напевне, функціональним значенням цього органу для обміну марганцю між водним середовищем і організмом риб.

Таблиця 3. Вміст цинку в органах і тканинах веслоноса*
Table 3. Content of zinc in the organs and tissues of the paddlefish*

Господарство / Fish farm	Вміст Zn, мг/кг сирової маси ($M \pm m$, $n = 5$) / Zn content, mg / kg of crude mass ($M \pm m$, $n = 5$)				
	м'язи / muscle	печінка / liver	нирки / kidney	зябра / gills	шкіра / skin
«Гірський Тікич» / "Hirskyi Tikych"	5,54±0,98	16,80±1,59	16,24±2,22	19,46±1,43	40,54±1,45
«Нивка» / "Nivka"	1,20±0,14	9,22±0,15	5,54±0,45	7,16±0,93	9,84±1,73

Примітка.* ГДК — 40,0 мг/кг сирової маси у товарній рибі.

Note: * MAC — 40.0 mg / kg of raw weight in commodity fish.

Значно нижчим накопиченням даного елемента характеризувалась решта органів і тканин досліджуваного представника осетроподібних (табл. 4). В узагальненому вигляді за розподілом марганцю в порядку зменшення його вмісту органи і тканини веслоноса утворюють такі ряди: зябра > шкіра > нирки > м'язи > печінка «Гірський Тікич» та зябра > печінка $\geq$ шкіра > нирки > м'язи «Нивка».

Таблиця 4. Вміст марганцю в органах і тканинах веслоноса*
Table 4. Content of manganese in the organs and tissues of the paddlefish*

Господарство / Fish farm	Вміст Mn, мг/кг сирової маси ($M \pm m$, $n = 5$) / Mn content, mg / kg of crude mass ($M \pm m$, $n = 5$)				
	м'язи / muscle	печінка / liver	нирки / kidney	зябра / gills	шкіра / skin
«Гірський Тікич» / "Hirskyi Tikych"	0,23±0,06	0,21±0,04	0,30±0,06	1,03±0,14	0,69±0,13
«Нивка» / "Nivka"	0,10±0,01	0,29±0,06	0,27±0,03	1,15±0,08	0,29±0,07

Примітка.* ГДК — не встановлено.

Note: * MAC is not installed.

Серед досліджуваних органів і тканин веслоноса найбільшим вмістом купруму відрізнялась печінка. Зазначене накопичення в печінці, напевне, пов'язане з депонуванням міді з подальшим використанням для забезпечення ефективного перебігу низки важливих фізіологічних процесів в організмі риб. З наведених даних також помітне деяке зростання вмісту міді у нирках. Проте, за винятком печінки риб з господарства «Гірський Тікич», середні величини вмісту міді в усіх органах і тканинах експериментальних груп веслоноса були нижчими допустимих значень. Найнижчим вмістом цього елемента характеризувались м'язи риб (табл. 5). У міру зменшення накопичення міді в органах і тканинах веслоноса можна побудувати такі ряди: печінка > нирки > шкіра > зябра > м'язи «Гірський Тікич» та печінка > нирки > зябра > шкіра > м'язи «Нивка».

Таблиця 5. Вміст міді в органах і тканинах веслоноса*

Table 5. Content of copper in the organs and tissues of the paddlefish*

Господарство / Fish farm	Вміст Cu, мг/кг сирової маси ($M \pm m$, $n = 5$) / Cu content, mg / kg of crude mass ($M \pm m$, $n = 5$)				
	м'язи / muscle	печінка / liver	нирки / kidney	зябра / gills	шкіра / skin
«Гірський Тікич» / “Hirskyi Tikych”	0,44±0,04	16,48±2,17	1,78±0,19	0,71±0,08	1,14±0,13
«Нивка» / “Nivka”	0,09±0,02	9,84±1,66	1,90±0,57	0,20±0,05	0,16±0,02

Примітка. * ГДК — 10,0 мг/кг сирової маси у товарній рибі.

Note: * MAC — 10.0 mg / kg of raw weight in commodity fish.

Кількість нікелю в організмі веслоноса розподілялась досить рівномірно, з незначним підвищенням вмісту у зябрах та шкірі, які безпосередньо контактують з навколишнім середовищем (табл. 6). За середньою величиною у напрямі зменшення вмісту ніколу досліджені органи і тканини веслоноса утворюють такі ряди: зябра > шкіра > м'язи > нирки > печінка «Гірський Тікич» та шкіра > зябра > печінка > нирки > м'язи «Нивка».

Таблиця 6. Вміст нікелю в органах і тканинах веслоноса*

Table 6. Content of nickel in the organs and tissues of the paddlefish*

Господарство / Fish farm	Вміст Ni, мг/кг сирової маси ($M \pm m$, $n = 5$) / Ni content, mg / kg of crude mass ($M \pm m$, $n = 5$)				
	м'язи / muscle	печінка / liver	нирки / kidney	зябра / gills	шкіра / skin
«Гірський Тікич» / “Hirskyi Tikych”	2,15±0,09	0,92±0,19	1,67±0,65	3,24±0,80	2,98±0,75
«Нивка» / “Nivka”	0,28±0,06	0,71±0,09	0,33±0,07	0,77±0,07	0,82±0,17

Примітка. * ГДК — не встановлено.

Note: * MAC is not installed

Найбільший вміст кобальту у веслоноса виявлено у печінці і зябрах у кількості, що перевищує мінімальний рівень накопичення цього елемента в шкірі і м'язах у 2,7–11,6 раза (табл. 7). Органи і тканини веслоноса у міру зменшення вмісту кобальту можна розмістити у такі ряди: печінка > зябра > м'язи > нирки ≥ шкіра «Гірський Тікич» та печінка > зябра > нирки > шкіра > м'язи «Нивка».

Установлено, що свинець найбільш інтенсивно накопичувався у зябрах веслоноса. Натомість, у його м'язах зареєстровано найменші величини вмісту цього елемента, які не перевищували гранично допустиму концентрацію, установлену в межах до 1 мг/кг сирової маси (табл. 8). У міру зменшення вмісту свинцю окремі органи і тканини веслоноса утворюють такі ряди: зябра > шкіра > печінка > нирки > м'язи «Гірський Тікич» та зябра > печінка > нирки > шкіра > м'язи «Нивка».

Таблиця 7. Вміст кобальту в органах і тканинах веслоноса*
Table 7. Content of cobalt in the organs and tissues of the paddlefish*

Господарство / Fish farm	Вміст Co, мг/кг сирової маси (M ± m, n = 5) / Co content, mg / kg of crude mass (M ± m, n = 5)				
	м'язи / muscle	печінка / liver	нирки / kidney	зябра / gills	шкіра / skin
«Гірський Тікич» / "Hirskyi Tikych"	0,13±0,03	0,60±0,10	0,11±0,02	0,46±0,03	0,11±0,01
«Нивка» / "Nivka"	0,10±0,01	1,16±0,06	0,34±0,03	0,48±0,05	0,18±0,03

Примітка. * ГДК — не встановлено.

Note: * MAC is not installed

Таблиця 8. Вміст свинцю в органах і тканинах веслоноса*
Table 8. Content of lead in the organs and tissues of the paddlefish*

Господарство / Fish farm	Вміст Pb, мг/кг сирової маси (M ± m, n = 5) / Pb content, mg / kg of crude mass (M ± m, n = 5)				
	м'язи / muscle	печінка / liver	нирки / kidney	зябра / gills	шкіра / skin
«Гірський Тікич» / "Hirskyi Tikych"	0,63±0,03	0,70±0,08	0,64±0,05	1,23±0,06	1,05±0,09
«Нивка» / "Nivka"	0,94±0,04	3,04±0,20	2,03±0,42	3,06±0,15	1,69±0,39

Примітка. ГДК — 1,0 мг/кг сирової маси у товарній рибі.

Note: * MAC — 1.0 mg / kg of raw weight in commodity fish.

Вміст кадмію в органах і тканинах веслоноса характеризувався низькими величинами, які не перевищували встановлений допустимий рівень — до 0,2 мг/кг сирової маси. Дещо більшим вміст цього елемента був у зябрах, шкірі і нирках риб з господарства «Гірський Тікич» та в печінці, нирках і зябрах інтродукта з господарства «Нивка» (табл. 9). За ступенем зменшення накопичення кадмію органи і тканини обстежених риб можна розмістити у такі ряди: зябра > шкіра > нирки > печінка > м'язи «Гірський Тікич» та печінка > нирки > зябра > шкіра > м'язи «Нивка».

Таблиця 9. Вміст кадмію в органах і тканинах веслоноса*
Table 9. Content of cadmium in the organs and tissues of the paddlefish*

Господарство / Fish farm	Вміст Cd, мг/кг сирової маси (M ± m, n = 5) / Cd content, mg / kg of crude mass (M ± m, n = 5)				
	м'язи / muscle	печінка / liver	нирки / kidney	зябра / gills	шкіра / skin
«Гірський Тікич» / "Hirskyi Tikych"	0,037±0,009	0,045±0,009	0,060±0,010	0,065±0,015	0,061±0,010
«Нивка» / "Nivka"	0,031±0,002	0,110±0,008	0,104±0,017	0,097±0,002	0,047±0,009

Примітка. ГДК — 0,2 мг/кг сирової маси у товарній рибі.

Note: * MAC — 0.2 mg / kg of raw weight in commodity fish.

Узагальнюючи наведені дані щодо вмісту важких металів в органах і тканинах веслоноса слід відмітити, що залізо, мідь і кобальт більшою мірою накопичувались у печінці, цинк — у печінці, шкірі і зябрах, манган — у зябрах, нікель — у зябрах і шкірі риб. Свинець і кадмій, інтенсивність надходження яких в організм гідробіонтів викликає найбільше занепокоєння, значною мірою концентрувались у зябрах, шкірі та печінці інтродуцента. Загалом, за кількісними показниками вмісту в усіх проаналізованих органах і тканинах веслоноса переважали залізо і цинк, найменшу кількість складали кобальт і кадмій.

Таким чином, отримані дані щодо характеру розподілу і накопичення важких металів в організмі досліджуваного виду осетроподібних, в цілому, вказують на аналогічні закономірності, виявлені для багатьох представників прісноводної іхтіофауни України [6–9]. Отже, більш забрудненими за переважною більшістю йонів важких металів виявились тканини і органи риб, що безпосередньо контактують з навколишнім середовищем, тобто — зябра та шкіра, а також органи, що забезпечують обмін і резервування багатьох речовин, необхідних для функціонування організму, та беруть участь у процесах детоксикації, насамперед — печінка.

Аналіз результатів досліджень, виконаних у порівняльному аспекті, показав, що серед усіх риб, вирощених сумісно у полікультурі в умовах господарства «Гірський Тікич», веслоніс відрізнявся найменшим вмістом у м'язах міді, кобальту, свинцю і кадмію, без перевищення гранично допустимих концентрацій (табл. 10).

Таблиця 10. Вміст важких металів у м'язовій тканині риб, вирощених у полікультурі в господарстві «Гірський Тікич», мг/кг сирової маси ($M \pm m$, $n = 5$)

Table 10. Content of heavy metals in the muscle tissue of fish, which was grown in polyculture at the fish farm “Hirskyi Tikych”, mg/kg of raw mass ($M \pm m$, $n = 5$)

Важкі метали / Heavy metals	Об'єкти полікультури у порядку зменшення величини досліджуваних показників / Objects of polyculture in order of decreasing the value of the studied indicators	ГДК, мг/кг сирової маси у товарній рибі / MPC mg / kg of raw weight in commodity fish
Fe	веслоніс (29,60±7,25) > короп (24,20±5,16) > товстолоб (19,06±3,65)	—
Zn	веслоніс (5,54±0,98) > короп (4,24±0,27) > товстолоб (4,24±0,09)	40,0
Mn	веслоніс (0,23±0,06) > короп (0,22±0,03) > товстолоб (0,17±0,02)	—
Cu	короп (2,03±0,36) > товстолоб (0,96±0,09) > веслоніс (0,44±0,04)	10,0
Ni	веслоніс (2,15±0,09) > товстолоб (0,80±0,07) > короп (0,77±0,10)	—
Co	товстолоб (0,20±0,04) > короп (0,14±0,03) > веслоніс (0,13±0,03)	—
Pb	короп (0,86±0,02) > товстолоб (0,75±0,05) > веслоніс (0,63±0,03)	1,0
Cd	короп (0,080±0,006) > товстолоб (0,043±0,006) > веслоніс (0,037±0,009)	0,2

Загалом, представлені у таблиці 10 дані дають підставу для висновку, що за вмістом важких металів у м'язовій тканині веслоноса виявлені схожі показники з основними об'єктами риборозведення у ставовій аквакультурі України, якими є короп і рослиноідні риби.

Порівнюючи вміст важких металів у м'язах риб з господарства «Нивка» слід відмітити нижчий рівень їх накопичення у веслоноса, порівняно з коропом, за всіма досліджуваними металами. За аналогією з господарством «Гірський Тікич», незважаючи на певне перевищення нормативних значень за деякими важкими металами у воді ставів, зокрема за свинцем і кадмієм, перевищення їх гранично допустимих концентрацій у м'язах веслоноса не виявлено (табл. 11).

Таблиця 11. Вміст важких металів у м'язовій тканині риб, вирощених у полікультурі в господарстві «Нивка», мг/кг сирової маси ($M \pm m$, $n = 5$)

Table 11. Content of heavy metals in the muscle tissue of fish, which was grown in polyculture at the fish farm “Nivka”, mg/kg of raw mass ($M \pm m$, $n = 5$)

Важкі метали / Heavy metals	Об'єкти полікультури у порядку зменшення величини досліджуваних показників / Objects of polyculture in order of decreasing the value of the studied indicators	ГДК, мг/кг сирової маси у товарній рибі / MPC mg / kg of raw weight in commodity fish
Fe	короп ($7,78 \pm 0,83$) > веслоніс ($4,64 \pm 0,85$)	–
Zn	короп ($5,44 \pm 1,26$) > веслоніс ($1,20 \pm 0,14$)	40,0
Mn	короп ($0,13 \pm 0,02$) > веслоніс ($0,10 \pm 0,01$)	–
Cu	короп ($0,29 \pm 0,02$) > веслоніс ($0,09 \pm 0,02$)	10,0
Ni	короп ($0,87 \pm 0,03$) > веслоніс ($0,28 \pm 0,06$)	–
Co	короп ($0,14 \pm 0,02$) > веслоніс ($0,10 \pm 0,01$)	–
Pb	короп ($1,02 \pm 0,07$) > веслоніс ($0,94 \pm 0,04$)	1,0
Cd	короп ($0,082 \pm 0,005$) > веслоніс ($0,031 \pm 0,002$)	0,2

За вмістом таких небезпечних токсикантів як свинець і кадмій, у м'язах усієї кількості досліджених риб, вирощених у ставовій полікультурі господарств «Гірський Тікич» та «Нивка», зареєстровано такі коливання величин (мг/кг сирової маси): Pb — веслоніс (0,53–1,07), гібрид товстолобів — (0,62–0,85), короп — (0,81–1,26); Cd — веслоніс (0,017–0,061), гібрид товстолобів — (0,028–0,059), короп — (0,061–0,098). Тобто, за наведеними показниками, істотних відмінностей між досліджуваними об'єктами культивування не виявлено.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

В умовах ставових господарств Лісостепу та Полісся України за характером розподілу і накопичення в організмі веслоноса йонів важких металів (Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Co, Pb, Cd) відмічені закономірності, виявлені раніше для інших

прісноводних видів риб з внутрішніх водойм України. Вміст важких металів у зябрах, шкірі та печінці досліджуваного інтродуцента, як правило, перевищував рівень їх накопичення у м'язах. Перевищення гранично допустимих концентрацій розглянутих токсикантів у м'язовій тканині веслоноса не виявлено.

Дослідження даного спрямування з північноамериканським веслоносом в Україні лише розпочато, що зумовлює доцільність їх продовження з використанням риб різного віку, вирощених за відповідних технологій аквакультури. Отримані результати можуть використовуватись у процесі розвитку товарного осетрівництва на наступних етапах рибогосподарського освоєння веслоноса. Крім того, вивчення адаптивності нових об'єктів рибництва в умовах забруднення водойм токсикантами різного походження сприятиме ефективному науковому забезпеченню робіт з відтворення племінних ресурсів цих риб та їх розширеного використання у штучно сформованих іхтіокомплексах континентальних водойм.

ЛІТЕРАТУРА

1. Онученко О. В., Третяк О.М., Кулешов О.В. Основи рибогосподарського освоєння веслоноса *Polyodon spathula* (Walbaum). Київ : Вища освіта, 2003. 111 с.
2. Третяк О. М. Рибницько-біологічні основи розведення та вирощування веслоноса *Polyodon spathula* (Walbaum) в аквакультурі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. с.-г. наук : спец. 06. 02. 03 «рибництво». Київ, 2012. 48 с.
3. Mims S. D. Paddlefish culture. Development expanding beyond U.S., Russia, China // Global Aquaculture Advocate. 2006. P. 62—63.
4. Виноградов В. К., Ерохина Л. В., Мельченков Е. А. Биологические основы разведения и выращивания веслоноса (*Polyodon spathula* (Walbaum)). Москва : ФГНУ Росинформагротех, 2003. 344 с.
5. Третяк О. М., Глушко Ю. М., Тарасюк С. І. Сезонна мінливість цитогенетичних характеристик у веслоноса // Рибогосподарська наука України. 2010. № 3. С. 25—31.
6. Олексієнко Н. В., Мельник А. П., Сидоров М. А. Вміст важких металів у тканинах та органах каналного сома // Рибогосподарська наука України. 2008. № 3. С. 11—18.
7. Вміст та розподіл важких металів в органах і тканинах промислових видів риб Канівського водосховища / Мельник А. П. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2009. № 1. С. 93—99.
8. Видові особливості розподілу та накопичення важких металів в органах і тканинах ляща (*Abramis brama* L.) та карася сріблястого (*Carassius auratus* L.) Канівського водосховища / Мельник А. П. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2012. № 3—4. С. 22—26.
9. Важкі метали у абіотичних і біотичних складових рибогосподарської гідроекосистеми «Ішхан» / Мельник А. П. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2015. № 3—4. С. 5—14.
10. Хавезов И., Цалев Д. Атомно-абсорбционный анализ. Ленинград : Химия, 1983. 144 с.
11. ГОСТ 26929-94. Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб.

- Минерализация для определения содержания токсичных элементов. Москва : Стандартиформ, 2010. 12 с. (Межгосударственный стандарт).
12. ГОСТ 30178-96. Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов. Москва : Стандартиформ, 2010. 10 с. (Межгосударственный стандарт).
 13. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеиздат, 1973. 270 с.
 14. СОУ – 05.01.37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України. 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).

REFERENCES

1. Onuchenko, O. V., Tretjak, O. M., & Kuleshov, O. V. (2003). *Osnovy rybogospodars'kogo osvojennja veslonosa Polyodon spathula (Walbaum)*. Kyi'v: Vyshha osvita.
2. Tretjak, O. M. (2012). *Rybnyč'ko-biologichni osnovy rozvedennja ta vyroshhuvannja veslonosa Polyodon spathula (Walbaum) v akvakul'turi Ukraïny. Extended abstracts of candidate's thesis*. Kyi'v.
3. Mims, S. D. (2006). Paddlefish culture. Development expanding beyond U.S., Russia, China. *Global Aquaculture Advocate*, 62-63.
4. Vinogradov, V. K., Erokhina, L. V., & Mel'chenkov, E. A. (2003). *Biologicheskie osnovy razvedeniya i vyrashchivaniya veslonosa (Polyodon spathula (Walbaum))*. Moskva: FGUN Rosinformagrotekh.
5. Tretjak, O. M., Glushko, Ju. M., & Tarasjuk, S. I. (2010). Sezonna minlyvist' cytogenetychnyh harakterystyk u veslonosa. *Rybogospodars'ka nauka Ukraïny*, 3, 25-31.
6. Oleksijenko, N. V., Mel'nyk, A. P., & Sydorov, M. A. (2008). Vmist vazhkyh metaliv u tkanynah ta organah kanal'nogo soma. *Rybogospodars'ka nauka Ukraïny*, 3, 11-18.
7. Mel'nyk, A. P. et al. (2009). Vmist ta rozpodil vazhkyh metaliv v organah i tkanynah promyslovyh vydiv ryb Kanivs'kogo vodoshovyshha. *Rybogospodars'ka nauka Ukraïny*, 1, 93-99.
8. Mel'nyk, A. P. et al. (2012). Vydovi osoblyvosti rozpodilu ta nakopychennja vazhkyh metaliv v organah i tkanynah l'jashha (*Abramis brama* L.) ta karasja sribljastogo (*Carassius auratus* L.) Kanivs'kogo vodoshovyshha. *Rybogospodars'ka nauka Ukraïny*, 3-4, 22-26.
9. Mel'nyk, A. P. et al. (2015). Vazhki metaly u abiotychnyh i biotychnyh skladovyh rybogospodars'koi' gidroekosystemy "Ishhan". *Rybogospodars'ka nauka Ukraïny*, 3-4, 5-14.
10. Khavezov, I., & Tsalev, D. (1983). *Atomno-absorbtsionnyy analiz*. Leningrad: Khimiya.
11. Syr'e i produkty pishchevye. Podgotovka prob. Mineralizatsiya dlya opredeleniya soderzhaniya toksichnykh elementov (2010). *GOST 26929-94, Mezhhgosudarstvennyy standart*. Moskva: Standartinform.
12. Syr'e i produkty pishchevye. Atomno-absorbtsionnyy metod opredeleniya toksichnykh elementov (2010). *GOST 30178-96, Mezhhgosudarstvennyy standart*. Moskva: Standartinform.

13. Alekin, O. A., Semenov, A. D., & Skopintsev, B. A. (1973). *Rukovodstvo po khimicheskomu analizu vod sushi*. Leningrad: Gidrometeoizdat.
14. Voda rybogospodars'kyh pidprijemstv. Zagal'ni vymogy ta normy (2006). *SOU-05.01.37-385:2006*. Kyiv: Ministerstvo agrarnoi' polityky Ukrainy.

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ ВЕСЛОНОСА *POLYODON SPATHULA* (WALBAUM) В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРУДАХ ЛЕСОСТЕПИ И ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ

Б. А. Ганкевич, veslonos-ua@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

А. М. Третяк, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Е. Н. Колос, kolos-en@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Исследовать особенности накопления тяжелых металлов (Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Co, Pb, Cd) в органах и тканях интродуцированного во внутренние водоемы Украины североамериканского представителя отряда *Acipenseriformes* — веслоноса *Polyodon spathula* (Walbaum).

Методика. Объектом исследований были 4–7-летки веслоноса, выращенные в прудах Лесостепи и Полесья Украины. Для сравнительной оценки особенностей накопления тяжелых металлов в мышечной ткани рыб исследовали 3-леток карпа и гибрида толстолобиков, выращенных в поликультуре с экспериментальными группами веслоноса. Исследования содержания тяжелых металлов в воде прудов, органах и тканях рыб выполняли с использованием общепринятых в токсикологии методик. Количественное определение содержания тяжелых металлов осуществляли с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра С – 115–М1.

Результаты. Токсикологическое состояние опытных прудов характеризовалось превышением нормативных значений по содержанию в воде Mn (в 8,5–8,9 раза), Cu (в 2,1–3,9 разв) и Pb (в 1,5–1,8 раза). Концентрация остальных тяжелых металлов в воде не превышала нормативный уровень. По характеру распределения и накопления тяжелых металлов в органах и тканях веслоноса выявлены схожие закономерности, отмеченные для карпа и растительноядных рыб. Превышения ПДК по содержанию тяжелых металлов в мышечной ткани веслоноса не выявлено. Среди всех исследованных видов рыб, выращенных в поликультуре, веслонос отличался наиболее низким содержанием в мышцах Cu, Co, Pb и Cd. Среднее содержание тяжелых металлов в мышцах веслоноса в прудах Лесостепи и Полесья находилось в пределах (мг/кг сырой массы): Fe — 4,64–29,60; Zn — 1,20–5,54; Mn — 0,10–0,23; Cu — (0,09–0,44); Ni — 0,28–2,15; Co — 0,10–0,13; Pb — 0,63–0,94; Cd — 0,031–0,037.

Научная новизна. Впервые исследованы особенности распределения и накопления тяжелых металлов в органах и тканях североамериканского веслоноса, выращенного в условиях типичных прудовых хозяйств Украины.

Практическая значимость. Результаты исследований являются составной частью материалов для формирования базы данных по определению качества продукции осетроводства, в частности по особенностям накопления тяжелых металлов рыбами.

Ключевые слова: веслонос, прудовое рыбоводство, поликультура рыб, накопление тяжелых металлов, органы и ткани рыб.

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 71-80

DOI: 10.15407/fsu2018.02.071

УДК 639.371.13:639.3.06

Received 11.01.18

Received in revised form 23.02.18

Accepted 05.03.18

ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЕРШЕ НЕРЕСТУЮЧИХ ПЛІДНИКІВ РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ *ONCORHYNCHUS MYKISS* (WALBAUM), ВИРОЩЕНОЇ В УМОВАХ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА «СЛОБОДА-БАНИЛІВ»

П. Д. Мендришора, p.mendryshora@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

Г. А. Куріненко, annazakharenko@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

Мета. Проаналізувати результати вирощування та дати рибницько-біологічну характеристику вперше нерестуючим плідникам райдужної форелі, вирощених за індустріальною технологією в умовах форелевого господарства «Слобода-Банилів», за потомством.

Методика. Вирощування проводили в басейнових умовах форелевого господарства «Слобода-Банилів». Матеріалом для досліджень слугували дворічки райдужної форелі, отримані від ікри осінньо-нерестуючої форми райдужної форелі. Вирощування риб відбувалося в басейні площею 216 м² за густоти посадки 37 екз./м², згідно загальноприйнятих технологій у форелівництві. Оцінку маточного стада проводили за показниками продуктивних та репродуктивних ознак. Підрощування личинок здійснювали впродовж 45 діб в пластикових лотках за густоти посадки 10 тис. екз./м². Годівлю риб проводили штучним кормом фірми «Віомар». Статистичну обробку матеріалу проводили в «Microsoft Office Excel» (2003). Аналіз величин виконано в системі абсолютних значень. Критеріями аналізу показників були їх середня величина та похибка ($M \pm m$), відхилення (σ), показник мінливості (C_v).

Результати. Згідно проведених робіт з формування маточних стад райдужної форелі встановлено, що плідники, вирощені в умовах індустріального господарства «Слобода-Банилів», попри нестабільні умови вирощування, характеризувалися помірним темпом росту та мали високі значення продуктивних та репродуктивних ознак. Так, середній показник маси тіла самиць у віці 2-х років складав 720,0 г, робочої плодючості — 2,3 тис. ікринок, маси продукуючої ікри — 101,3 г. Відсоток запліднення був майже однаковим у кожній з дослідних самиць, та перебував в межах 84,9–92,7%. Середній показник маси личинок у віці 45 діб становив 974,5 мг. Виживання мальків в середньому складало 47,7%, з межами коливань від 42,1 до 52,3%.

Наукова новизна. Вперше в Україні проведено дослідження з формування маточних стад райдужної форелі у басейновому господарстві з нестабільними умовами вирощування з застосуванням аналізу репродуктивних та продуктивних ознак.

Досліджений нами показник, а саме — розмір ікринок — може бути використаним як показник рибогосподарської цінності самиць як в цілому, так і з метою створення селекційних стад, оскільки є показником швидкості дозрівання, тобто головною ознакою для ранньодозріваючої форми.

Практична значимість. Результати проведеної роботи дадуть змогу здійснити відбір та сформувати повноцінне маточне стадо, що характеризуватиметься високими показниками продуктивних та репродуктивних ознак вперше нерестуючих особин дворічного віку в господарствах з нестабільними умовами вирощування.

© П. Д. Мендришора, Г. А. Куріненко, 2018

Ключові слова: райдужна форель, маса тіла, довжина тіла, ікра, личинки, продуктивні, репродуктивні показники.

CHARACTERISTICS OF FIRSTLY SPAWNING BROOD RAINBOW TROUT *ONCORHYNCHUS MYKISS* (WALBAUM), REARED IN THE CONDITIONS OF THE INDUSTRIAL FISH FARM SLOBODA-BANYLIV

P. Mendryshora, p.mendryshora@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

H. Kurinenko, annazakharenko@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To analyze the results of rearing and to provide fish culture-biological characteristics of firstly spawning brood rainbow trout based on their offspring reared using industrial technology in the conditions of the trout farm "Sloboda-Banyliv".

Methodology. Rearing was performed in tanks of the trout farm "Sloboda-Banyliv". The material for the study were age-2 rainbow trout produced from eggs of an autumn-spawning form of rainbow trout. Rearing was performed in a 216 m² tank with a stocking density of 37 fish/m² according to generally accepted trout culture methods. Evaluation of the brood stock was performed using productive and reproductive features. Growing of larvae was done for 45 days in plastic trays with a stocking density of 10 thousand fish/m². Statistical processing of the material was done in Microsoft Office Excel (2003). Analysis of values for performed in the system of absolute values. The criteria for analysis were their mean values and standard error ($M \pm m$), deviation (σ), coefficient of variation (C_v). Fish were fed with the artificial feed "Biomar".

Findings. The works on the creation of rainbow trout brood stock showed that brood fish reared in the conditions of the industrial fish farm "Sloboda-Banyliv", despite instable rearing conditions, were characterized by a moderate growth rate and high values of productive and reproductive features. E.g., mean body weight of age-2 females was 720.9 g with a fecundity of 2.3 thousand. Mean weight of produced eggs was 101.3 g. Fertilization rate was almost the same in all studied females and varied within 84.9–92.7 %. Mean weight of 45 day larvae was 974.5 mg. Survival rate of fingerlings was on average 47.7% with a variation from 42.1% to 52.3%.

Originality. A study on the creation of rainbow trout brood stocks in a tank fish farm with instable conditions of rearing with the use of an analysis of productive and reproductive features was performed in Ukraine for the first time. The studied feature such as egg diameter can be used as a parameter of the breeding value of females both broadly and for the creation of selective-breeding stocks, because it is a parameter of maturation rate, i.e. the main feature for early matured form.

Originality. The results of the performed work can allow selecting and creating a full brood stock at fish farms with instable rearing conditions, which are characterized by high values of productive and reproductive features of firstly spawning age-2 fish.

Key words: rainbow trout, body weight, body length, eggs, larvae, productive, reproductive features.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Ефективність функціонування форелевих господарств, як і будь-яких інших рибницьких господарств, в цілому залежить від якості плідників. Плідники з високими показниками продуктивних та репродуктивних ознак зможуть забезпечити отримання життєстійкого посадкового матеріалу. Необхідно зауважити, що впродовж останніх років у форелевих господарствах Західної України спостерігається погіршення умов вирощування за рахунок зміни кліматичних умов (зростання середньої температури води та повітря), внаслідок чого відбувається зміщення терміну нересту та раннє дозрівання самиць у

дворічному віці. Тому в умовах сьогодення виникла необхідність вивчення рибницько-біологічних особливостей плідників райдужної форелі у господарствах з нестабільними умовами вирощування та спрямування робіт на покращення даних показників.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

За даним напрямком роботи особливу увагу потрібно приділити якості овульованої ікри, адже доведено, що від індивідуальних показників ікринок залежить життєстійкість посадкового матеріалу [1–3]. За дослідженнями Н. Новоженіна, було встановлено, що показники індивідуальної маси ікринок 35 мг є граничним, оскільки за маси 35–40 мг під час інкубації вони гинуть [4, 5]. Однак, необхідно зазначити, що близький за родинним статусом до райдужної форелі сталеголовий лосось, який досягає статевої зрілості в умовах півдня України у дворічному віці, має інші значення [6]. Тому основним завданням було дослідження якості ікри та оцінка якості потомства, отриманого від вперше нерестуючих плідників дворічного віку, вирощених за нестабільних умов утримання.

Необхідно зазначити, що найбільш об'єктивним показником якості ікри є рівень виживання ембріонів. В умовах виробництва даний показник зазвичай визначають за виживанням личинок, однак він не є достатньо надійним критерієм оцінки якості ікри, оскільки ембріогенез лососевих риб, в тому числі й райдужної форелі, досить тривалий, і ймовірність впливу різноманітних технічних чинників (зупинка та порушення роботи інкубаційних апаратів, забруднення води паводковими водами, тощо) є дуже високою й, відповідно, може впливати на кількість та якість отриманих личинок. В той же час, слід зауважити, що на виживання ембріонів неможливо розмежувати вплив таких показників, як індивідуальні особливості самиць (включаючи їх генетичну неповноцінність), нестабільні умови утримання плідників та порушення біотехніки штучного відтворення, в основі чого лежить процес дозрівання та овуляції.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Збір експериментальних матеріалів проводили у 2016 р. на базі форелевого господарства «Слобода-Банилів», що розташоване в с. Банилів Вишницького району Чернівецької області. Дане господарство є повносистемним та за своїми технологічними складовими належить до басейнового типу. Загальна площа водного дзеркала становить 1100 м². У зв'язку з нестабільним водопостачанням, у господарстві використовують два його джерела: ґрунтові води басейну р. Черемош та свердловину потужністю 8 м³/год; дана кількість води забезпечує необхідну для лососевих риб проточність. Воду додатково насичують киснем до оптимальних показників для життєдіяльності риб.

Температуру води в лотках, басейнах та ставах визначали за допомогою водного термометра, двічі на добу, з наступним визначенням середньодобових показників.

Годівлю риб проводили штучним кормом фірми «Biomar» рецепту «Efico alpha 717», розміром гранули 4,5 мм. Добову потребу у кормах визначали згідно таблиць раціонів, розроблених виробником [7]. В даних таблицях враховані

показники індивідуальної маси риб та температури водного середовища на момент годівлі. Коефіцієнт вгодованості розраховували за Фультоном [8].

В якості дослідного матеріалу було обрано вперше нерестуючих самиць райдужної форелі у віці 2-х років. Бонітування та відбір плідників проводили за 2–3 тижні до нересту. Оцінку плідників здійснювали на основі фенотипових ознак, що передбачає використання тільки здорових, повноцінних особин без ушкоджень, вад розвитку та добре вгодованих [9, 10].

Екстер'єрну оцінку плідників проводили за основними рибиницько-іхтіологічними параметрами: масою, довжиною тіла за Смітом, довжиною тіла без хвостового плавця, довжиною тулуба, довжиною голови, найбільшою та найменшою висотою тіла, найбільшим та найменшим обхватом тіла [11, 12]. Проміри у риб проводили сантиметровою стрічкою з точністю до 1 мм. Індивідуальне зважування здійснювали на електронних товарних вагах з точністю 1 г. Для дослідження використовували живу рибу. За результатами вимірювань проводили аналіз та визначали продуктивні характеристики плідників.

З метою дослідження репродуктивних показників було відібрано проби незапліднених ікринок, які були опрацьовані в лабораторних умовах. Ікринки фіксували 4%-вим розчином формаліну. Загальну масу одержаної ікри вимірювали ваговим способом. Зважування ікринок проводили на електронних вагах «Axis AD 500» третього класу точності. Діаметр ікринок визначали за допомогою штангенциркуля з точністю 0,1 мм.

Осіменіння ікри здійснювали «напівсухим» способом. Знеклеювання заплідненої ікри виконували методом промивання чистою водою, ікринки для набрякання залишали на 2 год. [9, 10].

Інкубацію ікринок проводили в апаратах вертикального типу (ІВТМ). Завантаженість одного інкубаційного лотка складала 1,5–3,5 тис. ікринок.

Підрощування личинок тривало впродовж 45 діб в пластикових лотках за густоти посадки 10,0 тис. екз./м².

Статистичну обробку морфометричних показників проводили за допомогою програми в «Microsoft Office Excel» (2003). Обробку даних щодо параметрів ікри проводили із застосуванням комп'ютерної програми ROSP. Аналіз величин пластичних ознак виконано в системі абсолютних значень. Критеріями аналізу показників були їх середня величина та середнє відхилення ($M \pm m$), похибка (σ), показник мінливості (C_v) [13].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Господарство «Слобода-Банилів» розташоване у Вижницькому районі, Чернівецької області. Джерелом водопостачання рибиницьких басейнів є ґрунтові води басейну річки Черемош. Термічний режим в господарстві нестабільний: влітку вода в ставах прогрівається до 16–19°C, взимку знижується до 2°C. Оскільки живлення джерела водопостачання відбувається в основному за рахунок атмосферних опадів та танення снігу, для нього характерні сезонні коливання потужності, у зв'язку з чим водообмін в господарстві не стабільний та в літні місяці буває на межі критичного для райдужної форелі.

В 2016 р. початок нерестової компанії припав на середину листопада, що є на 10 діб раніше ніж попереднього року. В нерестовому процесі було використано 48 самиць та 48 самців. З них трирічки — 18 екз., чотирирічки — 25 екз. При цьому самиці, які дозріли у віці 2-х років, становили 10,4%. Середній показник індивідуальної маси дворічних самиць складав 720 г з межами коливань від 550 до 950 г, довжина тіла за Смітом — відповідно від 34,0 до 42,0 см (табл. 1). Загалом, самиці характеризувалися задовільними показниками екстер'єрних показників та коефіцієнта вгодованості, що коливався в межах 1,1–1,9 од.

Таблиця 1. Продуктивна характеристика дворічних самиць райдужної форелі (n = 5)

Table 1. Productive characteristics of two-year-old rainbow trout females (n = 5)

Показники / Indicators	M ± m	Cv, %
Маса тіла, г / Body weight, g	720,0±157,96	21,94
Довжина тіла за Смітом, см / Body length per Smith, cm	37,50±3,46	9,24
Довжина тіла без хвостового плавця, см / Body length without caudal fin, cm	34,74±3,58	10,32
Довжина голови, см / Head length, cm	7,64±0,79	10,33
Довжина тулубу, см / Body length, cm	25,20±2,80	11,1
Обхват тіла великий, см / Large circumference of the body, cm	21,30±1,57	7,35
Обхват тіла малий, см / Small circumference of the body, cm	9,40±0,65	6,94
Висота тіла велика, см / Body height large, cm	9,74±0,49	5,01
Висота тіла мала, см / Body height small, cm	4,16±0,21	4,98

Найбільше значення коефіцієнта варіації було зафіксовано за показником маси тіла, решта мали середні значення та становили від 4,98 до 11,10 %.

Аналіз репродуктивних ознак вперше нерестуючих самиць, вирощених в господарстві з нестабільними умовами, засвідчив наявність високих показників. Так, середній показник індивідуальної робочої плодючості складав 2266,0 ікринок, відносної робочої плодючості — 3133,0 ікринки.

Рис. 1. Індивідуальні показники плодючості дворічних самиць райдужної форелі

Fig. 1. Individual fertility indicators of two-year-old rainbow trout females

Як і в більшості риб, в кожній з самиць ікринки на момент овуляції мають різні розміри. В нашому досліді середній показник маси становив 37,3 мг, з межами коливань від 34,4 до 38,7 мг; діаметра — 3,85 мм, з межами коливань від 3,74 до 3,92 мм. Коефіцієнт мінливості в середньому за масою складав 4,6 %, за діаметром — 1,8% (рис. 2).

Рис. 2. Індивідуальні показники маси овульованої ікри райдужної форелі
Fig. 2. Individual indicators of the mass of ovulated eggs of rainbow trout

Інкубаційний процес тривав 37 діб. Середні показники температури води становили 9°C з межами коливань від 8 до 10°C.

Відсоток запліднення був близьким в кожній з дослідних самиць, та перебував в межах від 84,9–92,7 %, з середнім показником 90,5 %. Показник рівня виживання за період інкубації становив 60,2%. Максимальне його значення зафіксовано у самиці № 5 — 68,9%. Найнижчий показник зафіксовано у самиці № 4 — 48,3% (рис. 3).

Рис. 3. Діаграма запліднення та виживання ікри райдужної форелі за період інкубації
Fig. 3. Diagram of fertilization and survival of rainbow trout eggs during the incubation period

Таким чином, виживання ембріонів не залежало від індивідуальної маси самиці та кількості продукрованої ікри. Наприклад, у самиці № 4, що за

індивідуальною масою та масою продукуючої ікри мала найбільші значення, виживання вільних ембріонів становило 48,3%, що було нижчим на 19,8%, ніж середнє значення

Підрощування личинок тривало впродовж 45 діб в пластикових лотках об'ємом 0,03м³ (50×18×30 см), що були використані під час інкубації. Зростання маси та збільшення лінійного розміру упродовж періоду підрощування відбувалось поступово та рівномірно. Середній показник маси тіла личинок у віці 45 діб становив 974,5 мг. Найбільший показник зафіксовано у личинок, отриманих від ікри, що була відібрана від самиці № 2 — 1062,1 мг, найменший — 837,6 мг — від самиці № 4 (рис. 4). Приріст маси становив від 717,5 до 923,0 мг, що, відповідно, у відсотковому виразі становить 85,7–86,9%.

Рис. 4. Динаміка зростання маси у личинок райдужної форелі за період підрощування

Fig. 4. Dynamics of mass gain in rainbow trout larvae during growing season

Середнє значення показника виживання мальків становило 47,7%, з межами коливань від 42,1 до 52,3%. Максимальне значення даного показника зафіксовано у самиці № 5, найнижче — у самиці № 4 (рис. 5).

Рис. 5. Показники виживання вільних ембріонів райдужної форелі за період підрощування

Fig. 5. Indicators of free rainbow trout embryos survival during the growing period

Таким чином, згідно результатів аналізу вищевказаних досліджуваних показників продуктивних та репродуктивних ознак, можемо стверджувати, що вперше нерестуючі самиці характеризувалися високими значеннями продуктивних показників, однак рівень виживання вільних ембріонів та личинок в період підрощування був нижчим ніж нормативний [9, 10].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Аналіз отриманих даних за середніми розмірами та показниками мінливості ікри дозволяє зробити висновок, що більшість самиць в дворічному віці не можуть вважатися повноцінними плідниками, оскільки основна маса їхніх ікринок є фізіологічно незрілими, непридатними до нормального ембріогенезу, а, можливо, й запліднення, і відповідно, у них спостерігається високий показник смертності як ікри так і личинок, що в нашому досліді відповідно становив 32,0 та 53,4%. Однак серед дворічних риб виявлені особини, ікра яких може бути використана з рибогосподарською метою. Саме ці самиці повинні складати основу для створення племінного маточного стада.

ЛІТЕРАТУРА

1. Brown M. E. The growth of brown trout (*Salmo trutta* Linne). 1. Factors influencing the growth of trout fry // J. Exp. Biol. 1946. Vol. 22. № 3–4. P. 473—491.
2. Савостьянова Г. Г., Слущкий Е. С. О размерности икринок радужной форели // Изв. ГосНИОРХ. 1974. Т. 97. С. 159—168.
3. Савостьянова Г. Г., Никандров В. Я. Зависимость некоторых биометрических показателей икры от возраста самок радужной форели // Изв. ГосНИОРХ. 1976. Вып. 113. С. 3—7.
4. Новоженін Н. П. К вопросу о жизнестойкости потомства от впервые нерестующих производителей. // Прудовое рыбоводство. 1970. №4. С. 69—90.
5. Галкина З. И. Влияние размеров и возраста самок лососевых рыб на потомство : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Москва, 1968. 19 с.
6. Були Л. И., Осипченко Е. В. Особенности роста молоди стальноголового лосося в южных районах Украины // Рибогосподарська наука України. 2012. № 1. С. 72—77.
7. Каталог кормів «Біомар». [Б. м.], 2013. 8 с.
8. Инструкция по физиолого-биохимическим анализам рыбы / Лиманский В. В., и др. Москва : ВНИИПРХ, 1984. 60 с.
9. Технологическая инструкция по производству радужной форели в различных типах хозяйств Украины / Галасун П. Т. и др. Львов, 1987. 17 с.
10. Титарев Е. Ф. Форелеводство. Москва : Пищевая промышленность, 1980. 167 с.
11. Рекомендації з розведення та вирощування високопродуктивних племінних стад райдужної форелі / Мрук А. І. та ін. Київ : Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України, 2010. 24 с.
12. Комплексна технологія відтворення лососевих риб в рибницьких господарствах України / Мрук А. І. та ін. Київ : Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України, 2015. 27 с.
13. Плохинский Н. А. Биометрия. Москва : Московский университет, 1981. 367 с.

REFERENCES

1. Brown, M. E. (1946). The growth of brown trout (*Salmo trutta* Linne). 1. Factors influencing the growth of trout fry. *J. Exp. Biol.*, 22(3-4), 473-491.
2. Savost'yanova, G. G., & Slutskiy, E. S. (1974). O razmernosti ikrinok raduzhnoy foreli. *Izv. GosNIORKh*, 97, 159-168.
3. Savost'yanova, G. G., & Nikandrov, V. Ya. (1976). Zavisimost' nekotorykh biometricheskikh pokazateley ikry ot vozrasta samok raduzhnoy foreli. *Izv. GosNIORKh*, 113, 3-7.
4. Novozhenin, N. P. (1970). K voprosu o zhiznennosti potomstva ot vpervye nerestuyushchikh proizvoditeley. *Prudovoe rybovodstvo*, 4, 69-90.
5. Galkina, Z. I. (1968). Vliyanie razmerov i vozrasta samok lososevykh ryb na potomstvo. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moskva.
6. Buli, L. I., & Osipchenko, E. V. (2012). Osobennosti rosta molodi stal'nogolovogo lososya v yuzhnykh rayonakh Ukrainy. *Rybogospodars'ka nauka Ukrainy*, 1, 72-77.
7. *Kataloh kormiv «Biomar»*. (2013).
8. Limanskiy, V. V., Yarzombek, A. A., Bekina, E. N., & Andronikov, S. B. (1984). *Instruktsiya po fiziologo-biokhimicheskim analizam ryby*. Moskva: VNIIPRKH.
9. Galasun, P. T., Bulatovih, M. A., & Borbat, M. O. (1987). *Tekhnologicheskaya instruktsiya po proizvodstvu rayduzhnoy foreli v razlichnykh tipakh khozyaystv Ukrainy*. L'vov.
10. Titarev, E. F. (1980). *Forelevodstvo*. Moskva: Pishchevaya promyshlennost'.
11. Mruk, A. I., Oleksik, V. I., & Zakharenko, H. A. (2010). Rekomendatsii z rozvedennia ta vyroshchuvannia vysokoproduktyvnykh plemennykh stad raiduzhnoi foreli. Kyiv: Instytut rybnogo hospodarstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy.
12. Mruk, A. I., Kuheruc, A. I., Kurinenko, H. A., Terterjan, L. A., & Galoian, L. L. (2015). *Kompleksna tekhnolohiia vidtvorennia lososevykh ryb v rybnytskykh hospodarstvakh Ukrainy*. Kyiv : Instytut rybnogo hospodarstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy.
13. Plokhinskiy, N. A. (1981). *Biometriya*. Moskva: Moskovskiy universitet.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЕРВЫЕ НЕРЕСТЯЩИХСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ *ONCORHYNCHUS MYKISS* (WALBAUM), ВЫРАЩЕННОЙ В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «СЛОБОДА-БАНИЛОВ»

П. Д. Мендришора, p.mendryshora@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

А. А. Куриненко, annazakharenko@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Проанализировать результаты выращивания и дать рыбоводно-биологическую характеристику впервые нерестящихся производителей радужной форели, за потомством, выращенных по индустриальной технологии в условиях форельного хозяйства «Слобода-Банилов», по потомству.

Методика. Выращивание проводили в бассейновых условиях форелевого хозяйства «Слобода-Банилов». Материалом для исследований служили двухгодовики радужной форели, полученные от икры осеннее нерестящейся формы радужной форели. Выращивание проводили в бассейне площадью 216 м² при плотности посадки 37 экз/м², по общепринятым технологиям в форелеводстве. Оценку маточного стада проводили по показателям

продуктивных и репродуктивных признаков. Подращивание личинок осуществляли на протяжении 45 суток в пластиковых лотках при плотности посадки 10 тыс. экз./м². Статистическую обработку материала проводили в «Microsoft Office Excel» (2003). Анализ величин выполнен в системе абсолютных значений. Критериями анализа показателей были их средняя величина и погрешность ($M \pm m$), отклонение (σ), показатель изменчивости (Cv). Кормление рыб проводили искусственным кормом фирмы «Віомар».

Результаты. Согласно проведенным работам по формированию маточных стад радужной форели, обнаружено, что производители, выращенные в условиях индустриального хозяйства «Слобода-Банилов», невзирая на нестабильные условия выращивания характеризовались умеренным темпом роста и имели высокие значения продуктивных и репродуктивных признаков. Средний показатель массы тела самок в возрасте 2-х лет составлял 720,0 г, плодовитости — 2,3 тыс. икринок. Средний показатель массы продуцируемой икры — 101,3 г. Процент оплодотворения был почти одинаковым у каждой из опытных самок, находясь в пределах 84,9–92,7%, Средний показатель массы личинок в возрасте 45 суток составлял 974,5 мг. Выживаемость мальков в среднем составляла 47,7%, с пределами колебаний от 42,1 до 52,3%.

Научная новизна. Впервые в Украине проведено исследование по формированию маточных стад радужной форели в бассейновом хозяйстве с нестабильными условиями выращивания с применением анализа репродуктивных и продуктивных признаков.

Исследованный нами параметр, а именно — размер икринок, может быть использован в качестве показателя рыбохозяйственной ценности самок как в целом, так и с целью создания селекционных стад, поскольку является показателем скорости созревания, то есть, главным признаком для раннесозревающей формы.

Практическая значимость. Результаты проведенной работы дадут возможность провести отбор и сформировать полноценное маточное стадо в хозяйствах с нестабильными условиями выращивания, которое будет характеризоваться высокими показателями продуктивных и репродуктивных признаков впервые нерестящихся особей двухгодичного возраста.

Ключевые слова: радужная форель, масса тела, длина тела, икра, личинки, продуктивные, репродуктивные показатели.

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ЗІ ШТУЧНОГО ОТРИМАННЯ ОВУЛЬОВАНОЇ ІКРИ ВІД ПЛІДНИКІВ СТЕРЛЯДІ *ACIPENSER RUTHENUS* (LINNAEUS) У НЕТРАДИЦІЙНІ СТРОКИ

М. М. Пашко, marina-fish@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Третяк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Колос, kolos-en@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити особливості штучного отримання овульованої ікри від плідників стерляді у нетрадиційні строки та визначити основні рибницькі показники в експериментальних групах риб.

Методика. Об'єктом досліджень були самки стерляді різного віку масою тіла 1,4–3,3 кг, виведені в умовах господарства індустріального типу у водоймі з природним температурним режимом лісостепової зони України. Експерименти виконували за регульованого режиму температури води в період з січня до березня з використанням натуральних гонадотропних препаратів для стимулювання дозрівання статевих продуктів риб. У процесі підготовки плідників до проведення рибницьких робіт застосовували установки рециркуляційного водопостачання. Визначення рибницьких показників та дослідження фізико-хімічних чинників середовища здійснювали за загальноприйнятими методиками.

Результати. За температури води 14,0–16,5°C зареєстровано високу ефективність дозрівання гонад в усіх експериментальних групах риб. Середня маса статевих продуктів, отриманих від плідників у різних варіантах дослідів, становила 130–384 г. Середні показники робочої плодючості та відносної робочої плодючості самок стерляді змінювались відповідно в межах 13,42–36,83 тис. та 8,80–13,40 тис. ікринок/кг маси риб. Загальна тривалість дозрівання риб від початку гормонального стимулювання до моменту виникнення процесу овуляції яйцеклітин змінювалась в середньому від 407,6 до 587,4 градусо-годин.

Наукова новизна. Досліджено особливості отримання зрілих статевих продуктів від самок стерляді із застосуванням нових для аквакультури України методів заводського відтворення осетрових риб.

Практична значимість. Результати досліджень являють інтерес для розвитку сучасних методів аквакультури осетрових риб в умовах господарств індустріального типу.

Ключові слова: плідники стерляді, індустріальне рибництво, нетрадиційні технології, ікра, овуляція, рибницькі показники.

RESULTS OF THE EXPERIMENTS ON ARTIFICIAL PRODUCTION OF OVULATED EGGS FROM BROOD STERLET *ACIPENSER RUTHENUS* (LINNAEUS) AT NON-TRADITIONAL TERMS

M. Pashko, marina-fish@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
O. Tretiak, info@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
O. Kolos, kolos-en@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To study the peculiarities of the artificial production of ovulated eggs from brood sterlet at non-traditional terms and to determine major productive parameters in experimental fish groups.

© М. М. Пашко, О. М. Третяк, О. М. Колос, 2018

Methodology. The object of the study were sterlet females of different ages with body weights 1.4–3.3 kg reared in the conditions of a farm of industrial type in a water body with natural temperature regime for the forest-steppe zone of Ukraine. The experiment was performed under regulated water temperature regime during the period from January to March with the use of natural gonadotropic preparations for the stimulation of fish gonad maturity. A recirculating aquaculture system was used during the preparation of brood fish for the study. Determination of productive parameters and study of physical-chemical factors of the environment were performed according to generally accepted methods.

Findings. High efficiency of gonad maturation was observed in all experimental fish under water temperature of 14.0–16.5°C. Mean weights of sexual products obtained from brood fish in different experimental variants were 130–384 g. Mean working fecundities and relative working fecundities of sterlet females varied within 13.42–36.83 thousand eggs and 8.80–13.40 thousand eggs/kg of fish weight. General duration of fish maturation from the beginning of hormonal stimulation until the moment of the beginning of egg ovulation changed on average from 407.6 to 587.4 degree-hours.

Originality. The peculiarities of the production of mature eggs from sterlet females with the use of industrial reproduction of sturgeons, which is new for Ukrainian aquaculture, have been studied.

Practical value. The study results can be useful for the development of advanced methods of sturgeon aquaculture in the conditions of industrial fish farms.

Key words: brood sterlet, industrial aquaculture, non-traditional technologies, eggs, ovulation, productive parameters.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом виникли значні перешкоди для виконання робіт з відновлення природних запасів осетрових риб, більшість з яких перебуває під загрозою зникнення. Тому реальною можливістю забезпечити виробництво власної осетрової продукції в Україні є розвиток аквакультури цих риб [1–3].

Серед аборигенних представників родини *Acipenseridae* для розвитку вітчизняного осетрового господарства особливий інтерес викликає стерлядь [3–4]. Цей прісноводний вид осетрових є досить поширеним за різноманітних технологій осетрівництва та користується постійною увагою дослідників [5–8]. Проте, одним з нових технологічних варіантів культивування стерляді, який поки що недостатньо висвітлювався у спеціальній літературі, є ікряно-товарний напрям аквакультури в умовах рибогосподарських підприємств індустріального типу [3, 4, 9]. Зазначені обставини обумовлюють актуальність та новизну проведених досліджень.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Значний обсяг експериментальних досліджень з племінними групами осетрових риб в Україні проведено на базі спеціалізованих осетрових репродукторів та у пристосованих умовах окремих рибовідтворювальних комплексів повносистемних господарств ставової аквакультури. Відбір зрілої ікри від плідників на цих підприємствах здійснювався переважно у традиційні для певного виду осетрових нерестові терміни. Водночас залишаються недостатньо дослідженими методи експлуатації осетрових маточних стад з керованим отриманням овульованої ікри у різні сезони року для потреб розвитку ікряно-товарного напрямку осетрової аквакультури. Насамперед це стосується невеликих

рибницьких господарств індустріального типу з утриманням ремонтно-маточних груп осетрових риб у плавучих садках, установлених у водоймах з природним температурним режимом. Зважаючи на це, метою досліджень було визначення основних рибницьких показників у експериментальних роботах з отримання овульованої ікри стерляді у нетрадиційні нерестові строки з використанням плідників, вирощених в умовах садків за природної температури води.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Збір експериментальних матеріалів проводили в період 2014–2015 рр. на базі рибогосподарського підприємства індустріального типу ТОВ-СРП «Осетр» (Київської обл.).

Отримання овульованої ікри стерляді здійснювали у нетрадиційні для відтворення осетрових риб строки (січень–березень) із застосуванням внутрішньом'язових ін'єкцій плідників суспензією препарату порошкоподібних зневоднених гіпофізів осетрових риб. Випробовували різні дози гонадотропного препарату за дворазових ін'єкцій. Проводили прижиттєвий відбір зрілих статевих продуктів від самок стерляді методом зціджування ікри після підрізання яйцепроводів риб [10]. У рибницьких роботах використано плідників стерляді 7–8-річного віку, вирощених у плавучих садках за природного температурного режиму водойм лісостепової зони України. Експериментальні роботи виконували в умовах рибницького репродуктора, обладнаного установкою замкнутого водопостачання (УЗВ).

Визначення рибницьких показників експериментальних груп стерляді та фізико-хімічних параметрів водного середовища проводили, користуючись загальноприйнятими в рибництві та гідрохімії методами [11, 12].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Гідрохімічні аналізи джерела водопостачання господарства «Осетр» показали, що вода є характерною для поверхневих природних вод регіону та за середнього рівня мінералізації із сумою іонів 330,3–366,1 мг/дм³ належить до гідрокарбонатного класу групи кальцію. Загальна твердість води перебувала в межах 3–4 мг-екв/дм³. Величини водневого показника (рН) води становили 7,8–8,0, що відповідає слаболужному середовищу. Концентрація амонійного азоту не перевищувала 0,82 мгN/дм³, відповідно, нітритного азоту — 0,22 мгN/дм³ та нітратного — 0,43 мгN/дм³. Мінеральний фосфор та загальне залізо виявлені у кількості відповідно 0,11–0,36 мгP/дм³ та 0,22–0,37 мгFe/дм³. Перманганатна окиснюваність води становила від 8,0 до 11,5 мгО/дм³, що вказує на відсутність забруднення легкокорозійними органічними речовинами. Загалом, за незначних відхилень від нормативних значень окремих показників, досліджувану воду за наведеним хімічним складом можна вважати придатною для культивування різних вікових груп стерляді.

У період виконання рибницьких експериментів вміст розчиненого у воді кисню змінювався у межах 6,9–9,4 мгО₂/дм³, що відповідає сприятливим величинам для життєдіяльності осетрових риб.

Вирощування та зимове утримання експериментальних груп стерляді здійснювали в умовах плавучих садків, установлених у штучно створеній водоймі

(каналі) з водопостачанням з Канівського водосховища на р. Дніпро. Впродовж періоду виконання рибницьких робіт (січень–березень) температура води в садках з маточним матеріалом риб коливалась від 0,7 до 5,5°C. Після переміщення самок стерляді у басейни інкубаційного цеху, обладнані засобами УЗВ, основним екологічним чинником у технології підготовки риб до процесу штучного отримання овульованої ікри є регульоване (тривале) підвищення температури води у рибницьких місткостях до рівня 13,5–14,0°C.

Загальна доза гіпофізарного препарату для самок стерляді за дворазових ін'єкцій у різних варіантах дослідів становила від 3,5 до 5,0 мг/кг маси риб. Попередні ін'єкції виконували за температури води 14,0°C із розрахунку до 30% від загальної дози гонадотропної речовини. Вирішальне інектування відбувалось за температури води 14,5–15,0°C з інтервалом між ін'єкціями 12 год. Температуру води в період дозрівання риб після другої ін'єкції здебільшого підвищували на 1,0–1,5°C. Тривалість дозрівання плідників після вирішальної ін'єкції до початку овуляції ооцитів, насамперед, в залежності від загальної дози гормональних ін'єкцій, характеризувалась значним діапазоном коливань у межах 12–28 годин. За вищенаведеного температурного режиму весь період дозрівання плідників від моменту проведення попередньої ін'єкції до початку процесу овуляції ооцитів в середньому становив: із загальною дозою гіпофізарних ін'єкцій 4 мг/кг — 587,4 градусо-годин, відповідно, із дозою 4,5 мг/кг — 509,0 градусо-годин та із дозою 5 мг/кг — 407,6 градусо-годин.

За весь період досліджень індивідуальна маса використаних у рибницьких роботах 56 екз. самок стерляді змінювалась у межах 1,40–3,30 кг. З екз. риб із середньою масою 1,53 кг, відібрані для дослідів на початку січня, не відреагували на загальну дозу гонадотропного препарату 3,5 мг/кг. В усіх інших групах плідників зареєстровано досить високу ефективність дозрівання гонад після гормонального стимулювання. Основні результати за середніми величинами рибницьких показників наведені в таблиці.

Аналіз величин репродуктивних показників самок стерляді показав, що групи риб із дослідів зимового періоду характеризувались схожим середнім рівнем відносної робочої плодючості — в межах 8,80–10,33 тис. ікринок/кг маси риб. Водночас зі збільшенням середньої маси плідників з 1,46–1,56 до 2,38–2,50 кг помітно зростали середні величини маси отриманих статевих продуктів (зі 130–145 до 239–268 г) та робочої плодючості (з 13,46–14,65 до 22,88–26,04 тис. ікринок). Найвищі репродуктивні показники із середніми величинами робочої плодючості та відносної робочої плодючості — відповідно 36,83 тис. ікринок та 13,40 тис. ікринок/кг маси риб — показали самки стерляді в експериментах ранньовесняного періоду 2015 р., тобто у варіантах дослідів, коли строки виконання рибницьких маніпуляцій з отримання зрілих статевих продуктів стерляді випереджали традиційний період штучного відтворення цього виду осетрових орієнтовно на один місяць. Проте, зазначені істотні переваги за виявленими показниками в останній групі риб певною мірою можна пояснити як вибірковістю добору плідників, так і більшою масою тіла та індивідуальними річними відмінностями підготовки організму риб до процесу відтворення.

Мінімальні індивідуальні показники робочої плодючості в межах 10,15–11,38 тис. ікринок відмічені у трьох найменших плідників середньою масою 1,45 кг. Відносна робоча плодючість у них становила 7,24–7,60 тис. ікринок/кг маси риб.

Таблиця. Результати отримання овульованої ікри від плідників стерляді у нетрадиційні строки

Table 1. Results of obtaining ovulated caviar from sterlet breeders in non-traditional terms

Період відбору ікри, декада — місяць (рік) / Selection period for caviar, decade-month (year)	Загальна доза гонадотропного препарату, мг/кг маси риби* / Total dose of gonadotropic drug, mg / kg of fish weight*	Показники (M±m) / Indicators (M ± m)				n/n
		Маса риби, кг / Weight of fish, kg	Маса отриманих статевих продуктів, г / Weight of the obtained sexual products, g	Робоча плодючість, тис. ікринок / Operative fecundity, thousand caviar	Відносна робоча плодючість, тис. ікринок / кг маси риби / Relative operative fecundity, thousand caviar / kg of fish weight	
перша декада — січень (2014) / first decade — January (2014)	4,0	1,56±0,04	145,00±19,00	14,65±1,69	9,32±0,88	4
	4,5	1,46±0,02	130,00±12,00	13,46±1,25	9,18±0,76	4
	5,0	1,53±0,03	130,00±17,00	13,67±1,47	8,80±0,84	4
друга декада — січень (2014) / second decade — January (2014)	4,0	2,09±0,11	189,00±26,00	18,83±2,50	8,98±1,03	4
	4,5	2,05±0,07	191,00±10,89	19,02±1,05	9,27±0,34	5
	5,0	2,28±0,10	215,00±15,17	20,79±1,29	9,10±0,50	5
перша декада — лютий (2014) / first decade — February (2014)	4,0	2,48±0,10	247,00±19,01	23,87±1,62	9,60±0,38	5
	4,5	2,50±0,13	267,50±31,66	26,04±2,88	10,33±0,62	4
	5,0	2,38±0,09	238,75±23,57	22,88±2,16	9,60±0,66	4
третя декада — березень (2015) / third decade — March (2015)	5,0	2,74±0,07	383,71±30,83	36,83±2,95	13,40±0,95	14

Примітка. * — у варіанті дослідів із загальною дозою гонадотропного препарату 3,5 мг/кг маси риби самки стерляді на гормональну стимуляцію не відреагували.

Note. * — in the variant of the experiments with a total dose of gonadotropic drugs 3.5 mg/kg weight of fish, sterlet females did not respond on hormonal stimulation.

Відносно невисокі показники плодючості одиничних особин стерляді більшої маси були насамперед пов'язані з недостатньою ефективністю дозрівання, що позначилось на кількості відібраних статевих продуктів. Максимальний показник робочої плодючості (50,10 тис. ікринок) зареєстровано у найбільшій самки масою 3,30 кг. Загалом 50% плідників, використаних у дослідях наприкінці березня, за середньої маси 2,89 кг мали індивідуальні величини робочої плодючості в межах 42,33–50,10 тис. ікринок за середнього показника відносної робочої плодючості 15,44 тис. ікринок/кг маси риби.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Оцінка репродуктивних показників самок стерляді у дослідах зі штучного отримання зрілих статевих продуктів у нетрадиційні строки загалом указує на достатню ефективність проведених рибницьких робіт. Впродовж зимово-весняного періоду в результаті спрямованого впливу комплексу еколого-фізіологічних чинників, насамперед, регульованого температурного режиму в умовах УЗВ, у різних експериментальних групах плідників із середньою масою 1,46–2,74 кг показники робочої плодючості в середньому становили 13,42–36,83 тис. ікринок за середніх величин відносної робочої плодючості 8,80–13,40 тис. ікринок/кг маси риб.

Отримані результати підтвердили перспективність випробованих нових малопоширених для аквакультури України технологічних рішень в інтенсивному осетрівництві.

Застосовані у дослідах методи виконання рибницьких робіт з плідниками стерляді являють інтерес для подальшого розвитку ікр'яно-товарного напрямку осетрівництва.

Серед перспективних завдань наукового забезпечення за цією проблемою на окрему увагу заслуговують питання оцінки показників життєздатності осетрової молоді, відтвореної в заводських умовах у нетрадиційні нерестові строки, та дослідження біологічних особливостей цих риб на наступних етапах онтогенезу.

Вирощування життєстійкої осетрової молоді зі зміщенням строків її заводського відтворення сприятиме розвитку рибогосподарської діяльності за індустріальних технологій осетрівництва з цілорічним виробництвом широкого асортименту делікатесної продукції. Водночас, виникатимуть додаткові можливості для відновлення чисельності популяцій осетрових риб у природних водоймах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Шерман І. М., Шевченко В. Ю. Сучасні проблеми і перспективи осетрівництва в Україні // Рибне господарство. 2004. Вип. 64. С. 102—106.
2. Шерман І. М., Корнієнко В. О., Шевченко В. Ю. Актуальність та передумови domestикації представників родини осетрових в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2006. Вип. 44. С. 145—154.
3. Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні / Третяк О. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2010. № 4. С. 4—22.
4. Грициняк І. І., Третяк А. М., Пашко М. М. Современные аспекты ведения осетрового хозяйства в Украине // Аквакультура осетровых: современные тенденции и перспективы : Міжнар. наук-практ. конф. : матер. допов. Херсон : Гринь Д.С., 2016. С. 36—42.
5. Шерман І. М., Ігнатів О. В. Вирощування цьогорітків стерляді в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2007. Вип. 50. С. 129—133.
6. Кончиц В. В., Мамедов Р. А. Состояние и перспективы восстановления численности стерляди в водоемах Беларуси // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. Київ : ДІА, 2011. С. 48—58.
7. Разработка эффективных методов производства посадочного материала стерляди для восстановления утраченных популяций / Кольман Р. та ін. //

- Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. Київ : ДІА, 2011. С. 67—69.
8. Кононенко І. С., Бех В. В. Кріоконсервування статевих продуктів-ефективний метод збереження біорізноманіття осетрових видів риб // Рибогосподарська наука України. 2016. № 2. С. 5—21.
 9. Пашко М. М., Третяк А. М., Колос Е. Н. К вопросу управления половым созревaniem стерляди в процессе воспроизводства в индустриальных условиях // Аквакультура осетровых: современные тенденции и перспективы : Міжнар. наук-практ. конф. : матер. допов. Херсон : Гринь Д.С., 2016. С. 134—136.
 10. Подушка С. Б. Прижизненное получение икры у осетровых рыб // Биологические ресурсы и проблемы развития аквакультуры на водоеме Урала и Западной Сибири: Всерос. конф., Тюмень, 17-18 сент. 1996 г. : тез. докл. Тюмень, 1996. С. 17—18.
 11. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеиздат, 1973. 270 с.
 12. СОУ – 05.01.37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України. 2006. 7 с.

REFERENCES

1. Sherman, I. M., & Shevchenko, V. Ju. (2004). Suchasni problemy i perspektyvy osetrivnyctva v Ukraini. *Rybne gospodarstvo*, 64, 102-106.
2. Sherman, I. M., Kornijenko, V. O., & Shevchenko, V. Ju. (2006). Aktual'nist' ta peredumovy domestykacii' predstavnykiv rodyny osetrovyyh v umovah pivdnja Ukrainy. *Tavrijs'kyj naukovyj visnyk*, 44, 145-154.
3. Tretjak, O. M. et al. (2010). Stan zapasiv osetrovyyh ryb ta rozvytok osetrovoi' akvakul'tury v Ukraini. *Rybogospodars'ka nauka Ukrainy*, 4, 4-22.
4. Gritsinyak, I. I., Tretyak, A. M., & Pashko, M. M. (2016). Sovremennye aspekty vedeniya osetrovogo khozyaystva v Ukraine. *Akvakul'tura osetrovyykh: sovremennye tendentsii i perspektivy: Mizhnar. nauk-prakt. konf.: mater. dopov.* Kherson: Grin' D.S., 36-42.
5. Sherman, I. M., & Ignatov, O. V. (2007). Vyroshhuvannya c'ogolitkiv sterljadi v umovah pivdnja Ukrainy. *Tavrijs'kyj naukovyj visnyk*, 50, 129-133.
6. Konchits, V. V., & Mamedov, R. A. (2011). Sostoyanie i perspektivy vosstanovleniya chislennosti sterlyadi v vodoemakh Belarusi. *Zberezhennya genofondu ta vidnovlennya populyatsiy tsinnikh vidiv rib: Mizhnar. nauk. konf.: mater.* Kyiv: DIA, 48-58.
7. Kol'man, R. et al. (2011). Razrabotka effektivnykh metodov proizvodstva posadochnogo materiala sterlyadi dlya vosstanovleniya utrachennykh populyatsiy. *Zberezhennya genofondu ta vidnovlennya populyatsiy tsinnikh vidiv rib: Mizhnar. nauk. konf.: mater.* Kyiv: DIA, 67-69.
8. Kononenko, I. S., & Bekh, V. V. (2016). Kriokonservuvannya statevyh produktiv-efektyvnyj metod zberezhennja bioriznomanittja osetrovyh vydiv ryb. *Rybogospodars'ka nauka Ukrainy*, 2, 5-21.
9. Pashko, M. M., Tretyak, A. M., & Kolos, E. N. (2016). K voprosu upravleniya polovym sozrevaniem sterlyadi v protsesse vosproizvodstva v industrial'nykh

- usloviyakh. *Akvakul'tura osetrovykh: sovremennye tendentsii i perspektivy: Mizhnar. nauk-prakt. konf.: mater. dopov.* Kherson: Grin' D.S., 134-136.
10. Podushka, S. B. (1996). Prizhiznennoe poluchenie ikry u osetrovykh ryb. *Biologicheskie resursy i problemy razvitiya akvakul'tury na vodoeme Urala i Zapadnoy Sibiri: Vseros. konf., Tyumen', 17-18 sent. 1996 g.: tez. dokl.* Tyumen', 17-18.
11. Alekin, O. A., Semenov, A. D., & Skopintsev, B. A. (1973). *Rukovodstvo po khimicheskomu analizu vod sushi.* Leningrad: Gidrometeoizdat, 1973.
12. Voda rybogospodars'kyh pidpriemstv. Zagal'ni vymogy ta normy. (2006). *SOU – 05.01.37-385:2006.* Kyiv: Ministerstvo agrarnoi' polityky Ukrainy.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ИСКУССТВЕННОМУ ПОЛУЧЕНИЮ ОВУЛИРОВАННОЙ ИКРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТЕРЛЯДИ *ACIPENSER RUTHENUS* (LINNAEUS) В НЕТРАДИЦИОННЫЕ СРОКИ

М. М. Пашко, marina-fish@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

А. М. Третяк, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Е. Н. Колос, kolos-en@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Исследовать особенности искусственного получения овулированной икры от производителей стерляди в нетрадиционные сроки и определить основные рыбоводные показатели в экспериментальных группах рыб.

Методика. Объектом исследований были самки стерляди разного возраста массой 1,4–3,3 кг, выращенные в условиях хозяйства индустриального типа в водоеме с естественным температурным режимом лесостепной зоны Украины. Эксперименты выполняли при регулируемом режиме температуры воды в период с января по март с использованием натуральных гонадотропных препаратов для стимуляции созревания половых продуктов рыб. В процессе подготовки производителей к проведению рыбоводных работ применяли установки рециркуляционного водоснабжения. Определение рыбоводных показателей и исследование физико-химических факторов среды осуществляли по общепринятым методикам.

Результаты. При температуре воды 14,0–16,5°C зарегистрирована высокая эффективность созревания гонад во всех экспериментальных группах рыб. Средняя масса половых продуктов, полученных от производителей в разных вариантах опытов, составляла 130–384 г. Средние показатели рабочей плодовитости и относительной рабочей плодовитости самок стерляди изменялись соответственно в пределах 13,42–36,83 тыс. и 8,80–13,40 тыс. икринок/кг массы рыб. Общая продолжительность созревания рыб от начала гормональной стимуляции до момента возникновения процесса овуляции яйцеклеток изменялась в среднем от 407,6 до 587,4 градусо-часов.

Научная новизна. Исследованы особенности получения зрелых половых продуктов от самок стерляди с применением новых для аквакультуры Украины методов заводского воспроизводства осетровых рыб.

Практическая значимость. Результаты исследований представляют интерес для развития современных методов аквакультуры осетровых рыб в условиях хозяйств индустриального типа.

Ключевые слова: производители стерляди, индустриальное рыбоводство, нетрадиционные технологии, икра, овуляция, рыбоводные показатели.

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 89-102
DOI: 10.15407/fsu2018.02.089
УДК 639.371.2 (477.7)

Received 23.02.18
Received in revised form 06.04.18
Accepted 12.04.18

ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕГОЛЕТКОВ СТЕРЛЯДИ *ACIPENSER RUTHENUS* (LINNAEUS) И ВЕСЛОНОСА *POLYODON SPATHULA* (WALBAUM) В УСЛОВИЯХ ЮГА УКРАИНЫ

А. В. Билык, bilyk_anna@ukr.net, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины, Национальный природный парк «Нижнеднепровский», г. Херсон

Н. А. Грудко, nagrudko@gmail.com, ГВУЗ «Херсонский государственный аграрный университет», г. Херсон

И. М. Шерман, sherman_i.m@ukr.net, ГВУЗ «Херсонский государственный аграрный университет», г. Херсон

Цель. Определить влияние отдельных элементов биотехники на эффективность выращивания рыбопосадочного материала стерляди и веслоноса для оптимизации технологии их выращивания и рационального использования в аквакультуре юга Украины.

Методика. Выращивание сеголетков стерляди и веслоноса проводилось в экспериментальных прудах площадью 2 и 3 га. С целью формирования кормовой базы вносились органические удобрения из расчета 5 т/га. Выращивание сеголетков стерляди проводилось при плотностях посадки 65,0–95,0 тыс. экз./га; в контрольном варианте плотность посадки составляла 100,0 тыс. экз./га. Выращивание сеголетков веслоноса проводилось при плотности посадки 0,5–1,5 тыс. экз./га. Средняя индивидуальная масса мальков стерляди при зарыблении экспериментальных прудов по вариантам составляла 69–85 мг., мальков веслоноса — 600–700 мг.

Результаты. Проанализированы результаты выращивания и представлена рыбоводно-биологическая характеристика сеголетков стерляди (*Acipenser ruthenus* L.) и веслоноса (*Polyodon spathula* Walbaum), выращенных по комбинированной технологии на базе экспериментальных прудов Днепровского осетрового рыбоводного завода (Херсонская обл.). Изучен количественный и качественный состав кормовой базы прудов (фитопланктон, зоопланктон, зообентос), особенности роста и питания сеголетков стерляди и веслоноса. Установлено, что при плотности посадки 79,0 тыс. экз./га и достаточном уровне развития кормовой базы можно получить сеголетков стерляди средней массой в пределах 3,60–4,40 г при выходе 70,32–82,78% и средней рыбопродуктивности 238,09 кг/га. Зарыбление прудов мальками веслоноса массой 600–700 мг, при плотности на уровне 0,5–1,5 тыс. экз./га дало возможность получить сеголетков массой 278,0–409,8 г при выходе на уровне 25,4–31,2%.

Научная новизна. В результате исследований получило дальнейшее развитие представление о влиянии плотностей посадки на разноплановые результаты выращивания рыбопосадочного материала стерляди и веслоноса. Установлена и обоснована взаимосвязь между плотностью посадки и рыбопродуктивностью, выходом и массой сеголетков стерляди и веслоноса. Получена новая информация о влиянии отдельных элементов биотехники выращивания на биохимические показатели сеголетков стерляди и веслоноса.

Практическая значимость. Полученные данные расширяют и дополняют существующие представления о влиянии технологических факторов на эффективность выращивания жизнестойкого рыбопосадочного материала стерляди и веслоноса в условиях юга Украины и способствуют решению практических задач современной аквакультуры.

© А. В. Билык, Н. А. Грудко, И. М. Шерман, 2018

Ключевые слова: стерлядь, веслонос, прудовое выращивание, сеголетки, кормовая база, плотность посадки, выживаемость, средняя масса, рыбопродуктивность.

EFFECT OF STOCKING DENSITY ON THE EFFICIENCY OF REARING OF STERLET *ACIPENSER RUTHENUS* (LINNAEUS) AND PADDLEFISH *POLYODON SPATHULA* (WALBAUM) IN THE CONDITIONS OF SOUTHERN UKRAINE

A. Bilyk, bilyk_anna@ukr.net, Kherson Hydrobiology Station NASU, National park «Nyzhniodniprovsky», Kherson

N. Grudko, nagrudko@gmail.com, Kherson State Agrarian University, Kherson

I. Sherman, sherman_i.m@ukr.net, Kherson State Agrarian University, Kherson

Purpose. To determine the effects of specific elements of biotechnologies used for rearing sterlet and paddlefish seeds for the optimization of rearing technology and their rational use in pond fish facilities of Southern Ukraine.

Methodology. Rearing of young-of-the-year sterlet and paddlefish was conducted in experimental ponds (2 ha and 3 ha). In order to develop appropriate natural food supply, we added mineral and organic fertilizers (5 tons/ha). Rearing of YOY sterlet was conducted with different stocking densities (65000 and 95000 fish/ha), the control variant had 100000 fish/ha. Rearing of YOY paddlefish was conducted with a stocking density of 500 and 1500 fish/ha. Mean individual body weight while stocking experimental ponds was 69–75 mg (sterlet) and 600–700 mg (paddlefish).

Findings. Results of rearing were analyzed and fishery performance of sterlet (*Acipenser ruthenus* L.) and paddlefish (*Polyodon spathula* (Walbaum)) reared according to the combined technology were analyzed. We examined pond food supply composition (phytoplankton, zooplankton, zoobenthos), growth and nutrition of YOY sterlet and paddlefish. It was found that a stocking density of 79000 fish/ha and abundant food supply for YOY sterlet can result in mean individual body weight of 3.60–4.40 g, survival rate — 70.32–82.78%, fish productivity — 238.09 kg/ha. Stocking ponds with paddlefish with individual body weight of 600–700 mg and stocking density of 500-1500 fish/ha resulted in obtaining young-of-the-year with mean individual body weight of 278.0-409.8 g, survival rate — 25.4–31.2%.

Scientific novelty. Our experiment allowed better understanding of the correlation between stocking density and results of the rearing of sterlet and paddlefish seeds. We found a clear correlation between mean individual body weight, stocking density and duration of rearing for YOY sterlet. We found an effect for some biotechnological aspects on biochemical indicators of YOY sterlet.

Practical value. The obtained data enriches and refines existing representation of the correlation between technological factors and efficiency of rearing viable sterlet and paddlefish seeds in the conditions of southern Ukraine and contributes to finding optimal parameters of rearing in terms of modern aquaculture.

Keywords: sterlet, paddlefish, pond rearing, fingerlings, food base, stocking density, survival rate, mean body weight, fish productivity.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Современные представления о рациональном использовании гидробиоресурсов не только ориентированы на ресурсосбережение, но и поднимают вопросы, связанные с биоразнообразием акватории, что гарантирует соответствующее качество. Наиболее ценными в промысловом и хозяйственном отношении видами являются осетрообразные, в том числе стерлядь и веслонос [1, 2].

При использовании комбинированной технологии производства рыбопосадочного материала осетровых выращивание в прудах — заключительный этап в процессе получения сеголетков, что в значительной мере определяет общий результат. Вместе с этим, именно эффективность выращивания зависит от многих факторов, которые разнопланово влияют на качество рыбопосадочного материала, определяя его пригодность по целевому назначению. На этом этапе технологического процесса формируются пластические характеристики, определяющие взаимоотношения организма и среды. Исходя из вышеизложенного, необходимо определить факторы и степень их влияния на эффективность выращивания, что позволит регулировать значимые параметры рыбопосадочного материала.

Общеизвестно, что оптимальная плотность посадки при выращивании сеголетков стерляди составляет 80–100 тыс. экз./га, при которой выход составляет 65–75% [2–6]. С увеличением плотности посадки до 120 тыс. экз./га конечная масса полученного рыбопосадочного материала осетровых снижается практически в два раза, а выход составляет 38–45% [7]. При этом известно, что при высоких плотностях посадки и недостаточном развитии кормовой базы в прудах наблюдается значительный отход. Но при уменьшении плотности посадки до 50 тыс. экз./га, с увеличением объемов использования удобрений до 7 т/га, внесением маточной культуры дафнии в срок 35–40 дней можно получить посадочный материал массой 5–6 г при выходе 50% [8].

Выращивание сеголетков веслоноса можно проводить как в монокультуре, так и в поликультуре с другими видами рыб. При выращивании в монокультуре и поликультуре с растительноядными рыбами плотность посадки мальков веслоноса в выростных прудах может варьировать в пределах от 2,0 до 29,5 тыс. экз./га [9]. В условиях выращивания веслоноса в монокультуре с плотностью посадки 10 тыс. экз./га в конце сезона средняя индивидуальная масса составляла 72 г, выживаемость при этом была на уровне 48% [10]. Также в литературных источниках представлена информация об успешном выращивании сеголетков веслоноса в относительно небольших выростных прудах площадью 1–2 га с глубинами 1,5–2,0 м. При этом авторы не рекомендуют использовать пруды с интенсивным зарастанием [11].

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕРЕШЕННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Технология выращивания осетровых отработана достаточно хорошо, однако процесс прудового содержания сеголетков требует дальнейшей адаптации в конкретных условиях ареала с учетом биологических особенностей вида. Относительно веслоноса сведения достаточно ограничены, объект для отечественного рыбоводства новый, требует разнопланового изучения за пределами естественного ареала, с последующей адаптацией в условиях культивирования при комбинированном методе выращивания сеголетков являющемся ведущим в условиях современного осетроводства. В этой связи, при работах с относительно новым для рыбоводства видом, необходимо адаптировать существующие технологии классического осетроводства для культивирования веслоноса.

В настоящее время, в связи с актуальностью вопроса о сохранении или восстановлении биоразнообразия акваторий, а также с активным развитием товарного осетроводства, повышается значимость искусственного воспроизводства и выращивания высококачественного рыбопосадочного материала стерляди и веслоноса. При этом, одним из ключевых заданий является эффективное использование мощностей специализированных предприятий, что отражается на плотности посадки. В свою очередь, она определяется, с одной стороны, потребностями технологии, что требует максимальной загрузки мощностей, а с другой — отрицательным влиянием особей при определенной скученности. Логично, общая задача заключается в определении оптимума с учетом этих двух аспектов.

Исходя из изложенного, целью наших исследований было изучение ведущих технологических составляющих, ориентированных на оптимизацию технологии выращивания сеголетков стерляди и веслоноса в условиях юга Украины.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Выращивание сеголетков осетровых проводилось в экспериментальных прудах площадью 2 и 3 га Днепровского осетрового рыбоводного завода. В качестве экспериментального материала использовали мальков и сеголетков стерляди и веслоноса, которых выращивали в бассейнах в соответствии с методическими рекомендациями для комбинированного метода выращивания. Формирование экспериментальных групп проводилось по методу групп-аналогов. В ходе постановки эксперимента при выращивании сеголетков стерляди было сформировано три варианта с плотностями посадки в первом варианте 65,0, во втором — 79,0 и в третьем — 95,0 тыс. экз./га; в качестве контроля выступали пруды, где плотность посадки была нормативной и составляла 100 тыс. экз./га. Средняя масса мальков стерляди при зарыблении экспериментальных прудов колебалась в пределах 69,0–85,0 мг. В ходе постановки эксперимента при выращивании сеголетков веслоноса были сформированы варианты с плотностями посадки 1,0 и 1,5 тыс. экз./га, средняя масса мальков при зарыблении составляла 700–800 мг. В качестве отдельных повторностей выступали смежные годы исследований.

С целью формирования кормовой базы в пруды вносили органические удобрения из расчета 5,0 т/га. Отбор и обработку гидрохимических, гидробиологических и биохимических проб, изучение особенностей питания сеголетков проводили в соответствии с общепринятыми в рыбохозяйственных исследованиях методиками [9–13].

Статистическая оценка результатов экспериментальных исследований проводилась корреляционно-регрессионным и дисперсионным анализом с помощью программы «Agrostat», которая представлена в виде надстройки к программе «Microsoft Office Excel» [14, 15].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В период проведения исследований осуществляли систематический контроль физико-химических параметров среды в экспериментальных прудах. Температура воды при выращивании стерляди колебалась в пределах вариантов

от 22,5–24,5 до 27,0–27,6°C, при среднесезонных показателях в пределах 24,2–25,9°C. Среднесуточная температура воды при выращивании веслоноса увеличивалась от 18–23 до 29–30°C, при среднесезонных показателях 22,5 – 24,1°C.

Содержание растворенного в воде кислорода показало прямую зависимость от температуры воды в прудах. Минимальные показатели растворенного в воде кислорода — 4,6–4,7 мгО₂/дм³ — наблюдались в период максимальных температур воды. Среднесезонные показатели растворенного в воде кислорода при выращивании стерляди колебались в пределах вариантов — 6,3–7,1 мгО₂/дм³, в контроле — 6,0–9,2 мгО₂/дм³. Содержание растворенного в воде кислорода при выращивании веслоноса в среднем за сезон было на уровне 5,8–6,2 мгО₂/дм³.

Водородный показатель воды (рН) на протяжении всего периода исследований характеризовался как нейтральный и слабощелочной. Его среднесезонные значения при выращивании стерляди были на уровне 7,5–7,7 и лишь в периоды максимальных температур он повышался до 8,0–9,2. В процессе выращивания сеголеток веслоноса значения рН воды колебались в пределах 7,8–8,6.

Перманганатная окисляемость в экспериментальных прудах на протяжении исследований была на уровне 12,3–14,1 мгО/дм³ с тенденцией к увеличению. Однако, на протяжении периода выращивания она имела оптимальные значения для выращивания сеголетков стерляди в прудах. Перманганатная окисляемость при выращивании веслоноса была в пределах нормативных значений и составляла в среднем 12,88–19,64 мгО/дм³.

Значения показателя жесткости воды в экспериментальных прудах в период проведения исследований в среднем колебались в пределах 6,9–7,6 мг-экв./дм³. Среднесезонные показатели концентрации хлора в воде были в пределах 40,7–50,5 мг/дм³.

Содержание фосфора на протяжении выращивания сеголетков стерляди колебалось по годам от 0,05 до 0,28–0,40 мгР/дм³, но, в целом, его средние показатели были на уровне 0,17–0,22 мгР/дм³.

Содержание азота находилось в пределах от 0,01–0,05 до 0,11–0,20 мг/дм³. Среднесезонные показатели NO₂ были на уровне 0,04–0,07 мг/дм³. Содержание NO₃⁻ в период выращивания сеголетков стерляди колебалось от 0,6–0,9 до 1,6–3,3 мг/дм³, в среднем составляя 1,2–1,6 мг/дм³.

В целом, на протяжении всего периода исследований физико-химические параметры воды в экспериментальных прудах, в которых осуществлялось выращивание сеголетков стерляди и веслоноса, были близкими к основным нормативным значениям, не выходя за пределы допустимых норм. При выращивании сеголетков веслоноса наблюдалось временное превышение рекомендованных для него значений по таким показателям как рН и перманганатная окисляемость, что могло снизить показатели выживаемости. При этом все среднесезонные показатели физико-химических параметров воды были в пределах допустимых значений и не превышали рекомендованных для веслоноса.

Видовое разнообразие фитопланктона прудов ограничивалось 19 видами, которые относились к 5 отделам водорослей: зеленым (*Chlorophyta*), сине-

зеленым (*Cyanobacteria*), желто-зеленым (*Xanthophyceae*), динофитовым (*Dinophyta*) и диатомовым (*Bacillariophyceae*). Наиболее массовыми видами являлись *Mycrocystis aeruginosa*, *M. flos-aquae*, *Woronichinia naegeliana*, *Aphanizomenon flos-aquae*, *Chlorogloea sarcinoides*, *Microcystis pulvereae*, *Anabaena circinalis*, *Anabaena flos-aquae*, *Chlorogloea microcystoides* Geitl, *Chlorogloea sarcinoides* Elenk, относящиеся к отделу сине-зеленых водорослей. Биомасса фитопланктона в прудах при выращивании стерляди колебалась от 3,2 до 19,4 мг/дм³, при выращивании веслоноса — от 8,15 до 11,28 мг/дм³.

Видовой состав зоопланктона прудов насчитывал 27 видов, относящихся к 3 таксономическим группам кормовых организмов: ветвистоусые ракообразные (*Cladocera*), веслоногие ракообразные (*Copepoda*) и коловратки (*Rotatoria*). Наиболее массовыми видами являлись *Daphnia longispina*, *D. magna*, *D. pulex*, *Moina rectirostris*, *Bosmina longirostris*, *B. coregoni* Baird, *B. kessleri* Ulijan, *B. longispina* Leydig, *Leptodora kindtii* Focke, *Sida crystallina* Muller, *Simocephalus vetulus* Muller. Среднесезонная биомасса зоопланктона колебалась от 3,50 до 4,27 мг/дм³ в контрольном варианте, где плотность посадки стерляди составляла 100 тыс. экз./га, и с практически полным его выеданием. В прудах второго варианта, где плотность посадки составляла 79,0 тыс. экз./га наблюдалась максимальная среднесезонная биомасса зоопланктона — на уровне 7,15–7,64 мг/дм³. При выращивании веслоноса среднесезонные показатели зоопланктона были в пределах 5,39–7,37 мг/дм³. Развитие зоопланктона в целом носило вспышкообразный характер в связи с жизненными циклами основных кормовых организмов и уровнем их поедания объектом культивирования.

Зообентос экспериментальных прудов был представлен четырьмя таксономическими группами кормовых организмов: хирономиды (*Chironomidae*), гаммариды (*Gammaridae*), олигохеты (*Oligochaeta*), личинками комаров (*Chaoboridae*). Наиболее массовыми видами в период выращивания сеголетков стерляди были *Chaetogammarus ischnus*, *Chironomus plumosus*, *Culex pipiens* и *Tanytus molinis*. Среднесезонная биомасса зообентоса колебалась от 1,84–2,80 г/м² в третьем варианте, с плотностью посадки 95,0 тыс. экз./га, до 4,94–5,76 г/м² в прудах первого варианта с минимальной плотностью посадки. Низкие показатели развития зообентоса в прудах третьего варианта объясняются в первую очередь достаточно высокой плотностью посадки сеголетков стерляди в прудах.

Анализ кормовой базы экспериментальных прудов, в которых проводилось выращивание сеголетков стерляди, показал, что уровень обеспеченности рыб кормовыми организмами способствовал реализации потенции роста и развития. Уровень поедания ведущих кормовых организмов показал, что мальки стерляди отдавали предпочтение зоопланктону. При анализе желудочно-кишечных трактов установлено, что большую часть пищевого комка сеголетков стерляди при выращивании в прудах составляли зоопланктонные организмы рода *Daphnia* и личинки комаров (*Chironomidae*), другие кормовые организмы встречались в незначительных количествах.

В результате выращивания стерляди нами были получены сеголетки средней массой от 2,65±0,17 до 4,11±0,21 г (табл. 1).

Таблица 1. Результаты выращивания сеголетков стерляди в зависимости от плотности посадки

Table 1. Results of growing young-of-the-year sterlet depending on the stocking density

Вариант (год) / Variant (year)	Пруд, № / Pond, №	Посажено мальков, тыс. экз./га / Planted fry thousand ind. / ha	Выловлено сеголетков / Caught of young-of-the- year		Вы- ход, % / Yield, %	Рыбопродук- тивность, кг/га / Fish capacity, kg/ha
			тыс. экз./га / thousand ind. / ha	сред. масса, г / average mass, g		
I (2015)	15, 16	65,0	46,50	2,65±0,30	71,53	123,23
II (2012)	8, 9, 10	79,0	59,06	4,11±0,21	74,84	238,09
III (2016)	5, 6, 8	95,0	52,52	3,60±0,27	55,28	184,03
Контроль (2015) / Control (2015)	11, 12	100,0	51,34	3,20±0,17	51,34	156,54

Наиболее высокие показатели средней массы тела сеголетков стерляди были характерны для экспериментальных групп второго варианта, где плотность посадки составляла 79,0 тыс. экз./га. Средняя конечная масса экспериментального материала в этом варианте составляла $4,11 \pm 0,21$ г, при этом на протяжении всего периода выращивания сеголетков наблюдался высокий уровень пищевой активности. Минимальная средняя масса сеголетков стерляди была получена в первом варианте и составила $2,65 \pm 0,30$ г. Учитывая относительно одинаковые условия выращивания, низкие средние конечные массы сеголетков стерляди в первом варианте на уровне 2,6–2,9 г обусловлены низким уровнем развития зоопланктона, что связано главным образом с наличием в прудах разновозрастных групп жаброногих ракообразных *Notostraca* (щитней), а также наличием «сорной рыбы», которая проникала через водозаборные сооружения наблюдавшееся во время спуска экспериментальных прудов.

Разница в плотностях посадки, обеспеченности кормами и эффективности их использования мальками определила также уровень их выживаемости в разрезе отдельных вариантов. На фоне более высоких средних масс сеголетков стерляди, для групп второго варианта также был характерен и наиболее высокий уровень выживаемости. Средний выход сеголетков стерляди в прудах составлял 74,84%. Минимальные показатели выживаемости экспериментального материала были характерны для прудов контрольного варианта, составляя 51,34%. Соответственно, максимальная рыбопродуктивность также была характерна для экспериментальных прудов второго варианта, составляя 238,09 кг/га.

В период проведения исследований в опытных группах отмечался высокий темп роста массы экспериментального материала, характеризуюсь значительными колебаниями по вариантам, что зависело в первую очередь от обеспеченности пищей.

Темп роста массы тела сеголетков стерляди имел наиболее высокие показатели во втором варианте, где уровень развития кормовой базы был достаточно высоким. Соответственно, разница в массе тела контрольного и второго вариантов составляла 0,35 г за 35 суток выращивания, 1,2 г — за 50 суток, в конце выращивания разница в массе сократилась до 0,91 г (рис. 1).

Рис. 1. Темп роста сеголетков стерляди при выращивании в прудах

Fig. 1. The rate of growth of young-of-the-year sterlet during growing in ponds

Определение химического состава м'яса полученных сеголетков стерляди позволило установить, что условия выращивания влияли не только на массу тела, но и на обеспеченность основными резервными веществами, такими как жиры и белки. На протяжении всего периода исследований показатели влаги в теле были практически на одинаковом уровне и колебались в пределах 79,6–82,2%. Содержание липидов по всем опытным и контрольным группам было на уровне 1,86–1,92%. Минимальные показатели содержания протеина были характерны для прудов первого варианта, составляя 12,7–12,9%. Максимальное содержание протеина в пределах 14,7–14,9% было отмечено в прудах второго варианта. Содержание минеральных веществ в организме сеголетков стерляди во всех вариантах было незначительным и находилось в диапазоне 0,85–0,96%.

Анализируя данные по морфометрическим показателям, в зависимости от плотности посадки, необходимо отметить, что по абсолютным значениям наблюдается разница в вариабельности по основным линейным показателям, таким как полная длина ($C_v = 11,0\text{--}16,4\%$), малая длина ($C_v = 9,64\text{--}17,3\%$), длина

головы ($C_v = 10,3\text{--}29,4\%$) та длина рыла ($C_v = 14,9\text{--}20,1\%$). Обращает на себя внимание разница вариабельности (вариантам по наибольшей высоте тела, конечной массе сеголетков стерляди и коэффициенту упитанности. Так, по наибольшей высоте тела наблюдалась высокая вариабельность — от 13,0 до 36,4%. Анализ линейно-массовых показателей сеголетков стерляди показал максимальный уровень вариации по массе тела в пределах от 28,9 в III варианте до 44,1% в контрольном варианте. Коэффициент упитанности по Фультону колебался в диапазоне от 0,70 (контрольный вариант) до 0,83 (II вариант), при этом следует отметить, что коэффициент вариации был на уровне 20,9% в контрольном и 40,7% — во II варианте.

Выращивание сеголетков веслоноса при плотности посадки 1,5 тыс. экз./га позволило получить массу сеголеток 279,0 г, при выходе на уровне 25,4% и рыбопродуктивности 103,6 кг/га. При уменьшении плотности посадки мальков до 0,5 тыс. экз./га масса сеголетков веслоноса увеличилась до 409,6 г, а выход — до 31,2% (табл. 2).

Таблица 2. Результаты выращивания сеголетков веслоноса в зависимости от плотности посадки

Table 1. Results of growing young-of-the-year paddlefish depending on the stocking density

Варианты (год) / Variant (year)	Посажено мальков, тыс. экз./га / Planted fry thousand ind. / ha	Выловлено сеголетков / Caught of young-of-the-year		Выход, % / Yield, %	Рыбопродук- тивность, кг/га / Fish capacity, kg/ha
		тыс. экз./га / thousand ind. / ha	сред. масса, г / average mass, g		
I (2005)	1,5	0,380	279,0±12,42	25,4	103,6
II (2013)	1,0	0,309	311,6±13,23	30,9	95,51
III (2015)	0,5	0,156	409,8±15,24	31,2	63,60

Характер питания сеголетков веслоноса в течение вегетационного сезона менялся в зависимости от уровня развития кормовых организмов в экспериментальных прудах. Так, в июне доля ветвистоусых ракообразных в вариантах колебалась от 83,0 до 90,56%, веслоногих — от 2,89 до 7,61%, коловраток — 0,01–0,07%.

Рассматривая темп роста сеголетков веслоноса можно отметить, что процент прироста в первые 20 суток выращивания составлял 16,7–19,3% от конечной массы, при этом они достигли 52,5–68,0 г (рис. 2).

При выращивании сеголетков веслоноса после 80 суток наблюдается замедление темпа роста. Так, в период от 80 до 102 суток выращивания они приросли на 6,8–10,2%, а в период от 102 до 120 суток их прирост составил 5,9–9,2% от общего прироста.

В ходе математического анализа было установлено, что наиболее тесная взаимосвязь существовала между плотностью посадки и полученной конечной массой сеголетков, выживаемостью, а также рыбопродуктивностью. Коэффициенты корреляции между данными показателями колебались в пределах 0,971–0,998.

Рис.2. Темп роста сеголетков веслоноса при выращивании в прудах

Fig. 2. The rate of growth of young-of-the-year paddlefish during growing in ponds

Полученные статистические показатели при выращивании сеголетков стерляди дали возможность проанализировать зависимость между плотностью посадки и основными рыбоводными показателями, и построить полиномиальные уравнения (1–3).

$$B = 0,001п^3 - 0,2777п^2 + 24,289п - 611,65; \quad (1)$$

$$M = 0,0002п^3 - 0,0462п^2 + 4,1243п - 116,8; \quad (2)$$

$$P = -0,0293п^3 + 6,9705п^2 - 542,78п + 13989; \quad (3)$$

где B — выход, %;

M — масса, г;

P — рыбопродуктивность, кг/га;

п — плотность посадки, тыс. экз./га.

Согласно данным анализа, коэффициент аппроксимации полученных уравнений колебался в пределах от 0,9481 до 0,9880, что можно считать достоверным в плане проведенных исследований.

Дисперсионный анализ совместного влияния плотности посадки и массы мальков веслоноса на основные рыбоводные показатели выявил, что доля влияния массы мальков на выживание составляла 21,3%, на массу — 24,1%. Влияние плотности посадки на указанные рыбоводные показатели соответственно отвечало 29,3 и 42%.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Данная научная работа посвящена исследованию влияния отдельных технологических аспектов выращивания сеголетков стерляди и веслоноса в условиях юга Украины. Результаты выращивания посадочного материала показали, что низкая плотность посадки и высокий уровень интенсификации дают более высокие показатели конечной массы и выхода экспериментального материала.

При выращивании стерляди наиболее оптимальным был вариант с плотностью посадки 79,0 тыс. экз./га, при этом был получен экспериментальный материал стерляди средней массой $4,11 \pm 0,21$ г при выходе 74,84%, средней плотнотпродуктивности 238,09 кг/га и содержании протеина на уровне 14,7–14,9%.

Плотность посадки мальков веслоноса в выростных прудах в условиях юга Украины на уровне 1,5 тыс. экз./га даст возможность сеголеткам достичь массы около 279,0 г при выживании 25,4–29,3%. Уменьшение плотности посадки до 0,5 тыс. экз./га способствует увеличению массы сеголетков до 409,8 г и выхода — до 31,2%.

Следует сделать акцент на том, что для нормального роста и развития сеголетков необходимо тщательно контролировать кормовую базу прудов, уровень развития которой, в первую очередь влияет на основные рыбохозяйственные показатели.

ЛИТЕРАТУРА

1. Екологічні передумови раціонального ведення рибного господарства Дніпровсько-Бузької естуарної області / Пилипенко Ю. В. та ін. Херсон : Гринь Д.С., 2013. 196 с.
2. Еколого-технологічні основи відтворення і вирощування молоді осетроподібних / Шерман І. М. та ін. Херсон : Олді-Плюс, 2009. 348 с.
3. Мильштейн В. В. Осетроводство. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1982. 152 с.
4. Корниенко В. А., Билык А. В., Мошнягул К. И. Влияние плотности посадки на эффективность выращивания покатной молоди русского осетра для зарыбления Нижнего Днепра // Actual status and conservation of natural population of sturgeon fish *Acipenseridae*. Aktualny stan i ochorona naturalnych populacji ryb jesiotrowatych *Acipenseridae*. Olsztyn, 2014. S. 227—230.
5. Корниенко В. А., Билык А. В., Мошнягул К. И. Влияние основных технологических параметров и состояния кормовой базы на результативность выращивания мальков-покатников русского осетра (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt, 1833) // Аквакультура осетровых: современные тенденции и перспективы : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Херсон : Гринь Д.С., 2016. С. 91—97.
6. Билык А. В. Новые технологии в выращивании покатной молоди русского осетра (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt, 1833) // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології», 17-19 вересня 2015 р. : VIII Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф. : матер. Херсон : Гринь Д.С., 2015 С. 26—29.
7. Аквакультура осетрообразных : учебно-практическое пособие / Васильева Л. и др. Херсон : Гринь Д.С., 2016. 238 с.

8. Камоликова Л. И., Зайцева Л. А. Возможности совместного выращивания молоди осетра и севрюги // Рациональные основы ведения осетрового хозяйства. Волгоград, 1981. С. 96—97.
9. Зуева З. С., Медная Л. И., Гунин А. И. Выращивание веслоноса в прудах Астраханской области // Биологические ресурсы Каспийского моря : Междунар. конф. : тезисы докл. Астрахань, 1992. С. 132—134.
10. Lobchenko V., Vedrasco A., Billard R. Rearing Paddlefish *Polyodon spathula* to Maturity in Ponds in the Republic of Moldavia // International Review of Hydrobiology. 2002. Vol. 87, № 5. P. 553—559.
11. Руководство по выращиванию веслоноса в условиях Нижнего Поволжья / Архангельский В. В. и др. Астрахань : КаспНИРХ, 1997. 48 с.
12. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон и бентос) / ред. Кутикова Л. А., Старобогатов Я. И. — Ленинград : Гидрометеиздат, 1977. 511 с.
13. Жадин В. И. Методы гидробиологических исследований. Москва : Высшая школа, 1960. 189 с.
14. Алёкин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометиздат, 1970. 443 с.
15. ГОСТ 7636—85. Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки // Методы анализа. Київ : Держспоживстандарт України, 2004. С. 17—124.
16. Пилипенко Ю. В., Корнієнко В. О. Методика збору та обробки матеріалів по живленню риб. Херсон : ПВВ «Колос» ХДАУ, 2009. 34 с.
17. Плохинский Н. А. Биометрия. Новосибирск : АН СССР, 1961. 364 с.
18. Методика польового досліду : монографія / Ушкаренко В. О. та ін. Херсон : Айлант, 2014. 465 с.

REFERENCES

1. Pylypenko, Yu. V. (2013). *Ekolohichni peredumovy ratsionalnoho vedennia rybnoho hospodarstva Dniprovsko-Buzkoï estuarnoi oblasti*. Kherson: Hrin D.S.
2. Sherman, I. M. (2009). *Ekoloho-tekhnologichni osnovy vidtvorennia i vyroshchuvannia molodi osetropodibnykh*. Kherson: Oldi-Plius.
3. Mil'shtejn, V. V. (1982). *Osetrovodstvo*. Moskva: Legkaja i pishhevaja promyshlennost'.
4. Kornienko, V. A., Bilyk, A. V., & Moshnjagul, K. I. (2014). Vlijanie plotnosti posadki na jeffektivnost' vyrashhivaniya pokatnoj molodi russkogo osetra dlja zaryblenija Nizhnego Dnepra. *Actual status and conservation of natural population of sturgeon fish Acipenseridae. Aktualny stan i ochorona naturalnykh populacii ryb jesiotrowatych Acipenseridae*. Olsztyn, 227-230.
5. Kornienko, V. A., Bilyk, A. V., & Moshnjagul, K. I. (2016). Vlijanie osnovnyh tehnologicheskikh parametrov i sostojaniya kormovoj bazy na rezul'tativnost' vyrashhivaniya mal'kov-pokatnikov russkogo osetra (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt, 1833). *Akvakul'tura osetrovyh: sovremennye tendencii i perspektivy: Mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija*. Herson: Grin' D.S., 91-97.
6. Bilyk, A. V. (2015). Novye tehnologii v vyrashhivanii pokatnoj molodi russkogo osetra (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt, 1833). *Suchasni problemi teoretichnoi ta praktichnoi ihtologii: Materialy VIII Mizhnarodnoi ihtologichnoi naukovopraktichnoi konferencii, 17-19 veresnja 2015 r.* Herson: Grin' D.S., 26-29.

7. Vasil'eva, L., Pilipenko, Ju., Kornienko, V., Shevchenko, V. et al. (2016). *Akvakul'tura osetroobraznyh: uchebno-prakticheskoe posobie*. Herson: Grin' D.S., 2016. 238 s.
8. Kamolikova, L. I., & Zajceva, L. A. (1981). Vozmozhnosti sovmestnogo vyrashhivaniya molodi osetra i sevrjugi. *Racional'nye osnovy vedeniya osetrovogo hozjajstva*. Volgograd, 96-97.
9. Zueva, Z. S., Mednaya, L. I., & Gunin, A. I. (1992). Vyrashhivanie veslonosa v prudah astrahanskoj oblasti. *Biologicheskie resursy kaspiskogo morya: mezhdunar. konf.: tezisy dokl.* Astrahan, 132-134.
10. Lobchenko, V., Vedrasco, A., & Billard, R. (2002). Rearing Paddlefish *Polyodon spathula* to Maturity in Ponds in the Republic of Moldavia. *International Review of Hydrobiology*, 87(5), 553-559.
11. Arhangel'skij, V. V. et al. (1997). *Rukovodstvo po vyrashhivaniyu veslonosa v usloviyah nizhnego povolzhya*. Astrahan: KaspNIRKh.
12. Kutikova, L. A. & Starobogatov, Ja. I. (Eds.) (1977). *Opredelitel' presnovodnyh bespozvonochnyh Evropejskoj chasti SSSR (plankton i bentos)*. Leningrad: Gidrometeoizdat.
13. Zhadin, V. I. (1960). *Metody gidrobiologicheskikh issledovanij*. Moskva: Vysshaja shkola.
14. Aljokin, O. A. (1970). *Osnovy gidrohimii*. Leningrad: Gidrometizdat.
15. Ryba, morskije mlekoopitaiushchije, morskije bespozvonochnye i produkty ikh pererabotki. GOST 7636-85. Mizhderzhavnyi standart. *Metody analiza*. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 17-124.
16. Pylypenko, Yu. V., & Korniienko, V. O. (2009). *Metodyka zboru ta obrobky materialiv po zhyvlenniu ryb*. Kherson: Kolos.
17. Plohinskij, N. A. (1961). *Biometrija*. Novosibirsk: AN SSSR.
18. Ushkarenko, V. O. et al. (2014). *Metodyka polovoho doslidu: monohrafiia*. Kherson: Ailant.

**ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ ПОСАДКИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ
РИБОПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ СТЕРЛЯДІ *ACIPENSER RUTHENUS* (LINNAEUS)
ТА ВЕСЛОНОСА *POLYODON SPATHULA* (WALBAUM)
В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ**

Г. В. Білик, bilyk_anna@ukr.net, Херсонська гідробіологічна станція НАН України, Національний природний парк «Нижньодніпровський», м. Херсон

Н. О. Грудко, nagrudko@gmail.com, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

І. М. Шерман, sherman_i.m@ukr.net, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

Мета. Визначити вплив окремих елементів біотехніки на ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу стерляді та веслоноса для оптимізації технології вирощування та раціонального використання в аквакультурі півдня України.

Методика. Вирощування рибопосадкового матеріалу стерляді та веслоноса проводилося в експериментальних ставах площею 2 та 3 га. З метою формування кормової бази вносилися органічні добрива із розрахунку 5 т/га. Вирощування цьоголіток стерляді проводилося за щільності посадки 65–95,0 тис. екз./га, в контрольному варіанті — 100,0 тис. екз./га. Вирощування цьоголіток веслоноса проводилось за щільності посадки

**ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕГОЛЕТКОВ СТЕРЛЯДИ
ACIPENSER RUTHENUS (LINNAEUS) И ВЕСЛОНОСА POLYODON SPATHULA (WALBAUM)
В УСЛОВИЯХ ЮГА УКРАИНЫ**

0,5-1,5 тис. екз./га. Середня індивідуальна маса мальків стерляді при зарибленні експериментальних ставів по варіантах складала 69–85 мг, мальків веслоноса — 600–700 мг.

Результати. Проаналізовані результати вирощування та представлена рибницько-біологічна характеристика цьоголіток стерляді (*Acipenser ruthenus* L.) та веслоноса (*Polyodon spathula* Walbaum), вирощень[за комбінованої технології на базі експериментальних ставів Дніпровського осетрового риборозплідного заводу (Херсонська обл., південь України). Вивчений кількісний та якісний склад кормової бази ставів (фітопланктон, зоопланктон, зообентос), особливості росту та живлення цьоголіток стерляді і веслоноса. Встановлено, що за щільності посадки 79,0 тис. екз./га та достатнього рівня розвитку кормової бази у мінімальний термін вирощування можна отримати цьоголіток стерляді середньою масою в межах 3,60–4,40 г за виходу 70,32–82,78% та середньої рибопродуктивності 238,09 кг/га. Зариблення ставів мальками масою 600–700 мг, за щільності посадки на рівні 0,5–1,5 тис. екз./га надало змогу отримати цьоголіток масою 278,0–409,8 г при виживанні на рівні 24,5–31,2%.

Наукова новизна. У результаті досліджень набуло подальшого розвитку уявлення про вплив щільності посадки на різнопланові результати вирощування рибопосадкового матеріалу стерляді та веслоноса. Встановлений та обґрунтований взаємозв'язок між щільністю посадки та рибопродуктивністю, виходами та масою цьоголіток стерляді та веслоноса. Отримана нова інформація про вплив окремих елементів біотехніки вирощування на біохімічні показники цьоголіток стерляді та веслоноса.

Практична значимість. Отримані дані розширюють та доповнюють існуючі уявлення про вплив технологічних факторів на ефективність вирощування життєстійкого рибопосадкового матеріалу стерляді та веслоноса в умовах півдня України та сприяють розширенню практичних задач сучасної аквакультури.

Ключові слова: стерлядь, веслоніс, ставове вирощування, цьоголітки, кормова база, щільність посадки, виживання, середня маса, рибопродуктивність.

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АМАРАНТУ (*AMARANTHUS*) В ГОДІВЛІ КОРОПА ЗА РІЗНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

Р. А. Паламарчук, feeding@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. В. Дерень, derenj@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначення впливу додавання до основного раціону коропа добавки з антиоксидантними властивостями амаранту (*Amaranthus*) на деякі рибницько-фізіологічні показники риб в залежності від умов вирощування.

Методика. Рибницькі, іхтіологічні та гідрохімічні дослідження проведено за загальноприйнятими в рибництві методиками. Вміст гемоглобіну в крові коропів визначали гемоглобін-ціанідним методом. Кількість еритроцитів у крові коропів підраховували в камері Горяєва. Визначення вмісту білка проводили за методом Бредфорд. Концентрацію дієнових кон'югатів досліджували за методом, що ґрунтується на реакції оптичної густини гептанізопропанольного екстракту ліпідів. Визначення концентрації ТБК-активних продуктів проводили спектрофотометрично за кольоровою реакцією з тіобарбітуровою кислотою. Активність супероксиддисмутази (СОД) — за визначенням відсотка гальмування реакції відновлення нітросинього тетразолію в присутності феназинметасульфату. Активність каталази — за зміною концентрації H_2O_2 .

Результати. У дослідженнях проаналізовано вплив згодовування коропу зерна українського високоврожайного кормового сорту амаранту з лікувальними властивостями «Харківський-1» на фізіолого-біохімічні показники організму. Проведено порівняльну характеристику ефективності використання даної кормової добавки в стандартних умовах вирощування та за впливу стресового чинника (забруднення води в результаті інтенсифікаційних заходів).

В обох варіантах дослідів у крові риб дослідної групи відмічено збільшення кількості формених елементів крові: спостерігалася тенденція до збільшення кількості еритроцитів на 15,0–18,1% відносно контролю. За оптимальних умов вирощування в м'язах коропів дослідної групи є тенденція до збільшення вмісту жиру, а за впливу стрес-чинників зростає вміст протеїну ($p < 0,01$) та жиру, відносно контролю. За оптимальних умов вирощування відмічена тенденція до зростання активності СОД, як в м'язах, так і в гепатопанкреасі коропа (на 5,9–8,3%). За впливу стрес-чинників активність даного ферменту значно посилюється ($p < 0,01$), що свідчить про активізацію антиоксидантних властивостей амаранту при виникненні негативних чинників.

Наукова новизна. При проведенні досліджень, виходячи з аналізу поживності та біологічно активних властивостей амаранту, вперше вивчено його вплив на деякі рибницько-фізіологічні показники організму дволіток коропа та визначено ефективність його використання в оптимальних умовах вирощування, а також за впливу стрес-чинника.

Практична значимість. Моделювання в лабораторних умовах підвищеного вмісту нітритів у воді, як поширеного у рибництві стрес-чинника та порівняння його впливу на деякі рибницько-фізіологічні показники організму коропа є обґрунтованим і актуальним. За умови отримання позитивних результатів введення даної кормової добавки до раціону

коропа можна вирішити проблеми рибних господарств, викликані інтенсифікацією виробництва, а саме: зниження приростів риби та її відхід внаслідок гіпоксії і розвитку супутніх захворювань внаслідок органічного забруднення водного середовища.

Ключові слова: амарант, нивківський короп, дволітки, фізіолого-біохімічні показники організму, умови вирощування, хімічний склад води.

DETERMINATION OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF AMARANTH (AMARANTHUS) IN FEEDING OF CARP UNDER DIFFERENT REARING CONDITIONS

R. Palamarchuk, feeding@if.org.ua, Institute of Fisheries of the NAAS, Kyiv

O. Deren, derenj@ukr.net, Institute of Fisheries of the NAAS, Kyiv

Purpose. Determination of the effect of adding an *Amaranthus* (*Amaranthus*) supplement with anti-oxidant properties to the basic diet of carp on some fish-physiological parameters depending on rearing conditions.

Methodology. Aquaculture, ichthyological and hydrochemical studies were conducted according to generally accepted methods in fish culture. The hemoglobin content in carp blood was determined by hemoglobin-cyanide method. The number of red blood cells in the blood of carp was counted in the Goryaev's chamber. Determination of protein content was carried out using the Bradford's method. The concentration of diene conjugates was estimated by a method based on the reaction of the optical density of the heptaninopropanol lipid extract. Determination of the concentration of TBK-active products was carried out spectrophotometrically by color reaction with thiobarbituric acid. The activity of superoxide dismutase (SOD) was determined by the inhibition of the reaction of nitrosin tetrazolium reduction in the presence of phenazine methisulphate. The activity of catalase was evaluated based on changing H_2O_2 concentration.

Findings. The study analyzed the effect of feeding carp with grains of Ukrainian high-yielding feed grade amaranth with healing properties (Kharkiv-1) on physiological and biochemical parameters of fish organism. A comparative description of the efficiency of using this feed supplement under standard conditions of cultivation and the effect of a stress factor (water pollution as a result of intensification measures) was carried out.

In both experiments, an increase in the number of formed blood elements was observed in the blood of experimental groups of fish: there was a tendency of an increase in the number of erythrocytes by 15-18.1% compared to control. Under optimum conditions of rearing, there was a tendency for an increase in body fat in the experimental group carp, while the effect of stress factors increases the protein ($p < 0.01$) and fat contents compared to control. Under optimal conditions of cultivation, the tendency of an increase in SOD activity, both in muscles and in hepatopancreas of carp (by 5.9-8.3%.) was observed. Under the effect of stress factors, the activity of this enzyme was significantly increased ($p < 0.01$) that indicated on the activation of the anti-oxidant properties of amaranth in the event of negative factors.

Originality. For the first time the effect of biologically active properties of amaranth on some fish and physiological parameters of age-1+ fish was studied and the effectiveness of its use under optimum conditions of cultivation, as well as the effect of stress factor was determined.

Practical value. Laboratory simulation of high content of nitrites in water, as widely common stress-factor in fish farming, and comparison of its effect on some fish-physiological parameters of carp organism is justified and topical. Taking into account positive results of the introduction of this feed additive into the diet of carp, it is possible to solve the problems of fish farms caused by the intensification of production, namely: reduction in fish growth gain and their death due to hypoxia and the development of concomitant diseases as a result of organic pollution of the aquatic environment.

Key words: amaranth, Nyvky carp, age-1+ fish, physiological-biochemical indices of the organism, conditions of cultivation, chemical composition of water.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

До важливих аспектів організації годівлі об'єктів риборозведення належить покращення харчової цінності м'яса риб, вирощених в умовах промислового виробництва. У структурі виробничих витрат при вирощуванні риби, за інтенсивних технологій значна частина належить витратам на придбання штучних кормів. При цьому, часто в годівлі застосовують незбалансовані кормосуміші, що зумовлює зниження темпів росту та резистентності риб [1]. Тому, в умовах сьогодення актуальним завданням є зниження собівартості вирощеної рибної продукції за рахунок здешевлення рецептів рибних комбікормів зі збереженням їх якісних характеристик.

За інтенсифікації виробництва в рибогосподарських водоймах, зокрема підвищення густоти посадки риб, і, як наслідок, — збільшення кількості згодовуваних кормів і продуктів життєдіяльності риб, відбувається погіршення хімічного складу водного середовища. Підвищений вміст нітритів у воді вказує на посилення процесів розкладання органічних речовин в умовах повільного окиснення NO_2 в NO_3 . Нітрити є значно небезпечнішими, ніж нітрати, і при розкладанні виділяють окиси азоту. Дані процеси відбуваються внаслідок забруднення водойм органічними відходами [2]. Підвищений вміст нітритів негативно впливає безпосередньо на організм риб, оскільки викликає зростання концентрації метгемоглобіну в крові, при цьому знижується здатність крові до перенесення кисню [3, 4].

В зв'язку з цим, значний інтерес викликає використання в складі рибних комбікормів нових кормових добавок з біологічно активними властивостями, в тому числі рослинного походження. Перспективним і економічно вигідним може стати застосування в складі основного раціону коропа рослинних добавок з антиоксидантними властивостями, з огляду на позитивні результати використання їх з цією метою в інших підгалузях тваринництва [5, 6].

Однією з таких кормових добавок є високобілкова рослина широкого спектру дії — амарант (*Amaranthus*). Використання білків амаранту в годівлі тварин робить корми більш повноцінними і збалансованими за амінокислотним складом, вмістом пектину, вітамінів і біологічно активних речовин. Встановлено, що амарант, завдяки наявності флавоноїдів, зокрема рутину, та поліфенольних сполук проявляє антиоксидантні властивості [7, 8]. Основною серед біологічно активних властивостей амаранту є його здатність збільшувати насичення крові киснем завдяки вмісту у ньому сквалену [9].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Перспективним є введення амаранту до складу кормів для коропа як в якості кормового компоненту, так і додаткової біологічно активної добавки [10–12]. Враховуючи, що для амаранту характерні антиоксидантні характеристики, то актуальним є вивчення та порівняння таких властивостей амаранту за оптимальних умов вирощування риб і в умовах дії стресових чинників, зокрема забруднення води при екзогенному навантаженні [13].

У дослідженнях вперше проаналізовано вплив згодовування коропа зерна

українського високоврожайного кормового сорту амаранту з лікувальними властивостями «Харківський-1» на деякі фізіолого-біохімічні показники організму риб. Сорт «Харківський-1» занесений до Реєстру сортів рослин України. Вміст олії в зерні даного сорту досягає 8%, сквалену — 7–8% [14]. Тому даний сорт є цінною кормовою культурою, а зерно характеризується високими біологічно активними властивостями.

Мета дослідження полягала у визначенні впливу додавання до основного раціону коропа кормової добавки з антиоксидантними властивостями — амаранту на деякі рибницько-фізіологічні показники в залежності від умов вирощування.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проведено в Інституті рибного господарства НААН. Проведено серію експериментальних модельних випробувань в лабораторних умовах, дотримуючись загальноприйнятих у рибництві правил постановки дослідів з визначення впливу введення до складу раціону коропа амаранту на деякі фізіолого-біохімічні показники організму. В ході досліджень здійснено оцінку впливу додавання до комбікорму амаранту на гематологічні показники, поживність м'яса, активність системи антиоксидантного захисту організму в залежності від умов вирощування.

Об'єктом дослідження були дволітки нивківського коропа. Для годівлі риб використовували збалансований комбікорм для коропа з вмістом протеїну 23%, до складу якого додатково вводили амарант методом гранулювання. Комбікорм згодовували риbam один раз на добу. Добова кількість комбікорму становила 3–5% від маси риб.

Зрівняльний період перед проведенням дослідів тривав 10 діб, впродовж яких дволіткам коропа згодовували однакову кількість стандартного комбікорму та забезпечували аналогічні оптимальні умови утримання. Після закінчення зрівняльного періоду, коли риби адаптувалися до умов утримання і перейшли до активного живлення, їх розділили на контрольні і дослідні групи, у відповідності до мети дослідів. Тривалість експерименту складала 14 днів.

В першому досліді (Дослід 1) сформовано контрольну групу риб і дослідну, яких додатково до складу основного раціону введено мелене насіння амаранту в кількості 10%. Вирощування проводили в акваріумах місткістю 150 л за щільності посадки 67 екз./м³. При цьому забезпечено оптимальні аналогічні умови вирощування.

В другому досліді (Дослід 2) формування груп риб проводили аналогічним методом, але вирощування здійснювали в акваріумах місткістю 80 л за щільності посадки 125 екз./м³. При цьому, внаслідок додаткового навантаження на водне середовище, відбувалося постійне органічне забруднення води.

Впродовж проведення експериментальних робіт в акваріумах систематично контролювалися кисневий, гідрохімічний та температурний режими. Температуру води протягом проведення експериментів утримували в межах 19–21°C, що забезпечувалось шляхом автоматичного підігріву. Температурні показники перебували в оптимальних межах для засвоєння корму та росту коропа. Водобмін здійснювали шляхом заміни води один раз на добу.

Відбір проб для хімічного аналізу води та їх обробку в лабораторії проводили за загальноприйнятими методиками [15]. Якість води оцінювали згідно загальних вимог та норм у рибництві [16].

Контрольні зважування і огляд зовнішнього покриву та внутрішніх органів здійснювали перед початком годівлі та в кінці досліду. Для досліджень відбирали по 5 особин, які не отримували корм протягом 8–10 годин, проводили їх зовнішній огляд та відбір проб для здійснення досліджень відповідно до завдань. Після розтину оглядали внутрішні органи, звертаючи увагу на зовнішній вигляд печінки, жовчного міхура і кишківника (колір, консистенція, наявність крововиливів чи некрозу) [17].

Вміст гемоглобіну в крові коропів визначали гемоглобін-ціанідним методом (з ацетоннігдрином). Принцип методу полягає в тому, що гемоглобін при взаємодії з заліzosиньородистим калієм окиснюється до метгемоглобіну, який утворює з ацетонціангдрином забарвлений гемоглобінціанід, інтенсивність якого пропорційна вмісту гемоглобіну [18]. Кількість еритроцитів у крові коропів підраховували в камері Горяєва [19].

Визначення хімічного складу м'язів проводили за традиційними методиками зоотехнічного аналізу [20].

Для біохімічних досліджень використовували 10% гомогенати тканин печінки і скелетних м'язів коропа. Досліджували концентрацію дієнових кон'югатів за методом, що ґрунтується на реакції оптичної густини гептанізопропанольного екстракту ліпідів [21]. Визначення концентрації ТБК-активних продуктів проводили спектрофотометрично за кольоровою реакцією з тіобарбітуровою кислотою [22]. Активність супероксиддисмутази (СОД) — за визначенням відсотка гальмування реакції відновлення нітросинього тетразолію в присутності феназинметасульфату [23]. Активність каталази — за зміною концентрації H_2O_2 [24]. Визначення вмісту білка проводили за методом Бредфорд [25].

Одержані цифрові результати опрацьовували статистично за допомогою стандартного пакету статистичних програм «Microsoft Excel». Вираховували середні арифметичні величини (M), середню квадратичну помилку (m) і вірогідність різниць (P) між досліджуваними середньоарифметичними величинами [26].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Впродовж проведення обох дослідів проводився повний контроль хімічного складу води, газового режиму, вивчалась динаміка вмісту біогенних елементів і концентрації органічної речовини в акваріумах.

В Досліді 1 показник рН середовища був оптимальним для проходження біохімічних процесів (7,31–7,93), що свідчить про інтенсивність кругообігу речовин екосистеми. Перманганатна окиснюваність встановлює присутність у воді легкоокиснюваних органічних речовин, і є одним з показників ступеня забруднення водою органічними домішками. Коливання даних показників були незначні впродовж досліду і не перевищували нормативних значень. Концентрація кисню не опускалась нижче нормативних значень і в середньому була на рівні 5,02–5,26 $\text{мгО}_2/\text{дм}^3$, що забезпечувалось безперервною аерацією

води в акваріумах. Вода не була забруднена нітритами, які були присутні в незначних кількостях. Нітратний азот, відповідно, теж був присутній в незначній кількості. Згідно результатів досліджень, вміст амонійного азоту коливався в межах $0,00\text{--}0,12\text{ мгN/дм}^3$ в дослідній і $0,00\text{--}0,08\text{ мгN/дм}^3$ в контрольній групах, що не перевищило нормативні межі. Слід відмітити дещо високі концентрації сульфатів, які в середньому не перевищували допустимі значення. Вміст кальцію перевищував нормативні значення, але це позитивно впливає на санітарні характеристики води і зумовлено складом води джерела водопостачання.

Отже, при проведенні Досліді 1, гідрохімічний режим в акваріумах практично не відрізнявся, тобто додавання до корму експериментальної добавки не вплинуло на стан водного середовища. Впродовж всього періоду вирощування гідрохімічні показники перебували в оптимальних для росту і розвитку риби значеннях.

В Досліді 2 змодельовано ефект забруднення водного середовища шляхом підвищення щільності посадки коропа з метою визначення рівня прояву біологічних властивостей амаранту за впливу даного стрес-чинника на організм риб. Показник рН середовища був оптимальним для проходження біохімічних процесів ($7,97\text{--}8,30$). Перманганатна окиснюваність складала $17,95\text{ мгO/дм}^3$ з максимальним значенням $22,80\text{ мгO/дм}^3$, що перевищує нормативне (до 15 мгO/дм^3). Показники біхроматної окиснюваності, що характеризують загальне забруднення води, в середньому не перевищували нормативних значень, проте максимальне значення зафіксовано на рівні $57,0\text{ мгO/дм}^3$. У відповідності до мети досліджень, вміст нітритів у воді перевищував нормативні значення і в середньому склав $2,10\text{ мгN/дм}^3$ (за норми — до $0,10\text{ мгN/дм}^3$), коливаючись в межах $1,07\text{--}3,44\text{ мгN/дм}^3$. Відповідно, відмічено зростання вмісту нітратів до $0,63\text{ мгN/дм}^3$, проте даний показник не перевищував нормативних значень. Слід відмітити дещо високі концентрації вільного аміаку у воді, які в середньому не перевищували допустимі значення, проте коливання були суттєвими з максимальним значенням $0,08\text{ мгN/дм}^3$ (за норми — до $0,05\text{ мгN/дм}^3$). Вміст амонійного азоту також піднімався до критичних значень, проте не перевищував норми. Концентрація кисню не опускалась нижче нормативних значень, в середньому перебуваючи на рівні $7,9\text{ мгO}_2\text{/дм}^3$, що забезпечувалось безперервною аерацією води в акваріумах.

Отже, результати гідрохімічних показників в Досліді 2 вказують на те, що вода містила понаднормову кількість забруднень органічного походження, що зумовило збільшення вмісту у ній нітритів і зростання показника перманганатної окиснюваності. Проте, в акваріумах проводився щоденний водообмін, а це перешкоджало збільшенню концентрації органічних сполук у воді.

При проведенні експериментальних робіт визначали фізіолого-біохімічні показники організму в обох варіантах досліді, відповідно до біологічно активних властивостей амаранту.

Гематологічні показники певною мірою ілюструють проходження обмінних процесів в організмі, об'єктивно відображаючи їх рівень та ступінь реактивності організму.

При дослідженні гематологічних показників в Досліді 1 не відмічено достовірної різниці у кількості еритроцитів та вмісті гемоглобіну у крові коропів дослідної і

контрольної груп, що свідчить про нормальний фізіологічний розвиток риби при згодовуванні амаранту. У крові риби дослідної групи спостерігалася тенденція до збільшення кількості еритроцитів, яка становила $1,200 \pm 0,056$ млн/мкл, що на 15% більше, ніж у контролі. При цьому рівень гемоглобіну в крові риби мав тенденцію до зниження, але різниця склала лише близько 5% (табл. 1).

У Досліді 2 в крові коропів дослідної групи вміст гемоглобіну був на 19% ($p < 0,05$) нижчим відносно контрольної групи. Поряд з цим, спостерігається тенденція до зростання кількості еритроцитів при згодовуванні амаранту: вона склала $0,830 \pm 0,075$, що на 18,1% більше, ніж у контролі (табл. 1).

Отримані результати свідчать про збільшення кількості формених елементів крові в коропів дослідної групи.

Таблиця 1. Фізіолого-гематологічні показники дволіток коропа ($M \pm m, n=3$)

Table 1. Physiological and hematological indicators of two-year-old carp ($M \pm m, n = 3$)

Варіант / Variant	Група риби / Group of fishes	Вміст гемоглобіну, г% / Hemoglobin content, g%	Кількість еритроцитів, млн/мкл / Number of erythrocytes, million / μ l
Дослід 1 / Experiment1	Контрольна / Control	$6,240 \pm 0,890$	$1,020 \pm 0,040$
	Дослідна / Experimental	$5,920 \pm 0,631$	$1,200 \pm 0,056$
Дослід 2 / Experiment2	Контрольна / Control	$6,700 \pm 0,351$	$0,680 \pm 0,012$
	Дослідна / Experimental	$5,430 \pm 0,203^*$	$0,830 \pm 0,075$

Примітка. Тут і надалі — різниці вірогідні порівняно з контролем: * — $p < 0,05$, ** — $p < 0,01$.

Notes. Here and thereafter — the differences are probable compared with the control: * — $p < 0,05$ ** — $p < 0,01$.

Поживність м'яса коропів оцінювали після закінчення експериментальних робіт. В Досліді 1 у м'язах коропів дослідної групи, за згодовування комбікорму з додаванням амаранту, відмічено тенденцію до збільшення вмісту жиру на 26,4% та зменшення вмісту протеїну на 6% відносно контрольної групи риби (табл. 2).

В Досліді 2 у м'язах дволіток коропа дослідної групи містилося на 4,1% ($p < 0,05$) більше сухої речовини — $23,690 \pm 0,220$ та на 5,3% ($p < 0,01$) більше протеїну — $17,150 \pm 0,058$. Також відмічено тенденцію до зростання вмісту жиру на 3,5%. Отримані показники підтверджено додатковими приростами у дослідній групі риби (табл. 2).

Також визначено вплив досліджуваних добавок на активність системи антиоксидантного захисту організму (АОС), зокрема основних ферментів — каталази і СОД — та вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) — дієнових кон'югатів та ТБК-продуктів в гепатопанкреасі і м'язах коропів. Дослідження проведено, виходячи з літературних даних щодо антиоксидантних властивостей амаранту.

Таблиця 2. Хімічний склад м'язів дволіток коропа ($M \pm m$, $n = 3$)
Table 2. Chemical composition of two-year-old carp muscle ($M \pm m$, $n = 3$)

Варіант / Variant	Група риб / Group of fishes	Маса, г / Mass, g	Суха речовина, % / Dry basis, %	Протеїн, % / Protein, %	Жир, % / Fat, %
Дослід 1 / Experiment 1	Контрольна / Control	57,30 $\pm$ 11,67	21,100 $\pm$ 0,058	14,330 $\pm$ 0,203	3,680 $\pm$ 0,882
	Дослідна / Experimental	61,70 $\pm$ 5,49	19,970 $\pm$ 0,088	13,470 $\pm$ 0,260	5,000 $\pm$ 1,528
Дослід 2 / Experiment 2	Контрольна / Control	38,70 $\pm$ 1,20	22,710 $\pm$ 0,176	16,250 $\pm$ 0,173	4,430 $\pm$ 0,132
	Дослідна / Experimental	78,50 $\pm$ 3,50	23,690 $\pm$ 0,220*	17,150 $\pm$ 0,058**	4,590 $\pm$ 0,135

Відомо, що вільні радикали — це активні форми кисню, які є основним чинником порушення у системі ПОЛ клітинних мембран і ДНК. Певна кількість радикалів завжди є присутня в клітинах, та забезпечує різні процеси в організмі. Важливо, щоб реакції окиснення не перевищували реакції відновлення. Захист від вільних радикалів забезпечує антиоксидантна система, яка бере участь у регуляції та знешкодженні порушень у системі ПОЛ.

В Досліді 1 встановлено, що в гепатопанкреасі коропів дослідної групи вміст каталази і продуктів ПОЛ залишається на тому ж рівні, що і в гепатопанкреасі коропів контрольної групи. Спостерігається деяка тенденція до зростання активності СОД в дослідній групі — на 8,3% (табл. 3).

В Досліді 2, за введення до складу основного раціону дволіток коропа амаранту та підвищеного вмісту нітритів у воді, не виявлено достовірної різниці у показниках системи антиоксидантного захисту організму в гепатопанкреасі. Відмічено тенденцію до збільшення активності каталази на 2,9% і зниження вмісту дієнових кон'югатів на 44,1% (табл. 3).

При дослідженні активності антиоксидантних ферментів та вмісту продуктів ПОЛ у скелетних м'язах коропів в Досліді 1 вірогідної різниці активності ферментів між дослідною і контрольною групами не виявлено. Проте, в дослідній групі є тенденція до зниження активності каталази (на 32,6%) а також, як і в гепатопанкреасі, спостерігається тенденція до збільшення вмісту СОД (на 5,9%). При цьому вміст продуктів ПОЛ у скелетних м'язах коропів дослідної групи має тенденцію до зростання на 14,3–15,7% (табл. 4).

В Досліді 2 у м'язах коропів дослідної групи достовірно зросла активність СОД ($p < 0,01$), і склала $2,630 \pm 0,057$ проти $2,190 \pm 0,068$ в контролі. Разом з цим, зростав вміст дієнових кон'югатів на 44,1% ($p < 0,01$). Отримані показники вмісту дієнових кон'югатів потребують додаткової перевірки, оскільки даний показник в гепатопанкреасі і м'язах набув обернено пропорційного значення (табл. 4).

З отриманих результатів можна зробити висновок, що значних змін в активності антиоксидантних ферментів у гепатопанкреасі та скелетних м'язах при згодовуванні коропа амаранту за оптимальних умов вирощування не відмічено. Відмічено збільшення вмісту СОД як в м'язах, так і в гепатопанкреасі, що є важливим показником, оскільки активність даного ферменту є досить високою.

Таблиця 3. Активність антиоксидантних ферментів та вміст продуктів ПОЛ у гепатопанкреасі дволіток коропа ($M \pm m$, $n = 3$)

Table 3. The activity of antioxidant enzymes and lipid peroxidation product in two-year-old carp hepatopancreas ($M \pm m$, $n = 3$)

Варіант / Variant	Група риб / Group of fishes	Каталаза, мкмоль H_2O_2 / хв. $\times$ мг білка / Catalase, $\mu\text{mol } H_2O_2 / \text{minute}^x$ mg protein	СОД, ум. од./ хв. $\times$ мг білка / SOD conv. units per minute ^x mg protein	ТБК-продукти, нмоль / мг білка / TBA-substances nmol / mg protein	Дієнові кон'югати, нмоль / мг білка / Diene conjugates, nmol / mg protein
Дослід 1 / Experiment 1	Контрольна / Control	18,890 $\pm$ 0,061	2,760 $\pm$ 0,123	1,530 $\pm$ 0,107	0,210 $\pm$ 0,102
	Дослідна / Experimental	18,880 $\pm$ 0,078	3,010 $\pm$ 0,062	1,620 $\pm$ 0,131	0,330 $\pm$ 0,121
Дослід 2 / Experiment 2	Контрольна / Control	74,180 $\pm$ 2,868	4,650 $\pm$ 0,077	0,480 $\pm$ 0,091	1,020 $\pm$ 0,298
	Дослідна / Experimental	76,370 $\pm$ 1,109	4,500 $\pm$ 0,132	0,410 $\pm$ 0,091	0,570 $\pm$ 0,134

Таблиця 4. Активність антиоксидантних ферментів та вміст продуктів ПОЛ у м'язах дволіток коропа ($M \pm m$, $n = 3$)

Table 4. The activity of antioxidant enzymes and lipid peroxidation product in two-year-old carp muscle ($M \pm m$, $n = 3$)

Варіант / Variant	Група риб / Group of fishes	Каталаза, мкмоль H_2O_2 / хв. $\times$ мг білка / Catalase, $\mu\text{mol } H_2O_2 / \text{minute}^x$ mg protein	СОД, ум. од./хв. $\times$ мг білка / SOD conv. units per minute ^x mg protein	ТБК-продукти, нмоль / мг білка / TBA-substances nmol / mg protein	Дієнові кон'югати, нмоль / мг білка / Diene conjugates, nmol / mg protein
Дослід 1 / Experiment 1	Контрольна / Control	0,890 $\pm$ 0,120	2,880 $\pm$ 0,242	0,750 $\pm$ 0,011	0,120 $\pm$ 0,009
	Дослідна / Experimental	0,600 $\pm$ 0,202	3,060 $\pm$ 0,225	0,890 $\pm$ 0,070	0,140 $\pm$ 0,049
Дослід 2 / Experiment 2	Контрольна / Control	2,770 $\pm$ 0,230	2,190 $\pm$ 0,068	0,220 $\pm$ 0,064	0,260 $\pm$ 0,049
	Дослідна / Experimental	2,120 $\pm$ 0,084	2,630 $\pm$ 0,057**	0,230 $\pm$ 0,038	0,820 $\pm$ 0,085**

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

При введенні амаранту за оптимальних умов вирощування в кількості 10% до складу корму вміст гемоглобіну в крові практично не змінюється, але є тенденція до збільшення кількості еритроцитів (на 15%). Відмічена чітка тенденція до збільшення вмісту жиру в м'язах (на 26,4%), хоча вміст протеїну є дещо нижчим (на 6%), ніж в контролі. Встановлено деяку тенденцію до збільшення вмісту СОД як в м'язах, так і в гепатопанкреасі (на 5,9–8,3%), що є

важливим показником, оскільки активність даного ферменту є досить високою. Разом з цим, у м'язах коропа є тенденція до зниження вмісту каталази (на 32,6%) і зростання вмісту продуктів ПОЛ (на 14,3–15,7%).

За згодовування амаранту в умовах нітритного забруднення дещо знижується вміст гемоглобіну ($p < 0,05$), але є тенденція до збільшення кількості еритроцитів (на 18,1%). Зростає вміст протеїну на 5,3% ($p < 0,01$) та є тенденція до збільшення вмісту жиру. В м'язах достовірно підвищилася активність СОД ($p < 0,01$), разом з тим зріс вміст дієнових кон'югатів ($p < 0,01$) на 44,1%. В гепатопанкреасі відмічено тенденцію до збільшення активності каталази на 2,9% і тенденцію до зниження вмісту продуктів ПОЛ.

З отриманих результатів досліджень фізіолого-біохімічних показників організму дволіток коропа можна зробити висновок, що біологічні властивості амаранту були краще виражені за впливу стрес-чинника. З метою перевірки отриманих результатів необхідно здійснити пролонговані дослідження в умовах нагульних ставів впродовж вегетаційного періоду.

ЛІТЕРАТУРА

1. Шерман І. М. Ставове рибництво. Київ : Урожай, 1994. 336 с.
2. Гринжевський М. В., Пшеничний Д. Р. Вирощування дволіток коропів у ставах за інтенсивною технологією. Київ : ІНКООС, 2009. 192 с.
3. Харитонов Н. Н. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства. Киев : Наукова думка, 1984. 195 с.
4. Показники крові бичків при хронічному нітратно-нітритному токсикозі / Гутий Б. В. та ін. // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2005. С. 246—249.
5. Доклиническое изучение безопасности фитопрепаратов, обладающих гепатопротекторными свойствами / Крепова Л. В. и др. // Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения: 8 Междунар. съезд «Фитофарм 2004», 21-23 июня 2004 г. : матер. Санкт-Петербург, 2004. С. 111—114.
6. Ноллед Лоуд. Європа проти антибіотиків // Тваринництво України. 2005. № 2. С. 19—20.
7. Карунський О. Й. Хімічний та амінокислотний склад амаранту // Вісник державного агроєкологічного університету. 2008. № 2 (23). С. 190—192.
8. Котов Н. Т., Мірошніченко Л. А., Шаталов Є. П. Кормова культура — амарант // Сучасні аграрні технології. 2012. № 10. С. 14—21.
9. Гальцев В. П., Стоцький П. І., Сєнік В. Б. Огляд застосування амаранту та один зі способів отримання амарантової олії, як джерела сквалену // Аграрний вісник Причорномор'я. 2012. Вип. 63. С. 188—191.
10. Выштакалю А. Б. Физиологическое состояние и продуктивность кур яичного направления при скармливании им витаминно-травяной муки из амаранта : дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13. Казань, 2000. 200 с.
11. Rořkova J., Trřkova M., Herzig I. The use of amaranth grain in diets for broiler chickens and its effect on performance and selected biochemical indicators // Czech Journal Animal Science. 2004. Vol. 49. P. 532—541.
12. The use of amaranth (genus *Amaranthus* L.) in the diets for broiler chickens / Pisarikova B. et. al. // Veterinarni Medicina. 2006. Vol. 51. P. 399—407.

13. Карасьова Н. В. Перспективи використання амаранту // Хранение и переработка зерна. 2009. № 1. С. 31—33.
14. Воронков М. Ф. Насінництво нових сортів амаранту // Підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, асп. і здоб. Харків. нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва, 11–14 січ. 2011 р. : матер. Харків, 2011. С. 60—61.
15. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеиздат, 1970. 412 с.
16. СОУ 05.01–37–385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України. 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
17. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1966. 375 с.
18. Дервиз Г. В., Воробьев А. И. Количественное определение гемоглобина крови посредством аппарата ФЭК // Лабораторное дело. 1969. № 4. С. 2—8.
19. Иванова Н. Т. Методика некоторых гематологических показателей у рыб // Типовые методики исследований продуктивности видов рыб в пределах их ареалов : сб. научн. тр. Вильнюс, 1974. С. 83—90.
20. Методики зоотехнических и биохимических анализов кормов, продуктов обмена и животноводческой продукции. Дубровицы : ВНИИЖ, 1978. 128 с.
21. Стальная И. Д. Метод определения диеновой конъюгации ненасыщенных высших жирных кислот // Современные методы в биохимии. Москва : Медицина, 1977. С. 63—64.
22. Коробейникова Е. Н. Модификация определения продуктов перекисного окисления липидов в реакции с тиобарбитуровой кислотой // Лабораторное дело. 1989. № 7. С. 8—9.
23. Дубинина Е. Е., Сальникова Л. А., Ефимова Л. Ф. Активность и изоферментный спектр супероксиддисмутазы эритроцитов и плазмы крови человека // Лабораторное дело. 1983. № 10. С. 30—33.
24. Корольок М. А., Иванова Л. И., Майорова И. Г. Метод определения активности каталазы // Лабораторное дело. 1988. № 1. С. 16—19.
25. Bradford M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding // Anal. Biochem. 1976. Vol. 72. P. 248—254.
26. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва : Колос, 1969. 256 с.

REFERENCES

1. Sherman, I. M. (1994). *Stavove rybnystvo*. Kyiv: Urozhai.
2. Hrynzhovskyi, M. V., & Pshenychnyi, D. R. (2009). *Vyroshchuvannia dvolitok koropiv u stavakh za intensyvnoiu tekhnolohiieiu*. Kyiv: INKOS.
3. Haritonova, N. N. (1984). *Biologicheskie osnovy intensifikatsii prudovogo rybovodstva*. Kiev: Naukova dumka.
4. Hutyi, B. V., et al. (2005). Pokaznyky krovi bychkiv pry khronichnomu nitratno-nitrytnomu toksykozi. *Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu*, 246-249.
5. Krepova, L. V., et al. (2004). Doklinicheskoe izuchenie bezopasnosti fitopreparatov, obladajushhih gepatoprotektnymi svojstvami. Aktual'nye problemy sozdaniya novyh lekarstvennyh preparatov prirodnogo proishozhdeniya: 8 Mezhdunar. siezd "Fitofarm 2004", 21-23 iyunja 2004 g.: materialy. Sankt-Peterburg, 111-114.

6. Noll, L. (2005). Yevropa proty antybiotyky. *Tvarynnystvo Ukrainy*, 2, 19-20.
7. Karunskyi, O. Y. (2008). Khimichniy ta aminokyslotnyi sklad amarantu. *Visnyk derzhavnoho ahroekologichnoho universytetu*, 2 (23), 190-192.
8. Kotov, N. T., Miroshnychenko, L. A., & Shatalov, Ye. P. (2012). Kormova kultura – amarant. *Suchasni ahrarni tekhnologii*, 10, 14-21.
9. Haltsev, V. P., Stotskyi, P. I., & Sienik, V. B. (2012). Ohliad zastosuvannya amarantu ta odyin z sposobiv otrymannia amarantovoi olii, yak dzherela skvalenu. *Ahrarnyi visnyk Prychornomia*, 63, 188-191.
10. Vyshtakalju, A. B. (2000). Fiziologicheskoe sostojanie i produktivnost' kur jaichnogo napravlenija pri skarmlyvanii im vitaminno-travjanoj muki iz amaranta. *Candidate's thesis*. Kazan'.
11. Roškova, J., Trčková, M., & Herzig, I. (2004). The use of amaranth grain in diets for broiler chickens and its effect on performance and selected biochemical indicators. *Czech Journal Animal Science*, 49, 532-541.
12. Pisarikova, B., et. al. (2006). The use of amaranth (genus *Amaranthus* L.) in the diets for broiler chickens. *Veterinarni Medicina*, 51, 399-407.
13. Karasova, N. V. (2009). Perspektyvy vykorystannia amarantu. *Khranjenje y pererabotka zerna*, 1, 31-33.
14. Voronkov, M. F. (2011). Nasinnystvo novykh sortiv amarantu. *Materialy pidsumk. nauk. konf. prof.-vykl. skladu, asp. i zdob. Kharkiv. nats. ahrar. un-tu im. V. V. Dokuchaieva, 11-14 sich. 2011 r.* Kharkiv, 60-61.
15. Alekin, O. A. (1970). *Osnovy gidrohimii*. Leningrad: Gidrometeoizdat.
16. Voda rybohospodarskykh pidpriemstv. Zahalni vymohy ta normy (2006). *SOU 05.01–37–385:2006. Standart Minahropolityky Ukrainy*. Kyiv: Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy.
17. Pravdin, I. F. (1966). *Rukovodstvo po izucheniju ryb*. Moskva: Pishhevaja promyshlennost'.
18. Derviz, G. V., & Vorob'ev, A. I. (1969). Kolichestvennoe opredelenie gemoglobina krovi posredstvom apparata FJeK. *Laboratornoe delo*, 4, 2-8.
19. Ivanova, N. T. (1974). Metodika nekotorykh gematologicheskikh pokazatelej u ryb. *Tipovye metodiki issledovanij produktivnosti vidov ryb v predelah ih arealov: sb. nauchn. tr.* Vilnius, 83-90.
20. *Metodiki zootehnicheskikh i biohimicheskikh analizov kormov, produktov obmena i zhivotnovodcheskoj produkcii* (1978). Dubrovicy: VNIIZh.
21. Stal'naja, I. D. (1977). Metod opredelenija dienovoj kon'jugacii nenasyshshenyh vysshih zhirnih kislot. *Sovremennye metody v biohimii*. Moskva, 63-64.
22. Korobejnikova, E. N. (1989). Modifikacija opredelenija produktov perekisnogo okislenija lipidov v reakcii s tiobarbiturovoj kislotoj. *Laboratornoe delo*, 7, 8-9.
23. Dubinina, E. E., Sal'nikova, L. A., & Efimova, L. F. (1983). Aktivnost' i izofermentnyj spektr superoksiddismutazy jeritrocytov i plazmy krovi cheloveka. *Laboratornoe delo*, 10, 30-33.
24. Koroljuk, M. A., Ivanova, L. I., & Majorova, I. G. (1988). Metod opredelenija aktivnosti katalazy. *Laboratornoe delo*, 1, 16-19.
25. Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Anal. Biochem.*, 72, 248-254.
26. Plohinskij, H. A. (1969). *Rukovodstvo po biometrii dlja zootehnikov*. Moskva: Kolos.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМАРАНТА (*AMARANTHUS*) В КОРМЛЕНИИ КАРПА ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ

Р. А. Паламарчук, feeding@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН., г. Киев
О. В. Дерень, derenj@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Определение влияния добавления к основному рациону карпа добавки с антиоксидантными свойствами амаранта (*Amaranthus*) на некоторые рыбоводно-физиологические показатели рыб в зависимости от условий выращивания.

Методика. Рыбоводные, ихтиологические и гидрохимические исследования проведены по общепринятым в рыбоводстве методикам. Содержание гемоглобина в крови карпов определяли гемоглобин-цианидным методом. Количество эритроцитов в крови карпов подсчитывали в камере Горяева. Определение содержания белка проводили по методу Брэдфорд. Концентрацию диеновых конъюгатов исследовали методом, основанным на реакции оптической плотности гептанизопропанольного экстракта липидов. Определение концентрации ТБК-активных продуктов проводили спектрофотометрически по цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой. Активность супероксиддисмутазы (СОД) — по определению процента торможения реакции восстановления нитросинего тетразолия в присутствии феназинметасульфата. Активность каталазы — по изменению концентрации H_2O_2 .

Результаты. В исследованиях проанализировано влияние скормливания карпу зерна украинского высокоурожайного кормового сорта амаранта с лечебными свойствами «Харьковский-1» на физиолого-биохимические показатели организма. Проведена сравнительная характеристика эффективности использования данной кормовой добавки в стандартных условиях выращивания и при воздействии стрессового фактора (загрязнение воды в результате интенсификационных мероприятий).

В обоих вариантах опытов в крови рыб опытной группы отмечено увеличение количества форменных элементов крови: наблюдалась тенденция к увеличению количества эритроцитов на 15,0–18,1% относительно контроля. При оптимальных условиях выращивания в мышцах карпов опытной группы есть тенденция к увеличению содержания жира, а при влиянии стресс-факторов возрастает содержание протеина ($p < 0,01$) и жира относительно контроля. При оптимальных условиях выращивания отмечена тенденция к росту активности СОД, как в мышцах, так и в гепатопанкреасе карпа (на 5,9–8,3%). При влиянии стресс-факторов активность данного фермента значительно усиливается ($p < 0,01$), что свидетельствует об активизации антиоксидантных свойств амаранта при возникновении негативных факторов.

Научная новизна. При проведении исследований, исходя из анализа питательности и биологически активных свойств амаранта, впервые изучено его влияние на некоторые рыбоводно-физиологические показатели организма двухлетков карпа и определена эффективность его использования в оптимальных условиях выращивания, а также при воздействии стресс-фактора.

Практическая значимость. Моделирование в лабораторных условиях повышенного содержания нитритов в воде как распространенного в рыбоводстве стресс-фактора и сравнение его влияния на некоторые рыбоводно-физиологические показатели организма карпа является обоснованным и актуальным. При условии получения положительных результатов введения данной кормовой добавки в рацион карпа, можно решить проблемы рыбных хозяйств, вызванные интенсификацией производства, а именно: снижение приростов рыбы и ее выхода вследствие гипоксии и развитие сопутствующих заболеваний вследствие органического загрязнения водной среды.

Ключевые слова: амарант, нивчанский карп, двухлетки, физиолого-биохимические показатели организма, условия выращивания, химический состав воды.

ДЕЯКІ АДАПТИВНІ РЕАКЦІЇ КАРАСЯ СРІБЛЯСТОГО *CARASSIUS AURATUS GIBELIO* (BLOCH) ЗА НАДМІРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ АМОНІЙНИМ АЗОТОМ

Ю. О. Коваленко, kovalenkoyuliia888@gmail.com, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

М. Т. Примачов, alkaloid@lan.ua, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

О. С. Потрохов, alport@bigmir.net, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

О. Г. Зінковський, hydrobiol@igb.ibc.com.ua, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Мета. Встановити морфофізіологічні зміни та рівень накопичення енергоємних сполук у карася сріблястого (*Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782)) за дії різної тривалості підвищеної концентрації амонійного азоту у воді.

Методика. В роботі були визначені морфофізіологічні показники карася сріблястого, а саме: коефіцієнт вгодованості, індексу печінки та селезінки, вміст білків, ліпідів, глікогену в органах і тканинах, а також вміст глюкози в плазмі крові риб. Збір та опрацювання іхтіологічних матеріалів виконані у відповідності до загальновизнаних методик.

Результати. Проведені дослідження показали, що при істотній концентрації амонійного азоту (до 24,3 мг N/дм³) та зі збільшенням часу адаптації (від 3 місяців до декількох поколінь) в одновікових групах риб виявлено різницю в довжині та масі тіла, що підтверджується показниками вгодованості за Фультоном і Кларк.

У карася з найменшим та найбільшим часом адаптації — 3 місяці за концентрації 24 мг N/дм³ та в декілька поколінь до концентрації амонійного азоту 48 мг N/дм³ — індекс печінки був зменшений на 8,0 та 22,7% порівняно з контролем, а у риб, що адаптувалися 3 роки до концентрації 24,3 мг N/дм³, індекс печінки, навпаки, збільшився.

У всіх дослідних групах карася сріблястого було встановлено сталий вміст білка в м'язах. За адаптації риб за 3 місяці вміст ліпідів у їхній печінці був дещо вищий (на 6%), ніж контрольне значення, проте у карася з адаптацією протягом 3 років вміст ліпідів був значно нижчим, ніж у контролі (на 35%), а у риб з тривалою адаптацією вміст ліпідів у печінці наближується до контрольних значень. Також вміст глікогену в печінці піддослідних риб має вищий вміст відповідно до тривалості адаптації (3 місяці та 3 роки), проте за найдовшої адаптації до концентрації амонійного азоту 48 мг N/дм³ накопичення глікогену також наближується до контрольних значень.

Наукова новизна. Вперше вивчені адаптивні можливості карася сріблястого при довготривалому впливі високих концентрацій амонійного азоту за морфофізіологічними показниками.

Практична значимість. Отримані дані можливо використовувати для розуміння особливостей пристосування коропових риб (на прикладі сріблястого карася) до існування у водоймах, що піддаються надмірній дії сполук азоту. Це дасть змогу оцінити у подальшому, як за таких умов формуються нові стійкі/опірні популяції риб.

Ключові слова: карась сріблястий, адаптація, амонійний азот, індекс печінки, індекс селезінки, коефіцієнт вгодованості, білки, ліпіди, глікоген.

**SOME ADAPTIVE REACTIONS OF THE PRUSSIAN CARP
CARASSIUS AURATUS GIBELIO (BLOCH) BASED ON THE EXCESSIVE
LOAD OF AMMONIUM NITROGEN**

Yu. Kovalenko, kovalenkoyuliia888@gmail.com, Institute of Hydrobiology of the Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

M. Primachev, alkaloid@lan.ua, Institute of Hydrobiology of the Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

A. Potrokhov, alport@bigmir.net, Institute of Hydrobiology of the Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

O. Zinkovskiy, hydrobiol@igb.ibc.com.ua, Institute of Hydrobiology of the Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

Purpose. The aim of the study was to find a difference in morphophysiological parameters and in the accumulation of energy-intensive substances in Prussian carp (*Carassius gibelio* Bloch, 1782), which existed at different times and at different concentrations of allochthonous nitrogen in water.

Methodology. In the course of the work, following morphological, physiological and biochemical parameters of the Prussian carp were determined: condition factors, hepatic and splenic indices, protein, lipid and glycogen content in fish organs and tissues, and glucose content in blood plasma. Collection and processing of ichthyological materials were carried out in accordance with generally accepted methods.

Findings. The conducted studies showed that at a significant concentration of ammonium nitrogen up to 24.3 mg N/dm³ and with an increase in the adaptation time (from 3 months to several generations), the even-aged groups of fish had a difference in body length and weight that was confirmed by Fulton's and Clark'.

In the Prussian carp with the smallest and greatest adaptation time (3 months at a concentration of 24 N/dm³ and in several generations) to the ammonium nitrogen concentration of 48 mg N/dm³, the hepatic index was reduced (by 8 and 22.7%) compared to control, while the hepatic index, by contrast, increased compared to control to a concentration of 24.3 mg N/dm³ in fish adapted for 3 years.

In all experimental groups of the Prussian carp, stable protein content in muscles was noted. After adaptation of fish during 3 months, lipid content in the liver was slightly higher than reference values, however, after adaptation during 3 years, lipid accumulation was significantly lower than control (by 35%), and in fish with long-term adaptation, lipid content in the liver approached reference values. Glycogen content in the liver of the experimental fish gradually increased with the duration of adaptation, however, with long-term adaptation to ammonium nitrogen concentration of 48 mg N/dm³, glycogen accumulation also approached the control.

Originality. For the first time, the adaptive features of the Prussian carp in terms of morphophysiological indices have been studied under a prolonged exposure to high concentrations of ammonium nitrogen.

Practical value. The obtained data can be used to understand the peculiarities of adaptation of cyprinids (for example, Prussian carp), to their existence in reservoirs affected by excessive action of nitrogen compounds. This will allow us to evaluate the conditions, under which new resistant fish populations are formed.

Key words: Prussian carp, adaptation, ammonium nitrogen, hepatic index, splenic index, fatness factor, proteins, lipids, glycogen.

**ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ**

Головним джерелом надходження в природні води токсичних речовин як в Україні, так і в інших країнах є промисловість [1–4]. Індустріальне навантаження

токсикантами на екосистеми знизило якість води у багатьох країнах світу [3–5]. Не становлять винятків навіть розвинені країни: наприклад, у США забруднення водних екосистем ставить під загрозу існування 90% зникаючих видів прісноводних риб, молюсків та інших гідробіонтів [1, 6, 7]. Оскільки не всі гідробіонти однаково реагують на зміни у середовищі, виникає необхідність дослідження адаптивних реакцій природних популяцій риб за дії несприятливих чинників. Це зумовлено різними межами стійкості та вразливості різних видів водяних тварин, що, в подальшому, визначає поширення одних і зникання інших. Механізми адаптації риб до діючих чинників можливо оцінити за низкою морфофізіологічних показників, таких як коефіцієнт вгодованості, індекси внутрішніх органів. При цьому важливу роль відіграють енергоємні речовини — білки, ліпіди, глікоген та, зокрема, глюкоза.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

При незбалансованому використанні мінеральних добрив у сільському господарстві та через скиди промислових відходів підвищується вміст сполук азоту практично у всіх водоймах. Це призводить до евтрофікації водойм, особливо в літній період [5], а, отже, має негативний вплив на фізіологічний стан риб, зокрема карася сріблястого. Сполуки азоту надходять крізь зябровий апарат та кишківник риб, тим самим вражаючи їх та інші внутрішні органи, зокрема печінку та селезінку. Таким чином, відбувається порушення обмінних процесів, які можуть відображатись на нейрогуморальній регуляції та ферментативній активності, змінюючи вміст запасних речовин, що може позначитись на успішності зимівлі риб, а також на якості та кількості статевих клітин, а, отже, і на видовому різноманітті іхтіофауни. До несприятливих умов риби вимушені пристосовуватись протягом декількох поколінь.

Тому одним із пріоритетних напрямів досліджень є визначення закономірностей пристосувань риб до тривалого або постійного забруднення води токсичними речовинами. Прикладом утворення популяцій риб, які змогли пристосуватися за екстремальних умов є популяція карася сріблястого, яка мешкає більше 20 років у ставах дендропарку «Олександрія» (м. Біла Церква). У воді цих ставків відмічається суттєве перевищення ГДК_{рибгосп} за амонійним азотом.

Отже, метою роботи було встановлення зміни морфофізіологічних показників та рівня вмісту енергоємних сполук у тканинах карася сріблястого за дії різної тривалості підвищеної концентрації амонійного азоту у воді.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проводились на Білоцерківській експериментальній гідробіологічній станції Інституту гідробіології НАН України впродовж одного місяця (30 діб). Об'єктом дослідження слугували чотири групи карася сріблястого (*Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782)): 1 — контрольна група риб стабільно існувала в оптимальних за показниками амонійного азоту умовах; 2 — група була адаптована до надмірної концентрації йонів амонію впродовж трьох місяців; 3 — група риб, що мешкала у забрудненій водоймі 3 роки; 4 — група риб, що перебувала декілька поколінь за токсичного навантаження амонійним азотом.

Піддослідні риби мали вік від 2+ до 4+. Вибірка складала 5–7 особин для кожної групи риб.

Дослідні водойми характеризувались наступною концентрацією йонів амонію мг N/дм³: 1 — 2,5; 2 — 24,0; 3 — 24,3; 4 — 48. Збільшення рН та температури води призводить до зростання концентрації аміаку відносно загального амонію у воді, що посилює токсичну дію азотних сполук на організм риб [8]. Середня температура води у період досліджень становила °C: 1 — 29; 2 — 26,5; 3 — 26; 4 — 26; а середній водневий показник (рН): 1 — 8,80; 2 — 8,12; 3 — 8,19; 4 — 8,23. Розрахункова середня концентрація аміаку у воді під час досліджень становила N/дм³: 1 — 0,65; 2 — 5,76; 3 — 5,83; 4 — 11,52.

Вміст амонійного азоту у воді встановлювали з використанням реактиву Неслера [9].

Кров у риб відбирали із серця, використовуючи гепаринізований шприц. Потім її центрифугували для виділення плазми 15 хв при 3000 об./хв. У плазмі крові визначали вміст глюкози глюкозооксидазним методом з використанням стандартних комерційних наборів «Філісіт-Діагностика» (Україна). Тканини м'язів, печінки та зябер риб, відібраних безпосередньо після вилову гачковими знаряддями лову, зберігали за температури –22°C. Вміст глікогену в тканинах визначали антроновим методом [10], вміст ліпідів — визначали за допомогою фосфор-ванілінового реагенту (набір «Загальні ліпіди», «Філісіт-Діагностика» (Україна)). Вміст загальних білків встановлювали за методом Лоурі [11]. Вгодваність, індекси печінки та селезінки розраховували за загальноприйнятими методиками, порівнюючи масу органів з масою тіла риб [12, 13].

Дані статистично обробляли з використанням програм «Statistica.10» та «Excel» із пакету «Microsoft Office».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Процес росту риб значною мірою залежить від абіотичних та біотичних чинників середовища, адже він є сумарним виразом специфіки способу життя та індикатором стану популяції риб [4]. Було встановлено, що особини віком 3+, які пристосовувались до амонійного азоту впродовж 3-х місяців (2 група) та 3-х років (3 група), мали відмінності за лінійним ростом та масою тіла. Адже риби з 2-ї групи, які мали менший час адаптації до амонійного азоту (24,3 мг N/дм³), мали перевагу в розмірі у середньому на 1 см, порівняно з карасем з адаптацією 3 роки, за тієї ж концентрації (група 3). Відповідно, група риб з меншим часом адаптації переважає за масою тіла на 37% порівняно з карасем, що пристосовувався впродовж 3-х років. Це також знаходить своє відображення в коефіцієнтах вгодваності, які зазвичай використовують як кількісну характеристику, що свідчить про наявність або відсутність сприятливих умов для існування риб. До того ж, вони є одним із основних критеріїв оцінки фізіологічного стану риб: темпів росту, готовності до нересту та зимівлі, а також екологічного стану водойми, зокрема наявності достатньої кількості кормових об'єктів [14].

Задля об'єктивності оцінки фізіологічного стану риб були проведені розрахунки коефіцієнтів вгодваності за Фультоном та Кларк.

Згідно результатів досліджень за Фультоном, вірогідної різниці між карасем з

контрольної водойми та рибами з найменшою адаптацією (3 місяці, за концентрації амонійного азоту 24,0 мг N/дм³) встановлено не було.

У риб з груп 3 та 4, із середньою та найдовшою адаптованістю (упродовж 3 років та в декількох поколіннях до 24,3 та 48,0 мг N/дм³ азоту відповідно), коефіцієнт за Фультоном зменшився на 16 та 17%, а за Кларк — на 16%. У риб із найдовшою адаптацією суттєвої відмінності щодо контрольної групи риб також встановлено не було (за Кларк).

Рис. 1. Коефіцієнт вгодованості карася під впливом амонійного азоту: 1 — за Фультоном; 2 — за Кларк ($M \pm m$, $n = 5-7$)

Fig. 1. Coefficient of crucian carp condition under the influence of ammonia nitrogen: 1 — per Fulton; 2 — per Clark ($M \pm m$, $n = 5-7$)

Як відомо, розміри внутрішніх органів залежать від довжини тіла й рівня метаболізму; у зв'язку з цим, зазначені показники, можливо, будуть піддаватися змінам. Дані про їх зміни необхідні для оцінки фізіологічного стану риб у зовнішньому середовищі, яке змінюється [15].

Дослідження печінки дають змогу отримати інформацію, яка може бути критерієм визначення фізіологічного стану організму [16, 17]. Зміни її розмірів, кольору та консистенції дають змогу оцінити загальний фізіологічний стан організму, а також, певною мірою, характер патологічних змін в організмі риб [16, 18, 19].

Індекс печінки карасів з адаптацією 3 місяці (група 2) та декілька поколінь (група 4) за 24,0 та 48,0 мг N/дм³ азоту виявився меншим (на 8,0 та 22,7% відповідно), порівняно з контролем. Проте карась з адаптацією протягом 3 роки (група 3) мав дещо збільшений індекс печінки на 13,5% відносно контролю. Це, можливо, вказує на структурно-функціональні зміни у клітинах печінки, за тривалого існування у забруднених азотними сполуками водоймах (рис. 2).

За літературними даними, зростання індексу печінки може бути пов'язаним зі збільшенням енергозатрат на забезпечення життєдіяльності риб [20, 21].

Величина індексу селезінки (органу формування елементів крові, депо крові та імуногенезу) [20] залежить від дії різних несприятливих факторів [21].

За отриманими даними, закономірність показників індексів селезінки у риб з

адаптацією протягом 3 місяців (група 2) і 3 років (група 3) дещо схожа з такою індексів печінки. Адже у риб із найменшим часом адаптації індекс селезінки менший, упорівнянні з контролем на 26,75%, проте у групі риб із середньою тривалістю адаптації він був більшим у 2,6 рази відносно контролю. Це, можливо, пов'язано з різною тривалістю адаптації організму, адже за концентрації азоту 24,3 мг N/дм³ риби існували 3 роки; за цей час у популяції карася виробились та стабілізувались пристосувальні процеси. Втім, зі збільшенням часу адаптації протягом декількох поколінь індекс селезінки наближується до контрольних величин. За цей час утворилася стійка до діючого чинника популяція риб.

У карася із адаптацією протягом кількох поколінь до концентрації азоту 48,0 мг N/дм³ (група 4) індекс селезінки також був на 22,2% більшим, порівняно з контролем. Наближення цих показників до контрольних значень, можливо, вказує на пристосування риб до умов навколишнього середовища, зокрема, дії амонійного азоту.

Зміни у функціональному стані цих органів можуть спричинити такі на більш глибокому рівні, що можливо, відобразиться на різних метаболічних процесах [23].

Рис. 2. Індекс печінки (А) та селезінки (Б) карася під впливом алохтонного азоту ($M \pm m$, $n = 5-7$)

Fig. 2. Index of liver (A) and spleen (B) crucian carp under the influence of allochthonous nitrogen ($M \pm m$, $n = 5-7$)

У всіх дослідних групах карася (що адаптувались 3 місяці, 3 роки та декілька поколінь до 24,0; 24,3 та 48,0 мг N/дм³ азоту відповідно), показники вмісту білка у м'язовій тканині були близькими. Відомо, що за нормального фізіологічного стану в процесі росту у риб збільшується вміст білка у м'язах, а, отже, зростають маса та довжина тіла [16].

У тканинах печінки всіх досліджуваних груп риб було встановлено відмінність за вмістом білка відносно контролю на 23,5; 6,0 та 22,6% відповідно, (рис. 3).

**ДЕЯКІ АДАПТИВНІ РЕАКЦІЇ КАРАСЯ СРІБЛЯСТОГО *CARASSIUS AURATUS GIBELIO* (BLOCH)
ЗА НАДМІРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ АМОНІЙНИМ АЗОТОМ**

Рис 3. Вміст загального білка (А), ліпідів (Б) та глікогену (В): 1— м'язи; 2 — печінка; 3 — зябра ($M \pm m$, $n = 5-7$)

Fig. 3. Content of total protein (A), lipids (B) and glycogen (C): 1— muscle; 2 — liver; 3 — gills ($M \pm m$, $n = 5-7$)

В зябрах карася із меншим часом адаптації (3 місяці та 3 роки) також було встановлено збільшення білка на 31 та 17% щодо контролю, проте у риб з тривалішою адаптацією у зябрах вміст білка був меншим відносно контролю на 7%.

Оскільки ліпіди є основою всіх внутрішньоклітинних мембран, а також відіграють істотну роль у метаболізмі клітин, то рівновага протікання перекисних і антиоксидантних процесів є однією із необхідних умов нормального функціонування організму. Порушення цієї рівноваги завжди свідчить про наявність патології чи стресу [8, 24], адже вміст і склад ліпідів в органах і тканинах риб залежать від фізіологічного стану організму, на який можуть впливати різні фактори водного середовища [25, 26]. За отриманими результатами, вміст ліпідів у м'язах карася з найдовшим періодом адаптації (кілька поколінь) був на рівні контрольних значень, на відміну від риб із

середньою та меншою тривалістю адаптації (3 роки та 3 місяці), в яких вміст ліпідів був більшим на 29 та 47% відносно контролю.

У риб з адаптацією протягом 3 місяців до 24,0 мг N/дм³ азоту (група 2), в печінці вміст ліпідів не відрізнявся вірогідно від контролю (рис. 3), на відміну від карася з середньою та довготривалою адаптацією — 3 місяці та кілька поколінь до 24,3 та 48,0 мг N/дм³ азоту відповідно (групи 2 та 4), в яких було встановлено менший вміст ліпідів у печінці, порівняно з контролем, на 35 та 9%. Це могло бути зумовлено використанням енергоємних сполук для забезпечення сталості організму при незадовільних умовах існування. Але при довготривалій адаптації до впливу амонійного забруднення протягом декількох поколінь), завдяки формуванню стійкої популяції риб, вміст ліпідів в їхній печінці стабілізувався та був вищим, ніж у риб за середньотривалої адаптації.

Зменшення запасів ліпідів може викликати у риб порушення проникності клітинних мембран, деструктивні і функціональні зміни в органах і тканинах, що, можливо, призведе до виснаження організму або зниження його резистентності [8; 27]. Проте, слід враховувати, що рівень та спрямованість ліпідного обміну змінюються в залежності від етапу онтогенезу, статі та фази репродуктивного циклу [28], а також від існування риб за надмірного азотного навантаження.

В органах і тканинах всіх досліджуваних груп риб було встановлено більший вміст глікогену, ніж у контрольній групі. Зокрема, в м'язах його вміст був на 11,00; 27,25 та 22,00%, у печінці — на 12,00, 32,00 і 23,00% та у зябрах на 35,50; 34,80 та 44,00% відповідно вищим, порівняно до контролю.

В ЦНС і в підшлунковій залозі знаходяться детектори рівня глюкози в крові. За відхиленням цього параметру від оптимального значення змінюється секреція гормонів і активність вегетативної нервової системи. Нейрогуморальні сигнали надходять у різні органи, передусім в печінку, де посилюють або послаблюють процеси, спрямовані на нормалізацію вмісту глюкози в крові [29].

Було встановлено, що вміст глюкози в плазмі крові карася залежить від часу адаптації риб до дії амонійного азоту у водоймах. У всіх дослідних групах риб, за адаптації протягом 3 місяців, 3 років та в декількох поколіннях (групи 2, 3 та 4) до концентрацій амонійного азоту 24,0; 24,3 та 48,0 мг N/дм³ відповідно, вміст глюкози в плазмі крові був меншим відносно контролю на 15, 23% та у 2,7 рази відповідно. Це може свідчити про посилене її використання як легкодоступного енергетичного субстрату для забезпечення пластичних потреб [30] — побудову нових клітин та підтримку гомеостазу організму карася.

Під впливом амонійного азоту різної тривалості карась реагував зменшенням вмісту глюкози у крові за вищого вмісту глікогену в органах і тканинах відносно контролю. Отже, глюкоза використовувалася на пристосувальні реакції організму. Проте кількість глікогену постійно відновлювалася завдяки процесам глюконеогенезу [8, 31]. Таким чином організм заощаджує найбільш доступні енергетичні ресурси.

Рис. 4. Вміст глюкози в плазмі крові карася під впливом алохтонного азоту ($M \pm m$, $n = 5-7$)

Fig. 4. Content glucose in blood plasma of crucian carp under the influence of allochthonous nitrogen ($M \pm m$, $n = 5-7$)

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Отримані результати досліджень вказують на те, що за меншого часу адаптації (3 місяці до 24,0 мг N/дм³ азоту) фізіологічний стан риб не зазнає суттєвих змін, адже за коефіцієнтами вгодованості, індексами печінки та селезінки, вмістом загального білка та ліпідів — ця група риб суттєво не відрізняється від особин карася з контрольної групи. Проте ця дослідна група характеризувалась вищим вмістом глікогену в печінці та зябрах (на 12 та 35,0% відповідно) та меншим вмістом глюкози в плазмі крові (на 15,0%) відносно контролю. Це свідчить про переважання глікогенвипасаючих процесів над глікогензатратними.

За 3-річної адаптації до концентрації азоту 24,3 мг N/дм³ карась сріблястий має нижчий коефіцієнт вгодованості за Фультоном і Кларк та менший вміст ліпідів у печінці (на 35,0%) і глюкози (на 23,0%) відносно контролю. Проте ця дослідна група, з середньою тривалістю адаптації, мала вищі індекси печінки та селезінки, більший вміст глікогену в печінці порівняно з контролем на 13,5 та 32,0% відповідно.

Тобто, за середньої адаптації риб до дії амонійного азоту (впродовж 3-х років) у карася відбувається зниження маси тіла, пригнічення росту, збільшення індексів печінки та селезінки і зменшення вмісту енергетичних речовин. Це могло стати наслідком тривалого існування (3 роки) досліджуваної групи риб у таких екологічних умовах.

У групі риб з найбільш тривалим терміном адаптації — впродовж декількох поколінь — до 48,0 мг N/дм³ азоту було відзначено, що коефіцієнти вгодованості, вміст загального білка, ліпідів та глікогену у печінці, зябрах та м'язах наближаються до контрольних значень, що може вказувати на успішне пристосування карася сріблястого до надмірних величин амонійного азоту. В свою чергу, вміст глюкози в плазмі крові був меншим у 2,7 рази, порівняно з контролем. Також можна зазначити, що концентрація глюкози в плазмі крові у всіх дослідних групах пропорційно знижувалась відповідно до тривалості адаптації та концентрації амонійного азоту.

Таким чином, на ранніх етапах пристосування риби є малочутливими до надмірних концентрацій амонійного азоту ($24,0 \text{ мг N/дм}^3$), проте на тривале перебування в забрудненому середовищі карась реагує збільшенням запасу енергоємних речовин та зростанням індексів внутрішніх органів. Хоча за адаптації в декілька поколінь риби мають зменшену печінку, збільшену селезінку та менший рівень глюкози у плазмі крові, порівняно з іншими піддослідними групами риб. Попри це, інші показники, здебільшого, приходять в нормальний стан — наближені до результатів риб з контрольної водойми, що може свідчити про вдале пристосування карася сріблястого до концентрації амонійного азоту 48 мг N/дм^3 .

Отже, отримані результати свідчать про високий рівень опірності сріблястого карася за існування в нетипових та екстремальних для більшості представників їхтіофауни екологічних умовах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Wilcove D. S., Chen L. Y. Management costs for endangered species // *Conservation Biology*. 1998. P. 1405—1407.
2. Boesch D. F., Dennison W., Houde K. Factors in the decline of coastal ecosystems. Washington : Science, 2001. 1591 p.
3. Ситник Ю. М., Арсан О. М., Киричук Г. Є. Вміст іонів важких металів у органах та тканинах моллюсків деяких водойм міської зони Києва // *Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка*. 2012. № 2 (51). С. 230—236. (Серія : Біологія).
4. Дгебуадзе Ю. Ю. Экологические закономерности изменчивости роста рыб : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. биол. наук. Москва, 1998. 54 с.
5. Сыромятникова С. И., Колмыков С. И., Корнилов А. Г. Азотистое загрязнение объектов Белгородской области в сельскохозяйственных и горнопромышленных районах // *Научные ведомости*. 2012. № 15 (134), вып. 20. С. 173—177. (Серия Естественные науки).
6. Швед Т. А., Ісаєв С. Д. Оцінка дотримання вимог щодо прибережних захисних смуг на прикладі об'єктів м. Києва // *Інтегроване управління водними ресурсами : наук. збірник*. 2014. № 2. 121 с.
7. Добрянська Г. М., Мельник А. П., Янович Н. Є. Особливості вміст важких металів в організмі різних видів промислових риб // *Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького*. 2013. Т. 15, № 1 (55), ч. 4. С. 53.
8. Потрохов О. С. Фізіолого-біохімічні механізми адаптації риб до змін екологічних чинників водного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. біол. наук : 03.00.10. Київ : ІГБ НАН України, 2011. 44 с.
9. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Методика определения аммонийного азота и свободного аммиака. Ленинград : Гидрометеиздат, 1973. 103 с.
10. Практикум по биохимии / ред. С. Е. Северина, Г. А. Соловьевой. Москва : МГУ, 1989. 510 с.
11. Lowry J. O. H., Rosenbrough N. J., Farr A.L. et al. Protein measurement with the Folin phenol reagent // *J. Biol. Chem.* 1951. Vol. 193, № 1. P. 265—275.
12. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1966. 376 с.

13. Яржомбек А. А., Лиманский В. В., Щербина Т. В. Справочник по физиологии рыб. Москва : Агропромиздат, 1986. 192 с.
14. Вплив кадмію та хрому (VI) на стан антиоксидантної системи в клітинах крові коропа (*Cyprinus carpio* L.) / Багдай Т. В. та ін. // Біологія тварин. 2015. Т. 17, № 1. С. 11—14.
15. Фунг Н. Д., Распопов В. М., Сергеева Ю. В. Морфобиологическая характеристика заводской молоди осетра для формирования запасов // Вестник АГТУ. 2013. № 2. С. 191—196. (Серия : Рыбное хозяйство).
16. Гейна К. М. Біологічна характеристика промислового стада сріблястого карася (*Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782)) Дніпровсько-Бузької гірлової системи // Рибогоподарська наука України. 2017. № 3. С. 37—49.
17. Клименко О. М., Куновський Ю. В., Присяжнюк Н. М. Динаміка змін фізичних параметрів кровотворних органів коропа впродовж вегетаційного періоду // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2013. № 10 (105). С. 44.
18. Пронина Г. И., Ревякин А. О., Корягина Н. Ю., Патологические изменения поджелудочной железы и печени рыб под действием аллоксана // Биомедицина. 2013. Т. 1, № 3. 59 с.
19. Htun-Han M. The reproductive biology of the dab *Limanda limanda* (L.) in the North Sea: gonosomatic index, hepatosomatic index and condition factor // Fish boil. 1978. P. 369—378.
20. Жиденко А. А. Особенности пластического обмена карпа разного возраста под действием гербецидов // Вісник Дніпропетровського університету. 2008. № 16, т. 3. С. 84—92. (Біологія. Екологія).
21. Рыжков Л. П., Кучко Т. Ю. Селезенка — морфофизиологический индикатор качества состояния популяции рыб // Экологическая физиология водных организмов. Петрозаводск, 1992. С. 11—17.
22. Примачев М. Т. Комплексное влияние паразитов и загрязнения воды на морфо-физиологические показатели рыб // Проблеми функціонування та підвищення продуктивності водних екосистем : II Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. Дніпро : Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017. С. 34—35.
23. Дорохова И. Н. Особенности морфофизиологических и биохимических параметров печени морского ерша из бухт с различным уровнем загрязнения // Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов. Экология физиология и биохимия водных организмов : Обзор статей. 2010. С. 44—47.
24. Кириллов В. Н. Особенности липидного обмена в организме рыб в условиях повышенной минерализации воды // Вестник АГТУ. 2009. № 1. С. 132—133. (Серия : Рыбное хозяйство).
25. Арсан В. О. Енергозабезпечення організму коропа при адаптації до змін концентрації іонів важких металів у водному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.10 «Іхтіологія». Київ, 2004. 20 с.
26. Попова Е. М., Кошій І. В. Ліпіди як компонент адаптації риб до екологічного стресу // Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 49—56.
27. Бычкова Л. И., Симаков Ю. Г. Ихтиотоксикология. Учебно-методический комплекс дисциплин по специальности (направлению) 110901.65 – Водные биоресурсы и аквакультура. 2012. 389 с.

28. Жуков Д. А. Биология поведения: гуморальные механизмы. СПб : Речь, 2007. 443 с.
29. Kennish M. J. Environmental threats and environmental future of estuaries // *Environmental Conservation*. 2002. Vol. 29, № 1. P. 78—107.
30. Причепя М. В., Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. Метаболічні стрес-реакції в окуня *Perca fluviatilis* L. та йоржа *Gymnocephalus cernua* L. за дії фенолу та біхромату калію // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2014. № 1 (58). С. 44—50. (Серія : Біологія).

REFERENCES

1. Wilcove, D. S. & Chen L. Y. (1998). Management costs for endangered species. *Conservation Biology*, 1405-1407.
2. Boesch, D. F., Dennison, W., & Houde, K. (2001). *Factors in the decline of coastal ecosystems*. Washington: Science, 1591.
3. Sytnyk, Yu. M., Arsan, O. M., & Kyrychuk, H. Ye. (2012). Vmist ioniv vazhkykh metaliv u orhanakh ta tkanynakh moliuskiv deiakykh vodoim miskoi zony Kyieva. *Naukovi zapysky Ternopilskoho Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Hnatiuka*, 2 (51), 230-236.
4. Drebuadze, Yu. Yu. (1998). Ekologicheskie zakonomernosti izmenchivosti rosta ryb. *Extended abstract of doctor's thesis*.
5. Syromyatnikova, S. I., Kolmykov, S. I., & Kornilov, A. G. (2012). Azotistoe zagryaznenie ob"ektov Belgorodskoy oblasti v sel'skokhozyaystvennykh i gornopromyshlennyy rayonakh. *Nauchnye vedomosti. Seriya Estestvennye nauki*, 15 (134), 20, 173-177.
6. Shved, T. A., & Isaiev, S. D. (2014). Otsinka dotrymannia vymoh shchodo pryberezhnykh zakhysnykh smuh na prykladi ob'ektiv m. Kyieva. *Intehrovane upravlinnia vodnymi resursamy: nauk. zbirnyk*, 2, 121.
7. Dobrianska, H. M., Melnyk, A. P., & Yanovych, N. Ye. (2013). Osoblyvosti vmist vazhkykh metaliv v orhanizmi riznykh vydiv promyslovykh ryb. *Naukovyi visnyk LNUVMBT im. S. Z. Hzhyskoho*, 15, 1 (55), 4, 53.
8. Potrohov, O. S. (2011). Fiziologo-biohimichni mehanizmy adaptacii' ryb do zmin ekologichnykh chynnykiv vodnogo seredovyshha. *Extended abstract of doctor's thesis*. Kyi'v: IGB NAN Ukrainy.
9. Alekin, O. A., Semenov, A. D., & Skopintsev, B. A. (1973). Metodika opredeleniya ammoniynogo azota i svobodnogo ammiaka. Leningrad: Gidrometeoizdat.
10. Severina, S. E., & Solov'evoy, G. A. (Eds.) (1989). *Praktikum po biokhimii*. Moskva: MGU.
11. Lowry, J. O. H., Rosenbrough, N. J., & Farr, A. L. et al. (1951). Protein measurement with the Folin phenol reagent. *J. Biol. Chem. Vol.*, 193, 1, 265-275.
12. Pravdin, I. F. (1966). *Rukovodstvo po izucheniyu ryb*. Moskva: Pishch. promyshlennost'.
13. Yarzhombek, A. A., Limanskiy, V. V., & Shcherbina, T. V. (1986). *Spravochnik po fiziologii ryb*. Moskva: Agropromizdat.
14. Bagday, T. V., Snitins'kiy, V. V., Antonyak, G. L., & Oleksyuk, N. P. (2015). Vpliv kadmiyu ta khromu (VI) na stan antioksidantnoi sistemi v klitinakh krovi koropa (*Cyprinus carpio* L.). *Biologiya tvaryn*, 17(1), 11-14.

15. Fung, N. D., Raspopov, V. M., & Sergeeva, Yu. V. (2013). Morfobiologicheskaya kharakteristika zavod skoy molodi osetra dlya formirovaniya zapasov. *Vestnik AGTU. Ser.: Rybnoe khozyaystvo*, 2, 191-196.
16. Haina, K. M. (2017). Biolohichna kharakterystyka promyslovoho stada sribliastoho karasia (*Carassis auratus gibelio* (Bloch, 1782)) Dniprovsko-Buzkoï hyrlovoi systemy. *Rybohopodarska nauka Ukrainy*, 3, 37-49.
17. Klymenko, O. M., Kunovskyi, Yu. V., & Prysiazhniuk, N. M. (2013). Dynamika zmin fizychnykh parametriv krovotvornykh orhaniv koropa vprodovzh vechetatsiinoho periodu. *Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktii tvarynnytstva*, 10 (105), 44.
18. Pronina, G. I., Revyakin, A. O., & Koryagina, N. Yu. (2013). Patologicheskie izmeneniya podzheludochnoy zhelezy i pecheni ryb pod deystviem alloksana. *Biomeditsina*, 1, 3, 59.
19. Htun-Han, M. (1978). The reproductive biology of the dab *Limanda limanda* (L.) in the North Sea gonosomatic index, hepatosomatic index and condition factor. *Fish boil*, 369-378.
20. Zhidenko, A. A. (2008). Osobennosti plasticheskogo obmena karpa raznogo vozrasta pod deystviem gerbetsidov. *Visnik Dnipropetrovs'kogo universitetu. Biologiya. Ekologiya*, 16, 3, 84-92.
21. Ryzhkov, L. P. (1992). Selezhenka – morfofiziologicheskiiy indikator kachestva sostoyaniya populyatsii ryb. *Ekologicheskaya fiziologiya vodnykh organizmov*, 11-17.
22. Primachev, M. T. (2017). Kompleksnoe vliyanie parazitov i zagryazneniya vody na morfo-fiziologicheskie pokazateli ryb. *Problemy funktsionuvannia ta pidvyshchennia produktyvnosti vodnykh ekosystem: II Mizhnar. nauk.-prakt. konf.: tezy dop.* Dnipro: Dniprovskiy natsionalnyi universytet imeni Olesia Honchara, 34-35.
23. Dorokhova, I. N. (2010). Osobennosti morfofiziologicheskikh i biokhimicheskikh parametrov pecheni morskogo ersha iz bukht s razlichnym urovnem zagryazneniya. *Sovremennye problemy fiziologii i biokhimii vodnykh organizmov. Ekologiya fiziologii i biokhimii vodnykh organizmov: Obzor statey*, 44-47.
24. Kirillov, V. N. (2009). Osobennosti lipidnogo obmena v organizme ryb v usloviyakh povyshennoy mineralizatsii vody. *Vestnik AGTU. Seriya: Rybnoye khozyaystvo*, 1, 132-133.
25. Arsan, V. O. (2004). Enerhozabezpechennia orhanizmu koropa pry adaptatsii do zmin kontsentratsii ioniv vazhkykh metaliv u vodnomu seredovyshchi. *Extended abstract of candidate's thesis*.
26. Popova, E. M., & Koshchii, I. V. (2007). Lipidy yak komponent adaptatsii ryb do ekolohichnoho stresu. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 49-56.
27. Bychkova, L. I., & Simakov, Yu. G. (2012). Ikhtiotoksikologiya. *Uchebno-metodicheskiiy kompleks distsiplin po spetsial'nosti (napravleniyu): 110901.65 – Vodnye bioresursy i akvakul'tura*.
28. Zhukov, D. A. (2007). *Biologiya povedeniya: humoral'nyye mekhanizmy*. Sankt-Peterburg: Rech.
29. Kennish, M. J. (2002). Environmental threats and environmental future of estuaries. *Environmental Conservation*, 29, 1, 78-107.
30. Prychepa, M. V., Potrohov O. S., & Zin'kovs'kyj O. G. (2014). Metabolichni stres-reakcii' v okunja *Perca fluviatilis* L. ta jorzha *Gymnocephalus cernua* L. za dii' fenolu ta bihromatu kaliju. *Naukovi zapysky Ternopil's'kogo nacional'nogo pedagogichnogo universytetu imeni Volodymyra Gnatjuka. Ser. Biologiya*, 1 (58), 44-50.

НЕКОТОРЫЕ АДАПТИВНЫЕ РЕАКЦИИ КАРАСЯ СЕРЕБРЯНОГО
CARASSIUS AURATUS GIBELIO (BLOCH)
ПРИ ЧРЕЗМЕРНОЙ НАГРУЗКЕ АММОНИЙНЫМ АЗОТОМ

Ю. А. Коваленко, kovalenkoyuliia888@gmail.com, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

М. Т. Примачёв, alkaloid@lan.ua, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

А. С. Потрохов, alport@bigmir.net, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

О. Г. Зиньковский, hydrobiol@igb.ibc.com.ua, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

Цель. Целью работы было установление различий в морфофизиологических показателях и в накоплении энергоемких веществ у серебряного карася (*Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782)), содержащегося в разные промежутки времени при различной концентрации аллохтонного азота в воде.

Методика. В ходе работы были определены морфофизиологические показатели карася серебряного, а именно: коэффициенты упитанности, индексы печени и селезенки, содержание белков, липидов и гликогена в органах и тканях рыб, а также содержание глюкозы в плазме крови. Сбор и обработка ихтиологических материалов были выполнены в соответствии с общепринятыми методиками.

Результаты. Проведенные исследования показали, что при существенной концентрации аммонийного азота — до $24,3 \text{ мг N/дм}^3$ — и с увеличением времени адаптации (от 3 месяцев до нескольких поколений), в одновозрастных группах рыб наблюдается разница в длине и массе тела, что подтверждается показателями упитанности по Фультону и Кларк.

У карася с наименьшим и наибольшим временем адаптации — 3 месяца при концентрации $24,0 \text{ мг N/дм}^3$ и несколько поколений к концентрации аммонийного азота $48,0 \text{ мг N/дм}^3$ — индекс печени был меньше на 8,0 и 22,7% по сравнению с контролем, а у рыб с адаптацией в течение 3 лет к концентрации $24,3 \text{ мг N/дм}^3$ индекс печени, напротив, увеличился относительно контроля.

Во всех опытных группах карася серебряного было отмечено устойчивое содержание белка в мышцах. При адаптации рыб в течение 3-х месяцев, содержание липидов в печени рыб несколько превышало контрольное значение, однако у карася с адаптацией в 3 года, содержание липидов было значительно ниже контроля (на 35%), а у рыб с продолжительной адаптацией содержание липидов в печени приближается к контрольным значениям. Также в печени подопытных рыб с непродолжительными адаптациями (3 месяца и 3 года), содержится больше гликогена, однако при длительной адаптации к концентрации аммонийного азота $48,0 \text{ мг N/дм}^3$ содержание гликогена приближается к контрольным значениям.

Научная новизна. Впервые изучены адаптивные возможности карася серебряного по морфофизиологическим показателям при длительном воздействии высоких концентраций аммонийного азота.

Практическое значение. Полученные данные можно использовать для понимания особенностей приспособления карповых рыб (на примере серебряного карася) к существованию в водоемах, подвергающихся чрезмерному действию соединений азота. Это позволит оценить в дальнейшем, как при таких условиях формируются новые стойкие популяции рыб.

Ключевые слова: серебряный карась, адаптация, аммонийный азот, индекс печени, индекс селезенки, коэффициент упитанности, белки, липиды, гликоген.

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 130-136
DOI: 10.15407/fsu2018.02.130
УДК: 597-1.05:[639.371.52:639.3.032](477)

Received 05.03.18
Received in revised form 17.04.18
Accepted 20.04.18

ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНА ОЦІНКА ПОМІСНИХ КОРОПІВ ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ ВІД СХРЕЩУВАННЯ АНТОНІНО- ЗОЗУЛЕНЕЦЬКОГО І ЛЮБІНСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПІВ УКРАЇНСЬКОЇ РАМЧАСТОЇ ПОРОДИ

Б. О. Грішин, Grishnbo@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

І. І. Грициняк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

І. А. Особа, iryna_osoba@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Охарактеризувати окремі фізіолого-біохімічні особливості помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопорідних типів української рамчастої породи. Встановити особливості білкового обміну в організмі досліджуваних груп коропа.

Методика. Для проведення досліджень були використані класичні біохімічні методи визначення концентрації білка та співвідношення його фракцій у тканинах.

Результати. Показано особливості білкового обміну в організмі помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопорідних типів української рамчастої породи. Зокрема наведено дані про вміст білків у тканинах скелетних м'язів та гепатопанкреасу досліджуваних груп риб.

Наукова новизна. Вперше здійснено аналіз білкового обміну в організмі помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопорідних типів української рамчастої породи.

Практична значимість. Білковий обмін значною мірою визначає фізіолого-біохімічний гомеостаз організму риб. Тому концентрація білка у тканинах, а також співвідношення окремих білкових фракцій відіграють важливу роль у наданні оцінки біологічних особливостей досліджуваних груп коропа та відображають функціонування основних метаболічних систем в його організмі.

Ключові слова: фізіолого-біохімічна оцінка, білковий обмін, короп, гібридизація, скелетні м'язи, гепатопанкреас

PHYSIOLOGICAL-BIOCHEMICAL EVALUATION OF CROSS-BRED CARPS OF THE FIRST GENERATION FROM CROSSING ANTONINSKO-ZOZULENETS AND LUBIN INTRABREED TYPES OF UKRAINIAN FRAMED BREED

B. Grishyn, Grishnbo@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

I. Hrytsyniak, info@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

I. Osoba, iryna_osoba@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To characterize some physiological-biochemical peculiarities of cross-bred carp of the first generation from crossing Antoninsko-Zozulenets and Lubin intrabreed types of Ukrainian framed breed. To establish the peculiarities of protein metabolism in the organism of the studied carp groups.

Methodology. Classical biochemical methods of the determination of protein concentration and ratios of its fractions in tissues were used for the study.

© Б. О. Грішин, І. І. Грициняк, І. А. Особа, 2018

Findings. Peculiarities of protein metabolism in the organism of cross-bred carp of the first generation from crossing Antoninsko-Zozulenets and Lubin intrabreed types of Ukrainian framed breed were demonstrated. In particular, data on protein content in skeletal muscle tissues and hepatopancreas of the studied fish groups were provided.

Scientific novelty. An analysis of protein metabolism in the organism of cross-bred carp of the first generation from crossing Antoninsko-Zozulenets and Lubin intrabreed types of Ukrainian framed breed was performed for the first time.

Practical value. Protein metabolism defines physiological-biochemical homeostasis of fish organism in a significant degree. Therefore, protein concentration in tissues as well as the ratio of some protein fractions play an important role in the evaluation of biological peculiarities of the examined carp groups and reflect the functioning of major metabolic systems in fish organism.

Key words: physiological-biochemical evaluation, protein metabolism, carp, hybridization, skeletal muscles, hepatopancreas.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

У забезпеченні життєдіяльності організму риб важлива роль належить білкам, оскільки вони є структурними елементами тканин, а їх синтез тісно пов'язаний з процесами органогенезу та ростом риб. На відміну від ссавців, у риб частка амінокислот лише в субстратному забезпеченні енергетичного обміну може складати 50–90% [1]. Це пояснюється дією багатьох екстремальних чинників навколишнього середовища, і потребує швидкого вилучення метаболічної енергії з легкодоступних субстратів для забезпечення нормального функціонування їхнього організму [2]. Значна кількість білків синтезується в печінці риб, а їх вміст регулюється інтенсивністю анаболічних та катаболічних процесів. Відомо, що на вміст білків у тканинах риб також впливає низка чинників екзогенного характеру, зокрема рівень забезпечення природною кормовою базою, умови вирощування, сезон [1–3]. Оскільки рівень метаболічних процесів детермінований також видовою приналежністю, науково-практичний інтерес становить дослідження окремих показників білкового обміну у тканинах помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопорідних типів української рамчастої породи та їх батьківських форм.

В організмі тварин, в тому числі і риб, білки знаходяться у динамічному стані, який забезпечується за рахунок процесів постійного синтезу та розпаду. Останні детерміновані генетично, а також залежать від умов утримання. Інтенсивність синтезу білків у тканинах коропа значною мірою визначається рівнем протеїну та вмісту незамінних амінокислот у складі природної кормової бази та штучних кормів [1, 2].

Одним із шляхів підвищення продуктивності коропів є вирощування їх гібридних форм, одержаних при схрещуванні їх з коропами інших порід, а також з амурським сазаном. Проведені в останні роки дослідження на прісноводних і морських рибах свідчать про позитивний вплив гетерозису на ріст, резистентність і якість м'яса риб [3], проте біохімічні механізми цього впливу вивчені мало.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

В умовах постійної інтенсифікації рибництва, а також внаслідок дії антропогенного навантаження погіршується стан культивованих водойм, що призводить до зниження їх продуктивності. Одночасно потреба регулярного наповнення ринку вимагає пришвидшених темпів вирощування риби. Тому проблема оптимізації риборозведення є актуальною і одним із шляхів її вирішення є використання промислової гібридизації для вирощування товарної риби [3].

Дані з характеристики фізіолого-біохімічних особливостей помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопорідних типів української рамчастої породи у літературі відсутні, що і визначає актуальність їх вивчення. Тому метою роботи було визначення концентрації білка та співвідношення його фракцій у тканинах гепатопанкреасу та скелетних м'язів помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопорідних типів української рамчастої породи.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Експериментальний матеріал було отримано з господарства ТОВ «Рибне господарство «Меркурій» Вінницького району Вінницької області протягом 2013–2015 рр. Експериментальну частину роботи було проведено у лабораторних умовах Інституту біології тварин НААН та Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН у декілька етапів.

Для досліджень використали тканини печінки та скелетних м'язів дволіток помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопорідних типів української рамчастої породи та їх батьківських форм. Тканини відбирали *ex tempore* на льодяне середовище виділення та заморожували у рідкому азоті для їх повноцінного зберігання до моменту виконання експериментальної частини роботи.

Для проведення досліджень були використані класичні біохімічні методи визначення концентрації білка та співвідношення його фракцій у тканинах за допомогою методу електрофорезу у поліакриламідному гелі [4, 5].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Однією з основних метаболічних систем, що визначає фізіолого-біохімічний гомеостаз організму, є білковий обмін. Відомо, що синтез білків відіграє важливу роль у процесах росту та розвитку коропа [6, 7]. Концентрація білка сироватки крові, а також співвідношення окремих білкових фракцій відіграють важливу роль у наданні оцінки біологічних особливостей виду, оскільки свідчать про стан білкового синтезу та обміну в організмі на момент визначення, а також про рівень активності імунної системи, на який вказує вміст γ -глобулінів [3].

Рационалізація рибогосподарської діяльності вимагає чіткого контролю біохімічних показників, які відображають фізіологічну картину стану організму риб у заданих умовах вирощування та сприяють покращенню останніх. Тому концентрація білка, а також співвідношення окремих білкових фракцій в тканинах

коропів різного генезу відображає функціональний стан їх організму, а також якість умов утримання риби. При попередньому обстеженні досліджуваної риби, яке проводилося перед відбором тканин, не було виявлено будь-яких захворювань. У зв'язку з цим, можна стверджувати, що умови вирощування досліджуваних груп коропа були задовільними.

З одержаних результатів досліджень, наведених у таблиці 1, видно, що різниці у загальному вмісті білків у печінці дволіток любінських рамчастих коропів, порівняно з їх вмістом у печінці дволіток антоніно-зоуленецьких рамчастих коропів, порівняно з їх гібридними формами, невірогідні ($P < 0,5$).

Таблиця 1. Вміст білків у тканинах дволіток помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зоуленецького і любінського внутрішньопорідних типів української рамчастої породи та їх батьківських форм, г% ($M \pm m$; $n = 4$)

Table 1. The content of proteins in the tissues of cross breed two-year-old carps of the first generation from the interbreeding of the Antoninsko-zozulenets and Lyubin intrabreed types of Ukrainian frame breed and their parental forms, % ($M \pm m$; $n = 4$)

Групи риби			
ЛРК / LFC	♂ЛРК × ♀АЗРК / ♂LFC × ♀AZFC	АЗРК / AZFC	♂АЗРК × ♀ЛРК / ♂AZFC × ♀LFC
гепатопанкреас / hepatopancreas			
17,34±0,36	17,27±0,51	17,50±0,30	17,21±0,77
скелетні м'язи / skeletal muscles			
16,4±0,72	16,80±0,41	16,60±0,41	16,75±0,61

У співвідношенні окремих білкових фракцій у печінці дволіток вихідних форм коропів, порівняно з їх вмістом у гепатопанкреасі помісних, різниці, за винятком фракції γ -глобулінів, також невірогідні (рис. 1).

Більшу частину білків у печінці риби всіх генотипів становить фракція білків, яка відповідає за електрофоретичною рухливістю альбумінам (31,3–32,1%). Далі ідуть α_1 -глобуліни (18,5–19,0%), β_1 -глобуліни (15,9–16,5%), β_2 -глобуліни (14,0–14,3%), γ -глобуліни (9,3–10,9%), α_2 -глобуліни (9,1–9,4%), що відображено на рисунку 1.

У тканині гепатопанкреасу помісної групи ♂ЛРК × ♀АЗРК коропів виявлено вірогідно більший вміст γ -глобулінів ($P < 0,05$), ніж у печінці чистопорідних рамчастих коропів, що, на нашу думку, свідчить про позитивний вплив гетерозису на функціонування імунної системи досліджуваних груп риби, оскільки відомо про роль γ -глобулінів у формуванні імунного статусу організму риби. Загалом, з одержаних результатів випливає, що вихідні батьківські та помісні групи коропів мало відрізнялися між собою за загальним вмістом білків та співвідношенням окремих білкових фракцій. Це, насамперед, зумовлено вирощуванням їх в однакових умовах.

Невірогідна також різниця у вмісті окремих білкових фракцій у скелетних м'язах дволіток любінських рамчастих коропів, порівняно з їх вмістом у скелетних м'язах антоніно-зоуленецьких рамчастих коропів ($P < 0,5$) (рис. 2).

Рис. 1. Співвідношення окремих білкових фракцій в гепатопанкреасі дволіток помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопорідних типів української рамчастої породи та їх батьківських форм, % ($M \pm m$; $n = 4$)

Fig. 1. The ratio of the individual protein fractions in the hepatopancreas of two-year-olds cross breed carp of the first generation from the interbreeding of the Antoninsko-Zozulenetskiy and Lyubin intrabreed types of Ukrainian frame breed and their parental forms, % ($M \pm m$; $n = 4$)

Рис. 2. Співвідношення окремих білкових фракцій в скелетних м'язах дволіток помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопорідних типів української рамчастої породи та їх батьківських форм, % ($M \pm m$; $n = 4$)

Fig. 2. The ratio of the individual protein fractions in the skeletal muscles of two-year-olds cross breed carp of the first generation from the interbreeding of the antonino-zozulenetskiy and Lyubin intrabreed types of Ukrainian frame breed and their parental forms, % ($M \pm m$; $n = 4$)

У помісей любінських рамчастих коропів з антоніно-зозуленецькими рамчастими коропами виявлено вірогідно вищий вміст фракції білків, які за електрофоретичною рухливістю відповідають фракції β_1 -глобулінів та γ -глобулінам ($P < 0,05$), ніж у скелетних м'язах чистопорідних рамчастих коропів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Різниця у загальному вмісті білків у печінці дволіток любінських рамчастих коропів, порівняно з їх вмістом у печінці дволіток антоніно-зозуленецьких рамчастих коропів та їх гібридних форм, невірогідні.

Проте, як у тканині гепатопанкреасу, так і у скелетних м'язах помісних груп виявлено вірогідно більший вміст γ -глобулінів порівняно з їх вмістом у вихідних батьківських форм коропа. На нашу думку, це свідчить про позитивний вплив гібридизації коропів любінського та антоніно-зозуленецького внутрішньопорідних типів коропів української рамчастої породи на стан білкового обміну та природної резистентності в організмі отриманих помісей.

ЛІТЕРАТУРА

1. Курант В. З. Метаболізм радіоактивно мічених амінокислот в організмі коропа за дії йонів металів // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. 2013. № 2 (55). С. 5—9. (Серія : Біологія).
2. Физиология и биохимия пищеварения животных и человека / Рыбальченко В. К. и др. Киев : Фитоцентр, 2002. С. 366.
3. Фізіолого-біохімічна характеристика м'яса дволіток мало лускатих коропів різного походження / Марценюк В. П. та ін. // Розведення і генетика тварин. 2007. Вип. 41. С. 127—133.
4. Мауер Г. Диск электрофорез. Теория и практика электрофореза в полиакриламидном геле. Москва : Мир, 1971. 248 с.
5. Гааль Э., Медьеша Г., Верецкеи Л. Электрофорез в разделении биологических макромолекул. Москва : Мир, 1982. 448 с.
6. Пилипець А. Біохімічний склад, синтетичні і енергетичні процеси у скелетних м'язах коропа різного віку наприкінці літнього і зимового періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук. Львів, 2003. 16 с.
7. Аминева В. А., Яржомбек А. А. Физиология рыб. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1984. С. 72—95.

REFERENCES

1. Kurant, V. Z. (2013). Metabolism radioaktivno michenykh aminokyslot v orhanizmi koropa za dii yoniv metaliv. *Nauk. zap. Ternop. nats. ped. un-tu. Ser. Biol.*, 2(55), 5-9.
2. Rybal'chenko, V. K., Beregovaja, T. V., Klevec, M. Ju., Kondratjuk, E. A., Motuznyj, V. O., Ostrovskaja, G. V., Rybal'chenko, T. V., & Skljarov, A. Ja. (2002). *Fiziologija i biohimija pishhevarenija zhivotnyh i cheloveka*. Kyiv: Fitocentr, 366.
3. Martseniuk, V. P., Yefimenko, M. Ia., Bekh, V. V., & Rekrut, S. V. (2007). Fiziolohe-biokhimichna kharakterystyka miasa dvolitok malo luskatykh koropiv riznoho pokhodzhennia. *Rozvedennia i henetyka tvaryn*, 41, 127-133.

4. Mauer, H. (1971). *Disk elektroforez. Teoriia i praktika elektroforeza v polyakrylamidnom hele*. Moskva: Myr.
5. Haal, E., Medeshy, H., & Veretskey, L. (1982). *Elektroforez v razdelenyy byolohycheskykh makromolekul*. Moskva: Myr.
6. Pylypets, A. (2003). Biokhimichniy sklad, syntetychni i enerhetychni protsesy u skeletnykh miazakh koropa riznoho viku naprykintsi litnoho i zymovoho periodu. *Extended abstracts of candidate's thesis*. Lviv.
7. Amineva, V. A., & Jarzhombek, A. A. (1984). *Fiziologija ryb*. Moskva: Legkaja i pishhevaja prom-st', 72-95.

**ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОМЕСНЫХ КАРПОВ ПЕРВОГО
ПОКОЛЕНИЯ ОТ СКРЕЩИВАНИЯ АНТОНИНСКО-ЗОЗУЛЕНЕЦКОГО
И ЛЮБЕНЬСКОГО ВНУТРИПОРОДНЫХ ТИПОВ УКРАИНСКОЙ
РАМЧАТОЙ ПОРОДЫ**

Б. О. Гришин, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

И. И. Грициняк, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

И. А. Особа, iryna_osoba@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Охарактеризовать отдельные физиолого-биохимические особенности поместных карпов первого поколения от скрещивания антонинско-зозуленецкого и Любень внутривидовых типов украинской рамчатой породы. Установить особенности белкового обмена в организме исследуемых групп карпа.

Методика. Для проведения исследований были использованы классические биохимические методы определения концентрации белка и соотношения его фракций в тканях.

Результаты. Показаны особенности белкового обмена в организме помесных карпов первого поколения от скрещивания антонинско-зозуленецкого и любеньского внутривидовых типов украинской рамчатой породы. В частности приведены данные о содержании белков в тканях скелетных мышц и гепатопанкреаса исследуемых групп рыб.

Научная новизна. Впервые осуществлен анализ белкового обмена в организме поместных карпов первого поколения от скрещивания антонинско-зозуленецкого и любеньского внутривидовых типов украинской рамчатой породы.

Практическая значимость. Белковый обмен в значительной степени определяет физиолого-биохимический гомеостаз организма рыб. Поэтому концентрация белка в тканях, а также соотношение отдельных белковых фракций играют важную роль в предоставлении оценки биологических особенностей исследуемых групп карпа и отражают функционирование основных метаболических систем в его организме.

Ключевые слова: физиолого-биохимическая оценка, белковый обмен, карп, гибридизация, скелетные мышцы, гепатопанкреас.

ВПЛИВ ПЕКАРСЬКИХ ДРІЖДЖІВ НА ЛІПІДНИЙ ОБМІН МОЛОДІ РОСІЙСЬКОГО ОСЕТРА (*ACIPENSER GUELLENSTAEDTII* BRANDT)

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

І. І. Грициняк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Ю. М. Забитівський, yurafish@ukr.net, Львівська дослідна станція ІРГ НААН, смт Великий Любін

Мета. Охарактеризувати окремі фізіолого-біохімічні особливості впливу згодовування різних концентрацій інактивованих пекарських дріжджів на ліпідний обмін молоді російського осетра.

Методика. Для проведення досліджень були використані класичні біохімічні методи визначення концентрації загальних ліпідів та співвідношення їх фракцій у печінці.

Результати. Показано особливості ліпідного обміну в організмі молоді російського осетра (на прикладі печінки) за додавання до основного корму пекарських дріжджів. Зокрема, наведено дані про вміст загальних ліпідів, діацилгліцеролів (ДАГ), неетерифікованих жирних кислот (НЕЖК), фосфоліпідів, ефірів холестеролу у тканинах печінки піддослідних риб.

Наукова новизна. Вперше здійснено аналіз ліпідного обміну в печінці молоді російського осетра при згодовуванні їй інактивованих пекарських дріжджів у якості додаткового корму.

Практична значимість. Ліпідний обмін значною мірою визначає фізіолого-біохімічний статус організму риб. Тому концентрація загальних ліпідів у тканинах печінки, а також співвідношення їх окремих фракцій мають велике значення у наданні оцінки впливу згодовування пекарських дріжджів молоді російського осетра та опосередковано відображають загальний фізіолого-біохімічний стан його організму.

Ключові слова: молодь російського осетра, пекарські дріжджі, ліпідний обмін, печінка, триацилгліцероли (ТАГ), діацилгліцероли (ДАГ), неетерифіковані жирні кислоти (НЕЖК), фосфоліпіди, ефіри холестеролу, фізіолого-біохімічна оцінка.

INFLUENCE OF BAKER'S YEAST ON LIPID METABOLISM OF RUSSIAN STURGEON (*ACIPENSER GUELLENSTAEDTII* BRANDT) FINGERLING

М. Simon, seemann.sm@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

I. Hrytsyniak, info@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Yu. Zabytivskyi, yurafish@ukr.net, Lviv Experimental Station of Institute of Fisheries NAAS, Velykyi Lyubin

Purpose. To characterize the individual physiological and biochemical features of the effects of feeding various concentrations of inactivated baker's yeast on the lipid exchange of young Russian sturgeon fingerling.

Methodology. To conduct research, we used classical biochemical methods for determining the concentration of total lipids and the ratio of their fractions in the liver.

Findings. Features of lipid metabolism in the organism of Russian sturgeon fingerling are shown on the example of the liver, with the addition of baker's yeast to the main food. In particular, given the information on content of total lipids, diacylglycerols (DAG), nonesterified fatty acid (NEFA), phospholipids, cholesterol esters in the liver tissues of experimental fishes.

© М. Ю. Симон, І. І. Грициняк, Ю. М. Забитівський, 2018

Scientific novelty. For the first time carried out the analysis of lipid metabolism in the liver of russian sturgeon fingerling at feeding her inactivated baker's yeast as a supplementary feed. Thus, for the organism of sturgeon fingerling, which actively gain muscle mass in conditions of intensification, feed with a yeast content of 5% will be more effective in view of lipid metabolism in the liver. Such concentration will promote less stress on the body from the side of metabolites and increase the growth potential of this fish.

Practical value. Lipid metabolism largely determines the physiological and biochemical status of the fish organism. Therefore, the concentration of total lipids in the liver tissues, as well as the ratio of their individual fractions, are of great importance in providing an assessment of the effect of feeding baker's yeast on Russian sturgeon fingerling and indirectly reflect the general physiological and biochemical state of its organism.

Key words: Russian sturgeon fingerling, baker's yeast, lipid metabolism, liver, triacylglycerol (TAG), diacylglycerol (DAG), non-esterified fatty acid (NEFA), phospholipids, esters cholesterol, physiological and biochemical assessment.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Підвищення ефективності відтворення осетрових видів риб пов'язано із зниженням смертності на ранніх етапах онтогенезу і отриманням життєстійкої молоді. Одним з вирішальних факторів для виживання молоді є забезпеченість її їжею у личинковий період. Для осетрів особливо важливим є момент переходу із змішаного, включаючи жовткове, на активне живлення. У російського осетра (*Acipenser gueldenstaedtii*) воно настає, залежно від температури, на 7–10 день. У цей період онтогенезу відбуваються морфологічні та фізіолого-біохімічні зміни в травній системі осетра, що вимагає підбору спектру харчових об'єктів з відповідним хімічним складом.

На сьогодні недостатньо інформації відносно використання інактивованих пекарських дріжджів у якості кормової добавки в складі стартового корму для молоді російського осетра. Тому дослідження з визначення доз та ефектів використання пекарських дріжджів з метою підвищення життєздатності осетрових видів риб є доцільним та актуальним [1]. Ліпіди — основні компоненти біологічних мембран різного ступеня спеціалізації — являють собою легкоокиснювані сполуки. Вони визначають проникність і плинність (здатність молекул швидко переміщуватися в площині) мембран, що, в свою чергу, є визначальним чинником в модифікації активності більшості ферментних комплексів у відповідь на різноманітні екологічні навантаження [2]. Ліпідний обмін є важливою ланкою метаболізму організму риб, яка обумовлює його фізіологічний статус в процесі росту та розвитку. Ювенальний період в організмі осетрів відзначається складними перебудовами, які прямо залежать від ефективності обміну ліпідів та їх похідних, оскільки вони беруть участь не лише у соматичних, а й у регуляторних, гормон-залежних процесах. Перебуваючи у складі біологічних мембран, ліпіди зумовлюють їх плинність та проникність, беруть участь у передачі нервових імпульсів, а також у створенні міжклітинних контактів.

Роль печінки в ліпідному обміні пояснюється тим, що в ній відбувається синтез, накопичення та утилізація ліпідів, а також їх транспортування у жирові

депо. Характеристика ліпідного обміну в печінці осетрових риб є одним з найважливіших критеріїв, що віддзеркалюють їх загальний фізіологічний стан. Це зумовлено тим, що рівень та спрямованість ліпідного обміну змінюються як в залежності від етапу онтогенезу, статі та фази репродуктивного циклу, так і від умов утримання [3].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Осетрівництво з використанням установок замкненого водопостачання (УЗВ) є однією з найбільш рентабельних, а, отже, таких, що швидко поширюються, галузей рибиництва. Втім, за збільшення масштабів керованого відтворення рибних ресурсів збалансована годівля і оптимізація умов утримання риби стають першорядними завданнями рибницьких підприємств. У зв'язку з цим, стан здоров'я риби і якість комбікормів є вирішальними чинниками рентабельності індустріального рибиництва. Це зумовлює актуальність досліджень перебігу процесів ліпідного обміну, в першу чергу в печінці, у молоді російського осетра при згодовуванні їй пекарських дріжджів.

Метою даної роботи є аналіз впливу згодовування різних кількостей інактивованих пекарських дріжджів на ліпідний обмін молоді російського осетра.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Об'єктом досліджень є молодь російського осетра (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt & Ratzeburg, 1833) середньою масою 119 г. Годівля протягом 28 днів відбувалася базовим сухим кормом із вмістом протеїну 47% і жиру — 15%, до якого у обох експериментальних групах додавали деактивовані глибоким замороженням пекарські дріжджі як джерело нуклеїнових кислот та вітамінів групи В. У першій групі їх кількість відносно корму становила 5%, у другій — 15%.

Печінку осетрів подрібнювали на холоді в скляних гомогенізаторах з наступним екстрагуванням загальних ліпідів хлороформ-метаноловою сумішшю у відношенні 2 : 1 за методом Фолча [4]. До 1 г досліджуваного матеріалу додавали 20 мл суміші метанол-хлороформ (1 : 2). Через 12 годин суміш відфільтровували, додавали 1/5 частину 0,7 М KCl за об'ємом і залишали до розділення на два шари. В утвореній двофазній системі нижній шар складається з хлороформу, а верхній — з метанолу і води. Водорозчинні неліпідні домішки переходять у водно-метанольний шар. У хлороформному шарі залишаються ліпіди. Верхній водно-метанольний шар видаляли за допомогою водно-струменевого насоса, а нижній — хлороформний, що містить ліпіди, випаровували. Розділення ліпідів на окремі фракції проводили методом висхідної одномірної тонкошарової хроматографії на пластинках «Silufol». Перед роботою пластинки активували 30 хв при температурі 105°C в сушильній шафі. Отриманий хлороформний розчин ліпідів спочатку випарювали насухо, а потім розчиняли у 1 мл хлороформу. Отримані проби ліпідів наносили на пластинку мікродозатором в кількості 40 мкл розчину і поміщали їх в хроматографічні камери. Рухомою фазою служила суміш гексану, діетилового ефіру і льодяної оцтової кислоти у відношенні 70 : 30 : 1. Одержані хроматограми проявляли в камері, насиченій парами йоду. Для ідентифікації окремих фракцій ліпідів використовували специфічні реагенти і очищені стандарти.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Існує прямо пропорційний зв'язок між загальним вмістом ліпідів та активністю анаболічних процесів в організмі риб, а їх кількість свідчить про енергетичний потенціал [5]. Як видно з результатів досліджень, вміст загальних ліпідів в печінці контрольної групи риб становив 9,38 г%, що вище на 7,32 та 10,09% відповідно, ніж у першій та другій дослідних групах (рис. 1).

Рис. 1. Вплив згодовування пекарських дріжджів на вміст загальних ліпідів у печінці молоді російського осетра ($M \pm m$)

Fig. 1. Effect of feeding baker's yeast on the content of total lipids in liver of Russian sturgeon fingerling ($M \pm m$)

Вищенаведені дані свідчать про використання більшою мірою енергетичних та пластичних ресурсів ліпідів під дією годівлі осетрів кормами з підвищеним вмістом нуклеїнових кислот. Найвищою в печінці російського осетра є кількість триацигліцеролів (ТАГ), які є попередниками диацигліцеролів (ДАГ), неестерифікованих жирних кислот (НЕЖК) та фосфоліпідів (рис. 2).

Рис. 2. Вплив згодовування пекарських дріжджів на вміст диацигліцеролів (ДАГ) у печінці молоді російського осетра ($M \pm m$)

Fig. 2. Effect of feeding baker's yeast on the content of diacylglycerol (DG) in liver of Russian sturgeon fingerling ($M \pm m$)

Таким чином, споживання кормів із вмістом дріжджів у кількості 15% знижує вміст ТАГ в печінці осетрів на 34,24%. Немає вірогідної різниці зниження ТАГ за умов застосування 5% дріжджів у кормах.

Аналіз похідних продуктів від ТАГ показує, що застосування підвищеної кількості дріжджів (15%) у кормах осетрів приводить до збільшення на 18,89% вмісту фосфоліпідів (рис. 3).

Рис. 3. Вплив згодовування пекарських дріжджів на вміст фосфоліпідів у печінці молоді російського осетра ($M \pm m$)

Fig. 3. Effect of feeding baker's yeast on the content of phospholipids in liver of Russian sturgeon fingerling ($M \pm m$)

Останні, як головний компонент біомембран, відповідають за щільність і бар'єрно-транспортну функцію мембран клітини печінки. Таким чином, відповідь організму на збільшення вмісту дріжджів у кормах спрямована на формування захисного бар'єру, який відображається у зміцненні мембран клітин, що запобігає їх руйнуванню продуктами метаболізму з одного боку, а також сприяє процесам виведення метаболітів — з іншого. Несхожа ситуація спостерігається при споживанні осетрами нижчої кількості дріжджів (5%). Видно, що ТАГ в основному використовуються на утворення ДАГ та холестеролу (рис. 4). Вміст фосфоліпідів у мембранах зменшується на 30,65%, що свідчить про зниження щільності мембран. Така картина показує відсутність загрози з боку метаболітів і спрямування потенціалу ліпідного обміну на процеси травлення та ліполізу. Вміст неетерифікованих жирних кислот (НЕЖК) відносно ТАГ вказує на напрямок процесу ліпідного обміну [6] (рис. 4).

Рис. 4. Вплив згодовування пекарських дріжджів на вміст неетерифікованих жирних кислот у печінці молоді російського осетра ($M \pm m$)

Fig. 4. Effect of feeding baker's yeast on the content of unesterified fatty acid (NEFA) in liver of Russian sturgeon fingerling ($M \pm m$)

Зниження кількості НЕЖК за умов годівлі кормами з вмістом дріжджів 5% свідчить про наявність синтетичних процесів ліпідів, зокрема в напрямку збільшення вмісту холестеролу (рис. 5).

Рис. 5. Вплив згодовування пекарських дріжджів на вміст ефірів холестеролу у печінці молоді російського осетра ($M \pm m$)

Fig. 5. Effect of feeding baker's yeast on the content of cholesterol esters in liver of Russian sturgeon fingerling ($M \pm m$)

Останній, як попередник стероїдних гормонів та жовчних кислот, бере активну участь в регуляції травних процесів організму. Годівля осетрів з використанням 5 і 15% дріжджів безпосередньо впливає на збільшення синтезу холестеролу у 1,67 та 2,72 рази відповідно відносно контрольних показників. У першому випадку його кількість зумовлена зниженням НЕЖК, в другому — зменшенням вмісту ТАГ.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Таким чином, для організму молоді осетра, яка активно набирає м'язову масу в умовах інтенсифікації, корм із вмістом дріжджів 5% буде ефективнішим з огляду на ліпідний обмін в печінці. Така концентрація сприятиме меншому стресу для організму за впливу метаболітів та підвищуватиме ростовий потенціал молоді російського осетра.

ЛІТЕРАТУРА

1. Симон М. Ю. Використання кормових дріжджів у годівлі осетрових видів риб (*Acipenseridae*) (Огляд) // Рибогосподарська наука України. 2015. № 4(34). С. 100—126.
2. Симон М. Ю. Особливості окисних процесів у осетрових видів риб (*Acipenseridae*) (Огляд) // Рибогосподарська наука України. 2016. № 1(35). С. 106—126.
3. Симон М. Ю. Особливості травлення осетрових видів риб (*Acipenseridae*) (Огляд) // Рибогосподарська наука України. 2016. № 3(37). С. 123—144.
4. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissue / Folch J. et al. // Journal of Biology Chemistry. 1957. № 226. P. 497—509.
5. Климов А. Н., Никульчева А. Н. Обмен липидов и липопротеидов и его нарушения. Санкт-Петербург : Питер-ком, 1999. 512 с.
6. Особливості вмісту неполярних ліпідів в тканинах коропа (*Cyprinus carpio* L.) / Ляврін Б. З. та ін. // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. 2013. № 2 (55). С. 10—14. (Серія : Біологія).

REFERENCES

1. Symon, M. Yu. (2015.) Vykorystannia kormovykh drizhdzhiv u hodivli osetrovykh vydiv ryb (*Acipenseridae*) (Ohliad). *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4(34), 100-126.
2. Symon, M. Yu. (2016). Osoblyvosti okysnykh protsesiv u osetrovykh vydiv ryb (*Acipenseridae*) (Ohliad). *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1(35), 106-126.
3. Symon, M. Yu. (2016). Osoblyvosti travlennia osetrovykh vydiv ryb (*Acipenseridae*) (Ohliad). *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 3(37), 123-144.
4. Folch, J., Lees, M., Stanley, G., & Sloane, H. (1957). A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissue. *Journal of Biology Chemistry*, 226, 497-509.
5. Klimov, A. N., & Nikul'cheva, A. N. (1999). *Obmen lipidov i lipoproteidov i ego narusheniya*. Sankt-Peterburg: Piter-kom.
6. Liavrin, B. Z., Rabcheniuk, O. O., Khomenchuk, V. O., & Kurant, V. Z. (2013). Osoblyvosti vmistu nepoliarnykh lipidiv v tkanyakh koropa (*Cyprinus carpio* L.). *Naukovi zapysky Ternopilskoho nats. ped. un-tu.*, 2 (55), 10-14.

ВЛИЯНИЕ ПЕКАРСКИХ ДРОЖЖЕЙ НА ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН МОЛОДИ РУССКОГО ОСЕТРА (*ACIPENSER GUELLENSTAEDTII* BRANDT)

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

И. И. Грициняк, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Ю. М. Забытиский, yurafish@ukr.net, Львовская опытная станция ИРХ НААН, пгт Великий Любень

Цель. Охарактеризовать отдельные физиолого-биохимические особенности влияния скормливания различных концентраций инактивированных пекарских дрожжей на липидный обмен молоди русского осетра.

Методика. Для проведения исследований были использованы классические биохимические методы определения концентрации общих липидов и соотношение их фракций в печени.

Результаты. Показаны особенности липидного обмена в организме молоди русского осетра (на примере печени) при добавлении к основному корму пекарских дрожжей. В частности, приведены данные о содержании общих липидов, диацилглицеролов (ДАГ), неэтерифицированных жирных кислот (НЭЖК), фосфолипидов, эфиров холестерина в тканях печени подопытных рыб.

Научная новизна. Впервые осуществлен анализ липидного обмена в печени молоди русского осетра при скормливании ей инактивированных пекарских дрожжей в качестве дополнительного корма.

Практическая значимость. Липидный обмен в значительной степени определяет физиолого-биохимический статус организма рыб. Поэтому концентрация общих липидов в тканях печени, а также соотношение их отдельных фракций имеют большое значение для оценки влияния скормливания пекарских дрожжей молоди русского осетра, и опосредованно отражают общее физиолого-биохимическое состояние его организма.

Ключевые слова: молодь русского осетра, пекарские дрожжи, липидный обмен, печень, триацилглицеролы (ТАГ), диацилглицеролы (ДАГ), неэтерифицированные жирные кислоты (НЭЖК), фосфолипиды, эфиры холестерина, физиолого-биохимическая оценка.

TAPAS – міжнародний дослідницький проект

Пропонуємо ознайомитись та долучитись до TAPAS (Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability), що діє в межах програми Horizon 2020, з 2016 року. Його мета — консолідація стабільності європейської аквакультури шляхом розробки спеціальних підходів та умов, на основі всебічного аналізу всіх форм та типів ведення аквакультури, включно з марикольтурою. Ключовою сферою діяльності є виявлення нормативних потреб існуючих й новітніх практик аквакультури. Більше інформації можна отримати відвідавши **сайт**: www.tapas-H2020.eu.

Координатор проекту: Trevor Telfer, University of Stirling.

ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ РИБ

В Інституті рибного господарства НААН працює ПЛР-лабораторія, діяльність якої спрямована на діагностику інфекційних захворювань риб. На сьогодні в арсеналі лабораторії є діагностикими для вірусних, бактеріальних та паразитарних захворювань, які, за даними Міжнародного Епізоотичного Бюро (OIE), є найбільш небезпечними для об'єктів сучасної аквакультури. При розробленні діагностичних тест-систем зверталась увага на тенденції розвитку вітчизняного рибництва та інфекційні агенти, які циркулюють в Україні або можуть проникнути у вітчизняні рибогосподарські підприємства із сусідніх країн.

Ми пропонуємо молекулярну діагностику вірусних захворювань коропових, лососевих, осетрових та інших видів риб.

Лососеві: вірус інфекційного панкреатичного некрозу IPNV; вірусна геморагічна септицемія VHSV; вірус інфекційного гемопоетичного некрозу IHNV.

Коропові: вірус весняної віремії SVCV; герпесвірус CyHV та KHV.

Осетрові: герпесвірус AcHV; іридовірус AcIV; аденовірус AcAdV.

Іctalурові: герпесвірус каналного сома CCV.

Для бактеріальних хвороб риб підібрані тест-системи для діагностики фурункульозу форелі (*Aeromonas salmonicida*), геморагічної септицемії (*Aeromonas hydrophila*), хвороби нирок лососевих (BKD) (*Renibacterium salmoninarum*), ентеричної хвороби «червоного рота» (*Yersinia ruckeri*), флавобактеріозу (*Flavobacterium columnare* і *Flavobacterium psychrophila* (BCWD) та септицемії сома (*Edwardsiella ictaluri*).

Присутні також тест-системи ідентифікації ендопаразитів *Tetracapsuloides bryosalmonae* (проліферативна хвороба нирок) та *Myxobolus cerebralis*, що інфікують райдужну форель.

Для отримання додаткової інформації можна звертатися за адресою:

Інститут рибного господарства НААН, вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164.
Лабораторія біотехнологій у рибництві.

Завідувач лабораторії: к.б.н., с.н.с. Рудь Юрій Петрович.

Тел. (097) 953-80-80 або e-mail: rudziknew@ukr.net.

FISHERIES SCIENCE OF UKRAINE

"Fisheries Science of Ukraine" — a scientific journal, has been published in Ukraine since 2007. "Fisheries Science of Ukraine" included in the List of Specialized Publications of Ukraine, which can be used for publishing results of doctor's and candidate's thesis (biological and agricultural sciences), was approved in 08.07.2009, recertification of 06.11.2014 (Ministry of Education and Science of Ukraine №1279)

Founder and publisher of the journal — Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

State registration certificate KB № 20934-10734 PR of 18.08.2014

EDITOR-IN-CHIEF

Leonid Buchatskyi, Doctor of Sciences, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Leading Research Scientist of the Laboratory of Biotechnologies in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF

Ihor Hrytsyniak, Doctor of Sciences, Professor, Academician of the NAAS of Ukraine, Director, Institute of Fisheries of the NAAS
Natalia Kolesnyk, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of International Scientific and Technical Cooperation and Intellectual Property, Institute of Fisheries of the NAAS

EDITORIAL BOARD

BIOLOGICAL SCIENCES

Boris Gomelsky, Doctor of Biological Sciences, Professor, Kentucky State University, UNITED STATES OF AMERICA

Daniel Patrick, Doctor of Biological Sciences, Head of Biology Department Laboratories of the Pyrenees and Landes, FRENCH REPUBLIC

Gautam V. Zodape, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Zoology of Shivaji University Kolhapur, REPUBLIC OF INDIA

Ihor Buzevych, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Vasyl Sondak, Doctor of Sciences, Head of "Water Bioresources", National University of Water Management and Natural Resources, UKRAINE

Yuriy Rud', PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Bio-technology in Aquaculture of the Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Oleksandr Potrokhov, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Biology of reproduction of fish, Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, UKRAINE

Oleksandr Tretiak, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Deputy Director in scientific works, Institute of Fisheries of the NAAS

Valentyna Solomatina, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Leading research scientist of the department of feeds and fish feeding, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

AGRICULTURAL SCIENCES

XU Pao, Doctor, Professor, Director of Freshwater Fisheries Research Center, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Jedrzep Krupinski, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director, National Research Institute of Animal Production, POLAND

Mykhailo Efymenko, Doctor of Sciences, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head Research Scientist, Institute of Animal Breeding and Genetics of the NAAS, UKRAINE

Serhiy Tarasiuk, Doctor of Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head of the Molecular-Genetic Research Department, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Vitaliy Bekh, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Fish Selection, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Isaak Sherman, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Aquaculture Department, Kherson State Agrarian University, UKRAINE

Natalia Matvienko, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Ichthyopathology of the Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Oleksandr Kostenko, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Veterinary Medicine and Zootechnics Department, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, UKRAINE

SCIENTIFIC EDITORS OF SECTIONS

are staff employees of the Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine: **Natalia Tushnytska**, PhD, Senior Research Scientist, Scientific Secretary of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Deren**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Feeds and Fish Feeding of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yaroslav Tuchapskyi**, PhD, Head of the Carp Breeding Laboratory of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Zaloilo**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Molecular-Genetic Studies of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Zabytivskyi**, PhD, Senior Research Scientist of Section of Sturgeon of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Antonina Mruk**, Head of the Laboratory Salmonids Culture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Tetiana Hryhorenko**, PhD, Head of the Laboratory of Hydrobiology and Technology of Invertebrates Cultivation of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Oleksandr Didenko**, PhD, Senior Research Scientist of the Department of Study Reservoirs Bioresources of the Institute of Fisheries of the NAAS.

Editorial board of the Journal "Fisheries Science of Ukraine", Institute of Fisheries NAAS, 135, Obukhivska St, Kiev-164, Ukraine, 03164; tel.: +38 (044) 223-84-34; tel/fax: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Layout design: Natalia Kolesnik, Serhiy Shinkar, Yevheniy Arkhanhelskyi, Oleksandr Bezusyi; **Making-up:** Yevheniy Arkhanhelskyi, Maria Simon; **Literature editing:** Tetiana Shvets; **Corrector:** Hanna Kovalchuk

ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НААН
вул. Обухівська, 135 м. Київ-164, 03164, Україна
тел./факс: +38(044) 423-74-62, тел.: +38(044) 423-74-65

<http://fsu.ua>

info@fsu.ua