ISSN 2312-9581 (Online)

ISSN 2075-1508 (Print)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

3/2018

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські науки), переатестація від 06.11.2014 (наказ Міністерства освіти і науки України №1279)

Засновник та видавник — Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20934-10734 ПР від 18.08.2014

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

БУЧАЦЬКИЙ Леонід Петрович, доктор біол. наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), провідний науковий співробітник лабораторії біотехнологій в рибицтві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ГРИЦІНЯК Ігор Іванович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, директор Інституту рибного господарства НААН
КОЛЕСНИК Наталія Леонідівна, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності, Інститут рибного господарства НААН

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Гомельський Борис, доктор біол. наук, професор, Державний Університет Кентуккі, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Патрік Даніель, доктор біол. наук, Голова департаменту біології Лабораторії Піренеїв, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА
Зодапе Гаутам В., доктор біол. наук, професор, декан факультету зоології Державного Університету Шиваджи в Колхатурі, РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ
Бузевич Ігор Юрійович, доктор біол. наук, с.н.с., завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА
Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, зав. кафедрою водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА
Рудь Юрій Петрович, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії біотехнологій в рибицтві ІРГ НААН, УКРАЇНА
Потрохов Олександр Спирidonович, доктор біол. наук, с.н.с., керівник лабораторії біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, УКРАЇНА
Третяк Олександр Михайлович, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН
Соломатіна Валентина Дмитрівна, доктор біол. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник відділу кормів та годівлі риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Ху Пао, доктор наук, професор, директор Центру прісноводного рибного господарства, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
Крупінські Єджей, доктор наук, професор, іноземний член Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут зоотехнії Польщі, ПОЛЬЩА
Єфименко Михайло Якович, доктор с.-г. наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник, Інститут розведення і генетики тварин НААН, УКРАЇНА
Тарасюк Сергій Іванович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, зав. відділу молекулярно-генетичних досліджень, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА
Бех Віталій Валерійович, доктор с.-г. наук, професор, зав. відділу селекції риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА
Шерман Ісаак Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедри рибицтва, Херсонський державний аграрний університет, Україна
Матвієнко Наталія Миколаївна, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу іхтіопатології ІРГ НААН, УКРАЇНА
Костенко Олександр Іванович, канд. с.-г. наук, с.н.с., нач. відділу ветеринарної медицини та зоотехнії, Національна академія аграрних наук України, УКРАЇНА

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

є штатними працівниками Інституту рибного господарства НААН України: **Тушницька Наталія Йосифівна**, канд. ветерин. наук, с.н.с., вчений секретар ІРГ НААН; **Дерень Ольга Володимирівна**, канд. с.-г. наук, с.н.с., зав. лабораторії кормів і годівлі риб ІРГ НААН; **Тучапський Ярослав Васильович**, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу селекції риб ІРГ НААН; **Заліло Ольга Василівна**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ІРГ НААН; **Забитівський Юрій Михайлович**, канд. біол. наук, старший науковий співробітник сектору осетрівництва ІРГ НААН; **Мрук Антоніна Іванівна**, зав. лабораторії лососівництва ІРГ НААН; **Григоренко Тетяна Володимирівна**, канд. с.-г. наук, зав. лабораторії гідробіології та технологій культивування цінних безхребетних ІРГ НААН; **Діденко Олександр Володимирович**, канд. біол. наук, с.н.с., старший науковий співробітник відділу вивчення біоресурсів водосховищ.

Редакція журналу «Рибогосподарська наука України», вул. Обухівська, 135, м. Київ-164, 03164

тел.: +38 (044) 223-84-34, тел./факс: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Підписано до друку 12.09.2018 р. Формат 70х108/16. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 7,1. Наклад 500 прим.

Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту рибного господарства НААН

(Протокол №4 від 12 вересня 2018 р.)

Дизайн макету: Колесник Н. Л., Шинкар С. В., Архангельський Є. Ю., Безусий О. Л. **Верстка:** Архангельський Є. Ю., Симон М. Ю. **Літературне редагування:** Швець Т. М. **Коректор:** Ковальчук Г. В.

Друкарня ТОВ «ПРО ФОРМАТ», 02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 45 Б, оф.16, тел.: +38(044) 353-85-58

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

3/2018(45)

Заснований у 2007 р.
Виходить 4 рази на рік

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 1-120
DOI: 10.15407/fsu2018.03

З М І С Т

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 5-15
DOI: 10.15407/fsu2018.03.005

Д. В. Медовник

Малі річки урбанізованих територій як середовище існування
іхтіоценозів 5

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 16-27
DOI: 10.15407/fsu2018.03.016

*Сарієва Майрам, Аліяскаров Майл, Дженбаев Бекмамат,
Сергек уулу Айбек*

Прогнозування обсягів вилову риби з водойм Киргизької
Республіки..... 16

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 28-38
DOI: 10.15407/fsu2018.03.028

А. І. Кучерук, А. І. Мрук, І. Ю. Бузевич

Формування ремонтно-маточного стада та відтворення європейського
харіуса *Thymallus thymallus* (Linnaeus) у штучних умовах..... 28

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 39-49
DOI: 10.15407/fsu2018.03.039

М. М. Пашко, О. М. Третьяк, С. М. Пашко, О. М. Колос, Н. Г. Михайленко

Результати штучного відтворення осетрових риб, вирощених
у садках за природного температурного режиму водойм
лісостепової зони України..... 39

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 50-88
DOI: 10.15407/fsu2018.03.050

*Ю. Озиранский, Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон, С. Д. Щербак,
Р. В. Кононенко, М. О. Федоренко*

Тиляпія (*Tilapia*) як один з основних об'єктів сучасної аквакультури.
Досвід культивування в Ізраїлі (огляд) 50

© Інститут рибного господарства НААН України, 2018

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 89-102

DOI: 10.15407/fsu2018.03.089

*Р. А. Паламарчук, О. В. Дерень*Вплив амаранту *Amaranthus* (Linnaeus) на якісні та продуктивні характеристики дволіток коропа *Cyprinus carpio* (Linnaeus)

за введення його до складу раціону 89

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 103-111

DOI: 10.15407/fsu2018.03.103

М. Ю. Симон, Ю. М. Забитівський, І. І. Грициняк

Вплив інактивованих пекарських дріжджів на потенціал росту

молоді російського осетра *Acipenser gueldenstaedtii* (Brandt)..... 103**КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ**

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 112-117

DOI: 10.15407/fsu2018.03.112

*І. Й. Грициняк, Т. М. Швець*Вирезуб *Rutilus frisii frisii* (Nordmann). Тематична бібліографія..... 112**ЮВІЛЕЇ**

Вчений іхтіолог-рибовод. До 75-річчя від дня народження

Андрющенко Антоніни Іванівни 118

СОДЕРЖАНИЕ

БИОРЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ ВОДОЕМОВ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 5-15
DOI: 10.15407/fsu2018.03.005

Д. В. Медовник

Малые реки урбанизированных территорий в качестве местообитаний ихтиоценозов	5
---	---

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 16-27
DOI: 10.15407/fsu2018.03.016

Сариева Майрам, Алияскаров Маил, Дженбаев Бекмамат, Сергек уулу Айбек

Прогнозирование объёмов вылова рыбы в озерах и водохранилищах Кыргызской Республики	16
--	----

ТЕХНОЛОГИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 28-38
DOI: 10.15407/fsu2018.03.028

А. И. Кучерук, А. И. Мрук, И. Ю. Бузевич,

Формирование ремонтно-маточного стада и воспроизводство европейского хариуса <i>Thymallus thymallus</i> (Linnaeus) в искусственных условиях	28
--	----

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 39-49
DOI: 10.15407/fsu2018.03.039

М. М. Пауко, А. М. Третьяк, С. М. Пауко, Е. Н. Колос, Н. Г. Михайленко

Результаты искусственного воспроизводства осетровых рыб, выращенных в садках с естественным температурным режимом водоемов лесостепной зоны Украины	39
---	----

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 50-88
DOI: 10.15407/fsu2018.03.050

Ю. Озиранский, Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон, С. Д. Щербак, Р. В. Кононенко,
Н. А. Федоренко

Тиляпия (<i>Tilapia</i>) как один из основных объектов современной аквакультуры. Опыт культивирования в Израиле (обзор)	50
--	----

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 89-102
DOI: 10.15407/fsu2018.03.089

Р. А. Паламарчук, О. В. Дерень

Влияние амаранта <i>Amaranthus</i> (Linnaeus) на качественные и продуктивные характеристики двухлетков карпа <i>Cyprinus carpio</i> (Linnaeus) при введении его в состав рациона	89
--	----

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 103-111
DOI: 10.15407/fsu2018.03.103

М. Ю. Симон, Ю. М. Забытиский, И. И. Грициняк

Влияние инактивированных пекарских дрожжей на потенциал роста молоди русского осетра <i>Acipenser gueldenstaedtii</i> (Brandt)	103
---	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 112-117
DOI: 10.15407/fsu2018.03.112

Ир. И. Грициняк, Т. М. Швеца

Вырезуб <i>Rutilus frisii frisii</i> (Nordmann). Тематическая библиография	112
--	-----

ЮБИЛЕИ

Ученый ихтиолог-рыбовод. К 75-летию со дня рождения Андрущенко

Антонины Ивановны	118
-------------------------	-----

CONTENTS

BIORESOURCES AND ECOLOGY OF WATER BODIES

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 5-15
DOI: 10.15407/fsu2018.03.005

D. Medovnyk

Small rivers of urbanized territories as an environment of ichthyocenosis..... 5

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 16-27
DOI: 10.15407/fsu2018.03.016

M. Sarieva, M. Aliiaskarov, B. Dzhemberbaev, A. Sergek uulu

Fish yield prediction in water bodies of the Kyrgyz Republic..... 16

TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 28-38
DOI: 10.15407/fsu2018.03.028

A. Kucheruk, A. Mruk, I. Buzevitch

Forming a replacement-brood stock of European grayling *Thymallus thymallus* (Linnaeus) in artificial conditions..... 28

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 39-49
DOI: 10.15407/fsu2018.03.039

M. Pashko, A. Tretiak, S. Pashko, Y. Kolos, N. Mykhaylenko

Results of artificial reproduction of sturgeons reared in cages with natural temperature regime of water bodies of the forest-steppe zone of Ukraine..... 39

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 50-88
DOI: 10.15407/fsu2018.03.050

Yu. Oziransky, N. Kolesnyk, M. Symon, S. Shcherbak, R. Kononenko, M. Fedorenko

Tilapia (*Tilapia*) as one of the main objects of modern aquaculture. Experience of cultivation in Israel (review) 50

FEEDS AND FEEDING

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 89-102
DOI: 10.15407/fsu2018.03.089

R. Palamarchuk, O. Deren

The effect of amaranth *Amaranthus* (Linnaeus) on qualitative and productive characteristics of 1+ carp *Cyprinus carpio* (Linnaeus) after being added to the composition of the diet 89

PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 103-111
DOI: 10.15407/fsu2018.03.103

M. Simon, Yu. Zabytivskyi, I. Hrytsyniak

Influence of inactivated baker's yeast on growth potential of Russian sturgeon *Acipenser gueldenstaedtii* (Brandt) fingerling 103

CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 112-117
DOI: 10.15407/fsu2018.03.112

Ir. Hrytsyniak, T. Shvets

Black Sea roach (Vyrezub) *Rutilus frisii frisii* (Nordmann). Thematic bibliography 112

ANNIVERSARIES

Scientist ichthyologist-fish breeder. Andryushchenko Antonina Ivanovna – to the 75th anniversary of her birthday 118

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 5-15

DOI: 10.15407/fsu2018.03.005

УДК [597.2/.5:556.53]:574.5

Received 23.07.18

Received in revised form 30.07.18

Accepted 16.08.18

МАЛІ РІЧКИ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ІХТІОЦЕНОЗІВ

Д. В. Медовник, medovnyk@nas.gov.ua, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Мета. Встановлення екологічного потенціалу водних тіл різного типу в складі малих річок урбанізованих територій за особливостями структури іхтіоценозів, гідрохімічними та еколого-токсикологічними показниками.

Методика. Об'єктами досліджень були представники іхтіофауни, а також вода та донні відклади. Матеріали відбирали протягом 2015–2016 рр. на ділянках річок Горенка, Либідь, Нивка та Сирець у межах м. Київ. Збір іхтіологічного матеріалу проведено за допомогою сачка, без використання засобів та методів, що суперечать законодавству або потребують спеціального дозволу. Обробка проб виконана згідно із загальноприйнятими методиками.

Результати. Показано, що якісний склад іхтіоценозів водних тіл у складі малих річок залежить від їх гідроморфологічних та гідрологічних характеристик. Згідно зі структурою іхтіоценозів, найвищий екологічний потенціал був притаманний водним тілам, де було збережено неперервність сполучення з приймаючою водоймою. Домінуючий комплекс в іхтіоценозах таких водних тіл складали індиферентні до швидкості течії аборигенні види риб, котрі здійснюють сезонні міграції, тоді як на ізольованих гідроспорудами водних тілах – переважно короткоциклові лімної фауни, у тому числі інвазивні. Проведена оцінка якості води за гідрохімічними та еколого-токсикологічними показниками також виявила вплив антропогенної трансформації водних тіл на їх екологічний потенціал. Так, вищий ступінь забрудненості та токсичності водного середовища був притаманний більш трансформованим водотокам.

Наукова новизна. Встановлено, що у випадку малих річок у межах м. Київ екологічний потенціал водних тіл, згідно зі структурою іхтіофауни, більшою мірою залежить від збереження сполучення з приймаючою водоймою та проточності, ніж від гідрохімічних та токсикологічних характеристик.

Практична значимість. Результати досліджень можуть бути використані для розробки заходів, спрямованих на збереження та відтворення екосистем малих річок, зокрема їх іхтіоценозів.

Ключові слова: малі річки, антропогенна трансформація, екологічний потенціал, структура іхтіоценозів, гідрохімічні та еколого-токсикологічні характеристики.

SMALL RIVERS OF URBANIZED TERRITORIES AS AN ENVIRONMENT OF ICHTHYOCENOSIS

D. Medovnyk, medovnyk@nas.gov.ua, Institute of Hydrobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

© Д. В. Медовник, 2018

Purpose. Establishing the ecological potential of water bodies of various types in the composition of small rivers of urbanized territories based on their ichthyocenosis structure features, hydrochemical and toxicological indices.

Methodology. The objects of the study were ichthyofauna species as well as water and bottom sediments. Materials were collected during 2015-2016 on the sections of the Gorenka, Lybid, Nyvka and Syrets rivers within the city of Kyiv. Collection of ichthyological material was carried out with a hand net, without the use of tools and methods that are in conflict with the law or need special permission. Processing of samples was carried out in accordance with generally accepted methods.

Findings. It has been shown that the qualitative composition of ichthyocenoses of small rivers depends on their hydromorphological and hydrological characteristics. According to the ichthyocenoses structure, the highest ecological potential was inherent to waterbodies, where the connection with the receiving reservoir was maintained. The dominant complex in the ichthyocenoses of such water bodies were native fish species indifferent to water flow velocity, which perform seasonal migrations, whereas mainly short-cycle limnophilic species including invasive ones were presented in isolated hydrostructures of water bodies. The water quality assessment based on hydrochemical and toxicological indicators also revealed the effect of the anthropogenic transformation of water bodies on their ecological potential. Thus, higher contamination and degree of water toxicity were inherent to more transformed watercourses.

Originality. It has been established that in the case of small rivers within the boundaries of Kyiv, ecological potential of water bodies based on their ichthyofauna structure depended more on the preservation of their connectivity with the receiving reservoir and water flow rate than on hydrochemical and toxicological characteristics.

Practical value. The study results can be used to develop measures aimed at preserving and restoring small river ecosystems, in particular their ichthyocenoses.

Keywords: small rivers, anthropogenic transformation, ecological potential, ichthyocenoses structure, hydrochemical and toxicological characteristics.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Внаслідок зарегулювання великих рік основними резерватами для реофільних видів риб стали їх притоки, зокрема малі річки [1], екологічні характеристики котрих, в свою чергу, відрізняються особливо високою залежністю від антропогенного впливу [2-4]. Так, трансформація гідроморфологічних характеристик та гідрологічного режиму малих водотоків, а також порушення їх гідрохімічних та еколого-токсикологічних характеристик відображаються, зокрема, на видовому різноманітті рибного населення та представленості в ньому різних екологічних груп [5, 6].

Тому видова та екологічна структура рибних угруповань є важливою характеристикою для оцінки екологічного потенціалу значно змінених водних об'єктів, зокрема малих річок урбанізованих територій та окремих фрагментів їхнього русла.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Визначення основних антропогенних чинників, що впливають на формування структури іхтіоценозів малих річок урбанізованих територій, а також адаптивного потенціалу різних представників іхтіофауни стосовно дії антропогенного впливу є важливими для оцінки екологічного потенціалу зазначених водотоків, та,

відповідно, для збереження та відновлення їх екосистем. Зміщення акцентів від оцінки якості води як ресурсу в напрямку оцінки стану водного середовища як необхідної складової в процесах життєдіяльності людини та місця існування гідробіонтів передбачається Водною Рамковою Директивою ЄС 2000/60/ЄС, прийнятою в якості основного інструмента інтегрованого управління водними ресурсами [7, 8].

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

З метою оцінки екологічного потенціалу малих річок Горенка, Нивка, Либідь та Сирець в межах м. Київ щодо структури їх іхтіоценозів було виділено окремі водні тіла в їх складі та вивчено характер і ступінь антропогенного порушення вищезазначених водотоків.

Зібраний протягом 2015–2016 рр. іхтіологічний матеріал було опрацьовано згідно із загальноприйнятими методиками [9, 10]. Відбір іхтіологічного матеріалу був проведений за допомогою іхтіологічного сачка, використання якого не суперечить законодавству України та не потребує спеціальних дозволів. Загалом, на річках Горенка, Либідь, Нивка та Сирець було зібрано відповідно 164, 316, 1981 та 399 екз. риб.

Якість води за гідрохімічними показниками, а також гостра летальна токсичність води та донних відкладів на досліджених ділянках річок були визначені згідно із загальноприйнятими методиками [11, 12].

Згідно з підходами Водної Рамкової Директиви ЄС 2000/60/ЄС [7, 8] до типології річкових водних об'єктів, водотоки Горенка, Либідь, Нивка та Сирець належать до малих річок на низинах у осадових породах, при цьому згідно категорійних ознак внаслідок антропогенної трансформації їхніх гідроморфологічних характеристик вони мають бути віднесені до значно змінених водних об'єктів.

У якості водних тіл були обрані фрагменти русла, ідентифікаційні ознаки яких характеризувалися наявністю гідротехнічних споруд різного типу та антропогенною трансформацією гідроморфологічних особливостей водотоку (рис. 1).

Рис. 1. Водні тіла малих річок Горенка, Нивка, Либідь та Сирець

*Примітка. 1 — штучна зона підпору, 2 — ділянка зі штучними порогами, 3 — ділянка в каналізаційному колекторі, а — гребля, б — штучні пороги, в — каналізаційний колектор.

Fig. 1. Water bodies of small rivers Horenka, Nyvka, Lybid & Syrets

*Notes. 1 — artificial zone of the backwater, 2 — area with artificial rapids, 3 — area in collecting pipe; а — dam, б — artificial rapids, в — collecting pipe.

Обрані для дослідження якісної структури іхтіоценозів водні тіла характеризувалися: № 1 — штучними зонами підпору (середня течія річок Горенка і Нивка та нижня течія р. Сирець); № 2 — штучними порогами (середня течія річок Горенка та Сирець); № 3 — каналізованістю (середня і нижня течії р. Либідь та середня течія р. Нивка).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Встановлено, що іхтіоценоз водного тіла № 1 (штучна зона підпору) включав 7–11 видів риб, більшість із яких належали до лімnofільних. У річках Горенка та Нивка домінуючий комплекс був утворений, переважно, короткоцикловими лімnofілами, такими як вівсянка звичайна (*Leucaspius delineatus* (Heckel), 1843), чебачок амурський (*Pseudorasbora parva* (Temminck et Schlegel), 1846), карась сріблястий — тугоросла форма (*Carassius gibelio* (Bloch), 1782), а також короткоцикловим реофілом пічкур звичайним (*Gobio gobio* (L.), 1758) [13], відносна чисельність яких знаходилась у межах 14–56%. В той же час, у зоні підпору на р. Сирець домінували індиферентні до швидкості течії в'язь звичайний (*Idus idus* (L.), 1758) та верховодка звичайна (*Alburnus alburnus* (L.), 1758), складаючи відповідно 10 та 70% відносної чисельності в іхтіоценозах [13].

Іхтіоценоз водного тіла № 2 (ділянка зі штучними порогами) включав переважно короткоциклові лімnofільні види риб, причому у р. Горенка серед 7 відмічених видів положення супердомінанта займав реофіл пічкур звичайний (56%), а у р. Сирець відмічено 3 види риб — пічкур звичайний (11%) та короткоциклові лімnofіли карась сріблястий (25%) і триголкова колючка звичайна (*Gasterosteus aculeatus* (L.), 1758) (64%), які разом утворювали домінуючий комплекс [13].

У складі іхтіоценозу водного тіла № 3 (каналізована ділянка) у річках Либідь та Нивка було відмічено 9–13 видів риб. У р. Либідь більшість із них за відношенням до швидкості течії належала до реофілів та індиферентів, тоді як значна частка лімnofільних видів була представлена одиничними екземплярами. Домінуючий комплекс утворювали індиферентні види — в'язь звичайний та верховодка звичайна, складаючи відповідно 23 та 37%. В той же час, у складі іхтіоценозу р. Нивка домінували пічкур звичайний (32%) та інвазивні короткоциклові лімnofіли — чебачок амурський (44%) та тугоросла форма карася сріблястого (23%).

Спільними для всіх досліджених водних тіл у складі малих річок були такі види риб, як пічкур звичайний, вівсянка звичайна, карась сріблястий, окунь звичайний та триголкова колючка звичайна. Серед них пічкур звичайний є аборигенним реофільним видом, характерним для іхтіоценозів малих річок, а інші належать до еврібіонтних лімnofілів із високою екологічною пластичністю [14, 15].

Слід звернути увагу, що видова структура іхтіоценозів та особливо їх домінуючі комплекси характеризувались розбіжністю залежно від розташування досліджених водних тіл у водотоках.

Так, для штучної зони підпору (водне тіло № 1) на р. Сирець та каналізованої ділянки (водне тіло № 3) р. Либідь відмічені аналогічні домінуючі види риб — в'язь звичайний та верховодка звичайна. Їх високу чисельність у водних тілах різного типу можна пояснити збереженням неперервного гідрологічного зв'язку з приймаючою водоймою, що уможливорює притаманні зазначеним видам зимувальні міграції. В той же час, за умови порушення зв'язку гідротехнічними спорудами у водних тілах аналогічних типів на інших малих річках домінували короткоциклові лімnofіли та реофіл пічкур звичайний, котрим не властиві міграції до приймаючих водойм.

Крім зв'язку з приймаючою водоймою, на екологічну структуру іхтіоценозів водних тіл вплинула швидкість течії. Так, більша кількість та чисельність лімnofільних видів риб спостерігалась у водних тілах з низькою проточністю, класифікованих як «штучна зона підпору», а також у сполучених з ними водних тілах інших типів. Зокрема, такі інвазивні види риб, як чебачок амурський та головешка-ротань (*Perccottus glenii* Dybowski, 1877), котрі належать до короткоциклових лімnofілів, були відмічені майже виключно на водних тілах у складі р. Нивка [13], ідентифікованих як «штучна зона підпору» та суміжна з нею «каналізована ділянка», де перший з них увійшов до домінуючого комплексу. Особливості поширення цих двох видів риб у малих річках свідчать про їх приуроченість до ділянок русла з послабленою проточністю. Такі екотопи можуть виступати в якості резерватів для популяцій вказаних інвазивних видів, а також інших короткоциклових лімnofілів.

Отже, екологічний потенціал водних тіл у складі малих річок, згідно зі структурою іхтіоценозів, залежить від гідроморфологічних та гідрологічних чинників, в першу чергу від збереження неперервності зв'язку з приймаючою водоймою та від швидкості течії.

Окрім зміни гідроморфологічних та гідрологічних характеристик, до антропогенних чинників, що здатні чинити вплив на екологічний потенціал досліджених водних тіл як середовища існування іхтіоценозів, слід віднести порушення гідрохімічного та еколого-токсикологічного режимів.

Проведений аналіз якості води за гідрохімічними показниками (табл. 1) виявив розбіжності між досліджуваними водними об'єктами.

Встановлено, що значення водневого показника, вміст розчиненого кисню та мінералізація води в усіх досліджених водних об'єктах знаходились у межах рівнів для водойм рибогосподарського призначення (ГДК_{рибогосп.}).

Незначне перевищення ГДК_{рибогосп.} за показником вмісту амонійного азоту було відмічено у водотоці з найменшим ступенем урбанізації, тоді як значно порушені річки характеризувалися перевищенням ГДК_{рибогосп.} за вмістом у воді як сполук неорганічного азоту, так і органічних речовин.

Оцінка якості води за екологічною класифікацією показала, що за водневим показником, вмістом розчиненого кисню та мінералізацією вона відповідала класу І–ІІІ, категорії 1–4, тобто «відмінна – задовільна».

Таблиця 1. Якість води малих річок за основними гідрохімічними показниками

Table 1. Water quality of small rivers by the main hydrochemical indices

Показник / Indices	р. Горенка / river Horenka		р. Либідь / river Lybid		р. Нивка / river Nyvka		р. Сирець / river Syrets		ГДК рибо-госп. / MAC fisheries
	Знач. / Value	К. К. / C. & C.	Знач. / Value	К. К. / C. & C.	Знач. / Value	К. К. / C. & C.	Знач. / Value	К. К. / C. & C.	
pH / pH	7,85	II 2	8,11	II 3	8,28	III 4	8,21	III 4	6,5-8,5
Кисень, мг O ₂ /л / Oxygen, mg O ₂ /l	6,87	III 4	6,46	III 4	6,12	III 4	8,14	I 1	>6,0
Мінералізація, мг/л / Dissolved solids concentration, mg/l	288	I 1	630	II 2	527	II 2	840	II 3	1000
Амонійний азот, мг N/л / Ammonia nitrogen, mg N/l	0,45	III 4	0,66	III 5	0,67	III 5	0,78	III 5	0,39
Нітритний азот, мг N/л / Nitrite nitrogen, mg N/l	0,01	II 3	0,13	V 7	0,04	III 5	0,14	V 7	0,02
Нітратний азот, мг N/л / Nitrate nitrogen, mg N/l	<0,1	I 1	2,92	V 7	1,68	IV 6	4,24	V 7	9,1
ХСК, мг O ₂ /л / COD mg O ₂ /л	17,1	II 3	29,4	III 4	85,5	V 7	51,2	IV 6	20
БСК ₅ , мг O ₂ /л / BOD ₅ mg O ₂ /л	–	–	4,98	III 5	7,96	IV 6	8,54	IV 6	2,0

*Notes. К. К. – клас та категорія якості води за екологічною класифікацією [12].

*Notes. C. & C. – class & category of water quality according to the ecological classification [12].

За показниками вмісту сполук неорганічного азоту вода відповідала класу I–III, категорії 1–4, тобто «дуже чиста – слабо забруднена» (найменш урбанізований водний об'єкт), або класу III–V, категорії 5–7, тобто «помірно забруднена – дуже забруднена» (більш урбанізовані водні об'єкти).

За показниками вмісту органічних речовин вода належала до класу II, категорії 3, тобто «досить чиста» (найменш урбанізований водний об'єкт), або до класу III–V, категорії 4–7, тобто «слабко забруднені – дуже забруднені» (більш урбанізовані водні об'єкти).

Так само, як рівень забруднення, ступінь токсичності води та донних відкладів розрізнявся на досліджених водних тілах (табл. 2) та водотоках в цілому (табл. 3).

Значення показника гострої летальної токсичності свідчать про наявність певної залежності її від ступеню антропогенного навантаження і порушення гідроморфологічних та гідрологічних характеристик річок.

Таблиця 2. Значення показника гострої летальної токсичності води та донних відкладів різних водних тіл *

Table 2. Significance of the acute lethal toxicity of water and sediments of various water bodies *

Водний об'єкт / Water object	Сезон / Season			
	весна / spring	літо / summer	осінь / autumn	зима / winter
Водне тіло № 1 – штучна зона підпору: / Water body №1 – artificial zone of the backwater:				
р. Горенка / river Horenka	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent
р. Нивка / river Nyvka	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> низька / low	<u>відсутня / absent</u> середня / average	<u>відсутня / absent</u> середня / average
р. Сирець / river Syrets	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>помірна / moderate</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent
Водне тіло № 2 – ділянка зі штучними порогами: / Water body №2 – area with artificial rapids:				
р. Горенка / river Horenka	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent
р. Сирець / river Syrets	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>помірна / moderate</u> відсутня / absent
Водне тіло № 3 – каналізована ділянка: / Water body №3 – area in collecting pipe:				
р. Либідь / river Lybid	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>низька / low</u> висока / high	<u>низька / low</u> низька / low
р. Нивка / river Nyvka	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>низька / low</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> середня / average	<u>відсутня / absent</u> середня / average

Примітка. *Над рискою — вода, під рискою — донні відклади.

Notes. **Above the ridge – water, under the ridge – bottom sediments.

Таблиця 3. Значення показника гострої летальної токсичності води та донних відкладів досліджуваних водотоків

Table 3. Significance of the acute lethal toxicity of water and sediments of the studied streamflow *

Водний об'єкт / Water object	Сезон / Season			
	весна / spring	літо / summer	осінь / autumn	зима / winter
р. Горенка / river Horenka	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent
р. Либідь / river Lybid	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> низька / low	<u>низька / low</u> помірна / moderate	<u>низька / low</u> помірна / moderate
р. Нивка / river Nyvka	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> низька / low	<u>відсутня / absent</u> середня / average	<u>відсутня / absent</u> середня / average
р. Сирець / river Syrets	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> відсутня / absent	<u>відсутня / absent</u> помірна / moderate

*Примітка. Над рискою — вода, під рискою — донні відклади.

**Notes. Above the ridge – water, under the ridge – bottom sediments.

Вищі рівні токсичності води та донних відкладів були притаманні більш трансформованим водотокам. Найбільш суттєва різниця між токсичністю води та донних відкладів була притаманна річці з русловими ставками, внаслідок осадження токсичних речовин за умов зниженої проточності. Загалом, можна відмітити, що вода річок мала нижчі показники токсичності порівняно з донними відкладами.

До позитивних для існування риб умов у досліджених водних тілах слід віднести низький рівень гострої летальної токсичності води та донних відкладів протягом вегетаційного періоду. Доцільно припустити, що погіршення токсикологічної ситуації в осінній період відіграло певну роль у міграції багатьох видів риб до приймаючої водойми, однак не спричиняло випадіння з іхтіоценозів таких представників, котрим не були властиві сезонні міграції.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Формування структури іхтіоценозів малих річок урбанізованих територій залежить від характеру антропогенної трансформації, зміни гідроморфологічних та гідрологічних характеристик фрагментів русла та їх взаємного розташування у водотоці.

Домінуючі комплекси іхтіоценозів досліджених водних тіл сформовані залежно від розташування їх на водотоках і мають незначну різноманітність видового складу (2–3 види) з переважанням короткоциклових представників, таких як верховодка звичайна, пічкур звичайний та карась сріблястий.

За наявності неперервного зв'язку водного тіла з приймаючою водоймою відмічено домінування таких індиферентних до швидкості течії видів, як в'язь звичайний (10–23%) та верховодка звичайна (37–70%), тоді як внаслідок відокремлення гідротехнічними спорудами — короткоциклового реофіла пічкура звичайного (11–56%) та короткоциклових лімнофілів, у тому числі інвазивних представників (сумарно до 68%). Це пов'язано з сезонними міграційними процесами, що притаманні більшості середньоциклових видів риб та деяким із короткоциклових.

На екологічну структуру іхтіоценозів річок впливає також швидкість течії: її послаблення приводить до зростання кількості лімнофільних видів риб і їх відносної чисельності (з 12–19% до 30–90%), а також сприяє адаптації інвазивних видів риб (зростання чисельності з 0–7% до 25–68%).

Домінування риб з високою екологічною валентністю, таких як карась сріблястий, а також натуралізація у річках незначної кількості видів (звичайно до 3–5), може бути зумовлена погіршенням якості води за гідрохімічними та еколого-токсикологічними показниками.

Екологічний потенціал малих річок урбанізованих територій за структурою іхтіоценозів, згідно з отриманими результатами, значною мірою залежить від збереження зв'язку ділянок водотоків із приймаючою водоймою, а також від спорудження на них руслових ставків. Тому запобігання фрагментації русла гідротехнічними спорудами є важливим для збереження та відтворення екосистем малих річок урбанізованих територій.

ЛІТЕРАТУРА

1. Иванчева Е. Ю., Терещенко В. Г. Влияние особенностей водосбора на видовое разнообразие ихтиофауны малой реки // Биоразнообразие и роль животных в экосистемах : IV Междунар. науч. конф. : тезисы докл. Днепропетровск, 2007. С. 151—153.
2. Гай А. Є., Гроза В. А. Малі річки України: екологічні проблеми та перспективи збереження // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 2010. № 2 (43). С. 75—77. (Серія : Біологія. Спец. вип. : Гідроекологія).
3. Еколого-токсикологічне дослідження рівнів забруднення води та донних відкладів р. Нивка в районі аеропорту «Київ» / Коновець І. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2013. № 2. С. 32—44.
4. Екологічні проблеми Київських водойм і прилеглих територій / Романенко О. В. та ін. Київ : Наукова думка, 2015. 192 с.
5. Кочет В. М. Сучасний стан іхтіофауни малих річок Дніпропетровської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 2010. № 2 (43). С. 280—283. (Серія : Біологія. Спец. вип. : Гідроекологія).
6. Сондак В. В., Волкошовець О. В., Бабич Л. М. Динаміка видового складу рибного населення р. Горинь та ризики виживання аборигенної іхтіофауни в трансформованій річковій мережі // Вісник НУВГП. 2013. Вип. 3 (63). С. 15—23. (Сільськогосподарська наука).
7. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЄС. Основні терміни та їх визначення. Київ, 2006. 240 с.
8. Управление трансграничным бассейном Днепра: суббассейн реки Припяти : монография / ред. Ободевский А. Г., Станкевич А. П., Афанасьев С. А. Київ : Кафедра, 2012. 448 с.
9. Мовчан Ю. В. Риби України (визначник-довідник). Київ : Золоті ворота, 2011. 444 с.
10. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва : Пищевая промышленность, 1966. 376 с.
11. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. ; ред. Романенко В. Д. Київ : Логос, 2006. 408 с.
12. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / Романенко В. Д. та ін. Київ : Символ-Т, 1998. 28 с.
13. Романенко В. Д., Медовник Д. В. Видова та екологічна характеристика іхтіофауни малих річок урбанізованих територій // Гідробіологічний журнал. 2017. Т. 53, № 4. С. 3—12.
14. Крыжановский С. Г. Экологические группы рыб и закономерности их развития // Известия ТИНРО. 1948. Т. 27. С. 4—114.
15. Мовчан Ю. В., Смірнов А. І. Фауна України. Т. 8 : Риби. Вип. 2 : Коропів. Ч. 2 : Шемая, верховодка, бистрянкa, плоскирка, абрамiс, рибець, чехоня, гірчак, карась, короп, гіпофталмiхтис, аристихтис. Київ : Наукова думка, 1983. 360 с.

REFERENCES

1. Ivancheva, E. Yu., & Tereshchenko, V. G. (2007). Vliyanie osobennostey vodosbora na vidovoe raznoobrazie ikhtiofauny maloy reki. *Bioraznoobrazie i rol' zhivotnykh v ekosistemakh: IV mezhdunar. nauchn. konf.: tezisy dokl.* Dnepropetrovsk, 151-153.
2. Hai, A. Ye., & Hroza, V. A. (2010). Mali richky Ukrainy: ekolohichni problemy ta perspektyvy zberezhennta. *Naukovi zapysky Ternopil'skoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. V. Hnatiuka. Serii: Biolohiia. Spets. vyp.: Hidroekolohiia*, 2 (43), 75-77.
3. Konovets, I. M., Kipnis, L. S., Honcharova, M. T., Podruhina, A. B., & Sytnyk, Yu. M. (2013). Ekoloho-toksykologichne doslidzhennia rivniv zabrudnennia vody ta donnykh vidkladiv r. Nyvka v raioni aeroportu «Kyiv». *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 32-44.
4. Romanenko, O. V., Arsan, O. M., Kipnis, L. S., & Sytnyk, Yu. M. (2015). *Ekolohichni problemy Kyivskykh vodoim i prylehlykh terytorii*. Kyiv: Naukova dumka.
5. Kochet, V. M. (2010). Suchasnyi stan ikhtiofauny malykh richok Dnipropetrovskoi oblasti. *Naukovi zapysky Ternopil'skoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. V. Hnatiuka. Serii: Biolohiia. Spets. vyp.: Hidroekolohiia*, 2 (43), 280-283.
6. Sondak, V. V., Volkoshevets, O. V., & Babych, L. M. (2013). Dynamika vydovoho skladu rybnoho naselennia r. Horyn ta ryzyky vyzhyvannia aboryhennoi ikhtiofauny v transformovanii richkovii merezhi. *Visnyk NUVHP. Silskohospodarski nauky*, 3 (63), 15-23.
7. *Vodna Ramkova Dyrektyva YeS 2000/60/JeS. Osnovni terminy ta yikh vyznachennia*. (2006). Kyiv.
8. *Upravlenie transgranichnym basseynom Dnepra: subbasseyne reki Pripyati*. (2012). Obodovskiy A. G., Stankevich A. P., & Afanas'ev S. A. (Eds.) Kiev: Kafedra.
9. Movchan, Yu. V. (2011). *Ryby Ukrainy (vyznachnyk-dovidnyk)*. Kyiv: Zoloti vorota.
10. Pravdin, I. F. (1966). *Rukovodstvo po izucheniyu ryb (preimushchestvenno presnovodnykh)*. Moskva: Pishchevaya promyshlennost'.
11. Arsan, O. M., Davydov, O. A., Diachenko, T. M., Evtushenko, M. Yu., & Zhukynskiy, V. M. (2006). *Metody hidroekologichnykh doslidzhen poverkhnevyykh vod*. Romanenko V. D. (Ed.). Kyiv: Lohos.
12. Romanenko, V. D., Zhukynskiy, V. M., Oksiiuk, O. P., Yatsyk, A. V., Cherniavska, A. P., Vasenko, O. H. et al. (1998). *Metodyka ekolohichnoi otsinky yakosti poverkhnevyykh vod za vidpovidnymi katehoriiamy*. Kyiv: Symvol-T.
13. Romanenko, V. D., & Medovnyk, D. V. (2017). Vydova ta ekolohichna kharakterystyka ikhtiofauny malykh richok urbanizovanykh terytorii. *Hidrobiolohichniy zhurnal*, 53 (4), 3-12.
14. Kryzhanovskiy, S. G. (1948). Ekologicheskies gruppy ryb i zakonomernosti ikh razvitiya. *Izvestiya TinRO*, 27, 4-114.
15. Movchan, Yu. V., & Smirnov, A. I. (1983). *Fauna Ukrainy. Ryby. Koropovi. Shemaia, verkhovodka, bystrianka, ploskyrka, abramis, rybets, chekhonia, hirschak, karas, korop, hipofthalmikhtys, arystykhtys*. (Vol. 1-40; Vol. 8, iss. 2, p. 2). Kyiv: Naukova dumka.

МАЛЫЕ РЕКИ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В КАЧЕСТВЕ МЕСТООБИТАНИЙ ИХТИОЦЕНОЗОВ

Д. В. Медовник, medovnyk@nas.gov.ua, Институт гидробиологии НАН Украины,
г. Киев

Цель. Установление экологического потенциала водных тел различного типа в составе малых рек урбанизированных территорий по особенностям структуры ихтиоценозов, гидрохимическим и эколого-токсикологическим показателям.

Методика. Объектами исследований были представители ихтиофауны, а также вода и донные отложения. Материалы были отобраны в течение 2015–2016 гг. на участках рек Горенка, Лыбедь, Нивка и Сырец в пределах г. Киев. Сбор ихтиологического материала проведен с помощью сачка, без использования средств и методов, противоречащих законодательству или требующих специального разрешения. Обработка проб выполнена согласно общепринятым методикам.

Результаты. Показано, что качественный состав ихтиоценозов водных тел в составе малых рек зависит от их гидроморфологических и гидрологических характеристик. Согласно структуре ихтиоценозов, высокий экологический потенциал был присущ водным телам, где была сохранена непрерывность соединения с принимающим водоемом. Доминирующий комплекс в ихтиоценозах таких водных тел составляли индифферентные к скорости течения аборигенные виды рыб, совершающие сезонные миграции, тогда как на изолированных гидросооружениях водных тел — преимущественно короткоцикловые лимнофилы, в том числе инвазивные. Оценка качества воды по гидрохимическим и эколого-токсикологическим показателям также обнаружила влияние антропогенной трансформации водных тел на их экологический потенциал. Так, более высокая степень загрязненности и токсичности водной среды была присуща более трансформированным водотокам.

Научная новизна. Установлено, что в случае малых рек в пределах г. Киев экологический потенциал водных тел, согласно структуре ихтиофауны, в большей степени зависит от сохранения сообщения с принимающим водоемом и проточности, чем от гидрохимических и токсикологических характеристик.

Практическая значимость. Результаты исследований могут быть использованы для разработки мероприятий, направленных на сохранение и восстановление экосистем малых рек, в том числе их ихтиоценозов.

Ключевые слова: малые реки, антропогенная трансформация, экологический потенциал, структура ихтиоценозов, гидрохимические и эколого-токсикологические характеристики.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЁМОВ ВЫЛОВА РЫБЫ В ОЗЕРАХ И ВОДОХРАНИЛИЩАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

М. Сариева, Mairam.Sarieva@fao.org, Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО ООН), Проект GCP/KYR/012/FIN, г. Бишкек, Кыргызская Республика

М. Алияскаров, chotkaraev@mail.ru, Департамент пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Б. Дженбаев, kg.bek.bm@bk.ru, Национальная Академия наук Кыргызской Республики, г. Бишкек, Кыргызская Республика

А. Сергек уулу, mr.sergekuulu@mail.ru, Национальная Академия наук Кыргызской Республики, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Цель. Разработать эмпирическую модель прогнозирования улова рыбы в озерах и водохранилищах Кыргызской Республики на основе легко измеряемых физико-химических и биологических параметров для эффективного управления и устойчивого использования рыбных ресурсов.

Методика. Пробы воды для последующего анализа отбирали один раз в каждом сезоне (зима, весна, лето, осень) в течение 2014-2015 г. Выборка состояла из следующих параметров: температура воды, кислотно-щелочной баланс воды (pH), электропроводность, содержание растворенного кислорода, минерализация, общая щелочность, нитраты, хлорофилл «а».

Отбор проб проводился в поверхностном слое воды на глубине 0,5 м. в стерильные химические бутылки объемом 250 мл.

Содержание хлорофилла «а» определяли спектрофотометрическим методом в лабораторных условиях по методу, описанному Х. П. Стирлингом. Общую щелочность — титрованием раствора тетраборнокислого натрия (обратное титрование), нитраты — фотометрическим методом с реактивом Грисса после восстановления в кадмиевом редукторе.

Измерение параметров, которые быстро изменяются, таких как концентрация растворенного кислорода (O₂), кислотно-щелочной баланс (pH), температура воды, электропроводность, минерализация осуществляли при помощи аппаратуры, рассчитанной на работу в полевых условиях — «ОАКТОН» DO 110, «ОАКТОН» PH 11, «Orion Star» A 322.

Результаты. Согласно анализу данных, ряд индексов, таких как, морфо-эдафический индекс (МЭИ), первичная продуктивность и биомасса фитопланктона — это существенные показатели при прогнозировании возможных объемов улова, в озерах и водохранилищах умеренных и тропических широт. В ходе наших исследований было выявлено, что с увеличением морфо-эдафического индекса увеличивается вылов рыбы на единицу площади. По результатам проведенного анализа была разработана модель прогнозирования улова рыбы в шести водоемах Кыргызской Республики, которая имеет следующий вид:

$$Y = 0,1154 \times \text{МЭИ}_\Sigma^{1.1628}, \\ Y = 0,5613 \times \text{МЭИ}_\Sigma^{1.1786},$$

© Сариева Майрам, Алияскаров Маил, Дженбаев Бекмамат, Сергек уулу Айбек, 2018

где: Y — улов рыбы, кг/га/год;

МЭИэ — морфо-эдафический коэффициент электропроводности;

МЭИщ — морфо-эдафический коэффициент щелочности.

Научная новизна. Это первое исследование, направленное на разработку эмпирической модели прогнозирования улова рыбы в озерах и водохранилищах Центрально-Азиатского региона. Предложенная Модель, разработанная на основе МЭИ с применением статистического метода анализа, предоставляет существенную практическую помощь при планировании рыбохозяйственного потенциала озёр и водохранилищ в регионах с подобными условиями окружающей среды.

Практическая значимость. Предложенная эмпирическая модель на основе МЭИ может быть использована для управления рыбными запасами в пресноводных водоёмах умеренных и тропических широт.

Ключевые слова: лимнологические параметры, морфо-эдафический индекс (МЭИ), эмпирическая модель прогнозирования улова рыбы.

FISH YIELD PREDICTION IN WATER BODIES OF THE KYRGYZ REPUBLIC

M. Sarieva, Mairam.Sarieva@fao.org, Food and Agriculture Organization of the United Nations, GCP/KYR/012/FIN Project, Bishkek Kyrgyz Republic

M. Aliaskarov, chotkaraev@mail.ru, Department of Pastures, Livestock and Fisheries of the Ministry of Agriculture, Food Industry and Melioration of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic

B. Dzenbaev, kg.bek.bm@bk.ru, National Academy of Science of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic

A. Sergек uulu, mr.sergekuulu@mail.ru, National Academy of Science of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic

Purpose. The development of a Fish Yield Prediction Model for lakes and water reservoirs of the Kyrgyz Republic based on easily measured physico-chemical and biological indicators (limnological parameters) for the effective management and sustainable use of fish resources.

Methodology. Water samples for the analysis were taken once at each season (winter, spring, summer, autumn) during 2014 - 2015. The sampling included the collection of the following parameters: water temperature, acid-base balance of water (pH), electrical conductivity, dissolved oxygen, total dissolved solids (TDS), total alkalinity, nitrates, chlorophyll a.

The samples were taken in surface layer of water at a depth of 0.5 m into 250 ml sterile chemical bottles.

Chlorophyll "a" concentration was measured by a spectrophotometric method in laboratory conditions, according to a method described by Stirling H.P. The total alkalinity was determined by titration of sodium tetraborate solution (reverse titration), nitrates were determined by a photometric method with the Griss reagent after reduction in the cadmium reducing agent.

The measurement of rapidly changing parameters, such as dissolved oxygen concentration (O_2) was carried out by portable field equipment "OAKTON" DO 110, acid-base balance (pH) – "OAKTON" PH 11, measurement of water temperature, electrical conductivity, total dissolved solids (TDS) was carried out with the device "Orion Star"A 322. All measurements were taken directly in water areas.

Findings. According to data analysis, a number of indices, such as the morpho-edaphic index (MEI), primary productivity and biomass of phytoplankton, are strong indicators of fish yield, both in temperate and tropical lakes and reservoirs. It was identified that with an increase in the morpho-edaphic index, fish yield per unit area increases. Based on the results of our analysis, a Fish yield prediction model in six water bodies of the Kyrgyz Republic was developed, which has the following form:

$$Y = 0.1154 \times MEIc^{1.1628},$$

$$Y = 0.5613 \times MEIa^{1.1786},$$

where: Y- fish yield, kg/ha/year;

MEIc - Morpho-edaphic Index of Conductivity;

MEIa - Morpho-edaphic Index of Alkalinity.

Originality. This is the first research on the empirical Model development of fish yield prediction for lakes and water reservoirs in Central Asian region. The proposed Fish Yield Prediction Model, developed on the basis of MEI, using the statistical method of analysis, has invaluable practical utility to understand the fisheries potential of lakes and water reservoirs in the region, where such environmental conditions prevail.

Practical value: If reliable data on fish stock assessment in water bodies are unavailable, the proposed model will be used as one of the tools in the management of fish stocks.

Key words. limnological parameters, morpho-edaphic index (MEI), empirical model of fish yield prediction, commercial fishery.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Общая площадь пресноводных озёр и водохранилищ в Центральной Азии составляет достаточно большую площадь ($43\,475 \times 10^3 \text{ км}^2$), где имеется значительный потенциал для развития внутреннего рыболовства. Однако, в Кыргызской Республике, несмотря на наличие большого разнообразия водных ресурсов, рыболовство развивается недостаточно [1, 2].

С 1930 г., по рекомендации академика Л. С. Берга были сделаны первые попытки развития рыболовства в стране путем вселения новых видов рыб с целью улучшения видового и промыслового состава ихтиофауны в озёрах Кыргызской Республики [3, 4].

Однако, интродукция новых видов рыб, возможно на тот момент не была достаточно изучена и не являлась научно обоснованной, в отдельных случаях данная стратегия зарыбления оказала пагубное влияние на ихтиофауну наших озёр. Отмечается, что за последние годы многие эндемичные виды рыб на озере Иссык-Куль находятся на грани исчезновения, одной из причин чего является акклиматизация хищника — судака (*Sander lucioperca*) и других вселенцев, попавших случайно и наносящих вред рыбным запасам. Естественная продуктивность рыбы в озере Иссык-Куль (6292 км^2), которое представляет большой интерес в рыболовстве, отражает низкий рыбопромысловый потенциал, с примерным уловом в 1,5–2,0 кг/га/год [5].

Существующие в данное время модели по оценке рыб и их эксплуатации нуждаются в действенных мерах во избежание полного их сокращения и хищничества.

Как известно, на производство рыбы в озёрах и водохранилищах влияют физико-химические факторы и биологические показатели продуктивности. В настоящее время многие ученые из разных стран предпринимают попытки связать уловы рыбы в озёрах и водохранилищах с различными биотическими и абиотическими факторами. Ряд индексов, такие как морфо-эдафический

индекс (МЭИ), первичная продуктивность и биомасса фитопланктона, являются мощными показателями улова объектов промысла, как в умеренных, так и в тропических озерах и водохранилищах [6, 7]. Было выявлено, что с увеличением морфо-эдафического индекса увеличивается вылов рыбы на единицу площади. К примеру, в водохранилищах Шри-Ланки в результате исследований было выявлено, что физико-химические и биологические параметры, а также морфологические и эдафические факторы, включая протяженность водосборных бассейнов напрямую влияют на уловы рыбы [8–10].

Впервые Р. Райдер [11] разработал эмпирическую модель прогнозирования улова рыбы, используя МЭИ, указывая, что с увеличением данного индекса увеличивается вылов рыбы на единицу площади. Далее, Р. Райдером в своих исследованиях для североамериканских озер МЭИ был определен как отношение общего количества растворённых в воде твёрдых веществ (минерализация) к средней глубине [11]. Другие исследователи — Н. F. Henderson и R. L. Welcomme, разработали другое определение МЭИ, заменяя минерализацию удельной электропроводностью озер и водохранилищ [12].

МЭИ почти сразу нашел широкое применение в исследованиях многих ученых лимнологов разных стран [8-9].

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕРЕШЕННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

В настоящее время нелегальное, нерегистрируемое и нерегулируемое рыболовство — очень широко распространенная проблема в стране, которая негативно влияет на рыбную отрасль в целом.

К примеру, в озере Сон-Куль, втором по значимости рыбохозяйственном водоёме в стране, было выловлено в 1978 г. 108,2 т (3,96 кг/га) пеляди и сегов, впоследствии производство которых возросло до 140 т в 1980 г. и 330 т/га (5–12 кг/га) в 1990 г. Но такие показатели не оказались устойчивыми, и в настоящее время упали до 2,2 т/год с разрешением на вылов исключительно производителей рыб для воспроизводства [13].

Общей целью наших исследований является предоставление рекомендаций в качестве инструментов управления для гарантирования устойчивого использования рыбных ресурсов в основных озерах и водохранилищах Кыргызской Республики. Данная цель достигается путем развития эмпирической модели прогнозирования улова рыбы, основываясь на легко измеряемых прогнозируемых параметрах. Ряд внутренних озер и водохранилищ Кыргызской Республики был использован в качестве репрезентативной выборки.

Данная проблема в республике исследована в рамках проекта ФАО ООН «Устойчивое развитие аквакультуры и рыболовства», GCP/KYR/012/FIN, финансируемого правительством Финляндии с целью оказать содействие устойчивому развитию внутреннего рыболовства в Кыргызской Республике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились на озере Сон-Куль, Токтогульском водохранилище и в четырех небольших ирригационных водоемах Чуйской области — Токтош, Жекен, Спартак и Чумышском водохранилище, которые используются для рыболовства. Выборка включала сбор следующих параметров: температура воды, кислотнo-щелочной баланс воды (pH), электропроводность, содержание растворенного кислорода, минерализация, общая щелочность, нитраты, хлорофилл «а».

Пробы воды на анализ отбирались один раз в каждом сезоне (зима, весна, лето, осень) в течение 2014–2015 гг. Отбор проб проводился в поверхностном слое воды на глубине 0,5 м в стерильные химические стеклянные бутылки объемом 250 мл.

Измерение содержания хлорофилла «а» осуществлялось спектрофотометрическим методом в лабораторных условиях по методу, описанному Х. П. Стирлингом [14]. Общая щелочность определялась титрованием раствора тетраборнокислого натрия (обратное титрование), содержание нитратов — фотометрическим методом с реактивом Грисса после восстановления в кадмиевом редуторе [15].

Измерение быстро изменяющихся параметров, таких как концентрация растворенного кислорода (O_2), кислотнo-щелочной баланс (pH), температура воды, электропроводность, минерализация осуществлялись полевым оборудованием — «OAKTON» DO 110, «OAKTON» PH 11, «Orion Star» A 322. Все измерения проводились непосредственно в водных участках. Морфо-эдафические индексы, основывающиеся на электропроводности (МЭИэ) и щелочности (МЭИщ), определяли следующим образом:

$MEI_{\text{э}} = \text{Электропроводность (мксм/см)} / \text{Средняя глубина (м)};$

$MEI_{\text{щ}} = \text{Щелочность (мг/л)} / \text{Средняя глубина (м)}.$

Взаимосвязь различных параметров определялась с помощью методов линейной регрессии с соответствующей трансформацией данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В данной статье представлены исследования, проводимые в пяти водохранилищах и озере Сон-Куль, которые охватывали все четыре сезона и были разнообразными с точки зрения географических местоположений и морфологических характеристик. Приводятся усреднённые значения параметров по каждому сезону, представляющие собой надежные данные, указанные с учетом стандартной ошибки.

Морфометрические характеристики и показатели вылова рыб за период 2009–2014 гг. в исследуемых водных объектах приведены в табл. 1.

Физико-химические и биологические параметры изученных водоёмов приведены в таб. 2.

Таблица 1. Морфометрические характеристики и показатели вылова рыб водохранилищ и озера Сон-Куль Кыргызской Республики

Table 1. Morphometric characteristics and indicators of fish catch in of reservoirs and Lake Son-Kul of the Kyrgyz Republic

Водоём/ Water bodies	Площадь (га) / Area (ha)	Средняя глубина (м) / Average depth (m)	Вылов рыбы* (т/год) / Fish catch (t / year)	Вылов рыбы (кг/га/год) / Fish catch (kg/ha/year)
Водохранилище Спартак / Reservoir Spartak	590	5	10,27	17,4
Чумышское водохранилище / Reservoir Chumyshskoe	56	1,5	3,2	57,8
Водохранилище Токтош / Reservoir Toktoosh	15	2	2,7	181,1
Водохранилище Жекен / Reservoir Zheken	30	1,5	5,2	158,6
Токтогульское водохранилище / Reservoir Toktogul'skoe	26,500	69	18,1	0,7
Озеро Сон-Куль / Lake Son-Kul'	2,700	14	50,5	18,

Примечание*. Средний показатель вылов рыбы в водоёмах за пять лет — 2009-2014 гг. (Данные из статистических отчетов Департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства при МСХППИМ КР).

Notes*. The average catch of fish in water bodies over the five years 2009-2014. (Data from statistical reports of the Department of Pastures, Livestock and Fisheries under the Ministry of Agriculture and Food of the Kyrgyz Republic)

Таблица 2. Физико-химические и биологические параметры водохранилищ и озера Сон-Куль Кыргызской Республики*

Table 2. Physico-chemical and biological parameters of reservoirs and Lake Son-Kul of the Kyrgyz Republic *

Водоём/ Water bodies	Т °С / T °C	pH / рН	Электропроводность (µS/cm) / Electrical conductivity (µS/cm)	Растворенный кислород (мг/л) / Dissolved oxygen (mg/l)	Общая минерализация (ppm) / Total Dissolved Salts (ppm)	Общая щелочность, (мг/л) / Total base number (mg/l)	Нитраты (мг/л) / Nitrates (mg/l)	Хлорофилла (мг/м³) / Chlorophylla (mg/m³)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Водохран. Спартак / Reservoir Spartak	14,3	7,1	749,4	14,1	367,8	171,7	0,859	16,8

**ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ВЫЛОВА РЫБЫ
В ОЗЕРАХ И ВОДОХРАНИЛИЩАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

*Продолжение табл. 2
continue of tab. 2*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чумышское водохрани. / Reservoir Chumyshskoe	14,5	7,8	426,9	15,0	209,5	109,0	1,822	12,2
Водохранилище Токтош / Reservoir Toktosh	13,0	7,0	798,8	15,0	390,5	181,7	2,108	14,8
Водохранилище Жекен / Reservoir Zheken	10,5	7,6	649,9	14,1	318,9	163,0	0,928	5,2
Токтогульское водохранилище / Reservoir Toktogul'skoe	15,1	8,2	400,2	11,7	196,5	98,1	0,783	2,2
Озеро Сон-Куль / Lake Son-Kul'	9,6	7,8	525,8	11,4	239,0	139,9	0,004	1,5

Примечание. *Указана стандартная ошибка.
Notes. *Указана стандартная ошибка.

Оценочные значения MEIэ и MEIщ в шести изученных водных объектах приведены в таблице 3.

Таблица 3. Морфо-эдафический индекс на основе электропроводности (MEIэ) и щелочности (MEIщ) водохранилищ и озера Сон-Куль Кыргызской Республики

Table 3. Morpho-edaphic index, which basis on the electrical conductivity (MEIe) and alkalinity (MEIa) in the reservoirs and Lake Son-Kul of the Kyrghyz Republic

Водоемы / Water bodies	MEIэ / MEIe	MEIщ / MEIa
Водохранилище Спартак / Reservoir Spartak	149,9	34,3
Чумышское водохранилище / Reservoir Chumyshskoe	284,6	72,7
Водохранилище Токтош / Reservoir Toktosh	399,4	90,8
Водохранилище Жекен / Reservoir Zheken	433,3	108,7
Токтогульское водохранилище / Reservoir Toktogul'skoe	5,8	1,4
Озеро Сон-Куль / Lake Son-Kul'	37,6	10,0

На рисинку 1 показаны результаты регрессионного анализа взаимосвязи МЭИэ и щелочности (МЭИщ) с содержанием хлорофилла «а» и улова рыбы в шести исследуемых водоемах. Обе формы МЭИ имели положительно значимые взаимосвязи ln-ln с содержанием хлорофилла «а». Сильную положительную связь ln-ln с обеими формами морфо-эдафического индекса имеет улов рыбы.

Рис. 1. Взаимосвязь между независимыми и зависимыми переменными водной среды водохранилищ и озера Сон-Куль Кыргызской Республики

Fig. 1. Interrelation between independent and dependent variables of the water environment of reservoirs and Lake Son-Kul of the Kyrgyz Republic

График показывает, что содержание хлорофилла «а» рассматривается как показатель биомассы фитопланктона. Поскольку хлорофилл «а» имеет положительную связь с МЭИэ и МЭИщ, обе формы МЭИ могут рассматриваться как показатели биологической продуктивности [16]. Для модели хлорофилл «а» и МЭИэ коэффициент детерминации составляет 53,70%, что является недостаточным для применения в описании. Также можно отметить, что p -значение равно 10%, при уровне значимости 5%, то есть нулевая гипотеза о наличии корреляции между факторами отвергается. Слабая описательная возможность модели может объясняться также недостаточным количеством наблюдений. При этом, модель хлорофилл «а» – МЭИщ, имеет более высокий коэффициент детерминации, чем предыдущая модель — 68,18%, что позволяет применять ее для описания. Положительным фактором также является то, что p -значение равно 5%, в таком случае мы принимаем нулевую гипотезу о наличии взаимосвязи между переменными. На основе регрессионного анализа обнаружена положительная взаимосвязь МЭИэ и МЭИщ с уловом рыбы (b и d), следовательно, с возрастанием двух МЭИ увеличиваются уловы рыбы в водоемах. Коэффициент детерминации для модели b и d имеет значения 0,91 и 0,92, что свидетельствует о сильной взаимосвязи переменных, то есть будем считать, что вероятность в построении модели составляет 91 и 92%

соответственно. Также важно то, что р-значение является приемлемым на 5%-ном уровне значимости. Регрессионные взаимосвязи между переменными и уровни их значимости приведены в таблице 4.

Таблица 4. Взаимосвязь между переменными и МЭИ
Table 4. Interrelation between variables and MEI

Взаимосвязь / Interdependence	R ²	p	№ графика / Schedule No.
Хлорофилл «а» = 0.7484 МЭИэ ^{0.4481} / Chlorophyll-a = 0.7484 MEIe ^{0.4481}	0,5370	<0,10	a
Хлорофилл «а» = 1.1534 МЭИщ ^{0.4963} / Chlorophyll-a = 1.1534 MEIa ⁴⁹⁶³	0,6818	<0,05	c
Улов рыбы = 0.1154 МЭИэ ^{1.1628} / Fish catch = 0.1154 MEIe ^{1.1628}	0,9154	<0,02	b
Улов рыбы = 0.5613 МЭИщ ^{1.1786} / Fish catch = 0.5613 MEIa ^{1.1786}	0,9237	<0,02	d

Примечание: *R2 — коэффициент детерминации, p — значение вероятности.

Notes: *R2 — coefficient of determination, p — probability value.

Таким образом, положительные ln-ln отношения обеих форм МЭИ могут рассматриваться как наиболее приемлемые модели прогнозирования продуктивности для озер и водохранилищ в Кыргызской Республике и в географических регионах, где преобладают подобные условия окружающей среды.

Модель прогнозирования улова рыбы в шести водоемах Кыргызской Республики на основе уравнения регрессии имеет следующий вид:

$$Y = 0,1154 \times \text{МЭИэ}^{1.1628},$$

$$Y = 0,5613 \times \text{МЭИщ}^{1.1786},$$

где: Y — улов рыбы, кг/га/год;

МЭИэ — морфо-эдафический коэффициент электропроводности;

МЭИщ — морфо-эдафический коэффициент щелочности.

Это первое исследование по разработке эмпирической модели прогнозирования улова рыбы для озер и водохранилищ в Центрально-азиатском регионе. Предложенная модель прогноза улова, разработанная на основе МЭИ, имеет неопределимую практическую полезность для понимания рыбохозяйственного потенциала озер и водохранилищ в регионе.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Таким образом, в отсутствие каких-либо научных подходов по управлению рыболовством в озерах и водохранилищах, предложенная модель может использоваться для количественной оценки первых приближений промыслового потенциала в подобных водоемах.

Данная модель, разработанная на основе физико-химических и биологических данных пяти водоемов, предлагается для прогноза улова рыбы, где необходимо знать количество рыбной продукции, которую можно отловить, не принося вред её запасам.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Авторы выражают благодарность Представительству Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединённых Наций в Кыргызской Республике и Министерству иностранных дел Правительства Финляндии за поддержку данной научной работы, а также профессору Упали Амарасингхе из университета Келания (Шри-Ланка) за содействие в анализе данных.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шикломанов И. А. Глобальные водные ресурсы // Природа и ресурсы. Париж : ЮНЕСКО, 1990. Вып. 26. С. 34—43.
2. Никитин А. А. Акклиматизация и искусственное воспроизводство сиговых рыб в водоемах Киргизии. Фрунзе, 1976. 121 с.
3. Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Ч. 1. Ленинград : Академия наук, 1948.
4. Гончаров А. И. Рыбохозяйственное освоение водоемов Киргизии. Фрунзе, 1964. С. 93.
5. Условия ихтиофауны рыбной отрасли и управления в озере Иссык-Куль / Конурбаев А. О. и др. Бишкек, 2005. С. 24.
6. Hadrian P. Chemical and Biological Methods of Water Analysis for Aquaculture. Stirling : Institute of Aquaculture University of Stirling, 1985. P. 119.
7. Руководство по химическому анализу поверхностных вод. Ленинград : Гидрометеоздат, 1977. 541 с.
8. Ryder R. A. A method for estimating the potential fish production of north-temperate lakes // Transactions of American Fisheries Society. 1965. Vol. 94. P. 214—218.
9. Henderson H. F., Welcomme R. L. The Relationship of Yield to Morpho edaphic Index and Numbers of Fishermen in African Inland Waters. CIFA Occasional, 1974. Paper 1. 19 p.
10. Oglesby R. T. Relationship of fish yield to lake phytoplankton standing crop, production and morphoedaphic factors // Journal of Fisheries Research Board of Canada. 1977. Vol. 34. P. 2271—2279.
11. Moreau J., De Silva S. S. Predictive Fish Yield Models for Lakes and Reservoirs of the Philippines, Sri Lanka and Thailand : FAO Fisheries Technical. Paper 319. Rome : FAO, 1991. 42 p.
12. Nissanka C., Amarasinghe, U. S. De Silva S. S. Yield Predictive Models for the Sri Lankan Reservoir Fishery // Fisheries Management and Ecology. 2000. Vol. 7. P. 425—436.
13. Amarasinghe U. S., De Silva S. S., Nissanka C. Evaluation of the robustness of predictive yield models based on catchment characteristics using GIS for reservoir fisheries in Sri Lanka // Fisheries Management and Ecology. 2002. Vol. 9. P. 293—302.

14. Китаев С. П. Экологические основы биопродуктивности озер разных природных зон. Москва : Академия наук СССР, Зоологический институт, 1984. 739 с.
15. Wetzel R. G. Limnology : 3rd edition. London : Academic Press, 2001.
16. Годовые отчеты Департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства при МСХППиМ КР за 2009–2014 годы.

REFERENCES

1. Shiklomanov, I. A. (1990). Global water resources. *Nature and resources*, 26, 34-43.
2. Nikitin, A. A. (1976). *Acclimatization and artificial reproduction of whitefishes in the reservoirs of Kyrgyzstan*. Frunze.
3. Berg, L. S. (1948). *Freshwater fish of the USSR and neighboring countries*. Vol. 1. Leningrad, Publishing House of the Academy of Sciences.
4. Goncharov, A. I. (1964). *Fisheries development of reservoirs of Kirghizia*. Frunze.
5. Konurbayev, A. O., Kustareva, L. A., Alpiev, M. N., Kabataev, D. T., & Konurbava, E. S. (2005). *Conditions of ichthyofauna of the fish industry and management in the Issyk-Kul lake*. Bishkek.
6. Hadrian, P. (1985). *Chemical and Biological Methods of Water Analysis for Aquaculture*. Stirling : Institute of Aquaculture University of Stirling.
7. *Guidelines for the chemical analysis of surface waters*. (1977). Leningrad: Gidrometeoizdat.
8. Ryder, R. A. (1965). A method for estimating the potential fish production of north-temperate lakes. *Transactions of American Fisheries Society*, 94, 214-218.
9. Henderson, H. F., & Welcomme, R. L. (1974). The Relationship of Yield to Morpho edaphic Index and Numbers of Fishermen in African Inland Waters. *CIFA Occasional*, 1.
10. Oglesby, R. T. (1977). Relationship of fish yield to lake phytoplankton standing crop, production and morphoedaphic factors. *Journal of Fisheries Research Board of Canada*, 34, 2271-2279.
11. Moreau, J., & De Silva, S. S. (1991). Predictive Fish Yield Models for Lakes and Reservoirs of the Philippines, Sri Lanka and Thailand. *FAO Fisheries Technical*, 319.
12. Nissanka, C., Amarasinghe, U. S., & De Silva, S. S. (2000). Yield Predictive Models for the Sri Lankan Reservoir Fishery. *Fisheries Management and Ecology*, 7, 425-436.
13. Amarasinghe, U. S., De Silva S.S., & Nissanka C. (2002). Evaluation of the robustness of predictive yield models based on catchment characteristics using GIS for reservoir fisheries in Sri Lanka. *Fisheries Management and Ecology*, 9, 293-302.
14. Kitaev, S. P. (1984). *Ecological bases of bioproductivity of lakes of different natural zones*. Moscow: USSR Academy of Sciences, Zoological Institute.
15. Wetzel, R. G. (2001). *Limnology*. 3rd edn. London: Academic Press.
16. *Annual Reports of the Department of Pastures, Livestock and Fisheries under the Ministry of Agriculture and Food of the Kyrgyz Republic for 2009-2014*.

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ВИЛОВУ РИБИ В ОЗЕРАХ І ВОДОСХОВИЩАХ КИРГИЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

М. Сарієва, Mairam.Sarieva@fao.org, Продовольча та сільськогосподарська Організація Об'єднаних Націй (ФАО ООН), Проект GCP / KYR / 012 / FIN, м. Бішкек, Киргизька Республіка,

М. Аліяскарів, chotkaraev@mail.ru, Департамент пасовищ, тваринництва та рибного господарства при Міністерстві сільського господарства, харчової промисловості й меліорації, м. Бішкек, Киргизька Республіка

Б. Дженбаєв, kg.bek.bm@bk.ru, Національна Академія наук Киргизької Республіки, м. Бішкек, Киргизька Республіка

А. Сергек уулу, mr.sergekuulu@mail.ru, Національна Академія наук Киргизької Республіки, м. Бішкек, Киргизька Республіка

Мета. Розробити емпіричну модель прогнозування вилову риби в озерах і водосховищах Киргизької Республіки на основі легко вимірюваних фізико-хімічних і біологічних параметрів для ефективного управління та сталого використання рибних ресурсів.

Методика. Проби води для наступного аналізу відбирали один раз в кожному сезоні (зима, весна, літо, осінь) впродовж 2014—2015 рр. Вибірка включала наступні параметри водного середовища: температура та кислотно-лужний баланс (рН), електропровідність, вміст розчиненого кисню, мінералізація, загальна лужність, нітрати, хлорофіл «а».

Відбір проб здійснювали в поверхневому шарі води на глибині 0,5 м в стерильні хімічні бутлі об'ємом 250 мл.

Вміст хлорофілу «а» визначали спектрофотометричним методом в лабораторних умовах за методом, описаним Х. П. Стірлінгом. Загальну лужність — за допомогою титрування розчину тетраборнокислого натрію (зворотне титрування), нітрати — фотометричним методом з реактивом Грісса після відновлення в кадмієвому редукторі.

Вимірювання параметрів, які швидко змінюються, зокрема — концентрації розчиненого кисню (O_2), кислотно-лужного балансу (рН), температури води, електропровідності, мінералізації здійснювали апаратурою, розрахованою на роботу в польових умовах — «ОАКТОН» DO 110, «ОАКТОН» PH 11, «Orion Star» A 322.

Результати. Згідно з аналізом отриманих даних, низка індексів, такі як морфо-едафічний індекс (MEI), первинна продуктивність та біомаса фітопланктону, є суттєвими показниками для прогнозування можливих обсягів улову об'єктів промислу з озер і водосховищ помірних й тропічних широт. При проведенні досліджень було виявлено, що зі збільшенням MEI зростає вилов риби на одиницю площі. За результатами проведеного нами аналізу була розроблена модель прогнозування вилову риби в шести водоймах Киргизької Республіки, яка має наступний вигляд:

$$Y = 0,1154 \times MEI_e^{1.1628},$$

$$Y = 0,5613 \times MEI_{щ}^{1.1786},$$

де Y — улов риби, кг / га / рік;

MEI_e — морфо-едафічний коефіцієнт електропровідності;

$MEI_{щ}$ — морфо-едафічний коефіцієнт лужності.

Наукова новизна. Це перше дослідження, спрямоване на розробку емпіричної моделі прогнозування вилову риби з озер і водосховищ в Центральній-Азійському регіоні. Запропонована модель, розроблена на основі MEI із застосуванням статистичного методу аналізу, надає істотну практичну допомогу під час планування рибогосподарського потенціалу озер та водосховищ в регіонах з подібними умовами навколишнього середовища.

Практична значимість. Запропонована емпірична модель на основі MEI може бути використана для управління рибними запасами в прісноводних водоймах помірних і тропічних широт.

Ключові слова: лімнологічні параметри, морфо-едафічний індекс, емпірична модель прогнозування вилову риби.

ФОРМУВАННЯ РЕМОНТНО-МАТОЧНОГО СТАДА ТА ВІДТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ХАРІУСА *THYMALLUS THYMALLUS* (LINNAEUS) У ШТУЧНИХ УМОВАХ

А. І. Кучерук, anna-kycheryk@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН
України, м. Київ

А. І. Мрук, amruk@ukr.net Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

І. Ю. Бузевич, busevitch@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН України,
м. Київ

Мета. Розробити методи формування ремонтно-маточного стада та відтворення європейського харіуса у контрольованих умовах рибних господарств Карпатського регіону.

Методика. В ході роботи яку проводили упродовж 2014–2017 рр. використовували загальноовизнані у рибництві методи досліджень. Вирощування однорічок та дволіток риб проводили у ставах площею 135 м². Для інкубації ікри застосовували горизонтальні апарати для лососевих риб типу Шустера. Для годівлі молодших вікових груп харіуса використовували штучний спеціалізований корм європейського виробника «БіоМар».

Результати. Впродовж трьох років на базі Державної установи рибницького форелевого заводу «Лопушно» було виведено ремонтно-маточне стадо європейського харіуса у віці трирічок загальною кількістю 15 екз. За 8 місяців до відтворення із раціону харіуса було вилучено штучний корм та повністю замінено на природний. Для годівлі риб використовували заморожених личинок хірономід (*Chironomidae*). Кормовий коефіцієнт природного корму за термін вирощування маточного стада в середньому становив 6 одиниць.

Середня маса плідників, використаних у відтворенні, становила 181,3 г, середня довжина — 25,0 см. Межі коливань за масою у самців складали від 190 до 260 г, у самиць — від 134 до 200 г; за довжиною у самиць — від 24,5 до 29,0 см, у самців — від 26 до 32 см. Самці на 35,8% переважали самиць за середньою масою; відповідно аналогічний результат спостерігали за середньою довжиною, яка у самців була більшою на 7%. Робоча плодючість самиць в середньому становила 2762±491 ікринок. Запліднення ікринок в середньому складало 60%.

Наукова новизна. Вперше в Україні розроблено цілісний механізм наукових принципів та методичних рекомендацій з формування племінних стад та штучного відтворення європейського харіуса з метою відновлення чисельності популяцій у річках Карпатського регіону.

Практична значимість. Проведені дослідження є основою для планування, та виконання робіт з відновлення чисельності популяцій європейського харіуса у водоймах Карпатського регіону.

Ключові слова: європейський харіус, формування ремонтно-маточного стада, штучне відтворення, рибницькі показники, чисельність популяції.

FORMING A REPLACEMENT-BROOD STOCK OF EUROPEAN GRAYLING *THYMALLUS THYMALLUS* (LINNAEUS) IN ARTIFICIAL CONDITIONS

A. Kucheruk, anna-kycheryk@ukr.net, Institute of Fisheries of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

A. Mruk, amruk@ukr.net Institute of Fisheries of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev

I. Buzevitch, busevitch@ukr.net, Institute of Fisheries of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Purpose. To develop methods for forming of a replacement-brood stock of the European grayling.

Methodology. In the course of the work, we used the generalized results of the studies performed during 2014-2017. Rearing age-1 and 1+ fish was done 135 m² ponds. Water temperature in the winter fluctuated within 2-5°C.

Findings. During three years, we formed a replacement-brood stock of the European grayling of age-3 European grayling with a total number of 15 fish at the State Enterprise "Trout hatchery "Lopushno". Eight months before spawning, artificial feeds were removed from the diet of brood grayling and they were replaced by natural feeds. Frozen chironomid larvae were used in the study. The feed conversion ratio of the natural feeds during rearing of brood stock was 6 units that corresponded to 12.82 kg.

The mean weight of domesticated brood fish used for the spawning was 181.3 g, mean length – 25.0 cm. Weights of males varied from 190 to 260 g, those of females – from 134 to 200 g; lengths of males varied from 26 to 32 cm, those of females – from 24.5 to 29.0 cm. Males exceeded the females by mean weight; a similar result was observed for the mean length, where males exceeded the females by 7%. Working fecundity of females was 2762±491 eggs. Fertilization rate was 60%.

Originality. For the first time in Ukraine, a holistic mechanism of scientific principles and methodical recommendations for artificial reproduction of the European grayling was developed for the purpose of the following stocking of rivers, aimed at preserving their number in the water network of the Carpathian region.

Practical value. The results of the work are the basis for planning, conducting and controlling the results of the artificial reproduction of the European grayling of the Carpathian region.

Keywords: European grayling, initial stock, growing, survival, size and weight indices.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

В останні роки особливого значення набула проблема збереження біологічного різноманіття водних екосистем. Безсумнівно, що найбільш вразливим компонентом біорізноманіття та найчутливішим інтегрованим індикатором його несприятливих змін є рідкісні види тварин і рослин [2,7].

Відновлення чисельності кожного рідкісного виду означає відновлення його функцій в екосистемі, та має розцінюватися як важливий крок до збереження, а часом — і до реставрації біорізноманіття в цілому.

Європейський харіус (*Thymallus thymallus* L.) в Україні є одним з найцінніших у природоохоронному відношенні видів риб з нестабільною чисельністю та недостатнім рівнем вивченості. Тому виникла нагальна потреба розроблення методів формування його маточних стад та окремих технологічних ланок штучного відтворення з метою збереження сталої популяції даного виду. Одним із шляхів такого відтворення та збереження служить створення

спеціальних резерватів (заповідних ядер природних парків тощо). Зазначені заходи можуть стати основою для підвищення ефективності як природного, так і штучного відтворення європейського харіуса. Водночас вирішуватимуться питання створення генетичних ресурсів з метою збереження цього виду для подальшого відтворення чисельності популяцій [6, 10].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Антропогенні чинники, які впливають на популяцію європейського харіуса (у формі браконьєрства та наслідків руслового зарегулювання), набули критичних значень, що не дають можливості підтримувати чисельність даного виду у статусі самовідтворювальної популяції. Зберегти європейського харіуса від повного зникнення на сьогодні можливо лише за допомогою цілеспрямованих робіт з розроблення технологічних підходів до його штучного відтворення [1, 3, 4].

На сьогодні стан популяції європейського харіуса в гірських річках Карпатського регіону погіршується, що підтверджується результатами іхтіологічних досліджень, які були виконані у 2009 р. При цьому зниження чисельності відмічали в р. Тиса та в її основних притоках — річках Тересві, Ріці, Лужанці, у верхів'ях Чорної та Білої Тиси. Частота зустрічання харіуса складала 3,8%, за кількістю в контрольних уловах ставними сітками відносно загальної кількості риб в уловах [5, 6].

Харіус європейський зустрічається також у верхів'ї р. Терембі та її верхніх притоках, річках Лютянці, Тур'ї, Пруті, у басейні Дністра — річках Лімниці, Бистриці Солотвинській та Бистриці Надвірнянській. Відповідно до літературних даних, у XX ст. чисельність уловів харіуса в ріках Закарпаття відповідала уловам форелі, а у відкритих ділянках рік його кількість була на 15–20% вищою [6].

Метою роботи було розроблення технологічних основ формування ремонтно-маточних стад європейського харіуса та його відтворення у штучних умовах.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження з вирощування одnorічок, дворічок та формування маточного стада європейського харіуса проводили у 2014–2017 рр. на рибницькому заводі ДУ «Лопушно» Чернівецької області. Водопостачання здійснювалось за рахунок артезіанської свердловини.

В сучасній рибницькій практиці, як правило, застосовується метод прижиттєвого отримання статевих продуктів. Для уникнення травматизації плідників та зручності роботи проводили анестезію риб у розчині гвоздичної олії концентрацією 1 мл / 10 л води [9].

Екстер'єрну оцінку риб проводили за основними рибницько-іхтіологічними параметрами: масою тіла, довжиною тіла за Смітом, найбільшою та найменшою висотою тіла, найбільшим та найменшим обхватом тіла. Проміри виконували мірною стрічкою з точністю до 0,5 мм. Індивідуальне зважування здійснювали на електронних товарних вагах з точністю до 0,1 г. Дослідження проводили на живій рибі. За результатами вимірювань аналізували та визначали розмірно-вагові та репродуктивні характеристики плідників.

Запліднення ікри здійснювали «сухим» способом. Знеклеювання заплідненої ікри виконували шляхом промивання чистою водою упродовж двох годин. Для інкубації ікри застосовували горизонтальні апарати для лососевих риб типу Шустера, проводячи її в затемненому місці з дотриманням температури води 10–12°C.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Ремонтно-маточне стадо є основою риборозплідника та повносистемного господарства. Головною метою роботи було створення вихідного стада європейського хариуса. У зв'язку з цим, одним з основних завдань серед проблем відтворення даного виду було відпрацювання технології формування маточного стада у штучних умовах та його адаптації до умов утримання, нехарактерних для природних.

Вирощування дволіток проводили в ставу площею 135 м², за глибини 0,8 м та повного водообміну тричі за добу. В зимовий період температура води коливалася в межах 2–5°C. Годівлю риб за даних умов здійснювали через день, використовуючи високобілковий корм «Inicis plus» (розмір крупки складав 2 мм) та «Ефіко Альфа 717» (розмір крупки — 3 мм) датського виробника «БіоМар». Середня маса тіла дволіток у вересні 2015 р. становила 69,1 г за довжини 23,6 см. Коефіцієнт вгодованості складав 1,2 (табл. 1).

Таблиця 1. Біологічні показники дволіток хариуса європейського, вересень 2015 р. (n = 10)

Table 1. Biological indicators of two-year-old European grayling, September 2015 (n = 10)

Показники / Indexes	Статистичні значення / Statistical values		
	(M±m)	δ	Cv
Маса тіла, г / Body weight, g	69,1±1,02	5,80	8,37
Довжина тіла, см / Body length, cm	23,6±0,90	2,91	12,35
Довжина тіла за Смітом, см / Body length by Smith, cm	21,8±0,80	2,66	12,19
Висота тіла найбільша (H), мм / Body height biggest, (H), mm	41,2±0,89	3,20	6,45
Висота тіла найменша (h), мм / Body height smallest (h), mm	11,7±0,52	1,57	13,39
Коефіцієнт вгодованості за Фультоном / Fulton's condition factor	1,2±0,04	0,12	10,39

До складу корму входили такі основні компоненти: рибне борошно, соєвий шрот, кров'яне борошно, ріпаковий шрот, риб'ячий жир, соняшниковий шрот, ріпакова олія, пшениця, кінські боби, горох, вітамінний премікс, мінеральний премікс.

У жовтні 2015 р. на господарстві відбулась масова загибель європейського хариуса. Проведені дослідження показали інфекційне ураження риб бактерією роду *Aeromonas*. У зв'язку з цим, були проведені лікувальні заходи. Риби були пересаджені у пластиковий басейн. У процесі лікування був застосований синтетичний антибіотик

— доксициклін, згідно рекомендацій іхтіопатологічної служби.

Вирощування тріліток проводили у басейні площею 4,5 м². Температура води упродовж року коливалася від 2 до 17°C. Кількість риб, що вижили після інфекції, склала 20 особин.

За даними іноземних літературних джерел та з практичного досвіду словацьких та польських риборозплідників відомо, що вирощування харіуса за годівлі штучними кормами проводять тільки до дворічного віку. Особин, які набувають статевої зрілості, рекомендується годувати виключно природними кормами. За годівлі штучними кормами формування статевих продуктів, а саме — ікринок у самиць відбувається, однак ікринки бувають непридатними до запліднення. У зв'язку з цим за 8 місяців до нересту раціон ремонтного стада харіуса змінювали зі штучного на природний. У наших дослідженнях використовували заморожених личинок комара — хірономід. Конверсія природного корму за термін вирощування маточного стада складала 6 одиниць.

Відбір статевих продуктів від плідників першої генерації, вирощеної у штучних умовах, здійснили 15.04.2017 р. за температури води 6°C. Овуляція ікри у вперше нерестуючих самиць відбулася без стимулювання. У зрілих самців після легкого натискання на черевце спостерігали «текучість» молок, у самиць вільно витікали овульовані ікринки.

Середня маса вирощених в штучних умовах плідників харіуса, використаних у відтворенні, становила 181,3 г, а середня довжина — 25 см. Межі коливань за масою у самців становили від 190 г до 260 г, у самиць — від 134 до 200 г; за довжиною — у самиць — від 24,5 до 29,0 см, у самців — від 26 до 32 см. Тривала практика робіт з плідниками європейського харіуса в процесі відтворення показала позитивні результати застосування для анестезії плідників препарату «Пропісцин». Проте у 2017 р., після заборони в країнах ЄС цього препарату, анестезію риб здійснювали гвоздичною олією. Робоча плодючість самиць в середньому складала 2762 ікринок. Запліднення ікринок становило 60%. Коефіцієнт вгодованості європейського харіуса за Фультоном становив: у самиць 1,1, у самців — 0,9 (табл. 2).

Таблиця 2. Характеристика самиць європейського харіуса ДУ «Лопушно», 2017 р. (n = 7)

Table 2. Characteristics of European grayling females in SE "Lopushyno", 2017 (n = 7)

Статистичні значення / Statistical values	Маса тіла, г / Body weight, g	Довжина тіла, см / Body length, mm	Висота тіла найбільша (Н), мм / Body height biggest (H), mm	Висота тіла найменша (h), мм / Body height smallest (h), mm
(M±m)	172,0±10,7	26,5±0,7	52,8±0,20	15,2±0,05
δ	26,20	1,70	0,69	1,10
Cv	15,00	6,59	13,20	7,30

Коефіцієнт високоспинності у самців складав 4,8 од. та був вищим, ніж у самиць (4,6 од.), що пояснюється більш прогонистою формою тіла у самців. У

порівнянні з природною популяцією самиці були більш прогонисті, ніж самці. Коефіцієнт високоспинності у самиць становив 4,9 од., проти 4,8 од. у самців, тобто самці та самиці за формою тіла практично не відрізнялися.

Таблиця 3. Характеристика самців хариуса європейського, ДУ «Лопушно», 2017 р. (n = 5)

Table 3. Characteristics of European grayling males in SE "Lopushyno", 2017 (n = 5)

Статистичні значення / Statistical values	Маса тіла риби, г / Body weight, g	Довжина тіла, см / Body length, cm	Висота тіла найбільша (Н), мм / Body height biggest (H), mm	Висота тіла найменша (h), мм / Body height smallest (h), mm
(M±m)	196±26,7	28,6±1,2	54,0±3,2	17,8±1,4
δ	53,3	2,4	6,5	2,8
Cv	27,2	8,2	12,0	16

Репродуктивні показники трирічних самиць, вирощених в штучних умовах та вперше використаних у відтворенні, мали високі значення: межі коливань робочої плодючості становили від 2193 до 3511 ікринок; відносна плодючість коливалась від 15,18 тис. до 17,55 тис. ікринок (табл. 4). У порівнянні із самицями з природних водойм, вік яких складав три–чотири роки, середня робоча плодючість самиць, вирощених в штучних умовах, була вищою на 35%. Об'єм еякуляту у вирощених самців в середньому склав 0,4 мл³, що було аналогічним до особин із природних популяцій. Температура води під час відбору ікри коливалась в межах 5–7°C. Відбір статевих продуктів проводили у два етапи, у зв'язку з нерівномірним дозріванням ікри. Відхід ікринок після запліднення в середньому становив 40%. Профілактичну обробку ікринок проводили на стадії вічка розчином формаліну концентрацією 1 : 2000 за експозиції 15 хв.

Таблиця 4. Репродуктивна характеристика самиць європейського хариуса ДУ «Лопушно», 2017 р. (n = 7)

Table 4. Reproductive characteristics of European grayling females in SE "Lopushyno", 2017 (n = 7)

Статистичні значення / Statistical values	Довжина тіла за Смітом, см / Body length by Cmith, cm	Маса тіла, г / Body weight, g	Маса ікри, г / Roe weight, g	Плодючість, ікринок / Fecundity, roes	
				робоча / working	відносна / relatively
(M±m)	26,5±0,7	172,0±10,7	31,9±6,0	2762±491,0	16020±3,6
δ	3,0	26,2	14,7	200,0	8,2
Cv	6,5	15,2	35,1	17,7	5,0

Незапліднені ікринки європейського хариуса мали середні показники діаметру — 2,48 мм та маси — 10,8 мг. Після запліднення та обводнення їхні розміри зростали за масою на 255% та діаметром — на 53%. Середня маса запліднених ікринок після двох годин набрякання становила 38,0 мг, діаметр ікринок змінювався в межах 3,1–4,4 мм (табл. 5).

Таблиця 5. Метрична характеристика ікринок харіуса ДУ «Лопушно»
(n = 70)

Table 5. Metric characteristic of European grayling roe in SE "Lopushyno"
(n = 70)

Статистичні значення / Statistical values	Маса ікринки, мг / Roe weight, mg		Діаметр ікринки, мм / Roe diameter, mm	
	до запліднення / before fertilization	після запліднення / after fertilization	до запліднення / before fertilization	після запліднення / after fertilization
(M±m)	10,80±0,2	38,4±0,50	2,48±0,05	3,80±0,09
δ	0,6	1,3	0,1	0,2
Cv	6,1	3,5	5,1	6,5

На етапі раннього онтогенезу харіуса основна частина особин гине під час ембріонального та личинкового періодів розвитку, тому спостереження за температурою та вмістом розчиненого у воді кисню проводили двічі на добу.

Тривалість ембріогенезу за температури води 5–10°C становила 22–24 доби, що відповідало 200 градусо-дням. Під час інкубації вміст розчиненого у воді кисню складав 6,0–9,5 мг/дм³. Стадія пігментації очей у ембріонів відбулася за середньої температури води 7°C на 15 добу (табл. 6). Меланофори на тілі з'явилися у дві лінії на голові та спині на 18–20 добу.

Таблиця 6. Температурний та кисневий режими під час раннього онтогенезу європейського харіуса, 2017 р.

Table 6. Temperature and oxygen regimes during early ontogenesis of European grayling, 2017

Дата / Date	Температура води, °C / Water temperature, °C		Середня t води, °C / Average water temperature, °C	Вміст O ₂ , мг/дм ³ / O ₂ content, mg/dm ³	Етапи розвитку ембріонів / Stages of embryo development
	ранок / morning	вечір / evening			
1	2	3	4	5	6
Квітень / April					
15	6,0	6,8	6,4	6,0	
16	6,6	7,2	6,9	6,0	
17	6,7	7,0	6,9	6,1	
18	6,8	7,2	7,0	6,3	
19	5,0	5,5	5,3	6,4	
20	5,0	6,0	5,5	6,2	
21	6,0	6,0	6,0	6,0	
22	5,0	6,0	5,5	6,0	
23	5,0	7,1	6,1	8,0	
24	6,0	7,2	6,6	9,3	
25	7,0	7,5	7,3	9,1

Продовження табл. 6
Continue of tab. 6

1	2	3	4	5	6
26	8,0	9,5	8,8	6,0	Початок
27	7,0	8,0	7,5	6,0	пігментації
28	7,0	8,0	7,5	9,1	очей /
29	7,0	9,0	8,0	9,3	Beginning of eye
30	7,0	8,7	7,9	9,5	pigmentation
Травень / May					
1	7,0	8,5	7,8	—	
2	7,0	9	8,0	—	
3	7,0	9,5	8,3	—	
4	8,0	8,7	8,4	—	
5	8,5	9,0	8,8	—	
6	9,0	10,0	9,5	—	Передчасне
7	9,5	10,2	9,9	—	вилуплення /
8	9,0	9,8	9,4	—	Premature
9	8,5	9,3	8,9	—	hatch out
10	9,0	10,0	9,5	—	Масове
					вилуплення /
					Mass hatch out

Рівень виживання під час інкубації ікри в середньому складав 42%.

У дослідженнях 2008 р., коли інкубацію ембріонів проводили у високогірному господарстві «Синевир» із водопостачанням інкубаційних апаратів з річки Чорна, інкубація відбувалася за середньої температури води 7,5°C (межі коливань — 5–14°C). Тривалість інкубації складала 22 доби. Під час неї спостерігалися значні коливання температури упродовж доби — до 10°C, у зв'язку з метеорологічними умовами краю. Виживання за час ембріогенезу становило 21% [11, 12].

Перед вилупленням ембріон в ікринці займав практично весь простір, однак його обертання не припинялося; також спостерігали рух ротового апарату, що характерно для розвитку в природних умовах.

За нашими спостереженнями, в середньому вилуплення ембріонів за період всіх досліджень тривала 5 діб за середньої температури води 7,5°C.

Після вилуплення тіло вільних ембріонів було випрямлене, жовтковий мішок мав овальну форму. Стадія «спокою» вільних ембріонів тривала 8–12 діб, маса тіла становила 10–12 мг, довжина коливалася від 9 до 11 мм.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Сформовано ремонтно-маточне стадо європейського харіуса у віці трирічок в штучних умовах. Середня маса плідників, які були вперше використані у

експериментах зі штучного відтворення, становила $181,3 \pm 10,9$ г, за середньої довжини $25,1 \pm 0,5$ см. Робоча плодючість самиць в середньому складала 2762 ікринки.

За результатами робіт з вирощування європейського хариуса в умовах рибницьких індустріальних форелевих господарств Карпатського регіону була розроблена технологія, яка надасть можливість вирощування та експлуатації ремонтно-маточного стада. Дана технологія включає систему безперервного циклу одержання цьоголіток для зарибнення, а також використання частини молоді для щорічного оновлення ремонтно-маточного стада.

ЛІТЕРАТУРА

1. Афанасьев С. О. Структура біотичних угруповань та оцінка екологічного стану річок басейну Тиси. Київ : Інтертехнодрук, 2006. 101 с.
2. Алимов А. Ф. Роль биологического разнообразия в экосистемах // Вестн. РАН. 2006. Т. 76, № 11. С. 989—994.
3. Габчак Н. Ф. Сучасний прояв руслових процесів та специфіка протипаводкового захисту господарських об'єктів у басейні Тиси в межах Закарпатської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. 2004. № 3. С. 36—42.
4. Дубіс Л. Ф. Методика та основні результати екологічних досліджень річкових басейнів території Закарпатської області // Вісник Львів. ун-ту. 1994. Вип. 19. С. 70—79. (Серія географічна).
5. Мрук А. І., Великопольський І. Й., Устич В. І. Європейський хариус басейну р. Тербля та аспекти його штучного відтворення // Рибогосподарська наука України. 2012. № 1. С. 53—60.
6. Мрук А. І., Устич В. І., Маслянка І. І. Сучасний стан та перспективи відтворення цінних лососевих видів риб в Закарпатті // Проблеми воспроизводства аборигенных видов рыб : науч. сб. Київ : Світ рибалки, 2005. С. 196—200.
7. Тишков А. А. Теория и практика сохранения биоразнообразия. К методологии охраны живой природы в России // Экол. вестн. России. 2006. № 10. С. 9—12.
8. Хандожевская А. И., Мрук А. И., Великопольский И. И. Характеристика европейского хариуса (*Thymallus thymallus* (L.)) из р. Красношурка // Третья Междунар. конф. молодых ученых NACEE : тезисы докл. Санкт-Петербург, 2013. С. 54—55. (Вестник государственной полярной академии ; № 1 (12)).
9. Фомин В. К., Островский М. П. Нерестовая миграция европейского хариуса (*Thymallus thymallus* L.) в ручьевых условиях // Распределение и поведение рыб. Москва : Ин-т эволюц. морфол. и экол. животных АН СССР, 1992. С. 89—107.
10. Mruk A., Ustych V. First experience of artificial reproduction of the european grayling (*Thymallus thymallus*) in Ukraine // International Workshop on the Restoration of fish Populations, Dusseldorf, Germany. Dusseldorf, 2009. P. 63.
11. Peňáz M. Early development of the grayling *Thymallus thymallus* (Linnaeus, 1758) // Acta Scientiarum Naturalium Academiae Scientiarum Bohemoslovacae Brno. 1975. Vol. 9. P. 1—35.
12. Witkowski A. The grayling (*Thymallus thymallus* (L.)) from the rivers of lower Silesia, Poland // Acta hydrobiol. 1975. Vol. 17. P. 355—370.

REFERENCES

1. Afanasev, S. O. (2006). Struktura biotychnykh uhrupovan ta otsinka ekolohichnoho stanu richok baseinu Tysy. Kyiv: Intertekhnodruk.
2. Alimov, A. F. (2006). Rol' biologicheskogo raznoobrazija v jekosistemah. *Vestn. RAN*, 76(11), 989-994.
3. Habchak, N. F. (2004). Suchasnyi proiav ruslovykh protsesiv ta spetsyfika protypavodkovoho zakhystu hospodarskykh ob'ektiv u baseini Tysy v mezhakh Zakarpatskoi oblasti. *Naukovi zapysky Ternopil'skoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu*, 3, 36-42.
4. Dubis, L. F. (1994). Metodyka ta osnovni rezultaty ekolohichnykh doslidzhen richkovykh baseiniv terytorii Zakarpatskoi oblasti. *Visnyk Lviv. un-tu*, 19, 70-79.
5. Mruk, A. I., Velykopolskyi, I. Y., & Ustych, V. I. (2012). Yevropeiskyi kharius baseina r. Tereblia ta aspekty yoho shtuchnoho vidtvorennia. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 53-60.
6. Mruk, A. I., Ustych, V. I., & Maslianka, I. I. (2005). Suchasnyi stan ta perspektyvy vidtvorennia tsinnykh lososevykh vydiv ryb v Zakarpatti. *Problemy vosproyvodstva aboryhennykh vidov ryb: nauch. sb.* Kyiv: Svit rybalky, 196-200.
7. Tishkov, A. A. (2006). Teorija i praktika sohraneniya bioraznoobrazija. K metodologii ohrany zhivoj prirody v Rossii. *Jekol. vestn. Rossii*, 10, 9-12.
8. Handozhevskaja, A. I., Mruk, A. I., & Velikopol'skij, I. I. (2013). Harakteristika evropejs'kogo hariusa (*Thymallus thymallus* (L.)) iz r. Krasnoshurka. *Tret'ja Mezhdunar. konf. molodyh uchenykh NACEE: tezisy dokl.* Sankt-Peterburg, 54-55.
9. Fomin, V. K., & Ostrovskij, M. P. (1992). Nerestovaja migracija yevropejskogo hariusa (*Thymallus thymallus* L.) v ruch'evykh uslovijah. *Raspredelenie i povedenie ryb.* Moskva: In-t jevoljuc. morfol. i jekol. zhivotnyh AN SSSR, 89-107.
10. Mruk, A., & Ustych, V. First experience of artificial reproduction of the european grayling (*Thymallus thymallus*) in Ukraine. *International Workshop on the Restoration of fish Populations*, Dusseldorf, Germany. Dusseldorf, 63.
11. Peňáz, M. (1975). Early development of the grayling *Thymallus thymallus* (Linnaeus, 1758). *Acta Scientiarum Naturalium Academiae Scientiarum Bohemoslovacae Brno*, 9, 1-35.
12. Witkowski, A. (1975). The grayling (*Thymallus thymallus* (L.)) from the rivers of lower Silesia, Poland. *Acta hydrobiol.*, 17, 355-370.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕМОНТНО-МАТОЧНОГО СТАДА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО ХАРИУСА *THYMALLUS THYMALLUS* (LINNAEUS) В ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

А. И. Кучерук, anna-kycheryk@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

А. И. Мрук, amruk@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

И. Ю. Бузевич, busevitch@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Разработать методы формирования ремонтно-маточного стада и воспроизводства европейского хариуса в контролируемых условиях рыбных хозяйств Карпатского региона.

Методика. В ходе работы проведенной в течение 2014–2017 гг., использовали общепризнанные в рыбоводстве методы исследований. Выращивание сеголетков и двухлетков рыб проводили в прудах площадью 135 м². Для инкубации икры применяли горизонтальные аппараты для лососевых рыб типа Шустера. Для кормления младших

возрастных групп хариуса использовали искусственный специализированный корм европейского производителя «БиоМар».

Результаты. В течение трех лет на базе Государственного учреждения рыбоводного форелевого завода «Лопушно» было выращено ремонтно-маточное стадо европейского хариуса в возрасте трехлетков общим количеством 15 экз. За 8 месяцев до воспроизводства из рациона хариуса был изъят искусственный корм и полностью заменен на естественный. Для кормления рыб использовали замороженных личинок хирономид (*Chironomidae*). Кормовой коэффициент естественного корма в течении выращивания маточного стада в среднем составил 6 единиц.

Средняя масса производителей, используемых в воспроизводстве, составляла 181,3 г, средняя длина — 25,0 см. Границы колебаний по массе у самок были от 190 до 260 г, у самок — от 134 до 200 г; по длине — у самок — от 24,5 до 29,0 см, у самцов пределы колебаний составляли от 26 до 32 см. Средняя масса самцов была на 35,8% выше, чем самок, соответственно, аналогичный результат наблюдали по средней длине, — у самцов она преобладала на 7%. Рабочая плодовитость самок в среднем составляла 2762 ± 491 икринок. Оплодотворение икринок в среднем пребывало на уровне 60%.

Научная новизна. Впервые в Украине разработан целостный механизм научных принципов и методических рекомендаций по формированию племенных стад и искусственного воспроизводства европейского хариуса с целью восстановления численности популяций в реках Карпатского региона.

Практическая значимость. Проведенные исследования являются основой для планирования и выполнения работ по восстановлению численности популяций европейского хариуса в водоемах Карпатского региона.

Ключевые слова: европейский хариус, формирование ремонтно-маточного стада, искусственное воспроизводство, рыбоводные показатели, численность популяции.

РЕЗУЛЬТАТИ ШТУЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ ОСЕТРОВИХ РИБ, ВИРОЩЕНИХ У САДКАХ ЗА ПРИРОДНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ВОДОЙМ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

М. М. Пашко, marina-fish@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Третяк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. М. Пашко, pashkoserg@gmail.com, ТОВ – СРП «Осетр», Київська область
О. М. Колос, kolos-en@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Г. Михайленко, mng70@i.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначити основні рибницькі показники штучного відтворення стерляді (*Acipenser ruthenus*) та сибірського осетра (*Acipenser baerii*) з комплексним використанням методів індустріальної аквакультури.

Методика. Матеріалом для досліджень були плідники стерляді та сибірського осетра, виведені у садкових умовах у водоймі з природним температурним режимом лісостепової зони України. Експерименти зі штучного відтворення осетрових риб виконували за регульованого режиму температури води у різні періоди весняного сезону (березень–травень) з використанням для стимулювання дозрівання статевих залоз натуральних гонадотропних препаратів. У процесі підготовки плідників до проведення рибницьких робіт застосовували установки рециркуляційного водопостачання. Визначення рибницьких показників та дослідження фізико-хімічних чинників середовища здійснювали за загальноприйнятими методиками.

Результати. За температури води 14–16°C зареєстровано високу ефективність дозрівання гонад у самок стерляді та сибірського осетра із середньою масою тіла відповідно 2,8 та 11,6 кг. Середня маса отриманої від плідників овульованої ікри становила 0,45 кг у стерляді та 1,48 кг у сибірського осетра. Середні показники робочої плодючості перебували на рівні 43,29 тис. ікринок у стерляді та 83,75 тис. ікринок у сибірського осетра, за відносної робочої плодючості відповідно 15,44 та 7,49 тис. ікринок/кг маси риб. У процесі інкубації ікри розвиток зародків риб на стадіях гастрюляції в середньому становив 87,17% у стерляді та 84,50% у сибірського осетра. Вихід вільних ембріонів обох видів риб від кількості зародків на 15-й стадії ембріонального розвитку в середньому наближався до 83–84%.

Наукова новизна. Досліджено особливості отримання ембріонів від плідників стерляді та сибірського осетра з комбінованим застосуванням різних методів індустріальної аквакультури в умовах осетрового господарства лісостепової фізико-географічної зони України.

Практична значимість. Результати досліджень являють інтерес для розвитку сучасних методів аквакультури осетрових риб в умовах господарств індустріального типу.

Ключові слова: плідники осетрових риб, індустріальне рибництво, штучне відтворення, рибницькі показники, вихід ембріонів.

RESULTS OF ARTIFICIAL REPRODUCTION OF STURGEONS REARED IN CAGES WITH NATURAL TEMPERATURE REGIME OF WATER BODIES OF THE FOREST-STEPPE ZONE OF UKRAINE

M. Pashko, marina-fish@ukr.net, Institute of Fisheries of Ukraine NAAS, Kyiv
A. Tretiak, info@if.org.ua, Institute of Fisheries of Ukraine NAAS, Kyiv

© М. М. Пашко, О. М. Третяк, С. М. Пашко, О. М. Колос, Н. Г. Михайленко, 2018

S. Pashko, pashkoser@gmail.com, «Osetr» Ltd., Kyiv region

Y. Kolos, kolos-en@ukr.net, Institute of Fisheries of Ukraine NAAS, Kyiv

N. Mykhaylenko, mng70@i.ua, Institute of Fisheries of Ukraine NAAS, Kyiv

Purpose. To determine main the technological parameters of artificial reproduction of sterlet (*Acipenser ruthenus*) and Siberian sturgeon (*Acipenser baerii*) with a combined use of industrial aquaculture methods.

Methodology. The material for the study were brood sterlet and Siberian sturgeon reared in cage conditions in a water body with natural temperature regime of the forest-steppe of Ukraine. The experiments were performed at a regulated water temperature regime at different periods of the spring (March-May) with the use of natural gonad-stimulating hormones for the stimulation of the maturation of sexual products in fish. During the process of the preparation of brood fish for fish breeding works, a recirculating water supply facility was used. The determination of technological parameters and study of physical-chemical factors of the environment were performed according to generally accepted methods.

Findings. At a water temperature of 14-16°C, high efficiency of gonad maturation was observed in sterlet and Siberian sturgeon females with mean weight of 2.8 and 11.6 kg, respectively. The mean weight of eggs obtained from the brood fish was 0.45 kg in sterlet and 1.48 kg in Siberian sturgeon. The mean working fecundity was 43.29 thousand eggs in sterlet and 83.75 thousand eggs in Siberian sturgeon at a relative working fecundity of 15.44 and 7.49 thousand eggs/kg of fish body weight, respectively. During the process of egg incubation, development of fish embryos at the gastrulation stage was on average 87.17% in sterlet and 84.50% in Siberian sturgeon. The output of free embryos of both species from the quantity of embryos on the stage 15 of embryonal development was close to 83-84%.

Originality. Peculiarities of the production of embryos from brood sterlet and Siberian sturgeon with a combined use of different methods of industrial aquaculture in the conditions of a sturgeon farm of the forest-steppe physical-geographical zone of Ukraine have been studied.

Practical value. The results of the study are of interest for the devolvement of modern methods of sturgeon aquaculture in the conditions of an industrial type farm.

Key words: brood sturgeons, industrial aquaculture, artificial reproduction, technological parameters, hatching.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

За існуючого катастрофічного зменшення запасів осетрових риб у місцях природного існування єдиною реальною можливістю збільшення обсягів виробництва власної осетрової продукції в Україні є розвиток відповідних напрямів аквакультури. Проте, на сьогодні існують чинники, що стримують функціонування вітчизняного осетрівництва. Серед них — недостатній рівень технологічної оснащеності більшості рибовідтворювальних підприємств та дефіцит племінних ресурсів осетрових риб і, як наслідок, брак осетрової молоді, підрощеної до життєстійких стадій [1–4].

У ситуації, що склалась, певні перспективи пов'язані зі створенням в Україні відносно невеликих господарств індустріального типу із садковим вирощуванням окремих видів та гібридних форм осетрових риб, у тому числі з метою формування племінних груп об'єктів осетрівництва. Відомо, що застосування садкових рибницьких систем вважається одним з найдоступніших методів ведення аквакультури, на створення якого здебільшого не потрібні значні матеріальні витрати [5, 6]. При цьому за наявності спеціального обладнання зі штучного відтворення

осетрових риб з регульованим режимом температури води забезпечуються сприятливі умови для поліциклічного виробництва різних видів осетрової продукції зі зміщенням традиційних строків виконання рибницьких робіт [7, 8].

Серед представників родини *Acipenseridae* для розвитку вітчизняного осетрового господарства значний інтерес становлять стерлядь та сибірський осетер. Ці прісноводні види осетрових риб є досить поширеними об'єктами за різноманітних технологій осетрівництва та користуються постійною увагою дослідників [2–4, 6–13]. Проте, одним з недостатньо вивчених у вітчизняній аквакультурі варіантів культивування осетрових, який мало висвітлювався у літературі, є повносистемне осетрівництво з використанням садків для вирощування племінних груп риб у поєднанні зі штучним відтворенням об'єктів риборозведення в умовах рециркуляційних систем водопідготовки. Цим, зокрема, обґрунтовуються актуальність та новизна проведених досліджень.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Переважну більшість експериментальних досліджень з відтворення осетрових риб в Україні проведено на базі спеціалізованих осетрових заводів. У рибницьких роботах зазвичай використовували плідників аборигенних видів, виловлених із природних водойм або вирощених у ставах [1, 2]. Відбір зрілих статевих продуктів від плідників на цих підприємствах здійснювався переважно у традиційні для певного виду осетрових нерестові терміни із застосуванням стандартних технологій заводського відтворення. Водночас, у вітчизняній аквакультурі залишаються недостатньо дослідженими методи експлуатації осетрових маточних стад з керованим отриманням овульованої ікри та інкубацією ембріонів у різні сезони року як для потреб розвитку ікряно-товарного напряму осетрової аквакультури, так і з метою продукування осетрової молоді. Насамперед це стосується невеликих рибницьких господарств індустріального типу з утриманням ремонтно-маточних груп осетрових риб у плавучих садках, установлених у водоймах з природним температурним режимом. Потребують уточнення показники життєздатності осетрового потомства, отриманого від плідників, вирощених за різних технологій індустріальної аквакультури. Зважаючи на це, метою досліджень було визначення основних рибницьких показників у експериментальних роботах зі штучного відтворення стерляді та сибірського осетра в умовах індустріальної аквакультури з використанням плідників, вирощених у садках за природного температурного режиму водойм Лісостепу України.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Збір експериментальних матеріалів проводили впродовж 2015 та 2018 рр. на базі рибогосподарського підприємства індустріального типу ТОВ-СРП «Осетр» Київської області, розташованого у північній частині лісостепової фізико-географічної зони України.

Для вирощування різновікових груп осетрових риб використовували сітчасті садки площею 24 м² (4×6 м) з різним розміром вічка у делі, які заглиблювали у воду на 2,5 м, що забезпечувало корисний об'єм садкових камер до 60 м³. Садки було розміщено на нерухомо закріплених понтонах у штучно створеній водоймі видовженої форми (каналі) з прямопливним надходженням води з Канівського водосховища на Дніпрі. Вирощування племінного матеріалу осетрових риб в

залежності від віку та маси тіла проводили з різною густотою посадки (переважно із розрахунку 5–20 кг/м² садкових площ). Годівлю риб проводили комбікормами рецептів «Аллер-Аква».

Отримання зрілої ікри стерляді здійснювали у нетрадиційні для відтворення осетрових риб строки (березень). Досліди з відтворення сибірського осетра проводили за природних нерестових термінів у весняний період (квітень–травень). Роботи з отримання зрілих статевих продуктів виконували із застосуванням внутрішньом'язових ін'єкцій плідників суспензією натуральних гіпофізів осетрових та коропових риб. Загальні дози гіпофізарних препаратів для самок риб за дворазових ін'єкцій становили 5 мг/кг для стерляді та 4 мг/кг маси плідників для сибірського осетра. Для самців дози гіпофізарних препаратів становили до 50% від дозувань, використаних для самок. Відбір зрілих статевих продуктів від самок риб проводили прижиттєво методом зціджування ікри після підрізання яйцепроводів [14]. Знеклеювали запліднену ікру з використанням розчину таніну. Для інкубації ембріонів застосовували апарати Вейса об'ємом 8 л.

Експериментальні роботи виконували в умовах рибницького репродуктора, обладнаного установкою замкнутого водопостачання (УЗВ).

Визначення рибницьких показників експериментальних груп осетрових риб та фізико-хімічних параметрів водного середовища проводили, користуючись загальноприйнятими в рибництві та гідрохімії методами [15, 16].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Водойма, у якій проводили вирощування племінного матеріалу осетрових, характеризується постійною проточністю зі швидкістю течії у районі розміщення садків 0,1–0,2 м/с. Понтони садкової лінії розташовані на ділянці з глибинами води 5–9 м.

Температура води у районі розміщення садків залежить від погодних умов відповідного періоду року. Середньомісячна температура води найхолодніших місяців становила 0,5–5,5°C. За температури повітря нижче 10–15°C поверхня води біля садків може замерзати. Влітку середньомісячна температура води на досліджуваних ділянках акваторії зазвичай перебувала в межах 20–24°C. Температурні максимуми (до 25–27°C) фіксували в окремі періоди літньої спеки у поверхневих горизонтах товщі води. Загальна сума тепла за період із середньодобовими показниками вище 10°C становила 3,2–3,4 тис. градусо-днів.

Результати хімічних аналізів загалом свідчать, що показники якості води поблизу садків з різновіковими групами осетрових риб істотно не відхилялись від існуючих гідрохімічних норм для риборозведення. Вміст розчиненого у воді кисню переважно перевищував 5 мгО₂/дм³. Лише в окремі дні літнього сезону концентрація кисню у воді зменшувалась до 3 мгО₂/дм³. Величини водневого показника (рН) води змінювались у межах 7,1–8,1. Концентрація амонійного азоту коливалась у межах 0,45–1,26 мгN/дм³, нітритного — 0,09–0,22 мгN/дм³, нітратного — 0,43–1,76 мгN/дм³. Перевищення зазначеними величинами нормативних значень мали періодичний та короткотерміновий характер. Мінеральний фосфор та загальне залізо виявлені у концентраціях відповідно 0,15–1,11 мгP/дм³ та 0,17–1,28 мгFe/дм³. Перманганатна окиснюваність води становила 6,8–16,0 мгО/дм³. Загальна твердість води перебувала на рівні 3,7–4,6 мг-екв./дм³. Вода характеризується середньою мінералізацією (до 394,8 мг/дм³), за іонним

складом належить до гідрокарбонатного класу групи кальцію.

Для вирощування племінних груп осетрових риб відбирали особин з найкращими екстер'єрними характеристиками без деформації тіла і механічних ушкоджень. Протягом всього періоду формування та експлуатації племінного поголів'я вибраковували риб з погано вираженими статевими ознаками, хворих, виснажених та травмованих особин, а також тих, які значно відстають у рості.

Денна норма кормів рецептів «Аллер-Аква», залежно від маси та віку племінного матеріалу, а також сезону року та умов середовища, становила переважно від 0,5 до 3,0% маси риб за 2–6-разового згодовування. З метою запобігання втратам тонучих кормів та контролю їх поїдання застосовуються підвісні годівниці (металеві рамки різної площі, обтягнені дрібновічковою деллю). Особливо ретельно за поїданням кормів слідкували за пониженої температури води на початку та в кінці періоду вирощування риб, а також у разі погіршення умов середовища.

У зазначених умовах вирощування досліджувані племінні групи осетрових риб демонстрували задовільні показники приростів та позитивну динаміку формування репродуктивної системи. Статевозрілих самок стерляді у стадії реєстрували з 5–6-річного віку, в більшості випадків із досягненням маси 0,8–1,5 кг. Самки сибірського осетра у схожих умовах вирощування досягали статевої зрілості, починаючи з 7–8-річного віку із масою тіла до 6–7 кг.

Вирощені в умовах садків племінні групи стерляді 7–8-річного віку середньою масою 1,5–2,7 кг успішно використані в експериментах з отримання овульованої ікри у нетрадиційні рибницькі строки (січень–березень) для потреб ікряно-товарного виробництва. Зареєстровано високу ефективність дозрівання маточного матеріалу. З 56 екз. плідників 94,5% самок позитивно відреагували на гіпофізарні ін'єкції.

У зв'язку із застосуванням нетрадиційних технологій осетрівництва зі зміщенням звичайних строків отримання зрілих статевих продуктів від плідників стерляді, цілком обґрунтовано виникла потреба в оцінці рибницької якості осетрового потомства, відтвореного таким шляхом. Для проведення експериментів з відтворення риб було відібрано 6 екз. самок стерляді із загальної групи плідників, призначених для отримання овульованої ікри з метою переробки у харчовий продукт.

Отримання зрілих статевих продуктів риб здійснювали наприкінці березня, тобто на місяць раніше орієнтовних строків заводського відтворення стерляді у традиційний нерестовий період. Роботи виконували за регульованого режиму температури води із використанням засобів рециркуляційного водопостачання.

У період проведення рибницьких робіт з відтворення стерляді вміст розчиненого у воді кисню підтримували на рівні, близькому до 9 мгО₂/дм³. Водневий показник (рН) води становив 7,8–8,0. Вода характеризувалась середнім ступенем мінералізації із сумою іонів до 366,1 мг/дм³. Істотних перевищень нормативних значень за рештою гідрохімічних показників не виявлено. Отже, якість води, що використовувалась у процесі відтворення стерляді, в цілому відповідала вимогам для культивування осетрових риб за індустріальних технологій.

За температури води 13,0–14,5°C усі дослідні самки стерляді масою 2,6–3,1 кг (в середньому — 2,8 кг) добре відреагували на дворазові гіпофізарні ін'єкції із загальною дозою 5 мг/кг маси риб. Процес овуляції ооцитів розпочинався через 14 год. після введення вирішальної дози гормонального препарату. Маса зрілих статевих продуктів, відібраних від плідників жіночої статі, становила 0,33–0,53 кг (табл. 1). Коефіцієнт поляризації ядра в ооцитах досліджуваних риб перебував на рівні 0,05–0,07. Робоча плодючість плідників змінювалась у межах 31,85–50,00 тис. ікринок за середньої величини даного показника 43,29 тис. ікринок. Відносна робоча плодючість самок теж характеризувалась високими величинами, що перебували в межах 11,80–17,01 тис. ікринок/кг маси риб (в середньому 15,44 тис. ікринок/кг).

Осіменіння ікри здійснювали спермою одновікових із самками 7–8-річних самців стерляді масою 1,6–2,6 кг (в середньому 2,0 кг). Активність спермій у відібраних статевих продуктах становила 50–90%.

За середньої температури води 14,5°C показники розвитку зародків стерляді на стадії середньої гастрული становили 53–97% (в середньому 87,2%). Період інкубації ікри до початку вилуплення вільних ембріонів, яке мало розтягнений характер, тривав в середньому 145 год. Частка виходу ембріонів з оболонок від проміжних етапів спостережень (стадій гастрмуляції) змінювалась у межах 76–89% (в середньому 83,7%).

Таблиця 1. Результати відтворення стерляді у нетрадиційні рибницькі строки (n = 6)

Table 1. Results of sterlet reproduction in non-traditional fish-breeding period (n = 6)

Показники / Indexes	Маса риб, кг / Weight of fish, kg	Маса отриманих статевих продуктів, кг / Weight of the obtained sexual products, kg	Робоча плодючість, тис.ікринок / Working fecundity, thous. roe	Відносна робоча плодючість, тис.ікринок/кг маси риб / Relative working fecundity, thous. roe / kg of fish weight	Розвиток ембріонів (гастрмуляція), % / Development of embryos (gastrulation),%	Вихід вільних ембріонів від кількості зародків на стадіях гастрмуляції, % / Exit of free embryos from the number of embryos at the stage of gastrulation, %
M±m	2,80±0,07	0,45±0,03	43,29±2,52	15,44±0,75	87,17±6,90	83,67±2,19
max	3,1	0,53	50,00	17,01	97	89
min	2,6	0,33	31,85	11,80	53	76
Cv, %	6,39	14,94	14,29	11,92	19,38	6,40

Рівень виживання личинок у басейнах за період витримування до переходу на активне живлення становив не менше 51,3% за максимальних показників в окремих місткостях до 62,5–67,2%. На наступному етапі виконання рибницьких робіт період вирощування осетрової молоді в басейнах до маси 2,5–3,0 г тривав понад 50 діб за середнього виживання мальків 67,2% (коливання показника в межах 61,3–73,8%).

У період виконання досліджень з відтворення сибірського осетра якість води

за основними хімічними показниками можна вважати придатною для культивування різних вікових груп осетрових. Вміст розчиненого у воді кисню підтримували на рівні не нижче 8,3 мгО₂/дм³. Водневий показник (рН) води становив 7,2–7,4. Вода характеризувалась середнім ступенем мінералізації із сумою йонів до 338,9 мг/дм³. Перманганатна окиснюваність води змінювалась у межах 12,6–14,2 мгО/дм³. Вміст загального заліза у воді не перевищував 0,92 мгFe/дм³. Із виявлених сполук азоту певним перевищенням нормативних значень характеризувався лише амонійний азот (до 1,23 мгN/дм³).

Упродовж другої половини квітня після переміщення плідників сибірського осетра із садків за температури води 13°C, їх протягом тижня витримували у басейнах інкубаційного цеху за температури води 14–15°C. Із усієї дози гіпофізарного препарату для самок 4 мг/кг попередня ін'єкція складала до 20% від загальної кількості гонадотропної речовини. Вирішальне ін'єктування відбувалось з інтервалом між ін'єкціями 12 годин. За температури води 15,5–16,0°C, із восьми використаних у експериментах самок сибірського осетра масою 8,7–14,0 кг (в середньому 11,6 кг) відреагувало на гіпофізарну стимуляцію 7 екз. риб. Процес овуляції ооцитів розпочинався через 18–20 год. після введення вирішальної дози гормонального препарату. Маса зрілих статевих продуктів, відібраних від плідників жіночої статі, становила 0,65–2,08 кг (табл. 2).

Таблиця 2. Результати відтворення сибірського осетра
Table 2. Results of reproduction of Siberian sturgeon

Показники / Indices	Маса риб, кг (n = 8) / Weight of fish, kg (n = 8)	Маса отриманих статевих продуктів, кг (n = 7)* / Weight of the obtained sexual products, kg (n = 7)*	Робоча плодючість, тис. ікринок (n = 7)* / Working fecundity, thousands roe (n = 7)*	Відносна робоча плодючість, тис. ікринок/кг маси риби (n = 7)* / Relative working fecundity, thousandth roe / kg of fish weight (n = 7)*	Розвиток ембріонів (гастрюляція) , % (n = 4)** / Development of embryos (gastrulation), % (n = 4)**	Вихід вільних ембріонів від кількості зародків на стадії гастрюляції, % (n = 4)** / Exit of free embryos from the number of embryos at the stage of gastrulation, % (n = 4)**
M±m	11,61± 0,61	1,48±0,19	83,75±9,88	7,49±1,01	84,50±3,59	83,00±4,78
max	14,0	2,08	112,32	10,45	94	90
min	8,7	0,65	38,35	2,91	78	69
Cv, %	14,81	34,55	31,22	35,72	8,51	11,51

Примітка. * Значення показників визначались після часткового вилучення оваріальної рідини.

** Із загальної кількості плідників (8 екз.) на гормональну стимуляцію відреагувало 7 самок, з яких 4 риби використали для відбору овульованої ікри з метою проведення експериментів з інкубації ембріонів; статеві продукти інших плідників використано для ікряно-товарного виробництва.

Notes. * The values of the indicators were determined after partial ovarian fluid extraction.

Notes ** Of the total number of brood stock (8 individuals), 7 females responded to hormonal stimulation, of which 4 fish were used to select ovulated roe to carry out experiments on embryo incubation; sexual products of other breeders we used for caviar production.

Коефіцієнт поляризації ядра в ооцитах досліджуваних риб перебував на рівні 0,06–0,08. Робоча плодючість плідників змінювалась у межах 38,35–112,32 тис. ікринок за середньої величини даного показника 83,75 тис. ікринок. Відносна робоча плодючість самок становила 2,91–10,45 тис. ікринок/кг маси риб (в середньому 7,49 тис. ікринок/кг).

Осіменіння ікри здійснювали спермою одновікових із самками 8- та 13-річних самців сибірського осетра масою 3,7–8,5 кг (в середньому 7,0 кг). Активність спермій у відібраних статевих продуктах становила 70–80%.

За температури води 16–17°C показники розвитку зародків осетра на стадіях гастрюляції становили 78–94% (в середньому 84,5%). Період інкубації ікри до початку вилуплення вільних ембріонів в середньому тривав до 125 год. Частка виходу ембріонів з оболонок від кількості зародків на стадіях гастрюляції змінювалась у межах 69–90% (в середньому 83%).

Рівень виживання личинок у басейнах за період витримування до переходу на активне живлення становив 49,7–62,3% (в середньому 57,2%). На наступному етапі виконання рибницьких робіт період вирощування осетрової молоді в басейнах до середньої маси 20 г тривав понад 70 діб за середнього виживання риб 70,3% (коливання показника в межах 64,6–74,2%).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Отже, на прикладі діючого рибогосподарського підприємства показано, що в умовах індустріальної аквакультури з використанням водойм з природним температурним режимом у північних регіонах України можна формувати ремонтно-маточні стада осетрових риб, отримуючи при цьому досить високі рибницькі показники. Значні перспективи розглянутих методів вирощування племінних груп осетрових риб пов'язані зі створенням повноциклових осетрових ферм, обладнаних системами замкнутого водопостачання, з пріоритетним розвитком ікряно-товарного виробництва.

За результатами проведених досліджень можна констатувати цілком задовільні показники життєздатності ембріонів стерляді, штучно отриманих у виробничих умовах у нетрадиційні ранньовесняні строки. Дослідження даного спрямування слід продовжити, зважаючи на низку важливих переваг розглянутих технологічних рішень. Насамперед це стосується можливості істотного подовження технологічного етапу, необхідного для вирощування високоякісного рибопосадкового матеріалу з поліпшеними розмірно-ваговими кондиціями з метою використання в аквакультурі. Водночас, висока ефективність вирощування посадкового матеріалу має вирішальне значення для організації робіт з відновлення чисельності популяцій осетрових риб.

ЛІТЕРАТУРА

1. Шерман І. М., Корнієнко В. О., Шевченко В. Ю. Актуальність та передумови доместикації представників родини осетрових в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2006. Вип. 44. С. 145–154.
2. Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні / Третяк О. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2010. № 4. С. 4–22.
3. Козлов В. И., Козлов А. В. Осетроводство. Москва : МГУТУ, 2011. 336 с.

4. Кольман Р. Искусственное размножение осетровых рыб // Проблемы производства посадочного материала исчезающих популяций осетровых рыб. Олыштын : MIR DRUK, 2012. С. 31—43.
5. Бугров Л. Ю. Технология садкового рыбоводства для открытых акваторий — инновационный потенциал повышения эффективности использования водоемов // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Москва : ВНИИР, 2007. С. 62—68.
6. Деякі проблеми аквакультури осетроподібних риб в Україні / Третяк О. М. та ін. // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф. : матер. Київ : ПРО ФОРМАТ, 2018. С. 70—72.
7. Пашко О. М., Третяк О. М., Колос О. М. З досвіду вирощування племінних груп стерляді у садках за природного температурного режиму водойм Лісостепу України // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф. : матер. Київ : ПРО ФОРМАТ, 2018. С. 73—75.
8. Пашко О. М., Третяк О. М., Колос О. М. До питання оцінки життєздатності ембріонів стерляді в умовах заводського відтворення у нетрадиційні строки // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф. : матер. Київ : ПРО ФОРМАТ, 2018. С. 75—76.
9. Савушкина С. И., Козовкова Н. А. Воспроизводство молоди сибирского осетра с использованием криоконсервированной спермы // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Астрахань : БИОС, 2001. С. 66—67.
10. Выращивание сибирского осетра при астатичном температурном режиме в бассейнах / Власов В. А. и др. // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Москва : ВНИИР, 2007. С. 133—140.
11. Шерман І. М., Ігнатів О. В. Вирощування цьоголітків стерляді в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2007. Вип. 50. С. 129—133.
12. Кончиц В. В., Мамедов Р. А. Состояние и перспективы восстановления численности стерляди в водоемах Беларуси // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. Київ : ДІА, 2011. С. 48—58.
13. Разработка эффективных методов производства посадочного материала стерляди для восстановления утраченных популяций / Кольман Р. и др. // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. Київ : ДІА, 2011. С. 67—69.
14. Подушка С. Б. Прижизненное получение икры у осетровых рыб // Биологические ресурсы и проблемы развития аквакультуры на водоеме Урала и Западной Сибири : Всеросс. конф., Тюмень, 17-18 сент. 1996 г. : тезисы докл. Тюмень, 1996. С. 17—18.
15. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеиздат, 1973. 270 с.
16. СОУ – 05.01-37-385:2006. Вода рыбогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).

REFERENCES

1. Sherman, I. M., Korniienko, V. O., & Shevchenko, V. Yu. (2006). Aktualnist ta peredumovy domestykatsii predstavnykiv rodyny osetrovykh v umovakh pivdnia Ukrainy. *Tavriiskyi naukovyi visnyk*, 44, 145-154.
2. Tretiak, O. M. et al. (2010). Stan zapasiv osetrovykh ryb ta rozvytok osetrovoi akvakultury v Ukraini. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 4-22.
3. Kozlov, V. Y., & Kozlov, A. V. (2011). *Osetrovodstvo*. Moskva: MHUTU.
4. Kolman, R. (2012). Yskusstvennoe razmnzhenye osetrovykh ryb. *Problemy proyzvodstva posadochnoho materyala ischezaiushchykh populiatsyi osetrovykh ryb*. Olshtyn: MIR DRUK, 31-43.
5. Buhrov, L. Yu. (2007). Tekhnolohiya sadkovoho rybovodstva dlia otkrytykh akvatoryi — ynnovatsyonnyi potentsyal povysheniya efektyvnosti yspolzovaniya vodoemov. *Ratsyonalnoe yspolzovanye presnovodnykh ekosystem — perspektivnoe napravlenye realizatsyi natsyonalnogo proekta “Razvytye APK”*: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater. Moskva: VNYIR, 62-68.
6. Tretiak, O. M. et al. (2018). Deiaki problemy akvakultury osetropodibnykh ryb v Ukraini. *Suchasni problemy ratsionalnogo vykorystannia vodnykh bioresursiv: Mizhnar. nauk.-prakt. konf.: mater.* Kyiv: PRO FORMAT, 70-72.
7. Pashko, O. M., Tretiak, O. M., & Kolos, O. M. (2018). Z dosvidu vyroshchuvannya plemninnykh hrup sterliadi u sadkakh za pryrodnoho temperaturnoho rezhymu vodoim Lisostepu Ukrainy. *Suchasni problemy ratsionalnogo vykorystannia vodnykh bioresursiv: Mizhnar. nauk.-prakt. konf.: mater.* Kyiv: PRO FORMAT, 73-75.
8. Pashko, O. M., Tretiak, O. M., & Kolos, O. M. (2018). Do pytannia otsinky zhyttiezdatnosti embrioniv sterliadi v umovakh zavodskoho vidtvorennia u netradytsiini stroky. *Suchasni problemy ratsionalnogo vykorystannia vodnykh bioresursiv: Mizhnar. nauk.-prakt. konf.: mater.* Kyiv: PRO FORMAT, 75-76.
9. Savushkina, S. Y., & Kozovkova, N. A. (2001). Vosproyzvodstvo molody sybyrskoho osetra s yspolzovanyem kryokonservirovannoi spermy. *Akvakultura osetrovykh ryb: dostizheniya y perspektivy razvytyia: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater.* Astrakhan: BIOS, 66-67.
10. Vlasov, V. A. et al. (2007). Vyrashchivanye sybyrskoho osetra pry astatychnom temperaturnom rezhyme v basseinakh. *Ratsyonalnoe yspolzovanye presnovodnykh ekosystem — perspektivnoe napravlenye realizatsyi natsyonalnogo proekta “Razvytye APK”*: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater. Moskva: VNYIR, 133-140.
11. Sherman, I. M., & Ihnatov, O. V. (2007). Vyroshchuvannya tshololitiv sterliadi v umovakh pivdnia Ukrainy. *Tavriiskyi naukovyi visnyk*, 50, 129-133.
12. Konchyts, V. V., & Mamedov, R. A. (2011). Sostoianye y perspektivy vosstanovleniya chyslennosti sterliady v vodoemakh Belarusy. *Zberezhennia henofondu ta vidnovlennia populiatsii tsinnykh vydiv ryb: Mizhnar. nauk. konf.: mater.* Kyiv: DIA, 48-58.
13. Kolman, R. et al. (2011). Razrabotka efektyvnykh metodov proyzvodstva posadochnoho materyala sterliady dlia vosstanovleniya utrachenynykh populiatsyi. *Zberezhennia henofondu ta vidnovlennia populiatsii tsinnykh vydiv ryb: Mizhnar. nauk. konf.: mater.* Kyiv: DIA, 67-69.
14. Podushka, S. B. (1996). Pryzhynennoe poluchenye ykry u osetrovykh ryb. *Byolohicheskiye resursy y problemy razvytyia akvakultury na vodoeme Urala y*

- Zapadnoi Sybyry: Vseross. konf., Tiumen, 17-18 sent. 1996 h.: tezisy dokl. Tiumen, 17-18.*
15. Alekyn, O. A., Semenov, A. D., & Skopyntsev, B. A. (1973). *Rukovodstvo po khymycheskomu analyzu vod sushy*. Leningrad: Hydrometeoyzdat.
 16. Voda rybohospodarskykh pidpriemstv. Zahalni vymohy ta normy. (2006). *SOU-05.01.-37-385:2006. Standart minahropolityky Ukrainy*. Kyiv: Ministerstvo ahrarynoi polityky Ukrainy.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСКУССТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСЕТРОВЫХ РЫБ, ВЫРАЩЕННЫХ В САДКАХ С ЕСТЕСТВЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ ВОДОЕМОВ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ

М. М. Пашко, marina-fish@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

А. М. Третьак, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

С. М. Пашко, pashkoserg@gmail.com, ООО – СРП «Осетр», Киевская область

Е. Н. Колос, kolos-en@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Н. Г. Михайленко, mng70@i.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Определить основные рыбоводные показатели искусственного воспроизводства стерляди (*Acipenser ruthenus*) и сибирского осетра (*Acipenser baerii*) с комплексным использованием методов индустриальной аквакультуры.

Методика. Материалом для исследований были производители стерляди и сибирского осетра, выращенные в условиях садков в водоеме с естественным температурным режимом лесостепной зоны Украины. Эксперименты по искусственному воспроизводству осетровых рыб выполняли при регулируемом режиме температуры воды в разные периоды весеннего сезона (март–май) с использованием натуральных гонадотропных препаратов для стимуляции созревания половых продуктов рыб. В процессе подготовки производителей к проведению рыбоводных работ применяли установки рециркуляционного водоснабжения. Определение рыбоводных показателей и исследования физико-химических факторов среды осуществляли по общепринятым методикам.

Результаты. При температуре воды 14–16°C зарегистрирована высокая эффективность созревания гонад у самок стерляди и сибирского осетра средней массой соответственно 2,8 и 11,6 кг. Средняя масса полученной от производителей зрелой икры составляла 0,45 кг у стерляди и 1,48 кг у сибирского осетра. Средние показатели рабочей плодовитости находились на уровне 43,29 тыс. икринок у стерляди и 83,75 тыс. икринок у сибирского осетра, при относительной рабочей плодовитости соответственно 15,44 и 7,49 тыс. икринок/кг массы рыб. В процессе инкубации икры развитие зародышей рыб на стадиях гаструляции в среднем составляло 87,17% у стерляди и 84,50% у сибирского осетра. Выход свободных эмбрионов обоих видов рыб от количества зародышей на 15-й стадии эмбрионального развития приближался к 83–84%.

Научная новизна. Исследованы особенности получения эмбрионов от производителей стерляди и сибирского осетра с комбинированным использованием различных методов индустриальной аквакультуры в условиях осетрового хозяйства лесостепной физико-географической зоны Украины.

Практическая значимость. Результаты исследований представляют интерес для развития современных методов аквакультуры осетровых рыб в условиях хозяйств индустриального типа.

Ключевые слова: производители осетровых рыб, индустриальное рыбоводство, искусственное воспроизводство, рыбоводные показатели, выход эмбрионов.

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 50-88
DOI: 10.15407/fsu2018.03.050
УДК: 639.3/.6(569.4)

Received 13.04.18
Received in revised form 22.05.18
Accepted 08.07.18

ТИЛЯПИЯ (*TILAPINIA*) КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ СОВРЕМЕННОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ. ОПЫТ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ В ИЗРАИЛЕ (ОБЗОР)

Ю. Озиранский, yuri@matc.org.il, Агентство по развитию международного сотрудничества при Министерстве Иностранных Дел Государства Израиль (MASHAV), Международный тренинговый центр по сельскому хозяйству, кибуц Шфаим

Н. Л. Колесник, kolenataleo@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

С. Д. Щербак, schek@gmail.ua, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

Р. В. Кононенко, ruslan_kononenko@ukr.net, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

Н. А. Федоренко, fedorenkono@ukr.net, Бюджетное предприятие «Методическо-технологический центр по аквакультуре», г. Киев

Цель. Государство Израиль за короткий период с 1948 года, невзирая на сложные политические и климато-географические условия, демонстрирует стабильное развитие аквакультуры. Это обусловлено разработкой и повсеместным применением ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, а также тщательным подбором наиболее эффективных объектов культивирования. В связи с этим, израильский опыт культивирования тилапий как одного из главных объектов мировой аквакультуры является актуальным для Украины, тем более что эти виды рыб были успешно завезены в нашу страну, но не нашли широкого распространения в рыбном хозяйстве.

Результаты. Работа, написанная организатором и участниками учебного курса «Интенсивное прудовое рыбоводство», который состоялся в Израиле в декабря 2016 года, является кратким обзором роли тилапий в мировой аквакультуре и технологических схем, по которым их культивируют в этой стране. В частности, приведены данные по мировому экспорту и импорту этих рыб в 2016 году; рассмотрена гастрономическая ценность мяса; описано систематическое положение трибы тилапий; дана краткая рыбоводно-биологическая характеристика основных видов, используемых в рыбном хозяйстве. Особое внимание сосредоточено на видах, успешно культивируемых в Израиле, и технологиях, позволяющих этого достичь.

Практическая значимость. Представленный обзор может быть использован для популяризации тилапий как объектов аквакультуры и модернизации существующих технологий их культивирования в Украине, а также в образовательной и научной деятельности.

Ключевые слова: тилапии, Израиль, рыбохозяйственная отрасль, аквакультура, установки замкнутого водоснабжения (УЗВ), *Tilapia zillii*, *Sarotherodon galilaeus*, *Oreochromis mossambicus*, *Oreochromis niloticus*, *Oreochromis aureus*.

© Ю. Озиранский, Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон, С. Д. Щербак, Р. В. Кононенко, Н. А. Федоренко, 2018

TILAPIA (*TILAPINI*) AS ONE OF THE MAIN OBJECTS OF MODERN AQUACULTURE. EXPERIENCE OF CULTIVATION IN ISRAEL (REVIEW)

Yu. Oziransky, yuri@matc.org.il, Agency for the Development of International Cooperation under the Ministry of Foreign Affairs of the State of Israel (MASHAV), International Training Center for Agriculture, Kibbutz Shefaim

N. Kolesnyk, kolesnik@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

M. Symon, seemann.sm@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

S. Shcherbak, schek@email.ua, Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv

R. Kononenko, ruslan_kononenko@ukr.net, National University of Life and Environmental sciences of Ukraine, Kyiv

M. Fedorenko, fedorenkono@ukr.net, Budget Enterprise "Methodological and Technological Center for Aquaculture", Kyiv

Purpose. *The State of Israel, for a short period in 1948, despite the difficult political and climatic and geographical conditions, demonstrates a stable development of aquaculture. In this regard, the Israeli experience of cultivating tilapia as one of the main objects of world aquaculture is relevant for Ukraine, especially since these fish species were successfully imported into our country, but not widely used in fisheries.*

Findings. *Tilapia has become the third most important fish in aquaculture after carp and salmon; worldwide production exceeded 1,500,000 metric tons in 2002 and increases annually. Because of their high protein content, large size, rapid growth (6 to 7 months to grow to harvest size), and palatability, a number of tilapiine cichlids—specifically, various species of *Oreochromis*, *Sarotherodon*, and *Tilapia* – are the focus of major aquaculture efforts.*

The work written by the organizer and participants of the of the training course “Intensive Pond Fish Culture”, which was held in Israel in December 2016, is a brief overview of the role of tilapias in the world’s aquaculture and the technological schemes by which they are cultivated in this country. In particular, data on world exports and imports of fish in 2016; the gastronomic value of meat is considered; the systematic position of the tribe of tilapias is described; summarizes fish breeding and biological characteristics of the main species used in fisheries. Special attention is focused on the species successfully cultivated in Israel and the technologies that allow it to be achieved. Results of research into tilapia breeding in domestic industrial fish breeding are provided in the article. Ways of efficiency increase in tilapia breeding are focused in the article.

Practical value. *This review can be used to popularize tilapias as aquaculture facilities and upgrade existing technologies for their cultivation in Ukraine, as well as in educational and scientific activities.*

Keywords: *tilapia, Israel, fisheries, aquaculture, recirculating aquaculture system (RAS), *Tilapia zillii*, *Sarotherodon galilaeus*, *Oreochromis mossambicus*, *Oreochromis niloticus*, *Oreochromis aureus*.*

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Продукция аквакультуры составляет 1% всей мировой международной торговли в стоимостном выражении и более 9% глобального сельскохозяйственного экспорта. В 2014 году глобальный экспорт продукции аквакультуры достиг 148 млрд долларов США, по сравнению с 8 млрд долларов США 1976 году [1]. Экспорт продукции аквакультуры из развивающихся стран составил 80 млрд долларов США, что показывает более высокую доходность в сравнении с экспортом мясной продукции, табака, риса и сахара вместе взятых. Рост потребления рыбы произошел благодаря значительному росту поставок продукции аквакультуры и высокому спросу. Последний обусловлен тем, что на

долю рыбы приходится 6,7% общемирового потребления белка, в то же время она является важным источником полиненасыщенных жирных кислот ω -3 и ω -6, кальция, цинка и железа [2]. В мировом масштабе свыше 57 млн человек заняты в секторе аквакультуры [2, 3].

Глобальные поставки рыбы для потребления человеком в последние пять десятилетий опережают рост населения: — по предварительным оценкам уровень потребления на душу населения превышает 20 кг в год, что вдвое выше показателя 1960-х годов, и в большой степени обусловлено ростом аквакультуры [3, 4].

Китай постепенно уступает свои лидерские позиции в развитии аквакультуры Нигерии и другим странам Африки. В регионе южнее Сахары объёмы производства аквакультуры за последние годы выросли более чем в 20 раз. На 2-м месте по темпам развития аквакультуры соседствуют Чили и Индонезия, а на 3-м — Норвегия и Вьетнам [1].

Оптимизация производства за счёт повышения его экологической безопасности и эффективности — это основная тенденция в развитии мировой аквакультуры. В связи с этим, выбор объекта и технологии культивирования приобретает особенную значимость, а в условиях глобальной интеграции и унификации возникает возможность его широкого применения [4]. Таким образом, тилапии, как вторые по значению объекты мировой аквакультуры после карпов, перспективны и для рыбного хозяйства Украины [5]. Заостряя внимание на опыте культивирования этих рыб в Израиле, где они — основные объекты аквакультуры, авторы статьи предлагают актуальную практическую информацию, применимую в условиях Украины.

Цель работы — обобщить информацию относительно роли представителей трибы тилапий в современной аквакультуре и дать краткий обзор опыта культивирования этих видов рыб в Израиле, полученный как «из первых рук» от руководителей и сотрудников научно-исследовательских станций, экспертов консультационной службы, Ассоциации рыбоводов Израиля во время прохождения учебного курса «Intensive pond fish farming» («Интенсивное прудовое рыбоводство») 04–22 декабря 2016 года, так и из открытых источников. Такой обзор будет полезен как рыбоводам-практикам, так и представителям государственных органов управления отраслью, отечественным разработчикам и производителям оборудования для аквакультуры, ученым.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ. ВЫДЕЛЕНИЕ НЕРЕШЕННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Тилапия в современной мировой аквакультуре. Мировое культивирование тилапии характеризуется стабильным ростом. Например, в 1997 г. оно составляло 1 млн т, уступая только карповым (*Cyprinidae*) и лососевым (*Salmonidae*). Уже в 2015 году мировое производство тилапии составило 6,4 млн тонн стоимостью 9,8 млрд долл. США, при этом товарооборот составил 1,8 млрд долл. США [1].

По состоянию на первую половину 2016 года на международный рынок было поставлено около 170 000 тонн тилапии (в основном — из Азии). Например, в

течение рассматриваемого периода из этого региона было экспортировано приблизительно 150 000 тонн тилапии, где в первую пятерку производителей входят Тайвань, Индия, Китай, Таиланд и Малайзия [6]. Следует заметить, что Тайвань стал страной-пионером в производстве тилапии, где её начали выращивать более десяти лет назад, и её экспорт всё время увеличивается. Так, за первую половину 2016 года экспорт тилапии из Тайваня увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Около 62% экспорта составляет замороженная целая рыба, ввозимая в США и рынки Ближнего Востока (Израиль, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн). Индия тоже ориентирована на страны Ближнего Востока: в настоящее время около 90% тилапии, выращенной в этой стране, поставляется в Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Оман. Экспорт китайской тилапии в основном представлен замороженным филе и цельными тушками, поставляемыми в Израиль, Мексику, африканские рынки, Кот-д'Ивуар и Иран. Таиланд, Малайзия и Индонезия также ориентированы на рынок США, африканские и латиноамериканские рынки. В то же время, крупнейшими поставщиками тилапии среди стран Центральной Америки являются Гондурас и Бразилия, где в настоящее время данный вид рыбы выступает вторым по значимости коммерческим видом для сектора аквакультуры. Его основное производство сосредоточено в бразильском штате Парана, где выращивается более 25% процентов от общего объема внутреннего культивирования тилапии. Темпы развития аквакультуры тилапии в Бразилии дают основания предполагать, что эта страна в краткосрочной перспективе станет ведущим производителем тилапии в регионе, а в долгосрочной — сможет конкурировать с Китаем на рынке замороженного филе тилапии. Так, согласно последнему отчету Rabobank, Бразилия увеличит производство тилапии до более чем 490 000 тонн к 2020 году [1].

В то же время, в ряде стран аквакультура тилапии строго регламентируется (как в США, где некоторые виды были признаны опасными инвазивными) или находится под запретом, т.к. всегда существует угроза бесконтрольного проникновения отдельных особей в природные водоёмы [7]. Например, департамент по вопросам охраны окружающей среды Ирана, являющийся органом, отвечающим за предоставление лицензии на выращивание рыбы, запретил разведение в стране тилапии, поскольку она может нанести серьезный вред экосистеме и местным видам гидробионтов, что приведет к весьма серьезным негативным последствиям как для окружающей среды, так и для социально-экономической обстановки [1, 8].

В гастрономическом отношении тилапия стала очень популярной благодаря нежному вкусу плотного белого мяса с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров. Его можно отваривать на пару, печь и жарить. Лучшим считается филе рыбы с меньшим количеством красных прожилок. Мускулатура тилапий сильно развита, что позволяет ей обитать в водоемах с довольно сильным течением, при этом не содержит межмышечных костей, что является превосходным гастрономическим качеством [9]. Её мясо — это прекрасный источник легко усваиваемого белка, оно богато никотиновой кислотой, витаминами группы В, К и Е, кальцием, калием, натрием, железом, магнием и фосфором. Также в тилапии содержится много кислот ω -3 и ω -6, причем последних — в несколько раз больше, чем первых [2]. Мясо этой рыбы

малокалорийно (96 ккал/100 г), поэтому его включают в диетические рационы. Для стандартной диеты в 2000 калорий/день, мясо тилапии обеспечивает следующие значения дневной нормы (размер порции — 880 г): калории — 98%; протеин (18,5 г) — 37%; железо (0 г) — 0%; натрий (52 мг) — 2%; общее количество жира (2,4 г) — 4%; холестерин (0 г) — 0%. Благодаря высокому содержанию полезных белков и минеральных элементов его рекомендуют употреблять детям, беременным женщинам и пожилым людям. Также, эта рыба очень полезна для растущего организма и людей, испытывающих постоянные физические нагрузки. В качестве продукта питания тилапия полезна для:

- нормализации работы нервной системы — ее рекомендуют включать в осенне-зимний рацион для предотвращения депрессии и упадка сил;
- борьбы с признаками старения — в этой рыбе содержится много витамина Е, который является природным антиоксидантом;
- нормализации кроветворения — витамин К стимулирует выработку красных кровяных телец, поэтому эту рыбу рекомендуют употреблять при пониженном гемоглобине;
- для стимуляции умственной деятельности — из-за высокого содержания железа и фосфора, которые благотворно влияют на работу мозга.

Поскольку мясо тилапии содержит гораздо больше полиненасыщенных кислот ω -6, чем ω -3, которые не вырабатываются в организме человека, (их соотношение превышает 3 : 1, а в норме — примерно 1 : 1), то его нужно очень осторожно употреблять при сердечных патологиях, артритах и аутоиммунных заболеваниях. А также при разного рода аллергических заболеваниях, особенно — при астме. Кроме того, из-за дисбаланса жирных кислот тилапию не стоит употреблять каждый день даже при отсутствии каких-либо противопоказаний [10].

Из-за всеядности и неприхотливости тилапию нередко называют «мусорной рыбой» и не советуют употреблять в пищу, так как она может поедать разного рода потенциально опасные отходы [11]. Кроме того, эта рыба может жить и в загрязненных водах, насыщенных вредными веществами. Однако к продукции сертифицированных рыбоводных хозяйств, соблюдающих все биостандарты, это не имеет никакого отношения. Рыба, выращенная на таких фермах, имеет соответствующие сертификаты и абсолютно безопасна [4, 8].

Таксономическая принадлежность тилапий. Само название «тилапия» происходит от местного имени одной из крупнейших рыб этого семейства на языке африканского племени, живущего в районе озера Малави [12]. На ближнем востоке тилапии, как очень широко распространённые рыбы имеют большое культурное, пищевое и хозяйственное значение, а также множество местных, исторических и религиозных названий. Самые известные из них: амнун (на иврите), мушт (арабское), а также «рыба Святого Петра» [4]. В продуктовых магазинах Израиля иногда можно встретить ценники с весьма прозаическим товарным названием тилапии — «морской цыплёнок» или «речная курица» [13].

Таким образом, тилапии, или тилапии, — обобщённое название для нескольких сотен видов рыб, относящихся к разным родам семейства цихлид (*Cichlidae*). Это одно из самых многочисленных семейств костистых пресноводных рыб. Только в Больших Африканских озерах обитает до 200 видов,

а всего известно около 1000 видов цихлид [14]. Они обитают почти во всех проточных и стоячих водоёмах тропической и субтропической зон земного шара. Считается, что это семейство в целом происходит из Малой Азии, а его отдельные роды имеют тропическое африканское происхождение, однако постепенно (со временем и при помощи людей) они широко распространились по всей Африке и большей части Азии. Цихлидам свойственно огромное видовое разнообразие, множество переходных и локальных форм, рас, большая внутривидовая вариабельность из-за широкого ареала обитания, локальности отдельных районов распространения, скрещивания с другими видами на границах ареала. Многие виды внутри родов и даже семейств легко скрещиваются и дают плодовитое потомство, что говорит о том, что видообразование у них не закончено и происходит до сих пор [15]. Рыб этого семейства отличает несколько характерных признаков:

- 1) высокое, сжатое с боков тело;
- 2) один длинный с большим количеством лучей плавник на спине;
- 3) по одному носовому отверстию с каждой стороны головы;
- 4) боковая линия прервана и состоит из двух частей: верхней и нижней;
- 5) забота о потомстве.

Собственно тилапии известны человеку более 3000 лет, их культивировали ещё в древнем Египте и именно они упомянуты в Библии [4]. В наши дни их культивируют как товарную столовую рыбу или декоративную даже в странах, в которых эти рыбы по разным причинам никогда не обитали и не могли выжить, например, в Финляндии или Австралии [8]. В умеренных широтах их успешно культивируют в промышленных условиях на теплых водах энергетических объектов или геотермальных водах, а в летнее время они хорошо развиваются в водоемах-охладителях [16].

В 1970-х годах в большой род тилапии включали более ста видов, распространённых, в основном, в тропических областях. Впоследствии, в 1980-х годах из старого рода *Tilapia* сотрудницей Британского музея естественной истории доктором Э. Труэйвэйс на основании зоогеографических, филогенетических, морфологических и этологических особенностей было выделено 4 рода: *Oreochromis*, *Sarotherodon*, *Danakilia* (один вид *D. franchetti* Vinciguerra) и *Tilapia* [17]. Вышеперечисленные 4 самостоятельных рода объединены в трибу тилапий (*Tilapini*). В 1990-е годы анализ ДНК подтвердил отличия видов этих родов между собой [18].

Кроме того, тилапиями называют представителей нескольких небольших родов семейства цихловых, таких как геротилапия (*Gerotilapia*), хилотилапия (*Chilotilapia*), хоплотилапия (*Choplotilapia*), астатотилапия (*Astatotilapia*), хромидотилапия (*Chromidotilapia*), петротилапия (*Petrotilapia*), офтальмотилапия (*Ophthalmotilapia*), паратилапия (*Paratilapia*), оксиляпия (*Oxilapia*) и ксенотилапия (*Xenotilapia*) [13]. Наиболее перспективными с точки зрения аквакультуры являются представители родов *Oreochromis*, *Sarotherodon* и *Tilapia*, включающие в себя множество видов, подвидов, местных вариаций и натургибридов, часто очень близких, похожих друг на друга и с трудом различающихся [19]. Кроме того, в последние годы основные усилия селекционеров направлены на получение маскулинного стада. Например, в США

специально для промышленного рыбоводства был выведен неприхотливый и быстрорастущий гибрид «Florida Red», представляющая собой помесь альбиносных форм тилапий нильской (*Oreochromis niloticus*) и мозамбикской (*Oreochromis mossambicus*). А в 2015 г. в Китае были зарегистрированы 2 новые породы тилапии. Выведенная компанией «Guolian Aquatic» «Мэй Хуа Цзян № 1» (Mei Hua Jiang No. 1) вырастает до массы 0,6 кг в среднем за 198 дней, будучи при этом очень устойчивой к болезням и адаптированной к экстремальным температурам. Выведенная компанией «Tongwei Co.» «Чжун Вэй № 1» (Zhong Wei No. 1) более эффективна с точки зрения кормопотребления и отличается высокой массой и большим количеством самцов [6]. Ниже рассмотрим общую систематическую принадлежность вышеуказанных родов тилапий.

Все 3 рода относят к семейству цихловых (*Cichlidae*), подотряда губановидных (*Labroidae*), отряда окунеобразных (*Perciformes*), надотряда колючепёрых (*Acanthopterygii*), инфракласса костистые (*Teleostei*), подкласса новопёрые (*Neopterygii*), класса лучепёрые (*Actinopterygii*) рыбы (Leveque, 1997). Между собой они различаются по таким морфометрическим показателям как: число жаберных тычинок, количество жестких и мягких лучей в спинном и анальном плавниках, число чешуи в боковой линии [9, 16].

Род *Oreochromis* — всеядны, достигают наибольшей массы, инкубация проходит во рту только у самок, пары перед нерестом не образуются, характерна полигамия. Половой диморфизм ярко выражен — самцы существенно превосходят по размерам самок, поэтому отбор самых крупных особей на племя без учета этого обстоятельства может привести к диспропорции в соотношении полов [9, 19].

Род *Sarotherodon* — всеядны, вынашивают потомство в ротовой полости только самцы (*S. melanotheron*) или оба родителя (*S. galilaeus*); половой диморфизм выражен слабо, характерна моногамия, переходящая в полигамию в случае преобладания самок [12, 16].

Род *Tilapia*, или *Coptodon* — зачастую с красной окраской груди и брюшка; исключительно либо преимущественно растительноядны; откладывают икру на субстрат и охраняют потомство, половой диморфизм отсутствует, характерна моногамия, причем пары образуются задолго до нереста. Включает в себя 5 подродов: *Dagatia*, *Heterotilapia*, *Neotrewavasiai*, *Pelmatolapia* и *Tilapia* [17].

Общая рыбоводно-биологическая характеристика видов тилапий, используемых в аквакультуре. Наиболее распространёнными объектами аквакультуры являются несколько видов тилапий из родов *Oreochromis*, *Sarotherodon* и *Tilapia* [20]. Краткая сравнительная рыбоводно-биологическая характеристика последних приведена ниже (табл. 1) [21].

Как видно из таблицы, будучи родом из пресных озёр, тилапии прекрасно выдерживают повышение солёности, чем активно пользуются рыбоводы, выращивая их в садках и лагунах [20]. Например, тилапия мозамбикская (*O. mossambicus*) нормально развивается и размножается с промежутками в 28–50 дней в воде солёностью 36,2‰, спокойно адаптируясь к потреблению морских водорослей. В то же время, по темпам роста культивирование тилапий в солёной воде проигрывает пресноводной аквакультуре [21, 22].

Таблица 1. Краткая рыбоводно-биологическая характеристика тилапий (по Привезенцеву Ю. А.)

Table 1. Summary fishery & biological characteristics of tilapia (according to Yu. A. Privezentsev)

Показатель / Indicator	Под <i>Oreochromis</i> Genus <i>Oreochromis</i>				Под <i>Sarotherodon</i> Genus <i>Sarotherodon</i>	Под <i>Tilapia</i> Genus <i>Tilapia</i>		
	<i>O. mossambicus</i>	<i>O. urolepis</i>	<i>O. macrochir</i>	<i>O. aureus</i>	<i>S. galilaeus</i>	<i>T. zillii</i>	<i>T. mariae</i>	<i>T. guineensis</i>
Репродуктивное поведение (вынашивание икры во рту) / Reproductive behavior (hatchery in the mouth)	♀	♀	♀	♀	♀, ♂	—	—	—
Естественный нерест / Nature spawning	—	—	—	—	—	На субстрате / On substrate		
Средняя товарная масса, г / Average market weight, g	200	250	250	200	250	250	250	250
Максимальная масса, кг / Maximum weight, kg	5	—	3	5	—	—	—	3
Начало созревания, мес. / The beginning of maturation, month.	3–7	—	5–7	7–8	5–7	—	—	5–7
Плодовитость, тыс. икринок / Fecundity, thousand roe	0,2–0,6	0,2–0,6	0,2–0,6	0,5–2	0,3–0,8	2–5	0,8–3	2–5
Период эмбрионального развития, сут. / The period of embryonic development, days.	5–7	—	5–7	5–7	7–10	—	—	—
Переносимая солёность, ‰ / Withstand salinity, ‰	до 15	Эври- галин- ный / Euryha- line	—	до 50	15–20	Пресноводные / Fresh-water		
Тип питания / Type of feed behavior	Всеядные / Omnivorous				Раститель- ноядные / Herbivorous	Всеядные / Omnivorous	Раститель- ноядные / Herbivorous	

Также неприхотливы тилапии и к содержанию кислорода в воде. Несмотря на то, что это типичные донные рыбы, при необходимости они могут подниматься в поверхностный слой и дышать, прогоняя через жабры воду из поверхностного слоя воды, более насыщенного кислородом, благодаря соприкосновению с приповерхностным слоем воздуха [9]. Кроме того, им свойственно обогащать

газовый состав крови особым способом: «хлопая» у поверхности жаберными крышками, тем самым взбивая пену и пузырьки воздуха, что аэрирует воду [23]. Устойчивость к низкому содержанию кислорода в воде определяется рядом факторов (вид, возраст, степень зрелости половых продуктов, концентрация растворённых в воде солей, температура воды). Так, при температуре 25°C пороговое содержание кислорода для *O. mossambicus* составляет 0,58–0,64 мг/л, а для *S. melanotheron* — 0,65–0,70 мг/л. Групповой эффект увеличивает потребление кислорода в 1,2–1,8 раза. У половозрелых рыб потребление кислорода ниже, чем у неполовозрелых [19, 21].

Несмотря на то, что большинство тилапий — тропические рыбы, большинство из них могут существовать при весьма широком диапазоне температур — от 10 до 45°C. В то же время, при низких температурах их рост замедляется и при температурах ниже 13°C могут наблюдаться летальные исходы. Однако кратковременное зимнее понижение температуры до 8°C в Израиле в 1955–56 гг. тилапии перенесли благополучно [24]. При температуре воды около 17°C большинство тилапий прекращают потреблять корм, хотя уже при 19°C начинают готовиться к размножению. В холодной воде они собираются в крупные косяки и пребывают в состоянии оцепенения до потепления [20]. На величину пороговых температур влияет концентрация солей, растворённых в воде. В солоноватой и солёной воде тилапии более толерантны как к низкой, так и к высокой температуре [25].

Различия по способу и характеру питания у разных видов тилапий несущественные. Например, тилапии мозамбикская (*O. mossambicus*), золотая (*O. aureus*), мери (*T. mariae*) и нильская (*O. niloticus*) абсолютно всеядны [10]. У таких видов, как тилапия галилейская (*S. galilaeus*), мясистая (*T. sparrmanii*) и макрочир (*O. macrochir*) наблюдается акцент в сторону питания растительным планктоном. А в рационе тилапии меланоплеуры (*S. melanotheron*) и цилли (*T. zillii*) — и вовсе преобладает крупная водная растительность, они более других видов являются растительноядными [21]. У планктофагов длинные и тонкие жаберные тычинки, рыбы с короткими и редкими тычинками питаются крупным кормом. Молодь тилапий до 40–80 мм способна эффективно отфильтровывать и переваривать сине-зеленые водоросли [22]. А крупные взрослые особи, зачастую в половозрелом возрасте, переходят от агрессивной всеядности к питанию микропланктоном. При этом они не процеживают воду подобно толстолобам (*Hypophthalmichthys*), поскольку в их глотке формируются мощные слизистые железы, выделяющие вязкую клейкую слизь, слаборастворимую в воде. К ней и прилипают одноклеточные водоросли, составляющие основу пищи этих рыб. У всех видов тилапий, по мере роста рыб, спектр питания расширяется. В аквакультуре тилапии охотно поедают рисовые отруби, размолотый рис, жмыхи, разнообразные водные и наземные растения, а также всевозможные пищевые отбросы и искусственные корма [9]. Их неоспоримым преимуществом является то, что для хорошего роста им нужно небольшое количество белков животного происхождения (10–20% рыбной муки), а основой всех кормов для этих рыб являются именно дешевые растительные белки. В качестве белковых добавок используют хлореллу, сухой помет птиц, активный ил бытовых сооружений и др. Суточная норма корма для различных видов составляет 2–5% от массы тела, с содержанием протеина 15–20%. Для молоди эти показатели значительно выше [11]. Следует отметить, что при кормлении тилапий как рыб с длинным

кишечником особенно важны балластные вещества или пищевые волокна (в основном — целлюлоза и пектин). Они создают чувство сытости при меньшем количестве потреблённых калорий, сорбируют продукты обмена и нормализуют деятельность желудочно-кишечного тракта, способствуя продвижению пищи по кишечнику. Для всеядных и рыбоядных видов тилапий необходимы 1–2% этих веществ, а для растительоядных — 3–5% [20, 26]. Режим и нормы кормления в значительной степени определяют результаты выращивания. Поскольку тилапии имеют небольшой рудиментарный желудок, их следует кормить многократно в течение суток. Для этого применяют нормированное кормление, при котором рассчитывают норму кормления и режим внесения корма, или кормление рыбы по потребности (бионический метод), применяя различного рода автокормушки. В случае использования бионического метода прироста массы выше, в среднем на 72%, а кормовой коэффициент составляет 1,6, против 2,3 при ручном кормлении [20, 27].

Практически у всех видов тилапий образ жизни связан с непрерывным рытьём и «пережёвыванием» грунта. В связи с этим, в их питании особая роль отведена полуразложившимся органическим донным отложениям — именно аминокислоты, содержащиеся в детрите являются своеобразным ускорителем роста этих рыб [28]. Например, при выращивании мозамбикской (*Oreochromis mossambicus*) и золотой (*Oreochromis aureus*) тилапий доля детрита в питании молоди составляла соответственно 43,3 и 49,9% содержимого кишечника. В питании половозрелых особей этих видов на долю детрита приходится от 49,9 до 87,7% содержимого кишечника [19].

Для тилапии характерна высокая пластичность роста. Скорость роста и конечные размеры рыб одного вида сильно колеблются в зависимости от условий выращивания (температуры воды, размеров и глубины водоёма, его зарастаемости и кормовой базы, гидрохимического режима, состава ихтиофауны) [9, 11]. Например, *O. mossambicus* во Вьетнаме достигает в 10-месячном возрасте массы 850 г, а в Индонезии за тот же срок она может иметь массу до 2,5 кг [29].

Сезон размножения у большинства видов наступает при температуре 26–30°C. Самцы становятся агрессивными, и каждый из них занимает охраняемую им территорию. В зависимости от вида, она может колебаться от 0,5 до 6,0 м² [16].

Нерест у тилапий в благоприятных условиях происходит через небольшие промежутки времени, но с возрастом его периодичность снижается. Кроме того, половая активность падает при снижении температуры ниже оптимального порога [24]. Так, если в тропическом поясе тилапии способны размножаться в течение всего года, то в субтропиках в течение нескольких теплых месяцев, а на границах ареала обитания рыбы размножаются только несколько недель в году [30]. Средняя продолжительность интервалов между нерестами у самок тилапий из рода *Oreochromis* составляет 28 суток [24].

Массовый отбор в маточное стадо проводят среди молодых, впервые созревающих производителей в основном по массе и экстерьеру. В дальнейшем производителей оценивают по качеству потомства. При массовом отборе следует принимать во внимание наличие у тилапии полового диморфизма. Оптимальное соотношение самцов и самок тилапий, относящихся к разным родам, заметно различается. Это необходимо учитывать при формировании маточных стад. У тилапий рода *Oreochromis* оптимальное соотношение самцов и самок 1 : 5–1 : 7. У

тиляпий рода *Sarotherodon* к одной самке подсаживают 1–2 самцов. У тилапий рода *Coptodon*, откладывающих икру на субстрат, соотношение самцов и самок 1 : 1 [9]. Пол тилапий можно определить по половой папиле. У самцов она удлинённой конической формы и оканчивается мочеполовым отверстием, а у самок она короткой цилиндрической формы. Кроме того, половое отверстие у них расположено отдельно от мочевого и находится на передней стороне папилы, ближе к её вершине. Следует заметить, что у тилапий наблюдаются случаи гермафродитизма, характеризующиеся присутствием в семенниках зрелых ооцитов. Кроме того, существенное влияние на выживаемость личинок тилапии оказывает размер икры. Поэтому при отборе производителей предпочтение следует отдавать особям с более крупной икрой [9, 31].

Плодовитость у тилапий разных родов существенно различается. Так, виды, не охраняющие потомство, имеют значительно большую плодовитость. Например, самка тилапии цилли (*Tilapia zillii*) может откладывать 5 тыс. икринок и более. У тилапий, инкубирующих икру в ротовой полости, плодовитость заметно ниже. Величина рабочей плодовитости зависит от массы самки: тилапия мозамбикская (*Oreochromis mossambicus*) может выметать за один нерест, в зависимости от массы тела и условий содержания, от 100 до 2500 икринок [9, 20]. Периодическое извлечение икры у инкубирующих самок — один из методов увеличения их плодовитости. Снижение периода инкубации икринок приводит к увеличению общего числа нерестов [32]. Например, при извлечении эмбрионов из ротовой полости самки на 5-е сутки, продолжительность интервала между нерестами сокращается до 20 суток. Отобранных эмбрионов помещают в инкубаторы вместимостью 1 л (типа аппаратов Вейса), личинки всплывают, а когда переходят на внешнее питание, их переводят в лотки вместимостью 80 л [12].

При выборе технологии заводского воспроизводства тилапий необходимо принимать во внимание особенности их размножения. Например, половозрелые тилапии рода *Oreochromis* в условиях оптимального температурного режима и хорошей обеспеченности кормом способны регулярно откладывать икру через 25–35 суток, а искусственное прерывание вынашивания потомства у самок на 1–5 сут. после нереста приводит к ускорению икрометания [9, 33].

Для всех видов тилапий характерны очень высокие темпы роста, в среднем они достигают половой зрелости уже до года, а самцы несколько опережают самок. В благоприятных условиях и при температуре воды 25–30°C дальнейший нерест может происходить регулярно, примерно раз в месяц [24]. Кроме того, почти все виды тилапий обладают ещё и скрытым гермафродитизмом и обладают способностью к постепенной перемене пола (чаще от самки к самцу) в результате сложного сочетания внешних и внутренних факторов [34]. Обычно тилапия достигает половой зрелости в начале второго года жизни при весе около 100 г, многие особи созревают уже в конце первого лета и только осеннее понижение температуры не дает им возможности выметать икру. С наступлением половой зрелости рост тилапий замедляется, но после нереста его темп возрастает, и ежедневный прирост составляет 3,0–3,5 г [12, 20].

Все тилапии проявляют заботу о потомстве. Отношения между самкой и самцом могут быть моногамными или полигамными. Видам, используемым в аквакультуре, зачастую свойственна полигиния, когда один самец нерестится с

несколькими самками. Такой нерест может быть почти одновременным, как у инкубирующих во рту рыб, когда за день самец может оплодотворить икру нескольких самок, либо поочередным, когда нерест с разными самками происходит по мере того, как ослабевает забота о подросших мальках [35]. Это типично для большинства видов, откладывающих икру на субстрат, хотя моногамные связи в этой группе тоже распространены. Известны у цихлид и случаи полиандрии, когда одна самка нерестится с несколькими самцами. Чаще всего это бывает у инкубирующих во рту, когда самцы враждуют между собой и оплодотворение происходит не одновременно несколькими мужскими особями, а по очереди: выметав порцию икры и оплодотворив её, самка перемещается на участок другого самца и продолжает икрометание. Это стратегия, обеспечивающая большое генетическое разнообразие [36]. Инкубирующие во рту тилипии (в основном из рода *Oreochromis*) после оплодотворения забирают икру в рот и долгое время (до месяца) инкубируют икру и выдерживают мальков во рту, с каждым днём всё дольше и дальше выпуская их на кормление и, таким образом, постепенно приучая к самостоятельному образу жизни (рис. 1).

Рис. 1. Мальки прячутся во рту у родителя

Fig. 1. The fry are hiding in the mouth of the parent specimen

Естественный «инкубатор» во рту у родителей защищает потомство от грибковой и прочей болезнетворной флоры и фауны. Слизистая оболочка ротовой полости взрослой рыбы вырабатывает секрет, угнетающе действующий на патогенную микрофлору. Непрерывное перемешивание икры и личинок в ротовой полости способствует лучшей аэрации и более тесному контакту с секретом слизистой. Постоянно вентилируя и перебирая икру во рту, тилипия ещё и отбраковывает «на ощупь» не оплодотворённые, ослабленные и заболевшие икринки, чем обеспечивает (методом своеобразного искусственного отбора) равномерно сильное потомство. Самки инкубируют икру и держат личинок в ротовой полости в зависимости от температуры воды в течение 10–15 дней. Например, при температуре 27°C эмбриональное развитие занимает 3–5 суток, выклев личинок на 5-е сутки, начало их выхода из ротовой полости — на 11-е, а окончание — на 16-е [9]. В то же время эти величины могут колебаться в зависимости от возраста самки и размера молоди. Вынашивание личинок в ротовой полости представляет идеальную защиту потомства от хищников и обеспечивает молоди при переходе на активное питание уменьшение энергетических затрат на поиски пищи, так как самка выпускает личинок в местах наибольшей концентрации зоопланктона. Однако в аквакультуре работы с такими самками нецелесообразны, в первую очередь потому, что они перестают расти, не питаются и сильно худеют. Другим преимуществом использования в аквакультуре самцов тилипий является то, что затраты в их организме на генеративный обмен намного меньше, чем у самок, вследствие чего противоречие между ростом самого организма и становлением воспроизводительной системы

менее выразительно. В результате развитие семенников может проходить при интенсивном росте рыбы, в отличие от самок. Поэтому усилия рыбководов направлены на получение лишь одних самцов — маскулинизацию стада — которые быстрее достигают товарного размера [20, 37].

Процесс маскулинизации происходит при помощи изменения температур или более распространенным способом — гормональным. После нереста самку берут за хвост и вытряхивают из рта икринки. Икру инкубируют, а когда появившиеся личинки начинают питаться, им дают корм, содержащий мужской половой гормон тестостерон [38]. Рекомендуется использовать молодь длиной 9–11 мм при плотности посадки в бассейны 2600–3000 экз./м³. Доза гормона этилнлестостерона — 60 мг, метилтестостерона — от 30 до 60 мг на 1 кг корма. Время скармливания от трех до шести недель. Выход самцов достигает 80–100 %. Генетика у тилапий не меняется и при этом способе нет нужды вести отдельно двуполоую линию, так как достаточно часть потомства каждый раз вовремя отсаживать «на племя» [39]. Для потребителя ничего опасного в такой обработке нет. Во-первых, рыбы получают очень маленькие количества гормона — микрограммы, а во-вторых, при любой термической обработке — варке, жарке, запекании — гормоны разрушаются. Следует отметить, что использование гормональных препаратов для получения однополого потомства довольно трудоёмко и требует определенных навыков при работе с большим количеством молоди. Перспективным является получение гибридов с выходом самцов от 80 до 100%, которых и выращивают как товарную рыбу [9] (табл. 2).

Таблица 2. Варианты межвидовой гибридизации для маскулинизации стада

Table 2. Variants of interspecific hybridization for masculinization of the herd

♀	♂	% ♂
<i>O. aureus</i>	<i>O. urolepis hornorum</i>	100
<i>O. niloticus</i>	<i>O. urolepis hornorum</i>	100
<i>O. niloticus</i>	<i>O. aureus</i>	80–90
<i>O. niloticus</i>	<i>O. mossambicus</i>	85

Следует отметить, что при использовании гибридов необходимо содержать и чистые линии для получения производителей.

Однако не все тилапии инкубируют икру во рту. Некоторые виды (например, тилапия цилли и зебровая тилапия) мечут икру традиционным для рыб образом, в грунт или на камни, впоследствии бдительно и агрессивно охраняя территорию [39]. Кроме того, они при помощи движения плавников, обдают кладку потоками воды, таким образом инкубируя её в течение двух дней. После выклева эмбрионы находятся 3–4 дня в гнезде, после чего переходят на активное питание [9].

Выход личинок при естественной инкубации достигает 98%. Проводить инкубацию икры можно в аппаратах Вейса или в небольших ёмкостях вместимостью 3–5 л с подачей воздуха. Хорошие результаты получают при инкубации икры и содержании эмбрионов в 8%-ном растворе поваренной соли — выход эмбрионов составляет 80–95 % [12].

Благодаря высокоразвитой сигнальной системе общения и ярко выраженному

территориальному инстинкту тилapia являются излюбленным материалом для биологических исследований в области зоопсихологии и подводной акустики. Так, эти рыбы общительны, отличаются жизнерадостным характером и очень богатым поведением. Они с готовностью реагируют на своего хозяина, привязываются к нему, отличаются от прочих людей и с лёгкостью вырабатывают многочисленные и сложные условные рефлексы, не уступая в этом отношении большинству привычных домашних животных [39]. При содержании в аквариуме тилapia драчливы и сильно роются в грунте, не допуская на «свой участок» ни одной чужой рыбы, а зачастую и не оставляя в окрестностях ни одного растения. Для содержания тилapiй требуется весьма просторный аквариум с небольшим количеством сильных растений и многочисленными укрытиями и лабиринтами из камней.

Культивирование тилapiй в Израиле имеет длительную историю, описанную ещё в Библии, и с начала 1950-х годов характеризуется стремительным ростом. Например, тилapia являются объектами как рыболовства (например, в 2004 г. из озера Кинерет было выловлено более 300 тонн этих рыб), так и рыбоводства (в том же 2004 г. было выращено 9270 тонн) [4]. Более того, в пустынях Негев и Арава тилapiй выращивают на подземных водах, высокая минерализация которых делает их непригодными для сельского хозяйства. Следует заметить, что помимо аборигенных видов тилapiй (астатотилapia флавия, тилapia цилли, израильской, галилейской и нильской) в страну были завезены другие виды тилapiй (например, тилapia мозамбикская и макрочире) которых успешно культивируют в разных типах хозяйств [40]. Кроме того, как было замечено выше, в Израиль импортируют мороженную тилapiю из стран Юго-Восточной Азии, хотя во многие из них впервые эти виды были завезены именно из Израиля (табл. 3).

Таблица 3. Вселение тилapiй в страны Азии и Океании [39]

Table 3. The introduction of tilapias into the countries of Asia and Oceania [39]

Вид / Species	Страна-реципиент / Country retsepiant	Страна-интродуцент / Country introductory	Дата первого вселения / Date of first introduction	Цель вселения / The purpose of the introduction
<i>Oreochromis aureus</i>	Вьетнам / Vietnam	Китай / China	2002	аквакульти- рование / aquaculture
	Китай / China		1981	
	Мьянма / Myanmar		1977	
	Таиланд / Thailand	Израиль / Israel	1970	
	Тайвань / Taiwan		1974	
	Фиджи / Fiji		1974	
	Филиппины / Philippines	США / USA	1977	
	Япония / Japan	Тайвань / Taiwan	1980	
	Австралия / Australia	неизвестно / unknown	неизвестно / unknown	неизвестно / unknown
	Сингапур / Singapore			
	Пакистан / Pakistan	Египет / Egypt	1985	рыбная ловля / fishing

**ТИЛЯПИЯ (TILAPIN) КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ СОВРЕМЕННОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ.
ОПЫТ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ В ИЗРАИЛЕ (ОБЗОР)**

Продолжение табл. 3

Continue tab. 3

Вид / Species	Страна-реципиент / Country retsepiant	Страна- интродуцент / Country introductory	Дата первого вселения / Date of first introduction	Цель вселения / The purpose of the introduction
<i>Oreochromis macrochir</i>	Япония / Japan	США / USA	1964	аквакультиви- рование / aquaculture
	Китай / China		1981	
	Индия / India	Таиланд / Thailand	1952	рыбная ловля / fishing
	Пакистан / Pakistan	Египет / Egypt	1951	
	Индонезия / Indonesia	Восточная Африка / East Africa	1939	неизвестно / unknown
	Непал / Nepal	Таиланд / Thailand	1988	
<i>Oreochromis mossamu bicus</i>	Камбоджа / Cambodia	Вьетнам / Vietnam	1980	аквакультиви- рование / aquaculture
	Кирибати / Kiribati	Израиль / Israel	1963	
	Китай / China	Сингапур, Таиланд / Сингапур, Thailand	1940	
	Мьянма / Myanmar	Китай / China	1957	
	Сингапур / Singapore	Индонезия / Indonesia	1943	
	Соломоновы острова / Solomon islands		1957	
	Французская Полинезия / French polynesia	Израиль / Israel	1950	
	Мальдивы / Maldives		1965	
	Микронезия / Micronesia		1970	
	Тайвань / Taiwan	Индонезия / Indonesia	1944	
	Таиланд / Thailand	Малайзия / Malaysia	1949	
	Фиджи / Fiji		1954	
	Филиппины / Philippines		1950	
	Бангладеш / Bangladesh		1954	
	Индия / India	Таиланд / Thailand	1952	
	Южная Корея / South Korea		1953	
	Япония / Japan		1954	
	Австралия / Australia	Израиль / Israel	неизвестно / unknown	
				декоративная / decorative

Вид / Species	Страна-реципиент / Country retsepiient	Страна- интродуцент / Country introductory	Дата первого вселения / Date of first introduction	Цель вселения / The purpose of the introduction
<i>Oreochromis niloticus</i>	Бангладеш / Bangladesh		1974	
	Индия / India	Таиланд / Thailand	1990	
	Малайзия / Malaysia		1974	
	Вьетнам / Vietnam	Тайвань / Thailand	1973	
	Китай / China	Судан / Sudan	1978	
	Тайвань / Taiwan		1965	
	Индонезия / Indonesia	Япония / Japan	1971	аквакультиви- рование / aquaculture
	Таиланд / Thailand		1966	
	Мьянма / Myanmar		1977	
	Непал / Nepal		1985	
	Сингапур / Singapore	Израиль / Israel	1970	
	Филиппины / Philippines		1970	
	Фиджи / Fiji		1968	
	Япония / Japan	Египет / Egypt	1962	
	Шри-Ланка / Sri Lanka	неизвестно / unknown	неизвестно / unknown	неизвестно / unknown
	Пакистан / Pakistan	Египет / Egypt	1985	рыбная ловля / fishing
	Китай / China	Япония / Japan	1966	
	Индонезия / Indonesia	Тайвань / Taiwan	1969	аквакультиви- рование / aquaculture
	Пакистан / Pakistan	Египет / Egypt	1985	
	Непал / Nepal	Таиланд / Thailand	1988	
<i>Oreochromis spilurus</i>	Филиппины / Philippines	Тайвань / Taiwan	1979	аквакультиви- рование / aquaculture
	Индонезия / Indonesia	Филиппины / Philippines	1980	
<i>Oreochromis urolepis</i>	Япония / Japan	Израиль / Israel	1981	
	Фиджи / Fiji	Китай / China	1985	
	Китай / China	Коста-Рика / Costa Rica	1981	аквакультиви- рование / aquaculture
	Шри-Ланка / Sri Lanka	Восточная Африка / East Africa	1969	
	Тайвань / Taiwan	Китай / China	неизвестно / unknown	неизвестно / unknown

**ТИЛЯПИЯ (*TILAPIN*) КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ СОВРЕМЕННОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ.
ОПЫТ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ В ИЗРАИЛЕ (ОБЗОР)**

Продолжение табл. 3

Continue tab. 3

Вид / Species	Страна-реципиент / Country retsepient	Страна- интродуцент / Страна- интродуцент	Дата первого вселения / Date of first introduction	Цель вселения / The purpose of the introduction
<i>Sarotherodon galilaeus</i>	Китай / China	Африка / Africa	1981	аквакультиви- рование / aquaculture
	Япония / Japan	США / USA	1964	
<i>Sarotherodon melano-theron</i>	Китай / China	Гана / Ghana	2002	аквакультиви- рование / aquaculture
	Япония / Japan	США / USA	1960	
<i>Tilapia mariae</i>	Австралия / Australia	Израиль / Israel	1960	декоративная / decorative
<i>Tilapia rendalli</i>	Шри-Ланка / Sri Lanka	Заир / Zaire	1955	аквакультиви- рование / aquaculture
	Тайвань / Taiwan	Восточная Африка / East Africa	1969	рыбная ловля / fishing
	Китай / China	Южная Африка / South Africa	1981	
	Таиланд / Thailand	Бельгия / Belgium	1955	
<i>Tilapia sparrmanii</i>	Япония / Japan	США / USA	1959	аквакультиви- рование / aquaculture
<i>Tilapia zillii</i>	Фиджи / Fiji	Гавайи / Hawaii	1957	аквакультиви- рование / aquaculture
	Япония / Japan	Египет / Egypt	1962	
	Китай / China	Южная Африка / South Africa	1963	
	Гуам / Guam	Гавайи / Hawaii	1956	
	Тайвань / Taiwan	Южная Африка / South Africa	1981	
	Филиппины / Philippines	Израиль / Israel	1970	
	Таиланд / Thailand	Малайзия / Malaysia	1949	
	Шри-Ланка / Sri Lanka	Восточная Африка / East Africa	1969	неизвестно / unknown

В Израиле тилапия популярна благодаря своему диетическому мясу, которое ценится выше мяса карпа — на уровне лосося. Объем продаж тилапии примерно соответствует таковому карпа [41]. Потребление тилапии постоянно растет, в том числе и по демографическим причинам: происходит смена пожилых ашкенази (субэтнической группы евреев, сформировавшейся в Центральной Европе и исповедующих иудаизм германского канона), для которых основной рыбой был

камп, на молодежь, которая, как и сефарды (евреи-репатрианты из арабских стран, курдистанские, персидские, афганские, среднеазиатские, грузинские, кавказские и кочинские евреи, исповедующие иудаизм испанского канона), предпочитает тилипию [13].

Ниже мы рассмотрим основные виды тилипий, использующихся в аквакультуре Израиля.

Золотая или израильская, тилипия (*Oreochromis aureus* Steindachner, 1864) из рода *Oreochromis* (рис. 2).

Рис. 2. *Oreochromis aureus*

Fig. 2. *Oreochromis aureus*

Нативный ареал обитания распространяется на Северную (Алжир, Ливия, Марокко, Тунис) и Западную Африки (Сахель, Судан, тропические леса гвинейского региона), а также и Ближний Восток. В 1961 году была завезена в США, где позже нанесла значительный экологический ущерб и была объявлена инвазивным видом. Ввиду исключительной толерантности к понижению температуры (выдерживает температуры от 8 до 41°C) и солёности воды (до 45‰), часто используется для аклиматизации в Европе [42]. В Украину она завезена в 1983 г. Однако оптимум температуры воды для неё составляет 22–35°C, а пороговые температуры – 10–15 и 38–42°C. Средняя длина 20 см, но достигает 45 см и массы 2,7 кг. Живет в среднем до 5 лет, но возможны случаи — и до 12 лет. Туловище довольно высокое, сжатое с боков, несёт один большой (до 34 лучей) спинной плавник. Голова относительно короткая и широкая, что связано с особенностями их размножения — инкубацией икры и выдерживанием личинок в ротовой полости [43]. Рот крупный, сильно развитый. На челюстях имеется несколько рядов коротких зубов. Жаберные тычинки редуцированы до небольших бугорков. Боковая линия прервана и состоит из двух частей: хвостовой нижней и спинной верхней. Плавники хорошо развиты. Спинной плавник имеет большое количество жестких, острых лучей, в анальном плавнике несколько утолщенных колючек. Хвостовой плавник симметричный и веерообразный. Чешуя крупная, плотно сидящая, циклоидного или ктеноидного типа. Количество позвонков — 25–33. Полифаг, основной корм — планктон. Кишечник в 3–8 раз длиннее тела, сечение почти одинаковое по всей его длине. Желудок однокамерный, без пилорических придатков, на его дне расположены железы. В пилорическом отделе желудка мышцы толстые. Переваривание всех химических компонентов пищи завершается при прохождении 2/3 длины кишечника [44]. Плавательный пузырь очень тонкий, замкнутый. Внутривисцеральный жир располагается вокруг печени и гонад и вдоль кишечника. *O. aureus* имеет диплоидное (2n) хромосомное число 44 и гаплоидное/гаметное (n)

22, с лёгкостью образуя гибриды с другими видами тилапий. Половая зрелость наступает в возрасте 2–3 месяцев при длине около 10 см. Половой диморфизм ярко выражен — самки намного меньше самцов. Кроме того, у самцов более крупные челюсти и массивная голова, плавники у них больше, спинной и анальный заострённые и удлинённые. Они ярче окрашены и более агрессивны. Для нереста необходима минимальная температура 20°C, желателен длительный световой день — короткий способен ингибировать нерест [45]. Нерест происходит на мелководьях, покрытых растительностью. Самцы перед нерестом занимают выбранную территорию, изгоняя с неё более слабых самцов и неготовых к нересту самок. После этого они при помощи плавников и рта расчищают территорию и роют яму глубиной до 60 см и диаметром 4–6 м. Потом происходит ритуал ухаживания с пощипыванием и разворотом хвоста. Самка, готовая к нересту, откладывает икру в гнездо, а самец оплодотворяет её, после чего она забирает икру в рот, где проходит эмбриональное развитие. Самки с оплодотворённой икрой уплывают на глубину, в то время как самцы возобновляют нерестовую деятельность с другими самками. Плодовитость составляет от 160 до 1600 икринок в зависимости от размера самок. Икра желто-коричневого цвета, вытянутой яйцевидной формы. В зависимости от возраста самки, её диаметр варьирует от 2 до 4 мм. В течение 2–4 дней после оплодотворения, в зависимости от температуры, появляется эмбрион, который 3–4 дня питается желтком. Личинки пребывают в ротовой полости самки до достижения длины 1 см, после чего в течении 5 дней плывут рядом с её головой, при малейшей опасности прячась у неё во рту [46, 47]. *O. aureus* выживает при понижении температуры воды до 6,7–8,0°C и содержания растворённого кислорода до 0,2–0,3 мг/л. При благоприятных условиях среды эта рыба достигает товарной массы 200–400 г уже за 6–8 мес.

Нильская тилапия (*Oreochromis niloticus*) из рода *Oreochromis*. Нативный ареал нильской тилапии охватывает тропические и субтропические области северо-восточной, центральной и западной Африки и Ближнего Востока. Широко распространена в бассейнах рек Нил и Нигер, в озёрах Танганьика, Баринго, Крейтер, Киву, Рудольф, Тана, встречается в реке Яркон (Израиль) [4]. Интродуцирована в водоёмы многих стран мира, включая такие страны и регионы как Южная Африка, Азия, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, США. Максимальная длина тела — 60 см, максимальный вес — 4,3 кг, максимальная продолжительность жизни — 9 лет. Сжатое с боков тело покрыто циклоидной чешуёй. Спинной плавник длинный, с 16–17 жёсткими лучами и 11–15 мягкими ветвистыми лучами. Жёсткая и мягкая части спинного плавника не разделены. Анальный плавник с 3 жёсткими и 10–11 мягкими лучами. Высота хвостового стебля равна его длине. Хвостовой плавник усечённый. Выпуклость на верхней части рыла отсутствует. На первой жаберной дуге 27–33 жаберных тычинок [48]. Боковая линия прерывистая. Окраска туловища серебристая, с чуть голубоватым отливом. Спина темнее брюшка. На теле имеются чётко выраженные поперечные полосы, достигающие нижней трети брюшка. Точечные пятна на хвостовом плавнике собраны в концентрические полосы. В нерестовый период появляется брачная окраска, особенно явно выраженная у самцов. Спина и бока приобретают светло-оранжевую окраску, а брюшко — оранжево-красную; на нижней челюсти

появляется красно-оранжевое пятно [49]. Брюшные, спинной и анальный плавники становятся красноватыми, на хвостовом плавнике появляются многочисленные чёрные полосы (рис. 3).

Рис. 3. *Oreochromis niloticus*

Fig.3. *Oreochromis niloticus*

Полифаг, основным кормом служат макрофиты, однако в состав рациона входят фитопланктон, зелёные (*Chlorophyta*) и сине-зелёные водоросли (*Cyanobacteria*), диатомовые водоросли (*Diatomeae*, или *Bacillariophyceae*), личинки воздушных насекомых, водные насекомые и икра рыб [24, 50]. Наблюдается сезонное изменение спектра питания. Может служить биологическим мелиоратором, контролирующим численность малярийных комаров (*Anopheles*) [51]. Полового созревания достигает в возрасте 5–6 месяцев. Нерест проходит при температуре выше 24°C. Самец строит гнездо на мелких прибрежных участках, среди скоплений нитчатых водорослей, выкапывая хвостом небольшую ямку в грунте, и охраняет нерестовую территорию. Наблюдаются ухаживания самца за самой зрелой самкой. После выметывания нескольких порций икры и оплодотворения спермой самца, самка собирает икру в ротовую полость и удаляется от гнезда. Таких особей нетрудно отличить по характерному подчелюстному мешку и периодическим «жующим» движениям челюстей, вследствие чего происходит перемешивание икры во рту [52]. Плодовитость — от 100 до 1500 икринок, в зависимости от размера самок. Самец в том же гнезде оплодотворяет икру другой самки. Икра развивается во рту самки в течение 3–4 дней. Личинки также держатся во рту самки или рядом с её головой в течение 1–2 недель до полного рассасывания желточного мешка [53]. В это время самка не питается. Даже после перехода на активное питание они могут при опасности прятаться во рту или под жаберными крышками самки. После перехода личинок на активное питание, что совпадает с их первым выходом из ротовой полости (на 11–13 сутки после нереста), у самок начинают активно расти ооциты новой генерации, которые будут выметаны при следующем нересте [51]. В тех частях ареала, где температура в зимние месяцы опускается ниже оптимума, нерест прекращается. В тропических областях нерест продолжается круглый год [54].

Из-за своей выносливости и всеядности с древних времён эта рыба была чрезвычайно распространена по всему бассейну Нила. Благодаря своему яркому, запоминающемуся образу жизни и поведению она была самой распространённой разновидностью рыб в египетской письменности и искусстве. Несмотря на довольно невзрачный внешний вид, отсутствие ярких плавников или контрастной окраски, для тилипии нильской ещё со времён Древнего Царства около домов и в парках строили специальные бассейны, в которых её разводили и содержали как

священное (тотемное) животное. Известны египетские фрески XV в. до н.э. (времена царицы Хатшепсут и Аменхотепа II), изображающие тилапию как тотемное животное, плавающее в специальном бассейне. Тилапия нильская даже вошла в древнеегипетскую письменность в качестве одного из составных иероглифов. Сам по себе иероглиф, соединявший в себе два значка, расположенных друг над другом: вода и рыба с высоким плавником (тилапия нильская) расшифровывался как слог «инт». Постепенно упрощаясь и видоизменяясь вместе с развитием письменности, этот иероглиф во времена Среднего и Позднего Царства произносился уже как «ин», а в египетской скорописи имел вид двух кривых полос, расположенных друг над другом (одна из этих полос в форме петли — изображала тилапию). А способ охраны мальков трансформировался у древних египтян в прекрасный декоративный мотив, где тилапия с цветком лотоса во рту символизирует возрождение, новую жизнь после смерти [4, 13].

Мозамбикская тилапия (*Oreochromis mossambicus*) — наиболее мелкий представитель рода *Oreochromis* (рис. 4).

Рис. 4. *Oreochromis mossambicus*

Fig. 4. *Oreochromis mossambicus*

Родом из Южной Африки (Ботсвана, Лесото, Намибия, Свазилленд, Южно-Африканская Республика). В настоящее время встречается в тропических и субтропических водоёмах по всему земному шару, а в некоторых странах признана инвазивным видом. Invasive Species Specialist Group (ISSG) («Группа Специалистов по Инвазивным Видам») включила её в список 100 наиболее вредных инвазивных видов мира. Она наносит вред коренным популяциям рыб из-за конкуренции в пище и местах для нереста, а также непосредственно поедая мальков. Например, на Гавайях лобан (*Mugil cephalus*) находится в опасности из-за введения этого вида, а в США — пятнистый ципринодон (*Cyprinodon macularius*). Несмотря на это, в природном ареале обитания — от дельты реки Замбези до реки Бушменов, она находится в опасности из-за конкуренции с инвазивной нильской тилапией (*Oreochromis niloticus*). В Израиль она была завезена в 50-х годах XX века для использования в аквакультуре, однако в скором времени была произвольно внесена в природные водоёмы, где широко распространилась и начала образовывать гибриды с нильской и галилейской тилапиями. Следует отметить, что в данном случае вселение прошло успешно — вид занял свободную экологическую нишу и нарушений баланса в экосистемах не произошло [4].

Мозамбикская тилапия достигает веса около 1200 г при длине около 40 см. Продолжительность жизни — до 11 лет. Туловище уплощённое с боков, с длинными спинными плавниками, передняя часть которых снабжена иглами.

Окрас туловища тёмный, матово-зеленый или желтоватый, хотя неполовозрелые особи и самки могут быть светлее. В спинной части, имеются тёмные точечные пятна, собранные в несколько рядов продольных полос. Поперечных полос нет. Точечные пятна на хвостовом плавнике не образуют концентрических полос, как у галилейской и нильской тилий, а разбросаны беспорядочно. Размер и окрас могут отличаться у особей, содержащихся в неволе, и у особей из акклиматизированных популяций под давлением факторов внешней среды [55]. Это чрезвычайно здоровая и плодовитая рыба, без труда приспосабливающаяся к доступным источникам пищи и способная размножаться в субоптимальных условиях. Она выживает в солоноватой воде и переносит температуру ниже 10°C и выше 38°C [56].

Половая зрелость наступает в возрасте 5 месяцев при длине 6–10 см; рабочая плодовитость — от 0,1 до 2,5 тыс. икринок. Первым шагом в репродуктивном цикле мозамбикской тилий является выкапывание самцом ямки, куда самка может выметать икру. После того, как икра отложена, самец оплодотворяет её. Плодовитость колеблется от 200 до 4000 икринок, в зависимости от размера и возраста самки. Нерест возможен каждые 4–8 недель, а число икрометаний при благоприятных условиях достигает 16 в год. Темпы роста и сроки полового созревания могут сильно колебаться в зависимости от условий окружающей среды. После оплодотворения самка прячет икру в рот, где она инкубируется до выклева личинок. Икра не клейкая, грушевидной формы, диаметром от 1 до 2 мм, массой 1–4 мг, с небольшим перивителлиновым пространством. Оболочка икринок довольно прочная, слабо прозрачная. Набухание икры продолжается 2 часа при температуре 26–28°C. Первые бластомеры появляются через 2–3 часа после нереста. Закрытие бластопора и начало гастрюляции наблюдаются через 8–12 часов, формирование тела эмбрионов — через 10–14 часов. Начало движений эмбриона — через 32–36 часов при длине 2,0–2,5 мм. Через 36–38 часов у него начинает пульсировать сердце, глаза приобретают серые пигментные клетки, а в головном отделе и вдоль кишечной трубки появляются большие темные клетки. Через 38–42 часа начинается кровообращение, но в крови эритроциты «проступают» не сразу: вначале они светло-оранжевые и лишь со временем приобретают красную окраску. Уже через 45–55 часов движение крови можно отчетливо проследить в периферических сосудах. Глаза приобретают черный блеск с сине-зеленым отливом. Появляются ротовое отверстие и жаберные лепестки. Выклев отмечается через 60–68 часов. В возрасте 2–3 суток после выклева личинки становятся подвижными, а на 3–4-е сутки всплывают к поверхности и переходят на активное питание [12]. Питание личинок разнообразное: сперва одноклеточными водорослями (например, хлореллой), при рассасывании желточного мешка — мелкими формами зоопланктона, после может проявляться каннибализм. При длине 2 см они активно потребляют бентосные организмы [24]. Взрослые особи всеядны, питаются детритом, диатомовыми водорослями, беспозвоночными, мальками, макрофитами [57]. Ниже рассмотрим примерные нормативы круглогодичного культивирования этого вида тилий [12, 20]:

- Объем воды в лотке, л — 80;
- Расход воды в лотке, л/мин — 0,3–0,4;
- t воды, °C — 25–30;

- Фотопериод: свет/темнота, ч — 12/12;
- Содержание кислорода, мг/л — более 4,7;
- Соотношение полов: самец / самка, экз. — 1:6;
- Диаметр икринки, мм — до 2;
- Средняя масса самки, г — 86–175;
- Относительное количество личинок, в зависимости от массы тела самки, экз./г — 5,3–3,4;
- Выход личинок при вылуплении, % — 94;
- Выход личинок после выдерживания, % — 93;
- Плотность посадки при выдерживании, экз./л — 300–600;
- Расход воды в инкубаторе, л/мин — 0,65;
- Расчетное количество молоди для получения 100 кг товарной рыбы — 500 экз.;
- Средняя масса товарной тилапии, г — 200;
- Масса в возрасте 1+, кг — 1,2–1,5.

Как и многие представители трибы *Tilapini*, мозамбикская тилапия имеет высокую способность к гибридизации. В аквакультуре их часто скрещивают с другими тилапиями, поскольку чистокровные мозамбикские тилапии растут медленно и имеют форму тела, плохо приспособленную для нарезания на крупные филе [20]. Кроме того, гибриды между мозамбикской тилапией и другим подвигом (например, *Oreochromis urolepis hornorum*) дают потомство, в котором все особи или большая часть — самцы [12].

Этот вид составляет 4% от общего числа тилапий, культивируемых в аквакультуре, однако чаще выращивают его гибриды. Основной сложностью при культивировании этой тилапии и её гибридов является их высокая чувствительность к ихтиофтириозу (возбудитель — *Ichthyophthirius multifiliis*) и миксоспоридиозу (возбудитель — *Myxobolus cerebralis*) [58].

Тилапия галилейская (*Sarotherodon galilaeus* Linnaeus, 1758 из рода *Sarotherodon*. Синонимы — *Sparus galilaeus*, *Tilapia galilaea*). Экваториальная, тропическая и субтропическая пресноводная рыба, встречается в Северной и Центральной Африке до 15° южной широты, а также на Ближнем Востоке в системе реки Иордан и прибрежных реках Израиля [4].

Ведёт придонный образ жизни на глубинах от 5 м, в основном в открытой воде, хотя молодь и особи в брачный период встречаются и у берега. Территориальный вид, иногда может образовывать стаи. Предпочитает температуры от 22 до 28°C, однако выдерживает снижение температуры до 9°C [20]. Галилейская тилапия — средняя по размерам (для цихлид) рыба. Средняя длина тела к моменту достижения половой зрелости составляет 19,1 см, минимальная — около 16 см. Максимальная зафиксированная длина тела — 41 см при массе 1,6 кг. Средняя высота тела — 45% от длины (может варьироваться от 43 до 56%). Основной цвет тела обычно бледно-жёлтый или серовато-зелёный, у некоторых экземпляров встречаются характерные тёмные вертикальные полосы нерегулярной формы и неоднородной насыщенности в верхней части тела (до 2/3 высоты) [59] (рис. 5).

Рис. 5. *Sarotherodon galilaeus*

Fig. 5. *Sarotherodon galilaeus*

Половой диморфизм в окраске тела отсутствует, в том числе и в брачный период. Длина головы составляет от 32,5 до 39% общей длины тела. Рот маленький, длина нижней челюсти составляет менее 1/3 от общей длины головы. Массивная глоточная кость (около 40% от общей длины головы — сравнимые размеры наблюдаются лишь ещё у нескольких видов тилапий) оснащена узкими одnobугорчатыми зубами. Крупные спинной, анальный, грудные и брюшной плавники, хвостовой плавник очень слабо вырезанный. Планктонофаг [20]. В брачный период образуются временные пары, после чего как самцы, так и самки вынашивают икру во рту [60, 61]. По евангельскому преданию, галилейскую тиланию много раз ловил Святой Пётр, который по первой своей профессии был рыбаком. Два тёмных пятна за её жабрами это, якобы, оставшиеся навсегда следы пальцев апостола Петра, который помог Иисусу заплатить налог на храм с улова этой рыбы (Евангелие от Матфея 17:24–27). По всей вероятности, именно этот вид тилании дважды упомянут в Евангелии, в частности, в знаменитой притче о том, как на озере Кинерет (где в изобилии водится тилания галилейская) Иисус накормил пять тысяч голодных пятью хлебами и двумя рыбами (Евангелие от Марка, 6:32–44) [4, 13].

Тилания цилли (*Tilapia zillii*, или *Coptodon zilli*, Gervais, 1848) из рода *Tilapia* (рис. 6).

Рис. 6. *Tilapia zillii*

Fig. 6. *Tilapia zillii*

В 1848 году этот вид был описан Жерве как *Acerina zillei*, и в дальнейшем получал многочисленные синонимичные названия, будучи в итоге включённым в род *Tilapia*. В настоящее время в одних биолого-ихтиологических справочных материалах он по-прежнему фигурирует как *Tilapia zillii*, а в других уже как *Coptodon zillii*. Международным союзом охраны природы рассматривается как синоним вида *Tilapia guineensis* [62]. Распространена в водоёмах Африки и юго-западной Азии. Стандартная длина (без хвостового плавника) — 30 см, сообщалось об экземплярах длиной до 40 см. Максимальная известная масса тела

— 300 г, максимальный возраст — 7 лет. Как и все цихловые, в условиях переуплотнения и недостатка корма перестаёт расти, едва достигнув длины 5–7 см и веса 50–75 г. У неё тёмная, иногда почти чёрная, окраска. Тело буровато-оливкового окраса с радужно-голубым блеском, грудь розоватая. На общем тёмном фоне выделяются ещё более тёмные размытые поперечные полосы. При возбуждении на боках появляется продольная тёмная полоса [63]. Спинной, анальный и хвостовой плавники буровато-оливковые с жёлтыми пятнами, на спинном и анальном плавниках — узкая оранжевая кайма. Брюшной плавник у молодых особей желтоватый или сероватый без пятен, с возрастом он темнеет и покрывается пятнами. Характерное «тиляпийное» пятно широкое, захватывает область последнего шипа до четвёртого мягкого луча спинного плавника, рядом с ним есть жёлтая полоса. Губы ярко-зелёные. Тело имеет характерную ассиметричную форму. Спина как бы «съехала» на голову, образовав над головой мясистый горб или, правильнее сказать, лоб. Из-за этого рыба выглядит немного набычившейся [64]. В брачный сезон район грудных плавников у самца может окрашиваться в красный цвет. *T. zillii* ведёт придонный образ жизни в пресных или солоноватых (с солёностью до 45‰) водоёмах, как правило на глубинах от 1 до 7 м, предпочитает зоны с водными растениями. Мальки часто встречаются у границ густой растительности, молодь — в районах сезонного затопления. В основном дневная рыба, иногда образует стаи. Полифаг. Размножается круглогодично (при t 20°C и выше). Самки откладывают клейкую икру — до 1000 икринок за один раз — на дне водоёма в местах с мелкими камнями или песком и густой растительностью на субстрате. Оба родителя охраняют кладку [65, 66].

Специфику культивирования тилапий в Израиле в первую очередь определяет постоянный дефицит пресной воды, поскольку его большую часть занимают пустыни. Кроме того, очень много солоноватоводных источников, непригодных для сельского хозяйства. Но израильтяне, путем упорного труда и применения последних достижений в области сельского хозяйства, осваивают эти неприветливые районы. Наибольшим резервуаром пресной воды в стране является озеро Кинерет, или Тивериадское море, а все местные газеты регулярно печатают информацию о текущем уровне воды в нём [67]. Поэтому правительство всячески поощряет строительство установок замкнутого водоснабжения (УЗВ), систем оборотного водоснабжения (СОВ) или интегрированных систем водоснабжения. Например, оно компенсирует все расходы, вплоть до 70% от всей суммы, требующейся для постройки УЗВ, или до 60% от затрат на строительство СОВ [68]. Ниже мы рассмотрим основные типы хозяйств по культивированию тилапии, распространённые в Израиле.

Интенсивные пруды являются специфичными для Израиля, хотя бы потому что в климатической зоне Украины, Латвии или России для них не хватает теплых и солнечных дней. Плотность посадки для галилейской тилапии в таких прудах примерно 15 кг/м³, при глубине около 1 м. На первый взгляд они напоминают обычные пруды с проточной системой водоснабжения, но это не так. Вода из системы никуда не выливается, её добавляют только для компенсации испарений. Система работает следующим образом: вода из биологического пруда подается в бассейны с рыбой. В каждом бассейне располагается механический аэратор и силос с комбикормом. После этого вода подается на механическую очистку — в микросетчатый барабанный фильтр [67]. Далее — снова в биологический пруд,

будучи обогащённой азотными соединениями, которые выделяют рыбы в результате своей жизнедеятельности. Биологическим прудом называется большой пруд, глубиной 10 м, в котором культивируются микроводоросли, которые в процессе жизнедеятельности питаются азотными соединениями и обогащают воду кислородом. На 12 прудов с рыбой необходим 1 биологический пруд. Поскольку в Израиле тепло и много солнечных дней, то микроводоросли, а также просто водоросли, быстро растут и «съедают» загрязнения, производимые рыбами. Для контроля растений в большой пруд подсаживают растительноядных рыб, например, толстолобиков [67].

Установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) широко распространены в Израиле, в них за 4–6 месяцев получают более 100 кг/м³ тилляпии. Израильские разработки в этой области являются одними из лучших в мире технологий для разведения рыбы в УЗВ. Так как в Израиле большая часть площади занята пустынями и наблюдается острая нехватка пресной воды, для решения этих проблем израильские биологи разработали целую систему рыбоводного хозяйства в условиях закрытого водоснабжения, которая может обходиться без больших объемов воды. Система состоит из отдельных резервуаров, соединенных с устройствами биологической очистки, в которых вода фильтруется с помощью специально выращенных бактерий, не просто очищающих воду, но и насыщающих ее кислородом — и снова подаётся в отсеки с рыбой [68]. В установках используется обычная водопроводная вода, которая проходит обработку солью из Красного моря. Одним из главных достоинств израильских технологий является почти полная автоматизация процесса — специальные вентиляторы позволяют рыбе дышать, химический состав воды контролируется компьютером, который по необходимости подпитывает систему свежей водой. Датчики, анализирующие параметры обеспечения нормальной жизнедеятельности рыбы, регулярно посылают сообщения на телефоны специалистов [69]. Система обладает колоссальной производительностью и позволяет выращивать до 150 кг рыбы в 1 м³ воды, при этом используя воду неограниченное количество раз. Годовой объем рыбы, выращиваемой таким образом, составляет до 20000 тонн. Годовая мощность УЗВ определяется не только созданием благоприятных условий для выращивания рыбы и обеспечением кормами высокого качества, но и применяемой технологией культивирования. Эксплуатация рыбоводной установки в режиме полицикла позволяет повысить ее годовую производительность в 1,5–2 раза по сравнению с двухразовым зарыблением. Кормление осуществляют при строгом контроле качества кормов. Применение корма с перекисным числом более 0,2 на ранних этапах онтогенеза, до дифференцировки пола, приводит в последующем к фенотипической инверсии пола у самок и неспособности их к размножению из-за недоразвитости выводящих половых протоков. Тилляпии в УЗВ задают корма с размером частиц от 0,5 до 3,0 мм, применяя автоматизированную раздачу кормов. Внесение зелени осуществляют вручную. Потребность тилляпий в отдельных питательных веществах меняется по мере роста. Например, снижается потребность в протеине. Лучший рост мальков обеспечивают корма, содержащие 40% протеина, а товарной рыбы — 30–35% протеина. Выращивание тилляпий в УЗВ проходит благополучно при следующих параметрах состава воды: температура — 25–31°C, pH — 6,5–7,5, растворённый кислород — 3–24 мг/л, аммиак — 0,3 мгN/л, нитриты — 0,02 мг/л, нитраты — до 60 мг/л, взвешенные

вещества — до 50 мг/л. В процессе выращивания необходимо ежедневное добавление 1/3 объема свежей воды, поддержание фотопериода в режиме — 12 часов — свет, 12 часов — темнота, и освещенность поверхности бассейнов около 600 люкс [9]. Ниже приведены общие нормативы выращивания тилапий в УЗВ (табл. 4).

Таблица 4. Рыбоводно-биологические нормативы выращивания тилапии в УЗВ

Table 4. Fish & biological standards for tilapia cultivation in RAS

Масса, г / Weight, g	Плотность посадки, кг/м³ / Stocking density, kg/m³	Выживаемость, % / Survival, %	Период выращивания, суток / Growth period, days	Водообмен, час / Water exchange, hour
2–15	2,5	75	30	1
15–60	20	95	30	1
60–100	60	96	30	1
100–140	90	97	30	1
140–180	120	97	30	1
180–220	150	97	30	1
220–250	150	93	30	1

В процессе выращивания при достижении рыбой массы 15 г отбирают для дальнейшей работы 95%, поддерживая температуру воды 27–28°C [68]. Нагрузка на биофильтр (УЗВ мощностью 10 т/год) составляет 2 т (табл. 5).

Таблица 5. Технологические показатели работы УЗВ при выращивании тилапии

Table 5. Technological performance of RAS for tilapia cultivation

Масса, г / Weight, g	Плотность посадки в силосе объёмом 4 м³ / Stocking density in silo tower, volume 4 m³		Расход воды, м³/час / Water flow rate, m³/hour
	Количество, особей / Number, specimen	Общая масса, кг / Total mass, kg	
2–10	2164	21,6	4,5
10–30	1969	98,4	10,0
50–100	1893	189,5	10,0
100–150	1837	192,0	11,2
150–200	1731	346,2	11,6
250–300	1680	420,0	11,8

Товарной считают рыбу массой 200 г и выше. Растет тилапия достаточно быстро и при благоприятных условиях среднесуточный прирост составляет 3–5 г. Весь цикл выращивания — от получения личинок до товарной продукции составляет — 160–180 сут. Таким образом, в условиях с оборотной системой водоснабжения, в течение года возможно многократное получение продукции [70].

Выращивание тилапии в садках. Следует отметить, что для эффективного

выращивания тилляпии подходят водоемы с температурой воды 23°C и выше на протяжении 4-х месяцев и более. Их кормовая база не имеет существенного значения, поскольку необходимо использовать искусственные корма. Они, а также гидрология водоёма и гидрохимический состав определяют оптимальную плотность посадки, которая также зависит от состава и качества корма, а также вида тилляпии. В садках молодь тилляпий выращивают в два этапа: первый — выращивание молоди до 1 г при плотности посадки 10 000–20 000 экз./м³, продолжительностью 15–20 суток. Второй — выращивание до 5–10 г при плотности посадки 2000 экз./м³, продолжительностью 30–45 суток. При поддержании кислорода на оптимальном уровне возможны и более плотные посадки. Продолжительность выращивания составляет 30–45 суток. Выход молоди – 80–85% [9]. При переходе на активное питание личинки имеют крупные размеры и способны потреблять гранулированные комбикорма. На первом этапе содержание протеина в комбикорме должно составлять 30–34%. По мере роста его количество можно снизить до 23–26%. Товарной считают тилляпию массой от 200 г; растет она быстро, среднесуточный прирост составляет 3–5 г. Таким образом, весь цикл выращивания тилляпии — от получения личинок до вылова товарной рыбы — составляет около 180 суток. При выращивании товарной рыбы плотность посадки в садки колеблется в пределах от 300 до 500 экз./м³ [71]. Интенсивное выращивание тилляпии при высоких плотностях посадки позволяет получать с 1 м² садковой площади 50–150 кг рыбы. Хотя экономическая эффективность садкового выращивания тилляпии, значительно выше, чем в прудах, экологический ущерб не сопоставим. Поэтому в Израиле последние десятилетия, на правительственном уровне проводятся программы по снижению количества садков [4].

Выращивание тилляпии в бассейнах. Высокая плотность посадки ограничивает возможность прохождения нереста и позволяет проводить совместное выращивание самцов и самок до товарного размера. Контроль качества воды и его оптимизация обеспечивают максимальную продуктивность. Следует отметить, что оптимальная для роста тилляпии температура лежит в пределах 25–33°C, при более низких значениях снижается иммунитет и скорость роста [9]. Ниже приведены основные технические данные бассейнового хозяйства по культивированию тилляпии, мощностью 100 т в год:

- Общая площадь здания 48х26 м — 1250 м²;
- Минимальная высота потолков — 2,5 м;
- Объем воды в бассейнах — 360 м³;
- Электроснабжение — 35 кВт/час;
- Максимальное потребление корма — 400 кг/день;
- Среднегодовое потребление комбикорма — 120000 кг;
- Рекомендуемая максимальная плотность посадки — 100 кг/м³;
- Кормовой коэффициент — <1,2;
- Количество рабочих дней в году — 365 дней;
- Подпитка свежей водой – 20000 м³/год, в среднем — 60 м³/день;
- Примерное количество мальков весом 1 г — 230000 экз.;
- Выход молоди 500 - граммовой навески — 200000 экз.;
- Примерная стоимость малька массой 1 г — 0,10 евро;
- Стоимость комбикорма для тилляпии — 0,75 евро/кг;

• Примерная продажная стоимость каждого килограмма тилапии навеской 500 г — 4,00 евро.

Выращивание тилапии в поликультуре. Рыбоводно-биологические качества тилапии обуславливают высокую эффективность её культивирования в поликультуре. Наиболее распространённым является её совместное выращивание с карповыми, осетровыми и кефалевыми рыбами, а также с креветками [9]. Ниже рассмотрим страны, в которых широко распространено выращивание тилапий в прудах в поликультуре (табл. 6).

Таблица 6. География выращивания тилапий в прудах с использованием поликультуры [20]

Table 6. Geography of tilapia cultivation in ponds with using polyculture [20]

Вид / Species	Страна / Country	Рыбопродуктивность в поликультуре / Fish productivity in polyculture
<i>Oreochromis nilotica</i>	Сирия, Восточная Африка (Судан, Эфиопия, Эритрея, Джибути, Сомали, Кения, Руанда, Уганда, Бурунди, Танзания, Малави, Замбия), Конго, Либерия, Камерун, Израиль / Syria, East Africa (Sudan, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya, Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania, Malawi, Zambia), Congo, Liberia, Cameroon, Israel	в пресной и солоноватой воде, 41,6–53 ц/га / in fresh and brackish water, 41,6–53 q / ha
<i>Oreochromis mossambica</i>	Китай, Тайвань, Уганда, США, Юго-восточная Азия (Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма, Восточный Тимор, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Таиланд, Бруней), Ближний Восток (Бахрейн, Иордания, Израиль, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестина и Саудовская Аравия), Южная Америка (Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Фолклендские острова, Чили, Эквадор) / China, Taiwan, Uganda, the United States, Southeast Asia (Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, East Timor, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thailand, Brunei), the Middle East (Bahrain, Jordan, Israel, Iraq, Iran, Yemen, Qatar, Kuwait, Lebanon, the United Arab Emirates, Oman, Palestine and Saudi Arabia), South America (Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Ecuador, Guyana, Guyana, Venezuela, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay)	в пресной и солоноватой воде, рыбопродуктивность 34,5–75,0 ц/га / in fresh and brackish water, 34,5–75,0 q / ha
<i>Sarotherodon melanotheron</i>	Конго, Судан, Европа, Азия, Южная Америка, Коста-Рика, США / Congo, Sudan, Europe, Asia, South America, Costa Rica, USA	в пресной воде, 27,8–34,5 ц/га / in fresh water, 27,8–34,5 q / ha

Однако, следует учитывать, что теляпия легко размножается по сравнению с другими рыбами, что в ряде случаев ведет к перенаселению водоёмов, снижению их продуктивности и является одной из сложных проблем при её

культивировании [20]. Поэтому, если есть риск её самовольного выхода в водоём, эту рыбу необходимо выращивать в поликультуре с хищными рыбами (сом, угорь большеротый окунь) [20]. Использование тилапий в поликультуре с карпом обеспечивает более эффективное потребление кормов, и кормовой коэффициент понижается до 0,2–0,3 [9]. Для кормления тилапий можно использовать комбикорма, предназначенные для карпа. Кроме того, тилапии используют в пищу экскременты карпа, обрастания на стенках бассейнов и садков. Все это снижает расход кормов, улучшает гидрохимический режим, способствует увеличению продуктивности на 10%. Например, при выращивании тилапий в прудах в монокультуре средняя рыбопродуктивность составляет примерно 5 ц/га и лишь при усиленном кормлении возрастает до 10–25 ц/га. В то же время, в прудовой поликультуре с канальным сомом рыбопродуктивность тилапий достигает 60 ц/га, а сома — 14 ц/га [20].

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Благодаря эвригалинности и всеядности тилапию культивируют на всех континентах в пресной и морской воде. Эта рыба является основой глобальной продовольственной безопасности и питания, поскольку ее можно выращивать в различных сельскохозяйственных системах. Особенно она важна в развивающихся странах, где её недорогое мясо является одним из основных источников белка, а благодаря своим рыбоводным характеристикам она удобна для развития бизнеса мелких фермеров. Таким образом, в мировом масштабе культивирование тилапии обеспечивает продукты питания, рабочие места, а также доходы на внутреннем и экспортном рынках для миллионов людей.

Общими чертами для большинства видов тилапий, используемых в мировой аквакультуре, являются всеядность, неприхотливость к условиям существования, непереносимость температуры воды ниже 13°C, образование устойчивых «семейных пар», забота о потомстве, высокоразвитая сигнальная система общения и ярко выраженный территориальный инстинкт.

Преимущества культивирования тилапий следующие: у неё высокие темпы роста (за 4–5 месяцев достигает веса в 350–400 г); нетребовательна к содержанию кислорода (выдерживает кратковременное понижение уровня растворенного кислорода до 2,5 мг/л); пластична по отношению к солёности (рост при солёности до 40‰); нетребовательна к кормам (можно использовать дешевые корма с низким содержанием животного белка); часто нерестится (до 16 раз в год); имеет низкую себестоимость выращивания (себестоимость порционной рыбы в мелкомасштабных УЗВ находится в пределах 3,0–3,5 долларов США за кг, а промышленное выращивание позволяет понизить эту цену до 2,5–2,9 долларов за кг. При этом, в Украине оптовая цена составляет 6–7 долларов США за кг, в рознице доходит и до 10 долларов за кг); с помощью генераторов кислорода растёт при довольно плотной посадке — до 140 кг/м³.

Таким образом, тилапии являются перспективными объектами для рыбного хозяйства Украины, а применение опыта их культивирования в Израиле способно повысить эффективность их использования в нашей стране.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы статьи благодарны Израильскому Агентству международного развития и Сотрудничества Министерства иностранных дел Израиля Mashav за

возможность принять участие в учебном курсе «Интенсивное прудовое рыбоводство». Известные исследователи и сотрудники научных подразделений Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий: Татьяна Зак, Маргарита Смирнов, Шинан Харпаз, Илья Островский, Владимир Драбкин, Цви Сновски, Гай Рубинштейн обеспечили исчерпывающую базу лекций и научную литературу, без которых написание данной статьи было бы невозможным. Многоуважаемый Ицхак Симон из Ассоциации рыбоводов Израиля продемонстрировал методы работы и действенность общественной организации в отстаивании интересов представителей рыбохозяйственной отрасли. Представители сферы бизнеса Борис Бордман, Игаль Маген, Еран Хадас, Леонид Гольдштейн любезно предоставили возможность посетить их предприятия и получить бесценный практический опыт.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мировой спрос на тилапию стабилен на фоне относительно низких цен. URL: <http://aquacultura.org/news/mirovoy-spros-na-tilyapiyu-stabilen-na-fone-otnositelno-nizkikh-tsen> (18.09.2017:).
2. n-3 PUFA fortification of high n-6 PUFA farmed tilapia with linseed could significantly increase dietary contribution and support nutritional expectations of fish / Shapira N. J. et al. // Agric. Food Chem. 2009. Vol. 57. P. 2249—2254
3. Parker R., Parker R. O. Aquaculture Science. USA : Cengage Learning, 2011. 672 p.
4. Современное состояние рыбохозяйственной отрасли Израиля (Обзор) / Озиранский Ю. и др. // Рибогосподарська наука України. 2017. № 1 (40). P. 6—28.
5. Aquaculture production (1985—1991) / FAO Fishery Information, Data & Statistics Service : FAO Fisheries Circular. Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1993. 815 p.
6. Китайские производители внедряют новые виды быстрорастущей тилапии. URL: <http://aquacultura.org/news/kitayskie-proizvoditeli-vnedryayut-novye-vidy-bystrorastushchey-tilapii> (дата обращения 27.10.2017).
7. Tilapia production systems in the Americas: technical advances, trends, and challenges / Watanabe W. O. et al. // Reviews in Fisheries Sciences. 2002. Vol. 10(3—4). P. 65—98.
8. Shelton W. L. Tilapia culture in the 21 st century. Philippines : Philippines Fisheries Society, 2002. 365 p.
9. Разведение и выращивание тилапий в промышленных хозяйствах. URL: https://studopedia.ru/13_161944_tema--razvedenie-i-virashchivanie-tilyapiy-v-industrialnih-hozyaystvah.html (дата обращения 25.10.2017).
10. Effect of flaxseed oil in diet on fatty acid composition in the liver of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) / Aguiar A. C. et al. // Arch. Latinoam. Nutr. 2007. Vol. 57 (3). P. 273—277.
11. Lim C., Webster C. D. Tilapia: Biology, Culture, and Nutrition Routledge. USA : CRC Press, 2006. 746 p.
12. Тилапия. URL: <http://www.fisherman.kz/index.php?np=92456146&nl=1> (дата обращения 26.10.2017).
13. Черницкий А. Вкусные рыбы Израиля. Изд. 2-е. Герцлия : Исрадон, 2009. 176 с.

14. Barlow G. W. The Cichlid Fishes. Cambridge, MA : Perseus Publishing, 2000. 352 p.
15. Wohlfarth G. W., Hulata G. Applied genetics of tilapias // ICLARM studies and reviews—6. Manila, Philippines : International Center for Living Aquatic Resources Management, 1983. 33 p.
16. Боронеккая О. И. Использование тилапии (*Tilapia*) в мировой и отечественной аквакультуре // Известия ТСХА. 2012. Вып. 1. С. 164—173.
17. Trewavas E. Tilapiine fish of the genera *Sarotherodon*, *Oreochromis* and *Danakilia*. London : British Museum (Natural History), 1983. 604 p.
18. Classification and phylogenetic relationships of african tilapiine fishes inferred from mitochondrial DNA sequences / Nagl S. et al. // Molecular Phylogenetics and Evolution. 2001. Vol. 20 (3). P. 361—374.
19. Григорьев С. С., Седова Н. А. Индустриальное рыбоводство. В 2 ч. Ч. 1 : Биологические основы и основные направления разведения рыбы индустриальными методами. Петропавловск-Камчатский : Камчат. ГТУ, 2008. 186 с.
20. Тилапии. URL: <http://www.fishportal.ru/references/fermer/glava-9/glava-9-1/> (дата обращения 26.10.2017).
21. Привезенцев Ю. А., Боронеккая О. И., Богерук А. К. Методические рекомендации по воспроизводству и выращиванию тилапий рода *Oreochromis*. Москва : РГАУ-МСХА, 2006. 23 с.
22. Chervinski J. Environmental physiology of tilapias // ICLARM Conf. Manila, Philippines, 1982. P. 119—128.
23. The biology and culture of tilapias / eds. R. S. V. Pullin, R. H. Lowe-McConnell. Manila, Philippines : International Centre for Living Aquatic Resource Management, 1982. 432 p.
24. Разведение тилапии в Израиле. URL: <http://aquaria2.ru/node/213> (дата обращения 26.10.2017).
25. Tilapia Aquaculture in the Americas. Vol. 1. / eds. B. A. Costa-Pierce, J. E. Rakocy. USA, Louisiana, Baton Rouge : World Aquaculture Society, 1997. 258 p.
26. Tilapia Aquaculture in the 21st Century : Fifth International Symposium on Tilapia in Aquaculture : proceedings / eds. K. Fitzsimmons, F. J. Carvalho. Rio de Janeiro, Brazilia : Ministerio de Agricultura, Departamento de Pesca e Aquicultura, 2000. 682 p.
27. Baker J. Simply Fish. London : Faber & Faber, 1988. 349 p.
28. Tilapia: prodution, marketing and technical development : Tilapia 2001 : International technical and trade conference on tilapia : proceedings / eds. S. Subasinghe, T. Singhe. Kuala Lumpur, Malaysia : Infofish, 2001. 852 p.
29. Tilapias as alien aquatics in Asia and the Pacific: a review / De Silva S. S. et al. // FAO Fisheries Technical Paper. 2004. No. 453.
30. Tilapia Aquaculture in the Americas. Vol. 2. / eds. B. A. Costa-Pierce, J. E. Rakocy. Louisiana, USA : World Aquaculture Society, 2000. 264 p.
31. Tilapias: Biology and Exploitation / eds. M. C. M. Beveridge, B. J. McAndrew. Dordrecht, Netherlands : Kluwer Academic Publishers, 2000. 505 p. (Fish and Fisheries Series ; 25).
32. Fessehay Y. Natural mating in Nile tilapia (*Oreochromis niloticus* L.). Implications for reproductive success, inbreeding and cannibalism. Wageningen, Netherlands : Wageningen UR, 2006. 150 p.

33. Tilapia Aquaculture : Fourth International Symposium on Tilapia in Aquaculture : proceedings / ed. K. Fitzsimmons. Orlando, Florida, USA : Northeast Regional Agricultural Engineering Service-106, 1997. 808 p.
34. Sixth International Symposium on Tilapia in Aquaculture : proceedings / eds. R. B. Bolivar, G. C. Mair, K. Fitzsimmons. Manila, Philippines : Bureau of Fisheries & Aquatic Resources, 2004. 682 p.
35. Second International Symposium on Tilapia in Aquaculture : ICLARM Conference 15 : proceedings. Vol. 1 / eds. R. S. V. Pullin et al. Bangkok, Thailand : Philippines, Manila : Department of Fisheries, 1988. 623 p.
36. First International Symposium on Tilapia in Aquaculture : proceedings / eds. L. Fishelson, Z. Yaron. Nazareth, Israel : Tel Aviv University, 1983. 624 p.
37. Abdel-Fattah M. El-Sayed. Tilapia culture. Cambridge, USA : CABI Publishing, 2006. 277 p.
38. Культивирование гибридов тилапии. URL: <http://aquavintro.org/2012/09/15/kultivirovanie-gibridov-tilyapii/> (дата обращения 26.10.2017).
39. Rothbard S., Peretz Y. Tilapia culture in Negev, the Israeli desert // International forum on tilapia farming in the 21st century (Tilapia forum 2002) : proceedings / eds. R. D. Guerrero, R. Guerrero del Castillo. Los Baños, Philippines, 2002. P. 60—65.
40. More Tilapia, Higher Profit. URL: <https://www.aquacultureinisrael.com/en/fishfarmers/israeli-aquaculture-know-how/item/13-more-tilapia-higher-profit> (accessed 26.10.2017).
41. Skinner W. F. *Oreochromis aureus* (Steindachner; *Cichlidae*), an exotic fish species, accidentally introduced to the lower Susquehanna River, Pennsylvania // Proceedings of the Pennsylvania Academy of Science. 1984. № 58. P. 99—100.
42. Habel M. L. Overwintering of the cichlid, *Tilapia aurea*, produces fourteen tons of harvestable size fish in a south Alabama bass-bluegill public fishing lake // Progressive Fish-Culturist. 1975. № 37. P. 31—32.
43. Spataru P., Zorn M. Food and feeding habits of *Tilapia aurea* (Steindachner) (*Cichlidae*) in Lake Kinneret (Israel) // Aquaculture. 1978. № 13 (1). P. 67—79.
44. Spatar Dadzie S. Laboratory experiment on the fecundity and frequency of spawning in *Tilapia aurea* // Bamidgeh. 1970. № 22. P. 14—18.
45. Hales L. S., Jr. 1989. Occurrence of an introduced African cichlid, the blue tilapia, *Tilapia aurea* (*Perciformes: Cichlidae*), in a Skidaway River tidal creek : unpublished mimeograph. [S. l.] : Department of Zoology and Institute of Ecology, University of Georgia, Athens, and Marine Extension Service Aquarium, Georgia Sea Grant College Program, Savanna, GA. 12 p.
46. McDonald E. M. Interactions between a phytoplanktivorous fish, *Oreochromis aureus*, and two unialgal forage populations // Environmental Biology of Fishes. 1987. № 18. P. 229—234.
47. Bwanika G., Murie D., Chapman L. Comparative Age and Growth of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus* L.) in Lakes Nabugabo and Wamala, Uganda // Hydrobiologia. 2007. Vol. 589. P. 287—301.
48. Payne A. I., Collinson R. I. A comparison of the biological characteristics of *Sarotherodon niloticus* (L.) with those of *S. aureus* (Steindachner) and other tilapia of the delta and lower Nile // Aquaculture. 1983. Vol. 30. P. 335—351.

49. Khallaf E. A., Alne-na-ei A. A. Feeding ecology of *Oreochromis niloticus* (Linnaeus) & *Tilapia zillii* (Gervais) in a Nile Canal // *Hydrobiologia*. 1987. Vol. 146. P. 57—62.
50. Feeding behaviour and food utilisation in tilapia, *Oreochromis niloticus*: Effect of sex ratio and relationship with the endocrine status / Toguyeni A. et al. // *Physiology & Behavior*. 1997. Vol. 62 (2). P. 273—279.
51. Latif A. A., Saady B. E. Reproduction in the Nile Bolti, *Tilapia nilotica* // *Bull. Inst. Ocean. Fish*. 1973. № 3. P. 120—142.
52. Tacon P. Relationships between the expression of maternal behaviour and ovarian development in the mouthbrooding cichlid fish *Oreochromis niloticus* // *Aquaculture*. 1996. Vol. 146 (3—4). P. 261—275.
53. Babiker M. M., Ibrahim H. Studies on the biology of reproduction in the cichlid *Tilapia nilotica* (L.): Gonadal maturation and fecundity // *J. Fish. Biol*. 1979. Vol. 14. P. 437—447.
54. Lowe-McConnel R. H. The biology and culture of Tilapias. Manila, Phillipines : Inter. Cent. For Living Aquatic Resor. Manag., 1982. 432 p.
55. Suresh A. V., Lin C. K. Tilapia culture in saline waters: a review // *Aquaculture*. 1992. Vol. 106. P. 201—226.
56. Kausik R. J. Parental influences on egg quality, fry production and fry performance in *Oreochromis niloticus* (Linnaeus) and *O. mossambicus* (Peters) // *Aquacult. Fish. Manage*. 1986. Vol. 20. P. 49—57.
57. Webster C. D., Chhorn L. Tilapia: Biology, Culture, and Nutrition. USA : CRC Press, 2006. 704 p.
58. Landau R. Growth and population studies on *Tilapia galilaea* in Lake Kinneret // *Freshwat. Biol*. 1979. № 9. P. 23—32.
59. Balshine-Earn S. The Costs of Parental Care in Galilee St. Peter's Fish, *Sarotherodon galilaeus* // *Animal Behaviour*. 1995. Vol. 50 (1) P. 1—7.
60. Schwanck E., Rona K. Male-female parental roles in *Sarotherodon galilaeus* (*Pisces: Cichlidae*). // *Ethology*. 1991. Vol. 89. P. 229—243.
61. El-Shazly A. Biological Studies On Four Cichlid Fishes (*Tilapia nilotica*, *Tilapia galilae*, *Tilapia zillii*, *Tilapia aurea*) : thesis M. Sc. Fac. Sci. Zagazig Univ. Egypt, 1993. 227 p.
62. Hauser W. J. An unusually fast growth rate for *Tilapia zillii* // *California Department of Fish and Game*. 1975. Vol. 61, iss. 1. P. 54—56.
63. Jensen K. W. Determination of age and growth of *Tilapia nilotica* L., *T. galilaea* Art., *T. zillii* Gerv. and *Lates niloticus* C. et V. by means of their scales // *K. Norske Vidensk. Selsk. Forh*. 1957. № 30. P. 150—157.
64. Spataru P. Food and feeding habits of *Tilapia zillii* (Gervais) (*Cichlidae*) in Lake Kinneret (Israel) // *Aquaculture*. 1978. № 14. P. 327—338.
65. Siddiqui A. Q. Reproductive biology of *Tilapia zillii* (Gervais) in Lake Naivasha, Kenya // *Environmental Biology of Fishes*. 1979. № 4(3). P. 257—262.
66. Израильский опыт выращивания рыбы при использовании замкнутых систем. URL: <http://www.uzv.su/knowledge/worldexperience/izrailskij-opit-virashivaniya-rib> (дата обращения 25.10.2017).
67. Выращивание рыбы в УЗВ в Израиле. URL: http://ikc.belapk.ru/tehnologii/novuyj_resurs (дата обращения 25.10.2017).

68. Intensive Tilapia in a re-circulation 'green-water' system. URL: <http://aquaculture-israel.com/Technology/re-circulation.html> (accessed: 25.10.2017).
69. The intensive culture of tilapia in tanks, raceways and cages. Recent Advances in Aquaculture / eds. Balarin J. D. et al. Boulder, Colorado, USA : Westview Press, 1982. P. 265—355.
70. Schmittou H. R. Principles and practices of high density fish culture in low volume cages. USA, St. Louis, MO : American Soybean Association, 2006. 78 p.

REFERENCES

1. Mirovoy spros na tilyapiyu stabilen na fone otnositel'no nizkikh tsen. *aquacultura.org*. Retrieved from <http://aquacultura.org/news/mirovoy-spros-na-tilyapiyu-stabilen-na-fone-otnositelno-nizkikh-tsen>.
2. Shapira, N. et al. (2009). n-3 PUFA fortification of high n-6 PUFA farmed tilapia with linseed could significantly increase dietary contribution and support nutritional expectations of fish. *J. Agric. Food Chem.*, 57, 2249-2254.
3. Parker, R., & Parker, R. O. (2011). *Aquaculture Science*. USA: Cengage Learning.
4. Oziransky, Yu., Kolesnyk, N., Shcherbak, S., Kononenko, R., Fedorenko, M., Mosnitsky, V., & Nekrasov, S. (2017). Modern status of fishery sectors of Israel (review). *Rybohospodars'ka nauka Ukrayiny*, 1, 6-28.
5. *FAO Fishery Information, Data & Statistics Service. Aquaculture production (1985-1991) (1993)*. FAO Fisheries Circular, 815, 20-21.
6. Kitayskie proizvoditeli vnedryayut novye vidy bystrorastushchey tilyapii. *aquacultura.org*. Retrieved from <http://aquacultura.org/news/kitayskie-proizvoditeli-vnedryayut-novye-vidy-bystrorastushchey-tilapii>.
7. Watanabe, W. O., Losordo, T. M., Fitzsimmons, K. & Hanley, F. (2002). Tilapia production systems in the Americas: technical advances, trends, and challenges. *Reviews in Fisheries Sciences*, 10 (3-4), 465-498.
8. Shelton, W. L. (2002). *Tilapia culture in the 21 st century*. Philippines: Philippines Fisheries Society.
9. Razvedenie i vyrashchivanie tilyapiy v industrial'nykh khozyaystvakh. *studopedia.ru*. Retrieved from https://studopedia.ru/13_161944_tema--razvedenie-i-vyrashchivanie-tilapiy-v-industrialnih-hozyaystvakh.html.
10. Aguiar, A. C. et al. (2007). Effect of flaxseed oil in diet on fatty acid composition in the liver of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*). *Arch. Latinoam. Nutr.*, 57 (3), 273-277.
11. Lim, C., & Webster, C. D. (Eds.) (2006). *Tilapia: Biology, Culture, and Nutrition* Routledge. USA: CRC Press.
12. Tilyapiya. *fisherman.kz*. Retrieved from <http://www.fisherman.kz/index.php?np=92456146&nl=1>.
13. Chernitskiy, A. (2009). *Vkusnye ryby Izrailya*. Gertsliya: Isradon.
14. Barlow, G. W. (2000). *The Cichlid Fishes*. Cambridge, MA: Perseus Publishing.
15. Wohlfarth, G. W., & Hulata, G. (1983). *Applied genetics of tilapias*. ICLARM studies and reviews-6. Manila, Philippines: International Center for Living Aquatic Resources Management.
16. Boronetskaya, O. I. (2012). Ispol'zovanie tilyapii (*Tilapiinae*) v mirovoy i otechestvennoy akvakul'ture. *Izvestiya TSKHA*, 1, 164-173.

17. Trewavas, E. (1983). Tilapiine fish of the genera *Sarotherodon*, *Oreochromis* and *Danakilia*. London: British Museum (Natural History).
18. Nagl, S., Tichy, H., Mayer, W. E., Samonte, I. E., McAndrew, B. J., & Klein, J. (2001). Classification and phylogenetic relationships of african tilapiine fishes inferred from mitochondrial DNA sequences. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 20 (3), 361-374.
19. Grigor'ev, S. S., & Sedova, N. A. (2008). *Industrial'noe rybovodstvo*. (Parts 1-2; part 1). Biologicheskie osnovy i osnovnye napravleniya razvedeniya ryby industrial'nymi metodami. Petropavlovsk-Kamchatskiy: Kamchat. GTU.
20. Tilyapii. *fishportal.ru*. Retrieved from <http://www.fishportal.ru/references/fermer/glava-9/glava-9-1>.
21. Privezentsev, Yu. A., Boronetskaya, O. I., & Bogeruk, A. K. (2006). *Metodicheskie rekomendatsii po vosпроизводstvu i vyrashchivaniyu tilyapiy roda Oreochromis*. Moskva: RGAU-MSKhA.
22. Chervinski, J. (1982). *Environmental physiology of tilapias: ICLARM Conf.* Manila, Philippines.
23. Pullin, R. S. V., & Lowe-McConnell, R. H. (Eds.). (1982). *The biology and culture of tilapias*. Manila, Philippines: International Centre for Living Aquatic Resource Management.
24. Razvedenie tilyapii v Izraile. *aquaria2.ru*. Retrieved from <http://aquaria2.ru/node/213>.
25. Costa-Pierce, B. A., & Rakocy, J. E. (Eds.). (1997). *Tilapia Aquaculture in the Americas*. Vol. 1. Baton Rouge, Louisiana, USA: World Aquaculture Society.
26. Fitzsimmons, K., & Filho, J. C. (Eds.). (2000). *Tilapia Aquaculture in the 21st Century: Proceedings of the Fifth International Symposium on Tilapia in Aquaculture*. Rio de Janeiro, Brazil: Ministério de Agricultura.
27. Baker, J. (1988). *Simply Fish*. London: Faber & Faber.
28. Subasinghe, S., & Singhe, T. (Eds.) (2001). *Tilapia: prodution, marketing and technical development : Proceedings of the Tilapia 2001 — International technical and trade conference on tilapia*. Malaysia, Kuala Lumpur : Infofish, 852 p.
29. De Silva, S. S., Subasinghe, R. P., Bartley, D. M., & Lowther, A. (2004). Tilapias as Alien Aquatics in Asia and the Pacific: A Review. *FAO Fisheries Technical Paper*, 453.
30. Costa-Pierce, B. A., & Rakocy, J. E. (Eds.). (2000). *Tilapia Aquaculture in the Americas*. Vol. 2. Baton Rouge, Louisiana, USA: World Aquaculture Society.
31. Beveridge, M. C. M., & McAndrew, B. J. (Eds.). (2000). *Tilapias: Biology and Exploitation*. Fish and Fisheries Series 25. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
32. Fessehay, Y. (2006). *Natural mating in Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) Implications for reproductive success, inbreeding and cannibalism*. Wageningen, Netherlands.
33. Fitzsimmons, K. (Ed.). (1997). *Tilapia Aquaculture: Proceedings of the Fourth International Symposium on Tilapia in Aquaculture*. Orlando, Florida, USA: Northeast Regional Agricultural Engineering Service-106.
34. Bolivar, R. B., Mair, G. C., & Fitzsimmons, K. (Eds.). (2004). *Proceedings of the Sixth International Symposium on Tilapia in Aquaculture*, September, 2004. Manila, Philippines. Bureau of Fisheries & Aquatic Resources.

35. Pullin, R. S. V., Bhukaswan, T., Tonguthai, K., & Maclean, J. L. (Eds.). (1988). *Proceedings of the Second International Symposium on Tilapia in Aquaculture. ICLARM Conference Proceedings 15*. Bangkok, Thailand: Department of Fisheries.
36. Fishelson, L., & Yaron, Z. (Eds.) (1983). *Proceedings of the First International Symposium on Tilapia in Aquaculture*. Nazareth, Israel: Tel Aviv University.
37. Abdel-Fattah, M. El-Sayed. (2006). *Tilapia culture*. USA, Cambridge: CABI Publishing.
38. Kultivirovanie gibridov tilyapii. aquavitro.org. Retrieved from <http://aquavitro.org/2012/09/15/kultivirovanie-gibridov-tilyapii>.
39. Rothbard, S., & Peretz, Y. (2002). Tilapia culture in Negev, the Israeli desert. *Proceedings of International forum on tilapia farming in the 21st century, Tilapia forum 2002*. Guerrero, R. D., & Guerrero del Castillo, R. (Eds). Los Baños, Philippines, 60-65.
40. More tilapia, higher profit. aquacultureinisrael.com. Retrieved from <https://www.aquacultureinisrael.com/en/fishfarmers/israeli-aquaculture-know-how/item/13-more-tilapia-higher-profit>.
41. Skinner, W. F. (1984). *Oreochromis aureus* (Steindachner; Cichlidae), an exotic fish species, accidentally introduced to the lower Susquehanna River, Pennsylvania. *Proceedings of the Pennsylvania Academy of Science*, 58, 99-100.
42. Habel, M. L. (1975). Overwintering of the cichlid, *Tilapia aurea*, produces fourteen tons of harvestable size fish in a south Alabama bass-bluegill public fishing lake. *Progressive Fish-Culturist*, 37, 31-32.
43. Spataru, P., & Zorn, M. (1978). Food and feeding habits of *Tilapia aurea* (Steindachner) (Cichlidae) in Lake Kinneret (Israel). *Aquaculture*, 13(1), 67-79.
44. Spatar, Dadzie S. (1970). Laboratory experiment on the fecundity and frequency of spawning in *Tilapia aurea*. *Bamidgeh*, 22, 14-18.
45. Hales, L. S., (1989). Occurrence of an introduced African cichlid, the blue tilapia, *Tilapia aurea* (Perciformes: Cichlidae), in a Skidaway River tidal creek: Unpublished mimeograph. Athens: Department of Zoology and Institute of Ecology, University of Georgia; Savanna, GA: Marine Extension Service Aquarium, Georgia Sea Grant College Program.
46. McDonald, E. M. (1987). Interactions between a phytoplanktivorous fish, *Oreochromis aureus*, and two unialgal forage populations. *Environmental Biology of Fishes*, 18, 229-234.
47. Bwanika, G., Murie, D., & Chapman, L. (2007). Comparative age and growth of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus* L.) in lakes Nabugabo and Wamala, Uganda. *Hydrobiologia*, 589, 287-301.
48. Payne, A. I., & Collinson, R. I. (1983). A comparison of the biological characteristics of *Sarotherodon niloticus* (L.) with those of *S. aureus* (Steindachner) and other tilapia of the delta and lower Nile. *Aquaculture*, 30, 335-351.
49. Khallaf, E. A., & Alne-na-ei, A. A. (1987). Feeding ecology of *Oreochromis niloticus* (Linnaeus) & *Tilapia zillii* (Gervais) in a Nile Canal. *Hydrobiologia*, 146, 57-62.
50. Toguyeni, A., Fauconneau, B., Boujard, T., Fostier, A., Kuhn, E., Mol, K., & Baroiller, J. (1997). Feeding behaviour and food utilisation in tilapia, *Oreochromis niloticus*: Effect of sex ratio and relationship with the endocrine status. *Physiology & Behavior*, 62 (2), 273-279.

51. Latif, A. A., & Saady, B. E. (1973). Reproduction in the Nile Bolti, *Tilapia nilotica*. *Bull. Inst. Ocean. Fish.*, 3, 120-142.
52. Tacon, P. (1996). Relationships between the expression of maternal behaviour and ovarian development in the mouthbrooding cichlid fish *Oreochromis niloticus*. *Aquaculture*, 146 (3-4), 261-275.
53. Babiker, M. M., & Ibrahim, H. (1979). Studies on the biology of reproduction in the cichlid *Tilapia nilotica* (L.): Gonadal maturation and fecundity. *J. Fish. Biol.*, 14, 437-447.
54. Lowe-McConnel, R. H. (1982). *The biology and culture of Tilapias*. Conf. Proc.-7. Manila, Phillipines: Inter. Cent. For Living Aquatic Resor. Manag.
55. Suresh, A. V., & Lin, C. K. (1992). Tilapia culture in saline waters: a review. *Aquaculture*, 106, 201-226.
56. Kausik, R. J. (1986). Parental influences on egg quality, fry production and fry performance in *Oreochromis niloticus* (Linnaeus) and *O. mossambicus* (Peters). *Aquacult. Fish. Manage.*, 20, 49-57.
57. Webster, C. D., & Chhorn, L. (2006). *Tilapia: Biology, Culture, and Nutrition*. USA: CRC Press.
58. Landau, R. (1979). Growth and population studies on *Tilapia galilaea* in Lake Kinneret. *Freshwat. Biol.* 9, 23-32.
59. Balshine-Earn, S. (1995). The costs of parental care in Galilee St. Peter's Fish, *Sarotherodon galilaeus*. *Animal Behaviour*, 50 (1), 1-7.
60. Schwanck, E., & Rona, K. (1991). Male-female parental roles in *Sarotherodon galilaeus* (Pisces: Cichlidae). *Ethology*, 89, 229-243.
61. El-Shazly, A. (1993). Biological Studies On Four Cichlid Fishes (*Tilapia nilotica*, *Tilapia galilae*, *Tilapia zillii*, *Tilapia aurea*). Thesis M. Sc. Egypt: Fac. Sci. Zagazig Univ.
62. Hauser, W. J. (1975). An unusually fast growth rate for *Tilapia zillii*. *California Department of Fish and Game*, 61(1), 54-56.
63. Jensen, K. W. (1957). Determination of age and growth of *Tilapia nilotica* L., *T. galilaea* Art., *T. zillii* Gerv. and *Lates niloticus* C. et V. by means of their scales. *K. Norske Vidensk. Selsk. Forh.*, 30, 150-157.
64. Spataru, P. (1978). Food and feeding habits of *Tilapia zillii* (Gervais) (Cichlidae) in Lake Kinneret (Israel). *Aquaculture*, 14, 327-338.
65. Siddiqui, A. Q. (1979). Reproductive biology of *Tilapia zillii* (Gervais) in Lake Naivasha, Kenya. *Environmental Biology of Fishes*, 4(3), 257-262.
66. Izrail'skiy opyt vyrashchivaniya ryby pri ispol'zovanii zamknutykh sistem. *uzv.su*. Retrieved from <http://www.uzv.su/knowledge/worldexperience/izrailskij-opit-virashivaniya-rib>.
67. Vyrashchivanie ryby v UZV v Izraile. *belapk.ru*. Retrieved from http://ikc.belapk.ru/tehnologii/novyj_resurs.
68. Intensive Tilapia in a re-circulation 'green-water' system. *aquaculture-israel.com*. Retrieved from <http://aquaculture-israel.com/Technology/re-circulation.html>.
69. Balarin, J. D., & Haller, R. D. (1982). *The intensive culture of tilapia in tanks, raceways and cages*. Recent Advances in Aquaculture. Muir, J. F., & Roberts, R. J. (Eds.). Boulder, Colorado, USA: Westview Press.
70. Schmittou, H. R. (2006). Principles and practices of high density fish culture in low volume cages. St. Louis, MO: American Soybean Association.

**ТИЛЯПІЯ (TILAPIN) ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ОБ'ЄКТІВ
СУЧАСНОЇ АКВАКУЛЬТУРИ. ДОСВІД КУЛЬТИВУВАННЯ
В ІЗРАЇЛІ (ОГЛЯД)**

Ю. Озиранський, yuri@matc.org.il, Агентство з розвитку міжнародного співробітництва при Міністерстві Закордонних Справ Держави Ізраїль (MASHAV), Міжнародний тренінговий центр з сільського господарства, кібуц Шфаїм

Н. Л. Колесник, kolesnik@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

С. Д. Щербак, schek@email.ua, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Р. В. Кононенко, ruslan_kononenko@ukr.net, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

М. О. Федоренко, fedorenkono@ukr.net, Бюджетна установа «Методично-технологічний центр з аквакультури», м. Київ

Мета. Держава Ізраїль, за короткий період з 1948 року, не дивлячись на складні політичні та клімато-географічні умови, демонструє стабільний розвиток аквакультури. Це обумовлено розробкою і повсюдним застосуванням ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій, а також ретельним підбором найбільш ефективних об'єктів культивування. У зв'язку з цим, ізраїльський досвід культивування тилапій, як одного з основних об'єктів світової аквакультури, є актуальним для України, тим більше, що ці види риб були успішно завезені в нашу країну, але не знайшли широкого поширення в рибному господарстві.

Результати. Робота, написана організатором і учасниками навчального курсу «Інтенсивне ставове рибництво», який відбувся в Ізраїлі в грудні 2016 року є коротким оглядом ролі тилапій в світовій аквакультурі та технологічних схем, за якими їх культивують в цій країні. Зокрема, наведені дані щодо світового експорту та імпорту цих риб в 2016 році; розглянута гастрономічна цінність їх м'яса; описано систематичне положення триби тилапія; подано коротку рибоводно-біологічну характеристику основних видів, які використовуються в рибному господарстві. Особливу увагу зосереджено на видах, які успішно культивуються в Ізраїлі і технологіях, що дозволяють цього досягти.

Практична значимість. Представлений огляд може бути використаний для популяризації тилапій як об'єктів аквакультури та модернізації існуючих технологій їх культивування в Україні, а також в освітній і науковій діяльності.

Ключові слова: тилапія, Ізраїль, рибогосподарська галузь, аквакультура, установка замкнутого водопостачання (УЗВ), *Tilapia zillii*, *Sarotherodon galilaeus*, *Oreochromis massambicus*, *Oreochromis niloticus*, *Oreochromis aureus*.

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 89-102
DOI: 10.15407/fsu2018.03.089
УДК [639.3.043:636.087.73]:639.371.52

Received 11.05.18
Received in revised form 19.06.18
Accepted 17.07.18

ВПЛИВ АМАРАНТУ *AMARANTHUS* (LINNAEUS) НА ЯКІСНІ ТА ПРОДУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВОЛІТОК КОРОПА *CYPRINUS CARPIO* (LINNAEUS) ЗА ВВЕДЕННЯ ЙОГО ДО СКЛАДУ РАЦІОНУ

Р. А. Паламарчук, feeding@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. В. Дерень, dereni@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначення ефективності засвоєння амаранту в організмі дволіток коропа, вивчення впливу даного нетрадиційного кормового компоненту на деякі фізіолого-біохімічні показники організму піддослідних риб та економічну складову вирощування.

Методика. Дослідження проведено в умовах ДП ДГ Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН. Об'єктом досліджень були дволітки любінського лускатого коропа. Коропам першої дослідної групи в кінці вегетаційного періоду впродовж 30 днів до складу основного раціону вводили муку з насіння амаранту в кількості 10%, а коропам другої дослідної групи — в кількості 20%. Контрольній групі коропів згодовували кормосуміш злакових культур впродовж всього періоду вирощування. Забезпечено ідентичні умови утримання коропа при постановці випробувань у відповідності до мети досліді. Рибницькі та гідрохімічні дослідження проведено за загальноприйнятими в рибництві методиками. Вміст гемоглобіну в крові коропів визначали гемоглобін-ціанідним методом. Кількість еритроцитів у крові коропів підраховували в камері Горяєва. Визначення вмісту білка проводили за методом Бредфорда. Концентрацію дієнових кон'югатів досліджували за методом, що ґрунтується на реакції оптичної густини гептанізопропанольного екстракту ліпідів. Визначення концентрації ТБК-активних продуктів проводили спектрофотометрично за кольоровою реакцією з тіобарбітуровою кислотою. Активність супероксиддисмутази (СОД) — за визначенням відсотка гальмування реакції відновлення нітросинього тетразоліа в присутності феназинметасульфату. Активність каталази — за зміною концентрації H_2O_2 .

Результати. Температурний режим та основні гідрохімічні показники в експериментальних ставах перебували в межах нормативних значень впродовж всього вегетаційного періоду.

Дослідженнями встановлено, що при згодовуванні амаранту дволіткам коропа в складі злакової кормосуміші з розрахунку 10 і 20% отримано позитивний вплив на гематологічні показники, поживність м'яса, активність системи антиоксидантного захисту організму та зниження вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів в сироватці крові, а саме: збільшення кількості еритроцитів та вмісту гемоглобіну ($p < 0,05-0,001$), зростання вмісту протеїну в м'язах (відповідно на 3 і 4%), тенденцію до підвищення активності супероксиддисмутази з одночасним зниженням вмісту ТБК-продуктів та дієнових кон'югатів.

За введення до раціону дволіток коропа амаранту в кількості 20% середня маса риб була на 3% вищою, витрати кормів на вирощування — меншими на 4%, а отриманий прибуток від вирощування — нижчим на 14%, ніж за введення в кількості 10% досліджуваної кормової добавки.

© Р. А. Паламарчук, О. В. Дерень, 2018

Наукова новизна. Вперше вивчено особливості росту і розвитку дволіток коропа та ефективності використання насіння амаранту в складі злакової кормосуміші. При цьому досліджено вплив амаранту на фізіолого-біохімічні показники організму піддослідних риб.

Практична значимість. На підставі аналізу змін фізіологічних та біохімічних функцій організму риб та економічної ефективності в результаті згодовування амаранту, розроблено кількісні норми та методи його введення до складу основного раціону дволіток коропа.

Ключові слова: дволітки коропа, амарант, рибопродуктивність, витрати корму, фізіолого-біохімічні показники організму, хімічний склад води.

THE EFFECT OF AMARANTH *AMARANTHUS* (LINNAEUS) ON QUALITATIVE AND PRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF 1+ CARP *CYPRINUS CARPIO* (LINNAEUS) AFTER BEING ADDED TO THE COMPOSITION OF THE DIET

R. Palamarchuk, feeding@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

O. Deren, derenj@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Determination of the effectiveness of amaranth assimilation in the body of 1+ carp, the study of the effect of this non-traditional feed component on some physiological and biochemical indices of experimental fish and the economic component of their rearing.

Methodology. Fish-rearing and hydrochemical studies were carried out according to generally accepted aquaculture methods. The hemoglobin content in carp blood was determined by the hemoglobin-cyanide method. The number of erythrocytes in carp blood was counted in a Goryaev's chamber. Protein content determination was carried out according to the Bradford's method. The concentration of diene conjugates was studied by a method based on the reaction of the optical density of the heptane-isopropanol extract of lipids. The concentration of TBA-active products was determined spectrophotometrically by a color reaction with thiobarbituric acid. The activity of superoxide dismutase (SOD) was determined by the percentage inhibition of the reduction of nitrous tetrazolium in the presence of phenazin methosulfate. The catalase activity was determined based on a change in H_2O_2 concentration.

Findings. The study was carried out under the conditions of the State Enterprise Lviv Experimental Station of the Institute of Fisheries of the National Academy of Sciences. The subject of the study were 1+ Lubin scaly carp. Carp of the first experimental group received amaranth seed flour added to the main diet as 10% at the end of the culture season for 30 days, while another experimental group received 20%. The control group of carp was fed with grain mixtures during the entire growing period. The conditions of fish keeping were identical according to the experiment goal.

The temperature regime and main hydrochemical parameters in the experimental ponds were within the limits of the normative values throughout the entire growing season.

When feeding 1+ carp with amaranth, a positive effect was obtained for hematological parameters, nutritional properties of meat, activity of antioxidant protection system, and reduction in lipid peroxidation products, namely: an increase in the number of erythrocytes and hemoglobin content ($p < 0.05 - 0.001$), a tendency to an increase in protein and fat contents in muscles, increased activity of superoxide dismutase, a decrease in the number of TBA products and diene conjugates in blood serum.

Originality. Peculiarities of growth, development of carp and efficiency of using feeds of various compositions with the addition of amaranth seeds against the background of similar satisfactory growing conditions were studied for the first time. At the same time, the effect of amaranth on physiological and biochemical parameters of the body of experimental fish was investigated.

Practical value. Based on the analysis of changes in the physiological and biochemical functions

of fish organism and economic efficiency as a result of feeding fish with amaranth, quantitative norms and methods for adding it to the diet of carp were developed.

Key words: 1+ carp, amaranth, fish productivity, feed costs, physiological and biochemical parameters of the organism, chemical composition of water.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Основним завданням при товарному вирощуванні коропа в умовах ставів є отримання високих продуктивних і якісних характеристик вирощеної продукції, що залежить від комплексу чинників, зокрема технологічних аспектів, умов утримання, локальних особливостей тощо. До основних умов раціонального ведення господарства належать дотримання загальноприйнятих методів підбору і відбору груп риб, їх технічно правильне вирощування і утримання, забезпечення нормованої повноцінної годівлі на всіх етапах онтогенезу. Комплексне врахування фізіологічних та продуктивних потреб організму риб з дотриманням оптимальної технології годівлі, адаптованої до відповідних умов вирощування, забезпечує максимальну ефективність ведення господарства.

Зокрема, підвищити показники продуктивності коропа можна шляхом згодовування штучних кормів покращеного складу. Однією з таких кормових рослин з біологічно активними властивостями є амарант. Застосування амаранту у рибництві є перспективним з огляду на його поживність: вміст протеїну — 15–17%, жиру — 7–8%, клітковини — 4,7%. Крім того, білок амаранту добре збалансований за амінокислотним складом. З 20 основних амінокислот в амаранті присутні 18, а вміст лізину і метіоніну у нього в 2 рази вищий, ніж в усіх зернобобових [1–3]. Встановлено, що амарант, завдяки наявності флавоноїдів, зокрема рутину та поліфенольних сполук, проявляє антиоксидантну властивість [4]. Також у амаранті міститься каротиноїд сквален, який легко всмоктується і засвоюється та позитивно впливає на резистентність організму, забезпечуючи стійкість до різних захворювань [5].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Оскільки амарант є маловивченим кормовим компонентом у рибництві [6], то, відповідно до описаних вище біологічних властивостей, актуальним є визначення ефективності його використання в якості кормової добавки при товарному вирощуванні коропа та вивчення фізіолого-біохімічних показників їх організму.

У дослідженнях вперше розглянуто доцільність використання амаранту в годівлі дволіток коропа, на заміщення злакової складової кормосуміші, з огляду на функціональний стан організму, продуктивні показники та економічну складову вирощування.

Мета досліджень полягала у встановленні ефективності засвоювання амаранту в організмі дволіток коропа, вивчення впливу даного нетрадиційного кормового компонента на деякі фізіолого-біохімічні показники організму піддослідних риб та економічну складову вирощування.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проведено в умовах ДП ДГ Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН. Використано два дослідних і один контрольний стави площею 0,16–0,19 га. Об'єктом досліджень були дволітки любінського лускатого коропа. Густота посадки піддослідних риб складала 1000 екз./га. Коропам першої дослідної групи (Дослід І) в кінці вегетаційного періоду (серпень) впродовж 30 днів до складу основного раціону вводили муку з насіння амаранту в кількості 10%, а коропам другої дослідної групи (Дослід ІІ) — в кількості 20%. Контрольній групі коропів (Контроль) згодовували кормосуміш злакових культур впродовж всього періоду вирощування. Загалом вегетаційний період тривав 75 днів.

Кормосуміш згодовували риbam на кормових місцях один раз на добу. Добова кількість кормосуміші становила 2–8% від маси риб з урахуванням темпів росту, рівня розвитку природної кормової бази в ставах, її поїдання та гідрохімічного режиму. Контрольні лови проводили один раз на 3 тижні і відповідно здійснювали паразитологічні обстеження експериментальних груп коропа.

Відбір проб для хімічного аналізу води та їх обробку в лабораторії проводили за загальноприйнятими методами [7]. Якість води оцінювали згідно із загальними вимогами та нормами у рибництві [8].

Годівлю проводили за схемами нормованої годівлі коропа [9]. Контрольні зважування і огляд зовнішнього покриву та внутрішніх органів риб здійснювали перед початком досліду та через 14 і 30 діб. Після закінчення досліду визначали загальну і середню масу риб, рівень виживання, проводили відбір матеріалу для фізіолого-біохімічних досліджень відповідно до визначених завдань.

Для біохімічних досліджень використовували 10% гомогенати тканин печінки і скелетних м'язів коропа. Досліджували концентрацію дієнових кон'югатів за методом, що ґрунтується на реакції оптичної густини гептанізопропанольного екстракту ліпідів [10]. Визначення концентрації ТБК-активних продуктів проводили спектрофотометрично за кольоровою реакцією з тіобарбітуровою кислотою [11]. Активність супероксиддисмутази — за визначенням відсотка гальмування реакції відновлення нітросинього тетразоліа в присутності феназинметасульфату [12]. Активність каталази — за зміною концентрації H_2O_2 [13]. Визначення вмісту білка проводили за методом Бредфорда [14].

Визначали вміст сухої речовини, білка, жиру та золи [15]. Вміст жиру — екстракційним методом, вміст сухої речовини — випаровуванням при температурі 100–105°C протягом 3–5 год. [16].

Вміст гемоглобіну в крові коропів визначали гемоглобін-ціанідним методом (з ацетоннінгідрином). Принцип методу полягає в тому, що гемоглобін при взаємодії з заліzosиньоридистим калієм окиснюється в метгемоглобін, який утворює з ацетонціангідрином забарвлений гемоглобінціанід, інтенсивність якого пропорційна вмісту гемоглобіну [17]. Кількість еритроцитів у крові коропів підраховували в камері Горяєва [18].

Одержані цифрові результати опрацьовували статистично за допомогою

стандартного пакету статистичних програм Microsoft Excel. Вираховували середні арифметичні величини (M), середню квадратичну похибку (m) і вірогідність різниць (P) між досліджуваними середньоарифметичними величинами [19].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Впродовж вегетаційного періоду проводився повний контроль хімічного складу води, газового режиму, вивчалась динаміка біогенних елементів і вмісту органічної речовини в двох дослідних і контрольному ставах.

Температура води впродовж сезону вирощування коливалась у межах 21–28°C, найвищі значення спостерігались в кінці червня і в середині липня. Загалом, температурний режим був оптимальним для засвоєння корму та росту коропа.

Гідрохімічний режим в дослідних ставах майже не відрізнявся, тому що, в основному, залежав від хімічного складу води єдиного для них джерела водопостачання (табл. 1).

В кінці червня — на початку липня, коли температура води у водоймах в середньому становила 27–29°C, в усіх ставах концентрація кисню знижувалась до 1,44–2,28 мгО/дм³. З метою запобігання явищам задуха в даний період збільшували проточність води і проводили вапнування в ставах.

Показник рН середовища був оптимальним для проходження біохімічних процесів в усіх ставах, відповідаючи слаболужному (7,38–7,66). Це свідчить про інтенсивність кругообігу речовин екосистеми, що сприяє підвищенню продуктивності ставів. Перманганатне окиснення встановлює присутність у воді легкоокиснюваних органічних речовин і є одним із показників ступеня забруднення водойми органічними домішками. Коливання даних показників у дослідних ставах були незначними впродовж всього періоду вирощування: 11,3–13,6 мгО/дм³. Вода не була забрудненою нітритами. Нітратний азот був відсутній впродовж всього сезону вирощування в усіх ставах. Згідно результатів досліджень, вміст амонійного азоту в середньому не відрізнявся в каскаді ставів і коливався в межах 0,13–0,37 мгN/дм³, що не перевищувало нормативних значень.

Таблиця 1. Результати хімічного аналізу води дослідних ставів, min–max / середнє

Table 1. Results of chemical analysis of water in experimental ponds, min-max / average

Показники / Indexes	Дослід I / Experiment I	Дослід II / Experiment II	Контроль / Control	Нормативні значення [8] / Normative values [8]
1	2	3	4	5
pH / pH	<u>6,90–7,90</u> 7,38	<u>6,92–8,12</u> 7,45	<u>7,32–8,00</u> 7,66	6,50–8,50
Перманганатне окиснення, мгО/дм ³ / Chemical oxygen demand with permanganate as the oxidant, mg O/dm ³	<u>8,6–13,4</u> 11,3	<u>9,9–14,7</u> 12,7	<u>12,8–14,3</u> 13,6	15,0

Продовження табл. 1

Continue of tab. 1

1	2	3	4	5
Лужність, мг-екв./дм ³ / Alkaline hardness, mg- equ/dm ³	<u>3,95–5,10</u> 4,51	<u>3,95–5,0</u> 4,47	<u>3,85–5,10</u> 4,48	3–6
Гідрокарбонати, HCO ₃ ⁻ , мг/дм ³ / Hydrocarbonate, HCO ₃ ⁻ , mg/dm ³	<u>241,0–310,9</u> 274,9	<u>241,0–304,5</u> 272,8	<u>234,7–310,9</u> 272,8	200–400
Нітрити, NO ₂ ⁻ , мгN/дм ³ / Nitrites, NO ₂ ⁻ , mgN/dm ³	<u>0–0,12</u> 0,04	<u>0–0,004</u> 0,001	0	0,1
Амонійний азот, NH ₄ ⁺ , мгN/дм ³ / Ammoniacal nitrogen, NH ₄ ⁺ , mgN/dm ³	<u>0,15–0,25</u> 0,20	<u>0,13–0,37</u> 0,22	<u>0,15–0,18</u> 0,17	1
Нітратний азот, NO ₃ ⁻ , мгN/дм ³ / Nitrate nitrogen, NO ₃ ⁻ , mgN/dm ³	0	0	0	до 2
Мінеральний фосфор, PO ₄ ³⁻ , мгP/дм ³ / Mineral phosphorus, PO ₄ ³⁻ , mgP/dm ³	<u>0–0,22</u> 0,07	<u>0–0,18</u> 0,06	0	0,5
Залізо заг., мг/дм ³ / Total ferum., mg/dm ³	<u>0,20–0,30</u> 0,24	<u>0,20–0,30</u> 0,25	<u>0,25–0,30</u> 0,28	1,8
Твердість заг., мг-екв./дм ³ / Total alkaline hardness, mg- equ/dm ³	<u>4,5–5,0</u> 4,8	<u>4,7–5,1</u> 5,0	<u>4,7–4,8</u> 4,8	3–7
Ca ²⁺ , мг/дм ³ / Ca ²⁺ , mg/dm ³	<u>75,6–90,0</u> 84,0	<u>75,6–91,8</u> 84,6	<u>79,2–84,6</u> 81,9	40 – 60
Mg ²⁺ , мг/дм ³ / Mg ²⁺ , mg/dm ³	<u>6,1–8,5</u> 7,7	<u>6,1–10,9</u> 8,9	<u>6,0–9,7</u> 7,9	до 30
Cl ⁻ , мг/дм ³ / Cl ⁻ , mg/dm ³	<u>17,3–24,5</u> 20,9	<u>17,3–24,5</u> 20,9	<u>17,3–24,5</u> 20,9	50–70
SO ₄ ²⁻ , мг/дм ³ / SO ₄ ²⁻ , mg/dm ³	<u>82,0–110,0</u> 94,0	<u>76,8–106,0</u> 95,9	<u>79,4–104,2</u> 91,8	50–70
Σ K ⁺ +Na ⁺ , мг/дм ³ / Σ K ⁺ , Na ⁺ , mg/dm ³	<u>33,0–84,3</u> 53,9	<u>38,0–82,3</u> 53,1	<u>32,5–79,0</u> 55,8	до 120
Мінералізація заг., мг/дм ³ / Total salinity, mg/dm ³	<u>476,2–603,8</u> 532,0	<u>497,2–603,8</u> 536,1	<u>454,5–607,5</u> 531,0	300–1000
Розчинений у воді кисень, мг/дм ³ / Dissolved oxygen, mg/dm ³	<u>1,44–4,5</u> 2,30	<u>2,28–5,25</u> 3,32	<u>1,90–4,84</u> 3,11	≥5 (зниж. зранку ≥2) / (lowered in the morning ≥2)

Мінеральний фосфор в Контролі був відсутній, а в дослідних ставах був присутнім в незначній кількості, збільшуючись максимально до 0,22 мгP/дм³ в

Досліді І. Твердість води була практично однаковою в усіх ставах і в середньому за сезон склала 4,8–5,0 мг-екв./дм³ (табл. 1). Відповідно, кількість кальцію була високою, що позитивно вплинуло на санітарний стан водойм та ріст риби. Вода не була забруднена хлоридами і в усіх ставах за весь період досліджень не перевищувала показника 20,9 мг/дм³. Вміст сульфатів у воді усіх експериментальних ставів перевищував нормативні значення, але це є закономірним для води джерела водопостачання даного господарства. Серед аніонів переважали гідрокарбонати, вміст яких був високим і становив у середньому 272,8–274,9 мг/дм³, а серед катіонів — кальцій.

Отже, за період досліджень хімічний склад води дещо змінювався, але істотної різниці між показниками дослідних ставів і контрольного не зафіксовано. В основному, за основними хімічними показниками вода ставів відповідала рибиницьким нормам.

По закінченні експериментальних робіт визначено фізіолого-біохімічні показники піддослідних груп коропа, виходячи з основних біологічних властивостей амаранту.

В крові дволіток коропів першої дослідної групи відмічено зростання вмісту гемоглобіну ($p < 0,01$) та тенденцію до збільшення кількості еритроцитів (табл. 2). В крові коропів другої дослідної групи — зростання вмісту гемоглобіну ($p < 0,01$) та кількості еритроцитів ($p < 0,01$). Це узгоджується з літературними даними і пов'язано із вмістом в насінні амаранту сквалену, який стимулює вироблення метгемоглобіну [5].

Таблиця 2. Гематологічні показники дволіток коропа ($M \pm m, n = 6$)
Table 2. Hematological parameters of two-year-old carp ($M \pm m, n=6$)

Група риб / Group of fishes	Вміст гемоглобіну, г% / Hemoglobin content, g%	К-ть еритроцитів, млн/мкл / Number of red blood cells, M/mcl
Дослід І / Experiment I	10,94±0,327*** /	1,25±0,040
Дослід ІІ / Experiment II	11,02±0,491**	1,39±0,060*
Контроль / Control	8,30±0,403	1,19±0,040

Примітка. Різниці статистично вірогідні порівняно з контрольною групою: * — $p < 0,05$; ** — $p < 0,01$; *** — $p < 0,001$.

Notes. The differences are statistically significant compared to the control group: * — $p < 0,05$; ** — $p < 0,01$; *** — $p < 0,001$.

В обох дослідних групах вміст каталази в сироватці крові піддослідних риб мав тенденцію до зниження відносно Контролю (табл. 3). Разом з цим, відмічено тенденцію до збільшення вмісту супероксиддисмутази: в Контролі даний показник складав 6,24±0,635 ум. од./хв. × мг білка, а в Досліді І та Досліді ІІ — 6,84±0,828 і 6,63±0,650 відповідно.

Визначено вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів в сироватці крові піддослідних риб. В Досліді І відмічено тенденцію до зниження вмісту ТБК-продуктів і дієнових кон'югатів відносно Контролю — відповідно 1,89±0,559

проти $1,96 \pm 0,063$ та $3,32 \pm 0,271$ проти $3,40 \pm 0,138$. В Досліді II дана тенденція була більш вираженою: досліджувані показники склали відповідно $1,40 \pm 0,239$ проти $1,96 \pm 0,063$ та $3,16 \pm 0,211$ проти $3,40 \pm 0,138$.

Дані показники в сукупності вказують на те, що згодовування амаранту дволіткам коропа сприяє підвищенню активності системи антиоксидантного захисту організму та зниженню кількості продуктів перекисного окиснення ліпідів, що може свідчити про зростання їх стресостійкості. Відсутність достовірних відмінностей між досліджуваними показниками може бути взаємопов'язаною з тим, що в усіх варіантах досліду забезпечено оптимальні та ідентичні умови вирощування.

Таблиця 3. Стан показників системи антиоксидантного захисту у сироватці крові експериментальних груп коропа ($M \pm m$, $n = 3$)

Table 3. The state of indicators of the antioxidant protection system in carp serum in experimental groups ($M \pm m$, $n = 3$)

Група риб / Group of fishes	Каталаза, мкмоль H_2O_2 /хв. $\times$ мг білка / Catalase, $\mu\text{mol } H_2O_2$ /min. $\times$ mg protein	СОД, ум. од./хв. $\times$ мг білка / Superoxide dismutase, av. un./min. $\times$ mg protein	ТБК-продукти, нмоль / мг білка / TBA-reactive substances, nmol / mg protein	Дієнові кон'югати, нмоль / мг білка / Diene conjugates, nmol / mg protein
Дослід I / Experiment I	$0,62 \pm 0,081$	$6,84 \pm 0,828$	$1,89 \pm 0,559$	$3,32 \pm 0,271$
Дослід II / Experiment II	$0,28 \pm 0,041$	$6,63 \pm 0,650$	$1,40 \pm 0,239$	$3,16 \pm 0,211$
Контроль / Control	$0,66 \pm 0,175$	$6,24 \pm 0,635$	$1,96 \pm 0,063$	$3,40 \pm 0,138$

Відносний вміст протеїну у м'язах дволіток коропа був найвищим у Досліді II і становив 16,3%, проти 15,67% в Контролі (табл. 4). Вміст жиру був вищим відносно Контролю в Досліді I і склав 4,43%, та нижчим в Досліді II — 3,97%. Отже, додаткове згодовування дволіткам коропа амаранту в кількості 10% приводить до зростання в його м'язах вмісту протеїну і жиру. При додаванні до корму амаранту в кількості 20% відмічено тенденцію до зниження вмісту жиру в м'язах з одночасним збільшенням вмісту протеїну.

Таблиця 4. Показники поживності м'яса експериментальних груп коропа, % ($M \pm m$, $n = 6$)

Table 4. Indices of meat nutrition in experimental groups of carp, % ($M \pm m$, $n = 6$)

Група риб / Group of fishes	Суха речовина / Dry substance	Протеїн / Protein	Жир / Fat
Дослід I / Experiment I	$22,13 \pm 0,133$	$16,20 \pm 0,153$	$4,43 \pm 0,186$
Дослід II / Experiment II	$21,50 \pm 0,200$	$16,30 \pm 0,100$	$3,97 \pm 0,145$
Контроль / Control	$21,53 \pm 0,273$	$15,67 \pm 0,273$	$4,33 \pm 0,240$

При аналізі рибогосподарських показників встановлено, що виживання коропа було найнижчим у Контролі — 85%, а найвищим — в Досліді I — 89% (табл. 5).

При вилові середня маса коропів, яким згодовували амарант в кількості 20% в складі основного раціону, була найвищою і становила 546 г, що на 24,2% більше Контролю і на 3,3% більше, ніж при використанні в годівлі амаранту в кількості 10%. Відповідно до рівня виживання і маси риб при вилові, отримано рибопродуктивність ставів, яка в Досліді I становила 425 кг/га, в Досліді II — 426 кг/га, і в Контролі — 253 кг/га.

В результаті проведення експериментальних робіт отримано також економію у витраті кормів на вирощування. Зокрема, у варіанті досліді, де риби отримували додатково до основного раціону 10% амаранту, витрати були найнижчими (4,7 од.), а в Контролі — найбільшими (6,5 од.). При введенні до складу основного раціону 20% амаранту даний показник був практично на однаковому рівні з Дослідом I і склав 4,9 од.

Таблиця 5. Результати вирощування дволіток коропа за додавання до основного раціону амаранту

Table 5. Results of cultivation two-year-old carp with amaranth addition to the main diet

Група риб / Group of fishes	Площа ставу, га / Area of the pond, ha	Посаджено / Stock with fish			Виловлено / Fish capture				Рибо- прод., кг/га / Standing crop of the fish per unit area in a body water, kg/ha	Витрат и кор- му, од. / Spend- ing feed, units
		к-ть, екз. / Num- ber of indi- viduals	сер. маса, г / Total mass, g	заг. маса, кг / Total mass, g	Ви- хід, % / sur- vival, %	к-ть, екз. / Num- ber of indi- viduals	сер. маса, г / Total mass, g	заг. маса, кг / Total mass, g		
Дослід I / Experiment I	0,16	160	43	7	89	142	528	75	425	4,7
Дослід II / Experiment II	0,19	190	43	8	86	163	546	89	426	4,9
Контроль / Control	0,17	170	43	7	85	145	414	60	253	6,5

Вартість корму, використаного на вирощування коропа, була найвищою при застосуванні в годівлі в серпні 20% амаранту, проте економічна ефективність зросла за рахунок зменшення витрат корму і збільшення приросту (табл. 6).

Найнижчі витрати на вирощування 1 кг продукції отримано в Досліді I — 8,16 грн, що на 19% менше, ніж за згодовування в складі основного раціону амаранту в кількості 20%.

Враховуючи вартість посадкового матеріалу і витрачених на вирощування кормів, отримано прибуток від вирощування коропа в Досліді I 6115 грн/га, що більше на 36% у порівнянні з контролем, а в Досліді II 5265 грн/га, що більше Контролю на 25%.

Таблиця 6. Економічна ефективність застосування амаранту в складі основного раціону дволіток коропа

Table 6. Economic efficiency of application of amaranth in the main ration of two-year-old carp

Показники / Indexes	Дослід I / Experiment I	Дослід II / Experiment II	Контроль / Control
Площа ставу, га / Area of the pond, ha	0,16	0,19	0,17
Вирощено коропа, кг / Fish capture, kg	75	89	60
Пшениця / Wheat	330,1	384,5	390,8
Зерновідходи / Grain screenings	64	79	70
Витрати на корм, грн * / Feed costs UAH*			
Ячмінь / Barley	89,5	112,2	99,4
Амарант / Amaranth	128	320	—
Всього / All	611,6	895,7	560,2
Витрати корму на 1 кг вирощеної продукції, грн / Feed costs per 1 kg of grown products, UAH.	8,16	10,06	9,34
Витрати на посадковий матеріал, грн * / Stocking material cost UAH *	210	240	210
1 кг риби / 1 kg of fishes	24	24	24
Ринкова вартість, грн / Market value, UAH	1800	2136	1440
Прибуток (враховуючи витрати на корми і посадковий матеріал), грн/га / Profit (taking into account the costs of feed and stocking material), UAH / ha	6115	5265	3940
Прибуток (враховуючи витрати на корми і посадковий матеріал), % / Profit (taking into account the costs of feed and stocking material), %	36	25	—

Примітка. * — ціна пшениці — 1,33–2,20 грн/кг, ячменю — 1,42 грн/кг, зерновідходів — 1,0 грн/кг, амаранту — 8 грн/кг і посадкового матеріалу — 30 грн/кг.

Notes. * — costs: wheat — 1,33–2,20 UAH/kg, barley — 1,42 UAH/kg, grain screenings — 1,0 UAH/kg, amaranth — 8 UAH/kg & stocking material — 30 UAH/kg.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

В процесі проведення експериментальних досліджень вивчено особливості росту, розвитку дволіток коропа та ефективності використання злакової кормосуміші з додаванням амаранту в кількості 10 і 20% на фоні аналогічних задовільних умов вирощування.

При дослідженні фізіологічних функцій організму піддослідних дволіток коропа за введення впродовж 30 днів до складу основного раціону амаранту

встановлено його позитивний вплив на гематологічні показники (в обох дослідних групах збільшилась кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну ($p < 0,05-0,001$) відносно Контролю), поживність м'яса (вміст жиру в м'язах коропів Досліді I зріс на 2%, протеїну — в дослідних групах відповідно на 3 і 4%), активність системи антиоксидантного захисту організму та зниження продуктів перекисного окиснення ліпідів в сироватці крові (в Досліді I дещо зріс вміст каталази та супероксиддисмутази з одночасним незначним зниженням кількості вмісту ТБК-продуктів та дієнових кон'югатів). У Досліді II вміст каталази знижувався, а супероксиддисмутази був дещо вищим відносно контролю, а також відмічено чітку тенденцію (більш виражену, ніж в Досліді I) до зниження вмісту ТБК-продуктів та дієнових кон'югатів).

За введення до раціону дволіток коропа амаранту в кількості 20% середня маса риб була на 3% вищою, а витрати кормів на вирощування зменшились на 4%, ніж за введення в кількості 10% досліджуваної кормової добавки. Проте отриманий прибуток в результаті, навпаки, був вищим на 14% за введення амаранту в кількості 10%.

Збільшення кількості введення амаранту до складу злакової кормосуміші не буде ефективним з економічної точки зору, відповідно до співвідношення ціни амаранту і злакових компонентів. Перспективним може бути використання даного нетрадиційного кормового компоненту з метою заміщення кормових компонентів вищої поживної цінності в складі збалансованих комбікормів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Доклиническое изучение безопасности фитопрепаратов, обладающих гепатопротекторными свойствами / Крепова Л. В. и др. // Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения : 8 Междунар. съезд «Фитофарм 2004», 21-23 июня 2004 г. : матер. Санкт-Петербург, 2004. С. 111—114.
2. Железнов О. Амарант — культура XXI століття // Хімія. Агрономія. Сервіс. 2009. № 5—6. С. 37—42.
3. Карасьева Н. В. Перспективы использования амаранту // Хранение и переработка зерна. 2009. № 1. С. 31—33.
4. Карунський О. Й. Хімічний та амінокислотний склад амаранту // Вісник державного агроекологічного університету. 2008. № 2 (23). С. 190—192.
5. Лобода А. В. Разработка технологии и рецептуры биологически активной добавки «Сквален-лецитин» на основе семян амаранта: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. техн. наук : 05.18.06. Краснодар, 2009. 20 с.
6. Котов Н. Т., Мірошніченко Л. А., Шаталов Є. П. Кормова культура — амарант // Сучасні аграрні технології. 2012. № 10. С. 14—21.
7. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград. : Гидрометеиздат, 1970. 412 с.
8. СОУ 05.01—37—385:2006. Вода рыбогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України. 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
9. Желтов Ю. А. Организация кормления разновозрастного карпа в фермерских рыбных хозяйствах. Киев : ИНКОС, 2006. 282 с.
10. Стальная И. Д. Метод определения диеновой конъюгации ненасыщенных высших жирных кислот // Современные методы в биохимии. 1977. С. 63—64.

11. Коробейникова Е. Н. Модификация определения продуктов перекисного окисления липидов в реакции с тиобарбитуровой кислотой // Лабораторное дело. 1989. № 7. С. 8—9.
12. Дубинина Е. Е., Сальникова Л. А., Ефимова Л. Ф. Активность и изоферментный спектр супероксиддисмутазы эритроцитов и плазмы крови человека // Лабораторное дело. 1983. № 10. С. 30—33.
13. Королук М. А., Иванова Л. И., Майорова И. Г. Метод определения активности каталазы // Лабораторное дело. 1988. № 1. С. 16—19.
14. Bradford M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding // Anal. Biochem. 1976. Vol. 72. P. 248—254.
15. Инструкция по физиолого-биохимическим анализам рыб / Лиманский В. В. и др. Москва, 1984. 150 с.
16. Лебедев П. Т., Усович А. Т. Методы исследования кормов, органов и тканей животных. Москва : Россельхозиздат, 1976. 389 с.
17. Дервиз Г. В., Воробьев А. И. Количественное определение гемоглобина крови посредством аппарата ФЭК // Лабораторное дело. 1969. № 4. С. 2—8.
18. Иванова Н. Т. Методика некоторых гематологических показателей у рыб // Типовые методики исследований продуктивности видов рыб в пределах их ареалов : сб. научн. тр. Вильнюс, 1974. С. 83—90.
19. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва : Колос, 1969. 256 с.

REFERENCES

1. Krepova, L. V., Bortnikova, V. V., & Shkarenkov, A. A. (2004). Doklinicheskoe izuchenie bezopasnosti fitopreparatov, obladajushhih gepatoprotekturnymi svojstvami. *Aktual'nye problemy sozdaniya novyh lekarstvennyh preparatov prirodnoho proishozhdeniya: 8 Mezhdunar. sjezd. Sankt-Peterburg*, 111-114.
2. Zheleznov, O. (2009). Amarant — kultura XXI stolittja. *Himija. Agronomija. Servis*, 5-6, 37-42.
3. Karasova, N. V. (2009). Perspektyvy vykorystannia amarantu. *Khranjenje y pererabotka zerna*, 1, 31-33.
4. Karunskyi, O. Y. (2008). Khimichniy ta aminokyslotnyi sklad amarantu. *Visnyk derzhavnoho ahroekologichnoho universytetu*, 2 (23), 190-192.
5. Loboda, A. V. (2009). Razrabotka tehnologii i receptury biologicheski aktivnoj dobavki «Ckvalen-lecitin» na osnove semjan amaranta. *Extended abstracts of doctor's thesis*. Krasnodar.
6. Kotov, N. T., Miroshnychenko, L. A., & Shatalov, Ye. P. (2012). Kormova kultura — amarant. *Suchasni ahrarni tekhnologii*, 10, 14-21.
7. Alekin, O. A. (1970). *Osnovy gidrohimii*. Leningrad: Gidrometeoizdat.
8. Voda rybohospodarskykh pidpriemstv. Zahalni vymohy ta normy (2006). *SOU 05.01–37–385:2006*. Standart Minahropolityky Ukrapiny. Kyiv: Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy.
9. Zheltov, Yu. A. (2006). *Organizatsiya kormleniya raznovozrastnogo karpa v fermerskikh rybnikh khazyaystvakh*. Kiev: INKOS.
10. Stal'naja, I. D. (1977). Metod opredelenija dienovoj kon'jugacii nenasyshhenykh vysshih zhirnih kislot. *Sovremennye metody v biohimii*, 63-64.

11. Korobejnikova, E. N. (1989). Modifikacija opredelenija produktov perekisnogo okislenija lipidov v reakcii s tiobarbiturovoj kislotoj. *Laboratornoe delo*, 7, 8-9.
12. Dubinina, E. E., Sal'nikova, L. A., & Efimova, L. F. (1983). Aktivnost' i izofermentnyj spektr superoksiddismutazy jeritroцитов i plazmy krovi cheloveka. *Laboratornoe delo*, 10, 30-33.
13. Koroljuk, M. A., Ivanova, L. I., & Majorova, I. G. (1988). Metod opredelenija aktivnosti katalazy. *Laboratornoe delo*, 1, 16-19.
14. Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Anal. Biochem*, 72, 248-254.
15. Limanskiy, V. V., Yambrozhek, A. A., & Bekina, E. N. (1984). Instruksiya po fiziologo-biokhimicheskim analizam ryb. Moskva.
16. Lebedev, P. T., & Usovich, A. T. (1976). Metody issledovaniya kormov, organov i tkaney zhivotnykh. Moskva: Rosselkhozizdat.
17. Derviz, G. V., & Vorob'ev, A. I. (1969). Kolichestvennoe opredelenie gemoglobina krovi posredstvom apparata FJeK. *Laboratornoe delo*, 4, 2-8.
18. Ivanova, N. T. (1974). Metodika nekotoryh gematologicheskikh pokazatelej u ryb. *Tipovye metodiki issledovaniy produkivnosti vidov ryb v predelah ih arealov: sb. nauchn. tr.* Vilnius, 83-90.
19. Plohinskij, H. A. (1969). *Rukovodstvo po biometrii dlja zootehnikov*. Moskva: Kolos.

ВЛИЯНИЕ АМАРАНТА *AMARANTHUS* (LINNAEUS) НА КАЧЕСТВЕННЫЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХЛЕТКОВ КАРПА *CYPRINUS CARPIO* (LINNAEUS) ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕГО В СОСТАВ РАЦИОНА

Р. А. Паламарчук, feeding@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

О. В. Дерень, derenj@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Определение эффективности усвоения амаранта в организме двухлетков карпа, изучение влияния данного нетрадиционного кормового компонента на некоторые физиолого-биохимические показатели организма подопытных рыб и экономическую составляющую выращивания.

Методика. Исследование проведено в условиях ГП ОХ Львовской опытной станции Института рыбного хозяйства НААН. Объектом исследований были двухлетки любенского чешуйчатого карпа. Карпам первой опытной группы в конце вегетационного периода в течение 30 дней в состав основного рациона вводили муку из семян амаранта в количестве 10%, а карпам второй опытной группы — в количестве 20%. Контрольной группе карпов скормливали кормосмеси злаковых культур в течение всего периода выращивания. Обеспечены идентичные условия содержания карпа при постановке испытаний в соответствии с целью опыта. Рыбоводные и гидрохимические исследования проведены по общепринятым в рыбоводстве методикам. Содержание гемоглобина в крови карпов определяли гемоглобин-цианидным методом. Количество эритроцитов в крови карпов подсчитывали в камере Горяева. Определение содержания белка проводили по методу Бредфорда. Концентрацию диеновых конъюгатов исследовали методом, основанным на реакции оптической плотности гептанизопропанольного экстракта липидов. Определение концентрации ТБК-активных продуктов проводили спектрофотометрически по цветной реакции с тиobarбитуровой кислотой. Активность супероксиддисмутазы (СОД) — по определению процента торможения реакции восстановления нитросинего тетразолия в присутствии феназинметасульфата. Активность каталазы — по изменению концентрации H_2O_2 .

Результаты. Температурный режим и основные гидрохимические показатели в экспериментальных прудах находились в пределах нормативных значений на протяжении всего вегетационного периода.

Исследованиями установлено, что при скормливании амаранта двухлеткам карпа в составе злаковой кормосмеси из расчета 10 и 20% получено положительное влияние на гематологические показатели, питательность мяса, активность системы антиоксидантной защиты организма и снижения содержания продуктов перекисного окисления липидов в сыворотке крови, а именно: увеличение количества эритроцитов и содержания гемоглобина ($p < 0,05-0,001$), рост содержания протеина в мышцах (соответственно на 3 и 4%), тенденцию к повышению активности супероксиддисмутазы с одновременным снижением количества ТБК-продуктов и диеновых конъюгатов.

При введении в рацион двухлетков карпа амаранта в количестве 20% средняя масса рыб была на 3% выше, затраты кормов на выращивание — меньше на 4%, а полученная прибыль от выращивания — ниже на 14%, чем при введении исследуемой кормовой добавки в количестве 10%.

Научная новизна. Впервые изучены особенности роста и развития двухлетков карпа и эффективности использования семян амаранта в составе злаковой кормосмеси. При этом исследовано влияние амаранта на физиолого-биохимические показатели организма подопытных рыб.

Практическая значимость. На основании анализа изменений физиологических и биохимических функций организма рыб и экономической эффективности в результате скормливания амаранта, разработаны количественные нормы и методы его введения в состав основного рациона двухлетков карпа.

Ключевые слова: двухлетки карпа, амарант, рыбопродуктивность, затраты корма, физиолого-биохимические показатели организма, химический состав воды.

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 103-111
DOI: 10.15407/fsu2018.03.103
УДК: [639.3.043.13:636.087.73]:[597-1.05:597.442]

Received 28.07.18
Received in revised form 08.08.18
Accepted 16.08.18

INFLUENCE OF INACTIVATED BAKER'S YEAST ON GROWTH POTENTIAL OF RUSSIAN STURGEON *ACIPENSER* *GUELLENSTAEDTII* (BRANDT) FINGERLING

M. Simon, seemann.sm@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Yu. Zabytivskiy, yurafish@ukr.net, Lviv Experimental Station of Institute of Fisheries
NAAS, Velykyi Lyubin

I. Hrytsyniak, info@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To analyze the effect of different concentrations of inactivated baker's yeast on the growth rate of Russian sturgeon fingerlings and the associated metabolic processes to establish the optimal concentrations that could be used in the feed composition for the above-mentioned fish, which are cultivated in recirculating aquaculture system (RAS).

Methodology. To achieve the purpose of the work, classical ichthyological and biochemical methods of research were used. So, during the experiment, regular measurements of the mass of fish were performed, mortality was calculated, samples of tissues were selected for further evaluation of the physiological and biochemical status of the organism. The results were processed using variational statistics methods using the standard Microsoft Office Excel package.

Results. The influence of various concentrations of baker's yeast in the composition of feed for Russian sturgeon on its growth and survival rates is demonstrated. In particular, it was found that their concentration of 5% on the diet within two weeks after transition to exogenous nutrition is optimal.

Scientific novelty. For the first time carried out the analysis of the influence of different concentrations of inactivated baker's yeast, as part of the diet of Russian sturgeon fingerling, on his growth potential.

Practical significance. It has been proved, that inactivated baker's yeast is appropriate to be introduced into the started diet for Russian sturgeon, since it has a positive effect on his digestive system and stimulated growth potential.

Key words: Russian sturgeon fingerling, inactivated baker's yeast, growth potential, started diet for fish.

ВПЛИВ ІНАКТИВОВАНИХ ПЕКАРСЬКИХ ДРІЖДЖІВ НА ПОТЕНЦІАЛ РОСТУ МОЛОДІ РОСІЙСЬКОГО ОСЕТРА *ACIPENSER GUELLENSTAEDTII* (BRANDT)

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Ю. М. Забитівський, yurafish@ukr.net, Львівська дослідна станція ІРГ НААН, смт
Великий Любін

І. І. Грициняк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

© М. Simon, Yu. Zabytivskiy, I. Hrytsyniak, 2018

Мета. Здійснити аналіз дії різних концентрацій інактивованих пекарських дріжджів на темпи росту молоді російського осетра та пов'язані з цим метаболічні процеси для встановлення оптимальних концентрацій, які могли б бути використані в складі стартових кормів, під час вирощування вищенаведених риб в установках замкненого водопостачання (УЗВ).

Методика. Для досягнення мети роботи були використані класичні іхтіологічні та біохімічні методи досліджень. Так, впродовж експерименту регулярно проводили проміри маси риб, підраховували смертність, відбирали проби тканин для подальшої оцінки фізіолого-біохімічного статусу організму. Отримані результати опрацьовували методами варіаційної статистики з допомогою стандартного пакету Microsoft Office Excel.

Результати. Продemonстровано вплив різних концентрацій пекарських дріжджів у складі стартових кормів для російського осетра на показники його росту та виживання. Зокрема виявлено, що їх концентрація обсягом 5% від раціону впродовж двох тижнів від переходу на екзогенне живлення є оптимальною.

Наукова новизна. Вперше здійснено аналіз впливу різних концентрацій інактивованих пекарських дріжджів у складі раціону молоді російського осетра на потенціал росту останнього.

Практична значимість. Доведено, що інактивовані пекарські дріжджі доцільно вводити в стартові корми для російського осетра, оскільки вони справляють позитивний вплив на його травну систему і стимулюють темпи росту.

Ключові слова: молодь російського осетра, інактивовані пекарські дріжджі, потенціал росту, стартові корми для риб.

PROBLEM STATEMENT AND ANALYSIS OF LAST ACHIEVEMENTS AND PUBLICATIONS

Intensive development of sturgeon aquaculture with applying recirculating aquaculture system (RAS) provides maximum use of the growing potential all members of this cartilaginous fish family – *Acipenseridae* [1]. At the same time, it is well-known that one of the biggest problems during the development of life-sustaining sturgeon fingerling is the harmonization of the features their digestive system with starter feeds presented on the market. Fodders for sturgeon, for the most part, in its prescription composition, differ significantly from organisms that are the natural forage base of this age group of fish [2]. As a consequence, feed producers and farmers are confronted with doubtful situations of sturgeon's fingerling active fragmentation growth, with its subsequent prolonged deceleration and the emergence of a number of nutritional disorders caused by the organism depletion due to inappropriate nutrition. Thus, the greatest losses of the number of Russian sturgeon under conditions of industrial cultivation are registered in the first month of its post-embryonical development. Accordingly, it is relevant to search for the optimal components of start fodder, which would satisfy not only the requirements for the somatic growth of fingerling, but also ensure the harmonious development of all systems of the body, including the formation of the immune system. Recently, inactivated baker's yeast has begun to be used in fish farming as a biologically active additive to the main feed [3]. For example, it is known that their application in this way has a positive effect on the organism as well salt-water and freshwater fish. Research of a wide range of scientists underline the immunomodulatory effect of inactivated baker's yeast and the possibility of their use as a transfer for nutrients, vitamins and minerals [4-8]. The results of the influence of

iodized yeast on the development and quality of meat and sex products of marketable Siberian sturgeon (*Acipenser baeri* Brandt, 1869) are sufficiently voluminous, although the author focuses on the effects of iodine, which transference into the organism and affects its growth rate and biochemical blood parameters [9]. At the same time, the mechanism of action of inactivated baker's yeast on the organism Russian sturgeon fingerling (*Acipenser guldenstaedtii* Brandt, 1833) requires further research. That is why the work related to the study of their influence on growth rates and associated metabolic processes in organism of Russian sturgeon fingerling, which is cultivated in the RAS, is relevant.

HIGHLIGHT OF THE EARLIER UNRESOLVED PARTS OF THE GENERAL PROBLEM. AIM OF THE STUDY

Using yeast as well as their products created through biosynthesis in sturgeon aquaculture lasts several decades [3]. The main advantage of this particular group of single-celled fungi in starter fodder is the presence in their composition of a large number of easily accessible oligopeptides, amino and nucleic acids, which are easily digestible by a rapidly growing organism [2]. However, they also contain substances that do not digest or not absorbed, and in certain concentrations, they can even cause contamination with a negative result for the fish organism. Therefore, it is extremely important to carry out an analysis of the effects of various concentrations of inactivated baker's yeast on the growth potential of Russian sturgeon fingerling and related metabolic processes. This will allow them to find out their optimal doses in starter fodder for fish of this species, while growing under the conditions of RAS.

MATERIALS AND METHODS

Studies have been carried out over the last few years, based on the of the state enterprises Experimental fish farm of Lviv research & experimental station of the Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. The object of research is the Russian sturgeon fingerling, which at the sac fry stage were placed in the RAS. After 10 days of adaptation, it was divided into 3 groups, 500 specimens each in order to further determine the effect of inactivated baker's yeast on productive characteristics.

The basis of food was taken starting sturgeon feed "Initsio Plus" company "Biomar" which production is widely represented in Ukraine market. The above-mentioned feed contains 58% crude protein, 14% crude fat, 10% carbohydrates, 0.4% fiber, 11.5% ash and 1.7% total phosphorus.

In the experimental group No. 1 we added to the basic feed 5% inactivated dry baker's yeast and in the experimental group No. 2–15%. In the diet of the control group of fish, these single-celled fungi were absent. Yeasts were introduced into the main feed immediately after their inactivation by deep freezing and before feeding the feed to the test specimens. The feeding was carried out six times during the day, taking into account the biorhythms of Russian sturgeon, namely 50% of the daily ration was set in the morning and evening, and the remaining feed was evenly distributed between four feeding in the afternoon.

The experiment was beginning on the 28th day after leaving the caviar, as soon as

the feeding of the starting feed was set out and lasted for 14 days. During its conduct, regular measurements of the mass of fish were carried out in order to assess their growth potential, determine mortality, and also sampling tissue for further evaluation of the physiological and biochemical status of the organism.

Every 7 days after the start of the experiment, one gram of fingerling was taken for the purpose of analyzing the activity of digestive enzymes. To do this, they were subjected to anesthesia with 0.2% solution of the drug "Propisin", and then dissection digestive tract, and subsequently – as linear growth – proximal area of the intestine located after the glandular stomach, and placed the indicated preparations into a deep freezing chamber (-80°C) liquid nitrogen. After defrosting we carried out homogenization of tissues, centrifugation and in the supernatant was determined activity of major groups of digestive enzymes – α -amylase, lipase (steapsin) and trypsin. The activity of amylase was determined by the Jing Fu method, using 2-chloro-4-nitrophenyl- α -D-maltotriose at a temperature of 25°C [10]. The activity of trypsin and lipase was determined by a method which was modified by M. Kamashevsky [11]. The total protein content was determined by the O. H. Lowry method [12]. Conversion of the activity of digestive enzymes was carried out in terms of grams of protein.

Digital data of the obtained results were processed by the methods of variation statistics, using correlation and regression analysis, using computer programs Microsoft Office Excel 2007 and Statistica-6. The analysis of variables is performed on the system of absolute values. The criteria for the analysis of the indicators were their mean value and error ($M \pm m$), deviation (σ), variability (Cv).

STUDY RESULTS AND THEIR DISCUSSION

Growth rate indicators for the mass of Russian sturgeon fingerling, which together with the initial feed "Inisio +" fed different concentrations of dry inactivated baker's yeasts, are shown in the diagram (Fig.1)

Fig. 1. Growth rate dynamics for the mass of Russian sturgeon fingerling during experimental feeding with 5 and 15% of dry baker's yeast, respectively, in the starter feed for sturgeon

As can be seen from the figure above, within 36 days after the hatching larvae, the addition of 5% and 15 yeast in the starter compound feed has a significant effect on the growth rate for the mass of fish. Thus, when feeding in experiment №2 15% of yeast for

43 days after the hatching, the average weight of experimental specimen prevailed on a 57% control group of fish. At the same time, the average weight of sturgeon fed 5% of yeast exceeded the control group by 35%. Dynamically, the mass grew in all groups of fish, but its steady growth was registered in two experimental groups, up to 36 days.

During the first week of the experiment, there were no significant advantages in the growth of young Russian sturgeon in the experimental and control groups, with the exception of the tendency to increase the mass. However, the difference has become apparent already for the second week of experimental feeding. It is obvious that the slow accumulation of vitamins, proteins and nucleic acids in the body gave impetus to metabolic processes, which were expressed in the rapid growth of the mass of fish for 43 days after the hatching.

Thus, from this stage of the experiment, it can be concluded that feeding with dry inactivated baker's yeast at a concentration of 5 and 15% has a positive effect on fisheries indices of Russian sturgeon fingerling, which cultivation in the RAS, at the end of the 14th day of feeding. In particular, the introduction of this biologically active impurity into the main starter compound feed allows faster growth of fish in the initial stages of ontogenesis.

It should be noted that mortality among Russian sturgeon fingerling at feeding of yeast, from the 28th to the 43rd day of cultivation in RAS, was at zero level in both experimental and control groups.

The analysis of digestive enzymes in the Russian sturgeon fingerling complementary information about the state of the organism in the effects of two concentrations of yeast. Thus, the study of the level of α -amylase activity indicates that the content of yeast in feeds in the amount of 5 and 15% positively affects the activity of hydrolysis of carbohydrates. In particular, the addition of 5% inactivated baker's yeast to the starter compound feed contributes to an increase in the hydrolysis of carbohydrates by 25% relative to the control group, however, the probability difference is not registered in the growth rate of fish (Fig. 2). A similar situation was observed for the level of lipase activity (Fig. 3).

Fig. 2. The level of α -amylase activity (U/mg protein) of Russian sturgeon fingerling during experimental feeding with 5 and 15% of dry baker's yeast, respectively, in the starter feed for sturgeon

Fig. 3. The level of lipase activity (U/mg protein) of Russian sturgeon fingerling during experimental feeding with 5 and 15% of dry baker's yeast, respectively, in the starter feed for sturgeon

Thus, with 5% and 15% of yeast in the starter feed for sturgeon, lipase activity increases by 51.8% and 52%, respectively, relative to control results after 7 days of experimental feeding. There is also a slight increase in the activity of trypsin (Fig. 4).

Fig. 4. The level of total trypsin activity of Russian sturgeon fingerling during experimental feeding with 5 and 15% of dry baker's yeast, respectively, in the starter feed for sturgeon

At 36 days after leaving the larval stage, there is no noticeable tendency to change in growth rates. However, the difference in weight between control and experimental groups is unlikely. However, an increase in the level of activity of digestive enzymes, which was clearly visible at day 7 of our experiment, induced growth potential in the organism of Russian sturgeon. It manifested itself after 14 days, or on the 43rd day of its exit from the larvae stage. As shown in Fig. 1, experimental groups predominate by weight control group of fishes – by 35% and 57%, respectively. However, figures of the digestive enzymes activity level shown that the highest rates of activity for amylase and trypsin are inherent in the experimental group, that fed 5% yeast.

Consequently, based on the above data, it can be assumed that the organism more stably uses the growth potential for a low content of yeast in the main feed compound. Further consumption of the same amount of yeast, as in the first two weeks, can lead to digestive system disorders and growth retardation. In particular, as shown in Figure 4,

sturgeon consumption of 15% of yeast as part of the starter compound feed affects the reduction of protein hydrolysis. Thus interfering in the processes of building an organism of Russian sturgeon in the first month of his life, when the daily gain of his mass can be up to 10–12%. That is, the lack of activity of trypsin, as a consequence, will slow down the transport mechanisms through the cell membrane, which generally leads to a decrease in growth rates.

CONCLUSION AND PERSPECTIVES OF FURTHER DEVELOPMENT

The results of our research suggest that dry inactivated baker's yeast has a positive effect on the digestive system of Russian sturgeon and stimulate its growth potential. The optimum dose for introducing into the starting feed is 5% of the total diet. It is expedient begin to apply it during the period of transition of fingerling to exogenous food and to adhere such diet for two weeks. After that, the amount of yeast in the Russian sturgeon fingerling diet should be reduced to a minimum in order to achieve the immunomodulatory effect, which was investigated by the example of the Beluga (*Huso huso* Linnaeus, 1758) [13].

BIBLIOGRAPHY

1. Симон М. Ю. Особливості переходу ранньої молоді осетрових риб (*Acipenseridae*) на годівлю штучними кормами в УЗВ (огляд) // Рибогосподарська наука України. 2015. №1 (35). С. 106—126.
2. Симон М. Ю. Особливості травлення осетрових видів риб (*Acipenseridae*) (Огляд) // Рибогосподарська наука України. 2016. № 3(37). С. 123—144.
3. Симон М. Ю. Використання кормових дріжджів у годівлі осетрових видів риб (*Acipenseridae*) (Огляд) // Рибогосподарська наука України. 2015. № 4(34). С. 100—126.
4. Effect of dietary nucleotide on antioxidant activity, non-specific immunity, intestinal cytokines, and disease resistance in Nile Tilapia / Rasha M. Reda et al. // Fish & Shellfish Immunology. 2018. Vol. 80. P. 281—290.
5. Comparative evaluation of Brewer's yeast as a replacement for fishmeal in diets for tilapia (*Oreochromis niloticus*), reared in clear water or biofloc environments / Nguyen H. et al. // Aquaculture. 2018. Vol. 495. P. 654—660.
6. Efficacy and tolerance of yeast cell wall as an immunostimulant in the diet of Japanese seabass (*Lateolabrax japonicas*) / Yu H. H. et al. // Aquaculture. 2014. Vol. 432. P. 217—224.
7. Metabolic and bioprocess engineering for production of selenized yeast increased content of seleno-methylselenocysteine / Mapelli V. et al. // Metabolic Engineering. 2011. Vol. 13, iss. 3. P. 282—293.
8. Зубкова Е. Б. Оптимизация состава комбикормов для осетровых рыб с использованием витазара и белковых гидролизатов : автореф. дис. на соискание уч. степени канд.биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология». Астрахань, 2001. 21с.
9. Масленников Р. В. Влияние йодированных дрожжей на рост, развитие и товарные качества ленского осетра при выращивании в садках : автореф. дис. на соискание уч. степени канд.с-г. наук : спец. 06.02.08 «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов». Саратов, 2015. 21 с.

10. Jing Foo A., Bais R. Amylase measurement with 2-chloro-4-nitrophenyl maltotrioxide as substrate // *Clinica Chimica Acta*. 1998. Vol. 272. P. 137—147.
11. Effects of *Artemia* sp. with essential fatty acids on functional and morfological aspects of the digestive system in *Acipenser gueldenstaedtii* larvae / Kamaszewski M. et al. // *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*. 2014. Vol. 14. P. 1—2.
12. Protein measurement with the folin phenol reagent / Lowry O. H. et al. // *The Journal of Biological Chemistry*. 1951. Vol. 193. P. 265—275.
13. Hoseinifar S. H., Mirvaghefi A., Merrifield D. L. The effects of dietary inactive brewer's yeast *Saccharomyces cerevisiae* var. *ellipsoideus* on the growth, physiological responses and gut microbiota of juvenile beluga (*Huso huso*) // *Aquaculture*. 2011. Vol. 318, iss. 1—2. P. 90—94.

REFERENCES

1. Symon, M. Yu. (2015). Osoblyvosti perekhodu rannoi molodi osetrovkyh ryb (*Acipenseridae*) na hodivliu shtuchnykh kormamy v UZV (ohliad). *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1(35), 106-126.
2. Symon, M. Yu. (2016). Osoblyvosti travlennia osetrovkyh vydiv ryb (*Acipenseridae*) (Ohliad). *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 3(37), 123-144.
3. Symon, M. Yu. (2015). Vykorystannia kormovykh drizhdzhiv u hodivli osetrovkyh vydiv ryb (*Acipenseridae*) (Ohliad). *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4(34), 100-126.
4. Rasha, M. R., Khaled, M. S., Rania, M. & El-Araby, I. E. (2018). Effect of dietary nucleotide on antioxidant activity, non-specific immunity, intestinal cytokines, and disease resistance in Nile Tilapia. *Fish & Shellfish Immunology*, 80, 281–290.
5. Nguyen, H. Da, C. T. Lundh T., Lan, T. T. & Kiessling, A. (2018). Comparative evaluation of Brewer's yeast as a replacement for fishmeal in diets for tilapia (*Oreochromis niloticus*), reared in clear water or biofloc environments. *Aquaculture*, 495, 654—660.
6. Yu, H. H., Han, F., Xue, M., Wang, J., Tacon, P., Zheng, Y. H., Wu, X. F. & Zhang, Y. J. (2014). Efficacy and tolerance of yeast cell wall as an immunostimulant in the diet of Japanese seabass (*Lateolabrax japonicus*). *Aquaculture*, 432, 217—224.
7. Mapelli, V., Hillestrom, P. R., Kapolna, E., Larsen, E. H. & Olsson, L. (2011). Metabolic and bioprocess engineering for production of selenized yeast increased content of seleno-methylselenocysteine. *Metabolic Engineering*, 13, 282—293.
8. Zubkova, E. B. (2001). Optimizacija sostava kombikormov dlja osetrovkyh ryb s ispol'zovaniem vitazara i belkovykh gidrolizatov. *Extended abstract of candidate's thesis*. Astrahan'.
9. Maslennikov, R. V. (2015). Vlijanie jodirovannykh drozhzhej na rost, razvitie i tovarnye kachestva lenskogo osetra pri vyrashhivanii v sadkah. *Extended abstract of candidate's thesis*. Saratov.
10. Jing, Foo A. & Bais, R. (1998). Amylase measurement with 2-chloro-4-nitrophenyl maltotrioxide as substrate. *Clinica Chimica Acta*, 272, 137—147.
11. Kamaszewski, M., Ostaszewska, T., Prusinska, M., Kolman, R., Chojanacki, M., Zabytivskij, Yu., Jankowska, B. & Kasprzak, R. (2014). Effects of *Artemia* sp. with

- essential fatty acids on functional and morfological aspects of the digestive system in *Acipenser gueldenstaedtii* larvae. *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 14, 1—2.
12. Lowry, O. H., Rosebrough, N. J., Farr, A. L. & Randall, R. J. (1951). Protein measurement with the folin phenol reagent. *The Journal of Biological Chemistry*, 193, 265—275.
 13. Hoseinifar, S. H., Mirvaghefi, A. & Merrifield, D. L. (2011). The effects of dietary inactive brewer's yeast *Saccharomyces cerevisiae* var. *ellipsoideus* on the growth, physiological responses and gut microbiota of juvenile beluga (*Huso huso*). *Aquaculture*, 318, 90—94.

ВЛИЯНИЕ ИНАКТИВИРОВАННЫХ ПЕКАРСКИХ ДРОЖЖЕЙ НА ПОТЕНЦИАЛ РОСТА МОЛОДИ РУССКОГО ОСЕТРА *ACIPENSER GUELDENSTAEDTII* (BRANDT)

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
Ю. М. Забытиский, yurafish@ukr.net, Львовская опытная станция ИРХ НААН,
 пгт Великий Любень

И. И. Грициняк, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Осуществить анализ воздействия различных концентраций инактивированных пекарских дрожжей на темпы роста молоди русского осетра и связанные с этим метаболические процессы для установления оптимальных концентраций, которые могли бы быть использованы в составе стартовых кормов, при выращивании вышеупомянутых рыб в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ).

Методика. Для достижения цели работы были использованы классические ихтиологические и биохимические методы исследований. Так, на протяжении эксперимента регулярно проводили промеры массы рыб, вычисляли смертность, отбирали пробы тканей для дальнейшей оценки физиолого-биохимического статуса организма. Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики с помощью стандартного пакета Microsoft Office Excel.

Результаты. Продемонстрировано влияние различных концентраций пекарских дрожжей в составе стартовых кормов для русского осетра на показатели его роста и выживаемости. В частности установлено, что их концентрация объемом 5% от рациона в течение двух недель после перехода на экзогенное питание является оптимальной.

Научная новизна. Впервые осуществлен анализ влияния различных концентраций инактивированных пекарских дрожжей в составе рациона молоди русского осетра на потенциал роста последнего.

Практическая значимость. Доказано, что инактивированные пекарские дрожжи целесообразно вводить в стартовые корма для русского осетра, поскольку они оказывают положительное влияние на его пищеварительную систему и стимулируют темпы роста.

Ключевые слова: молодь русского осетра, инактивированные пекарские дрожжи, потенциал роста, стартовые корма для рыб.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 112-117

DOI: 10.15407/fsu2018.03.112

УДК 016:[597.554.3:639.371.5]

Received 03.06.18

Received in revised form 17.06.18

Accepted 15.07.18

ВИРЕЗУБ *RUTILUS FRISII FRISII* (NORDMANN). ТЕМАТИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

І. Й. Грициняк, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Т. М. Швець, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Підготовка довідкового переліку україно- та російськомовних публікацій з питань вивчення еколого-біологічних характеристик та шляхів відновлення чисельності зникаючого виду риб з родини коропових іхтіофауни України — вирезуба *Rutilus frisii frisii* Nordmann.

Методика. Під час системного пошуку у процесі формування тематичного переліку було застосовано як цілісний, так і вибірковий методи. Бібліографічне ядро складало виключно україно- та російськомовні наукові видання, присутні у фонді наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 37 джерел, що охоплюють часовий інтервал з 1931 по 2017 рр., та присвячені питанням дослідження географічного поширення, морфо-екологічних характеристик, біологічних особливостей різних стадій розвитку, а також специфіки відтворення й технологій ставового та індустріального вирощування червонокнижного виду риб — вирезуба — в контексті збереження біорізноманіття. Крім того, до переліку включено публікації, які стосуються проблем реституції даного виду у басейнах річок. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Підготовлений список публікацій може бути використаний науковцями, практиками, студентами, до сфери інтересів яких належать питання дослідження біології, а також проблеми відновлення та збереження вирезуба як зникаючого об'єкта іхтіофауни.

Ключові слова: вирезуб, червонокнижний вид, біологічні особливості, розведення, реституція.

BLACK SEA ROACH (VYREZUB) *RUTILUS FRISII FRISII* (NORDMANN). THEMATIC BIBLIOGRAPHY

Ir. Hrytsynyak, library@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

T. Shvets, library@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To create a thematic bibliographic list of publications on studies of ecological and biological characteristics of the Black Sea roach (vyrezub) *Rutilus frisii frisii* Nordman, as an endangered cyprinid species of the fish fauna of Ukraine.

Methods. The complete and selective methods were applied in the process of the systematic search. The bibliographic core has been formed with the publications exclusively in Ukrainian and

© І. Й. Грициняк, Т. М. Швець, 2018

Russian from the fund of the scientific library of the Institute of Fisheries NAAS of Ukraine.

Results. There was composed a thematic list of publications with a total quantity of 37 sources covering a time interval from 1931 to 2017 devoted to the questions on the study of the geographical distribution, morphological and ecological characteristics, biological features of different developmental stages, as well as the specifics of reproduction and technologies of pond and industrial rearing of a Red Book fish species, the Black Sea roach, in the context of biodiversity conservation. In addition, the list includes publications on problems of the restitution of this species in river basins.

The literary sources are arranged in alphabetical order by author or title, and described according to DSTU 8302:2015 "Information and documentation. Bibliographic reference. General principles and rules of composition", with the amendments (code UKND 01.140.40), as well as in accordance with the requirements of APA style — international standard of references.

Practical value. The list may be useful for scientists, practitioners, students, whose area of interests covers the questions of biological studies, and problems of the restoration and conservation of the Black Sea roach as an endangered object of fish fauna.

Key words: Black Sea roach, vyrezub, Red Book species, biological characteristics, rearing, restitution.

1. Алимов И. А. Выращивание вырезуба (*Rutilus frisii*) в рыбоводных прудах / И. А. Алимов // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2013. № 10. С. 26—30.
2. Амброз А. И. Вырезуб — *Rutilus frisii* Nordmann // Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепро-Бугского лимана. Киев : АН УССР, 1956. С. 98—106.
3. Аннотированный каталог круглоротых и рыб континентальных вод России. Москва : Наука, 1998. С. 69—70.
4. Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Ч. 1. Ленинград : Всесоюзный институт озерного и речного рыбного хозяйства, 1932. С. 327.
5. Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Ч. 2. Москва — Ленинград : АН СССР, 1949. С. 532—534.
6. Великохатко Ф. Д. Новые данные о распространении и биологии вырезуба *Rutilus frisii* Nordmann // Известия Ленинградского НИИ ихтиологии. 1931. Т. 12, вып. 1. С. 270—272.
7. Владимиров М. З. Раннее эмбриональное развитие и морфология нового межродового гибрида карповых рыб: самка вырезуба *Rutilus frisii* (Nordm.) и самец рыбка *Vimba vimba vimba* (L.) // Вопросы ихтиологии. 1978. Т. 18, № 5. С. 963—965.
8. Воспроизводство вырезуба в связи с сохранением биоразнообразия / Михеев В. П. и др. // Таврійський науковий вісник. 2011. Вип. 76. С. 242—247.
9. Вырезуб — *Rutilus frisii* (Nordmann) // Промысловые рыбы СССР. Москва : Пищепромиздат, 1949. С. 326—327.
10. Вырезуб (*Rutilus frisii* (Nordman)) // Красная книга Смоленской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. Смоленск : СГПИ, 1997. С. 104.
11. Дзюбан Н. А., Дудкин А. Д. Воспроизводство вырезуба // Рыбное хозяйство. 1952. № 1. С. 33—35.
12. Докучаев А. С. Выращивание маточного стада вырезуба в прудовых условиях для целей искусственного воспроизводства // Вклад молодых ученых в рыбохозяйственную науку России : Всерос. молодёжная конф., Санкт-Петербург, 12-14 окт. 2010 г. : тезисы докл. Санкт-Петербург : ГосНИОРХ, 2010. С. 47—49.
13. Жизнь животных. Т. 4, ч. 1 : Рыбы / ред. Т. С. Расс. Москва : Просвещение, 1971. С. 278—280.

14. Жуков П. И. Вырезуб (*Rutilus frisii* (Nordmann, 1840)) // Справочник по экологии пресноводных рыб. Минск : Наука и техника, 1988. С. 130—131.
15. Жуков П. И. Рыбы Белоруссии. Минск : Наука и техника, 1965. С. 171—172.
16. Иванчев В. П., Сарычев В. С., Иванчева Е. Ю. Миноги и рыбы бассейна Верхнего Дона. Рязань : Голос губернии, 2013. 275 с. (Труды Окского государственного природного биосферного заповедника ; вып. 28).
17. Козлов В. И. Справочник фермера-рыбовода. Москва : ВНИРО, 1998. С. 424—426.
18. Козлов В. И., Абрамович Л. С. Справочник рыбовода. Москва : Росагропромиздат, 1991. С. 195—198.
19. Костоусов В. Г., Корабельникова О. В., Худый А. И. О возможности реституции вырезуба *Rutilus frisii* (Nordman) в бассейне Верхнего Днепра // Актуальные проблемы зоологической науки в Беларуси : XI Зоологическая Международная науч.-практ. конф., 1-3 нояб. 2017 г., Минск : сборник статей. Т. 1. Минск : А.Н. Вараксин, 2017. С. 204—213.
20. Мовчан Ю. В. Вирезуб причорноморський — *Rutilus frisii* (Nordmann, 1840) // Риби України (визначник-довідник). Київ, 2001. С. 68—69.
21. Мовчан Ю. В., Смірнов А. І. Фауна України. Т. 8 : Риби. Вип. 2 : Коропів. Ч. 1. Київ : Наукова думка, 1981. С. 67—80.
22. Нетрадиційні об'єкти рибництва в аквакультурі України / Гринжевський М. В. та ін. Київ : Світ, 2001. С. 142—143.
23. Никольский Г. В. Частная ихтиология. Москва : Советская наука, 1950. С. 202—203.
24. Опалатенко Л. К. О морфологии и экологии вырезуба (*Rutilus frisii*) (*Pisces, Cyprinidae*) Верхнего Днестра // Вестник зоологии. 1978. № 4. С. 83—85.
25. Опыт воспроизводства вырезуба методами индустриального рыбоводства / Михеев В. П. и др. // Сбалансированное природопользование: современный взгляд, тенденции и перспективы : Междунар. науч.-практ. конф., Херсон, 17-19 мая 2010 г. : матер. Херсон : Колос, 2010. С. 55—57.
26. Разведение рыбы и раков / сост. Барышникова Т. Ростов-на-Дону : Респекс, 1999. С. 41—43.
27. Розведення та вирощування вирезуба і кутума // Галузевий збірник нормативно-технологічної документації з розведення та вирощування промислово-цінних риб. Київ : Укррибпроект, 2004. С. 249.
28. Рудик-Леуська Н. Я., Котовська Г. О., Христенко Д. С. Вирезуб // Атлас аборигенної іхтіофауни басейну р. Дніпро. Київ, 2011. С. 117—120.
29. Сироватська Н. І. Вирозуб *Rutilus frisii* (Nordmann). Харків : Видавництво Наркомпостачання УРСР, 1933. 80 с. (Праці Українск. філії Озівсько-Чорноморського інституту морського рибного господарства ; т. 7, вип.1).
30. Смирнова Е. Н. Морфо-экологические особенности развития вырезуба *Rutilus frisii* (Nordm.) // Труды Института морфологии животных им. А. Н. Северцова. 1957. Вып. 20. С. 95—120.
31. Смирнова Е. Н., Трушинская М. Б. Основные задачи по восстановлению и увеличению численности запасов вырезуба // Известия ГосНИОРХ. 1964. Т. 57. С. 69—76.
32. Худий О. І. Прояви статевого диморфізму в популяції вирезуба із Дністровського водосховища // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. Київ : Інститут рибного господарства НААН України; ДІА, 2011. С. 103—107.
33. Худий О. І., Ткебучава І. Б. Вирезуб причорноморський *Rutilus frisii* (Nordmann, 1840) у зоологічних колекціях Природничого музею

- Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : Х Міжнар. Іхтіол. наук.-практ. конф., Київ, 19-21 вер. 2017 р. : матер. Херсон : Грінь Д.С., 2017. С. 359—363.
34. Худий О. І., Худа Л. В., Цапок О. Л. Гістологічна характеристика яєчників статевозрілих самок туводної форми виразуба Дністровського водосховища // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : II Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., Канів, 16-19 вер. 2009 р. : тези. Севастополь : Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського, 2009. С. 165—167.
 35. Худий О. І., Худа Л. В., Цапок О. Л. Характеристика ростових процесів виразуба в умовах Дністровського водосховища // Доповіді Національної академії наук України. 2008. № 7. С. 175—178.
 36. Червона книга України. Тваринний світ / ред. Акімов І. А. Київ : Глобалконсалтинг, 2009. С. 319.
 37. *Rutilus frisii* (Nordman, 1840) — виразуб // Атлас пресноводных рыб России / ред. Решетников Ю. С. Т. 1. Москва : Наука, 2002. С. 317—319.

REFERENCES

1. Alimov, I. A. (2013). Vyrashchivanie vyrezuba (*Rutilus frisii*) v rybovodnykh prudakh. *Rybovodstvo i rybnoe khozyaystvo*, 10, 26-30.
2. Ambroz, A. I. (1956). Vyrezub - *Rutilus frisii* Nordmann. *Ryby Dnepra, Yuzhnogo Buga i Dneprovsko-Bugskogo limana*. Kiev: AN USSR, 98-106.
3. *Annotirovannyi katalog kruglorotykh i ryb kontinental'nykh vod Rossii* (1998). Moskva: Nauka, 69-70.
4. Berg, L. S. (1932). *Ryby presnykh vod SSSR i sopredel'nykh stran*. Ch. 1. Leningrad: Vsesoyuznyi institut ozernogo i rechnogo rybnogo khozyaystva, 327.
5. Berg, L. S. (1949). *Ryby presnykh vod SSSR i sopredel'nykh stran*. Ch. 2. Moskva - Leningrad: AN SSSR, 532-534.
6. Velikokhat'ko, F. D. (1931). Novye dannye o rasprostraneniі i biologii vyrezuba *Rutilus frisii* Nordmann. *Izvestiya Leningradskogo NII ikhtiologii*, 12(1), 270-272.
7. Vladimirov, M. Z. (1978). Rannee embrional'noe razvitiye i morfologiya novogo mezhrodovogo gibrida karpovykh ryb: samka vyrezuba *Rutilus frisii* (Nordm.) i samets rybtsa *Vimba vimba vimba* (L.). *Voprosy ikhtiologii*, 18(5), 963-965.
8. Mikheev, V. P., Mel'chenkov, E. A., Kalmykova, V. V., Mikheev, P. V., Myshkin, A. V., & Razhukov, R. S. (2011). Vospriizvodstvo vyrezuba v svyazi s sokhraneniem bioraznoobraziya. *Tavriys'kiy nauchiy visnik*, 76, 242-247.
9. Il'in, B. S. (Comp.) (1949). Vyrezub – *Rutilus frisii* (Nordmann). *Promyslovye ryby SSSR*. Moskva: Pishchepromizdat, 326-327.
10. Pastukhov, V. M. (1997). Vyrezub (*Rutilus frisii* (Nordman)). *Krasnaya kniga Smolenskoй oblasti. Redkie i nakhodyashchiesya pod ugrozoy ischeznoveniya vidy zhivotnykh i rasteniy*. Smolensk: SGPI, 104.
11. Dzyuban, N. A., & Dudkin, A. D. (1952). Vospriizvodstvo vyrezuba. *Rybnoe khozyaystvo*, 1, 33-35.
12. Dokuchaev, A. S. (2010). Vyrashchivanie matochnogo stada vyrezuba v prudovykh usloviyakh dlya tseley iskusstvennogo vospriizvodstva. *Vklad molodykh uchenykh v rybokhozyaystvennyuyu nauku Rossii: tezisy dokladov Vserossiyskoy molodezhnoy konferentsii, Sankt-Peterburg, 12-14 oktyabrya 2010 g.* Sankt-Peterburg: GosNIORKh, 47-49.
13. Rass, T. S. (Ed.). (1971). *Zhizn' zhivotnykh*. (Vol. 4, 1 – Ryby). Moskva: Prosveshchenie, 278-280.

14. Zhukov, P. I. (1988). Vyrezub (*Rutilus frisii* (Nordmann, 1840)). *Spravochnik po ekologii presnovodnykh ryb*. Minsk: Nauka i tekhnika, 130-131.
15. Zhukov, P. I. (1965). *Ryby Belorussii*. Minsk: Nauka i tekhnika, 171-172.
16. Ivanchev, V. P., Sarychev, V. S., & Ivancheva, E. Yu. (2013). *Minogi i ryby basseyna Verkhnego Dona: trudy Okskogo gosudarstvennogo prirodnogo biosfernogo zapovednika*. (Vol. 28). Ryazan': Golos gubernii.
17. Kozlov, V. I. (1998). *Spravochnik fermer-rybovoda*. Moskva: VNIRO, 424-426.
18. Kozlov, V. I., & Abramovich, L. S. (1991). *Spravochnik rybovoda*. Moskva: Rosagropromizdat, 195-198.
19. Kostousov, V. G., Korabel'nikova, O. V., & Khudyy, A. I. (2017). O vozmozhnosti restitutsii vyrezuba *Rutilus frisii* (Nordman) v basseyne Verkhnego Dnepra. *Aktual'nye problemy zoologicheskoy nauki v Belarusi: XI Zoologicheskaya Mezhdunarodnaya nauch.-prakt. konf., 1-3 noyab. 2017 g., Minsk: sbornik statey*. (Vol. 1). Minsk: A.N. Varaksin, 204-213.
20. Movchan, Yu. V. (2001). Vyrezub prychnomorskyi - *Rutilus frisii* (Nordmann, 1840). *Ryby Ukrainy (vyznachnyk-dovidnyk)*. Kyiv, 68-69.
21. Movchan, Yu. V., & Smirnov, A. I. (1981). *Fauna Ukrainy*. (Vol. 8, iss. 2, ch.1). Kyiv: Naukova dumka, 67-80.
22. Hrynzhhevskiy, M. V., et al. (2001). *Netradytsiini obiekty rybnytstva v akvakulturi Ukrainy*. Kyiv: Svit, 142-143.
23. Nikol'skiy, G. V. (1971). *Chastnaya ikhtiologiya*. Moskva: Sovetskaia nauka, 202-203.
24. Opalatenko, L. K. (1978). O morfologii i ekologii vyrezuba (*Rutilus frisii*) (*Pisces, Cyprinidae*) Verkhnego Dnestra. *Vestnik zoologii*, 4, 83-85.
25. Mikheev, V. P., Mel'chenkov, E. A., Myshkin, A. V., Razhukov, R. S., Kalmykova, V. V., & Mikheev, P. V. (2010). Opyt vosproizvodstva vyrezuba metodami industrial'nogo rybovodstva. *Sbalansirovannoe prirodopol'zovanie: sovremennyy vzglyad, tendentsii i perspektivy: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Kherson, 17-19 maya 2010 g.* Kherson: Kolos, 55-57.
26. Baryshnikova, T. (Comp.) (1999). *Razvedenie ryby i rakov*. Rostov-na-Donu: Respeks, 41-43.
27. Rozvedennia ta vyroshchuvannia vyrezuba i kutuma (2004). *Haluzevyi zbirnyk normatyvno-tekhnolohichnoi dokumentatsii z rozvedennia ta vyroshchuvannia promyslovo-tsinnykh ryb*. Kyiv: Ukrrybproekt, 249.
28. Rudyk-Leuska, N. Ya., Kotovska, H. O., & Khrystenko, D. S. (2011). Vyrezub. *Atlas aboryhennoi ikhtiofauny baseinu r. Dnipro*. Kyiv, 117-120.
29. Syrovatska, N. I. (1933). Vyrozub *Rutilus frisii* (Nordmann). *Pratsi Ukrainsk. filii Ozivsko-Chornomorskoho instytutu morskoho rybnoho hospodarstva*. (Vol. 7, iss.1). Kharkiv: Vydavnytstvo narkompostachannia URSR.
30. Smirnova, E. N. (1957). Morfo-ekologicheskie osobennosti razvitiya vyrezuba *Rutilus frisii* (Nordm.). *Trudy Instituta morfologii zhivotnykh im. A.N. Severtsova*, 20, 95-120.
31. Smirnova, E. N., & Trushinskaya, M. B. (1964). Osnovnye zadachi po vosstanovleniyu i uvelicheniyu chislennosti zapasov vyrezuba. *Izvestiya GosNIORKh*, 57, 69-76.
32. Khudyi, O. I. (2011). Proiavy statevoho dymorfizmu v populatsii vyrezuba iz Dnistrovskoho vodoskhovyshcha. *Zberezhennia henofondu ta vidnovlennia populatsii tsinnykh vydiv ryb: materialy mizhnarodnoi naukovoï konferentsii*. Kyiv: Instytut rybnoho hospodarstva NAAN Ukrainy, DIA, 103-107.
33. Khudyi, O. I., & Tkebuchava, I. B. (2017). Vyrezub prychnomorskyi *Rutilus frisii* (Nordmann, 1840) u zoolohichnykh kolektsiiakh Pryrodnychoho muzeiu

- Chernivetskoho natsionalnoho universytetu imeni Yurii Fedkovycha. *Suchasni problemy teoretychnoi i praktychnoi ikhtiologii: X Mizhnarodna ikhtiologichna naukovo-praktychna konferentsiia*, Kyiv, 19-21 veresnia 2017 roku: materialy. Kherson: Hrin D.S., 359-363.
34. Khudyi, O. I., Khuda, L. V., & Tsapok, O. L. (2009). Histologichna kharakterystyka yaiechnykh statevyrilykh samok tuvodnoi formy vyrezuba Dnistrovskoho vodoskhovyscha. *Suchasni problemy teoretychnoi ta praktychnoi ikhtiologii: tezy II Mizhnarodnoi ikhtiologichnoi naukovo-praktychnoi konferentsii*, Kaniv, 16-19 veresnia 2009 roku. Sevastopol: Instytut biolohii pivdennykh moriv im. O.O. Kovalevskoho, 165-167.
 35. Khudyi, O. I., Khuda, L. V., & Tsapok, O. L. (2008). Kharakterystyka rostovykh protsesiv vyrezuba v umovakh Dnistrovskoho vodoskhovyscha. *Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy*, 7, 175-178.
 36. Akimov, I. A. (2009). *Chervona kniga Ukrainy. Tvarinniy svit*. Kyiv: Globalkonsalting.
 37. Reshetnikova, Yu. S. (Ed.). (2002). *Rutilus frisii* (Nordman, 1840) – vyrezub. *Atlas presnovodnykh ryb Rossii*. (Vol. 1). Moskva: Nauka, 317-319.

ВЫРЕЗУБ *RUTILUS FRISII FRISII* (NORDMANN). ТЕМАТИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Ир. И. Грициняк, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, г. Київ
Т. М. Швець, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, г. Київ

Цель. Формирование справочного перечня украино- и русскоязычных публикаций по вопросам изучения эколого-биологических особенностей и путей восстановления численности исчезающего вида рыб семейства карповых ихтиофауны Украины — вырезуба *Rutilus frisii frisii* Nordmann.

Методика. В ходе системного поиска в процессе подготовки тематического перечня были применены как целостный, так и выборочный методы. Библиографическое ядро составляли исключительно украино- и русскоязычные научные издания, имеющиеся в фонде научной библиотеки Института рыбного хозяйства НААН Украины.

Результаты. Сформирован тематический библиографический перечень публикаций в количестве 37 источников, охватывающих временной интервал с 1931 по 2017 гг., и посвященных вопросам исследования географического распространения, морфо-экологических характеристик, биологических особенностей различных стадий развития, а также специфики воспроизводства и технологий прудового и индустриального выращивания краснокнижного вида рыб — вырезуба — в контексте сохранения биоразнообразия. Кроме того, перечень включает публикации, касающиеся проблем реституции указанного вида в бассейнах рек. Литературные источники размещены в алфавитном порядке по автору или названию, описаны согласно ДСТУ 8302:2015 «Інформація і документація. Бібліографічна посилка. Общі положення і правила складання», с учетом поправок (код УКНД 01.140.40), а также в соответствии с требованиями к оформлению списка литературы по международному стандарту APA style.

Практическая значимость. Подготовленный список публикаций может быть использован учеными, практиками, студентами, сфера интересов которых включает вопросы изучения особенностей биологии, а также проблемы воспроизводства и сохранения вырезуба как исчезающего объекта ихтиофауны.

Ключевые слова: вырезуб, краснокнижный вид, биологические особенности, разведение, реституция.

ЮВІЛЕЇ

ВЧЕНИЙ ІХТІОЛОГ-РИБОВОД.
ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

АНДРЮЩЕНКО АНТОНІНИ ІВАНІВНИ

Андрющенко Антоніна Іванівна народилася 6 липня 1943 р. в с. Вілине Петрівського району Ярославської області.

У 1967 р. закінчила з відзнакою біологічний факультет Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

З 1967 по 2002 рр. працювала в Інституті рибного господарства НААН, обіймаючи поступово посади від молодшого наукового співробітника до заступника директора Інституту з наукової роботи.

Поряд з науковою роботою з 1996 р. займається педагогічною діяльністю.

Після закінчення аспірантури при Інституті рибного господарства, Андрющенко А. І. в 1973 р. захистила дисертацію і здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук.

За результатами науково-педагогічної діяльності їй присуджено науковий звання старший науковий співробітник та доцент.

Має 212 наукових праць, з них 7 монографій у співавторстві, 5 підручників, 7 навчальних посібників (з грифами Міносвіти України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, рішень вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України), а також близько 30 навчально-методичних видань і довідників. Андрющенко А. І. підготувала близько 200 дипломників з освітнім ступенем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

За її керівництва захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Поряд з цим, Андрющенко А. І. була одним з основних розробників технології відтворення та акліматизації південноамериканських представників іхтіофауни родини чукучанових риб у внутрішніх водоймах України.

Активну участь брала вона у розпочатку робіт з питань розроблення технології вирощування товарних осетрових риб в умовах ставових та індустріальних рибних господарств України, а також в розробленні технології експлуатації нерестово-вирощувальних господарств.

За досягнуті успіхи в розвитку рибогосподарської науки та педагогічній діяльності Андрющенко А. І., як спеціаліст високої кваліфікації в галузі іхтіології і рибництва, нагороджена орденом «За заслуги» III-го ступеня, низкою відзнак, зокрема: «Ветеран рибного господарства», «Почесний працівник рибного господарства», «Відмінник освіти України», іншими державними та галузевими відзнаками.

Колектив Інституту рибного господарства НААН бажає ювілярці міцного здоров'я, щастя, добра та подальших успіхів у роботі.

І. І. Грициняк, директор Інституту рибного господарства НААН, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

О. О. Олексієнко, канд. с.-г. наук, с. н. с.

TAPAS – міжнародний дослідницький проект

Пропонуємо ознайомитись та долучитись до **TAPAS (Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability)**, що діє в межах програми Horizon 2020, з 2016 року. Його мета — консолідація стабільності європейської аквакультури шляхом розробки спеціальних підходів та умов, на основі всебічного аналізу всіх форм та типів ведення аквакультури, включно з марикультурою. Ключовою сферою діяльності є виявлення нормативних потреб існуючих й новітніх практик аквакультури. Більше інформації можна отримати відвідавши **сайт**: www.tapas-H2020.eu.

Координатор проекту: Trevor Telfer, University of Stirling.

ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ РИБ

В Інституті рибного господарства НААН працює **ПЛР-лабораторія, діяльність якої спрямована на діагностику інфекційних захворювань риб**. На сьогодні в арсеналі лабораторії є діагностикими для вірусних, бактеріальних та паразитарних захворювань, які, за даними Міжнародного Епізоотичного Бюро (OIE), є найбільш небезпечними для об'єктів сучасної аквакультури. При розробленні діагностичних тест-систем зверталась увага на тенденції розвитку вітчизняного рибництва та інфекційні агенти, які циркулюють в Україні або можуть проникнути у вітчизняні рибогосподарські підприємства із сусідніх країн.

Ми пропонуємо молекулярну діагностику вірусних захворювань коропових, лососевих, осетрових та інших видів риб.

Лососеві: вірус інфекційного панкреатичного некрозу IPNV; вірусна геморагічна септицемія VHSV; вірус інфекційного гемопоетичного некрозу IHNV.

Коропові: вірус весняної віремії SVCV; герпесвірус CyHV та KHV.

Осетрові: герпесвірус AcHV; іридовірус AcIV; аденовірус AcAdV.

Іctalурові: герпесвірус каналного сома CCV.

Для бактеріальних хвороб риб підібрані тест-системи для діагностики фурункульозу форелі (*Aeromonas salmonicida*), геморагічної септицемії (*Aeromonas hydrophila*), хвороби нирок лососевих (BKD) (*Renibacterium salmoninarum*), ентеричної хвороби «червоного рота» (*Yersinia ruckeri*), флавобактеріозу (*Flavobacterium columnarae* і *Flavobacterium psychrophila* (BCWD) та септицемії сома (*Edwardsiella ictaluri*).

Присутні також тест-системи ідентифікації ендопаразитів *Tetracapsuloides bryosalmonae* (проліферативна хвороба нирок) та *Myxobolus cerebralis*, що інфікують райдужну форель.

Для отримання додаткової інформації можна звертатися за адресою:

Інститут рибного господарства НААН, вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164.
Лабораторія біотехнологій у рибництві.

Завідувач лабораторії: к.б.н., с.н.с. Рудь Юрій Петрович.

Тел. (097) 953-80-80 або e-mail: rudziknew@ukr.net.

FISHERIES SCIENCE OF UKRAINE

"Fisheries Science of Ukraine" — a scientific journal, has been published in Ukraine since 2007. "Fisheries Science of Ukraine" included in the List of Specialized Publications of Ukraine, which can be used for publishing results of doctor's and candidate's thesis (biological and agricultural sciences), was approved in 08.07.2009, recertification of 06.11.2014 (Ministry of Education and Science of Ukraine №1279)

Founder and publisher of the journal — Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

State registration certificate KB № 20934-10734 PR of 18.08.2014

EDITOR-IN-CHIEF

Leonid Buchatskyi, Doctor of Sciences, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Leading Research Scientist of the Laboratory of Biotechnologies in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF

Ihor Hrytsyniak, Doctor of Sciences, Professor, Academician of the NAAS of Ukraine, Director, Institute of Fisheries of the NAAS
Natalia Kolesnyk, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of International Scientific and Technical Cooperation and Intellectual Property, Institute of Fisheries of the NAAS

EDITORIAL BOARD

BIOLOGICAL SCIENCES

Boris Gomelsky, Doctor of Biological Sciences, Professor, Kentucky State University, UNITED STATES OF AMERICA

Daniel Patrick, Doctor of Biological Sciences, Head of Biology Department Laboratories of the Pyrenees and Landes, FRENCH REPUBLIC

Gautam V. Zodape, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Zoology of Shivaji University Kolhapur, REPUBLIC OF INDIA

Ihor Buzevych, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Vasyl Sondak, Doctor of Sciences, Head of "Water Bioresources", National University of Water Management and Natural Resources, UKRAINE

Yuriy Rud', PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Bio-technology in Aquaculture of the Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Oleksandr Potrokhov, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Biology of reproduction of fish, Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, UKRAINE

Oleksandr Tretiak, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Deputy Director in scientific works, Institute of Fisheries of the NAAS

Valentyna Solomatina, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Leading research scientist of the department of feeds and fish feeding, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

AGRICULTURAL SCIENCES

XU Pao, Doctor, Professor, Director of Freshwater Fisheries Research Center, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Jedrzep Krupinski, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director, National Research Institute of Animal Production, POLAND

Mykhailo Efymenko, Doctor of Sciences, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head Research Scientist, Institute of Animal Breeding and Genetics of the NAAS, UKRAINE

Serhiy Tarasiuk, Doctor of Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head of the Molecular-Genetic Research Department, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Vitaliy Bekh, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Fish Selection, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Isaak Sherman, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Aquaculture Department, Kherson State Agrarian University, UKRAINE

Natalia Matvienko, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Ichthyopathology of the Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Oleksandr Kostenko, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Veterinary Medicine and Zootechnics Department, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, UKRAINE

SCIENTIFIC EDITORS OF SECTIONS

are staff employees of the Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine: **Natalia Tushnytska**, PhD, Senior Research Scientist, Scientific Secretary of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Deren**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Feeds and Fish Feeding of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yaroslav Tuchapskyi**, PhD, Head of the Carp Breeding Laboratory of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Zaloilo**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Molecular-Genetic Studies of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Zabytivskyi**, PhD, Senior Research Scientist of Section of Sturgeon of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Antonina Mruk**, Head of the Laboratory Salmonids Culture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Tetiana Hryhorenko**, PhD, Head of the Laboratory of Hydrobiology and Technology of Invertebrates Cultivation of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Oleksandr Didenko**, PhD, Senior Research Scientist of the Department of Study Reservoirs Bioresources of the Institute of Fisheries of the NAAS.

Editorial board of the Journal "Fisheries Science of Ukraine", Institute of Fisheries NAAS, 135, Obukhivska St, Kiev-164, Ukraine, 03164; tel.: +38 (044) 223-84-34; tel/fax: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Layout design: Natalia Kolesnik, Serhiy Shinkar, Yevheniy Arkhanhelskyi, Oleksandr Bezusyi; **Making-up:** Yevheniy Arkhanhelskyi, Maria Simon; **Literature editing:** Tetiana Shvets; **Corrector:** Hanna Kovalchuk

ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НААН
вул. Обухівська, 135 м. Київ-164, 03164, Україна
тел./факс: +38(044) 423-74-62, тел.: +38(044) 423-74-65

<http://fsu.ua>

info@fsu.ua