ISSN 2312-9581 (Online)

ISSN 2075-1508 (Print)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

4 / 2018

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські науки), переатестація від 06.11.2014 (наказ Міністерства освіти і науки України №1279)

Засновник та видавник — Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20934-10734 ПР від 18.08.2014

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

БУЧАЦЬКИЙ Леонід Петрович, доктор біол. наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), провідний науковий співробітник лабораторії біотехнологій в рибицтві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ГРИЦІНЯК Ігор Іванович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, директор Інституту рибного господарства НААН
КОЛЕСНИК Наталія Леонідівна, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності, Інститут рибного господарства НААН

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Гомельський Борис, доктор біол. наук, професор, Державний Університет Кентуккі, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Патрік Даніель, доктор біол. наук, Голова департаменту біології Лабораторії Піренеїв, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА
Зодапе Гаутам В., доктор біол. наук, професор, декан факультету зоології Державного Університету Шиваджи в Колхапурі, РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ
Бузевич Ігор Юрійович, доктор біол. наук, с.н.с., завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА
Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, зав. кафедрою водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА
Рудь Юрій Петрович, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії біотехнологій в рибицтві ІРГ НААН, УКРАЇНА
Потрохов Олександр Спиридонович, доктор біол. наук, с.н.с., керівник лабораторії біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, УКРАЇНА
Третяк Олександр Михайлович, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН
Соломатіна Валентина Дмитрівна, доктор біол. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник відділу кормів та годівлі риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Ху Пао, доктор наук, професор, директор Центру прісноводного рибного господарства, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
Крупінські Єджей, доктор наук, професор, іноземний член Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут зоотехнії Польщі, ПОЛЬЩА
Єфименко Михайло Якович, доктор с.-г. наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник, Інститут розведення і генетики тварин НААН, УКРАЇНА
Тарасюк Сергій Іванович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, зав. відділу молекулярно-генетичних досліджень, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА
Бех Віталій Валерійович, доктор с.-г. наук, професор, зав. відділу селекції риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА
Шерман Ісаак Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедри рибицтва, Херсонський державний аграрний університет, Україна
Матвієнко Наталія Миколаївна, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу іхтіопатології ІРГ НААН, УКРАЇНА
Костенко Олександр Іванович, канд. с.-г. наук, с.н.с., нач. відділу ветеринарної медицини та зоотехнії, Національна академія аграрних наук України, УКРАЇНА

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

є штатними працівниками Інституту рибного господарства НААН України: **Тушницька Наталія Йосифівна**, канд. ветерин. наук, с.н.с., вчений секретар ІРГ НААН; **Дерень Ольга Володимирівна**, канд. с.-г. наук, с.н.с., зав. лабораторії кормів і годівлі риб ІРГ НААН; **Тучапський Ярослав Васильович**, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу селекції риб ІРГ НААН; **Заліло Ольга Василівна**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ІРГ НААН; **Забитівський Юрій Михайлович**, канд. біол. наук, старший науковий співробітник сектору осетрівництва ІРГ НААН; **Мрук Антоніна Іванівна**, зав. лабораторії лососівництва ІРГ НААН; **Григоренко Тетяна Володимирівна**, канд. с.-г. наук, зав. лабораторії гідробіології та технологій культивування цінних безхребетних ІРГ НААН; **Діденко Олександр Володимирович**, канд. біол. наук, с.н.с., старший науковий співробітник відділу вивчення біоресурсів водосховищ.

Редакція журналу «Рибогосподарська наука України», вул. Обухівська, 135, м. Київ-164, 03164

тел.: +38 (044) 223-84-34, тел./факс: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Підписано до друку 17.12.2018 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 7,1. Наклад 500 прим.

Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту рибного господарства НААН

(Протокол № 8 від 17.12.2018 р.)

Дизайн макету: Колесник Н. Л., Шинкар С. В., Архангельський Є. Ю., Безусий О. Л. **Верстка:** Архангельський Є. Ю., Симон М. Ю. **Літературне редагування:** Швець Т. М. **Коректор:** Ковальчук Г. В.

Друкарня ТОВ «ПРО ФОРМАТ», 02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 45 Б, оф.16, тел.: +38(044) 353-85-58

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

4/2018(46)

Заснований у 2007 р.
Виходить 4 рази на рік

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 1-128
DOI: 10.15407/fsu2018.04

З М І С Т

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 5-14
DOI: 10.15407/fsu2018.04.005

О. М. Маренков, В. О. Курченко

Гістоморфологічний аналіз ооцитів карася сріблястого
(*Carassius gibelio* Bloch, 1782) в умовах Запорізького
(Дніпровського) водосховища 5

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 15-25
DOI: 10.15407/fsu2018.04.015

І. О. Кошовий, А. В. Подобайло, А. І. Шустов

Видове багатство та видове різноманіття риб р. Удай в межах
НПП «Пирятинський» 15

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 26-48
DOI: 10.15407/fsu2018.04.026

Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон, О. М. Маренков, Т. С. Шарамок

Червоний каліфорнійський черв'як (*Eisenia foetida andrei*) —
цінний кормовий об'єкт у рибництві (огляд) 26

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 49-56
DOI: 10.15407/fsu2018.04.049

*О. О. Олексієнко, І. І. Грициняк, В. П. Оборський, В. В. Бех,
Б. О. Ганкевич*

Оцінка репродуктивних показників коропа (*Cyprinus carpio* Linnaeus,
1758) ПАТ «Хмельницькрибгосп» 49

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 57-67
DOI: 10.15407/fsu2018.04.057

О. О. Батуревич, О. В. Дерень, Г. В. Качай

Ефективність введення сапоніту та анальциму до складу раціону
дволіток коропа (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) 57

© Інститут рибного господарства НААН України, 2018

ЕКОНОМІКА

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 68-78

DOI: 10.15407/fsu2018.04.068

*М. М. Пашко, О. М. Третяк*Економічна ефективність штучного отримання овульованої ікри стерляді (*Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758) з комбінованим використанням індустриальних технологій 68**КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ**

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 79-101

DOI: 10.15407/fsu2018.04.079

І. Й. Грициняк, Т. М. Швець

Кріоконсервація статевих продуктів риб. Тематична бібліографія 79

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 102-123

DOI: 10.15407/fsu2018.04.102

*М. Ю. Симон*Молекулярно-генетичні дослідження риб родини осетрових (*Acipenseridae*). Тематична англomовна бібліографія 102**ЮВІЛЕЇ**

Видатний вчений-біолог. До 75-річчя від дня народження Бучацького Леоніда Петровича 124

До 80-річчя з дня народження Думік Ольги Михайлівни 126

СОДЕРЖАНИЕ

БИОРЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ ВОДОЕМОВ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 5-14
DOI: 10.15407/fsu2018.04.005

О. Н. Маренков, В. А. Курченко

Гистоморфологический анализ ооцитов караса серебряного (*Carassius gibelio* Bloch, 1782) в условиях Запорожского (Днепроовского) водохранилища 5

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 15-25
DOI: 10.15407/fsu2018.04.015

И. А. Кошевой, А. В. Подобайло, А. И. Шустов

Видовое богатство и видовое разнообразие рыб в пределах НПП «Пирятинский» 15

ТЕХНОЛОГИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 26-48
DOI: 10.15407/fsu2018.04.026

Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон, А. Н. Маренков, Т. С. Шарамок

Красный калифорнийский червь (*Eisenia foetida andrei*) — ценный кормовой объект в рыбоводстве (обзор) 26

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 49-56
DOI: 10.15407/fsu2018.04.049

А. А. Алексеенко, И. И. Грициняк, В. П. Оборский, В. В. Бех, Б. А. Ганкевич
Оценка репродуктивных показателей карпа (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758)

ПАО «Хмельницкрийбхоз» 49

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 57-67
DOI: 10.15407/fsu2018.04.057

О. А. Батуревич, О. В. Дерень, Г. В. Качай

Эффективность введения сапонита и анальцима в состав рациона двухлетков карпа (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) 57

ЭКОНОМИКА

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 68-78
DOI: 10.15407/fsu2018.04.068

М. М. Пауко, А. М. Третьяк

Экономическая эффективность искусственного получения овулированной икры стерляди (*Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758) с комбинированным использованием промышленных технологий 68

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 79-101
DOI: 10.15407/fsu2018.04.079

Ир. И. Грициняк, Т. М. Швец

Криоконсервация половых продуктов рыб. Тематическая библиография 79

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 102-123
DOI: 10.15407/fsu2018.04.102

М. Ю. Симон

Молекулярно-генетические исследования рыб семейства осетровых (*Acipenseridae*). Тематическая англоязычная библиография 102

ЮБИЛЕИ

Выдающийся ученый-биолог. К 75-летию со дня рождения Бучацкого Леонида Петровича 124

К 80-летию со дня рождения Думик Ольги Михайловны 126

CONTENTS

BIORESOURCES AND ECOLOGY OF WATER BODIES

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 5-14
DOI: 10.15407/fsu2018.04.005

O. Marenkov, V. Kurchenko

Histological and morphological analysis of oocytes of the Prussian carp (*Carassius gibelio* Bloch, 1782) under the conditions of the Zaporizhzhia (Dnipro) reservoir 5

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 15-25
DOI: 10.15407/fsu2018.04.015

I. Koshovyi, A. Podobailo, A. Shustov

Fish species richness and species diversity in the Uday river within the national nature park «Pyryatynsky» 15

TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 26-48
DOI: 10.15407/fsu2018.04.026

N. Kolesnyk, M. Simon, O. Marenkov, T. Sharamok

Red Californian earthworm (*Eisenia foetida andrei*) as a valuable food item in fish farming (review) 26

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 49-56
DOI: 10.15407/fsu2018.04.049

O. Oleksiienko, I. Hrytsyniak, V. Oborskiy, V. Bekh, B. Hankevych

Evaluation of the reproductive indexes of carp (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) at the PJSC «Khmelnyskrybhosp» 49

PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 57-67
DOI: 10.15407/fsu2018.04.057

O. Baturevych, O. Deren, G. Kachai

Efficiency of the supplementation of age-2 carp (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) diet with saponite and analcime 57

ECONOMICS

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 68-78
DOI: 10.15407/fsu2018.04.068

M. Pashko, O. Tretiak

Economic efficiency of the artificial production of ovulated sterlet (*Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758) eggs with the combined use of industrial technologies 68

CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 79-101
DOI: 10.15407/fsu2018.04.079

Ir. Hrytsyniak, T. Shvets

Cryopreservation of fish germ cells. Thematic bibliography 79

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 102-123
DOI: 10.15407/fsu2018.04.102

M. Simon

Molecular-genetic investigations of sturgeon (*Acipenseridae*). Thematic English language bibliography 102

ANNIVERSARIES

An outstanding biologist. On the 75th anniversary of Butchatskyi Leonid Petrovich 124

On the 80th anniversary of Dumik Olga Mikhailivna 126

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 5-14

DOI: 10.15407/fsu2018.04.005

УДК 597-18:597.554.3(282.247.326.8)

Received 21.08.18

Received in revised form 15.09.18

Accepted 25.10.18

ГІСТОМОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ООЦИТІВ КАРАСЯ СРІБЛЯСТОГО (*CARASSIUS GIBELIO* BLOCH, 1782) В УМОВАХ ЗАПОРІЗЬКОГО (ДНІПРОВСЬКОГО) ВОДОСХОВИЩА

О. М. Маренков, gidrobions@gmail.com, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

В. О. Курченко, kurchenko.viktoriiia.3@gmail.com, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Мета. Провести гістоморфологічний аналіз ікри карася сріблястого в умовах Запорізького (Дніпровського) водосховища.

Методика. Дослідження проводили на двох контрольно-спостережних пунктах, розташованих у Самарській затоці та нижній частині Запорізького (Дніпровського) водосховища. Лов здійснювали стандартними ставними сітками з кроком вічка 30–120 мм. Об'єктом дослідження був карась сріблястий. Біологічний аналіз риб проводили згідно з класичними методиками в іхтіології. Для дослідження плодючості риб яєчники у самиць відбирали на IV стадії зрілості. Стадію зрілості гонад визначали візуально. Індивідуальну абсолютну плодючість визначали ваговим методом. Для дослідження репродуктивного потенціалу та особливостей відтворення риб яєчники у самиць відбирали на різних стадіях зрілості. Проби фіксували у розчині Буена з подальшою обробкою згідно із загальноприйнятими гістологічними методами. Для виготовлення зрізів використовували мікромом «Thermo scientific microm HM 325». Зрізи фарбували за допомогою гематоксилін-еозину та за Маллорі. Фотографії препаратів робили за допомогою цифрової камери «Sciencelab T500 5.17M», яка підключалась до мікроскопа «MICROmed XS-2610». Під час опису періодів та фаз росту та розвитку статевих клітин, стадій зрілості яєчників використовували позначення та терміни, прийняті в іхтіологічних дослідженнях. Статистичну обробку матеріалу проводили за допомогою комп'ютерної програми «STATISTICA 6.0».

Результати. Будова ооцитів сріблястого карася подібна за будовою до ооцитів сазана: у них немає жирової краплі, є широка радіальнопокреслена оболонка і мікропіле. Для карася характерний асинхронний трофоплазматичний ріст ооцитів і порційне ікриметання. Встановлено, що при порційному нересті у першій порції ікри карася містилося близько 60% всіх ікринок, у другій та наступних порціях — решта 40%. Абсолютна плодючість карася коливалась в межах від 10,51 до 189,95 тис. ікринок. Середній показник плодючості за всіма віковими групами склав $80,28 \pm 16,55$ тис. ікринок. У нерестовому стадії частка самок складала 55%, самців — 45%. Коефіцієнт промислового повернення від ікри становив 0,005 %.

Наукова новизна. Вперше проведено гістоморфологічний аналіз ікри карася сріблястого в умовах Запорізького (Дніпровського) водосховища.

Практична значимість. Дослідження статевих залоз риб має вагоме прикладне значення при вирішенні питань промислового рибальства та екологічного моніторингу.

Ключові слова: карась сріблястий, стадії дозрівання ікри, ооцити, Запорізьке (Дніпровське) водосховище.

© О. М. Маренков, В. О. Курченко, 2018

HISTOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF OOCYTES OF THE PRUSSIAN CARP (*CARASSIUS GIBELIO* BLOCH, 1782) UNDER THE CONDITIONS OF THE ZAPORIZHZHIA (DNIPRO) RESERVOIR

O. Marenkov, gidrobions@gmail.com, Oles Honchar Dnipro National University,
Dnipro

V. Kurchenko, kurchenko.viktoriiia.3@gmail.com, Oles Honchar Dnipro National
University, Dnipro

Purpose. To conduct histomorphological analysis of the Prussian carp eggs under the conditions of Zaporizhzhia (Dnipro) reservoir.

Methods. The research was carried out at two observation stations located in the Samara Bay and the lower part of the Zaporizhzhia (Dnipro) Reservoir. The catches were carried out by standard gill nets with 30-120 mm mesh sizes. The object of the study was Prussian carp. The biological analysis of fish was carried out in accordance with the classical methods in ichthyology. For studying the fertility of fish, ovaries from females were taken at the stage IV of maturity. The stage of gonad maturity was determined visually. Individual absolute fertility was determined by the weighting method. To study the reproductive potential and features of fish reproduction, ovaries were taken from females at different stages of maturity. Samples were preserved in Bouin solution and further processed according to generally accepted histological methods. For the preparation of sections, a "Thermo scientific microm HM 325" microtome was used. The sections were stained with hematoxylin-eosin and by Mallory method. Images of preparations were made using a "Sciencelab T500 5.17M" digital camera, connected to a "MICROMED XS-2610" microscope. During the description of the periods and phases of growth and development of gonads, stages of ovarian maturity, we used standard ichthyological definitions and terms. Statistical processing was carried out using the STATISTICA 6.0 software.

Findings. The structure of the oocytes of Prussian carp is similar to that of common carp: they do not have a fatty drop, there is a wide radially-shaped membrane and a micropyle. The Prussian carp is characterized by asynchronous trophoplasmic growth of oocytes and intermittent spawning. It has been determined that if the spawning is intermittent, the first portion of eggs contained about 60% of all eggs, and the second and subsequent portions the remaining 40%. The absolute fertility of the Prussian carp ranged from 10.51 to 189.95 thousand eggs. The average fertility index in all age groups was 80.28 ± 16.55 thousand eggs. In spawning population, the proportion of females was 55%, males – 45%. The yield to the fishery from eggs was 0.005%.

Scientific novelty. For the first time histomorphological analysis of Prussian carps under the conditions of Zaporizhzhia (Dnipro) reservoir was conducted.

Practical significance. The study of fish gonads has a significant applied importance for resolving the issues of commercial fishery and ecological monitoring.

Key words: Prussian carp, egg maturation stages, oocytes, Zaporizhzhia (Dnipro) reservoir.

ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ООЦИТОВ КАРАСЯ СЕРЕБРЯНОГО (*CARASSIUS GIBELIO* BLOCH, 1782) В УСЛОВИЯХ ЗАПОРОВСКОГО (ДНЕПРОВСКОГО) ВОДОХРАНИЛИЩА

О. Н. Маренков, gidrobions@gmail.com, Днепропетровский национальный университет
имени Олеса Гончара, г. Днепр

В. А. Курченко, kurchenko.viktoriiia.3@gmail.com, Днепропетровский национальный
университет имени Олеса Гончара, г. Днепр

Цель. Провести гистоморфологический анализ икры карася серебряного в условиях Запорожского (Днепропетровского) водохранилища.

Методика. Исследования проводили на двух контрольно-наблюдательных пунктах, которые располагаются в Самарском заливе и нижнем участке Запорожского (Днепровского) водохранилища. Лов осуществляли стандартными ставными сетями с шагом ячеи 30–120 мм. Объектом исследования был карась серебряный. Биологический анализ рыб проводили согласно классических методик в ихтиологии. Для исследования плодовитости рыб, яичники у самок отбирали на IV стадии зрелости. Стадию зрелости гонад определяли визуально. Индивидуальную абсолютную плодовитость определяли весовым методом. Для исследования репродуктивного потенциала и особенностей воспроизводства рыб яичники у самок отбирали на разных стадиях зрелости. Пробы фиксировали в растворе Буэна с дальнейшей обработкой согласно общепринятых гистологических методов. Для изготовления срезов использовали микротом «Thermo scientific microm HM 325». Срезы красили с помощью гематоксилин-эозина и по Маллори. Фотографии препаратов делали с помощью цифровой камеры «Sciencelab T500 5.17M», которая подключалась к микроскопу «MICROmed XS-2610». Во время описания периодов и фаз роста и развития половых клеток, стадий зрелости яичников, использовали обозначения и термины, принятые в ихтиологических исследованиях. Статистическую обработку материала проводили с помощью компьютерной программы STATISTICA 6.0.

Результаты. Строение ооцитов серебряного карася подобно с строением ооцитов сазана: у них нет жировой капли, есть широкая радиальноисчерченная оболочка и микропиле. Для карася характерен асинхронный трофоплазматический рост ооцитов и порционное икрометание. Определено, что при порционном нересте в первой порции икры карася содержалось около 60% всех икринок, во второй и следующих порциях — остальные 40%. Абсолютная плодовитость карася колебалась в пределах от 10,51 до 189,95 тыс. икринок. Средний показатель плодовитости за всеми возрастными группами составляет $80,28 \pm 16,55$ тыс. икринок. В нерестовом стаде часть самок составляла 55%, самцов — 45%. Коэффициент промышленного возврата от икры составлял 0,005 %.

Научная новизна. Впервые проведен гистоморфологический анализ икры карася серебряного в условиях Запорожского (Днепровского) водохранилища.

Практическое значение. Исследование половых желез рыб имеет большое прикладное значение при решении вопросов промыслового рыболовства и экологического мониторинга.

Ключевые слова: карась серебряный, стадии созревания икры, ооциты, Запорожское (Днепровское) водохранилище.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Розвиток статевих клітин у гонадах риби — тривалий та складний процес, нормальний хід якого залежить від цілої низки зовнішніх та внутрішніх чинників. Так, абіотичні та біотичні чинники, які у ряді випадків тісно пов'язані, а то й обумовлені антропогенним впливом, за певних умов можуть мати велике значення. При цьому важливими є вікові особливості, роль термічного режиму та забезпечення риби кормовою базою, у результаті чого розвиток статевих клітин може прискоритися або, навпаки, в деяких випадках навіть зупинитися [1]. Дослідження статевих залоз риби являє не лише теоретичний інтерес, але й має вагомий прикладний значення при вирішенні питань промислового рибальства та екологічного моніторингу.

Останні дослідження репродуктивних показників риби також свідчать про певні порушення у формуванні статевих продуктів та плодючості цінних промислових видів, які мешкають у зонах постійного екологічного напруження [2–4].

Карась сріблястий *Carassius gibelio* (Bloch, 1782) — вид-вселенець, що є провідним промисловим видом у Запорізькому (Дніпровському) водосховищі. Аналіз даних літератури показав, що екологія розмноження карася сріблястого досліджена не в повному обсязі, тому потребує більш ретельного дослідження та аналізу [5, 6].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

В 2017 р. в Запорізькому (Дніпровському) водосховищі вилов карася сріблястого сягнув 54% від загальних сіткових уловів риби. За останні 15 років промисловий вилов карася зріс з 30 до 512 т/рік. Також карась — важливий об'єкт аматорського та спортивного рибальства, і дає підстави вважати, що фактичні обсяги його вилучення з водосховища значно вищі.

У результаті гідробудівництва та зарегулювання стоку річок велика частина водойм стали малопроточними. Така зміна гідрологічного режиму позитивно позначилася на чисельності та відтворенні лімnofільного сріблястого карася, який на сьогоднішній день нарощує чисельність популяції, витісняє аборигенного золотого карася і є харчовим конкурентом цінних промислових видів риби — сазана, ляща.

Таким чином, метою нашої роботи було дослідження та аналіз стадій дозрівання ікри карася сріблястого в умовах Запорізького (Дніпровського) водосховища.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Іхтіологічні дослідження проводили на акваторії Запорізького (Дніпровського) водосховища разом зі співвиконавцями: ПП «РІНА», ПП «Форошук В.В.» та ТОВ «Борисфен-2010» протягом 2015–2018 рр. Контрольні лови риби здійснювали на підставі дозволів, виданих Управлінням охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Дніпропетровській області. Дослідження проводили на двох контрольно-спостережних пунктах, які розташовані у Самарській затоці та нижній частині Запорізького (Дніпровського) водосховища. Лов здійснювали стандартними ставними сітками з кроком вічка 30–120 мм. Об'єктом дослідження був карась сріблястий *Carassius gibelio* (Bloch, 1782).

Біологічний аналіз риби проводили згідно з класичними методиками в іхтіології [7–10] за такими показниками: стандартна та абсолютна довжина тіла, індивідуальна маса, стать, коефіцієнт вгодованості за Фультоном. Вік риби визначали за методиками В. Л. Брюзгіна [11] та І. І. Чугунової [12].

Для дослідження плодючості риби яєчники у самиць відбирали на IV стадії зрілості. Стадію зрілості гонад визначали візуально [7]. Індивідуальну абсолютну плодючість з'ясовували ваговим методом.

Для дослідження репродуктивного потенціалу та особливостей відтворення риби яєчники у самиць відбирали на різних стадіях зрілості. Проби фіксували у розчині Буена з подальшою обробкою згідно із загальноприйнятими гістологічними методами [13, 14]. Для виготовлення зрізів використовували мікроскоп «Thermo scientific microm НМ 325». Зрізи фарбували за допомогою

гематоксилін-еозину та за Маллорі [15]. Фотографії препаратів робили за допомогою цифрової камери «Sciencelab T500 5.17М», яка підключалась до мікроскопа «MICROmed XS-2610». Під час опису періодів та фаз росту і розвитку статевих клітин, стадій зрілості яєчників використовували позначення та терміни, прийняті в іхтіологічних дослідженнях [15–18].

Статистичну обробку матеріалу проводили за допомогою комп'ютерної програми «STATISTICA 6.0».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Середньовиважений показник промислової довжини особин карася тримався на рівні минулих років і становив $21,32 \pm 2,14$ см. Показники маси карася коливалися в межах від 80 до 2500 г (рис. 1). Середньовиважена маса особин сягнула величини $240,52 \pm 22,14$ г. У однорікових групах самці відставали за темпом росту від самок на 18%.

Рис. 1. Карась сріблястий (*Carassius gibelio*) масою 2,5 кг, вилучений поблизу с. Військове; знаряддя лову — ставна сітка з кроком вічка $a = 100$ мм (фото — О. М. Маренков)

Fig. 1. Prussian carp (*Carassius gibelio*) with mass 2.5 kg, who was caught near village Viiskove, fishing gear - a stacked net with a step $a = 100$ mm (photo by O. M. Marenkov)

Ядро нерестової популяції карася складали самки 4–7-річного року (70%) та самці 5–7-річного віку (80%). Абсолютна плодючість карася коливалась в межах від 10,51 до 189,95 тис. ікринок. Середній показник плодючості за всіма віковими групами склав $80,28 \pm 16,55$ тис. ікринок. Варіювання даного показника в діапазоні min–max практично не змінилися в порівнянні з попередніми роками. В нерестовому стаді частка самок складала 55%, самців — 45%. Коефіцієнт промислового повернення від ікри складав 0,005%.

У водоймах України для карася характерний асинхронний трофоплазматичний ріст ооцитів і порційне ікрOMETання [19].

При гістологічному дослідженні встановлено, що перехід ооцитів карася з фази одношарового фолікула в фазу вакуолізації в літній період відбувався не одночасно, а асинхронно (рис. 2). У фазі початку вакуолізації (фаза «D₁») діаметр ооцита дорівнював 280–320 мкм; по периметру ооцита знаходився один ряд вакуолей, кількість яких знаходилась в діапазоні від 30 до 36 шт., а їх діаметр — $20,4 \pm 4,5$ мкм.

Рис. 2. Ооцити карася (*Carassius gibelio*) в період протоплазматичного росту. Видно ооцити у фазі одношарового фолікула і у фазі початку вакуолізації «D₁» (зб. 56х).

Fig. 2. Oocytes of Prussian carp (*Carassius gibelio*) in the period of protoplasmic growth. Oocytes are visible in the phase of a single-layer follicle and in the phase of the beginning of the vacuolation "D₁" (an increase of 56x).

Після досягнення фази «D₂» вакуолі розташовувалися в 2–3 ряду і мали діаметр $18,8 \pm 4,6$ мкм. Спостерігали збільшення діаметра ооцита до 340–360 мкм, по його колу нараховували близько 40 вакуолей. У фазі «D₃» вся цитоплазма аж до ядра була зайнята вакуолями, діаметр яких у середньому складав $34,2 \pm 5,2$ мкм. У цей період товщина вторинної оболонки досягала 1,4–1,8 мкм. Розмір ооцитів в фазі «D₃» знаходився в межах від 460 до 500 мкм.

Жовткоутворення починалося у фазі «E₁» [17]. У цей час між вакуолями з'являлися перші гранули жовтка, які виникали майже одночасно по всій товщині ооциту. Жовткові гранули мали округлу форму. Тришарова вторинна оболонка характеризувалася радіальною смугастістю, оскільки карась є фітофілом, а ікринки прилипають до нерестового субстрату. Діаметр ооцитів дорівнював 630–650 мкм.

У фазі «Е₂» ооцити мали діаметр 680–700 мкм. Спостерігали зменшення розмірів вакуолей, і діаметр в середньому становив $30,0 \pm 4,3$ мкм. Окремі частини ооцита були заповнені жовтком.

При досягненні фази «Е₃» ооцити карася повністю заповнювалися жовтком (рис. 3). Діаметр клітин становив 990–1100 мкм, вакуолі відтіснялися до периферії і знаходилися в кортикальному шарі. Розмір вакуолей зменшувався — і становив 8–18 мкм. Дефінітивні ооцити досягали діаметра 1,2–1,4 мм.

Рис. 3. Асинхронний розвиток статевих продуктів карася (*Carassius gibelio*) та процеси резорбції: 1 — ооцити у фазі «D₁»; 2 — ооцити в фазі «D₃»; 3 — процес резорбції ікри; 4 — ооцити в фазі «Е».

Fig. 3. Asynchronous development of genital products of Prussian carp (*Carassius gibelio*), and processes of roe resorption: 1 - oocytes in the phase "D₁", 2 - oocytes in the phase "D₃", 3 - process of roe resorption, 4 - oocytes in the phase "E".

Будова ооцитів сріблястого карася дещо подібна за будовою до ооцитів інших фітофільних корошових риб (сазана, плітки, ляща): у них немає жирової краплі, є широка радіальнопокреслена оболонка і одне мікропіле. Сріблястий карась є порційнонерестовим видом. У першій порції містилося близько 60% всієї ікри, у другій та наступних порціях — решта 40%. За сприятливих умов наступні порції ікри можуть бути відкладені в поточному році. За відсутності відповідних умов вони можуть резорбуватися або брати участь у формуванні генерації наступного року. На більшості нерестовищ для карася існують оптимальні умови для нересту, що дозволяє йому ефективно відтворюватися в умовах Запорізького (Дніпровського) водосховища та формувати стійкі популяції.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Для сріблястого карася характерний асинхронний трофоплазматичний ріст ооцитів і порційне ікрометання. В сприятливих умовах на нерестовищах карась відкладає першу порцію ікри, в якій міститься близько 60% (від загального її обсягу, друга і наступна порції можуть відкладатися в один сезон або брати участь в утворенні генерації наступного року.

Встановлено, що перехід ооцитів карася з фази одношарового фолікула «С» у фазу вакуолізації в літній період відбувається не одночасно, а асинхронно. У ооцитів сріблястого карася відсутня жирова крапля, вони мають широку радіальнопокреслену оболонку, яка забезпечує клейкість ікри.

Отримані результати являють очевидний теоретичний інтерес та практичну значимість для дослідження та прогнозування біоресурсного потенціалу водойм з використанням даних комплексних досліджень репродуктивного потенціалу риб.

Оскільки розуміння пристосування риб до умов розмноження та їх адаптація до нових водойм базується на глибоких знаннях особливостей формування репродуктивної системи, важливим аспектом подальших досліджень є поглиблене всебічне вивчення та дослідження гістологічної будови гонад риб і стадій зрілості статевих продуктів із використанням гістологічних, цитологічних і біохімічних методів.

Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом Ф75/142 Державного фонду фундаментальних досліджень «Репродуктивний потенціал інвазійних гідробіонтів водойм Придніпров'я та їх вплив на формування біопродуктивності» (ДР №0118U006319).

ЛІТЕРАТУРА

1. Козий М. С., Шерман И. М. Гистоморфологические особенности ихтиофауны юга Украины. Херсон : Гринь Д.С., 2011. 324 с.
2. Чепурнова Л. В. Закономерности функций гонад, размножения и состояния популяций рыб бассейна Днестра в условиях гидростроительства. Кишенев : Штиинца, 1991. 161 с.
3. Шихшабеков М. М., Рабазанов Н. И. Морфо-экологические исследования размножения рыб в водоемах с нарушенным экологическим режимом. Москва. : Закон и право, 2009. 327 с.
4. Екологічні аспекти сучасного стану промислового іхтіокомплексу Запорізького (Дніпровського) водосховища / Федоненко О. В. та ін. // Наукові записки Тернопільського пед. університету. 2010. Вип. 2 (43). С. 506—509. (Серія : Біологія. Спец. випуск : Гідроекологія).
5. Воспроизводительная способность серебряного карася (*Carasius auratus gibelio* Bloch, 1782) и золотого карася (*Carassius carassius* Linnaeus, 1758) в Аграханском заливе Дагестана после его реконструкции / Шихшабеков М. М. и др. // Рыбное хозяйство Украины. 2013. № 6 (89). С. 18—23.
6. Шихшабеков М. М., Бархалов Р. М. Гаметогенез, половые циклы и экология нереста рыб (на примере семейства *Cyprinidae*) в водоемах Тверской системы (эколого-морфологические исследования). Махачкала, 2004. 162 с.
7. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. ; ред. Романенко В. Д. Київ : Логос, 2006. 408 с.

8. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция. Ленинград : ГосНИОРХ, 1984. 52 с.
9. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва : Пищевая промышленность, 1966. 376 с.
10. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення ryb з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98 № 166. Київ, 1998. 47 с.
11. Брюзгин В. Л. Методы изучения роста рыб по чешуе и отолитам. Киев : Наукова думка, 1969. 186 с.
12. Чугунова И. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб (Методическое пособие по ихтиологии). Москва : АН СССР, 1959. 164 с.
13. Fish Histology and Histopathology. 4th edn. / Mumford S. et al. West Virginia : US Fish & Wildlife Service, 2007. 357 p.
14. Гистология для ихтиологов: опыт и советы / Микодина Е. В. и др. Москва : ВНИРО, 2009. 112 с.
15. Кулаев С. И. Строение, цикл развития семенников половозрелого сома (*Silurus glanis* D.) // Зоол. журн. 1944. Т. 23, № 6. С. 390—398.
16. Крыжановский С. Г. Эколого-морфологические закономерности развития карповых, вьюновых и сомовых рыб (*Cyprinoidei* и *Siluroidei*) // Тр. Ин-та морфологии животных АН СССР. 1949. Вып. 1. С. 5—332.
17. Шихшабеков М. М., Галимова У. М., Атаева Р. Д. Материалы по изучению гаметогенеза и половых циклов некоторых видов промысловых рыб в водоемах Дагестанского побережья Каспия // Респ. научно-практич. конф. : матер. Махачкала, 2001. С. 146—147.
18. Козій М. С., Шерман І. М., Лянзберг О. В. Атлас гістології та ембріології промислових ryb України. Херсон : Гринь Д.С., 2011. 404 с.
19. Маренков О. М. Особливості відтворення основних промислових корошових видів ryb Запорізького водосховища в сучасних екологічних умовах // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : VII Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф., Мелітополь — Бердянськ, 10-13 вер. 2014 р. : матер. Херсон : Гринь Д. С., 2014. С. 159—161.

REFERENCES

1. Kozij, M. S., & Sherman, I. M. (2011). *Gistomorfologicheskie osobennosti ihtiofauny juga Ukrainy*. Herson: Grin' D.S.
2. Chepurnova, L. V. (1991). *Zakonomernosti funkcij gonad, razmnzhenija i sostojanija populacij ryb bassejna Dnestra v uslovijah gidrostroytel'stva*. Kishenev: Shtiinca.
3. Shihshabekov. M. M., & Rabazanov. N. I. (2009). *Morfo-jekologicheskie issledovanija razmnzhenija ryb v vodoemah s narushennym jekologicheskim rezhimom*. Moskva: Zakon i pravo.
4. Fedonenko, O. V., Yesipova, N. B., Sharamok, T. S., Jakovenko, V. O., & Ananieva, T. V. (2010). Ekolohichni aspekty suchasnoho stanu promysloвого ikhtiokompleksu Zaporizkoho (Dniprovskoho) vodoshkovyshcha. *Naukovi zapysky Ternopil'skoho nats. univ. Ser.: biolohiia. Spets.vypusk: hidroekolohiia*, 2(43), 506-509.

5. Shihshabekov, M. M., Ramazanov, M. G., Abdullaeva, N. M., & Marenkov, O. N. (2013). *Vosproizvoditel'naja sposobnost' serebrjanogo karasja (Carasius auratus gibelio Bloch, 1782) i zolotogo karasja (Carassius carassius Linnaeus, 1758) v Agrahanskom zalive Dagestana posle ego rekonstrukcii. Rybne gospodarstvo Ukrainy*, 6 (89), 18-23.
6. Shihshabekov, M. M., & Barhalov, R. M. (2004). *Gametogenez, polovye cikly i jekologija neresta ryb (na primere semejstva Cyprinidae) v vodoemah Tverskoj sistemy (jekologo-morfologicheskie issledovanija)*. Mahachkala.
7. Arsan, O. M., Davydov, O. A., & Diachenko, T. M. et al. (2006). *Metody hidroekologichnykh doslidzhen poverkhnevyykh vod*. Kyiv: Lohos.
8. *Metodicheskie rekomendatsii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskikh issledovaniyah na presnovodnykh vodoemah. Zoobentos i ego produktsiya* (1984). Leningrad: GosNYORKH.
9. Pravdin, I. F. (1966). *Rukovodstvo po izucheniyu ryb (preimushchestvenno presnovodnykh)*. Moskva: Pishhevaya promyshlennost'.
10. *Metodyka zboru i obrobky ikhtiologichnykh i hidrobiologichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoskhovysch i lymaniv Ukrainy: Zatv. nakazom Derzhkomrybhospu Ukrainy 166 vid 15.12.98*. (1998). Kyiv.
11. Bryuzgin, V. L. (1969). *Metody izucheniya rosta ryb po cheshue i otolitam*. Kiev: Naukova dumka.
12. Chugunova, I. I. (1959). *Rukovodstvo po izucheniyu vozrasta i rosta ryb. (Metodicheskoe posobie po ihtologii)*. Moskva: Publishing House of the Acad. Sc. USSR.
13. Mumford, S., Heidel, J., Smith, C., Morrison, J., Macconnel, B. & Blazer, V. (2007). *Fish Histology and Histopathology*. (4th edn.). West Virginia: US Fish & Wildlife Service.
14. Mikodina, E. V., Sedova, M. A., Chmylevskij, D. A., Mikulin, A. E., P'janova, S. V., & Polujektova, O. G. (2009). *Gistologija dlja ihtologov: Opyt i sovety*. Moskva: VNIRO.
15. Kulaev, S. I. (1944). Stroenie, cikl razvitija semennikov polovozrelogo soma (*Silurus glanis* D.). *Zoologicheskij zhurnal*, 23(6), 390-398.
16. Kryzhanovskij, S. G. (1949). Jekologo-morfologicheskie zakonomernosti razvitija karpovyh, v'junovyh i somovyh ryb (*Cyprinoidei* i *Siluroidei*). *Tr. In-ta morfologii zhivotnyh AN SSSR*, 1, 5-332.
17. Shihshabekov, M. M., Galimova, U. M., & Ataeva, R. D. (2001). Materialy po izucheniju gametogeneza i polovyh ciklov nekotoryh vidov promyslovyh ryb v vodoemah Dagestanskogo poberezh'ja Kaspija. *Mat-ly Resp. nauchno-praktich. konf.* Mahachkala, 146-147.
18. Kozii, M. S., Sherman, I. M., & Lianzberh, O. V. (2011). *Atlas histologii ta embriologii promyslovykh ryb Ukrainy*. Kherson: Hrin D.S.
19. Marenkov, O. M. (2014). Osoblyvosti vidtvorennia osnovnykh promyslovykh koropovykh vydiv ryb Zaporizkoho vodoskhovyscha v suchasnykh ekolohichnykh umovakh. *Suchasni problemy teoretychnoi i praktychnoi ikhtiologii: materialy VII Mizhnar. ikhtiologichnoi nauk.-prakt. konf., Melitopol-Berdiansk, 10-13 veresnia 2014 r.* Kherson: Hrin D. S., 159-161.

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 15-25
DOI: 10.15407/fsu2018.04.015
УДК [597-19:556.53]:504(28)

Received 23.09.18
Received in revised form 11.10.18
Accepted 29.10.18

ВИДОВЕ БАГАТСТВО ТА ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ РИБ Р. УДАЙ В МЕЖАХ НПП «ПИРЯТИНСЬКИЙ»

І. О. Кошовий, koshovoyihor0507@ukr.net, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», м. Київ

А. В. Подобайло, wporakaniv@ukr.net, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», м. Київ

А. І. Шустов, ojodedias@ukr.net, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», м. Київ

Мета. Визначення видового багатства, видового різноманіття та розподілу риб річки Удай в межах НПП «Пирятинський», а також виявлення пріоритетності в наданні особливого режиму охорони окремим акваторіям.

Методика. Об'єктом досліджень стало дрібно розмірне рибне населення річки Удай. Вибір проб проводився в рамках моніторингових робіт спільно з науковим відділом НПП «Пирятинський» в липні 2014–2017 рр. в межах Пирятинського району Полтавської області по руслу річки Удай, на території НПП «Пирятинський». Контрольні лови проводились на глибинах до 2 м мальковою волокушею довжиною 6 м з вічком 5 мм. Обробка проб виконана згідно із загальноприйнятими методиками.

Результати. В уловах 2014–2017 рр. в р. Удай на території НПП «Пирятинський» виявлено 19 видів риб, що належать до 6 родин. Найбільшим видовим багатством характеризувалась станція поблизу с. Кейбалівка (14 видів). На всіх станціях було відмічено майже однакову кількість видів риб, тобто спостерігався близький до рівномірного розподіл по відношенню до видового багатства риб на кожній окремій станції. Згідно із розрахованим індексом видового різноманіття, найвищу його значення зафіксовано на станції с. Кейбалівка. Здійснено розрахунок індексу подібності (схожості) Жаккара. Так, найбільш унікальною акваторією, відповідно до проведених розрахунків, стала така неподалік с. Кейбалівка. Особливого режиму охорони потрібно надавати саме даній акваторії.

Наукова новизна. Інформації про видове різноманіття риб окремих акваторій р. Удай в літературі не наводиться, а за змінами видового різноманіття можна робити висновки про належний стан охорони водних екосистем в конкретний момент часу. Саме тому розраховано видове різноманіття та розподіл риб р. Удай, а також визначено пріоритетність в наданні особливого режиму охорони акваторії поблизу с. Кейбалівка.

Практична значимість. Отримані дані використані в розробці планів зі збереження біологічного різноманіття національного парку, та, крім того, в підготовці менеджмент-плану об'єкта Смарагдової мережі Європи UA0000077.

Ключові слова: видове багатство, індекс видового різноманіття, індекс подібності Жаккара, іхтіофауна.

© І. О. Кошовий, А. В. Подобайло, А. І. Шустов, 2018

FISH SPECIES RICHNESS AND SPECIES DIVERSITY IN THE UDAY RIVER WITHIN THE NATIONAL NATURE PARK «PYRYATYNSKY»

I. Koshovyi, koshovoyihor0507@ukr.net, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Educational and Scientific Center "Institute of Biology and Medicine", Kyiv

A. Podobailo, wporakaniv@ukr.net, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Educational and Scientific Center "Institute of Biology and Medicine", Kyiv

A. Shustov, ojodedias@ukr.net, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Educational and Scientific Center "Institute of Biology and Medicine", Kyiv

Objective. Determination of species richness, species diversity and distribution of fishes in the Uday River within the National Nature Park "Pyryatynskiy" as well as determination of the prioritization in providing the special protection regime for some water areas.

Methodology. The object of study were small-sized fish populations of the Uday River. Sampling was carried out with the framework of monitoring works in association with scientific department of National Nature Park in July 2014-2017. The study was performed in Pyryatynsky district, Poltava region, along the Uday River channel on the territory of the National Nature Park. Monitoring catches were conducted at depths up to 2 m by a beach seine of 6 m in length, mesh size of 5 mm. Sample processing was carried out in accordance with generally accepted methods.

Findings. 19 species of fish belonging to 6 families were found on National Nature Park "Pyryatynsky" territory in the catches of 2014-2017. The largest species richness was found on a station near the village Kaybalovka (14 species). Almost the same number of fish species were observed at all stations. According to the calculated species diversity indices, the highest species diversity index was determined for the station Kaybalivka. Also we calculated the Jaccard similarity coefficient. The most unique water area, according to the calculations, was the area near the station Kaybalivka. A special protection regime should be assigned to this particular water area.

Originality. Any information on fish species diversity in some water areas of the Uday River is absent in the literature, but by using information about changes in species diversity it is possible to draw conclusions about the proper state of the protection of aquatic ecosystems at a specific time. Therefore, the species diversity and distribution of the Uday River has been calculated, and the priority has been given to provide a special regime for the protection of the water area near the village Kaybalivka.

Practical value. The obtained data have been used in the development of plans for the conservation of the biological diversity of the national park, and in the preparation of the management plan of the Emerald Network Europe Project UA0000077.

Key words: species richness, index of species diversity, Jaccard similarity coefficient, ichthyofauna.

ВИДОВОЕ БОГАТСТВО И ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РЫБ В ПРЕДЕЛАХ НПП «ПИРЯТИНСКИЙ»

И. А. Кошевой, koshovoyihor0507@ukr.net, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, ННЦ «Институт биологии и медицины», г. Киев

А. В. Подобайло, wporakaniv@ukr.net, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, ННЦ «Институт биологии и медицины», г. Киев

А. И. Шустов, ojodedias@ukr.net, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, ННЦ «Институт биологии и медицины», г. Киев

Цель. Определение видового богатства, видового разнообразия и распределения рыб реки Удай в пределах НПП «Пирятинский», а также определение приоритетности в предоставлении особого режима охраны отдельным акваториям.

Методика. Об'єктом досліджень стало малорозмерне рибне населення ріки Удай. Отбір проб проводився в рамках моніторингових робіт спільно з научним відділом НПП «Пирятинський» в липні 2014–2017 рр. в Пирятинському районі Полтавської області по руслу ріки Удай, на території НПП «Пирятинський». Контрольні отлови проводилися на глибинах до 2 м малькової волокуші довжиною 6 м з ячеєю 5 мм. Обробка проб виконана в відповідності з общепринятыми методиками.

Результати. В уловах 2014–2017 рр. в р. Удай на території НПП «Пирятинський» виявлено 19 видів риб, що належать до 6 родин. Найбільшим видовим багатством характеризувалася станція поблизу с. Кейбалівка (14 видів). На всіх станціях було помічено майже однакове кількість видів риб, то єсть спостерігалося практично рівномірне розподілення по показателю видового багатства риб на кожній окремій станції. Згідно з розрахованим індексом видового різноманіття, станція с. Кейбалівка має найвище його значення. Здійснено розрахунок індексу спорідненості Жаккара. Так, найбільш унікальною акваторією, згідно з проведеними розрахунками, стала така поблизу с. Кейбалівка. Таким чином, особливий режим охорони потрібно надавати саме цій акваторії.

Наукова новизна. Інформація про видовий різноманітний склад окремих акваторій р. Удай в літературі не наведена, а про зміни видового різноманіття можна робити висновки про стан охорони водних екосистем в певний час. Саме тому було досліджено видовий різноманітний склад і розподіл риб р. Удай, а також визначено пріоритетність в наданні спеціального режиму охорони акваторії поблизу с. Кейбалівка.

Практична значимість. Отримані дані використані в розробці планів збереження біологічного різноманіття національного парку, і, крім того, в підготовці менеджмент-плану об'єкта мережі Emerald UA0000077.

Ключові слова: видовий багатство, індекс видового різноманіття, індекс спорідненості Жаккара, іхтіофауна.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Національний природний парк «Пирятинський» створений на середній течії р. Удай з метою збереження та раціонального використання унікальних і еталонних природно-ландшафтних та історико-культурних комплексів. Річка Удай впадаючи в р. Сула, є притокою другого порядку р. Дніпро. Довжина річки становить 324 км, а площа водозбірної басейну — 7030 км². Протяжність русла в межах парку сягає 65 км [1].

Дослідження видового багатства та видового різноманіття іхтіофауни р. Удай пов'язане з підготовкою, створенням та подальшою роботою НПП «Пирятинський». Вперше огляд видового складу риб на середній течії річки Удай знаходимо в публікації А. В. Подобайла [2]. В 1990-х роках ним було виявлено 27 видів риб, із 7 родин. Н. О. Глотова зі співавторами (2011 р.), відмічає 15 видів риб на середній течії р. Удай [3]. Вона говорить про присутність серед виявлених представників різних видів риб 12 аборигенних видів та 3 чужорідних, з яких 2 поширилися, можливо, внаслідок інтродукції (карась сріблястий, чебачок амурський), а один — шляхом саморозселення (колючка південна). Автором зроблено висновок про наявність вже 28 видів риб на середній течії р. Удай, оскільки нею було виявлено 1 новий вид — пічкур-білопер дніпровський.

У 2015 р. І. О. Кошовий відзначає наявність 15 видів риб на річці Удай [4, 5]. Тобто, на основі аналізу даних, зазначених окремими дослідниками, можна стверджувати про наявність 28 видів риб на середній течії р. Удай. За даними «Літопису природи НПП «Пирятинський» [6] в межах національного парку в р. Удай та притоках мешкає 30 видів кісткових риб.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Більша частина інформації щодо іхтіофауни р. Удай стосується видового багатства та екологічних груп риб, а от відомостей про видове різноманіття риб окремих біотопів р. Удай в літературі не наводиться. За змінами видового різноманіття можна робити висновки про належний стан охорони водних екосистем в конкретний момент часу. Саме тому виникає необхідність фауністичних досліджень для визначення сучасного видового різноманіття, уточнення ареалів та визначення чисельності риб. Охорона водно-болотних угідь — одне з основних завдань НПП «Пирятинський». Досягнення цього завдання неможливе без вивчення іхтіофауни р. Удай. Зміни в іхтіофауні — важливий індикатор змін в екосистемах водно-болотних угідь. Актуальність роботи полягає в необхідності вивчення видового багатства риб р. Удай для організації моніторингу цієї ключової групи хребетних водно-болотних угідь, які підлягають охороні.

Об'єктом досліджень стало дрібнорозмірне рибне населення річки Удай. Отримані дані використані в розробці планів зі збереження біологічного різноманіття національного парку, так, крім того, в підготовці менеджмент-плану об'єкта Смарагдової мережі Європи UA0000077.

Мета роботи — визначити видове багатство, видове різноманіття та розподіл риб річки Удай в межах НПП «Пирятинський», а також виявити пріоритетність в наданні особливого режиму охорони окремим територіям.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Відбір проб проводився в рамках моніторингових робіт спільно з науковим відділом НПП «Пирятинський» в липні 2014–2017 рр., в межах Пирятинського району Полтавської області по руслу річки Удай, на території НПП «Пирятинський». Контрольні лови проводились на глибинах до 2 м мальковою волокушею довжиною 6 м з вічком 5 мм. Кожного року обловлювалась однакова площа акваторій. Відбір проб проводився за незмінною методикою. Глибина на ділянках дослідження становила від 1 до 5 м. Загалом для дослідження було відловлено і опрацьовано 4038 особин різних видів кісткових риб. Проби були відібрані на 7 стаціонарних гідробіологічних станціях (рис. 1). Географічні координати для станцій визначались за допомогою GPS навігатора GarminTrex 10 (табл. 1). Для кожної проби було описано видовий склад риб та їх кількісне співвідношення. Фіксація проб здійснювалась 4,0%-м розчином формаліну.

Здійснювали масовий іхтіологічний аналіз. Визначення виду риб проводили за визначниками Г. П. Коблицької [9] та Ю. В. Мовчана [10].

Крім того, ми розраховували фреквенцію (F) [11] для кожного виду, тобто відсоток станцій, в яких вид присутній. Також було визначено відсоток кожного виду від загальної кількості особин (D).

Для визначення пріоритетності природоохоронних заходів розраховували індекс різноманіття Сімпсона $1/D$ [12], в якому D обчислюють за формулою:

$$D = \sum p_i^2,$$

де p_i — відносна поширеність і-тих видів на станції.

Для порівняння характерних рис угруповання між усіма можливими парами станцій розраховували коефіцієнт подібності Жаккара [12], який обраховували за допомогою комп'ютерної програми Past3. X (2018 p.).

Рис. 1. Стаціонарні гідробіологічні станції по руслу р. Удай в Пирятинському районі, на яких було відібрано проби

* Примітка. 1 — с. Кроти, 2 — с. Гурбинці, 3 — с. Кейбалівка, 4 — о. Масальський, 5 — Сумський Міст, 6 — с. Велика Круча, 7 — с. Повстинь.

Fig. 1. Stationary hydrobiological stations along the river Uday in the Pyriatynsky district, on which samples were taken

* Notes. 1 — Kroti, 2 — Gurbintsi, 3 — Keyybalivka, 4 — island Masalskyi, 5 — Sumy Bridge, 6 — Velyka Krucha, 7 — Povstyn.

Таблиця 1. Географічні координати стаціонарних гідробіологічних станцій, на яких було здійснено відбір іхтіологічних проб в липні 2014–2017 рр.

Table 1. Geographical coordinates of stationary hydrobiological stations on which the selection of ihtiological samples was carried out in July 2014–2017

№	Назва станції / The name of the station	Географічні координати / Geographical oordinates
Станції по руслу р. Удай / Stations along the river Uday		
1	с. Кроти / Krotы	50°23'11" N / 32°28'29" E
2	с. Гурбинці / Gurbintsy	50°21'48" N / 32°28'36" E
3	с. Кейбалівка / Keybalivk	50°18'20" N / 32°30'05" E
4	о. Масальський / island Masalskyi	50°14'21" N / 32°31'50" E
5	Сумський Міст / Sumy Bridge	50°13'37" N / 32°33'19" E
6	с. Велика Круча / Velyka Krucha	50°11'09" N / 32°34'20" E
7	с. Повстинь / Povstyn	50°10'45" N / 32°37'24" E

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

У пробах молоді риб р. Удай, що були відібрані в липні 2014–2017 рр., виявлено 19 видів риб, що належать до 6 родин. Переважають представники з родини коропових — 12 видів, 2 види належать до родини щипавкові (в'юнові), 2 види — до родини окуневі, інші 3 родини мають по 1 виду (щукові, колючкові, головешкові) (табл. 2). Зафіксовані нами 19 видів риб складають більшу частину від відомого видового складу р. Удай. З іхтіофауни басейну р. Дніпро без Дніпровсько-Бузького лиману вони становлять близько 21,8% [11].

Таблиця 2. Розподіл дрібно розмірного рибного населення р. Удай в межах НПП «Пирятинський»

Table 2. Distribution of small-scale fish population of the river Uday in the limits of NNP «Pyryatynsky»

№	Вид /Species	Номер станції (див. рис. 1) / The number of the station (see fig. 1)							D	F
		1	2	3	4	5	6	7		
1	<i>Petroleuciscus borysthenicus</i>	64	57	31	2	3	4	23	4,55	100
2	<i>Leuciscus idus</i>	-	5	6	1	3	-	1	0,39	71,4
3	<i>Leucaspis delineatus</i>	-	4	-	-	-	-	-	0,09	14,2
4	<i>Rutilus rutilus</i>	16	124	29	7	9	43	37	6,56	100
5	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	118	113	59	4	19	9	44	9,06	100
6	<i>Alburnus alburnus</i>	47	113	63	140	7	716	254	33,1	100
7	<i>Blicca bjoerkna</i>	20	34	34	1	2	30	14	3,09	100
8	<i>Abramis brama</i>	-	-	1	-	-	-	1	0,04	28,5
9	<i>Rhodeus amarus</i>	122	1071	164	36	22	61	93	38,8	100
10	<i>Gobio gobio</i>	-	13	4	44	-	14	-	1,85	51,1
11	<i>Carassius carassius</i>	-	-	2	-	-	-	-	0,04	14,2
12	<i>Tinca tinca</i>	-	-	-	-	-	-	1	0,02	14,2

№	Вид /Species	Номер станції (див. рис. 1) / The number of the station (see fig. 1)							D	F
		1	2	3	4	5	6	7		
13	<i>Cobitis taenia</i>	2	2	-	3	1	14	9	0,76	85,7
14	<i>Misgurnus fossilis</i>	-	-	-	-	-	-	1	0,02	14,2
15	<i>Esox lucius</i>	7	2	3	3	1	1	3	0,49	100
16	<i>Pungitius platygaster</i>	3	1	3	-	2	1	1	0,27	85,7
17	<i>Perca fluviatilis</i>	5	-	24	3	-	1	-	0,27	57,1
18	<i>Gymnocephalus cernuus</i>	-	-	-	2	-	10	-	0,29	28,5
19	<i>Perccottus glenii</i>	-	-	3	-	-	-	-	0,07	14,2
	Всього особин	394	1539	426	246	69	904		482	
	Всього видів	10	12	14	12	10	12		13	

Розподіл видів риб по станціях досить рівномірний (табл. 2). За період дослідження 2014–2017 рр. найбільшу кількість різних видів риб було зафіксовано на станції поблизу с. Кейбалівка (14 видів). Крім того, значним видовим багатством характеризувалася станція поблизу с. Повстинь (13 видів); на станціях с. Гурбинці, о. Масальський та с. Велика Круча відловлено по 12 видів риб, станції в районі Сумського Мосту та с. Гурбинці вирізняються найменшим видовим багатством: на них було виловлено по 10 видів риб. Варто відзначити, що на всіх станціях було відмічено майже однакову кількість видів риб, тобто спостерігається близький до рівномірного розподіл за видовим багатством риб на кожній окремій станції.

До найбільш численних видів можна віднести такі: гірчак європейський, верховодка звичайна, плітка звичайна, краснопірка звичайна, плоскирка європейська, боби́рець дніпровський. Причому, на перші п'ять найбільш численних видів припадає близько 95% від всієї добутої під час дослідження риби. Відносна чисельність кожного з інших зафіксованих видів риб була незначною і становила менше 1,0% загальної кількості, окрім пічкара звичайного — 1,8%.

Найрозповсюдженішими видами в р. Удай на території НПП «Пирятинський» за період дослідження стали: гірчак європейський, верховодка звичайна, краснопірка звичайна, плітка звичайна, боби́рець дніпровський та щука звичайна — вони присутні в уловах зі всіх 7 станцій. Найрідкіснішими в уловах були такі види: лин звичайний, в'юн звичайний, карась золотий та ротань-головешка. Останні 4 види реєструвалися на одній окремій гідробіологічній станції кожен. Показник фреквенції (F) для них був найменшим і становив 14,2% для кожного з 4 видів відповідно.

Трійку лідерів серед станцій за кількістю відловлених за період дослідження екземплярів різних видів риб складають наступні: с. Гурбинці (1539 особин), с. Велика Круча (904 особини), с. Повстинь (489 особин) та с. Кейбалівка (404 особини). Насамперед, така ситуація спостерігається через те, що за період дослідження, в ловах з даних чотирьох станцій відзначається велика кількість гірчака європейського (*Rhodeus amarus*) — на станції с. Гурбинці відловлено 1071

екз. даного виду, а на трьох інших станціях — по 61, 93 та 164 екз. відповідно. Щодо відносної чисельності, то станція поблизу с. Гурбинці є абсолютним лідером, оскільки на ній відловлено 27% екземплярів від загальної кількості виловленої за період дослідження риби.

Аналізуючи дані таблиці 2, також можна сказати, що для шуки звичайної спостерігається більш-менш однаковий кількісний розподіл по станціях за період дослідження.

Іхтіофауна р. Удай характеризується високим видовим різноманіттям. Воно може охарактеризувати те, наскільки збалансованим є угруповання щодо поширення особин за видами. При обранні пріоритетів щодо охорони тих чи інших ділянок річки є необхідність враховувати як видове багатство риб, так і їх видове різноманіття.

Індекс видового різноманіття риб на досліджуваних станціях змінювався в межах від 1,57 до 4,78 (табл. 3). За період дослідження найбільшим видовим багатством характеризуються такі станції: с. Кейбалівка (14 видів), с. Повстинь (13 видів) (табл. 3). Виходячи з таких даних, можна зробити висновок щодо пріоритетності охорони саме даних станцій. У даному разі на мінімальній площі охорони буде піддано в першому випадку 73% видів риб від загальної кількості нами пійманих, в другому випадку — 68% видів риб, але враховуючи, що на всіх станціях спостерігається відносно рівномірний розподіл за кількістю видів (від 10 до 14), неможливо чітко вказати, яким саме станціям потрібно надавати особливого режиму охорони. Отже, варто виокремити серед станцій з найвищим видовим багатством такі з найвищим видовим різноманіттям. Серед станцій з найвищим видовим багатством найвищим видовим різноманіттям характеризується с. Кейбалівка — 4,78, а, як відомо, чим вище значення даного індексу, тим вище видове різноманіття. Найвище видове різноманіття (за індексом Сімпсона) спостерігається тоді, коли всі види в угрупованні представлені однаковою кількістю особин [9]. Таким чином, особливого режиму охорони потрібно надавати саме станції поблизу села Кейбалівка.

Таблиця 3. Індекс різноманіття Сімпсона для кожної гідробіологічної станції

Table 3. The Simpson variety index for each hydrobiological station

№	Станція / Hydrobiological station	Видове багатство / Species richness	Індекс різноманіття Сімпсона / Simpson variety index
		2014–2017	2014–2017
1	с. Кроти / Kroty	10	4,55
2	с. Гурбинці / Gurbintsy	12	1,98
3	с. Кейбалівка / Keybalivka	14	4,78
4	о. Масальський / island Masalskyi	12	2,63
5	Сумський Міст / Sumy Bridge	10	4,74
6	с. Велика Круча / Velyka Krucha	12	1,57
7	с. Повстинь / Povstyn	13	3,00

Ще одним важливим аспектом в оцінці пріоритетності надання особливої охорони тим чи іншим станціям є різниця видового складу угруповань. Тобто, серед усіх станцій за коефіцієнтом подібності Жаккара в охороні віддається пріоритет найбільш унікальним станціям, які за видовим складом найбільше відрізняються від усіх досліджуваних станцій. На зображенні (рис. 2) можемо побачити порівняння кожної пари станцій за коефіцієнтом подібності Жаккара.

Рис. 2. Дендрограма схожості біотопів за видовим складом риб

Примітка. 1 — с. Кроти, 2 — с. Гурбинці, 3 — с. Кейбалівка, 4 — о. Масальський, 5 — Сумський Міст, 6 — с. Велика Круча, 7 — с. Повстинь.

Fig. 2. Dendrogram of similarity of the biotopes to the species composition of fish

Notes. 1 — Kroty, 2 — Gurbintsy, 3 — Kayybalivka, 4 — island Masalskyi, 5 — Sumy Bridge, 6 — Velyka Krucha, 7 — Povstyn.

За індексом подібності (схожості) Жаккара найбільш подібними є угруповання 6 та 4 — 0,84 (рис. 1), які утворюють кластер 1к, а саме дані угруповання відрізняються лише наявністю двох видів (в'язь європейсько-сибірський та колючка багатоголкова південна). В 6 угрупованні немає виду з 4 угруповання (в'язь європейсько-сибірський), а в 4 не представлений вид з 6 угруповання (колючка багатоголкова південна). Станція 2 — Гурбинці (далі 2 ст.) та 5 — Сумський Міст (далі 5 ст.) зводяться в кластер 2к з індексом подібності 0,83. У видовому складі 2 ст. представлені 2 види (вівсянка неповнолінійна та пічкур звичайний), яких немає в угрупованні 5 ст. Ситуація досить схожа з першою парою 4 : 6, але спостерігається те, що в першому випадку — в кожному угрупованні не представлено по 1 виду з іншого. Разом з тим, в парі 2 : 5 в угрупованні не 5 ст. представлено двох видів з 2 ст.

Сукупність 1к та угруповання під 1 — Кроти (далі 1 ст.) утворюють кластер 3к з індексом подібності 0,77 і характеризується відсутністю у видовому складі 1 ст. трьох видів з кластеру 1к (в'язь європейсько-сибірський, пічкур звичайний, йорж звичайний). Сукупності 3к і 2к об'єднуються в кластер 4к з індексом подібності 0,72 та відрізняються відсутністю в кластері 2к одного виду (в'язь європейсько-сибірський) з кластеру 3к, а також відсутністю в кластері 3к двох видів (окунь звичайний та йорж звичайний) з кластеру 2к. Кластер 4к зі станцією 7 — Повстинь (далі 7 ст.) утворюють кластер 5к з індексом подібності 0,64 та

відрізняються відсутністю у видовому складі 7 ст. 3 видів (вівсянка неповнолінійна, окунь звичайний та йорж звичайний) із кластеру 4к, а також відсутністю у видовому списку кластеру 4к двох видів (лин звичайний та в'юн звичайний) із 7 ст. Останній кластер 6к утворюється з 5к і станції 3 — Кейбалівка (далі 3 ст.). Кластер 6к з індексом подібності 0,62 характеризується наявністю у видовому складі 3 ст. трьох видів (лящ звичайний, карась золотий та ротань-головешка), яких немає у видовому складі кластеру 5к. Крім того, видовий список угруповання 3 ст. не включає 5 видів (вівсянка неповнолінійна, лин звичайний, щипавка звичайна, в'юн звичайний, йорж звичайний) із сукупності 5к.

Тобто, відповідно до вищенаведених даних, можна зробити висновок, що станція 3 — Кейбалівка характеризується як найбільш унікальна (індекс подібності Жаккара — 0,62) за видовим складом від об'єднаної сукупності усіх інших (5к-кластер), та відзначається трьома видами, не представленими в кластері 5к (лящ звичайний, карась золотий та ротань-головешка), що в черговий раз підтверджує її унікальність. Також досить унікальним є угруповання 7 — Повстинь, яке характеризується наявністю одного виду (лин звичайний), якого немає в об'єднаній сукупності 4к, а також у видовому складі станції 3 — Кейбалівка.

Отже, за індексом подібності Жаккара особливого режиму охорони потрібно надавати саме території поблизу с. Кейбалівка, оскільки за видовим багатством вона є найунікальнішою, і, разом з тим, відзначається найвищим видовим багатством (14 видів) та найвищим індексом різноманіття Сімпсона (4,78).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Таким чином, в уловах 2014–2017 рр. в р. Удай на території НПП «Пирятинський» виявлено 19 видів риб, що належать до 6 родин. Найбільшим видовим багатством характеризувалась станція поблизу с. Кейбалівка (14 видів). На всіх станціях було відмічено майже однакову кількість видів риб, тобто спостерігався близький до рівномірного розподіл за видовим багатством риб на кожній окремій станції.

Особливого режиму охорони потрібно надавати акваторії поблизу с. Кейбалівка, оскільки за видовим багатством вона є найунікальнішою, і, разом з тим, відзначається найвищим видовим багатством (14 видів) та найвищим індексом різноманіття Сімпсона (4,78).

ЛІТЕРАТУРА

1. Природа національного природного парку «Пирятинський» : монографія / Абдулєва О. С. та ін. Київ : Талком, 2017. 197 с.
2. Подобайло А. В. Рибне населення середньої течії р. Удай // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : І Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. Канів, 2008. С. 115.
3. Глотова Н., Куцоконь Ю., Подобайло А. Розподіл дрібно-розмірного рибного населення на мілководдях річки Удай НПП «Пирятинський» // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2012. Вип. 61. С. 10—11. (Біологія).
4. Моніторинг іхтіофауни р. Удай в межах національного природного парку «Пирятинський» / Кошовий І. О. та ін. // Сучасні проблеми теоретичної та

- практичної іхтіології : VIII Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. Херсон, 2015. С. 100—102.
5. Кошовий І. О., Подобайло А. В. Відносна чисельність та розподіл гірчака (*Rhodeus amarus* (Bloch, 1782)) у річках національного природного парку «Пирятинський» // Мережа NATURA 2000 як іноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні : наук.-практ. семінар : матер. Київ, 2017. Вип. 1. С. 59—63. (Серія : Conservation Biology in Ukraine).
 6. Літопис національного природного парку «Пирятинський». В 5 т. Т. 5. [Б. м.] : Рукопис, 2016. 339 с.
 7. Коблицкая А. Ф. Определитель молоди пресноводных рыб. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1981. 208 с.
 8. Мовчан Ю. В. Риби України: визначник-довідник. Київ : Національний науково-природничий музей зоологічний музей НАН України, 2011. 420 с.
 9. Kosco J. Zmeny ichtyocenu povodia Torysy s dorazom na chranene a invazne druhi // Natura Carpatica. 2007. Vol. XLVIII. P. 127—140.
 10. Harrison I., Laverty M., Sterling E. Species Diversity. [S. l.] : OpenStax CNX, 2004.

REFERENCES

1. Abduloieva, O. S., et al. (2017). *The nature of the national natural park "Pyryatynsky"*. Kyiv: Talkom.
2. Podobailo, A. V. (2008) The fish population of the middle reaches of the river Uday. *Modern problems of theoretical and practical ichthyology: I Mizhnarodna nauk.-praktych. konf.* Kaniv, 115.
3. Hlotova, N., Kutsokon, Yu., & Podobaylo, A. (2012). Distribution of small-scale fish population in the shallow waters of the Uday River national natural park "Pyryatynsky". *Visnyk of the Taras Shevchenko National University of Kyiv*. 61, 10-11.
4. Koshovyi, I., Podobaylo, A., & Kutsokon, Yu. (2015). Monitoring the ichthyofauna of the river. Take it within the limits of the National Nature Park "Pyryatynsky". *Modern problems of theoretical and practical ichthyology: VIII Mizhnarodna nauk.-praktych. konf.* Kherson, 100-102.
5. Koshovyi, I., & Podobaylo, A. (2017). Relative number and distribution of hirschak (*Rhodeus amarus* (Bloch, 1782)) in the rivers of the National Nature Park "Pyryatynsky". *NATURA 2000 network as an innovative system for the protection of rare species and habitats in Ukraine. Materials of the scientific and practical seminar*, 59-63.
6. *Chronicle of the National Natural Park "Pyryatynsky"*. Manuscript (2016). Vol. 5.
7. Koblickaja, A. F. (1981). *Opredelitel' molodi presnovodnyh ryb*. Moskva: Legkaja i pishhevaja promyshlennost'.
8. Movchan, Yu. V. (2011). *Ryby Ukrainy (vyznachnyk-dovidnyk)*. Kyiv: Zoloti vorota.
9. Kosco, J. (2007). Zmeny ichtyocenu povodia Torysy s dorazom na chranene a invazne druhi. *Natura Carpatica*, XLVIII, 127-140.
10. Harrison, I., Laverty, M., & Sterling, E. (2004). *Species Diversity*. [S. l.] : OpenStax CNX.

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 26-48
DOI: 10.15407/fsu2018.04.026
УДК: 639.3:595.142.39

Received 03.09.18
Received in revised form 18.09.18
Accepted 24.10.18

RED CALIFORNIAN EARTHWORM (*EISENIA FOETIDA ANDREI*) AS A VALUABLE FOOD ITEM IN FISH FARMING (REVIEW)

N. Kolesnyk, kolenataleo@gmail.com, Institute of Fisheries, NAAS, Kyiv
M. Simon, seemann.sm@gmail.com, Institute of Fisheries, NAAS, Kyiv
O. Marenkov, gidrobions@gmail.com, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro
T. Sharamok, sharamok@i.ua, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

Purpose. To analyze a selection of professional literature and summarize the information on the vermiculture of the Red Californian earthworm (*Eisenia foetida andrei*). To present the achievements of modern biotechnology of this species. To consider the features of different cultivation methods, as well as the possibilities and prospects of its use as a food item in aquaculture.

Results. This work contains brief information on the biology and artificial selection of this species of lower invertebrates, its use in fish farming, as well as in other branches of the national economy. Currently, the market presents several hybrids of this species, adapted to local climatic conditions. This is the reason to consider the features of the production characteristics of hybrids of the Red Californian earth worm from different countries.

The article provides recommendations on the specificity of procurement of the breeding culture, optimal methods of further cultivation depending on the needs of the farms, the main requirements for the substrate and feed, as well as methods for assessing the quality of the obtained biomass. Data on the amino acid composition of flour made of the Red Californian earthworm are given, its fodder value in comparison with traditional feeds for fish, and the specifics of feeding various species of fish. The work presents a method for preparation of starter feed for carp fish using technology developed by Yevtushenko M. Yu.

An overview of scientific studies has revealed that the Red Californian earthworm is optimally used not only as a valuable high protein feed for multi-aged fish groups, but also for the production of organic fertilizers – biocompost. The latter was widespread not only in crop production, but also in the recultivation of different soils.

Practical significance. The summarized information will be useful for researchers who are exploring ways to optimize fish feeding. The presented technology of cultivating red Californian earthworms is most palatable for fish farms of different types of aquaculture. Obtaining biocompost as a valuable by-product of vermiculture provides an opportunity for their integrated development and obtaining additional profit.

Key words: red Californian earthworm (*Eisenia foetida andrei*), vermiculture, aquaculture, fodder organisms, biocompost.

ЧЕРВОНІЙ КАЛІФОРНІЙСЬКИЙ ЧЕРВ'ЯК (*EISENIA FOETIDA ANDREI*) — ЦІННИЙ КОРМОВИЙ ОБ'ЄКТ У РИБНИЦТВІ (ОГЛЯД)

Н. Л. Колесник, kolesnik@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

© **N. Kolesnyk, M. Simon, O. Marenkov, T. Sharamok, 2018**

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

О. М. Маренков, gidrobions@gmail.com, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Т. С. Шарамок, sharamok@i.ua, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Мета. Проаналізувати масив спеціальної літератури та узагальнити отриману інформацію щодо вермикультури червоного каліфорнійського черв'яка (*Eisenia foetida andrei*). Дати уявлення щодо досягнення сучасної біотехнології даного виду, розглянути особливості його культивування різними методами, а також можливості і перспективи використання в якості кормового об'єкта в аквакультурі.

Результати. Дана робота містить коротку інформацію з біології та селекції цього виду нижчих безхребетних, його застосування як в рибництві, так і в інших галузях народного господарства. На даний час на ринку представлено кілька його гібридів, пристосованих до місцевих кліматичних умов. Саме тому розглянуто особливості продукційних характеристик гібридів червоного каліфорнійського черв'яка з різних країн.

У статті викладені рекомендації щодо специфіки закупівлі маточної культури, оптимальні методи подальшого культивування в залежності від потреб господарств, основні вимоги до субстрату і корму, а також способи оцінки якості отриманої біомаси. Наведено дані стосовно амінокислотного складу борошна з червоного каліфорнійського черв'яка, показники його кормової цінності в порівнянні з традиційними кормами для риб, специфіки згодовування різним видам риб. Представлено варіант приготування стартового корму для коропових риб за технологією, розробленою М. Ю. Євтушенком.

Огляд наукових праць виявив, що червоного каліфорнійського черв'яка оптимально використовувати не лише в якості цінного високобілкового корму для різновікових груп риб, але й для виробництва органічного добрива — біогумусу. Останній отримав широке поширення не тільки в рослинництві, а й при рекультивації різних ґрунтів.

Практична значимість. Масив узагальненої інформації буде корисним для науковців, які досліджують шляхи оптимізації годівлі риб. Представлена технологія культивування червоного каліфорнійського черв'яка оптимальна для рибницьких господарств різних типів ведення аквакультури. Отримання біогумусу в якості цінного побічного продукту вермикультури дає можливість для їх інтегрованого розвитку і отримання додаткового прибутку.

Ключові слова: червоний каліфорнійський черв'як (*Eisenia foetida andrei*), вермикультура, аквакультура, кормові організми, біогумус.

КРАСНЫЙ КАЛИФОРНИЙСКИЙ ЧЕРВЬ (*EISENIA FOETIDA ANDREI*) — ЦЕННЫЙ КОРМОВОЙ ОБЪЕКТ В РЫБОВОДСТВЕ (ОБЗОР)

Н. Л. Колесник, kolesnik@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН України, г. Київ

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН України, г. Київ

А. Н. Маренков, gidrobions@gmail.com, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, г. Дніпро

Т. С. Шарамок, sharamok@i.ua, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, г. Дніпро

Цель. Проанализировать массив специальной литературы и обобщить полученную информацию касательно вермикультуры красного калифорнийского червя (*Eisenia foetida*

andrei). Представить достижения современной биотехнологии данного вида. Рассмотреть особенности его культивирования различными методами, а также возможности и перспективы использования в качестве кормового объекта в аквакультуре.

Результаты. Данная работа содержит краткую информацию по биологии и селекции этого вида низших беспозвоночных, его применения как в рыбоводстве, так и в других отраслях народного хозяйства. В настоящее время на рынке представлено несколько гибридов этого червя, приспособленных к местным климатическим условиям. Рассмотрены особенности продукционных характеристик гибридов красного калифорнийского червя из разных стран.

В статье изложены рекомендации относительно специфики закупки маточной культуры, оптимальные методы последующего культивирования в зависимости от потребностей хозяйств, основные требования к субстрату и корму, а также способы оценки качества полученной биомассы. Приведены данные по аминокислотному составу муки из красного калифорнийского червя, показатели его кормовой ценности в сравнении с традиционными кормами для рыб, специфике скармливания различным видам рыб. Представлен вариант приготовления стартового корма для карповых рыб по технологии, разработанной Н. Ю. Евтушенко.

Обзор научных трудов выявил, что красного калифорнийского червя оптимально использовать не только в качестве ценного высокобелкового корма для разновозрастных групп рыб, но и для производства органического удобрения — биогумуса. Последний получил широкое распространение не только в растениеводстве, но и при рекультивации различных почв.

Практическая значимость. Массив обобщенной информации будет полезным для ученых, исследующих пути оптимизации кормления рыб. Представленная технология культивирования красного калифорнийского червя оптимальна для рыбоводных хозяйств различных типов ведения аквакультуры. Получение биогумуса в качестве ценного побочного продукта вермикультуры даёт возможность для их интегрированного развития и получения дополнительной прибыли.

Ключевые слова: красный калифорнийский червь (*Eisenia foetida andrei*), вермикультура, аквакультура, кормовые организмы, биогумус.

PROBLEM STATEMENT AND ANALYSIS OF LAST ACHIEVEMENTS AND PUBLICATIONS

Vermiculture is the general name of intensive biotechnology, based on the breeding worms for biomass and organic fertilizer called biocompost. Worms are further used as high-quality protein feed, and biocompost is a valuable fertilizer for plants [1]. Most often, the following *Lumbricidae* species are used for this purpose: *Eisenia foetida* — a manure worm (the most popular and most common species of earthworm) and a red Californian earthworm (*Eisenia foetida andrei*) [2]. Currently, many farms grow different hybrids of these worms, adapted to local climatic conditions. For example, the hybrid “Staratel” was obtained by Russian Professor A. M. Igonin by crossing in 1982 two populations of manure worms: the southern Chui and the northern Vladimirsky one [1]. Domestic hybrids of the red Californian earthworm, as well as worms from European manufacturers, are widely represented on the Ukrainian market, the comparative figures of which are discussed below (Table 1) [3].

The incubation period of cocoons is the time from laying the egg cocoon until larvae appear from it. The shorter this period the higher population productivity. Hatchability rate is the number of viable larvae that emerged from one cocoon. The

term of sexual maturity of compost worms is the number of days after the larva hatching from the cocoon to becoming a mature individual capable of producing offspring [4]. The shorter it is, the more productive the population is.

Table 1. Production characteristics of hybrids of the red Californian earthworm, presented on the Ukrainian market

Production features	Country of origin		
	Hungary	Italy	Ukraine
The number of cocoons, coc. / week.	1	1	0.82
The incubation period, days.	20.3	21.7	23.7
Hatching, larv./coc.	4.7	3.0	2.8
The average weight of an adult worm, g/ind.	0.79	0.66	0.73
The term of puberty, days.	64.9	71.2	67.2

The Red Californian earthworm was bred to accelerate the disposal of organic waste in the late 50s in the United States under the leadership of Thomas Jason Barrett (Thomas J. Barrett, 1884–1975). Working at the University of California, Barrett is the founder of industrial vermicultivation in the United States [1].

The Red Californian earthworm breed is the result of breeding work between a manure worm (*Eisenia foetida*) and a brandling worm (*Eisenia andrei*) from the family of earthworms (*Lumbricidae*) of the suborder of earthworms (*Lumbricina*) [5]. It should be noted that a mixture of closely related species of *E. foetida*, *E. andrei*, *E. veneta* and others is often cultivated in many Vermiculture farms under the trade name "Red Californian earthworm". These species differ from the red Californian earthworm, and it is not easy to distinguish them by morphology. At the same time, it is necessary to take into account that the red Californian earthworm is a breed of intensive type: it is more demanding in terms of feeding and living conditions [6]. Thus, during breeding work, its mobility was reduced, which is convenient when cultivated on vermi farms, but leads to mass death with a decrease in ambient temperature — during frosts it does not go deep into the substrate.

The developed technology of breeding Californian earthworms allowed them to be produced in large quantities and exported to other countries, but their export to the territory of the former USSR was prohibited. Since 1979, the cultivation of the Californian earthworm has acquired significant proportions in Western Europe and Japan [1]. As a result of the selection, a worm was obtained, which differs from its ancestor, the usual earthworm (*Lumbricus terrestris*) in next features [7]:

- reduced mobility (does not attempt to leave the reservoir for cultivation);
- increased vital activity (about 600 kg of biocompost are produced from 1 ton of substrate, and biomass growth is 100 kg);
- increased fertility (up to 22 individuals in a cocoon compared to 3 of an earthworm);
- increased life span (up to 15 years compared to the 4th year of the earthworm);
- high recycling rate (it eats twice as much of its own weight per day).

Californian earthworm is traditionally used for [8]:

- recycling organic waste;
- production of biocompost;
- liquid fertilizer production;
- high-protein feed for fish and animal farming;
- receiving protein flour;
- raw materials for pharmaceuticals (treatment of thrombosis, cancer, trypanosomal infections, microbial infections, as well as diseases of the immune system and inflammation);
- bait for fishing.

Below we consider the main stages of the use of the red Californian earthworm in fish farms: the purchase of brood stock, the actual cultivation and the specificity of the fish feeding.

STUDY RESULTS AND THEIR DISCUSSION

The systematic characteristic of the red Californian earthworm. Domain: eukaryota (*Eukaryota*), kingdom: animals (*Animalia*), group: bilaterians (*Bilateria*), taxon: protostomes (*Protostomia*), clade: spiral (*Lophotrochozoa*), phylum: annelid worms (*Annelida*), class: clitellates (*Clitellata*), subclass: oligochaetal worms (*Oligochaeta*), order: haplotaxids (*Haplotaxida*), suborder: earthworms (*Lumbricina*), family: earthworms (*Lumbricidae*) [3].

Biological characteristic of the red Californian earthworm. The body of a red Californian earthworm is elongated, adults's body is slightly flattened in the middle. The color of the covers varies from dark red to brownish red, sometimes with a pearl shimmer [4]. The body is divided into segments with two setae on each. The number of segments ranges from 101 to 117. The body diameter ranges from 3 to 5 mm, the average length is from 6 to 14 cm. Weight is from 0.4 to 1 g, body temperature is 16–22 ° C. Lifetime is 13–15 years [9]. The dermo-muscular body wall of the earthworm surrounds a body cavity filled with fluid, where internal organs are located (Fig. 1).

Fig. 1. Red Californian earthworm *Eisenia foetida andrei*

a – scheme of the structure; b – view from the ventral side; c – two individuals during copulation; 1 – mouth; 2 – suprapharyngeal and 17 – subpharyngeal ganglia; 3 – "hearts"; 4 – segmental, 5 – dorsal and 15 – ventral blood vessels; 6 – skin; 7 – segmental and 8 – longitudinal muscles; 9 – excretory tube (metanephridium); 10 – setae; 11 – ventral nerve chain; 12 – the stomach; 13 – goiter; 14 – the esophagus; 16 – throat; 18 – clitellum; 19 – male, 20 – female genitals.

The body cavity is divided with transverse partitions into chambers by the number of segments. The cells that make up the partitions make up the third layer — the middle layer. It covers the entire body cavity of the earthworm: surrounds the organs of the digestive system and from the inside covers the skin-muscular sac. This layer of cells is present in all multicellular animals, starting with worms [2].

They feed on decaying plant debris, obtaining them from the soil, passing it through the intestines. Food gets first in the foregut, which consists of the pharynx, esophagus, goiter and stomach, then in the mid-intestine, then in the hind intestine, with ending in the anus [9].

Californian earthworms breathe with whole body surface. The sensory organs are weakly developed, and environmental stimuli are perceived by light-sensitive cells scattered throughout the entire cover. The receptors of touch, taste, smell are also located there. The structure of nervous and blood circulatory systems is the same as in all annelids (see signs of type). In each segment of the worm on the ventral side there is a small ganglion. All ganglia are interconnected, forming the ventral nervous chain. In front of this chain, under the pharynx, there is a large subpharyngeal ganglion, and above the pharynx there is the largest nasopharyngeal ganglion. The epopharyngeal and subpharyngeal ganglia are connected by nerve bridges surrounding the pharynx laterally [4]. Both nerve ganglia and bridges form the pharyngeal nerve ring. The nerves come to the different parts of the body of the worm from all the ganglia. The worm has no special sense organs, but it feels a touch on its body, a taste of food, and distinguishes light from darkness. Irritations are perceived by sensitive skin cells that are connected by nerves to nerve ganglia [9]. Great amount of sensitive cells are located at the front end of the body, and the nerves go from them to the ganglia of the pharyngeal nerve ring. The earthworm's reflexes are much more complex than the reflexes of the coelenterate and flatworm. The earthworm, in contact with the needle, can wriggle in one direction or another, constricting only the front or only the back end of the body. It depends on the more complex structure of its nervous system. They, like the hydra, are capable of regeneration (rebuilds lost or damaged parts of the body) that is a protective function [3].

Reproduction of the Californian earthworm. The Californian earthworm is hermaphrodite and is not capable of self-fertilization. Mature individuals mutually fertilize each other. In front of the body there are the ovaries and testes. Two individuals touch each other with the front ends, where there is a clitellum. By this time, the worm's sperm accumulates in them. Sperm are exchanged: sperm from the clitellum of one individual is transferred to the seminal receptacle of another one [7]. After that, the worms go off. Fertilized eggs are separated from the body of the worms and placed in a protein ring, or capsule (cocoon), which is first yellow and then brown. As a result of mating of two individuals, 2 eggs or capsules are formed, 1 for each of the individuals. Cocoons open after aging in 3–4 weeks (depending on the temperature, humidity and acidity of the substrate). From 2 to 22 individuals are born from each capsule [9]. Cocoons contain liquid rich in protein that feeds young animals by the time of hatching. Young worms are white. Under optimal conditions, maturity begins 2–3 months after leaving the cocoon. The fertility of the Californian earthworm is up to 2 thousand individuals per year. In the cold season, sexual activity decreases, as well as in particularly hot months. The highest sexual activity occurs at a substrate temperature

of 20 ° C. Under optimal conditions, mating can occur every week [8].

Purchase of breeding stock of red Californian earthworm is the first stage of its biotechnology breeding. Worms should be bought along with the substrate only in specialized vermi farms [10]. The seller must have permission to sell worms, issued by the quarantine service. Sometimes nematodes are sold instead of young Californian earthworms, so purchaser should be cautious. The substrate must contain young worms and cocoons. High-quality breeding stock of red Californian earthworm (family) has at least 1500 individuals [11]. Worms must be motile and red. At first they are kept in their native substrate, to get used to the new feed. The seller must inform in detail exactly what the worms ate before selling. Such additional feed should be given to the worms in the new conditions at the first time, gradually giving them other types of feed. At first they are kept in their native substrate, to get used to the new feed. Sometimes nematodes are sold instead of young Californian earthworms. The seller must have permission to sell worms, issued by the quarantine service [12].

Cultivation of the red Californian earthworm is carried out by several methods, based on its ability to spread over three levels of depths. The first level is the surface horizon (5–7 cm); it is a fresh substrate, which is a food for worms. Its quantity is constantly changing, since the worms feed on it constantly, and this layer is applied periodically [13]. The middle level is 10–30 cm; it is the working area where the major amount of worms live. The third level is the accumulator of biocompost; as the worms work it is constantly increasing in height. Based on this zoning and biotechnological requirements, various vermicomposters are most often used; these are boxes (wooden or plastic), storage pits (beds), less often compost heaps or pits [10, 14].

Storage pits, baskets and boxes are used most actively. The main disadvantages of vermicomposting using piles, wedge system and storage pits are: intensive manual labor, large areas, difficulty in maintaining humidity, slow processing of waste, difficulties in collecting vermicompost without worms [10, 12, 15].

There are 2 main types of technology for the cultivation of worms: open one (not indoors, rarely applicable for the Californian earthworm) and closed one (in vermicomposters of various designs). When using any technology, it is necessary to have a stock culture in case of unforeseen circumstances such as the death of the main culture [11, 16].

An open or trench method of growing worms involves breeding worms in piles or storage pits on the ground. The following parameters of storage pits are used: width: 1.2–2 meters; height 20–30 cm; length: any. It is recommended to leave the passage between them of such a width to ensure the maneuverability of the tractor with a trailer. When cultivating worms using this technology, there are two variations. In the first case, a wooden frame with a height of 40 cm is knocked down on the sides of the pile [17]. In the case of using boards, a more favorable microclimate is created for the activity of worms. In the second case, the pile is formed without boards. In this case, labor productivity increases, but the worms poorly process the substrate ventilated from the edges. In the bottom the pile is underlain by plastic wrap to protect against moles. The film must be perforated to drain water. With a large number of moles, a fine-mesh metal net is used [13, 14, 18].

Settling the worm into storage pits. Although the Californian earthworm easily gets used to a different feed, when using different composts we recommend a trial settlement. For this, they a little amount of ready substrate is put into the storage pit and 50-100 adult worms are put there, permissible waste after 24 hours is no more than 10 individuals, otherwise the substrate is not suitable for further settlement. Increased acidity or alkalinity may be the cause of death of worms [12, 19]. It is very important not to allow any contact with the metal, which is a strong oxidizing agent. With increased acidity, limestone or chalk is added, with increased alkalinity – straw, sawdust or tops of plants. The optimum stocking density is from 1 to 3 families per 1 m². The optimal number of adult worms for vermiculture is from 750 to 1500 individuals per 1 m², with a substrate height of 25 cm [13, 18, 20].

Removing worms from storage pit. Breeding Californian earthworms is better to start in the warm season, then after a couple of months can be collected. The worm is chosen in this way: the worms are not fed for 2–3 days to be hungry, then 7–10 cm of fresh compost is put at the top of the pit or box and removed after one day. 60–80% of mature worms enter fresh compost; young worms and cocoons remain in the lower substrate [20, 21]. The removal of worms is repeated several times. Nevertheless, it is not possible to collect all the worms in this way, 3-4% remains in recycled compost, which is already a fertilizer, the biocompost. The collected worms are put in new pits or used in feeding fish [16, 22].

Wintering worm in storage pits. The most significant disadvantage of the Californian earthworm is the weak self-preservation instinct. At negative temperatures, they do not go deep into the ground, gather in one lump and die. It can be concluded that the cultivation of the red Californian earthworm in the winter period is connected with the maintaining optimum temperatures necessary for their vital activity. At a temperature of 14 ° C, the worms stop feeding, at 10 ° C they clean out the digestive tract and fall into anabiosis [19, 21, 23]. To insulate the storage pits, 25–40 cm of fresh compost or fermented manure is laid on them, watered and covered with 40–50 cm of hay or straw. No more than 10 cm of substrate freezing is allowed [18, 19, 24].

The closed method involves the use of containers with lids and an approximate size from 70 x 40 x 15 cm to 100 x 50 x 30 cm. At the bottom of such boxes, several small holes are drilled to drain water during irrigation. The same holes are drilled in the lids for ventilation. Boxes can be placed in piles in any convenient place, protected from direct sunlight, as well as from cold. The optimal location for them are greenhouses or workshops. This method is the most effective for breeding the Californian earthworm and we will take a closer look at it below [11, 16, 25].

The whole space of the shop is filled with racks, at least 100 cm wide (doubled). Single racks 50 cm wide are also used, but they are placed along the walls. There should be a distance of 120 cm between the racks, between their shelves – at least 50–60 cm (depending on the height of the containers). The height of the racks depends on the height of the room. It is best to use perforated boxes for vegetables 60 x 40 x 20 cm and trays 60 x 40 x 10 cm. Plastic is a durable material that is resistant to aggressive media [15, 26]. Ventilation, runoff of excess water and the migration of worms is provided by perforation. The density of worms stocking is 20 thousand worms per one box, and 10 thousand per the tray. All worms must be of different ages: adults 4–8 cm long (3–5%), fry 1.5–2 mm

(60–80%), ring-shaped cocoons 5 mm in diameter from the outside and 3 mm inside [27, 28]. The substrate is poured into containers 5 cm thick. This method of preparation when using 1 m² of floor allows obtaining up to 200 kg of substrate. To make offensive gases not reach the racks, good ventilation is required [14, 2, 28].

Assessment of the state of the worms population is carried out on the basis of growth and development indicators by monthly counting their number and determining the age composition. This is carried out as follows. In different places of the bed (in a staggered order or diagonally), samples of the substrate with worms of 10x10 cm are taken from all its depth. All worms are selected from these samples, their number is calculated and the biomass is determined (that is, weighted). Then the obtained average results are multiplied by 100 and thus the average number and biomass of worms per 1 m² is determined [29]. However, an increase in the mass of worms is not a single indicator. When feeding nutritious food you can get a significant increase in the mass of worms, but they will not put off the cocoons. Worm reproduction is affected by population density. With its increase, the stress from overpopulation negatively affects reproduction. Therefore, during the quantitative recording of the number of worms, the age composition of the population is also determined by counting the cocoons, young and adult worms separately, and the average number of embryos in the cocoons is determined [30]. The ratio of different age groups gives an understanding not only about the general state of the population, but also about the possible future. If adult worms and cocoons predominate over young forms in the population, this indicates that the conditions of vermiculture impede the development of embryos and the appearance of young worms. Correct analysis will provide an opportunity to make changes in the conditions and optimize the parameters of the process of vermiculture [31].

Cultivated worms are not amenable to epizootic diseases. They can die only in violation of the breeding technology. Most often, protein poisoning during the unfinished fermentation of the substrate causes the death of worms. As a result, the worm becomes “acidic” and emits harmful gases that are lethal to other worms [32].

The main requirements for the workshop for the cultivation of the Californian earthworm:

1. Temperature:
 - a) optimal 18 ° C – 25 ° C
 - b) permissible 15 ° C – 30 ° C
 - c) extreme 4 ° C – 35 ° C
2. Illumination
 - a) optimal 60 watts per 20 m².
 - b) maximum up to 80 watts per 20 m².
 - c) minimum 40 watts per 20 m²
3. It should be remembered that direct sunlight is detrimental to worms.
4. Humidity level
 - a) optimal 75–80%
 - b) minimum 65%
 - c) maximum 90%

5. Ventilation: natural or forced, for air exchange not more than 0.5 m / s;

6. Protection against pests: Californian earthworms are a treat for centipedes, ants, moths, rats, moles, shrews, birds, toads, frogs, etc .. The room must not be accessible to them; the floor should be hard (concrete), the walls and the ceiling (concrete, metal) should be impenetrable [14, 23, 31, 33].

The main technological steps in breeding the Californian earthworm are:

1. Preparation of compost (nutrient substrate);
2. Settling worms;
3. Food preparation;
4. Removal of worms;
5. Wintering [11, 16, 24, 29, 34].

Substrate for red Californian earthworm. Basic rules for the preparation of the substrate (compost) for further settlement of the worm:

1. mineral content – up to 10%;
2. The content of crude protein is not more than 25%;
3. Acidity 6.5–7.5 pH;
4. the required humidity of the compost is 70-80%;
5. use only the water settled during 48 hours to moisten the compost;
6. temperature in the compost from 15 to 22 ° C;
7. it is necessary to mix the substrate about twice a week to enrich it with oxygen;
8. It is prohibited to use fresh manure, as in the process of manure burning out, its temperature rises to 70–80 ° C, which leads to the death of the worm;
9. It is not recommended to use old manure that has lain for more than 3 years, because it contains a small amount of nutrients for worms [12, 15, 22, 35, 36].

Cattle and pigs manure, bird droppings are used for the preparation of the substrate for worms. Manure for vermifarming, as a rule, is mixed with various fillers (at least 20–40%, and much more for bird droppings), such as cut straw, last year's grass, leaf litter, cardboard, peat, silt [37]. Peat is good because, having a high moisture capacity, reduces the moisture content of the substrate, absorbs and retains ammonia and other aggressive substances [19, 27]. Mixing different substrates is good for breeding worms. Mixing pig and cow manure (respectively, with fillers) gives good results [32]. Horse manure the most favorably effects the development of worms, but adding cow manure (about 25%) to it gives an even greater positive effect than single horse manure. Fresh manure is unsuitable due to the large amount of ammonia and chlorides [14, 23, 31]. Liquid manure is mixed with the same amount (by weight) of straw, hay, sawdust, etc. Organic for worms is composted only in storage pits or heaps, 1.5–2 m high, but in no case in pits [17, 21]. Complex mineral fertilizers are applied to composted organics at the rate of: 2–3 kg of double superphosphate (a mixture of $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ and CaSO_4), 1 kg of potassium sulfate (K_2SO_4), 2–3 kg of ammonium sulfate ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$), 1 kg of magnesium sulfate (MgSO_4), 60 g of boric acid (H_3BO_3), 3-5 kg of lime or dolomite flour per 1 t of composted organics [25, 36]. Storage pit should be well moistened (up to 60% humidity) and covered with ready compost or a 5–20 cm layer of soil in summer or 30–40 cm in winter [33]. The compost heap begins to heat up and in 5–7 days in summer the temperature reaches + 53 ° C and higher. At this temperature, the destruction of weed seeds, helminth eggs, pathogenic microflora, nematodes occurs

within 5–7 days, and the substrate is ready in 45–60 days [25, 28]. The main criterion for substrate readiness is the absence of ammonia odor in it. The readiness of the substrate is determined in the following way: a dozen worms are put on a wet substrate, if they crawl into the substrate within a few minutes, then it is ready to be occupied. If the worms lie on the surface and lift the heads up, then the substrate requires additional composting [34, 35].

Feed for worms. Naturally, all the food given to the worms should be processed in a meat grinder or chopped in another way [38]. The prepared feed is laid out in boxes of 5 cm each. It is recommended to leave a free space of 3–5 cm wide, so in case if for any reason fermentation processes begin in the feed mixture with release of poisonous gases, the worms could move into this safe zone [39, 40]. The worms should be fed once a week, adding 5 centimeters of food substrate. Under optimal temperature conditions, worms can live without food for several months, so if there is no certainty that the fermentation processes in the substrate have stopped, it is better to wait 7–10 days before giving it to the worms [33, 41]. Organic waste is used as feed: manure, bird droppings, plant haulm, fallen leaves, straw, wood chips, sawdust, food vegetable waste, cardboard, paper, etc. [18, 26, 42]. Citrus and meat products should be completely excluded from the diet of worms. Feeding needs to be rationed, since large doses of feed are extremely harmful for worms, because fermentation processes cause oxidation of the substrate. The addition of egg shells or sand to ground food favorably effects the digestion of worms [22, 36, 43].

The specificity of feeding the fish with the red Californian worm is caused by the fact that it is a highly nutritious food organism with convenient storage requirements for its by-products [44]. It is used for feeding not only breeders and fingerlings, but also as a promising component of feed for early juvenile fish [45]. It should be noted that feeding with the Californian worm in a live form contributes to the development of feeding behavior in juvenile fish [46]. The biomass of this worm is used in feeding fish raw, dry and boiled state.

The chemical composition of the Californian worm has the highest energy value, mainly due to the high protein content and its amino acid composition in comparison with other important natural food organisms for fish (Tables 2, 3) [47, 48].

Table 2. Comparative chemical composition of food organisms,% of dry matter

Organisms	Proteins	Fats	Carbohydrates
Red Californian earthworm (<i>Eisenia foetida andrei</i>)	51.1	5.67	19.83
Common earthworm (<i>Lumbricus terrestris</i>)	61.3	9.0	3.0
Waterflea (<i>Daphnia pulex</i>)	58.04	6.58	13.63
<i>Daphnia magna</i>	44.61	5.15	16.75
Rotifers (<i>Rotifera</i> , <i>Rotatoria</i>)	49.7	7.37	14.0

The body of the Californian earthworm contains 89.37% of dry matter, and in the common earthworm contains 92.9%. For comparison, in chironomid larvae, this indicator ranges from 12.94 to 15.12% [49, 50].

Table 3. Comparative content of essential amino acids in invertebrates, g/100g

Organisms	Amino acids					
	Arginine	Histidine	Tryptophan	Methionine	Cystine	Tyrosine
Waterflee (<i>Daphnia</i>)	10.92	2.69	3.62	3.45	1.17	4.27
Chironomid larvae (<i>Chironomidae</i>)	4.75	2.38	2.06	1.48	1.05	3.16
Caddis worm Larvae (<i>Trichoptera</i>)	5.36	2.28	2.98	1.72	1.21	3.34
Pot worms (<i>Enchytraeidae</i>)	5.62	1.86	1.79	1.69	1.05	3.37
Pond snail (<i>Lymnaea ovata</i>)	4.44	1.33	–	1.68	1.17	2.45
Common pond snail (<i>Limnaea stagnalis</i>)	4.92	1.24	–	1.04	1.02	2.24
Freshwater shrimp (<i>Amphipoda</i>)	4.76	1.69	1.72	1.56	0.99	2.24
Hemipterans (<i>Corixidae</i>)	4.50	2.15	1.64	2.02	1.92	3.04
Californian earthworm (<i>Eisenia foetida andrei</i>)	3.96	1.18	1.05	1.35	0.45	2.21

In qualitative evaluation in points of protein products, the meat of worms exceeds that of fish and pork, as well as soybean and is almost as good as veal meat [51].

The raw biomass of the Californian earthworm has a rich vitamin content, as well as high total lipids, which make up 9 – 11% of the wet mass [46]. The share of structural lipids, in particular, phospholipids, reaches 40 – 55% [53]. Phospholipids contain phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, phosphatidylserine, phosphatidylinositol, lysophosphatidylcholine [50]. In the raw biomass of this invertebrate there are both saturated (47 – 54%) and unsaturated fatty acids, among which monoenoic acids are equal to 25%, and polyene acids – 13% [50]. In addition, there is significant amount of branched chain fatty acids, which are common for microorganisms (up to 23%), as well as with an odd number of atoms (up to 25%) [53].

Thus, the biomass of the Californian earthworm in chemical composition of the body and nutritional value fully meets the physiological needs of fish for nutrients [48].

When using raw biomass it is crushed to a homogeneous state, making sure that the fraction size is not more than 0.5 mm, because otherwise it will not be available for the fish larvae to eat [47].

Homogeneous mass can be fed separately or added into the combined feed [48]. The chemical composition of the raw crushed biomass of the Californian earthworm does not change after drying and fully satisfies the nutritional needs of the larvae for protein, lipids and vitamins [44]. The table 3 shows that the stuffing of worms contains protein 3 times more than cow milk, and only a third less than pigs meat [49].

Table 4. Comparative composition of raw biomass of worms, cow milk and animal meat, %

Component	Worm	Cow milk	Meat		
			Pork	Veal	Chicken
Water	85.0	88.0	52.0	51.0	65.0
Fat	1.0	3.6	29.0	25.1	5.4
Protein	9.8	3.2	15.1	17.1	24.1
Ash	0.8	0.8	2.8	4.2	4.1

The dry biomass of the Californian eartworm consists of 70% protein with a greater amount of essential amino acids than meat and fish products, especially lysine (8%) and methionine (3%) prevail [50]. The Californian earthworm as a food organism contains 67–72% of protein, 7–19% of fats, 18–20% of carbohydrates, 2–3% of mineral substances, and also biologically active substances. The value of feed when adding worm biomass increases by 20–25%. The worm is also processed into protein flour containing 67% protein and 20% of fat [51]. The technology of drying the worms biomass and obtaining protein flour is not significantly different from the technology of preparing fish and meat and bone flour or milk powder.

At the same time, it should be noted that when feeding young fish with dry biomass of the Californian earthworm, there is a somewhat smaller absolute and relative growth than when using raw biomass [50]. This is due to the fact that during the drying of crushed worms biomass at a temperature of 100 ° C, a certain amount of biologically active substances contained in the raw biomass and necessary for the full development of juvenile fish are destroyed [51]. This is especially about enzymes involved in the digestion of protein, fat and carbohydrate components, which come in the composition of starter feed mixtures [52].

To obtain dry biomass, worms are collected, kept for a day without a food substrate for emptying the intestine and cleaning the body surface from it, dried in drying chambers at a temperature of up to 65 ° C and crushed in special threshers to 0.1–0,5 mm fractions receiving flour. It is added into the compound feed or fed separately, according to the developed standards for feeding different species of fish with natural food [53]. The value of vegetable feed when adding dry worm biomass increases by 20–25%. This is due to the fact that it is rich in protein with a greater amount of essential amino acids than meat and fish products [54]. Lysine (8%) and methionine (3%) especially prevail among them – Table 5.

Table 5. Comparison of the amino acid composition of the dry biomass of the Californian earthworm and other fish feed [51, 53]

Amino acids	Feed				
	Worm flour	Fish flour	Meat flour	Casein	Soy protein
Asparagin	12.07	12.33	11.95	7.19	7.45
Glutamine	17.76	21.48	22.69	22.41	9.71
Serine	8.53	6.61	6.21	6.9	9.13
Glycine	13.94	8.75	9.33	4.48	7.17

Continue of table 5

Amino acids	Feed				
	Worm flour	Fish flour	Meat flour	Casein	Soy protein
Histidine	4.23	2.92	4.07	2.91	2.78
Threonine	8.11	3.76	7.22	6.27	4.37
Alanine	9.83	10.27	10.66	4.96	7.53
Proline	11.11	6.88	8.36	14.36	5.63
Tyrosine	3.96	3.34	3.35	3.83	1.29
Valine	6.81	7.34	7.47	5.95	3.9
Methionine	4.47	3.92	3.35	2.83	–
Isoleucine	3.92	5.51	5.97	4.83	5.58
Leucine	8.74	11.56	12.35	10.77	7.51
Phenylalanine	2.88	4.85	7.34	7,41	2.8
Lysine	9.11	10,83	10,74	4,94	6,38
Tryptophan	8,57	8,76	6,71	–	–
Arginine	7,98	6.27	6.9	–	6,31

The addition of feed from the biomass of Californian earthworms improves the taste and presentation of fish meat [50, 55].

Being dried, but not chopped, the biomass of worms contains more than two times more protein than pork, beef, milk and a little more than chicken meat (Table 5) [56].

Table 6. Comparative composition of dry biomass of worms, cow milk and animal meat, %

Component	Worm	Cow milk	Meat		
			Pork	Veal	Chicken
Water	8.0	9.0	7.9	8.0	7.9
Fat	10,1	30,0	50,3	50,8	18,3
Protein	69,1	26,1	30,0	28,8	60,0
Other components	12.8	34,9	11,8	12,4	13,8

In this state, the biomass of worms is stored for a long period (up to 3–6 months, with no signs of caking, or deterioration) in dry and cool rooms in plastic bags, which makes it possible to keep this feed raw material in the season favorable for the cultivation of the Californian earthworm [51, 57].

The manufacturing techniques of starter feed for fish from the red Californian earthworm, developed by M.Yu. Evtushenko, provide feeding the larvae with 50% resorption of yolk, with special microgranules from crushed worms [60]. The feed amount is 7% by weight of the larvae body, they are fed three times a day, during the daylight hours. Thus during the first 10 days grain diameter is 0.2 - 0.4 mm, and the following 10 days, the figure is 0.5 - 0.7 mm. This feeding regime promotes complete and gradual filling larvae intestinal tract, and, accordingly, complete digestion of feed.

The main point of the technology developed by M.Yu. Evtushenko is that, first of all, the collected worms are exposed to low temperature (-15 - -18 ° C) by freezing them in the freezer [58]. The advantage of the cooling factor, which is absent in other technologies, is that it leads to a gradual decrease in the body's metabolism, which over time is almost completely inhibited, and the animals fall into a state of anabiosis. In this case, synthesis of the mucopolysaccharide component is minimized, which is the natural reaction of the worm's organism to stress, including when exposed to high temperatures during drying. However, even in small quantities, it can inhibit the process of digestion in young fish [50]. Therefore, at the next stage of the process, in order to remove the formed substances of mucopolysaccharide origin and stabilize the hydrolytic enzymes and their complexes, the frozen biomass of worms is treated with a cooled, non-ionic, organic solvent, often with acetone. For this, it is crushed and placed into a container, which is then poured with cooled acetone, in the ratio of the worms biomass to the acetone volume as 1:2. Then it is mixed for 30 ', while acetone displaces water in bound form from the tissues, thereby eliminating the immobilization of its molecules. In addition, this process contributes to the stabilization and preservation of the native properties and structure of proteins and their complexes (including hydrolytic enzymes), does not cause the destruction of the tissues by hydrolysis enzymes and allows maintaining the nutritional properties of the food made from them for a long time. Further, the wasted acetone is separated from the biomass, and it is dried for 120 ', in a stream of warm air, at a temperature of 40 ° C [58]. The dried biomass is chopped and dried again during 60 'at the above mentioned temperature.

For starter feed pellets with defined size dried powder mass is sieved through a sieve of desired mesh size. Thus, feed fraction with beads of any size can be obtained from the dried and fragmented biomass [55].

The starter feed fabricated using this technology is long-storage, and the technology received the patent of Ukraine under No. 32168 dated 12.05.2008 [58].

Biocompost is a highly valuable product of the processing of various kinds of organic waste by worms. Its value is determined by the high content of nutrients, and the appearance is a dense black or brown (depending on the type of manure or organic residues) lumps without smell. It surpasses traditional organic fertilizers in effect on the growth, development and yield of various crops [59]. In agrochemical indicators, biocompost is better than humus traditionally used in garden plots (Table 7).

Table 7. Agrochemical indicators of biocompost and humus (%)

Composition	Biocompost	Humus
Organic matter	45.7	23.6
Humic acids	3.3	2.3
Fulvic acids	2.3	0,6
Organic carbon	3.26	1,7
Nitrogen	3.16	1,54
C: N ratio	1.03	1,10

Biocompost contains significantly more nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, and almost all of the trace minerals necessary for plants. The use of biocompost

contributes to increasing the yield of maize and cereals by 30–40%, potatoes by 30–70%, and vegetable crops by 35–70% [60]. Moreover, the grown products meet the sanitary and hygienic requirements and are recommended for the nutrition of nursing mothers, for dietary and baby food. Given the low rate of application of biocompost (2.5–3.0 t/ha at a full and 200–300 kg/ha at a local application), the material and labor costs per unit area compared to the costs of using traditional organic fertilizers are reduced by 3 – 5 times [61]. At the same time, net income, for example, when growing vegetables using biocompost as an organic fertilizer, is 3–4 times higher than using bird droppings, and 20 times higher than using cattle manure [62]. Biocompost contributes to the formation of an agronomically valuable soil structure, creates an optimal composition of the soil solution; nutrients of biocompost, balanced by NPK and microelements, are slowly soluble and provide long-term consumption by plants.

CONCLUSION AND PERSPECTIVES OF FURTHER DEVELOPMENT

The Red Californian earthworm (*Eisenia foetida andrei*) is an intense breed bred by hybridization of manure worm (*Eisenia foetida*) and brandling worm (*Eisenia andrei*). Like any intensive breed, it has its own advantages (reduced mobility, increased vital activity and fertility, high recycling rate and nutritional value) and disadvantages (more demanding in terms of feeding and living conditions) compared to wild species. It should be noted that under the trade name "red Californian earthworm" unscrupulous vermi-farms sell wild closely related species, such as *E. foetida*, *E. andrei*, *E. veneta*, etc. Only red Californian earthworm is a highly valuable food for fish due to its chemical composition (rich in protein), and due to the promotion of the development of feeding behavior in young fish. The dry biomass of the Californian earthworm consists of 70% protein with more essential amino acids, especially lysine and methionine, than meat and fish products. There are 2 main types of technology for the cultivation of worms: open one (in storage pits) and closed one (in vermicomposters). Cultivated worms are not amenable to epizootic diseases, their death can be only caused by violations of breeding technology. Thus, the red Californian earthworm is a promising food organism for fish farming.

BIBLIOGRAPHY

1. Spurgeon D. J., Hopkins S. P. The development of genetically inherited resistance to zinc in laboratory selected generations of the earthworm *Eisenia fetida* // Environment Pollution. 2000. № 109. P. 19.
2. Meyer W. J., Bouwman H. Suitable characters for selective breeding in *Eisenia fetida* (*Oligochaeta*) // Biology Fertility Soil. 1995. № 20. P. 53–56.
3. Кодолова О. П., Стриганова Б. Р., Сидорова Т. Н. Сравнительное исследование репродукционного потенциала локальных поселений компостного червя *Eisenia fetida* (*Oligochaeta*, *Lumbricidae*) // Известия АН СССР. 1993. № 4. С. 558–568. (Сер. биол.).
4. Хабарова Т. В., Тришкин И. Б., Кочетков А. С. Способ и технология промышленного вермикомпостирования отходов сельскохозяйственного производства // Вестник Совета молодых ученых Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева. 2016. № 1(2). С. 10–15.

5. Агроэкологические аспекты производства и применения вермикомпостов / Еськов А. И. и др. // Достижения науки и техники АПК. 2004. № 4. С. 6—8.
6. Тимофеева С. С. Экологическая биотехнология. Иркутск : ИрГТУ, 2009. 210 с.
7. Мельник И. А. Дождевые черви на службе сельского хозяйства // Сельскохозяйственная биология. 1990. № 5. С. 160—163.
8. Стриганова Б. Р. Влияние дождевых червей на динамику почвенных процессов // Биодинамика почв. Таллинн, 1988. 12 с.
9. Горчаков Я. В., Дурманов Д. Н. Мировое органическое земледелие XXI века. Москва : ПАНМС. 2002. 402 с.
10. Покровская С. Ф. Использование дождевых червей для переработки органических отходов и повышения плодородия (вермикультура). Москва : ВНИИТЭИагропром, 1991. 37 с.
11. Потапов Д. С., Стом Д. И., Балаян А. Э. Новые методы оптимизации вермикультивирования // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 1998. № 2(8). С. 35—40.
12. Просянных Е. В., Трувеллер К. А., Купцова Н. Ю. Эколого-продукционная разнокачественность компостных червей по отношению к разным субстратам // Агрохимический вестник. 2007. № 1. С. 21—24.
13. Просянных Е. В., Трувеллер К. А., Купцова Н. Ю. Характеристика вермикомпостов различных популяций дождевых компостных червей (*Eisenia andrei*, *Eisenia foetida*) // Агрохимия. 2008. № 12. С. 40—44.
14. Просянных Е. В., Кислова Е. Н., Попкович Л. В. Производственно-экономическая оценка вермиферологии // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2007. № 4. С. 29—31.
15. Материало- и энергосберегающие технологические приемы вермикомпостирования / Просянных Е. В. и др. // АгроXXI. 2009. № 46. С. 41—43.
16. Стадник Б. Г., Бакулов И. А. Новое направление в биологизации земледелия // Химия в сельском хозяйстве. 1994. № 3. С. 23—24.
17. Терещенко П. В. Агроэкология. Модуль 10. Вермикультура и биогумус. Пущино : ОНТИ ПНЦ РАН, 2005. 50 с.
18. Купцова Н. Ю. Сравнительная оценка дождевых компостных червей, культивируемых в России : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук : спец. 03.00.16 «Экология». Брянск, 2008. 20 с.
19. Трувеллер К. А., Нефедов Г. Н. Ускоренное получение гибридных местных популяций компостных червей *Eisenia foetida* (*Lumbricidae*, *Oligochaeta*) для экоциклинга органических отходов // Дождевые черви и плодородие почв : I междунар. конф. : тезисы докл. Владимир, Россия, 2002. С. 7—8.
20. Перспективы развития вермикультуры на основе селекции / Андреев А. Г. и др. // Междунар. научн.-практ. конф. : тезисы докл. Днепропетровск, 1992. 20 с.
21. Тиунов А. В. Вермикомпост, вермикомпостирование и компостные черви: направление научных исследований в последнее десятилетие // Дождевые черви и плодородие почв : II Междунар. конф. : тезисы докл. Ковров, Россия, 2004. С. 9—11.
22. Стриганова Б. Р. Питание почвенных сапрофагов. Москва : Наука, 1980. 244 с.
23. Suzuki K. T. Quantification and characterization of metallothionein in tissues of lower vertebrates and invertebrates // Experientia. 1987. № 52. P. 265—272.

24. Дождевой червь — сокровищница природы, или в мире инноваций / В. С. Федюкин и др. // Дождевые черви и плодородие почв : II Междунар. конф. : тезисы докл. Ковров, Россия, 2004. С. 46—47.
25. Zhenjun S. Фармацевтическая ценность и использование дождевых червей в Китае // Дождевые черви и плодородие почв : II Междунар. конф. : тезисы докл. Ковров, Россия, 2004. С. 87—93.
26. Zhenjun S. Vermiculture and vermiprotein. [S. l.] : China Agricultural University Press, 2003. 367 p.
27. Садчиков А. П. Культивирование водных и наземных беспозвоночных (принципы и методы). Москва : МАКС Пресс, 2009. 272 с.
28. Дмитриева В. И., Степанова А. И. Вермикультивирование: теория, опыт, практика. Якутск : Сахаполиграфиздат, 2000. 120 с.
29. Мельник И. А. Дождевые черви на службе сельского хозяйства // Сельскохозяйственная биология. 1990. № 5. С. 160—163.
30. Игонин А. М. Как повысить плодородие почвы в десятки раз с помощью дождевых червей. Москва : Маркетинг, 1995. 88 с.
31. Городний Н. М., Мельник И. А., Повхан М. Ф. Биоконверсия органических отходов в биодинамическом хозяйстве. Киев : Урожай, 1990. 78 с.
32. Покровская С. Ф. Использование дождевых червей для переработки органических отходов и повышения плодородия почв (вермикультура). Москва : Агропромиздат, 1991. 32 с.
33. Tomati U., Grappelli A., Galli E. The hormone-like effect of earthworms on plant growth // Biology and Fertility of Soils. 1988. № 4. P. 288—294.
34. Вермикомпостирование и вермикультивирование как основа экологического земледелия в XXI веке: проблемы, перспективы, достижения / ред. Максимова С. Л. Минск : Институт зоологии НАН Беларуси, 2007. 164 с.
35. Максимова С. Л., Босак В. Н. Вермикомпостирование и вермикультивирование: состояние, проблемы и перспективы // Белорусское сельское хозяйство. 2007. № 9. С. 65—66.
36. Цыганов А. Р. Технология приготовления и применения вермикомпоста (биогумуса). Горки : БГСХА, 2002. 40 с.
37. Деревягин В. А., Деревягина Р. Н., Кравченко М. Е. Переработка органического сырья // Химизация сельского хозяйства. 1989. № 7. С. 25—27.
38. Косолапова А. И., Смышляев Э. И., Косолапов И. Н. Вермикультура и ее возможности. Рязань : Рязан. регион. ин-т повышения «квалификации и агробизнеса, Рязан. картонно-рубероид. з-д, 1996. 71 с.
39. Огороднік О. О., Гарбар О. В., Алпатова О. М. Порівняльний аналіз генетичної структури природних популяцій *Eisenia Foetida* (Savigny, 1826) та об'єктів вермікультури // Біологічні дослідження. 2014. С. 176—177.
40. Fluorescence fingerprints of *Eisenia fetida* and *Eisenia Andrei* / Albani J. R. et al. // Photochem. Photobiology. 2003. Vol. 78. P. 599—602.
41. Edwards C. A. Introduction, history, and potential of vermicomposting technology // Vermiculture Technology. Earthworms, Organic Wastes, and Environmental Management. Boca Raton, London, New York : CRC Press, 2011. P. 11—21 с.
42. Venter J. M., Reinecke A. J. The life cycle of the compost worm *Eisenia fetida* (*Oligochaeta*) // S. Afr. J. Zool. 1988. Vol. 3. P. 161—165.
43. Тимофеева С. С. Экологическая биотехнология. Иркутск : ИГТУ, 1999. 210 с.
44. Хижняк М. І., Федоренко В. Д. Рекомендації з виробництва та використання продукції вермікультури у ставовому рибництві. Київ : Урожай, 2005. 25 с.

45. Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / Андрющенко А. І. та ін. // Рибне господарство. 1998. Вип. 49–50. С. 3—119.
46. Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / Андрющенко А. І. та ін. ; ред. Гринжевський М. В. Київ, 1998. 124 с.
47. Городний Н. М. Биоконверсия в управлении агроэкосистемами. Киев : НАУ, 1996. 230 с.
48. Вермикультура: производство и использование / Повхан М. Ф. и др. Киев : УкрИНТЭИ, 1994. 128 с.
49. Желтов Ю. А. Сравнительная оценка некоторых кормов животного происхождения и их использование в кормлении рыб // Проблемы и перспективы развития аквакультуры в России : науч.-практ. конф. : матер. докл. Адлер, 2001. С. 175—177.
50. Рекомендації з використання місцевих та нетрадиційних кормів для годівлі коропа у ставах / Желтов Ю. О. та ін. Київ : Урожай, 1999. 43 с.
51. Мельник И. А. Приготовление вермикомпоста и разведение дождевых червей // Химизация сельского хозяйства. 1991. № 1. С. 44—50.
52. Мельник І. П., Карпець І. П. Вермикультура як засіб виробництва біогумусу, кормового білка й оздоровлення навколишнього середовища. Івано-Франківськ, 1991. 71 с.
53. Свеженцов А. А. Нетрадиційні кормові добавки // Тваринництво України. 2001. № 1. С. 21—23.
54. К технологии разведения калифорнийских червей в рыбоводстве / Харитонов Н. Н. и др. // Повышение качества рыбной продукции водоемов : Междун. конф. : матер. Киев, 1996. С. 48—49.
55. Хижняк М. И. Вермикультура в рыбоводстве // Рибне господарство. 2000. Вип. 56. С. 132—136.
56. Биотехнология кормов и кормовых добавок / Петенко А. И. и др. Краснодар : Кубанский ГАУ, 2011. 454 с.
57. Підрошування личинок коропа на сухій подрібненій біомасі каліфорнійського черв'яка / Хижняк М. І. та ін. // Рибне господарство. 2003. Вип. 62. С. 46—48.
58. Вирощування цьоголіток коропа на біомасі каліфорнійського черв'яка / М. І. Хижняк та ін. // Рибне господарство. 2002. Вип. 62. С. 49—51.
59. Годівля риб / Шерман І. М. та ін. Київ : Вища освіта, 2001. 269 с.
60. Кошаев А. Г., Кошаева О. В., Елисеев М. А. Биотехнология вермикультивирования органических отходов // Научный журнал КубГАУ. 2014. № 95. С. 594—693.
61. Терещенко П. В. Вермикультура и биогумус. Пушино : Департамент кадровой политики и образования МСХ и продовольствия РФ, 2000. 51 с.
62. Просяников Е. В., Еремин А. В., Мешков И. И. Словарь-справочник по вермитехнологии : Разведение дождевых червей, производство эффективного органического удобрения и ценного корма. Брянск : Брян. гос. с.-х. акад. и др., 2000. 87 с.
63. Хотько Э. И., Шаванова Т. М. Разведение местной популяции навозного червя *Eisenia foetida* Sav. в условиях Беларуси : метод. рекомендации. Минск : Право и экономика, 2005. 25 с.
64. Євтушенко М. Ю. Технологія виготовлення стартового корму для риб із гібрида каліфорнійського черв'яка // Рибогосподарська наука України. 2011. № 3(17). С. 91—100.

REFERENCES

1. Spurgeon, D. J., & Hopkins, S. P. (2000). The development of genetically inherited resistance to zinc in laboratory selected generations of the earthworm *Eisenia fetida*. *Environment Pollution*, 109, 19.
2. Meyer, W. J., & Bouwman, H. (1995). Suitable characters for selective breeding in *Eisenia fetida* (*Oligochaeta*). *Biology Fertility Soil*, 20, 53-56.
3. Kodolova, O. P., Striganova, B. R., & Sidorova, T. N. (1993). Sravnitel'noe issledovanie reprodukcionnogo potentsiala lokal'nyh poselenij kompostnogo chervja *Eisenia fetida* (*Oligochaeta, Lumbricidae*). *Izvestija AN SSSR. Ser. biol.*, 4, 558-568.
4. Habarova, T. V., Trishkin, I. B., & Kochetkov, A. S. (2016). Spособ i tehnologija promyshlennogo vermikompostirovanija othodov sel'sko-hozjajstvennogo proizvodstva. *Vestnik Soveta molodyh uchenyh Rjazanskogo gosudarstvennogo agrotehnologicheskogo universiteta imeni P. A. Kostycheva*, 1(2), 10-15.
5. Es'kov, A. I., Kasatikov, V. A., Rusakova, I. V., & Kravchenko, M. E. (2004). Agrojekologicheskie aspekty proizvodstva i primenenija vermikompostov. *Dostizhenija nauki i tehniki APK*, 4, 6-8.
6. Timofeeva, S. S. (2009). *Jekologicheskaja biotehnologija*. Irkutsk: IrGTU.
7. Mel'nik, I. A. (1990). Dozhdevye chervi na sluzhbe sel'skogo hozjajstva. *Sel'skohozjajstvennaja biologija*, 5, 160-163.
8. Striganova, B. R. (1988). Vlijanie dozhdevykh chervej na dinamiku pochvennykh processov. *Biodinamika pochv*. Tallinn.
9. Gorchakov, Ja. V., & Durmanov, D. N. (2002). *Mirovoe organicheskoe zemledelie XXI veka*. Moskva : PANMS.
10. Pokrovskaja, S. F. (1991). Ispol'zovanie dozhdevykh chervej dlja pererabotki organicheskikh othodov i povyshenija plodorodija (vermikul'tura). Moskva: VNIITJelagroprom.
11. Potapov, D. S., Stom, D. I., & Balajan, A. Je. (1998). Novye metody optimizacii vermikul'tivirovanija. *Bjulleten' VSNC SO RAMN*, №2(8), 35-40.
12. Prosjannikov, E. V., Truveller, K. A., & Kupcova, N. Ju. (2007). Jekologo-produkcionnaja raznokachestvennost' kompostnykh chervej po otnosheniju k raznym substratam. *Agrohimicheskij vestnik*, 1, 21-24.
13. Prosjannikov, E. V., Truveller, K. A., & Kupcova, N. Ju. (2008). Harakteristika vermikompostov razlichnykh populjacij dozhdevykh kompostnykh chervej (*Eisenia andrei*, *Eisenia foetida*). *Agrohimija*, 12, 40-44.
14. Prosjannikov, E. V., Kislova E. N., & Popkovich, L. V. (2007). Proizvodstvenno-jekonomicheskaja ocenka vermitehnologii. *Vestnik Rossijskoj akademii sel'skohozjajstvennykh nauk*, 4, 29-31.
15. Prosjannikov, E. V., Popkovich, L. V., Bovkun, G. F., & Kislova, E. N. (2009). Materialo- i jenergosberegajushhie tehnologicheskie priemy vermikompostirovanija. *AgroXXI*, 46, 41-43.
16. Stadnik, B. G., & Bakulov, I. A. (1994). Novoe napravlenie v biologizacii zemledelija. *Himija v sel'skom hozjajstve*, 3, 23-24.
17. Tereshhenko, P. V. (2005). Agrojekologija. Modul' 10. *Vermikul'tura i biogumus*. Pushhino: ONTI PNC RAN, 50.
18. Kupcova, N. Ju. (2008). Sravnitel'naja ocenka dozhdevykh kompostnykh chervej, kul'tiviruemykh v Rossii. *Extended abstract of candidate's thesis*. Brjansk.

19. Truveler, K. A., & Nefedov, G. N. (2002). Uskorennoe poluchenie gibridnyh mestnyh populacij kompostnyh chervej *Eisenia foetida* (Lumbricidae, Oligochaeta) dlja jekociklinga organicheskikh othodov. *Dozhdevye chervi i plodorodie pochv: I mezhdunar. konf.* Vladimir, Rossiya, 7-8.
20. Andreev, A. G., Kodolova, O. P., Nefjodov, G. N., Truveler, K. A., & Serkutan, K. N. (1992). *Perspektivy razvitiya vermikul'tury na osnove selekcii: Mezhdunar. nauchn.-prakt. konf.* Dnepropetrovsk, 20.
21. Tiunov, A. V. (2004). Vermikompost, vermikompostirovanie i kompostnye chervi: napravlenie nauchnyh issledovanij v poslednee desjatiletie. *Dozhdevye chervi i plodorodie pochv: II mezhdunar. konf.* Kovrov, Rossiya, 9-11.
22. Striganova, B. R. (1980). *Pitanie pochvennyh saprofagov.* Moskva: Nauka.
23. Suzuki, K. T. (1987). Quantification and characterization of metallothionein in tissues of lower vertebrates and invertebrates. *Experientia*, 52, 265-272.
24. Fedjukin, V. S., Fartukov, S. V., Chubatova, S. A., Golubkov, A. S. Shalanda, A.V., Surova, E. P., & Sholohov, I. V. (2004). Dozhdevoy cherv' – sokrovishchnitsa prirody, ili v mire innovatsiy. *Dozhdevye chervi i plodorodie pochv: II mezhdunar. konf.* Kovrov, Rossiya. 46-47.
25. Zhenjun, S. Farmatsevticheskaya tsennost' i ispol'zovanie dozhdevykh chervej v Kitae. (2004). *Dozhdevye chervi i plodorodie pochv : II mezhdunar. konf.* Kovrov, Rossiya, 87-93.
26. Zhenjun, S. (2003). *Vermiculture and vermiprotein.* China Agricultural University Press.
27. Sadchikov, A. P. (2009). Kul'tivirovanie vodnykh i nazemnykh bespozvonochnykh (printsipy i metody). Moskva : MAKS Press, 272.
28. Dmitrieva, V. I., & Stepanova, A. I. (2000). *Vermikul'tivirovanie: teoriya, opyt, praktika.* Sakhapomirafizdat.
29. Mel'nik, I. A. (1990). Dozhdevye chervi na sluzhbe sel'skogo khozyaystva. *Sel'skokhozyaystvennaya biologiya*, 5, 160-163.
30. Igonin, A. M. (1995). Kak povysit' plodorodie pochvy v desyatki raz s pomoshch'yu dozhdevykh chervej. Moskva: Marketing.
31. Gorodniy, N. M., Mel'nik, I. A., & Povkhan, M. F. (1990). *Biokonversiya organicheskikh otkhodov v biodinamicheskom khozyaystve.* Kiev: Urozhay,
32. Pokrovskaya, S. F. (1991). Ispol'zovanie dozhdevykh chervej dlya pererabotki organicheskikh otkhodov i povysheniya plodorodiya pochv (vermikul'tura). Moskva: Agroprom.
33. Tomati, U., Grappelli, A., & Galli, E. (1988). The hormone - like effect of earthworms on plant growth. *Biology and Fertility of Soils*, 4, 288-294.
34. Maksimova, S. L. (Ed.). (2007). Vermikompostirovanie i vermikul'tivirovanie kak osnova ekologicheskogo zemledeliya v XXI veke: problemy, perspektivy, dostizheniya. Minsk: Institut zoologii NAN Belarusi.
35. Maksimova, S. L., & Bosak, V. N. (2007). Vermikompostirovanie i vermikul'tivirovanie: sostoyanie, problemy i perspektivy. *Belorusskoe sel'skoe khozyaystvo*, 9, 65-66.
36. Tsyganov, A. R. (2002). Tekhnologiya prigotovleniya i primeneniya vermikomposta (biogumusa). Gorki: BGSKhA.
37. Derevyagin, V. A., Derevyagina, R. N., & Kravchenko, M. E. (1989). Pererabotka organicheskogo syr'ya. *Khimizatsiya sel'skogo khozyaystva*, 7, 25-27.
38. Kosolapova, A. I., Smyshlyaev, E. I., & Kosolapov, I. N. (1996). *Vermikul'tura i ee vozmozhnosti.* Ryazan'.

39. Ohorodnik, O. O., Harbar, O. V., & Alpatova, O. M. (2014). Porivnialnyi analiz henetychnoi struktury pryrodnykh populiatsii *Eisenia foetida* (Savigny, 1826) ta ob'ektiv vermikultury. *Biologichni doslidzhennia*, 176-177.
40. Albani, J. R., Demuynck, S., Grumiaux, F., & Lepretre, A. (2003). Fluorescence fingerprints of *Eisenia fetida* and *Eisenia Andrei*. *Photochem. Photobiology*, 78, 599-602.
41. Edwards, C. A. (2011). Introduction, history, and potential of vermicomposting technology. *Vermiculture Technology. Earthworms, Organic Wastes, and Environmental Management*. Boca Raton, London, New York: CRC Press, 11-21.
42. Venter, J. M., & Reinecke, A. J. (1988). The life cycle of the compost worm *Eisenia fetida* (*Oligochaeta*). *S. Afr. J. Zool.*, 3, 161-165.
43. Timofeeva, S. S. (1999). *Ekologicheskaya biotekhnologiya*. Irkutsk: IGTU.
44. Khyzhniak, M. I., & Fedorenko, V. D. (2005). Rekomendatsii z vyrobnytstva ta vykorystannia produktsii vermykultury u stavovomu rybnytstvi. Kyiv: Urozhai.
45. Andriushchenko, A. I., Baltadzi, R. A., Vovk, N. I., Hrynzhovskyi, M. V., Hudyma, B. I., & Demchenko, I. T. et al. (1998). Metody pidvyshchennia pryrodnoi ryboproduktyvnosti staviv. *Rybne hospodarstvo*, 49-50, 3-119.
46. Andriushchenko, A. I., Baltadzi, R. A., Vovk, N. I., Hrynzhovskyi, M. V., Hudyma, B. I., & Demchenko, I. T. et al. (1998). *Metody pidvyshchennia pryrodnoi ryboproduktyvnosti staviv*. Kyiv.
47. Gorodnij, N. M. (1996). Biokonversija v upravlenni agrojekosistemami. Kiev: NAU.
48. Povkhan, M. F., Mel'nik, I. A., & Andrienko, V. A. (1994). *Vermikul'tura: proizvodstvo i ispol'zovanie*. Kyiv: UkrINTEL.
49. Zheltov, Ju. A. (2001). Sravnitel'naja ocenka nekotorykh kormov zhivotnogo proishozhdenija i ih ispol'zovanie v kormlenii ryb. *Problemy i perspektivy razvitiia akvakul'tury v Rossii: nauchno-prakt. konf.* Adler, Rossiia, 175-177.
50. Zheltov, Ju. A., Hrynzhovskyi, M. V., & Demchenko, I. F. et al. (1999). Rekomendatsii z vykorystannia mistsevykh ta netradytsiinykh kormiv dlia hodivli koropa u stavakh. Kyiv: Urozhai.
51. Mel'nik, I. A. (1991). Prigotovlenie vermikomposta i razvedenie dozhdevykh chervei. *Khimizatsiya sel'skogo khozyaystva*, 1, 44-50.
52. Melnyk, I. P., & Karpets, I. P. (1991). Vermykultura yak zasib vyrobnytstva biohumusu, kormovoho bilka y ozdorovlennia navkolyshnoho seredovyshcha. Ivano-Frankivsk.
53. Svezhentsov, A. A. (2001). Netradytsiini kormovi dobavky. *Tvarynnytstvo Ukrainy*, 1, 21-23.
54. Kharitonova, H. H., et al. (1996). K tekhnologii razvedeniya kaliforniyskikh chervei v rybovodstve. *Povyshenie kachestva rybnoy produktsii vodoemov: mezhdun. konf.* Kiev, 48-49.
55. Khizhnyak, M. I. (2000). Vermikul'tura v rybovodstve. *Rybne gospodarstvo*, 56, 132-136.
56. Koshhaev, A. G., Zholobova, I. S., & Sazonova, N. V. (2011). *Biotekhnologiya kormov i kormovykh dobavok*. Krasnodar: FGOU VPO Kubanskiy GAU.
57. Khyzhniak, M. I., et al. (2003). Pidroshchuvannia lychynok koropa na sukhii podribnenii biomasi kaliforniiskoho chervia. *Rybne gospodarstvo*, 62, 46-48.
58. Khyzhniak, M. I., et al. (2002). Vyroshchuvannia tsoholitok koropa na biomasi kaliforniiskoho chervia. *Rybne gospodarstvo*, 62, 49-51.

59. Sherman, I. M., Hrynzhhevskiy, M. V., Zheltov Yu. O., et al. (2001). *Hodivlia ryb*. Kyiv: Vyshcha osvita.
60. Koshchaev, A. G., Koshchaeva, O. V., & Eliseev, M. A. (2014). Biotekhnologiya vermikul'tivirovaniya organicheskikh otkhodov. *Nauchnyy zhurnal KubGAU*, 95, 594-693.
61. Tereshchenko, P. V. (2000). *Vermikul'tura i biogumus*. Pushchino: Departament kadrovoy politiki i obrazovaniya MSKh i prodovol'stviya RF.
62. Prosyannikov, E. V., Eremin, A. V., & Meshkov, I. I. (2000). Slovar'-spravochnik po vermitekhnologii: Razvedenie dozhddevykh chervey, proizvodstvo effektivnogo organicheskogo udobreniya i tsennogo korma. Bryansk: Bryan. gos. s.-kh. akad. i dr.
63. Khot'ko, E. I., & Shavanova, T. M. (2005). Razvedenie mestnoy populyatsii navoznogo chervya *Eisenia foetida* Sav. v usloviyakh Belarusi: metod. rekomendatsii. Minsk: Pravo i ekonomika.
64. Ievtushenko, M. Yu. (2011). Tekhnolohiia vyhotovlennia startovoho kormu dlia ryb iz hibryda kaliforniiskoho cherviaka. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 3(17), 91-100.

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 49-56
DOI: 10.15407/fsu2018.04.049
УДК 639.3.032:639.371.52

Received 26.08.18
Received in revised form 16.19.18
Accepted 09.10.18

ОЦІНКА РЕПРОДУКТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ КОРОПА (*CYPRINUS CARPIO LINNAEUS*, 1758) ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП»

О. О. Олексієнко, Osipenko59@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І. Грициняк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. П. Оборський, mch@hrh.km.ua, ПАТ «Хмельницькрибгосп», смт Меджибіж
В. В. Бех, vitbekh@online.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Б. О. Ганкевич, Osipenko59@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Провести аналіз екстер'єрних та репродуктивних показників плідників коропа промислових стад підприємств ПАТ «Хмельницькрибгосп».

Методика. При виконанні робіт використовувались загальноприйняті в селекції та рибництві методики досліджень.

Результати. Проведена оцінка екстер'єру та репродуктивних показників промислового стада плідників антонінсько-зозуленецьких коропів підприємств ПАТ «Хмельницькрибгосп» з метою організації та ведення селекційно-племінної роботи, спрямованої на поліпшення темпу росту, екстер'єру, виживання і плодючості вирощуваних риб.

Наукова новизна. Проведений аналіз буде використаний як показник рибогосподарської цінності плідників антонінсько-зозуленецьких коропів промислових стад рибогосподарських підприємств ПАТ «Хмельницькрибгосп» з метою виділення селекційних гнізд і ведення селекційно-племінної роботи з коропом в господарстві.

Практична значимість. За результатами проведеної роботи буде проведено відбір та сформовано племінні стада коропа українських порід, що характеризуються високими показниками темпу росту, екстер'єру, типовості, виживання та плодючості.

Ключові слова: порода, короп, темп росту, екстер'єр, промислове стадо, плодючість, личинки, селекційно-племінна робота.

EVALUATION OF THE REPRODUCTIVE INDEXES OF CARP (*CYPRINUS CARPIO LINNAEUS*, 1758) AT THE PJSC "KHMELNYTSKRYBHOSP"

O. Oleksiyenko, Osipenko59@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
I. Hrytsyniak, info@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
V. Oborskiy, mch@hrh.km.ua, «Khmelnyskrybhosp» Ltd., Medzhybizh
V. Bekh, vitbekh@online.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
B. Hankevych, Osipenko59@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To carry out the analysis of exterior and reproductive indexes of the brood common carp of the commercial farm PJSC "Khmelnyskrybhosp".

Methodology. Methods generally accepted in fish selective breeding and farming have been used for the scientific works.

© О. О. Олексієнко, І. І. Грициняк, В. П. Оборський, В. В. Бех, Б. О. Ганкевич, 2018

Findings. Pond fish farming, as the traditional form of fisheries, is one of the main sources of table fish products, the task of which is the rearing and cultivation of valuable fish breeds in ponds. Successful fish farming development is possible only with the use of complex intensification of production. One of the main components of intensification in fish farming is the well-established selection and breeding work aimed at qualitative improvement of breeding facilities, namely: the selection of new breeds and the creation of highly productive breeding stocks of fish and their rational use. The results of production of commodity fish depend on the provision of the fish farm with fish seeds and their quality.

Evaluation of the exterior and reproductive indexes of the commercial stock of brood Antonino-Zozulenetskiy common carps at the PJSC "Khmelnyskrybhosp" has been carried out for purpose of the organization of selective breeding works for improving of the growth rate, exterior, survivability and fecundity of cultured fish.

Originality. This analysis will be used as a parameter of the value of Antonino-Zozulenetskiy common carp in their commercial stocks of fish farms of the PJSC "Khmelnyskrybhosp" for forming selection nests and carrying out of the selective breeding works at these farms.

Practical value. The results of the work will contribute to the selection and forming of the brood stocks of Ukrainian common carp strains, which are characterized by high growth rates, exterior, typical appearance, survivability and fecundity.

Key words: strain, common carp, growth rate, exterior, commercial stock, fecundity, larvae, selective breeding work.

ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРПА (*CYPRINUS CARPIO* LINNAEUS, 1758) ПАО «ХМЕЛЬНИЦКРИБХОЗ»

А. А. Алексеенко, Osipenko59@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

И. И. Грициняк, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

В. П. Оборский, mch@hrh.km.ua, ПАО «Хмельницкрийбхоз», пгт Меджибож

В. В. Бех, vitbekh@online.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Б. А. Ганкевич, Osipenko59@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Провести анализ экстерьерных и репродуктивных показателей производителей карпа промышленных стад предприятий ПАО «Хмельницкрийбхоз».

Методика. При выполнении работ использовались общепринятые в селекции и рыбоводстве методики исследований.

Результаты. Проведена оценка экстерьера и репродуктивных показателей промышленного стада производителей антонинско-зозуленецких карпов предприятий ПАО «Хмельницкрийбхоз» с целью организации и ведения селекционно-племенной работы, направленной на улучшение темпа роста, экстерьера, выживаемости, плодовитости выращиваемых рыб.

Научная новизна. Проведенный анализ будет использован как показатель рыбохозяйственной ценности производителей антонинско-зозуленецких карпов промышленных стад рыбохозяйственных предприятий ПАО «Хмельницкрийбхоз» с целью выделения селекционных гнезд и ведения селекционно-племенной работы с карпом в хозяйстве.

Практическая значимость. По результатам проведенной работы будет осуществлён отбор и сформированы племенные стада карпа украинских пород, характеризующиеся высокими показателями темпа роста, экстерьера, типичности, выживаемости и плодовитости.

Ключевые слова: порода, карп, темп роста, экстерьер, промышленное стадо, плодовитость, личинки, селекционно-племенная работа.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Ставове рибництво як традиційна форма ведення рибного господарства є одним з головних джерел надходження товарної рибної продукції, його завданням є розведення і вирощування в ставах цінних порід риб. Найбільш розповсюдженим об'єктом рибництва в Україні, як і в низці інших країн, є короп.

Успішний розвиток рибництва можливий лише за використання комплексної інтенсифікації виробництва. Однією з основних складових частин якої є чітко налагоджена селекційно-племінна робота, спрямована на якісне поліпшення об'єктів розведення, а саме: виведення нових порід і створення високопродуктивних племінних стад риб та їх раціональне використання.

Результати виробництва товарної риби залежать від забезпеченості господарства рибопосадковим матеріалом та його якості. Високоякісний рибопосадковий матеріал за темпом росту, виживання, оплатою корму тощо отримується від відселекціонованих за низкою рибогосподарських ознак плідників риб.

Отже, необхідно було провести оцінку плідників антонінсько-зозуленецьких коропів ПАТ «Хмельницькрибгосп» за показниками їх репродуктивних ознак.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИДІЛЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

В умовах розвитку рибогосподарської галузі особливої актуальності набувають проблеми ведення селекційно-племінної справи, спрямованої на поліпшення біологічних та господарських ознак об'єктів риборозведення шляхом вдосконалення існуючих та виведення нових порід, внутрішньопорідних, зональних типів, ліній тощо, створення прогресивної гетерозисної структури порід та формування високопродуктивних племінних стад об'єктів розведення.

Метою досліджень було проведення аналізу екстер'єрних та репродуктивних показників плідників коропа промислових стад підприємств ПАТ «Хмельницькрибгосп».

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ

При виконанні робіт використовувались загальноприйняті в селекції та рибництві методики досліджень.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Формування породи як генетично збалансованої системи відбувається під впливом природного і штучного відбору. Кожна порода створюється для певної технології розведення і вирощування. Немає і не може бути універсальних порід, однаково продуктивних за будь-яких умов вирощування [1, 9].

Територія України включає три географічні зони — Полісся, Лісостеп і Степ, які розрізняються між собою за температурним режимом, кількістю опадів та природною кормовою базою ставів. Розмаїття ґрунтово-кліматичних умов визначає необхідність створення комплексу порід, пристосованих для вирощування в різних регіонах.

У ставовому рибництві України питання прогресивного розвитку продуктивності, консолідації та пластичності українських порід коропа успішно вирішуються шляхом розробленої О. І. Кузьомою системи структуризації їх на основі внутрішньопорідних і зональних типів. Внутрішньопорідні типи відрізняються між собою генезисом, рівнем гетерогенності і мінливості за рядом біологічних і господарсько цінних ознак. Внутрішньопорідний тип у структурному відношенні входить до складу породи, створюється в конкретних господарських і природних умовах, має свої характерні риси в напрямі продуктивності, типу тілобудови й конституції, кращу пристосованість до місцевих умов і більшу стійкість до хвороб риб. Зональні, або екологічні, типи створюються в процесі районування порід, і крім загальних порідних особливостей мають ще й специфічні, що виражаються в підвищеній адаптації до конкретної зони розповсюдження.

Принципи генетичного та екологічного розчленування українських порід коропа на внутрішньопорідні типи, а також зональні (екологічні) типи (масиви) дозволяють не лише утримувати продуктивність на високому рівні, а й значно удосконалювати її.

Розроблена система структуризації українських порід коропа об'єднує низку внутрішньопорідних типів та зональних (екологічних) типів (масивів). Серед них — антонінсько-зозуленецькі, несвицькі масиви, любінські, нивківський лускатий, малолускатий внутрішньопорідні типи. Кожен із них має певний ареал [10].

Антонінсько-зозуленецькі коропи (рамчасті та лускаті), як більш теплолюбні форми, районовані в рибних господарствах лісостепової та степової зон.

Антонінсько-зозуленецькі коропи виведені на базі відтворного схрещування місцевих безпорідних коропів Антонінського держрибзаповідника (Хмельницька область) із дзеркальними галицькими. У своїй спадковій основі вони мають 50% задатків аборигенних лускатих та 50% дзеркальних галицьких коропів [2–5].

Основним методом селекції коропів був масовий постійно поліпшувальний відбір з високою інтенсивністю серед молодших вікових груп. Цей метод заснований на вивченні потомства підібраних плідників на всіх вікових етапах з урахуванням взаємодії спадковості та середовища. Залежно від напрямку селекції, методика такого відбору доповнюється відповідним вирощуванням, яке сприяє розвитку корисних якостей. Метод постійно поліпшувального відбору є одним з основних у селекційно-племінній роботі з об'єктами аквакультури, спрямованих на створення нових селекційних стад, типів, порід риб [6].

Важливе значення під час проведення відбору приділялося темпу росту риб, їх екстер'єру та конституційній «міцності». На плем'я відбиралися особини, що мали найбільшу масу тіла, лускатий покрив яких відповідав прийнятому стандарту, красивої високоспинної тілобудови, в яких були відсутні будь-які дефекти та ознаки захворювань. Важливе місце при проведенні відбору приділялося також вираженості вторинних статевих ознак як у самців, так і в самиць.

Високі продуктивні якості вітчизняних коропів сприяли розповсюдженню їх також в країнах близького і далекого зарубіжжя. Вони були експортовані до Росії, Молдови, Румунії, Китаю з метою чистопорідного розведення й удосконалення аборигенних форм коропа [8, 9].

Антонінсько-зозуленецькі коропа — це типові представники українських порід коропа. Вони представлені двома формами: лускатою та рамчастою. Ці коропа завдяки своєму масиву та враховуючи історію створення, є ядром українських порід, їх еталоном і основою створення структурних одиниць української лускатої і української рамчастої порід коропа. Селекцію їх проводили за господарсько цінними ознаками і на створення стад із одномоментним характером зовнішнього (лускатого) покриття.

За попередні роки антонінсько-зозуленецькі коропа були піддані селекції на підвищення плодючості, виживання та темпу росту. Вирощування антонінсько-зозуленецьких коропів у виробничих умовах сприятиме підвищенню рибопродуктивності господарських водойм і виробництва товарної рибної продукції.

У господарстві ПАТ «Хмельницькрибгосп», де й були виведені антонінсько-зозуленецькі коропа, вони є одним з основних об'єктів вирощування.

Протягом 2017–2018 рр. проведено оцінку екстер'єру та репродуктивних показників промислового стада плідників антонінсько-зозуленецьких коропів підприємств ПАТ «Хмельницькрибгосп».

Як показали дослідження, екстер'єрні показники плідників промислового стада коропа українських порід, як рамчастої, так і лускатої, коливаються в значних межах, однак у стаді є особини, які зберегли типові для цих порід особливості екстер'єру. Так, індекс високоспинності (І/Н) у самиць рамчастого коропа коливається від 2,34 до 3,07; самців — від 2,43 до 3,20; самиць лускатого коропа — від 2,53 до 3,18; самців — від 2,58 до 3,26 (табл. 1).

Таблиця 1. Показники екстер'єру промислового стада плідників коропа господарств ПАТ «Хмельницькрибгосп»

Table 1. Indicators of the exterior of carp breeding stock on fish farms in public joint stock company "Khmelnitskrybgosp"

Порода коропів / Breed of carp	Стать / Sex	Кількість, екз. / Quantity, an instance	Р, кг / P, kg	І/Н	І/О
Рибгосп «Антоніни» / Fish farm «Antonyny»					
Український лускатий / Ukrainian scalled	♀	160	8,5	3,18–2,64	1,27–1,08
	♂	310	5,6	3,26–2,73	1,33–1,12
Український рамчастий / Ukrainian frame	♀	157	6,2	3,07–2,34	1,29–0,99
	♂	218	4,7	3,10–2,43	1,29–1,06
Рибгосп «Стара Синява» / Fish farm «Stara Syniava»					
Український лускатий / Ukrainian scalled	♀	100	6,3	3,07–2,62	1,16–1,13
	♂	134	4,2	3,10–2,69	1,25–1,23
Український рамчастий / Ukrainian frame	♀	49	6,2	3,15–2,37	1,24–1,08
	♂	67	4,0	3,20–2,59	1,27–1,15

Порода коропів / Breed of carp	Стать / Sex	Кількість, екз. / Quantity, an instance	Р, кг / P, kg	I/Н	I/O
Рибгосп «Волочиськ» / Fish farm «Volochnysk»					
Український лускатий / Ukrainian scaled	♀	40	7,0	3,00–2,53	1,15–1,12
	♂	125	5,8	3,06–2,59	1,18–1,14
Український рамчастий / Ukrainian frame	♀	20	7,0	2,98–2,52	1,14–1,07
	♂	67	5,6	3,07–2,58	1,20–1,10

Проведеними дослідженнями щодо репродуктивних показників плідників українських порід встановлено, що коропа́м як рамчастої, так і лускатої порід властива висока плодючість. Так, вихід 4-добових личинок з нерестових ставів знаходиться на дещо вищому рівні відносно нормативних показників (100 тис. екз. від одного гнізда риб) [7] (табл. 2).

Таблиця 2. Результати нересту плідників коропа господарств ПАТ «Хмельницькрибгосп»

Table 2. Results of carp breeding stock spawning in public joint stock company "Khmelnitskrybgosp"

Порода коропів / Breed of carp	Посаджено на нерест, гнізд / Placed on spawning nests	Кількість гнізд, що віднерести- лися / Quantity of nesting nests	Кількість 4-добових личинок на одну самицю, що віднерестилися, тис. екз. / Quantity of 4 day-old larvae per one female, wich was nested, thousands of specimens
Рибгосп «Антоніні» / Fish farm «Antoniny»			
Український лускатий / Ukrainian scaled	94	61	127
Український рамчастий / Ukrainian frame	31	26	124
Рибгосп «Стара Синява» / Fish farm «Stara Syniava»			
Український лускатий / Ukrainian scaled	49	34	106,0
Український рамчастий / Ukrainian frame	41	28	106,0
Рибгосп «Волочиськ» / Fish farm «Volochnysk»			
Український рамчастий / Ukrainian frame	14	10	100,0

Із кращих за екстер'єрними та репродуктивними показниками плідників українських рамчастої і лускатої порід коропа проводиться формування селекційних гнізд, потомство яких послужить основою для формування племінних ремонтно-маточних стад антонінсько-зозуленецьких типів українських порід коропа ПАТ «Хмельницькрибгосп».

Для природного відтворення риби плідники українських лускатої і рамчатої порід коропа були посаджені в нерестові стави.

Нерест відбувся 21–22 травня 2018 р.

Одержані личинки обох порід в 4-добому віці були посаджені на вирощування у пристосовані зимувальні стави № 5 (український лускатий короп) та №7 (український рамчастий короп).

Температурні, гідрохімічні і гідрологічні умови ставів знаходились у межах норми. Годівлю риби у ставах проводили частково. Природна кормова база ставів була бідною, що негативно вплинуло на ріст риби.

В кінці вересня дослідні стави були обловлені. Результати вирощування цьогоріток коропа представлені в таблиці 3.

Таблиця 3. Результати вирощування цьогоріток коропа
Table 3. Results of growth of young-of-the-year carp

Порода коропа / Breed of carp	Став / Pond	Площа, га / Area, ha	Посаджено тис. екз. / Planted, thousands of specimens		Виловлено / Caught		Вихід, % / yield-ing, %	Середня маса, г / Average mass, g	Рибопродуктивність, кг/га / Fish capacity, kg/ha	Витрати кормів, од. / Feed costs, units
			всього / total	на 1 га / on 1 ha	тис. екз. / thousands of specimens	кг / kg				
Український лускатий / Ukrainian scaled	зим. № 5 / wintering pond № 5	1,0	50	50	32,9	690,0	65,7	21,0	690,0	2,1
Український рамчастий / Ukrainian frame	зим. № 7 / wintering pond № 7	1,4	60	43	37,1	965,0	61,9	26,0	690,0	1,5

Рибопродуктивність ставів склала 690 кг/га, вихід риби з вирощування — 61,9–65,7%, що знаходиться в межах, близьких до нормативних показників щодо товарного вирощування риби.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Таким чином, для підвищення ефективності виробничої діяльності ПАТ «Хмельницькрибгосп» в господарстві необхідно організувати і проводити селекційно-племінну роботу, спрямовану на поліпшення племінних якостей ремонтно-маточних стад коропа українських порід (темп росту, екстер'єр,

виживання, плодючість) і створювати сприятливі умови утримання риб на всіх вікових етапах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Елеонский А. Н. Прудовое рыбоводство. Москва : Пищепромиздат, 1946. 325 с.
2. Кузема А. И. Украинские породы карпа // Труды совещания по вопросам прудового рыбоводства. Москва : АН СССР, 1953. С. 65—76.
3. Кузема А. И. Украинские породы карпа // Рыбоводство и рыболовство.- 1966. № 1. С. 14—16.
4. Олексієнко О. О. Антонінсько-зозуленецький тип — структурна ланка українських порід коропа // Таврійський науковий вісник. 2004. Вип. 32. С. 154—163.
5. Олексієнко О. О., Грициняк І. І. Внутрішньопорідна структура українських коропів // Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 21—27.
6. Використання безперервно поліпшувального відбору в селекції українських коропів / Олексієнко О. О. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2012. № 1. С. 78—86.
7. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. Москва : Агропромиздат, 1986. Т. 1. 260 с.
8. Томіленко В. Г., Олексієнко О. О., Кучеренко А. П. Інструкція з організації племінної роботи в коропівництві України // Інтенсивне рибництво. Київ : Аграрна наука, 1995. С. 3—33.
9. Томіленко В. Г. Генетика і селекція риб в Україні на межі тисячоліть. Київ : Логос, 2001. Т. 4. С. 351—371.
10. Структуризація українських порід коропа / Томіленко В. Г. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2012. № 2. С. 83—87.

REFERENCES

1. Eleonsky, A. N. (1946). *Prudovoe rybovodstvo*. Moskva: Pischepromizdat.
2. Kuzioma, A. I. (1953). *Ukrainskie porody karpa. Trudy soveschania po voprosam prudovogo rybovodstva*. Moskva: AN SSSR, 65-76.
3. Kuzioma, A. I. (1966). *Ukrainskie porody karpa. Rybovodstvo i rybolovstvo, 1*, 14-16.
4. Oleksienko, O. O. (2004). *Antonynsko-zozulenetskij typ – structurna lanka ukrainskykh porid koropa. Tavrijskiy naukovij visnic, 32*, 154-163.
5. Oleksienko, O. O., & Hryzynyak, I. I. (2007) *Vnutrischnyoporidna struktura ukrainskich koropiv. Rybogospodarska nauka Ukrainy, 1*, 21-27.
6. Oleksienko, O. O., Bech, V. V., Gryzynyak, I. I., Pavlischtschenko, V. M., & Osipenko, M. I. (2012) *Vykorystannja bezperervno polipchuvalnogo vidboru v selekzii ukrainskich koropiv. Rybogospodarska nauka Ukrainy, 1*, 78-86.
7. *Sbornik normativno-technologichskoj dokumentacii* (1986). (Vol. 1). Moskva: Agropromizdat.
8. Tomilenko, V. G., Oleksienko, O. O., & Kutscherenko, A. P. (1995). *Instrukcia z organizatsii pleminnoi roboty v koropivnytstvy Ukrainy. Intensyvne rybnytstvo*. Kyiv: Agrarna nauka, 3-33.
9. Tomilenko, V. G. (2001). *Genetyka i selekctia ryb v Ukraine na mezhi tysyacholit*. (Vol. 4). Kyiv: Logos, 351-371.
10. Tomilenko, V. G., Bech, V. V., Oleksienko, O. O., & Pavlischtschenko, V. M. (2012). *Structurisasiat ukrainskykh porid koropa. Rybogospodarska nauka Ukrainy, 2*, 83-87.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВВЕДЕННЯ САПОНІТУ ТА АНАЛЬЦИМУ ДО СКЛАДУ РАЦІОНУ ДВОЛІТОК КОРОПА (*CYPRINUS CARPIO LINNAEUS*, 1758)

О. О. Батуревич, sh Stefan_91@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН
України, м. Київ

О. В. Дерень, derenj@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН України, м.
Київ

Г. В. Качай, rybalybin@ukr.net, Львівська дослідна станція Інституту рибного
господарства НААН України, смт Великий Любін

Мета. Здійснити порівняльну характеристику впливу сапонітового борошна та анальциму при додаванні до основного раціону дволіток коропа на фізіолого-біохімічні показники їхнього організму.

Методика. При дослідженні застосовували рибницькі, іхтіологічні та статистичні методи. Об'єктом дослідження були дволітки коропа. Масову частку білка визначали за методом К'ельдаля, вміст жиру — за методом С. В. Рушковського в апараті Сокслета. Кількісне визначення концентрації металів у м'язах ставових риб здійснювали прямим всмоктуванням розчину у пропан-бутан-повітряне полум'я за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра С-115-М1.

Результати. Проведені дослідження з визначення продуктивних показників поживності м'яса та концентрації мікроелементів і важких металів в м'язах дволіток коропа. Встановлено, що при додаванні до раціону коропа сапонітового борошна та анальциму в кількості 3% упродовж всього сезону вирощування середня маса дволіток коропа була вищою відповідно на 12,1 і 9,7%, рибопроодуктивність — на 11,9 і 9,9% відносно контролю. Згодовування кормосуміші із добавкою анальциму сприяло збільшенню вмісту протеїну в м'язах коропів на 7,5%, а жиру — на 22,5%. В той же час, за введення до раціону сапонітового борошна відмічено лише збільшення жиру на 16,0%. Згодовування сапонітового борошна та анальциму сприяє зниженню кількості свинцю в м'язах риб відповідно на 77,7 і 78,7%, а кадмію — в 1,3 і 2,4 рази відносно контролю.

Наукова новизна. Уперше до раціону дволіток коропа введено мінеральні добавки природного походження — сапонітове борошно та анальцим, визначено їх вплив на продуктивні показники, поживність м'яса та його хімічний склад, з огляду на сорбційні та іонообмінні властивості досліджуваних добавок.

Практична значимість. Проведені дослідження є основою для планування та удосконалення схем раціональної годівлі дволіток коропа та підвищення рибопроодуктивності ставів.

Ключові слова: дволітки коропа, мінерали природного походження, сапонітове борошно, анальцим, рибопроодуктивність, жир, протеїн, важкі метали, сорбційна здатність, іонообмінні властивості.

EFFICIENCY OF THE SUPPLEMENTATION OF AGE-2 CARP (*CYPRINUS CARPIO* LINNAEUS, 1758) DIET WITH SAPONITE AND ANALCIME

O. Baturevych, shtefan_91@ukr.net, Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

O. Deren, derenj@ukr.net, Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

G. Kachai, rybalybin@ukr.net, Lviv Research Station of the Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Velykyi Lubin

Purpose. To perform a comparative analysis of the effect of saponite flour and analcime added to the basic diet of age-2 carp on physiological-biochemical parameters of fish organism.

Methodology. Aquaculture, ichthyological, and statistical methods were used for the study. The object of the study were age-2 carp. The weight content of protein was determined by Kjeldahl method, the fat content – by S.V. Rushkovskiy method in a Soxhlets extraction apparatus. Quantitative determination of metal concentrations in pond fish tissues were determined by direct absorption of the solution into propane-butane-air flame with the aid of atomic absorption spectrophotometer S-115-M1 in the laboratory of the Institute of Fisheries.

Findings. Studies on the determination of meat nutritional value and heavy metal concentrations in age-2 carp muscles have been performed. Addition of 3% saponite flour and analcime to carp diet during the entire rearing period resulted in an increase in age-2 carp average weight by 12.1% and 9.7%, fish productivity – by 11.9% and 9.9% compared to the control. Feeding of fish with a feed mixture supplemented with analcime contributed to an increase in protein content in carp muscles by 7.5% and fat – by 22.5%. At the same time, supplementation of the diet with saponite flour resulted in an increase in fat content by 16%. Feeding of fish with saponite flour and analcime resulted in a decrease in the contents of lead in fish muscles by 77.7% and 78.7%, cadmium – by 1.3 and 2.4 times compared to the control.

Originality. Minerals of volcanic origin, saponite flour and analcime, were added to age-2 carp diet for the first time. Their effect of productive parameters, food value of fish meat and its chemical composition were determined taking into account sorption and ion exchange properties.

Practical value. The results of the work are the basis for planning rational feeding of age-2 carp and increasing the productivity of ponds.

Key words: age-2 carp, minerals of volcanic origin, saponite flour, analcime, fish productivity, fat, protein, heavy metals, sorption ability, ion exchange properties.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ САПОНИТА И АНАЛЬЦИМА В СОСТАВ РАЦИОНА ДВУХЛЕТКОВ КАРПА (*CYPRINUS CARPIO* LINNAEUS, 1758)

О. А. Батуревич, shtefan_91@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

О. В. Дерень, derenj@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

Г. В. Качай, rybalybin@ukr.net, Львовская опытная станция Института рыбного хозяйства НААН Украины, пгт Великий Любень

Цель. Дать сравнительную характеристику влияния сапонитовой муки и альцима при добавлении к основному рациону двухлетков карпа на физиолого-биохимические показатели их организма.

Методика. При исследовании применяли рыбоводные, ихтиологические и статистические методы. Объектом исследования были двухлетки карпа. Массовую долю белка определяли по методу Кельдаля, содержание жира — по методу С. В. Рушковского в аппарате Сокслета. Количественное определение концентрации металлов в мышцах

прудовых рыб осуществляли прямым всасыванием раствора в пропан-бутан-воздушное пламя с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра С-115-М1.

Результаты. Проведены исследования по определению питательности мяса, продуктивных показателей и концентрации тяжелых металлов в мышцах двухлетков карпа. Установлено, что при добавлении в рацион карпа сапонитовой муки и анальцима в количестве 3% в течение всего сезона выращивания средняя масса двухлетков карпа была выше соответственно на 12,1 и 9,7%, рыбопродуктивность - на 11,9 и 9,9% относительно контроля. Скармливание кормосмеси с добавкой анальцима способствовало увеличению содержания протеина в мышцах карпов на 7,5%, а жира - на 22,5%. В то же время, при включении в рацион сапонитовой муки отмечено только увеличение жира на 16,0%. Скармливание сапонитовой муки и анальцима привело к снижению количества свинца в мышцах рыб соответственно на 77,7 и 78,7%, а кадмия - в 1,3 и 2,4 раза относительно контроля.

Научная новизна. Впервые в рацион двухлетков карпа введены минеральные добавки природного происхождения - сапонитовой муки и анальцима, определено их влияние на продуктивные показатели, питательность мяса и его химический состав, учитывая сорбционные и ионообменные свойства исследуемых добавок.

Выводы. Проведенные исследования являются основой для планирования и усовершенствования схем рационального кормления двухлетков карпа и повышения рыбопродуктивности прудов.

Ключевые слова: двухлетки карпа, минералы природного происхождения, сапонитовая мука, анальцим, рыбопродуктивность, жир, протеин, тяжелые металлы, сорбционная способность, ионообменные свойства.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Потреба коропа в основних поживних елементах на сьогодні є відомою, на основі чого розроблено рецепти комбікормів, що забезпечують отримання високої продуктивності. Проте в сучасних умовах багато рибних господарств використовують в годівлі коропа низькопоживні незбалансовані кормосуміші, які не забезпечують повною мірою фізіологічних потреб риб і є важкоперетравними, що може спричиняти низку фізіолого-біохімічних порушень в організмі. Тому пошук нових шляхів та засобів підвищення якісних показників комбікормів і надалі залишається актуальним завданням для дослідників. Крім дотримання балансу основних кормових компонентів, не слід забувати і про використання добавок, які мають конкретне цільове призначення і чинять безпосередній вплив на фізіологічний стан організму риб [1]. Наприклад, нестача мінеральних елементів в раціоні риб призводить до порушення обміну речовин, виникнення різних захворювань та зниження продуктивності об'єктів вирощування [2].

В сучасних умовах практично в усіх регіонах країни відмічається негативний вплив чинників екзогенного та ендогенного походження на гідрохімічний режим рибницьких водойм, зокрема забруднення мінерального і органічного походження, а також сполуками важких металів. Ці речовини акумулюються не тільки в донних відкладах, але й в організмі гідробіонтів, у тому числі риб [3].

З огляду на вищенаведене, перспективним є використання в годівлі коропа альтернативних кормових добавок, які можуть бути як додатковим джерелом мікроелементів, так і сорбентами, здатними нівелювати вплив негативних чинників на організм риб. Це забезпечить вирощування рибної продукції, що

відповідає споживчим характеристикам за показниками безпеки і якості.

На сьогодні у тваринництві в якості мінеральних добавок використовуються мінерали природного походження, які і характеризуються сорбційними та іонообмінними властивостями [8–9]. На території України найбільш поширеними є цеоліти, бентоніти, сапоніти, анальцими, вермикуліти, диопсиди та інші [4–7]. Сапоніт та анальцим — містять макро-, мікро- і ультрамікроелементи, а також мають велику катіонну і аніонну ємність та високі сорбційні властивості. Ці мінерали здатні сорбувати на своїй поверхні токсичні речовини, важкі метали, радіонукліди з наступним виведенням їх з організму, а також можуть бути використані в якості дезінтоксикантів кормів [10–12]. Враховуючи унікальні властивості сапоніту та анальцими, їх активно почали використовувати у тваринництві. Так, для збільшення концентрації обмінної енергії в раціонах корів рекомендують використовувати кізельгур [13], а введення цеоліту до корму перепелів у кількості 1,5% справляє позитивний вплив на їхню продуктивність та метаболізм [14]. Встановлено, що ефективність застосування сапоніту та анальциму в годівлі тварин полягає у зниженні швидкості проходження хімусу по шлунково-кишковому тракту, адсорбції токсинів та важких металів, виділення з організму сполук NH_3 , NO_2 , CO_2 та ін., регуляції складу і концентрації електролітів, покращенні процесу травлення [15–18].

Перші спроби використання мінералу вулканічного походження — цеоліту в складі комбікормів для коропа датуються 1983–1984 рр. Радянськими вченими отримані позитивні результати введення до раціону цьоголіток і дволіток коропа цеоліту в кількості 10%. Встановлено збільшення рибопродуктивності дволіток на 15%, при цьому витрати корму знизилися на 21% [19]. Доведено, що згодовування мінералів природного походження у складі комбікормів призводить до зниження кількості важких металів у м'язах дослідних риб [20].

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

В дослідженнях використано сапонітове борошно з Варварівського родовища Хмельницької області виробництва фірми «Veles» та анальцим з Полицького родовища Рівненської області. Експериментальні роботи проведено на базі Державного підприємства дослідного господарства «Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН» (ДП ДГ ЛДС) з метою визначення впливу сапонітового борошна і анальциму на продуктивні ознаки, поживність м'яса та накопичення деяких мікроелементів у м'язах дволіток коропа за вирощування в умовах ставів. Основний раціон коропа складала низькопоживна злакова зерноsumіш (контроль). До складу основного раціону дослідних груп риб було введено сапонітове борошно (дослід I) і анальцим (дослід II) в кількості 3% від маси корму методом замішування.

Дослідження проведено з використанням ставів-аналогів площею близько 0,3 га за густоти посадки однорічок любінського помісного коропа 1000 екз./га та середньої початкової маси 38 г (табл. 1). Вирощування здійснювалося в монокультурі.

Годівля проводилася впродовж всього вегетаційного періоду і тривала 160 днів. Кількість згодованого корму становила 3–5% від маси риб, з урахуванням темпів росту, поїдання рибою цих кормів та гідрохімічного режиму. Годівлю риб

проводили на кормових місцях один раз на добу. Температурні показники перебували в оптимальних межах для засвоєння корму та росту коропа.

Метричні показники вимірювали кравецькою стрічкою, а вагові — на електронних терезах.

У м'язах досліджуваних риб визначали вміст заліза (Fe), цинку (Zn), марганцю (Mn), міді (Cu), нікелю (Ni), кобальту (Co), свинцю (Pb) та кадмію (Cd). Проби тканин висушували в сушильній шафі за температури 108°C до постійної маси. Потім їх спалювали за методом мокрого озолування в азотній кислоті (марки х.ч.) протягом 12–18 год до повного знебарвлення суміші, в яку додавали 5–6 крапель 30% пероксиду водню (марки х.ч.). Кількісне визначення концентрації важких металів у тканинах здійснювали за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра С-115-М1 [21].

Масову частку білка визначали методом К'ельдаля; вміст жиру — методом С. В. Рушковського, за кількістю знежиреного залишку в апараті Соклета при використанні бензолу як розчинника; вміст сухої речовини — випаровуванням за температури 100–105°C до постійної маси протягом 3–5 год [22–23].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Впродовж всього періоду вирощування здійснювався фоновий контроль гідрохімічного, гідробіологічного та температурного режимів у експериментальних ставах. Дані показники перебували в межах нормативних значень, що є оптимальним для росту та розвитку риб.

Після закінчення експерименту здійснено облов ставів та відібрано матеріал для проведення досліджень.

Виходячи з результатів дослідів, нами було встановлено, що досліджувані природні мінеральні добавки впливають на відносний вміст жиру, протеїну і концентрацію деяких важких металів та мікроелементів в м'язах коропа. Оскільки годівля проводилася не повноцінними продукційними комбікормами, а кормосумішшю, слід зауважити, що обидва мінерали сприяли підвищенню рибопродуктивності, ймовірно, за рахунок їх зв'язувальних властивостей, що спричиняє уповільнення темпу просування їжі по травному тракту, і як наслідок — збільшення відсотка засвоєння поживних речовин.

За умов введення до складу низькопоживної зерноsumіші сапоніту впродовж вегетаційного сезону отримано на 11,9% вищу рибопродуктивність, середня маса зросла на 12,1%, а витрати корму були нижчими на 9,2% відносно контролю. За згодовування анальциму — відповідно на 9,9; 9,7 та 8,4% (табл. 1).

Дослідженнями хімічного складу м'язів коропа встановлено достовірне збільшення відносного вмісту протеїну на 7,5% ($p \leq 0,01$) і жиру на 21,8% ($p \leq 0,05$) за згодовування анальциму в дослідній групі відносно контрольної, а, відповідно, і вмісту сухої речовини на 5,5% ($p \leq 0,01$) (табл. 2). Це узгоджується з отриманими рибогосподарськими показниками і свідчить про підвищення поживності м'яса дволіток коропа за згодовування анальциму. Згодовування сапоніту позитивно впливало на вміст жиру в м'язах коропа на 16% ($p \leq 0,05$).

Таблиця 1. Результати вирощування коропа з додаванням до основного раціону мінералів природного походження

Table 1. Results of rearing carp with the addition of minerals of natural origin to their major diet

Група риб / Fish group	Пло- ща, га / Area, ha	Посаджено / Stocked			Виловлено / Harvested				Рибо- прод., кг/га / Fish produc- tivity, kg/ha	Витра- ти кор- му, од. / Feed costs, units
		к-ть, екз. / N, fish	сер. маса, г / mean weight, g	заг маса, кг / total weight, kg	вихід, % / output %	к-ть, екз. / N, fish	сер. маса, г. / mean weight, g	заг. маса, кг. / total weight, kg		
Контроль / Control	0,32	320	35,9	11,5	86	275	269,1	74	195,3	1,54
Дослід I / Experiment I	0,24	240	45,0	10,8	87	209	306,2	64	221,7	1,39
Дослід II / Experiment II	0,28	280	33,2	9,3	84	235	297,9	70	216,8	1,41

Таблиця 2. Вміст сирого протеїну, жиру, сухої речовини в м'язах коропа, % ($M \pm m$, $n = 3$)

Table 2. Contents of crude protein, fat, dry substance in carp muscles, % ($M \pm m$, $n = 3$)

Група риби / Fish group	Суша речовина / Dry substance	Протеїн / Protein	Жир / Fat
Контроль / Control	22,33±0,170	16,53±0,170	3,30±0,153
Дослід I / Experiment I	22,07±0,124	16,37±0,170	3,93±0,088*
Дослід II / Experiment II	23,60±0,178**	17,87±0,131**	4,26±0,176*

Примітка. Тут і надалі різниця між показниками вірогідна: * — $p \leq 0,05$, ** — $p \leq 0,01$.

Note. Differences between values are significant: * — $p \leq 0.05$, ** — $p \leq 0.01$.

Було проведено дослідження впливу анальциму та сапонітового борошна в складі кормосуміші на вміст важких металів та мікроелементів у м'язових тканинах риби з метою визначення їх сорбційних та іонообмінних властивостей (табл. 3).

У переліку ксенобіотиків, які можуть надходити з навколишнього середовища у живі організми, одними з найнебезпечніших є важкі метали. Перелік важких металів включає понад 40 елементів. Окремі з них, такі як цинк, мідь, марганець, хром, залізо є життєво необхідними для здійснення міжклітинних процесів, регуляторних функцій і є складовими ферментів. Крім того, до переліку найбільш розповсюджених важких металів що чинять токсичний вплив у дуже низьких дозах, входять кадмій і свинець. Саме вони спричиняють гострі ураження імунітету, незворотні зміни в активності ферментів травної системи та в структурі печінки, нирок та інших органів [24–26].

Таблиця 3. Вміст мікроелементів та важких металів у м'язах коропа мг/кг сирої маси ($M \pm m$, $n = 3$)Table 3. Microelement and heavy metal contents in carp muscles, mg/kg of wet weight ($M \pm m$, $n = 3$)

Група риб / Fish group	Метали, мг/кг / mg/kg							
	Fe	Zn	Mn	Cu	Ni	Co	Pb	Cd
Контроль / Control	38,53 $\pm$ 19,516	3,70 $\pm$ 2,207	0,56 $\pm$ 0,275	0,56 $\pm$ 0,311	0,45 $\pm$ 0,101	0,30 $\pm$ 0,170	3,27 $\pm$ 0,327	0,12 $\pm$ 0,017
Дослід I / Experiment I	20,0 $\pm$ 5,840	1,63 $\pm$ 0,567	0,46 $\pm$ 0,075	0,58 $\pm$ 0,059	3,28 $\pm$ 2,531	0,22 $\pm$ 0,020	1,84 $\pm$ 0,416	0,09 $\pm$ 0,020
Дослід II / Experiment II	9,70 $\pm$ 3,443	3,07 $\pm$ 0,273	0,16 $\pm$ 0,058	0,62 $\pm$ 0,126	0,64 $\pm$ 0,081	0,07 $\pm$ 0,000	1,83 $\pm$ 0,238*	0,05 $\pm$ 0,021

Встановлено, що концентрація заліза в котролі була вищою у порівнянні з дослідом I (сапонітове борошно) 1,9 раза та в 4,0 — для досліді II (анальцим). Оскільки вміст заліза у м'язах риб контрольної групи перевищував нормативне значення [27] і складав 38,53 мг/кг, то зниження його вмісту в м'язах риб дослідних груп може свідчити про сорбційні властивості досліджуваних добавок. Відмічено також істотне зменшення концентрації цинку в дослідних групах відносно контролю: в 2,3 раза для досліді I та в 1,2 раза для досліді II. Також на 3,5% збільшився вміст міді в тканинах риб, до раціону яких було введено сапонітове борошно, і склав 0,58 мг/кг, та на 9,7% — в досліді з анальцимом, склавши 0,62 мг/кг. Оскільки мідь необхідна риbam для синтезу еритроцитів, входить до складу протеїдів печінки і ряду окиснювальних ферментів, підвищення її вмісту корисне для правильного функціонування організму та не чинить токсичної дії [2]. Щодо впливу дії марганцю, то він потрапляє в організм риб через зябра і кишечник, оскільки рівень абсорбції його з води є досить високим [28]. Концентрація марганцю в тканинах коропів контрольної групи становила 0,56 мг/кг, а в досліді — 0,46 і 0,16 мг/кг відповідно, чим підтверджується сорбційна здатність досліджуваних мінералів. Таку ж тенденцію відмічено відносно вмісту кобальту в м'язах риб. В обох дослідних групах кількість даного елемента знизилася в 1,4 раза в досліді I і в 4,3 раза в досліді II. Виявлене помітне підвищення вмісту нікелю — в 7,3 та 1,4 раза в досліді I та II групи відповідно. Оскільки у складі досліджуваних добавок вміст нікелю дуже низький і становить від 0,002 до 0,005%, то не можна пов'язати настільки суттєве підвищення вмісту цього елемента в м'язах експериментальних груп риб з іонообмінними властивостями добавок. Тому встановлені тенденції вимагають додаткового дослідження з метою встановлення об'єктивних закономірностей. Вміст свинцю в м'язах усіх груп риб перевищував гранично допустимі концентрації [27] і становив у контролі 3,27 мг/кг сирої маси та 1,84 мг/кг в досліді I і 1,83 мг/кг в досліді II. Таким чином, завдяки сорбційній здатності досліджуваних мінералів, вміст даного токсичного елемента в м'язах знизився відповідно на 77,7 та 78,7% в контрольних групах. Позитивна динаміка спостерігається і у впливі анальциму та сапонітового борошна на вміст кадмію в досліджуваних зразках м'язів. Відмічена тенденція зниження його вмісту в 1,3 раза в досліді I та в 2,4 раза в досліді II.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Встановлено, що за введення до раціону сапонітового борошна середня маса дволіток коропа в кінці вегетаційного періоду зросла на 12,1%, а рибопродуктивність — на 11,9% в порівнянні з контролем. Згодовування сапоніту у складі раціону коропа позитивно позначилося не тільки на цих показниках, але і на підвищенні вмісту жиру в досліджуваних зразках м'язів на 16%.

За введення до раціону анальциму середня маса риб в кінці вегетаційного періоду та рибопродуктивність збільшились на 9,7 та 9,9% відповідно. Крім того, встановлено достовірне підвищення вмісту протеїну на 7,5% та жиру на 22,5% відносно контролю.

Встановлено, що за введення до складу кормосуміші для коропа сапоніту та анальциму, відбувається зниження в тканинах м'язів таких елементів як : залізо, цинк, марганець, кобальт, свинець та кадмій, що ще раз підтверджує сорбційні властивості даних мінеральних добавок.

Під час аналізу отриманих даних встановлено, що ефективнішими є результати вирощування дволіток коропа за введення сапоніту, з огляду на вищу середню масу виловлених риб та більшу рибопродуктивність ставів. Незважаючи на це, при дослідженнях вмісту жиру, протеїну та сухої речовини в м'язах риб кращі результати покзав анальцим. З огляду на отримані результати щодо кількості мікроелементів та важких металів в м'язах риб, стає зрозумілим, що анальцим є ефективнішим мінералом, оскільки має більш виражені сорбційні властивості, що є дуже важливою здатністю в сучасних умовах антропогенного навантаження на водойми.

Тому можна зробити висновок, що використання даних нетрадиційних кормових добавок є перспективним для підвищення рибопродуктивності та покращення показників якості рибної продукції для споживачів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Безкровна Н. І. Використання природних цеолітів для підвищення ефективності годівлі коропа за умов вирощування на теплих скидних водах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.10 «Іхтіологія». Київ, 1994. 25 с.
2. Янович Н. Є., Янович Д. О. Роль мікроелементів у життєдіяльності ставкових риб // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2014. Т. 16, № 2 (59), ч. 2. С. 345—372.
3. Вміст та розподіл важких металів в органах і тканинах промислових видів риб Київського водосховища / Мельник А. П. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2009. Вип. 7. С. 93—99.
4. Галатов А. Н. Применение глауконита в рационах растущих овец // Зоотехния. 2000. № 4. С. 22—24.
5. Grjsicki A., Rachubik J. Influence of bentonite on trace kinetics in rats // Bull. Veter. Inst. in Pulawy. 2005. № 1. P. 121—123.
6. Лушников Н. А. Минеральные вещества и природные добавки в питании животных. Курган : КГСХА, 2003. 192 с.

7. Мельник Н. В., Андрійчук В. Ф. Продуктивність курей-несучок при згодовуванні мінеральної добавки анальцим // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького. 2005. Вип. 3. С. 197—201.
8. Структурно-сорбційні характеристики українського сапоніту / Марцин І. І. та ін. // Укр. хим. журн. 2001. Вип. 2. С. 98—101.
9. Брек Д. В. Цеолитовые молекулярные сита. Москва : Мир, 1975. 781 с.
10. Эффективность использования анальцимосорбента в кормлении молодняка свиней / Решетниченко А. П. // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. трудов. Горки, Беларусь, 2014. С. 141—147.
11. Анальцимо-сорбент – дезінтоксикант кормів : пат. 37607 Україна, № 200804365 ; заявл. 07.04.2008 ; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23.
12. Зотеев В. С., Кирилов М. П. Эффективность использования природных сорбентов в рационах высокопродуктивных коров // Известия ФГОУ ВПО СГСХА. 2006. Вып 2. С. 62—65.
13. Мухутдинов Д. М., Бикташев Р. У., Исаков Р. Ш. Влияние добавки из отхода масло-экстракционного производства на молочную продуктивность крупного рогатого скота // Достижения науки и техники АПК. 2008. № 11. С. 54—55.
14. Регламентация використання цеоліту Сокиринського родошища за вирощування перепелів / Харчишин В. М. та ін. // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : збірник наук. праць. 2014. С. 19—23.
15. Plank G., Bauer J., Grünkemeier A. The protective effect of adsorbents against ochratoxin A in swine // Tierarztl Prax. 1990. № 5. P. 483—489.
16. Jung B. G., Toan N. T., Cho S. J. Dietary aluminosilicates supplement enhances immune activity in mice and reinforces clearance of porcine circovirus type 2 in experimentally infected pigs // Vet. Microbiology. Vol. 143. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113509005586?via%3Dihub> (accessed 15.10.2018).
17. Хіміч О. В. Ефективність використання сапоніту, селену та комплексних мінеральних добавок на їх основі в раціонах молочних корів і бичків на відгодівлі : дис. ... кандидата с.-г. наук : 06.02.02. Вінниця, 2005. 149 с.
18. Фисинин В. И., Егоров И. А., Драганов И. Ф. Кормление сельскохозяйственной птицы : учебник. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 344 с.
19. Таратухин В. А., Шимильская Л. К. Корм для карпа с добавкой цеолитового туфа // Рыбное хозяйство. 1984. № 9. С. 35—36.
20. Корягина В. Н. Состояние среды обитания, продуктивность и качество карпа при использовании в прудах местных природных цеолитов : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Ульяновск, 2007. 21 с.
21. Атомно-абсорбционный анализ / Хавезов И., Цалев Д. Ленинград : Химия, 1983. 144 с.
22. ДСТУ ISO 5983:2003. Корми для тварин. Визначення вмісту азоту і обчислення вмісту сирого білку. Метод К'ельдаля. Київ, 2005. 8 с. (Національний стандарт України).
23. ДСТУ ISO 6492:2003. Корми для тварин. Визначення вмісту жиру. Київ : Держспоживстандарт України, 2005. 8 с. (Національний стандарт України).
24. Остоумова И. Н. Биологические основы кормления рыб. Санкт-Петербург : ГосНИОРХ, 2001. 372 с.

25. Воробьев В. И. Биогеохимия и рыбоводство. Саратов : Литера, 1993. 224 с.
26. Данилів С. І., Мазепа М. А. Вплив ацетату свинцю на гуморальні фактори неспецифічної резистентності коропа // Современные проблемы токсикологии. 2009. Вып. 3–4. С. 53—56.
27. ДСТУ 2284:2010. Риба жива. Загальні технічні умови. Київ : Держспоживчстандарт України, 2012. С. 26. (Національний стандарт України).
28. Watanabe T., Kiron V., Satoh H. Trace minerals in fish nutrition // Aquaculture. 1997. № 1. P. 185—207.

REFERENCES

1. Bezкровна, N. I. (1994). Vykorystannia pryrodnykh tseolitiv dlia pidvyshchennia efektyvnosti hodivli koropa za umov vyroshchuvannia na teplykh skydnykh vodakh. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv.
2. Yanovych, N. Ye., Yanovych, D. O. (2014). Rol mikroelementiv u zhyttiedialnosti stavkovykh ryb. *Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnologii imeni S.Z. Hzhyskoho*, 59, 345-372.
3. Mel'nyk, A. P., Kurhans'kyi, S. V., Vlasova, N. M., & Mykhaenko, N. H. (2009). Vmist i rozpodil vazhkykh metaliv u orhanakh ta tkanynakh promyslovyykh vydiv ryb Kyivs'koho vodoskhoverstva. *Rybohospodars'ka nauka Ukrainy*, 7, 93-99.
4. Halatov, A. N. (2000). Prymenenye hlaukonyta v ratsyonakh rastushchykh ovets. *Zootekhnika*, 4, 22-24.
5. Grjsicki, A., & Rachubik, J. (2005). Influence of bentonite on trace kinetics in rats. *Bull. Veter. Inst. v Pulavio*, 1, 121-123.
6. Lushnikov, N. A. (2003). *Mineral'nye veshchestva i prirodnye dobavki v pitanii zhivotnykh*. Kurgan: KGSNA.
7. Melnyk, N. V., & Andriichuk, V. F. (2005). Produktivnist kurei-nesuchok pry zghodovuvanni mineralnoi dobavky anal'tsym. *Naukovyi visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii veterynarnoi medytsyny imeni S.Z. Hzhyskoho*, 2, 197-201.
8. Martsyn, I. I., et al. (2001). Strukturno-sorbtsiini kharakterystyky ukrainskoho saponitu. *Ukr. khym. zhurn*, 2, 98-101.
9. Brek, D. V. (1975). *Tseolytovyie molekuly arnysya*. Moskva: Myr.
10. Reshetnichenko, A. P. (2014). Jeftektivnost' ispol'zovaniia Anal'cimosorbenta v kormlenii molodnjaka svinej. *Aktual'nye problemy intensivnogo razvitiia zhivotnovodstva: sb. nauch. trudov*. Gorki, 141-147.
11. Reshetnichenko, O. P., Orlov, L. V., & Bogach, M. V. (2008). *Anal'cimo-sorbent – dezintoksikantkormiv*. Patent of Ukraine. № 37607.
12. Zoteev, V. S., & Kirilov, M. P. (2006). Jeftektivnost' ispol'zovaniia pryrodnykh sorbentov v racionah vysokoproduktivnykh korov. *Izvestija FGOU VPO SGSHA*, 2, 62-65.
13. Muhutdinov, D. M., Biktashev, R. U., & Isakov, R. Sh. (2008). Vliianie dobavki iz othoda maslo-jekstrakcionnogo proizvodstva na molochnuju produktivnost' krupnogo rogatogo skota. *Dostizheniya nauki i tekhniki APK*, 11, 54-55.
14. Kharchyshyn, V. M., Melnychenko, O. M., Vered, P. I., & Zlochevskiy, M. V. (2014). Rehlamentatsiia vykorystannia tseolitu Sokyrnytskoho rodovyscha za

- vyroshchuvannia perepeliv. *Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktii tvarynnytstva: zbirnyk naukovykh prats*, 19-23.
15. Plank, G., Bauer, J., & Grünkemeier, A. (1990). The protective effect of adsorbents against ochratoxin A in swine. *Tierarztl Prax*, 5, 483-489.
 16. Jung, B. G., Toan, N. T., & Cho, S. J. (2009). Dietary aluminosilicates supplement enhances immune activity in mice and reinforces clearance of porcine circovirus type 2 in experimentally infected pigs. *Vet. Microbiology*, 143. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113509005586?via%3Dihub>.
 17. Khimich, O. V. (2005). Efektyvnist vykorystanni asaponitu, selenu ta kompleksnykh mineralnykh dobavok na yikh osnovi v ratsionakh molochnykh koriv i bychkiv na vidhodivli. *Candidate's thesis*. Vinnytsia.
 18. Fisinin, V. I., Egorov, I. A., & Draganov, I. F. (2011). *Kormlenie sel'skohozjajstvennoj pticy*. Moskva: GJeOTAR-Media.
 19. Taratuhin, V. A., & Shimul'skaja, L. K. (1984). Korm dlja karpa s dobavkoj ceolitovogo tufa. *Rybnoe hozjajstvo*, 9, 35-36.
 20. Korjagina, V. N. (2007). Sostojanie sredy obitanija, produktivnost' i kachestvo karpa pri ispol'zovanii v prudah mestnyh prirodnyh ceolitov. *Extended abstract of candidate's thesis*. Ul'janovsk.
 21. Havezov, I., & Calev, D. (1983). Atomno-absorbcionnyj analiz. Leningrad: Himija.
 22. Kormy dlja tvaryn. Vyznachennia vmistu azotu i obchyslennia vmistu syroho bilku. Metod Kieldalia. (2005). *DSTU ISO 5983:2003. Natsionalnyi standart Ukrainy*. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy.
 23. Kormy dlja tvaryn. Vyznachennia vmistu zhyru. (2005). *DSTU ISO 6492:1999. Natsionalnyi standart Ukrainy*. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy.
 24. Ostoumova, I. N. (2001). *Biologicheskie osnovy kormlenija ryb*. Sankt-Peterburg: GosNIORH.
 25. Vorob'ev, V. I. (1993). *Biogeohimija i rybovodstvo*. Saratov: Litera.
 26. Danyliv, S. I., & Mazepa, M. A. (2009). Vplyv atsetatu svyntsiu na humoralni faktory nespetsyfichnoi rezystentnosti koropa. *Sovremennye problem toksykologii*, 3-4, 53-56.
 27. Ryba zhyva. Zahalni tekhnichni umovy. (2012). *DSTU 2284. Natsionalnyi standart Ukrainy*. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy.
 28. Watanabe, T., Kiron, V., Satoh, H. (1997). Trace minerals in fish nutrition. *Aquaculture*, 1, 185-207.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ШТУЧНОГО ОТРИМАННЯ ОВУЛЬОВАНОЇ ІКРИ СТЕРЛЯДІ (*ACIPENSER* *RUTHENUS LINNAEUS, 1758*) З КОМБІНОВАНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

М. М. Пашко, marina-fish@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

О. М. Третяк, veslonos-ua@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначити основні показники економічної ефективності штучного отримання овульованої ікри стерляді у нетрадиційні нерестові строки з використанням плідників, вирощених в умовах плавучих садків.

Методика. Розрахунки проведено за загальноприйнятими в економіці методиками. Для економічного аналізу використані фактичні показники господарської діяльності в індустріальній аквакультурі України, зокрема підприємства ТОВ-СРП «Осетр» (Київська обл.) у період 2016–2017 рр. Дослідження виконано на прикладі рибогосподарського підприємства потужністю 500 кг овульованої ікри стерляді. Структура проаналізованих виробничих витрат з оцінкою показників прибутковості підприємства передбачає здійснення повного циклу рибницьких процесів щодо вирощування та експлуатації плідників стерляді з комбінованим застосуванням сучасних методів індустріальної аквакультури.

Результати. У структурі виробничих витрат розглянутого осетрового господарства найбільшу сукупну частку (понад 50%) становлять оплата праці та витрати на закупівлю високоякісних комбікормів для осетрових риб. Установлено, що період окупності осетрового господарства потужністю 500 кг овульованої ікри стерляді з вирощуванням плідників в умовах плавучих садків на базі водойм з природним температурним режимом та заводським отриманням зрілих статевих продуктів риб із використанням рециркуляційних систем водопостачання становить не менше 6–7 років. Рівень рентабельності господарств цього типу може перевищувати 40%. Визначено шляхи підвищення прибутковості осетрових господарств індустріального типу.

Наукова новизна. Вперше проаналізовано показники економічної ефективності технологій вирощування плідників та штучного отримання зрілих статевих продуктів стерляді із застосуванням нетрадиційних для аквакультури України методів відтворення осетрових риб.

Практична значимість. Результати досліджень являють інтерес для розвитку індустріальної аквакультури в Україні та оцінки господарських показників ікряно-товарного напрямку інтенсивного осетрівництва.

Ключові слова: економічна ефективність, індустріальна аквакультура, плідники стерляді, ікра осетрових риб, комбіновані технології.

ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ARTIFICIAL PRODUCTION OF OVULATED STERLET (*ACIPENSER RUTHENUS* LINNAEUS, 1758) EGGS WITH THE COMBINED USE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGIES

M. Pashko, marina-fish@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

O. Tretiak, veslonos-ua@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To determine major parameters of the economic efficiency of the artificial production of ovulated sterlet eggs at non-traditional terms with the use of brood fish reared in the conditions of floating cages.

Methodology. The calculations were conducted according to the methods generally accepted in economics. For the economic analysis, we used actual numbers of business activities at the industrial aquaculture of Ukraine, in particular, SRP "Osetr" LLC (Kyiv region) during the period of 2016-2017. The study was conducted using a fish farm producing 500 kg of ovulated sterlet eggs as an example. The structure of the analyzed production costs with the assessment of enterprise profitability supposes a full cycle of fish culture processes on rearing and exploiting of brood sterlet with the combined use of modern industrial aquaculture methods.

Findings. The highest (more than 50%) share in the structure of production costs of the investigated sturgeon farm is labor compensation and costs of the purchase of high quality combined sturgeon feeds. The payoff period of a sturgeon farm producing 500 kg of ovulated sterlet eggs with the rearing of brood fish in the conditions of floating cages in a water body with natural temperature regime and artificial production of mature eggs and sperm with the use of recirculating aquaculture system was found to be no less than 6-7 years. The profitability level of fish farms of this type can exceed 40%. The ways of increasing the profitability of sturgeon farms of industrial type have been determined.

Originality. The parameters of economic efficiency of the technology of rearing brood fish and artificial production of mature eggs and sperm with the use of non-traditional methods of sturgeon rearing in Ukraine have been analyzed for the first time.

Practical value. The results of the study are of interest for the development of industrial aquaculture in Ukraine and assessment of performance indicators of caviar production in intensive sturgeon culture.

Key words: economic efficiency, industrial aquaculture, brood sterlet, sturgeon eggs, comined technologies.

ЕКОНОМІЧЕСЬКА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІСКУССТВЕННОГО ПОЛУЧЕННЯ ОВУЛІРОВАНОЇ ІКРИ СТЕРЛЯДИ (*ACIPENSER RUTHENUS* LINNAEUS, 1758) С КОМБІНОВАНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

М. М. Пашко, marina-fish@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, г. Київ

А. М. Третяк, veslonos-ua@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, г. Київ

Цель. Определить основные показатели экономической эффективности искусственного получения овулированной икры стерляди в нетрадиционные нерестовые сроки с использованием производителей, выращенных в условиях плавучих садков.

Методика. Расчеты проведены по общепринятым в экономике методикам. Для экономического анализа использованы фактические показатели хозяйственной деятельности в индустриальной аквакультуре Украины, в частности предприятия ООО-СРП «Осетр» (Киевская обл.) в период 2016–2017 гг. Исследования выполнены на примере рыбохозяйственного предприятия мощностью 500 кг овулированной икры стерляди.

Структура проаналізованих виробничих затрат с оценкой показателей прибыльности предприятия предусматривает осуществление полного цикла рыбоводных процессов по выращиванию и эксплуатации производителей стерляди с комбинированным применением современных методов индустриальной аквакультуры.

Результаты. В структуре производственных затрат рассмотренного осетрового хозяйства наибольшую совокупную долю (свыше 50%) составляют оплата труда и затраты на закупку высококачественных комбикормов для осетровых рыб. Установлено, что период окупаемости осетрового хозяйства мощностью 500 кг овулированной икры стерляди с выращиванием производителей в условиях плавучих садков на базе водоемов с естественным температурным режимом и заводским получением зрелых половых продуктов рыб с использованием рециркуляционных систем водоснабжения составляет не менее 6–7 лет. Уровень рентабельности хозяйств этого типа может превышать 40%. Определены пути повышения прибыльности осетровых хозяйств индустриального типа.

Научная новизна. Впервые проанализированы показатели экономической эффективности технологий выращивания производителей и искусственного получения зрелых половых продуктов стерляди с применением нетрадиционных для аквакультуры Украины методов воспроизводства осетровых рыб.

Практическая значимость. Результаты исследований представляют интерес для развития индустриальной аквакультуры в Украине и оценки хозяйственных показателей икорно-товарного направления интенсивного осетроводства.

Ключевые слова: экономическая эффективность, индустриальная аквакультура, производители стерляди, икра осетровых рыб, комбинированные технологии.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Одним з найважливіших аспектів ефективного ведення аквакультури є підвищення якості та конкурентоспроможності рибної продукції для забезпечення високого рівня прибутковості господарств. З цим значною мірою пов'язаний підвищений інтерес до розвитку технологій культивування осетрових риб, насамперед ікр'яно-товарного напрямку осетрівництва [1–5].

Відомо, що високі показники економічної ефективності за рентабельності виробництва понад 35% отримано за результатами ставового вирощування завезеного в Україну представника ряду осетроподібних (*Acipenseriformes*) американського веслоноса (*Polyodon spathula* (Walbaum) [6–8]. Визначені умови функціонування та перспективи розвитку ікр'яно-товарного напрямку культивування веслоноса у вітчизняній аквакультурі [9].

Серед інших риб ряду *Acipenseriformes* одним з найбільш розповсюджених видів в аквакультурі східноєвропейських країн є стерлядь — аборигенний представник родини *Acipenseridae* [10–14]. Здійснюється відпрацювання технологічних процесів використання стерляді для потреб розвитку ікр'яно-товарного осетрівництва в індустріальній аквакультурі України [15].

Згідно з оцінкою різних технологічних схем індустріальної аквакультури, застосування садкових систем є одним з найдоступніших методів ведення рибництва, на створення якого здебільшого не потрібні значні матеріальні витрати [16]. При цьому за наявності спеціального обладнання зі штучного

відтворення осетрових риб з регульованим режимом температури води забезпечуються сприятливі умови для поліциклічного виробництва різних видів осетрової продукції зі зміщенням традиційних строків виконання рибницьких робіт [14, 15, 17].

Істотний вплив на економічні показники суб'єктів аквакультури в Україні може справляти низка нерозв'язаних проблем у сфері правового регулювання виробничої діяльності та податкового навантаження в умовах господарств різних форм власності, що застосовують специфічні методи інтенсифікації виробництва [18].

Отже до актуальних завдань рибогосподарських досліджень в Україні належить оцінка економічної ефективності нових напрямів комбінованого застосування модифікованих технологій індустріальної аквакультури осетрових риб.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

За результатами виробничих випробувань, переконливо доведено, що в умовах садкових господарств індустріального типу на базі водойм Лісостепу України можна формувати високопродуктивні маточні стада осетрових риб, зокрема стерляді. Установлено, що значні перспективи зазначених методів вирощування племінних груп осетрових риб пов'язані зі створенням повноциклових осетрових господарств, обладнаних системами рециркуляційного водопостачання з пріоритетним розвитком ікряно-товарного виробництва [15, 17]. Проте до останнього часу не був проаналізований рівень можливої прибутковості цих малопоширених для вітчизняної аквакультури технологічних рішень в інтенсивному осетрівництві. Тому метою досліджень стало визначення основних показників економічної ефективності технології штучного отримання овульованої ікри стерляді у нетрадиційні нерестові строки з використанням плідників, вирощених в умовах плавучих садків, установлених у водоймах з природним температурним режимом лісостепової зони України.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Розрахунки проведено за загальноприйнятими в економіці методиками. Для економічного аналізу використані фактичні показники господарської діяльності в індустріальній аквакультурі України, зокрема підприємства ТОВ-СРП «Осетр» (Київська обл.) у період 2016–2017 рр., а також сучасні ціни на відповідні матеріали, різноманітні види продукції та засоби виробництва.

Оцінку господарських показників зроблено для рибницького підприємства зі щорічним виробництвом 500 кг овульованої ікри (ікри-сирцю) стерляді для її подальшої переробки на харчову продукцію. Матеріалом для досліджуваного циклу рибогосподарських робіт були різновікові групи стерляді та отримана від них у заводських умовах зріла ікра. Обсяг проаналізованих виробничих витрат з оцінкою прибутковості виробництва передбачає здійснення повного переліку рибницьких процесів, пов'язаних з вирощуванням та експлуатацією ремонтно-маточних груп стерляді з комбінованим застосуванням сучасних методів

індустріальної аквакультури.

За проаналізованої технологічної схеми для вирощування племінних груп стерляді використовували сітчасті садки з різним розміром вічка у делі, розтягнені на металевих рамах площею 24 м² (4 × 6 м), розміщених на нерухомо закріплених понтонах у водоймі з природним температурним режимом середовища, характерним для лісостепової зони України. Стінки садкових камер заглиблювали у воду на 2,5–3,0 м. На випадки погіршення газового режиму водного середовища передбачено штучне збагачення води киснем за допомогою компресорів та аераторів. Протягом всього періоду формування та експлуатації ремонтно-маточного матеріалу вибраковували рибу з погано вираженими статевими ознаками, хворих, травмованих та значно відсталих у рості особин. У віці 3+ зі стада відсортровували самців стерляді та проводили їх реалізацію як товарної риби. Вирощування племінних груп стерляді, в залежності від віку проводили з різною густиною посадки (5–20 кг/м² садкових площ) з годівлею комбікормами відомих європейських виробників із умістом протеїну 45–52% за визначених інструкціями норм годівування. У роботах з отримання зрілих статевих продуктів переважали плідники у віці 6+ середньою масою до 1,8 кг. У зв'язку із застосуванням модифікованої технології осетрівництва зі зміщенням строків виконання рибницьких робіт на найпрохолодніший період року, для ефективного дозрівання гонад проводили переднерестову підготовку плідників стерляді з використанням керованого підігріву води у системі рециркуляційного водопостачання. З метою гормональної стимуляції дозрівання статевих залоз риби використовували натуральні гонадотропні препарати із досягненням високої ефективності реагування самок на гіпофізарну стимуляцію (понад 90% плідників). Маса відібраної після овуляції ікри у самок стерляді на сьомому році життя становила в середньому близько 0,25 кг (14% маси тіла риби).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Згідно з проаналізованою технологічною схемою індустріального осетрівництва, орієнтовна кількість самок стерляді у віці семиліток (6+), необхідних для організації ікряно-товарного виробництва в обсязі 500 кг овульованої ікри, становить до 2 тис. екз. При цьому чисельність необхідного маточного поголів'я у віці 6+, з урахуванням наявності у стаді 65–70% добре підготовлених до участі у рибницьких роботах самок, становитиме близько 3 тис. екз. Для розміщення такої кількості риби необхідно мати до 20 садкових камер загальною площею 480 м². Водночас, для забезпечення ефективного та безперебійного продукування ікри-сирцю потрібне різновікове ремонтно-маточне стадо стерляді за регулярного його поповнення молодшими віковими групами риби. Розрахунки показують, що з метою забезпечення запланованих обсягів виробництва та для створення сприятливих умов утримання усіх вікових груп стерляді різних генерацій буде необхідно установити у водоймі не менше 50 садків і передбачити можливість подальшого збільшення садкових площ. У результаті витрати на створення садкового фонду господарства із використанням сучасних зразків пластикових понтонних секцій можуть сягати 8 млн грн. (близько 300 тис.

дол. США). Значно нижчі витрати будуть необхідні для створення рибницьких систем зі штучного отримання овульованої ікри осетрових риб у нетрадиційні нерестові строки. Їх вартість значною мірою визначатиметься особливостями комплектації та технічними характеристиками засобів комплексної водопідготовки. Загалом, витрати на створення основних виробничих потужностей такого підприємства будуть у кілька разів нижчими у порівнянні зі спорудженням традиційного басейнового господарства з культивування осетрових риб аналогічної потужності з рециркуляційним типом водопостачання.

Дані щодо витратної частини здійснення господарської діяльності підприємством проаналізованого типу зі щорічним виробництвом 500 кг осетрової ікри подано в табл. 1. Як видно з наведених даних, у структурі виробничих витрат найбільшу сукупну частку (понад 50%) становлять оплата праці разом з відповідними на неї нарахуваннями та витрати на закупівлю високоякісних комбікормів для різних вікових груп риб. Значна частина витрат у загальній собівартості продукції припадає на організацію і виконання технологічних процесів щодо підтримання сприятливих умов середовища у рибницьких ємностях та отримання зрілих статевих продуктів риб у прохолодний період року. Ці витрати, які значною мірою пов'язані з використанням електроенергії, газу на опалення приміщень та проведенням комплексу рибницьких робіт із застосуванням спеціального обладнання і дорогих матеріалів, складають разом близько чверті собівартості продукції. Водночас, на початкових етапах функціонування підприємства близько 4,5% від усіх закупівельних спроможностей необхідно буде витрачати на придбання вихідного рибопосадкового матеріалу стерляді. Формування інших наведених у таблиці статей витрат характеризується значною специфічністю для кожного конкретного підприємства і тому досить складно аналізується.

Очевидно, що за кожною із наведених вище статей виробничих витрат можлива певна економія матеріальних ресурсів і відповідних коштів із позитивними наслідками щодо забезпечення прибутковості виробництва. Наприклад, в результаті відпрацювання раціональних методів нормованої годівлі риб зазвичай вдається досягти економії дорогих спеціалізованих кормів. Освоєння процесів відтворення осетрових риб із використанням власних плідників усуває необхідність щорічної закупівлі рибопосадкового матеріалу. Додатковими резервами зростання прибутковості новоствореного підприємства, крім підвищення рівня продуктивності праці та оптимізації умов формування фонду заробітної плати кадрового персоналу, може бути налагодження наукового супроводу виробничої діяльності з удосконаленням способів поліциклічного отримання овульованої ікри та збереження життя «відпрацьованих» плідників, використанням методів раннього прижиттєвого визначення статі осетрових риб, поліпшенням репродуктивних характеристик маточного поголів'я із застосуванням генетичного моніторингу та спрямованого відбору ремонтно-маточного матеріалу у сформованих племінних стадах.

Таблиця 1. Кошторис витрат та калькуляція собівартості продукції в розрахунку на виробництво 500 кг ікри-сирцю стерляді з використанням плідників вікової групи 6+

Table 1. Cost estimates and calculation prime cost in terms of production 500 kg of sterlet's raw roe with using breeding stock in age-group 6+

Статті витрат / Expenditure	тис. грн / thousand UAH	% / %
Всього витрат / Total outlay	6680,1	100,0
у тім числі: / including:		
оплата праці, нарахування на зарплату / wages, payroll	1913,4	28,6
корми / feed	1510,0	22,6
вихідний рибопосадковий матеріал вікової групи 0+ /initial fish stocking material, age-group 6+	302,5	4,5
гіпофізарні гонадотропні препарати / pituitary gonadotropic preparations	90,0	1,3
витрати на придбання та експлуатацію технологічного (рибницького) обладнання і устаткування (лотки, басейни, елементи рециркуляційного водопостачання, компресори, аератори, засоби терморегуляції тощо) / expenses for the purchase and operation of technological (fishery) equipment and machinery (trays, pools, elements of recycling water supply, compressors, aerators, means of thermoregulation, etc.)	512,0	7,7
паливно-мастильні матеріали / fuel and lubricants	257,0	3,8
електроенергія / electricity	498,3	7,5
витрати на запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали / expenses for spare parts, repair and building materials	317,2	4,8
амортизація основних засобів / depreciation of fixed assets	347,0	5,2
витрати на спеціальне водокористування / expenses for special water using	147,0	2,2
витрати на опалення приміщень / expenses for premises heating	367,7	5,5
інші витрати / other expenses	418,0	6,3

З метою адаптованої оцінки господарсько-фінансових показників виробництва, у проведених розрахунках прийнятий досить високий для сучасного стану вітчизняної аквакультури рівень цін на придбані види продукції (корми, рибопосадковий матеріал, гонадотропні речовини, технологічне обладнання тощо) за максимально можливих обсягів закупівель. При цьому у розрахунках використана відносно невисока реалізаційна ціна на кінцеву продукцію, що дасть змогу забезпечити її високий рівень конкурентоспроможності.

Дані, наведені в табл. 2, показують, що за результатами виробництва 500 кг ікри-сирцю з використанням плідників стерляді семилітнього віку, вирощених у плавучих садках на базі водойм з природним температурним режимом із прийнятими у розрахунках витратами та зі збутом продукції з розцінкою на 1 кг

19 тис. грн (700 дол. США), прибуток становить 2819,9 тис. грн. При цьому рентабельність виробництва досягає рівня 42,2%.

Таблиця 2. Прогноз господарсько-фінансових результатів у розрахунку на виробництво 500 кг ікри-сирцю стерляді з використанням плідників вікової групи 6+

Table 2. Forecast of economic and financial results in terms of production 500 kg of sterlet's raw roe with using breeding stock in age-group 6+

Господарсько-фінансові показники / Economic and financial indicators	Значення показника / Indicator value
Собівартість продукції, тис. грн / Prime cost of production, ths. UAH	6680,1
Обсяг реалізації продукції в натуральному виразі, кг / Volume of sales in natural kind, kg	500,0
Ціна (гуртова) одиниці продукції, грн/кг / Price (wholesale) of the product unit, UAH / kg	19000,0
Виручка від реалізації продукції, тис. грн / Revenues from sales of products, ths. UAH	9500,0
Прибуток, тис. грн / Profit, thousand UAH	2819,9
Рентабельність, % / Profitability, %	42,2

Під час вирощування плідників стерляді у садках, установлених у водоймі з природним температурним режимом лісостепової зони України, до 10–15% самок за середньої маси тіла близько 1 кг досягають статевої зрілості на п'ятому році життя. Частка статевозрілих самок другої хвилі дозрівання із середньою масою тіла до 1,4 кг у стадії шестилітнього віку становить до 40%. Участь цих риб у рибницьких роботах з відбору овульованої ікри дає змогу прискорити процес окупності новоствореного підприємства. Певний внесок у прискорення окупності господарства забезпечує товарний збут відсортованих самців стерляді переважно із досягненням ними 3–4-річного віку. Проте, з урахуванням усіх проаналізованих обставин, окупність підприємства досліджуваного типу може тривати не менше 6–7 років (до налагодження планових масштабів виробництва осетрової ікри).

Певний вплив на рівень прибутковості підприємства може справляти характер збуту продукції. Ікра-сирець належить до сировини, що дуже швидко псується. Тому безпосередньо на рибницьких господарствах необхідно освоїти досить специфічні прийоми зберігання і переробки осетрової ікри після овуляції яйцеклітин, отриманих прижиттєвим способом.

Вирощування в аквакультурі статевозрілих самок стерляді для продукування ікри-сирцю з метою виробництва харчової ікри має важливе значення у сенсі заміщення цього виду продукції, завезеної із-за кордону, та компенсації втрат осетрової продукції на вітчизняному рибному ринку, що виникли внаслідок заборони промислового вилову осетрових риб в Азово-Чорноморському басейні.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Проаналізований технологічний варіант ведення індустріальної аквакультури дає змогу розвивати в Україні виробництво високоякісної сировини для виготовлення найважливішого виду осетрової продукції — харчової ікри.

Зважаючи на високу вартість ікри осетрових риб, навіть відносно невеликі обсяги її виробництва здатні забезпечувати істотні прибутки та створювати економічні переваги спеціалізованих підприємств. Упровадження досліджуваних методів рибництва у порівнянні з іншими технологіями індустриальної аквакультури осетрових риб не потребує значних інвестицій на початкових етапах створення підприємств та сприяє імпортозаміщенню на внутрішньому ринку рибної продукції.

З урахуванням витрат на створення ікряно-товарного осетрового господарства з комбінованим застосуванням методів індустриальної аквакультури та джерел водопостачання з різним температурним режимом зі щорічним обсягом виробництва ікри-сирцю стерляді 500 кг окупність новоствореного підприємства становить не менше 6–7 років. Рівень рентабельності господарств цього типу може перевищувати 40% за існування додаткових резервів подальшого зростання прибутковості виробництва після запровадження власного заводського відтворення та регулярного вирощування необхідних вікових груп осетрових риб, підвищення ефективності нормованої годівлі риб та відпрацювання надійних способів багаторазового прижиттєвого відбору статевих продуктів від плідників.

Окремого аналізу потребують економічні показники виробництва за технологіями вирощування життєстійкої осетрової молоді, відтвореної у заводських умовах у нетрадиційні рибницькі строки як для потреб аквакультури, так і з метою зариблення різних типів континентальних водойм.

ЛІТЕРАТУРА

1. Состояние и перспективы развития производства пищевой черной икры, как нового направления товарного осетроводства / Андрианов Д. П. и др. // Аквакультура осетровых рыб : достижения и перспективы развития : III Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Астрахань, 2004. С. 17—20.
2. Харенко Е. Н., Яричевская Н. Н. Некоторые аспекты технологического нормирования при производстве продукции из икры осетровых рыб прижизненного получения // Аквакультура осетровых рыб : достижения и перспективы развития : III Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Астрахань, 2004. С. 91—93.
3. Икорное направление товарного осетроводства / Лунеев Д. Е. и др. // Аквакультура осетровых рыб : достижения и перспективы развития : III Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Астрахань, 2004. С. 88—90.
4. Козлов В. И., Козлов А. В. Осетроводство. Москва : МГУТУ, 2011. 336 с.
5. Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні / Третяк О. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2010. № 4. С. 4—22.
6. Третяк О. М. Економічна ефективність ставового рибництва з використанням у полікультурі американського веслоноса // Рибогосподарська наука України. 2010. № 1. С. 112—122.
7. Механізми забезпечення прибутковості рибних господарств України / Смирнюк Н. І. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2009. № 1. С. 107—115.
8. Гринжевський М. В., Янінович Й. Є., Швець Т. М. Полікультура з шістьох видів риб // Рибогосподарська наука України. 2009. № 1. С. 38—42.
9. Третяк О. М. Система науково обґрунтованого розвитку аквакультури веслоноса а Україні // Рибогосподарська наука України. 2010. № 2. С. 3—25.

10. Шерман І. М., Корнієнко В. О., Шевченко В. Ю. Актуальність та передумови доместикації представників родини осетрових в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2006. Вип. 44. С. 145—154.
11. Шерман І. М., Ігнатів О. В. Вирощування цьогорітків стерляді в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2007. Вип. 50 С. 129—133.
12. Кончиц В. В., Мамедов Р. А. Состояние и перспективы восстановления численности стерляди в водоемах Беларуси // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. Київ : ДІА, 2011. С. 48—58.
13. Разработка эффективных методов производства посадочного материала стерляди для восстановления утраченных популяций / Кольман Р. и др. // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. Київ : ДІА, 2011. С. 67—69.
14. Деякі проблеми аквакультури осетроподібних риб в Україні / Третяк О. М. та ін. // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф. : матер. Київ : ПРО ФОРМАТ, 2018. С. 70—72.
15. Пашко М. М., Третяк О. М., Колос О. М. Результати експериментів зі штучного отримання овульованої ікри від плідників стерляді *Acipenser ruthenus* (Linnaeus) у нетрадиційні строки // Рибогосподарська наука України. 2018. № 2. С. 81—88.
16. Бугров Л. Ю. Технология садкового рыбоводства для открытых акваторий – инновационный потенциал повышения эффективности использования водоемов // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Москва : ВНИИР, 2007. С. 62—68.
17. Результати штучного відтворення осетрових риб, вирощених у садках за природного температурного режиму водойм лісостепової зони України / Пашко М. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2018. № 3. С. 39—49.
18. Муквич М. Г. Сучасний стан, проблеми та завдання розвитку рибицтва в Україні // Рибогосподарська наука України. 2009. № 1. С. 4—8.

REFERENCES

1. Andianov, D. P., et al. (2004). Sostoyanie i perspektivy razvitiya proizvodstva pishchevoy chernoy ikry, kak novogo napravleniya tovarnogo osetrovodstva. *Akvakul'tura osetrovykh ryb : dostizheniya i perspektivy razvitiya: III Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater.* Astrakhan', 17-20.
2. Kharenko, E. N., & Yarichevs'kaya, N. N. (2004). Nekotorye aspekty tekhnologicheskogo normirovaniya pri proizvodstve produktsii iz ikry osetrovykh ryb prizhiznennogo polucheniya. *Akvakul'tura osetrovykh ryb : dostizheniya i perspektivy razvitiya: III Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater.* Astrakhan', S. 91-93.
3. Lunieev, D. E., et al. (2004). Ikornoe napravlenie tovarnogo osetrovodstva. *Akvakul'tura osetrovykh ryb : dostizheniya i perspektivy razvitiya: III Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater.* Astrakhan', 88-90.
4. Kozlov, V. I., & Kozlov, A. V. (2011). *Osetrovodstvo*. Moskva: MGUTU.
5. Tretiak, O. M., et al. (2010). Stan zapasiv osetrovykh ryb ta rozvytok osetrovoi akvakultury v Ukraini. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 4-22.

6. Tretiak, O. M. (2010). Ekonomichna efektyvnist stavovoho rybnystva z vykorystanniam u polikulturi amerykansko veslonosa. *Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1*, 112-122.
7. Smyrniuk, N. I. et al. (2009). Mekhanizmy zabezpechennia prybutkovosti rybnykh hospodarstv Ukrainy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1*, 107-115.
8. Hrynzhevskiy, M. V., Yaninovich, Y. Ye., & Shvets, T. M. (2009). Polikultura z shistokh vydiv ryb. *Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1*, 38-42.
9. Tretiak, O. M. (2010). Systema naukovo obgruntovanoho rozvytku akvakultury veslonosa a Ukraini. *Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2*, 3-25.
10. Sherman, I. M., Korniienko, V. O., & Shevchenko, V. Yu. (2006). Aktualnist ta peredumovy domestykatsii predstavnykiv rodyny osetrovykh v umovakh pivdnia Ukrainy. *Tavriiskiy naukoviy visnyk, 44*, 145-154.
11. Sherman, I. M., & Ihnatov, O. V. (2007). Vyroshchuvannya tsoholitkiv sterliadi v umovakh pivdnia Ukrainy. *Tavriiskiy naukoviy visnyk, 50*, 129-133.
12. Konchits, V. V., & Mamedov, R. A. (2011). Sostoyanie i perspektivy vosstanovleniya chislennosti sterlyadi v vodoemakh Belarusi. *Zberezheniya genofondu ta vidnovlennya populyatsiy tsinnikh vidiv rib: Mizhnar. nauk. konf.: mater.* Kyiv: DIA, 48-58.
13. Kol'man, R. (2011). Razrabotka effektivnykh metodov proizvodstva posadochnogo materiala sterlyadi dlya vosstanovleniya utrachennykh populyatsiy. *Zberezheniya genofondu ta vidnovlennya populyatsiy tsinnikh vidiv rib: Mizhnar. nauk. konf.: mater.* Kyiv: DIA, 67-69.
14. Tretiak, O. M., et al. (2018). Deiaki problemy akvakultury osetropodibnykh ryb v Ukraini. *Suchasni problemy ratsionalnogo vykorystannia vodnykh bioresursiv: Mizhnar. nauk.-prakt. konf.: mater.* Kyiv: PRO FORMAT, 70-72.
15. Pashko, M. M., Tretiak, O. M., & Kolos, O. M. (2018). Rezultaty eksperymentiv zi shtuchnoho otrymannia ovulovanoi ikry vid plidnykiv sterliadi *Acipenser ruthenus* (Linnaeus) u netradytsiini stroky. *Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2*, 81-88.
16. Bugrov, L. Yu. (2007). Tekhnologiya sadkovogo rybovodstva dlya otkrytykh akvatoriyy – innovatsionnyy potentsial povysheniya effektivnosti ispol'zovaniya vodoemov. *Ratsional'noe ispol'zovanie presnovodnykh ekosistem – perspektivnoe napravlenie realizatsii natsional'nogo proekta «Razvitie APK»: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater.* Moskva: VNIIR, 62-68.
17. Pashko, M. M., et al. (2018). Rezultaty shtuchnoho vidtvorennia osetrovykh ryb, vyroshchennykh u sadkakh za pryrodnoho temperaturnoho rezhymu vodoim lisostepovoi zony Ukrainy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy, 3*, 39-49.
18. Mukvych, M. H. (2009). Suchasnyi stan, problemy ta zavdannia rozvytku rybnystva v Ukraini. *Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1*, 4-8.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 79-101

DOI: 10.15407/fsu2018.04.079

УДК 016:[597-146.3:621.59]

Received 13.07.18

Received in revised form 23.07.18

Accepted 09.08.18

КРІОКОНСЕРВАЦІЯ СТАТЕВИХ ПРОДУКТІВ РИБ. ТЕМАТИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

І. Й. Грициняк, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Т. М. Швець, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Підготовка довідкового переліку україно- та російськомовних публікацій з питань низькотемпературної консервації статевих клітин різних родин і видів риб та створення генетичних банків з метою збереження генетичного різноманіття популяцій цінних видів риб.

Методика. Під час системного пошуку у процесі формування тематичного переліку було застосовано як цілісний, так і вибірковий методи. Бібліографічне ядро складало виключно україно- та російськомовні наукові видання, присутні у фонді наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 150 джерел, що охоплюють часовий інтервал з 1979 по 2017 рр., та присвячені питанням історії розвитку і вивченню сучасного стану кріоконсервації статевих продуктів риб, її біологічним передумовам, методикам проведення і шляхам удосконалення останніх, проблемам впровадження досягнень кріобіотехнології у рибництво. Крім того, до переліку включено публікації, які стосуються створення і використання кріобанків як способу збереження генофонду риб-об'єктів аквакультури. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Підготовлений список публікацій може бути використаний науковцями, практиками, студентами, до сфери інтересів яких належать питання використання кріобіотехнологій з метою збереження генетичного різноманіття цінних видів риб та підвищення ефективності ведення рибництва.

Ключові слова: низькотемпературна консервація статевих продуктів риб, кріобанк гамет риб, кріопротектор, кріобіотехнології.

CRYOPRESERVATION OF FISH GERM CELLS. THEMATIC BIBLIOGRAPHY

Іr. Hrytsyniak, library@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

T. Shvets, library@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Forming a thematic bibliographic list of publications on studies of low-temperature preservation of sexual cells of various fish families and species and creating gene banks in order to preserve the genetic diversity of endangered fish species populations.

Methods. Complete and selective methods were applied in the process of the systematic search. The bibliographic core have been formed with the publications exclusively in Ukrainian and Russian from the fund of scientific library of the Institute of Fisheries NAAS of Ukraine.

© І. Й. Грициняк, Т. М. Швець, 2018

Findings. There was composed a thematic list of publications with a total quantity of 150 sources covering a time interval from 1979 to 2017, and including the questions on the history of the development and study of the current state of cryopreservation of fish sexual cells, its biological preconditions, methods and ways of their improvement, problems of the implementation of cryobiology achievements in fish farming. In addition, the list includes publications related to the creation and use of cryobanks as a way of preserving the fish gene pool. The literary sources are arranged in alphabetical order by author or title, and described according to DSTU 8302:2015 "Information and documentation. Bibliographic reference. General principles and rules of composition", with the amendments (code UKND 01.140.40), as well as in accordance with the requirements of APA style — international standard of references.

Practical value. The list may be useful for scientists, practitioners, students, whose area of interests covers the questions of using of cryo-technologies to reserve the genetic diversity of endangered fish species and increase the efficiency of fisheries.

Key words: fish sperm low-temperature preservation, fish gamete cryobank, cryoprotectant, cryobiotechnology.

КРИОКОНСЕРВАЦИЯ ПОЛОВЫХ ПРОДУКТОВ РЫБ. ТЕМАТИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Ир. И. Грициняк, library@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
Т. М. Швеца, library@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Формирование справочного перечня украино- и русскоязычных публикаций по вопросам низкотемпературной консервации половых клеток рыб различных семейств и видов, а также создания генетических банков с целью сохранения генетического разнообразия популяций ценных видов рыб.

Методика. В ходе системного поиска в процессе подготовки тематического перечня были применены как целостный, так и выборочный методы. Библиографическое ядро составляли исключительно украино- и русскоязычные научные издания, имеющиеся в фонде научной библиотеки Института рыбного хозяйства НААН Украины.

Результаты. Сформирован тематический библиографический перечень публикаций в количестве 150 источников, охватывающих временной интервал с 1979 по 2017 гг., и посвященных вопросам истории развития и изучению современного состояния криоконсервации половых продуктов рыб, ее биологическим предпосылкам, методикам проведения и путям совершенствования последних, проблемам внедрения достижений криобиотехнологии в рыбоводство. Кроме того, в перечень включены публикации, касающиеся создания и использования криобанков как способа сохранения генофонда рыб-объектов аквакультуры. Литературные источники размещены в алфавитном порядке по автору или названию, описаны согласно ДСТУ 8302:2015 «Информация и документация. Библиографическая ссылка. Общие положения и правила составления», с учетом поправок (код УКНД 01.140.40), а также в соответствии с требованиями к оформлению списка литературы по международному стандарту APA style.

Практическая значимость. Подготовленный список публикаций может быть использован учеными, практиками, студентами, в сферу интересов которых входят вопросы использования криобиотехнологий с целью сохранения генетического разнообразия ценных видов рыб и повышения эффективности ведения рыбоводства.

Ключевые слова: низкотемпературная консервация половых продуктов рыб, криобанк гамет рыб, криопротектор, криобиотехнологии.

1. Акимочкина Т. И. Цитологические особенности спермиев ценных видов рыб Волго-Каспийского бассейна и их изменение в зависимости от условий

- криоконсервации : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : 03.03.04 — клеточная биология, цитология и гистология. Астрахань : Астраханский государственный университет, 2010. 26 с.
2. Активность дегидрогеназ в плазме криоконсервированной спермы рыб / Каурова С. А. и др. // Криоконсервация как способ сохранения биологического разнообразия : конф. : матер. Пушино, 2008. С. 63—64.
 3. Алымов С. И., Васюкова А. Т., Василец С. В. Особенности криоконсервации спермы ручьевой форели (*Salmo trutta morpha fario*) // Рыбное хозяйство. 2003. Вип. 62. С. 124—126.
 4. Анализ криоколлекции белорыбицы (*Stenodus leucichthys leucichthys* Guld.) с помощью изоферментного и RAPD-анализа / Голованова Т. С. и др. // Холодноводная аквакультура: старт в XXI в. : Междунар. симп. : тезисы докл. Санкт-Петербург, 2003. С. 138—139.
 5. Ананьев В. И. Низкотемпературные генетические банки для развития аквакультуры, сохранение генетического разнообразия промысловых стад рыб, спасения видов и популяций, находящихся в угрожаемом состоянии, в северных регионах России // Холодноводная аквакультура: старт в XXI в. : Междунар. симп. : тезисы докл. Санкт-Петербург, 2003. С. 215—217.
 6. Ананьев В. И., Манохина М. С. К вопросу подготовки новой редакции научно-технической программы «Криобанк гидробионтов» на 2009–2014 гг. // Криоконсервация как способ сохранения биологического разнообразия : конф. : матер. Пушино, 2008. С. 15—16.
 7. Ананьев В. И., Манохина М. С., Виноградов М. Е. Проблемы создания криотехнологий для низкотемпературных генетических банков аквакультуры, сохранения геномов редких исчезающих видов рыб // Цитология. 2004. Т. 46, № 9. С. 765—766.
 8. Ананьев В. И., Манохина М. С., Голод В. М. Обоснование для создания регионального низкотемпературного генетического банка рыб и других гидробионтов Северо-Запада России // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : конф. : матер. Москва, 2007. С. 229—234.
 9. Ананьев В. И., Месс Ж., Багров А. М. Международный низкотемпературный генетический банк объектов аквакультуры // Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре : симпоз. : матер. докл. Адлер, 1999. С. 6—7.
 10. Баранникова И. А., Измайлов В. А. Пути сохранения осетровых [Заводское воспроизводство и криоконсервация гамет и эмбрионов] // Рыбное хозяйство. 1995. № 6. С. 44—45.
 11. Безусий О. Л., Черепнін В. О. Використання кобадаміду і плазми крові срібного карася при криоконсервації сперми коропа // Рибогосподарська наука України. 2012. № 4. С. 120—124.
 12. Бех В. В. Криоконсервация спермы карпов украинских пород // Цитология. 2004. Т. 46, № 9. С. 769.
 13. Бибенко О. В. Влияние факторов криоконсервирования на генетический аппарат спермиев рыб : автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. биол. наук : спец. 03.00.22 — криобиология. Харьков, 1993. 16 с.
 14. Бибенко О. В., Копейка Е. Ф. Влияние криоконсервации спермы карпа на эмбриогенез // Криоконсервирование репродуктивных клеток и эмбрионов. Харьков, 1992. С. 3—8.

15. Биологически активные вещества для криоконсервации спермы рыб — объектов рыбохозяйственных водоемов / Пронина Н. Д. и др. // Экологические проблемы пресноводных рыбохозяйственных водоемов России : Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвященная 80-летию Татарского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ». Санкт-Петербург : Татарское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ», 2011. С. 287—290.
16. Борышполец С. П., Дзюба Б. Б. Использование метанола для криоконсервирования спермиев различных видов рыб // Проблемы криобиологии. 2008. № 2. С. 224.
17. Буцкий К. И., Пуговкин А. Ю. Криорезистентность спермы белого толстолобика после стимуляции широкоиспользуемыми гормональными препаратами // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2014. Т. 24, № 2. С. 177.
18. Буцкий К. И., Пуговкин А. Ю., Копейка Е. Ф. Криоконсервирование спермы стерляди (*Acipenser ruthenus*) с использованием криозащитной среды на основе ДМСО // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2017. Т. 27, № 2. С. 174.
19. Буцкий К. И., Пуговкин А. Ю., Копейка Е. Ф. Вплив гормональних ін'єкцій на параметри якості та криорезистентність сперматозоїдів білого товстолобика (*Hypophthalmichthys molitrix*, Val. 1844) // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2014. Т. 24, № 2. С. 140—148.
20. Вивчення впливу криоконсервування та довгострокового зберігання сперми амурського сазана на життєстійкість личинок / Безусий О. Л. та ін. // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : IV Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф. : матер. Одеса, 2011. С. 30—32.
21. Влияние внутривидовых различий самцов карпа на криоустойчивость спермы / Цветкова Л. И. и др. // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1991. Вып. 61. С. 118—123.
22. Влияние ДМСО и продуктов его распада на сперматозоиды и выживаемость эмбрионов выюнов / Копейка Ю. Е. и др. // Проблемы криобиологии. 2002. № 4. С. 45—56.
23. Водно-солевой обмен спермиев карпа в условиях *in vitro* и состав среды для их криоконсервации / Дрокин С. И. и др. // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб : Междунар. конф., Санкт-Петербург, 20-22 апр. 2010 г. : тезисы докл. Санкт-Петербург, 2010. С. 57—59.
24. Возможность получения потомства карпа с применением криоконсервированных гамет / Наук В. В. и др. // Другий з'їзд гідроекологічного товариства України. Київ, 1997. Т. 2. С. 48—49.
25. Воспроизводство растительноядных рыб с использованием метода низкотемпературной консервации спермы / Цветкова Л. И. и др. // Проблемы воспроизводства растительноядных рыб, их роль в аквакультуре : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. докл. Адлер, 2000. С. 52—53.
26. Генетический банк данных рыб и водных беспозвоночных / Эрнест Л. К. и др. // Рыбное хозяйство. 1993. Т. 1. С. 28—29.
27. Горбунов Л. В. Необходимость разработки ускоренных режимов замораживания половых клеток и эмбрионов животных // Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем : Междунар. конф. молодых ученых : матер. Киев, 2002. С. 92—95.

28. Горбунов Л. В. Повышение воспроизводимости и обеспечение условий сопоставимости результатов криоконсервирования спермиев животных // Водні біоресурси і аквакультура : Міжнар. наук. конф. з нагоди 80-річчя Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України : матер. Київ, 2010. С. 325—327.
29. Горбунов Л. В. Температура внутрішньоклітинного кристалоутворення спермій коропа // Рибне господарство. 2004. Вип. 63. С. 54—57.
30. Горбунов Л. В., Бучацкий Л. П. Криоконсервация половых клеток и эмбрионов животных. Киев : Киевский университет, 2005. 325 с.
31. Горбунов Л. В., Гринжевский Н. В., Морозова И. А. Криоконсервация половых клеток и эмбрионов животных на основе применения сверхвысоких скоростей замораживания-оттаивания. Киев — Харьков : Харьковский биотехнологический центр ; Институт рыбного хозяйства УААН, 2002. 40 с.
32. Горбунов Л. В., Гринжевський М. В., Саліна А. С. Кріоконсервація статевих клітин риб на основі використання широкого діапазону швидкостей теплообміну // Проблеми воспроизводства аборигенных видов рыб : конф. : матер. Киев, 2005. С. 65—71.
33. Дзюба Б. Б. Активация, реактивация и оплодотворяющая способность спермиев белого толстолобика после разбавления криозащитной средой // Проблеми криобиології. 1997. № 3. С. 62—63.
34. Дзюба Б. Б., Дрокин С. И., Копейка Е. Ф. Некоторые аспекты криоконсервации спермы пелингаса // Проблеми криобиології. 1997. № 3. С. 67—68.
35. Дзюба Б. Б., Черепанов В. В., Копейка Е. Ф. Динамика клеточного объема спермиев карпа и белого толстолобика в период их движения до и после криоконсервации // Консервация генетических ресурсов. Пущино, 1996. С. 104—106.
36. Достижения в области криобиологии рыб и проблемы сохранения и устойчивого использования генетического разнообразия осетровых рыб: теоретические и практические аспекты / Ананьев В. И. и др. // Осетровые на рубеже XXI века : конф. : тезисы докл. Астрахань, 2001. С. 16—18.
37. Дрокин С. И. Влияние многократного получения спермы карпа на подвижность спермиев до и после криоконсервации и на жирнокислотный состав их фосфатидилхолина // Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 26-30 вер. 2005 р. : матер. Київ : Інститут рибного господарства УААН, 2005. С. 79—81.
38. Дрокин С. И. Криоконсервация спермы рыб Черного моря // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : IV Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф., Одеса, 7-11 вер. 2011 р. : тези. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011. С. 90—92.
39. Дрокин С. И. Связь методологии криоконсервации сперматозоидов различных видов рыб с их ультраструктурой // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : II Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф., Канів, 16-19 вер. 2009 р. : тези. Севастополь : Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського, 2009. С. 39—42.
40. Дрокин С. И., Забелинский С. А., Копейка Е. Ф. Влияние низкотемпературной консервации на фосфолипиды и их жирные кислоты сперматозоидов рыбы белого амура *Ctenopharyngodon idella* и индюка *Meleagris gallop.*

- Сравнительные аспекты // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. 1985. Т. 21, № 1. С. 79—82.
41. Жукинский В. Н., Копейка Е. Ф., Недялков Г. Ф. Криоконсервация спермы рыб и опыт ее использования для получения потомства карпа // Гидробиологический журнал. 1981. № 6. С. 39—51.
42. Жукинский В. Н., Недялков Г. Ф., Копейка Е. Ф. Результаты опытов осеменения карпа криоконсервированной спермой // Генетика, селекция, гибридизация: 2 Всесоюз. совещание, Ростов-на-Дону, 16-20 марта 1981 г. : тезисы докл. Ростов-на-Дону, 1981. С. 189—190.
43. Журавлева Г. Ф., Акимочкина Т. И. Изучение криопротекторных свойств различных химических соединений, используемых для замораживания и хранения репродуктивных клеток рыб // Естественные науки. 2010. № 1(30). С. 42—48.
44. Зависимость жизнеспособности криоконсервированных спермиев карпа от рецептуры криозащитных сред при долговременном хранении / Цветкова Л. И. и др. // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2006. Вып. 81. С. 41—45.
45. Земков Г. В. Оценка качества протекторов в различных условиях криоконсервации спермиев рыб // Цитология. 2004. Т. 46, № 9. С. 795—796.
46. Земков Г. В., Тихомиров А. М., Акимочкина Т. И. К биотехнологии криоконсервации репродуктивных клеток рыб // Ветеринарная патология. 2007. № 4. С. 214—215.
47. Изучение криоустойчивости спермиев карпа (*C. carpio*) в связи с особенностями активации движения / Дзюба Б. Б. и др. // Проблемы криобиологии. 2001. № 3. С. 60.
48. Использование генетического криобанка для сохранения генофонда рыб — объектов аквакультуры / Цветкова Л. И. и др. // Цитология. 2004. Т. 46, № 10. С. 876—877.
49. Использование новых технологий в аквакультуре [Криоконсервирование спермы самцов-производителей и подращивание молоди разных видов рыб] / Войнова Н. В. и др. // Холодноводная аквакультура: старт в XXI в. : Междунар. симп. : тезисы докл. Санкт-Петербург, 2003. С. 78—80.
50. Использование природных криопротекторов при криоконсервации спермы рыб / Каранова М. В. и др. // Первый конгресс ихтиологов России : тезисы докл. Москва, 1997. С. 356—357.
51. Исследование низкотемпературной консервации спермы рыб / Цветкова Л. И. и др. // Генетика, селекция и воспроизводство рыб : Первая Всерос. конф. : матер. Санкт-Петербург, 2002. С. 49—50.
52. К проблеме сохранения геномов осетровых рыб путем криоконсервации спермы / Цветкова Л. И. и др. // Осетровые на рубеже XXI в. : Междунар. конф. : тезисы докл. Астрахань, 2000. С. 32—33.
53. Каранова М. В., Цветкова Л. И. Криопротективные свойства антифризных гликопротеинов при замораживании спермы рыб // Избранные труды ВНИИПРХ. В 4 т. Дмитров : Север Подмосковья, 2002. С. 369—376.
54. Катасонов В. Я., Цветкова Л. И., Ананьев В. И. Генетическая коллекция спермы рыб // Рыбоводство и рыболовство. 1994. № 1. С. 34—35.
55. Качество криоконсервированной спермы сазанов после 25 лет хранения / Копейка Е. Ф. и др. // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : IV Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф., Одеса, 7-11 вер. 2011 р. : тези.

- Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2011. С.136—138.
56. Кононенко І. С. Комплексна оцінка молоді стерляді (*Acipenser ruthenus* L., 1758), отриманої з використанням кріобіотехнологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 06.02.03 — рибництво. Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2017. 17 с.
 57. Кононенко І. С. Оцінка виживання молоді стерляді (*Acipenser ruthenus*, L. 1758), отриманої від запліднення ікри кріоконсервованою спермою // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : Х Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф. : матер. Київ, 2017. С. 164—169.
 58. Кононенко І. С. Оцінка виживаності молоді стерляді, отриманої від кріоконсервованої сперми // Тваринництво України. 2017. № 3—4. С. 31—35.
 59. Кононенко І. С. Розроблення кріозахисних середовищ для низькотемпературного заморожування сперми стерляді (*Acipenser ruthenus*) // Рибогосподарська наука України. 2017. № 2 (40). С. 99—113.
 60. Кононенко І. С., Бех В. В. Кріоконсервування статевих продуктів — ефективний метод збереження біорізноманіття осетрових видів риб // Рибогосподарська наука України. 2016. № 2 (36). С. 5—21.
 61. Контейнер для розміщенні молочка коропа при заморожуванні-відтаюванні / Міщенко А. Г. та ін. // Ветеринарна біотехнологія. 2007. № 10. С. 133—137.
 62. Концепция сохранения и устойчивого использования биоразнообразия с применением методов криоконсервации геномов гидробионтов / Ананьев В. И. и др. // Избранные труды ВНИИПРХ. В 4 т. Дмитров : Север Подмоскovie, 2002. С. 385—399.
 63. Копейка Е. Ф. Инструкция по низкотемпературной консервации спермы карпа. Москва, 1986. 10 с.
 64. Копейка Е. Ф. Исследование влияния защитных сред на сперму осетровых рыб при низкотемпературной консервации : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Харьков : Институт криобиологии и криомедицины, 1982. 23 с.
 65. Копейка Е. Ф. Экологическая ниша как фактор, определяющий криорезистентность сперматозоидов рыб // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2014. Т. 24, № 4. С. 302—311.
 66. Копейка Е. Ф. Эволюция рыб и криорезистентность сперматозоидов // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2012. Т. 22, № 3. С. 239.
 67. Копейка Е. Ф., Вийо П., Гончаров Б. Ф. Динамика созревания и криорезистентность сперматозоидов сибирского осетра *Acipenser baerii* // Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів : Міжнарод. наук.-практ. конф. : матер. Київ, 2005. С. 125.
 68. Копейка Е. Ф., Копейка Ю. Е. Варибельность качества и криорезистентность спермиев рыб // Цитология. 2004. Т. 46, № 9. С. 806.
 69. Криоконсервация половых продуктов рыб для сохранения исходной генетической и популяционной структуры / Пронина Н. Д. и др. // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб : Междунар. конф., Санкт-Петербург, 20-22 апр. 2010 г. : тезисы докл. Санкт-Петербург, 2010. С. 176—177.
 70. Криоконсервация репродуктивных клеток рыб: история и перспективы / Пономарева Е. Н. и др. // Рыбное хозяйство. 2017. № 4. С. 85—88.

71. Кріоконсервація сперми карпа под захитою 1,3-бутиленгліколю / Борончук Г. В. и др. // Консервація генетических ресурсов. Пушино, 1996. С. 98—99.
72. Кріоконсервація сперми белорыбицы и белуги / Андреев А. А. и др. // Консервація генетических ресурсов. Пушино, 1996. С. 96—98.
73. Кріоконсервація сперми буффало / Цветкова Л. И. и др. // Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре: симпоз.: матер. докл. Адлер, 1999. С. 109—110.
74. Кріоконсервація сперми европейского окуня *Perca fluviatilis* L. с использованием метанола в качестве криопротектора / Дзюба Б. и др. // Кріоконсервація как способ сохранения биологического разнообразия: конф.: матер. Пушино, 2008. С. 48—49.
75. Кріоконсервація спермы рыб: состояние, развитие, перспективы / Цветкова Л. И. и др. // Избранные труды ВНИИПРХ. В 4 т. Дмитров: Север Подмосковья, 2002. С. 358—366.
76. Кріоконсервація спермы тихоокеанских лососей Камчатки чавычи и кеты / Желтоножко О. В. и др. // Проблемы криобиологии. 1996. № 3. С. 30—34.
77. Кріоконсервирование спермы лососевых рыб / Цветкова Л. И. и др. // Холодноводная аквакультура: старт в XXI век: Междунар. симпоз.: матер. Санкт-Петербург, 2003. С. 112.
78. Кріоконсервирование спермы стерляди: оптимизация состава криозащитной среды / Пуговкин А. Ю. и др. // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2016. Т. 26, № 2. С. 160.
79. Криотехнологии для сохранения генофонда рыб-объектов аквакультуры / Цветкова Л. И. и др. // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2005. Вып. 80. С. 140—144.
80. Криотехнологии для сохранения и промышленного использования генетических ресурсов / Пронина Н. Д. и др. // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности. Москва, 2005. Т. 2. С. 207—210.
81. Лунев Г. Е., Тренклер И. В. Кріоконсервація спермы русского осетра с использованием метилового спирта // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб: Междунар. конф., Санкт-Петербург, 20-22 апр. 2010 г.: тезисы докл. Санкт-Петербург, 2010. С. 107—108.
82. Манохина М. С., Ананьев В. И. Кріоконсервація ембрионов и личинок гидробионтов. Проблемы и перспективы // Кріоконсервація как способ сохранения биологического разнообразия: конф.: матер. Пушино, 2008. С. 88—89.
83. Манохина М. С., Ананьев В. И. Новое в подходах к решению проблемы кріоконсервации ембрионов и личинок рыб // Генетика, селекция и воспроизводство рыб: Первая Всерос. конф.: матер. Санкт-Петербург, 2002. С. 48—49.
84. Метальникова К. В. Получение и кріоконсервація спермы реверсантов — перспективный способ сохранения геномов самок [Рыбы] // Ветеринарная патология. 2008. № 2. С. 150—152.
85. Метальникова К. В. Предварительные наброски к обоснованию научной программы "Сохранение биоразнообразия различных видов рыб с использованием методов получения спермы реверсантов (самок) и ее кріоконсервации" // Цитология. 2004. Т. 46, № 9. С. 821.

86. Метод криоконсервации спермы осетровых рыб — объектов аквакультуры / Докина О. Б. и др. // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : IV Междунар. науч.-практ. конф. : матер. докл. Москва : ВНИРО, 2006. С. 76—79.
87. Метод криоконсервации спермы рыб — для сохранения геномов и получения жизнестойкого потомства / Цветкова Л. И. и др. // Проблемы и перспективы развития аквакультуры в России : науч.-практ. конф. : сбор. труд. Адлер, 2001. С. 116—117.
88. Методическое пособие по криоконсервации спермы карпа, лососевых и осетровых видов рыб / Цветкова Л. И. и др. Москва : ВНИИПРХ, 1997. 11 с.
89. Миксон К. Б., Зинченко А. А., Боброва Е. Н. Фазовые переходы и стеклование в криозащитных средах и эмбрионах выюна // Проблемы криобиологии. 2008. № 2. С. 225.
90. Миксон К. Б., Ревенко Е. Б., Гапон А. А. Влияние растворов криопротекторов на выживаемость и тератогенность эмбрионов карася (*Carassius auratus gibelio* Bloch, 1783) // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2014. Т. 24, № 2. С. 149—156.
91. Миксон К. Б., Черепанов В. В. Влияние растворов криопротекторов на выживаемость эмбрионов карася // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2012. Т. 22, № 3. С. 373.
92. Морозова И. А., Горбунова Н. И., Горбунов Л. В. Влияние объемного расширения среды, содержащей биообъект, на сохранность деконсервированных половых клеток и эмбрионов животных при сверхвысоких скоростях замораживания // Рыбное хозяйство. 2002. Вып. 61. С. 37—41.
93. Некоторые проблемы криоконсервации генофонда рыб / Петропавлов Н. Н. и др. // Первый конгресс ихтиологов России : тезисы докл. Москва, 1997. С. 361.
94. Низкотемпературная консервация спермы осетровых / Копейка Е. Ф. и др. // Осетровое хозяйство внутренних водоемов СССР : 2 Всесоюз. совещ., 26 февр.-2 марта 1979 г. : тезисы и рефераты. Астрахань, 1979. С. 220.
95. Низкотемпературная консервация спермы рыб / Копейка Е. Ф. и др. // Генетика, селекция гибридизация рыб : 2 Всесоюз. совещ., Ростов-на-Дону, 16-20 марта 1981 г. : тезисы докл. Ростов-на-Дону, 1981. С. 105—106.
96. Низкотемпературный генный банк спермы рыб – один из методов сохранения биологического разнообразия ихтиоценозов / Цветкова Л. И. и др. // Проблемы развития рыбного хозяйства на внутренних водоемах в условиях перехода к рыночным отношениям : Междунар. конф. : матер. Минск, 1998. С. 102—104.
97. Низькотемпературне криоконсервування сперми українських порід коропа / Гринжевський М. В. та ін. // Вісник аграрної науки. 2001. № 8. С. 37—38.
98. Новые криотехнологии для сохранения генофондов рыб / Пронина Н. Д. и др. // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2008. Вып. 24. С. 187—190.
99. О жизнестойкости личинок карпа, полученных с использованием замороженной спермы / Цветкова Л. И. и др. // Рыбоводство и рыболовство. 1995. № 3—4. С. 19.
100. О некоторых факторах, влияющих на криоустойчивость спермы карпа *Cyprinus carpio* / Цветкова Л. И. и др. // Вопросы ихтиологии. 1995. Т. 35, № 6. С. 804—810.

101. Образование льда при замерзании криозащитных растворов [Криоконсервация спермы рыб] / Андреев А. А. и др. // Ветеринарная патология. 2007. № 4. С. 231—234.
102. Определение вероятности образования микроскопических пор в мембранах криоконсервированных сперматозоидов карпа (*Cyprinus carpio*) / Буцкий К. И. и др. // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2015. Т. 25, № 2. С. 168.
103. Оптимизация криозащитных сред для замораживания спермы карпа, сибирского осетра и радужной форели / Пронина Н. Д. и др. // Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем : Междунар. конф. молодых ученых : матер. Киев, 2002. С. 119.
104. Оптимизация процесса криоконсервации спермы осетровых рыб при использовании различных сред / Пономарева Е. Н. и др. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. Т. 11, № 1(2). С. 132—134.
105. Оптимізація умов кріоконсервування сперми стерляді (*Acipenser ruthenus*, L. 1758) для запліднення ікри в умовах рибних господарств / Кононенко І. С. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2017. № 3. С. 83—95.
106. Опыт получения качественной спермы веслоноса и ее криоконсервация / Копейка Е. Ф. и др. // Криоконсервация как способ сохранения биологического разнообразия : конф. : матер. Пущино, 2008. С. 65—66.
107. Особенности кристаллизации высококонцентрированных суспензий клеток, содержащих осмотически неактивные внутриклеточные структуры [К криоконсервации спермы рыб] / Дрокин С. И. и др. // Ветеринарная патология. 2008. № 2. С. 141—143.
108. Оценка качества криоконсервированных молок сибирского осетра (*Acipenser baerii stenorhynchus* Nikol'sky) / Глоговски Я. и др. // Осетровые на рубеже XXI века : Междунар. конфер. : тез. докл. Астрахань, 2000. С. 229—230.
109. Очкур С. И., Цветкова Л. И. Влияние кислородного режима преднерестового содержания производителей сазана и карпа на дыхание, подвижность и криоустойчивость сперматозоидов // VIII науч. конф. по экологической физиологии и биохимии рыб : тезисы докл. Петрозаводск, 1992. Т. 2. С. 31—32.
110. Пилюев С. А. Применение криоконсервации в рыбоводстве // Селекция рыб : сб. науч. тр. Москва : Агропромиздат, 1989. С. 100—105.
111. Пилюев С. А. Проблемы криоконсервации в области рыбоводства // Рыбохозяйственное освоение водоемов комплексного назначения. Москва, 1990. С. 66—72.
112. Получение диспермного андрогенеза у сибирского осетра и андрогенетических гибридов между сибирским и русским осетрами с использованием криоконсервированной спермы / Грунина А. С. и др. // Криоконсервация как способ сохранения биологического разнообразия : конф. : матер. Пущино, 2008. С. 46—47.
113. Пономарёва Е. Н., Богатырева М. М., Тихомиров А. М. Использование криоконсервированного генетического материала для воспроизводства осетровых рыб // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб : Междунар. конф. : тезисы докл. Санкт-Петербург, 2010. С. 172—173.

114. Проблемы сохранения геномов лососевых и осетровых рыб / Ананьев В. И. и др. // Избранные труды ВНИИПРХ. В 4 т. Дмитров : Север Подмосковья, 2002. С. 399—412.
115. Пронина Н. Д. Оценка качества криоконсервированной спермы рыб // Цитология. 2004. Т. 46, № 9. С. 843—844.
116. Пуговкин А. Ю., Копейка Е. Ф. Исследование процесса переноса молекул воды через мембраны сперматозоидов щуки (*Esox lucius* L.) // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2015. Т. 25, № 2. С. 165.
117. Пуговкин А. Ю., Копейка Е. Ф. Осмотическая резистентность сперматозоидов карпа *Cyprinus carpio* // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2013. Т. 23, № 2. С. 190.
118. Пуговкин А. Ю., Буцкий К. И. Проницаемость мембран сперматозоидов стерляди (*Acipenser ruthenus* L.) и карпа (*Cyprinus carpio* L.) // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2014. Т. 24, № 2. С. 178.
119. Пуговкін А. Ю., Копейка Є. Ф. Проникність плазматичних мембран сперматозоїдів коропа (*Cyprinus carpio*, L., 1758) для молекул води та кріопротекторів на різних етапах кріоконсервування // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2016. Т. 26, № 4. С. 340—348.
120. Реакция спермиев карпа на солевые среды как тест на криорезистентность / Пуговкин А. Ю. и др. // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : IV Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф., Одеса, 7-11 вер. 2011 р. : тези. Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2011. С.185—186.
121. Результаты криоконсервации спермы карповых рыб / Богатырева М. М. и др. // Комплексные исследования биологических ресурсов южных морей и рек : Вторая Междунар. конф. молодых ученых и специалистов : матер. Астрахань, 2007. С. 22—24.
122. Результаты хранения образцов спермы севрюги / Богатырева М. М. и др. // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2008. № 3. С. 22—25. (Рыбное хозяйство).
123. Рекрут С. В., Павліщенко В. М., Журавель М. П. До питання про створення кріобанку гамет риб // Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф. : матер. Київ, 2005. С. 217.
124. Савушкина С. И. Выращивание рыбопосадочного материала, полученного с использованием криоконсервированной спермы // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : конф. : матер. Москва, 2007. С. 303—305.
125. Савушкина С. И. Качество производителей сибирского осетра, при получении которых использована криоконсервированная сперма // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : конф. : матер. Москва, 2005. Т. 2. С. 227—232.
126. Савушкина С. И. Методические аспекты биотехнологии криоконсервации половых продуктов пресноводных рыб // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : конф. : матер. Москва, 2005. Т. 2. С. 217—227.

127. Савушкина С. И. Устойчивость сперматозоидов русского осетра к замораживанию // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : II Междунар. конф. : матер. Астрахань, 2001. С. 32.
128. Савушкина С. И., Козовкова Н. А. Воспроизводство молоди сибирского осетра с использованием криоконсервированной спермы // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : II Междунар. конф. : матер. Астрахань, 2001. С. 66—67.
129. Савушкина С. И., Цветкова Л. И., Пронина Н. Д. Эффективность использования метода низкотемпературной консервации спермы рыб в аквакультуре // Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре : Междунар. симпоз. : тезисы докл. Краснодар, 1996. С. 96—97.
130. Савушкина С. И. Выращивание рыбопосадочного материала, полученного с использованием криоконсервированной спермы // Рациональное использование пресноводных экосистем – перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : конф. : матер. Москва, 2007. С. 303—305.
131. Семенова Л. Э., Галимова Л. В. Технические характеристики криозамораживающего устройства // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : II Междунар. конф. : матер. Астрахань, 2001. С. 33—34.
132. Сохранение генетического разнообразия рыб методом низкотемпературной консервации половых продуктов / Цветкова Л. И. и др. // Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре : Междунар. симпоз. : тезисы докл. Краснодар, 1996. С. 102.
133. Технология криоконсервации и хранения в низкотемпературном банке спермы рыб / Цветкова Л. И. и др. // Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре. Москва : ВНИРО, 2001. С. 152—158.
134. Тихомиров А. М. Перспективы создания регионального криобанка гидробионтов Волго-Каспийского бассейна // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : II Междунар. конф. : матер. Астрахань, 2001. С. 36—37.
135. Тихомиров А. М., Богатырева М. М., Джаригазов Е. С. Влияние метода замораживания и оттаивания на качество спермы русского осетра // Рациональное использование пресноводных экосистем – перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : конф. : матер. Москва, 2007. С. 308—310.
136. Тихомиров А. М., Богатырева М. М., Джаригазов Е. С. Влияние объемов, режимов замораживания и оттаивания на качество спермы русского осетра при криоконсервации // Рациональное использование пресноводных экосистем – перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : конф. : матер. Москва, 2007. С. 311—313.
137. Тихомиров А. М., Богатырева М. М., Красильникова А. А. Разработка криозащитных сред для низкотемпературного консервирования сперматозоидов белорыбицы (*Stenodus leucichthys* Guldenstadti, 1772) в целях сохранения генофонда // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2011. № 1. С. 58—62. (Рыбное хозяйство).
138. Тихомиров А. М., Пономарева Е. Н. Электростимуляция мембран спермиев русского осетра облегчает проникновение криопротекторов внутрь клеток //

- Криоконсервация как способ сохранения биологического разнообразия : конф. : матер. Пущино, 2008. С. 129—130.
139. Томиленко В. Г., Жукинский В. Н., Копейка Е. Ф. Криоконсервация спермы карпов украинской чешуйчатой породы нивчанского внутривидового типа и возможности использования ее в рыборазведении // Рыбное хозяйство. 1983. Вып. 37. С. 6—10.
 140. Филиппов В. Ю., Мрук А. И., Буцацкий Л. П. Криоконсервация половых клеток редких и исчезающих видов рыб (ручьевая форель, дунайский лосось, хариус европейский) // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб : Междунар. конф., Санкт-Петербург, 20-22 апр. 2010 г. : тезисы докл. Санкт-Петербург, 2010. С. 224—225.
 141. Цветкова Л. И. Создание низкотемпературной коллекции спермы рыб // Избранные труды ВНИИПРХ. В 4 т. Дмитров : Север Подмосковья, 2002. С. 412—417.
 142. Цветкова Л. И., Докина О. Б., Пронина Н. Д. Криоконсервация спермы амуров (*Stenopharyngodon idella*, *Mylopharyngodon piceus*) // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2001. Вып. 76. С. 73—76.
 143. Цедик В. В. Криоконсервация — метод збереження генофонду риб // Проблеми аквакультури і функціонування водних екосистем : Междунар. конф. молодых ученых : матер. Киев, 2002. С. 131—133.
 144. Черепанов В. В. Влияние факторов криоконсервирования на энергетический обмен активированных спермиев сазана // Проблемы криобиологии. 2003. № 4. С. 58—65.
 145. Черепанов В. В., Желтоножко С. В., Желтоножко В. В. Криоконсервация спермы реофильной нерки // Проблемы криобиологии. 2000. № 2. С. 64—70.
 146. Черепанов В. В., Копейка Е. Ф. Криоустойчивость спермиев сазана, выделенных из различных участков молок // Проблемы криобиологии. 2000. № 3. С. 59—63.
 147. Чипинов В. Г., Джаригаев Е. С., Болонина Н. В. Оценка качества спермы осетровых рыб различными методами и опыт ее низкотемпературной консервации // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2010. № 1. С. 140—143. (Рыбное хозяйство).
 148. Штайн Г. Криоконсервация гамет рыб // Проблемы криобиологии. 1991. № 3. С. 42—45.
 149. Экспериментальные исследования процесса криоконсервации спермы русского осетра в Турции / Джаригаев Е. С. и др. // Инновационные технологии аквакультуры : Междунар. науч. конф., 21-22 сент. 2009 г., г. Ростов-на-Дону : тезисы докл. Ростов-на-Дону, 2009. С. 45—47.
 150. Электростимуляция как способ увеличения проницаемости мембран спермиев осетровых рыб для криопротекторов / Пономарева Е. Н. и др. // Инновационные технологии аквакультуры : Междунар. науч. конф., Ростов-на-Дону, 21-22 сент. 2009 г. : тезисы докл. Ростов-на-Дону, 2009. С. 117—118.

REFERENCES

1. Akimochkina, T. I. (2010). Tsitologicheskie osobennosti spermiev tsennykh vidov ryb Volgo-Kaspiyskogo basseyna i ikh izmenenie v zavisimosti ot usloviy kriokonservatsii. *Extended abstract of candidate's thesis*. Astrakhan': Astrakhanskiy gosudarstvennyy universitet.

2. Kaurova, S. A., et al. (2008). Aktivnost' dehidrogenaz v plazme kriokonservirovannoy spermy ryb. *Kriokonservatsiya kak sposob sokhraneniya biologicheskogo raznoobraziya: konf.: mater.* Pushchino, 63-64.
3. Alymov, S. I., Vasyukova, A. T., & Vasilets, S. V. (2003). Osobennosti kriokonservatsii spermy ruch'evoy foreli (*Salmo trutta morpha fario*). *Rybne gosподarstvo*, 62, 124-126.
4. Golovanova, T. S., et al. (2003). Analiz kriokollektsii belorybitsy (*Stenodus leucichthys leucichthys* Guld.) s pomoshch'yu izofermentnogo i RAPD-analiza. *Kholodnovodnaya akvakul'tura: start v XXI v.: Mezhdunar. simp.: tezisy dokl.* Sankt-Peterburg, 138-139.
5. Anan'ev, V. I. (2003). Nizkotemperaturnye geneticheskie banki dlya razvitiya akvakul'tury, sokhraneniye geneticheskogo raznoobraziya promyslovykh stad ryb, spaseniya vidov i populyatsiy, nakhodyashchikhsya v ugrozhaemom sostoyanii, v severnykh regionakh Rossii. *Kholodnovodnaya akvakul'tura: start v XXI v.: Mezhdunar. simp.: tezisy dokl.* Sankt-Peterburg, 215-217.
6. Anan'ev, V. I., & Manokhina, M. S. (2008). K voprosu podgotovki novoy redaktsii nauchno-tekhnicheskoy programmy «Kriobank gidrobiontov» na 2009–2014 gg. *Kriokonservatsiya kak sposob sokhraneniya biologicheskogo raznoobraziya: konf.: mater.* Pushchino, 15-16.
7. Anan'ev, V. I., Manokhina, M. S., & Vinogradov, M. E. (2004). Problemy sozdaniya kriotekhnologiy dlya nizkotemperaturnykh geneticheskikh bankov akvakul'tury, sokhraneniya genomov redkikh ischezayushchikh vidov ryb. *Tsitologiya*, 46(9), 765-766.
8. Anan'ev, V. I., Manokhina, M. S., & Golod, V. M. (2007). Obosnovanie dlya sozdaniya regional'nogo nizkotemperaturnogo geneticheskogo banka ryb i drugikh gidrobiontov Severo-Zapada Rossii. *Ratsional'noe ispol'zovanie presnovodnykh ekosistem – perspektivnoe napravleniye realizatsii natsional'nogo proekta «Razvitie APK»: konf.: mater.* Moskva, 229-234.
9. Anan'ev, V. I., Mess, Zh., & Bagrov, A. M. (1999). Mezhdunarodnyy nizkotemperaturnyy geneticheskiy bank ob"ektov akvakul'tury. *Resursoberegayushchie tekhnologii v akvakul'ture: simpoz.: mater. dokl.* Adler, 6-7.
10. Barannikova, I. A., & Izmaylov, V. A. (1995). Puti sokhraneniya osetrovnykh [Zavodskoe vosproizvodstvo i kriokonservatsiya gamet i embrionov]. *Rybnoe khozyaystvo*, 6, 44-45.
11. Bezusiy, O. L., & Cherepnin, V. O. (2012). Vikoristannya kobadamidu i plazmi krovi sribnogo karasya pri kriokonservatsii spermi koropa. *Rybohospodars'ka nauka Ukrainy*, 4, 120-124.
12. Bekh, V. V. (2004). Kriokonservatsiya spermy karpov ukrainskikh porod. *Tsitologiya*, 46(9), 769.
13. Bibenko, O. V. (1993). Vliyanie faktorov kriokonservirovaniya na geneticheskiy apparat spermiev ryb. *Extended abstract of candidate's thesis.* Khar'kov.
14. Bibenko, O. V., & Kopeyka, E. F. (1992). Vliyanie kriokonservatsii spermy karpa na embriogenezu. *Kriokonservirovaniye reproduktivnykh kletok i embrionov.* Khar'kov, 3-8.
15. Pronina, N. D. et al. (2011). Biologicheskii aktivnyye veshchestva dlya kriokonservatsii spermy ryb - ob"ektov rybokhozyaystvennykh vodoemov. *Ekologicheskiiye problemy presnovodnykh rybokhozyaystvennykh vodoemov Rossii: Vseros. nauch. konf. s mezhdunar. uchastiem, posvyashchennaya 80-letiyu*

- Tatarskogo otdeleniya FGBNU «GosNIORKh»*. Sankt-Peterburg: Tatarskoe otdelenie FGBNU «GosNIORKh», 287-290.
16. Boryshpolets, S. P., & Dzyuba, B. B. (2008). Ispol'zovanie metanola dlya kriokonservirovaniya spermiev razlichnykh vidov ryb. *Problemy kriobiologii*, 2, 224.
 17. Butskiy, K. I., & Pugovkin, A. Yu. (2014). Kriorezistentnost' spermy belogo tolstolobika posle stimulyatsii shirokoispol'zuemymi gormonal'nymi preparatami. *Problemy kriobiologii i kriomedsiny*, 24(2), 177.
 18. Butskiy, K. I., Pugovkin, A. Yu., & Kopeyka, E. F. (2017). Kriokonservirovanie spermy sterlyadi (*Acipenser ruthenus*) s ispol'zovaniem kriozashchitnoy sredy na osnove DMSO. *Problemy kriobiologii i kriomedsiny*, 27(2), 174.
 19. Butskiy, K. I., Pugovkin, A. Yu., & Kopeyka, E. F. (2014). Vpliv gormonal'nikh iniektсий na parametri yakosti ta kriorezistentnist' spermatozoidiv bilogo tovtolobika (*Hypophthalmichthys molitrix*, Val. 1844). *Problemy kriobiologii i kriomedsiny*, 24(2), 140-148.
 20. Bezusiy, O. L., et al. (2011). Vivchennya vplivu kriokonservuvannya ta dovghostrokovogo zberigannya spermi amurs'kogo sazana na zhittiestyikist' lichinok. *Suchasni problemi teoretichnoi i praktichnoi ikhtiologii: IV Mizhnar. ikhtiologichna nauk.-prakt. konf.: mater.* Odesa, 30-32.
 21. Tsvetkova, L. I., et al. (1991). Vliyanie vnutripodnykh razlichiy samtsov karpa na krioustoychivost' spermy. *Sbornik nauchnykh trudov VNIIPRKh*, 61, 118-123.
 22. Kopeyka Yu. E. et al. (2002). Vliyanie DMSO i produktov ego raspada na spermatozoidy i vyzhivaemost' embrionov v'yunov. *Problemy kriobiologii*, 4, 45-56.
 23. Drokin, S. I., et al. (2010). Vodno-solevoy obmen spermiev karpa v usloviyakh in vitro i sostav sredy dlya ikh kriokonservatsii. *Vosproizvodstvo estestvennykh populyatsiy tsennykh vidov ryb: Mezhdunar. konf., Sankt-Peterburg, 20-22 apr. 2010 g.: tezisy dokl.* Sankt-Peterburg, 57-59.
 24. Nauk, V. V., et al. (1997). Vozmozhnost' polucheniya potomstva karpa s primeneniem kriokonservirovannykh gamet. *Drugiy z'ezd gidroekologichnogo tovaristva Ukraini*. (Vol. 2). Kyiv, 48-49.
 25. Tsvetkova, L. I., et al. (2000). Vosproizvodstvo rastitel'noyadnykh ryb s ispol'zovaniem metoda nizkotemperaturnoy konservatsii spermy. *Problemy vosproizvodstva rastitel'noyadnykh ryb, ikh rol' v akvakul'ture: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater. dokl.* Adler, 52-53.
 26. Ernest, L. K., et al. (1993). Geneticheskii bank dannykh ryb i vodnykh bespozvonochnykh. *Rybnoe khozyaystvo*, 1, 28-29.
 27. Gorbunov, L. V. (2002). Neobkhodimost' razrabotki uskorennykh rezhimov zamorazhivaniya polovykh kletok i embrionov zhivotnykh. *Problemy akvakul'tury i funktsionirovaniya vodnykh ekosistem: Mezhdunar. konf. molodykh uchenykh: mater.* Kiev, 92-95.
 28. Gorbunov, L. V. (2010). Povyshenie vosproizvodimosti i obespechenie usloviy sopostavimosti rezul'tatov kriokonservirovaniya spermiev zhivotnykh. *Vodni bioresursy i akvakul'tura: Mizhnar. nauk. konf. z nagodi 80-richchya Institutu rybnogo gospodarstva Natsional'noi akademii agrarnykh nauk Ukrainy: mater.* Kyiv, 325-327.
 29. Gorbunov, L. V. (2004). Temperatura vnutrishn'oklitinnogo kristaloutvorenniya spermiiv koropa. *Rybne gospodarstvo*, 63, 54-57.

30. Gorbunov, L. V., & Buchatskiy, L. P. (2005). *Kriokonservatsiya polovykh kletok i embrionov zhivotnykh*. Kiev: Kievskiy universitet.
31. Gorbunov, L. V., Grinzhevskiy, N. V., & Morozova, I. A. (2002). Kriokonservatsiya polovykh kletok i embrionov zhivotnykh na osnove primeneniya sverkhvysokikh skorostey zamorazhivaniya-otthavaniya. Kiev - Khar'kov: Khar'kovskiy biotekhnologicheskiy tsentr; Institut rybnogo khozyaystva UAAN.
32. Gorbunov, L. V., Grinzhevskiy, M. V., & Salina, A. S. (2005). Kriokonservatsiya statevikh klitin ryb na osnovi vikoristannya shirokogo diapazonu shvidkostey teploobminu. *Problemy vosproizvodstva aborigennykh vidov ryb: konf.: mater.* Kiev, 65-71.
33. Dzyuba, B. B. (1997). Aktivatsiya, reaktivatsiya i oplodotvoryayushchaya sposobnost' spermiev belogo tolstolobika posle razbavleniya krioazhchitnoy sredoy. *Problemy kriobiologii*, 3, 62-63.
34. Dzyuba, B. B., Drokin, S. I., & Kopeyka, E. F. (1997). Nekotorye aspekty kriokonservatsii spermy pelingasa. *Problemy kriobiologii*, 3, 67-68.
35. Dzyuba, B. B., Cherepanov, V. V., & Kopeyka, E. F. (1996). Dinamika kletochnoy ob"ema spermiev karpa i belogo tolstolobika v period ikh dvizheniya do i posle kriokonservatsii. *Konservatsiya geneticheskikh resursov*. Pushchino, 104-106.
36. Anan'ev, V. I., et al. (2001). Dostizheniya v oblasti kriobiologii ryb i problemy sokhraneniya i ustoychivogo ispol'zovaniya geneticheskogo raznoobraziya osetrovnykh ryb: teoreticheskie i prakticheskie aspekty. *Osetrovye na rubezhe XXI veka: konf.: teziy dokl.* Astrakhan', 16-18.
37. Drokin, S. I. (2005). Vliyanie mnogokratnogo polucheniya spermy karpa na podvizhnost' spermiev do i posle kriokonservatsii i na zhirnokislотноy sostav ikh fosfatidilkholina. *Aktual'ni problemi akvakul'turi ta ratsional'nogo vikoristannya vodnykh bioresursiv: Mizhnar. nauk.-prakt. konf., Kyiv, 26-30 ver. 2005 r.: mater.* Kyiv: Institut rybnogo gospodarstva UAAN, 79-81.
38. Drokin, S. I. (2011). Kriokonservatsiya spermy ryb Chernogo morya. *Suchasni problemi teoretichnoi ta praktichnoi ikhtiologii: IV Mizhnar. ikhtiologichna nauk.-prakt. konf., Odesa, 7-11 ver. 2011 r.: tezi.* Odesa: Odes'kiy natsional'niy universitet imeni I. I. Mechnikova, 90-92.
39. Drokin, S. I. (2009). Svyaz' metodologii kriokonservatsii spermatozoidov razlichnykh vidov ryb s ikh ul'trastrukturoy. *Suchasni problemi teoretichnoi ta praktichnoi ikhtiologii: II Mizhnar. ikhtiologichna nauk.-prakt. konf., Kaniv, 16-19 ver. 2009 r.: tezi.* Sevastopol': Institut biologii pivdennykh moriv im. O.O. Kovalevs'kogo, 39-42.
40. Drokin, S. I., Zabelinskiy, S. A., & Kopeyka, E. F. (1985). Vliyanie nizkotemperaturnoy konservatsii na fosfolipidy i ikh zhirnye kisloty spermatozoidov ryby belogo amura *Ctenopharyngodon idella* i indyuka *Meleagris gallop*. Sravnitel'nye aspekty. *Zhurnal evolyutsionnoy biokhimii i fiziologii*, 21(1), 79-82.
41. Zhukinskiy, V. N., Kopeyka, E. F., & Nedyalkov, G. F. (1981). Kriokonservatsiya spermy ryb i opyt ee ispol'zovaniya dlya polucheniya potomstva karpa. *Gidrobiologicheskyy zhurnal*, 6, 39-51.
42. Zhukinskiy, V. N., Nedyalkov, G. F., & Kopeyka, E. F. (1981). Rezul'taty opytov osemneniya karpa kriokonservirovannoy spermoy. *Genetika, selektsiya, gibridizatsiya: 2 Vsesoyuz. soveshchanie, Rostov-na-Donu, 16-20 marta 1981 g.: teziy dokl.* Rostov-na-Donu, 189-190.

43. Zhuravleva, G. F., & Akimochkina, T. I. (2010). Izuchenie krioprotekturnykh svoystv razlichnykh khimicheskikh soedineniy, ispol'zuemykh dlya zamorazhivaniya i khraneniya reproduktivnykh kletok ryb. *Estestvennye nauki*, 1(30), 42-48.
44. Tsvetkova, L. I., et al. (2006). Zavisimost' zhiznesposobnosti kriokonservirovannykh spermiev karpa ot retseptury kriozashchitnykh sred pri dolgovremennom khraneni. *Sbornik nauchnykh trudov VNIIPRKh*, 81, 41-45.
45. Zemkov, G. V. (2004). Otsenka kachestva protektorov v razlichnykh usloviyakh kriokonservatsii spermiev ryb. *Tsitologiya*, 46(9), 795-796.
46. Zemkov, G. V., Tikhomirov, A. M., & Akimochkina, T. I. (2007). K biotekhnologii kriokonservatsii reproduktivnykh kletok ryb. *Veterinarnaya patologiya*, 4, 214-215.
47. Dzyuba, B. B., et al. (2001). Izuchenie krioustoychivosti spermiev karpa (*C. carpio*) v svyazi s osobennostyami aktivatsii dvizheniya. *Problemy kriobiologii*, 3, 60.
48. Tsvetkova, L. I., et al. (2004). Ispol'zovanie geneticheskogo kriobanka dlya sokhraneniya genofonda ryb - ob"ektov akvakul'tury: materialy mezhdunarodnoy konferentsii "Sokhraneniye geneticheskikh resursov", Sankt-Peterburg, 19-22 oktyabrya 2004 g. *Tsitologiya*, 46(10), 876-877.
49. Voynova, N. V., et al. (2003). Ispol'zovanie novykh tekhnologiy v akvakul'ture [Kriokonservirovaniye spermy samtsov-proizvoditeley i podrashchivaniye molodi raznykh vidov ryb]. *Kholodnovodnaya akvakul'tura: start v XXI v.: Mezhdunar. simp.: tezisy dokl.* Sankt-Peterburg, 78-80.
50. Karanova, M. V., et al. (1997). Ispol'zovanie prirodnykh krioprotektorov pri kriokonservatsii spermy ryb. *Pervyy kongress ikhtologov Rossii: tezisy dokl.* Moskva, 356-357.
51. Tsvetkova, L. I., et al. (2002). Issledovanie nizkotemperaturnoy konservatsii spermy ryb. *Genetika, selektsiya i vosproizvodstvo ryb: Pervaya Vseros. konf.: mater.* Sankt-Peterburg, 49-50.
52. Tsvetkova, L. I., et al. (2000). K probleme sokhraneniya genomov osetrovnykh ryb putem kriokonservatsii spermy. *Osetrovye na rubezhe XXI v.: Mezhdunar. konf.: tezisy dokl.* Astrakhan', 32-33.
53. Karanova, M. V., & Tsvetkova, L. I. (2002). Krioprotektivnye svoystva antifriznykh glikoproteinov pri zamorazhivanii spermy ryb. *Izbrannye trudy VNIIPRKh*. (Vol. 1-4). Dmitrov: Sever Podmoskov'ya, 369-376.
54. Katasonov, V. Ya., Tsvetkova, L. I., & Anan'ev, V. I. (1994). Geneticheskaya kollektsiya spermy ryb. *Rybovodstvo i rybolovstvo*, 1, 34-35.
55. Kopeyka, E. F., et al. (2011). Kachestvo kriokonservirovannoy spermy sazanov posle 25 let khraneniya. *Suchasni problemi teoretichnoi ta praktichnoi ikhtologii: IV Mizhnar. ikhtologichna nauk.-prakt. konf., Odesa, 7-11 ver. 2011 r.: tezi.* Odesa: Odes'kiy natsional'niy universitet imeni I.I. Mechnikova, 136-138.
56. Kononenko, I. S. (2017). Kompleksna otsinka molodi sterlyadi (*Acipenser ruthenus* L., 1758), otrimanoi z vikoristannyam kriobiotekhnologiy. *Extended abstract of candidate's thesis.* Kyiv: Institut ribnogo gospodarstva NAAN Ukraini.
57. Kononenko, I. S. (2017). Otsinka vizhivannya molodi sterlyadi (*Acipenser ruthenus*, L. 1758), otrimanoi vid zaplidnennya ikri kriokonservovanoyu spermoyu. *Suchasni problemi teoretichnoi i praktichnoi ikhtologii: X Mizhnar. ikhtologichna nauk.-prakt. konf.: mater.* Kyiv, 164-169.
58. Kononenko, I. S. (2017). Otsinka vizhivanosti molodi sterlyadi, otrimanoi vid kriokonservovanoi spermi. *Tvarinnitstvo Ukraini*, 3-4, 31-35.

59. Kononenko, I. S. (2017). Rozroblennya krioza khisnikh seredovishch dlya niz'koterperaturnogo zamorozhuvannya spermi sterlyadi (*Acipenser ruthenus*). *Rybohospodars'ka nauka Ukrainy*, 2 (40), 99-113.
60. Kononenko, I. S., & Bekh, V. V. (2016). Kriokonservuvannya statevikh produktiv - effektivniy metod zberezheniya bioriznomanittya osetrovikh vidiv rib. *Rybohospodars'ka nauka Ukrainy*, 2 (36), 5-21.
61. Mishchenko, A. G., et al. (2007). Konteyner dlya rozmishchenni molochka koropa pri zamorozhuvanni-vidtayuvanni. *Veterinarna biotekhnologiya*, 10, 133-137.
62. Anan'ev, V. I., et al. (2002). Kontsepsiya sokhraneniya i ustoychivogo ispol'zovaniya bioraznoobraziya s primeneniem metodov kriokonservatsii genomov gidrobiontov. *Izbrannye trudy VNIIPRKh*. (Vol. 1-4). Dmitrov: Sever Podmoskov'ya, 385-399.
63. Kopeyka, E. F. (1986). *Instruktsiya po nizkoterperaturnoy konservatsii spermy karpa*. Moskva.
64. Kopeyka, E. F. (1982). Issledovanie vliyaniya zashchitnykh sred na spermu osetrovikh ryb pri nizkoterperaturnoy konservatsii. *Extended abstract of candidate's thesis*. Khar'kov: Institut kriobiologii i kriomeditsiny.
65. Kopeyka, E. F. (2014). Ekologicheskaya nisha kak faktor, opredelyayushchiy kriorezistentnost' spermatozoidov ryb. *Problemy kriobiologii i kriomeditsiny*, 24(4), 302-311.
66. Kopeyka, E. F. (2012). Evolyutsiya ryb i kriorezistentnost' spermatozoidov. *Problemy kriobiologii i kriomeditsiny*, 22(3), 239.
67. Kopeyka, E. F., Viyo, P., & Goncharov, B. F. (2005). Dinamika dozrevaniya i kriorezistentnost' spermatozoidov sibirskogo osetra *Acipenser baerii*. *Aktual'ni problemi akvakul'turi ta ratsional'nogo vikoristannya vodnikh bioresursiv: Mizhnarod. nauk.-prakt. konf.: mater.* Kyiv, 125.
68. Kopeyka, E. F., & Kopeyka, Yu. E. (2004). Variabel'nost' kachestva i kriorezistentnost' spermiev ryb. *Tsitologiya*, 46(9), 806.
69. Pronina, N. D., et al. (2010). Kriokonservatsiya polovoykh produktov ryb dlya sokhraneniya iskhodnoy geneticheskoy i populyatsionnoy struktury. *Vosproizvodstvo estestvennykh populyatsiy tsennykh vidov ryb: Mezhdunar. konf., Sankt-Peterburg, 20-22 apr. 2010 g.: tezisy dokl.* Sankt-Peterburg, 176-177.
70. Ponomareva, E. N., et al. (2017). Kriokonservatsiya reproduktivnykh kletok ryb: istoriya i perspektivy. *Rybnoe khozyaystvo*, 4, 85-88.
71. Boronchuk, G. V., et al. (1996). Kriokonservatsiya spermy karpa pod zashchitoy 1,3-butilenglikolya. *Konservatsiya geneticheskikh resursov*. Pushchino, 98-99.
72. Andreev, A. A., et al. (1996). Kriokonservatsiya spermy belorybitsy i belugi. *Konservatsiya geneticheskikh resursov*. Pushchino, 96-98.
73. Tsvetkova, L. I., et al. (1999). Kriokonservatsiya spermy buffalo. *Resursosberegayushchie tekhnologii v akvakul'ture: simpoz.: mater. dokl.* Adler, 109-110.
74. Dzyuba, B., et al. (2008). Kriokonservatsiya spermy evropeyskogo okunya *Perca fluviatilis* L. s ispol'zovaniem metanola v kachestve krioprotektora. *Kriokonservatsiya kak sposob sokhraneniya biologicheskogo raznoobraziya: konf.: mater.* Pushchino, 48-49.
75. Tsvetkova, L. I., et al. (2002). Kriokonservatsiya spermy ryb: sostoyanie, razvitie, perspektivy. *Izbrannye trudy VNIIPRKh*. (Vol. 1-4). Dmitrov: Sever Podmoskov'ya, 358-366.

76. Zheltonozhko, O. V., et al. (1996). Kriokonservatsiya spermy tikhookeanskikh lososey Kamchatki chavychi i kety. *Problemy kriobiologii*, 3, 30-34.
77. Tsvetkova, L. I., et al. (2003). Kriokonservirovanie spermy lososevykh ryb. *Kholodnovodnaya akvakul'tura: start v XXI vek: Mezhdunar. simpoz.: mater.* Sankt-Peterburg, 112.
78. Pugovkin, A. Yu., et al. (2016). Kriokonservirovanie spermy sterlyadi: optimizatsiya sostava kriozashchitnoy sredy. *Problemy kriobiologii i kriomedityny*, 26(2), 160.
79. Tsvetkova, L. I., et al. (2005). Kriotekhnologii dlya sokhraneniya genofonda ryb-ob"ektov akvakul'tury. *Sbornik nauchnykh trudov VNIIPRKh*, 80, 140-144.
80. Pronina, N. D., et al. (2005). Kriotekhnologii dlya sokhraneniya i promyshlennogo ispol'zovaniya geneticheskikh resursov. *Akvakul'tura i integrirovannye tekhnologii: problemy i vozmozhnosti*. (Vol. 2). Moskva, 207-210.
81. Lunev, G. E., & Trenkler, I. V. (2010). Kriokonservatsiya spermy russkogo osetra s ispol'zovaniem metilovogo spirta. *Vosproizvodstvo estestvennykh populyatsiy tsennykh vidov ryb: Mezhdunar. konf.*, Sankt-Peterburg, 20-22 apr. 2010 g.: tezisy dokl. Sankt-Peterburg, 107-108.
82. Manokhina, M. S., & Anan'ev, V. I. (2008). Kriokonservatsiya embrionov i lichinok gidrobiontov. *Problemy i perspektivy. Kriokonservatsiya kak sposob sokhraneniya biologicheskogo raznoobraziya: konf.: mater.* Pushchino, 88-89.
83. Manokhina, M. S., & Anan'ev, V. I. (2002). Novoe v podkhodakh k resheniyu problemy kriokonservatsii embrionov i lichinok ryb. *Genetika, selektsiya i vosproizvodstvo ryb: Pervaya Vseros. konf.: mater.* Sankt-Peterburg, 48-49.
84. Metal'nikova, K. V. (2008). Poluchenie i kriokonservatsiya spermy reversantov - perspektivnyy sposob sokhraneniya genomov samok [Ryby]. *Veterinarnaya patologiya*, 2, 150-152.
85. Metal'nikova, K. V. (2004). Predvaritel'nye nabroski k obosnovaniyu nauchnoy programmy "Sokhranenie bioraznoobraziya razlichnykh vidov ryb s ispol'zovaniem metodov polucheniya spermy reversantov (samok) i ee kriokonservatsii". *Tsitologiya*, 46(9), 821.
86. Dokina, O. B., et al. (2006). Metod kriokonservatsii spermy osetrovikh ryb - ob"ektov akvakul'tury. *Akvakul'tura osetrovyykh ryb: dostizheniya i perspektivy razvitiya: IV Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater. dokl.* Moskva: VNIRO, 76-79.
87. Tsvetkova, L. I., et al. (2001). Metod kriokonservatsii spermy ryb - dlya sokhraneniya genomov i polucheniya zhiznestroykogo potomstva. *Problemy i perspektivy razvitiya akvakul'tury v Rossii: nauch.-prakt. konf.: sbor. trud.* Adler, 116-117.
88. Tsvetkova, L. I., et al. (1997). *Metodicheskoe posobie po kriokonservatsii spermy karpa, lososevykh i osetrovyykh vidov ryb.* Moskva: VNIIPRKh.
89. Mikson, K. B., Zinchenko, A. A., & Bobrova, E. N. (2008). Fazovyie perekhody i steklovanie v kriozashchitnykh sredakh i embrionakh v'yuna. *Problemy kriobiologii*, 2, 225.
90. Mikson, K. B., Revenko, E. B., & Gapon, A. A. (2014). Vliyanie rastvorov krioprotektorov na vyzhivaemost' i teratogennost' embrionov karasya (*Carassius auratus gibelio* Bloch, 1783). *Problemy kriobiologii i kriomedityny*, 24(2), 149-156.
91. Mikson, K. B., & Cherepanov, V. V. (2012). Vliyanie rastvorov krioprotektorov na vyzhivaemost' embrionov karasya. *Problemy kriobiologii i kriomedityny*, 22(3), 373.
92. Morozova, I. A., Gorbunova, N. I., & Gorbunov, L. V. (2002). Vliyanie ob"emnogo rasshireniya sredy, soderzhashchey bioob"ekt, na sokhrannost'

- dekonservirovannykh polovykh kletok i embrionov zhivotnykh pri sverkhvysokikh skorostyakh zamorazhivaniya. *Rybne gospodarstvo*, 61, 37-41.
93. Petropavlov, N. N., et al. (1997). Nekotorye problemy kriokonservatsii genofonda ryb. *Pervyy kongress ikhtologov Rossii: tezisy dokl.* Moskva, 361.
94. Kopeyka, E. F., et al. (1979). Nizkoterperaturnaya konservatsiya spermy osetrovyykh. *Osetrovoe khozyaystvo vnutrennikh vodoemov SSSR: 2 Vsesoyuz. soveshch.*, 26 fevr.-2 marta 1979 g.: tezisy i referaty. Astrakhan', 220.
95. Kopeyka, E. F., et al. (1981). Nizkoterperaturnaya konservatsiya spermy ryb. *Genetika, selektsiya gibridizatsiya ryb: 2 Vsesoyuz. soveshch.*, Rostov-na-Donu, 16-20 marta 1981 g.: tezisy dokl. Rostov-na-Donu, 105-106.
96. Tsvetkova, L. I., et al. (1998). Nizkoterperaturnyy genny bank spermy ryb – odin iz metodov sokhraneniya biologicheskogo raznoobraziya ikhtiotzenozov. *Problemy razvitiya rybnogo khozyaystva na vnutrennikh vodoemakh v usloviyakh perekhoda k rynochnym otnosheniyam: Mezhdunar. konf.: mater.* Minsk, 102-104.
97. Grinzhevs'kiy, M. V., et al. (2001). Niz'kotemperaturne kriokonservuvannya spermi ukrains'kikh porid koropa. *Visnyk agrarnoi nauky*, 8, 37-38.
98. Pronina, N. D., et al. (2008). Novye kriotekhnologii dlya sokhraneniya genofondov ryb. *Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi*, 24, 187-190.
99. Tsvetkova, L. I., et al. (1995). O zhiznestoykosti lichinok karpa, poluchennykh s ispol'zovaniem zamorozhennoy spermy. *Rybovodstvo i rybolovstvo*, 3–4, 19.
100. Tsvetkova, L. I., et al. (1995). O nekotorykh faktorakh, vliyayushchikh na krioustoychivost' spermy karpa *Cyprinus carpio*. *Voprosy ikhtologii*, 35(6), 804-810.
101. Andreev, A. A., et al. (2007). Obrazovanie l'da pri zamerzanii kriozashchitnykh rastvorov [Kriokonservatsiya spermy ryb]. *Veterinarnaya patologiya*, 4, 231-234.
102. Butskiy, K. I., et al. (2015). Opredelenie veroyatnosti obrazovaniya mikroskopicheskikh por v membranakh kriokonservirovannykh spermatozoidov karpa (*Cyprinus carpio*). *Problemy kriobiologii i kriomeditsiny*, 25(2), 168.
103. Pronina, N. D., et al. (2002). Optimizatsiya kriozashchitnykh sred dlya zamorazhivaniya spermy karpa, sibirskogo osetra i raduzhnoy foreli. *Problemy akvakul'tury i funktsionirovaniya vodnykh ekosistem: Mezhdunar. konf. molodykh uchenykh: mater.* Kiev, 119.
104. Ponomareva, E. N., et al. (2009). Optimizatsiya protsessa kriokonservatsii spermy osetrovyykh ryb pri ispol'zovanii razlichnykh sred. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk*, 11, 1(2), 132-134.
105. Kononenko, I. S., et al. (2017). Optimizatsiya umov kriokonservuvannya spermi sterlyadi (*Acipenser ruthenus*, L. 1758) dlya zaplideniannya ikri v umovakh ribnykh gospodarstv. *Rybohospodars'ka nauka Ukrainy*, 3, 83-95.
106. Kopeyka, E. F., et al. (2008). Opyt polucheniya kachestvennoy spermy veslonosa i ee kriokonservatsiya. *Kriokonservatsiya kak sposob sokhraneniya biologicheskogo raznoobraziya: konf.: mater.* Pushchino, 65-66.
107. Drokin, S. I., et al. (2008). Osobennosti kristallizatsii vysokokontsentrirrovannykh suspenziy kletok, soderzhashchikh osmoticheski neaktivnye vnutrikletochnye struktury [K kriokonservatsii spermy ryb]. *Veterinarnaya patologiya*, 2, 141-143.
108. Glogovski, Ya., et al. (2000). Otsenka kachestva kriokonservirovannykh molok sibirskogo osetra (*Acipenser baerii stenorrhynchus* Nikol'sky). *Osetrovye na rubezhe XXI veka: Mezhdunar. konfer.: tez. dokl.* Astrakhan', 229-230.
109. Ochkur, S. I., & Tsvetkova, L. I. (1992). Vliyanie kislorodnogo rezhima prednerestovogo soderzhaniya proizvoditeley sazana i karpa na dykhanie,

- podvizhnost' i krioustoychivost' spermatozoidov. *VIII nauch. konf. po ekologicheskoy fiziologii i biokhimii ryb: tezisy dokl.* (Vol. 2). Petrozavodsk, 31-32.
110. Piliev, S. A. (1989). Primenenie kriokonservatsii v rybovodstve. *Selektsiya ryb: sb. nauch. tr.* Moskva: Agropromizdat, 100-105.
 111. Piliev, S. A. (1990). Problemy kriokonservatsii v oblasti rybovodstva. *Rybokhozyaystvennoe osvoenie vodoemov kompleksnogo naznacheniya.* Moskva, 66-72.
 112. Grunina, A. S., et al. (2008). Poluchenie dispermnogo androgeneza u sibirskogo osetra i androgeneticheskikh gibridov mezhdru sibirskim i russkim osetrami s ispol'zovaniem kriokonservirovannoy spermy. *Kriokonservatsiya kak sposob sokhraneniya biologicheskogo raznoobraziya: konf.: mater.* Pushchino, 46-47.
 113. Ponomareva, E. N., Bogatyreva, M. M., & Tikhomirov, A. M. (2010). Ispol'zovanie kriokonservirovannogo geneticheskogo materiala dlya vosproizvodstva osetrovyykh ryb. *Vosproizvodstvo estestvennykh populyatsiy tsennykh vidov ryb: Mezhdunar. konf.: tezisy dokl.* Sankt-Peterburg, 172-173.
 114. Anan'ev, V. I., et al. (2002). Problemy sokhraneniya genomov lososevykh i osetrovyykh ryb. *Izbrannye trudy VNIIPRKh.* (Vol. 1-4). Dmitrov: Sever Podmoskov'ya, 399-412.
 115. Pronina, N. D. (2004). Otsenka kachestva kriokonservirovannoy spermy ryb. *Tsitologiya*, 46(9), 843-844.
 116. Pugovkin, A. Yu., & Kopeyka, E. F. (2015). Issledovanie protsessa perenosa molekul vody cherez membrany spermatozoidov shchuki (*Esox lucius* L.). *Problemy kriobiologii i kriomedsiny*, 25(2), 165.
 117. Pugovkin, A. Yu., & Kopeyka, E. F. (2013). Osmoticheskaya rezistentnost' spermatozoidov karpa *Cyprinus carpio*. *Problemy kriobiologii i kriomedsiny*, 23(2), 190.
 118. Pugovkin, A. Yu., & Butskiy, K. I. (2014). Pronitsaemost' membran spermatozoidov sterlyadi (*Acipenser ruthenus* L.) i karpa (*Cyprinus carpio* L.). *Problemy kriobiologii i kriomedsiny*, 24(2), 178.
 119. Pugovkin, A. Yu., & Kopeyka, E. F. (2016). Proniknist' plazmatichnikh membran spermatozoidiv koropa (*Cyprinus carpio*, L., 1758) dlya molekul vodi ta krioprotektoriv na riznikh etapakh kriokonservuvannya. *Problemy kriobiologii i kriomedsiny*, 26(4), 340-348.
 120. Pugovkin, A. Yu., et al. (2011). Reaktsiya spermiev karpa na solevye sredy kak test na kriorezistentnost'. *Suchasni problemi teoretichnoi ta praktichnoi ikhtiologii: IV Mizhnar. ikhtiologichna nauk.-prakt. konf., Odesa, 7-11 ver. 2011 r.: tezi.* Odesa: Odes'kiy natsional'niy universitet imeni I.I. Mechnikova, 185-186.
 121. Bogatyreva, M. M., et al. (2007). Rezul'taty kriokonservatsii spermy karpovykh ryb. *Kompleksnye issledovaniya biologicheskikh resursov yuzhnykh morey i rek: Vtoraya Mezhdunar. konf. molodykh uchenykh i spetsialistov: mater.* Astrakhan', 22-24.
 122. Bogatyreva, M. M., et al. (2008). Rezul'taty khraneniya obraztsov spermy sevryugi. *Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta*, 3, 22-25.
 123. Rekrut, S. V., Pavlishchenko, V. M., & Zhuravel', M. P. (2005). Do pitannya pro stvorenniya kriobanku gamet rib. *Aktual'ni problemi akvakul'turi ta ratsional'nogo vikoristannya vodnikh bioresursiv: Mizhnar. nauk.-prakt. konf.: mater.* Kyiv, 217.

124. Savushkina, S. I. (2007). Vyrashchivanie ryboposadochnogo materiala, poluchennogo s ispol'zovaniem kriokonservirovannoy spermy. *Ratsional'noe ispol'zovanie presnovodnykh ekosistem – perspektivnoe napravlenie realizatsii natsional'nogo proekta «Razvitie APK»: konf.: mater.* Moskva, 303-305.
125. Savushkina, S. I. (2005). Kachestvo proizvoditeley sibirskogo osetra, pri poluchenii kotorykh ispol'zovana kriokonservirovannaya sperma. *Akvakul'tura i integrirovannye tekhnologii: problemy i vozmozhnosti: konf.: mater.* (Vol. 2). Moskva, 227-232.
126. Savushkina, S. I. (2005). Metodicheskie aspekty biotekhnologii kriokonservatsii polovykh produktov presnovodnykh ryb. *Akvakul'tura i integrirovannye tekhnologii: problemy i vozmozhnosti: konf.: mater.* (Vol. 2). Moskva, 217-227.
127. Savushkina, S. I. (2001). Ustoychivost' spermatozoidov russkogo osetra k zamorazhivaniyu. *Akvakul'tura osetrovyykh ryb: dostizheniya i perspektivy razvitiya: II Mezhdunar. konf.: mater.* Astrakhan', 32.
128. Savushkina, S. I., & Kozovkova, N. A. (2001). Vosproizvodstvo molodi sibirskogo osetra s ispol'zovaniem kriokonservirovannoy spermy. *Akvakul'tura osetrovyykh ryb: dostizheniya i perspektivy razvitiya: II Mezhdunar. konf.: mater.* Astrakhan', 66-67.
129. Savushkina, S. I., Tsvetkova, L. I., & Pronina, N. D. (1996). Effektivnost' ispol'zovaniya metoda nizkotemperaturnoy konservatsii spermy ryb v akvakul'ture. *Resursosberegayushchie tekhnologii v akvakul'ture: Mezhdunar. simpoz.: tezisy dokl.* Krasnodar, 96-97.
130. Savushkina, S. I. (2007). Vyrashchivanie ryboposadochnogo materiala, poluchennogo s ispol'zovaniem kriokonservirovannoy spermy. *Ratsional'noe ispol'zovanie presnovodnykh ekosistem – perspektivnoe napravlenie realizatsii natsional'nogo proekta «Razvitie APK»: konf.: mater.* Moskva, 303-305.
131. Semenova, L. E., & Galimova, L. V. (2001). Tekhnicheskie kharakteristiki krioamorazhivayushchego ustroystva. *Akvakul'tura osetrovyykh ryb: dostizheniya i perspektivy razvitiya: II Mezhdunar. konf.: mater.* Astrakhan', 33-34.
132. Tsvetkova, L. I., et al. (1996). Sokhranenie geneticheskogo raznoobraziya ryb metodom nizkotemperaturnoy konservatsii polovykh produktov. *Resursosberegayushchie tekhnologii v akvakul'ture: Mezhdunar. simpoz.: tezisy dokl.* Krasnodar, 102.
133. Tsvetkova, L. I., et al. (2001). Tekhnologiya kriokonservatsii i khraneniya v nizkotemperaturnom banke spermy ryb. *Sbornik nauchno-tekhnologicheskoy i metodicheskoy dokumentatsii po akvakul'ture.* Moskva: VNIRO, 152-158.
134. Tikhomirov, A. M. (2001). Perspektivy sozdaniya regional'nogo kriobanka gidrobiontov Volgo-Kaspiyskogo basseyna. *Akvakul'tura osetrovyykh ryb: dostizheniya i perspektivy razvitiya: II Mezhdunar. konf.: mater.* Astrakhan', 36-37.
135. Tikhomirov, A. M., Bogatyreva, M. M., & Dzharigazov, E. S. (2007). Vliyanie metoda zamorazhivaniya i ottaivaniya na kachestvo spermy russkogo osetra. *Ratsional'noe ispol'zovanie presnovodnykh ekosistem – perspektivnoe napravlenie realizatsii natsional'nogo proekta «Razvitie APK»: konf.: mater.* Moskva, 308-310.
136. Tikhomirov, A. M., Bogatyreva, M. M., & Dzharigazov, E. S. (2007). Vliyanie ob'emov, rezhimov zamorazhivaniya i ottaivaniya na kachestvo spermy russkogo osetra pri kriokonservatsii. *Ratsional'noe ispol'zovanie presnovodnykh ekosistem –*

- perspektivnoe napravlenie realizatsii natsional'nogo proekta «Razvitie APK»:* *konf.: mater.* Moskva, 311-313.
137. Tikhomirov, A. M., Bogatyreva, M. M., & Krasil'nikova, A. A. (2011). Razrabotka kriozashchitnykh sred dlya nizkotemperaturnogo konservirovaniya spermatozoidov belorybitsy (*Stenodus leucichtys Guldenstadti*, 1772) v tselyakh sokhraneniya genofonda. *Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta*, 1, 58-62.
 138. Tikhomirov, A. M., & Ponomareva, E. N. (2008). Elektrostimulyatsiya membran spermiev russkogo osetra oblegchaet proniknovenie krioprotektorov vnutr' kletok. *Kriokonservatsiya kak sposob sokhraneniya biologicheskogo raznoobraziya:* *konf.: mater.* Pushchino, 129-130.
 139. Tomilenko, V. G., Zhukinskiy, V. N., & Kopeyka, E. F. (1983). Kriokonservatsiya spermy karpov ukrainskoy cheshuychatoy porody nivchanskogo vnutripородного tipa i vozmozhnosti ispol'zovaniya ee v ryborazvedenii. *Rybnoe khozyaystvo*, 37, 6-10.
 140. Filippov, V. Yu., Mruk, A. I., & Buchatskiy, L. P. (2010). Kriokonservatsiya polovykh kletok redkikh i ischezayushchikh vidov ryb (ruch'evaya forel', dunayskiy losos', kharius evropeyskiy). *Vosproizvodstvo estestvennykh populyatsiy tsennykh vidov ryb: Mezhdunar. konf., Sankt-Peterburg, 20-22 apr. 2010 g.: tezisy dokl.* Sankt-Peterburg, 224-225.
 141. Tsvetkova, L. I. (2002). Sozdanie nizkotemperaturnoy kolleksii spermy ryb. *Izbrannye trudy VNIIPRKh*. (Vol. 1-4). Dmitrov: Sever Podmoskov'ya, 412-417.
 142. Tsvetkova, L. I., Dokina, O. B., & Pronina, N. D. (2001). Kriokonservatsiya spermy amurov (*Ctenopharyngodon idella*, *Mylopharyngodon piceus*). *Sbornik nauchnykh trudov VNIIPRKh*, 76, 73-76.
 143. Tsedik, V. V. (2002). Kriokonservatsiya - metod zberezhennya genofondu rib. *Problemy akvakul'tury i funktsionirovaniya vodnykh ekosistem: Mezhdunar. konf. molodykh uchenykh: mater.* Kiev, 131-133.
 144. Cherepanov, V. V. (2003). Vliyanie faktorov kriokonservirovaniya na energeticheskii obmen aktivirovannykh spermiev sazana. *Problemy kriobiologii*, 4, 58-65.
 145. Cherepanov, V. V., Zheltonozhko, S. V., & Zheltonozhko, V. V. (2000). Kriokonservatsiya spermy reofil'noy nerki. *Problemy kriobiologii*, 2, 64-70.
 146. Cherepanov, V. V., & Kopeyka, E. F. (2000). Krioustoychivost' spermiev sazana, vydelennykh iz razlichnykh uchastkov molok. *Problemy kriobiologii*, 3, 59-63.
 147. Chipinov, V. G., Dzhargazov, E. S., & Bolonina, N. V. (2010). Otsenka kachestva spermy osetrovyykh ryb razlichnymi metodami i opyt ee nizkotemperaturnoy konservatsii. *Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta*, 1, 140-143.
 148. Shtayn, G. (1991). Kriokonservatsiya gamet ryb. *Problemy kriobiologii*, 3, 42-45.
 149. Dzhargazov, E. S., et al. (2009). Eksperimental'nye issledovaniya protsessa kriokonservatsii spermy russkogo osetra v Turtsii. *Innovatsionnye tekhnologii akvakul'tury: Mezhdunar. nauch. konf., 21-22 sent. 2009 g., g. Rostov-na-Donu: tezisy dokl.* Rostov-na-Donu, 45-47.
 150. Ponomareva, E. N., et al. (2009). Elektrostimulyatsiya kak sposob uvelicheniya pronitsaemosti membran spermiev osetrovyykh ryb dlya krioprotektorov. *Innovatsionnye tekhnologii akvakul'tury: Mezhdunar. nauch. konf., Rostov-na-Donu, 21-22 sent. 2009 g.: tezisy dokl.* Rostov-na-Donu, 117-118.

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 102-123
DOI: 10.15407/fsu2018.04.102
УДК 016:[597-115.08:597.442]

Received 05.07.18
Received in revised form 24.07.18
Accepted 07.08.18

MOLECULAR-GENETIC INVESTIGATIONS OF STURGEON (*ACIPENSERIDAE*). THEMATIC ENGLISH LANGUAGE BIBLIOGRAPHY

M. Simon, seemann.sm@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Forming a thematic bibliographic list of English-language publications on certain issues of molecular genetic and cytogenetic studies of sturgeon (*Acipenseridae*).

Methods. The complete and selective methods were applied in the process of the systematic search. The bibliographic core was made up of literary sources from electronic archives of world-renowned specialized scientific journals. In particular: *Journal of Applied Ichthyology*, *Conservation Genetics*, *Fish Physiology and Biochemistry*, *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, *Transactions of the American Fisheries Society*, *Chinese Journal of Oceanology and Limnology* etc.

Results. A thematic list of the main publications was composed: thematic scientific collections, materials of international scientific and practical conferences, scientific articles and abstracts of dissertations. It consists of 156 English-language papers. Presented publications cover the time interval for the last thirty years. The literary sources are arranged in alphabetical order by author or title, and described according to DSTU 8302:2015 "Information and documentation. Bibliographic reference. General principles and rules of composition", with the amendments (code UKND 01.140.40), as well as in accordance with the requirements of APA style – international standard of references.

Practical value. The prepared list may be useful for scientists, practitioners, students, whose sphere of interests is related to issues of molecular genetic and cytogenetic research, as well as biotechnology.

Key words: sturgeon (*Acipenseridae*), aquaculture, molecular genetic studies, sturgeon viruses, polyploidy, phylogenetic analysis, RAPD markers, mitochondrial DNA, cytogenetic studies, hybridization.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИБ РОДИНИ ОСЕТРОВИХ (*ACIPENSERIDAE*). ТЕМАТИЧНА АНГЛОМОВНА БІБЛІОГРАФІЯ

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН
України, м. Київ

Мета. Формування довідкового бібліографічного переліку англomовних публікацій з питань молекулярно-генетичних та цитогенетичних досліджень риб з родини осетрових (*Acipenseridae*).

Методика. У процесі підготовки тематичного списку, в ході системного пошуку було застосовано цілісний та вибірковий методи. Бібліографічне ядро склали літературні джерела з електронних архівів всесвітньовідомих спеціалізованих наукових журналів, зокрема: *Journal of Applied Ichthyology*, *Conservation Genetics*, *Fish Physiology and Biochemistry*, *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, *Transactions of the American Fisheries Society*, *Chinese Journal of Oceanology and Limnology* та ін.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік основних робіт: тематичних наукових збірників, матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій,

© М. Simon, 2018

наукових статей і авторефератів дисертацій. Він налічує 156 англomовних джерел. Представлені публікації охоплюють часовий інтервал за останні тридцять років. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Підготовлений перелік може бути корисним для науковців, практиків, студентів, сфера інтересів яких стосується питань молекулярно-генетичних та цитогенетичних досліджень, а також біотехнологій.

Ключові слова: осетрові (*Acipenseridae*), аквакультура, молекулярно-генетичні дослідження, віруси у осетрових, філогенетичний аналіз, RAPD-маркери, мітохондріальна ДНК, цитогенетичні дослідження, гібридизація.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫБ СЕМЕЙСТВА ОСЕТРОВЫХ (*ACIPENSERIDAE*). ТЕМАТИЧЕСКАЯ АНГЛОЯЗЫЧНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

**М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН
Украины, г. Киев**

Цель. Формирование справочного библиографического перечня англоязычных публикаций по вопросам молекулярно-генетических и цитогенетических исследований рыб семейства осетровых (*Acipenseridae*).

Методика. В процессе подготовки тематического списка, в ходе системного поиска были применены целостный и выборочный методы. Библиографическое ядро составляли литературные источники из электронных архивов всемирно известных специализированных научных журналов, в частности: *Journal of Applied Ichthyology*, *Conservation Genetics*, *Fish Physiology and Biochemistry*, *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, *Transactions of the American Fisheries Society*, *Chinese Journal of Oceanology and Limnology* и др.

Результаты. Сформирован тематический библиографический перечень основных работ: тематических научных сборников, материалов международных научно-практических конференций, научных статей и авторефератов диссертаций. Он насчитывает 156 англоязычных источников. Представленные публикации охватывают временной интервал за последние тридцать лет. Литературные источники размещены в алфавитном порядке по автору или названию, описаны по ГОСТ 8302: 2015 «Информация и документация. Библиографические ссылки. Общие положения и правила составления», с учетом поправок (код УКНД 01.140.40), а также в соответствии с требованиями к оформлению списка литературы по международному стандарту APA style.

Практическая значимость. Подготовленный перечень может быть полезным для ученых, практиков, студентов, сфера интересов которых касается вопросов молекулярно-генетических и цитогенетических исследований, а также биотехнологий.

Ключевые слова: осетровые (*Acipenseridae*), аквакультура, молекулярно-генетические исследования, вирусы у осетровых, полиплоидия, филогенетический анализ, RAPD-маркеры, митохондриальная ДНК, цитогенетические исследования, гибридизация.

1. A fixed allele at microsatellite LS-39 is characteristic for the black caviar producer *Acipenser stellatus* // Jenneckens I. et al. // *Journal of Applied Ichthyology*. 2001. 17. P. 39—42.
2. Adeno-like virus associate with a disease of cultured white sturgeon (*Acipenser transmontanus*) / Hedrick R. P. et al. // *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic*

- Sciences. 1985. Vol. 42. P. 1321—1325.
3. Adkison M. A., Cambre M., Hedrick R. P. Identification of an iridovirus in Russian sturgeon (*Acipenser gueldenstaedti*) from northern Europe // Bull. Eur. Assoc. Fish Pathol. 1998. Vol. 18. P. 29—32.
 4. Alavi S. M. H. Sperm motility analysis for sturgeons // Cryopreservation of sturgeon sperm, 28 October 2009 : International Workshop : proceed. Wuhan, China, 2009. P. 12—20.
 5. Analysis of mitochondrial and nuclear DNA markers in old museum sturgeons yield insights about the species existing in Western Europe: *A. sturio*, *A. naccarii* and *A. oxyrinchus*. / Garrido-Ramos M. A. et al. // Springer Science & Business Media. 2009. P. 25—49.
 6. An iridovirus infection of the integument of the white sturgeon (*Acipenser transmontanus*) / Hedrick R. P. et al. // Diseases of Aquatic Organisms. 1990. Vol. 6. P. 39—40.
 7. Arefjev V. A. Cytogenetic aspects of differences in the quality of spawners of reciprocal hybrids between "bester" and beluga sturgeon // Biol. Principles of commercial culture of sturgeons : collected papers. Moscow : VNIRO, 1991. P. 134—150.
 8. Arefjev V. A. Karyotype variability in successive generations after hybridization between the great sturgeon, *Huso huso* (L.), and the sterlet, *Acipenser ruthenus* (L.) // Journal of Fish Biology. 1989. Vol. 35. P. 819—828.
 9. Arefjev V. A., Nikolaev A. I. Induced polyploidy in sturgeons: back to the problem in Russia // 2nd Int. Simp. on Sturgeons : abst. bull. Moscow : VNIRO, 1993. P. 31—32.
 10. Artyukhin E. N. Morphological phylogeny of the Order *Acipenseriformes* // The Sturgeon Quarterly. 1995. Vol. 3. P. 6—8.
 11. Barmintsev V. A., Chudinov O. S., Abramova A. B. Molecular and biological methods of identification and certification of sturgeons and their products // Fisheries and Aquaculture Journal. 2001. Vol. 1. P. 70—71.
 12. Bemis W. E., Findeis E. K. The sturgeons' plight // Nature. 1994. Vol. 370. P. 602.
 13. Beyea M. M., Benfey T. J., Kieffer J. D. Hematology and stress physiology of juvenile diploid and triploid shortnose sturgeon (*Acipenser brevirostrum*) // Fish Physiology and Biochemistry. 2005. Vol. 31. P. 303—313.
 14. Billard R., Lecointre G. Biology and conservation of sturgeon and paddlefish // Reviews in Fish Biology and Fisheries. 2000. Vol. 10. P. 355—392.
 15. Biochemical analysis of decrease in phenotypic diversity in the Volgo-Caspian Russian sturgeon population / Vasil'ev A. S. et al. // Journal of Applied Ichthyology. 1999. Vol. 15. P. 284—285.
 16. Birstein V. J. Sturgeon species and hybrids: can hybrids produce caviar? // Environmental policy and law. 2000. Vol. 32. P. 210—214.
 17. Birstein V. J., Hanner R., DeSalle R. Phylogeny of the *Acipenseriformes*: cytogenetic and molecular approaches. // Environmental Biology of Fishes. 1997. Vol. 48. P. 127—155.
 18. Birstein V. J., Betts J., De Salle R. Molecular identification of *Acipenser sturio* specimens: A warning note for recovery plans // Journal of Biological Conservation. 1998. Vol. 84. P. 97—101.
 19. Birstein V. J., De Salle R. Molecular phylogeny of *Acipenserinae* // Molecular phylogenetics and evolution. 1998. Vol. 9. P. 141—155.

20. Birstein V. J., Doukakis P., De Salle R. Molecular phylogeny of *Acipenserinae* and black caviar species identification // Journal of Applied Ichthyology. 1999. Vol. 15. P. 12—16.
21. Birstein V. J., Doukakis P., De Salle R. Polyphyletic genetic structure of the Russian sturgeon and caviar species identification // Journal of Conservation genetics. 2000. Vol. 1. P. 81—88.
22. Birstein V. J., Doukakis P., DeSalle R. Polyphyly of mtDNA lineages in the Russian sturgeon, *Acipenser gueldenstaedtii*: forensic and evolutionary implications // Journal of Conservation Genetics. 2000. Vol. 1. P. 81—88.
23. Birstein V. J., Poletaev A. I., Goncharov B. F. The DNA content in Eurasian sturgeon species determined by flow cytometry // Journal of Cytometry. 1993. Vol. 14. P. 337—383.
24. Birstein V. J., Vasil'ev V. P. Tetraploid-octoploid relationships and karyological evolution in the order *Acipenseriformes* (*Pisces*): karyotypes, nucleoli, and nucleolus-organizer regions in four acipenserid species // Journal of Conservation Genetics. 1987. Vol. 73. P. 3—12.
25. Bischof R., Szalanski A. L. Mitochondrial-DNA variation in pallid and shovelnose sturgeons, *Scaphirhynchus* (*Pisces: Acipenseridae*). // Trans. Nebr. Acad. Sci. 2000. Vol. 26. P. 19—21.
26. Blacklidge K. H., Bidwell C. A. Three ploidy levels indicated by genome quantification in *Acipenseriformes* of North America // Journal of Heredity. 1993. Vol. 84. P. 427—430.
27. Bowen B. W., Avise J. C. Genetic structure of Atlantic and Gulf of Mexico populations of sea bass, menhaden, and sturgeon: influence of zoogeographic factors and life-history patterns. // Marine Biology. 1990. Vol. 107. P. 371—381.
28. Brown J. R., Beckenbach A. T., Smith M. J. Intraspecific DNA sequence variation of the mitochondrial control region of white sturgeon (*Acipenser transmontanus*). // Molecular Biology Evol. 1993. Vol. 10. P. 326—341.
29. Brown J. R., Beckenbach A. T., Smith M. J. Mitochondrial DNA length variation and heteroplasmy in populations of white sturgeon (*Acipenser transmontanus*) // Journal of Conservation Genetics. 1992. Vol. 132. P. 221—228.
30. Brown J. R., Beckenbach A. T., Smith M. J. Influence of Pleistocene glaciations and human intervention upon mitochondrial DNA diversity in white sturgeon (*Acipenser transmontanus*) populations // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 1992. Vol. 49. P. 358—367.
31. Characteristics and pathogenicity of a novel herpesvirus isolated from adult and sub adult white sturgeon (*Acipenser transmontanus*) / Watson L. R. et al. // Diseases of Aquatic Organisms. 1995. Vol. 22. P. 199—210.
32. Characteristics of two viruses isolated from white sturgeon, *Acipenser transmontanus* / Hedrick R. P. et al. // Second Intern. Symp. Virus. Lower Verteb. : proceed. / ed. Fryer-Corvallis J. L. OR : Oregon State Univer. Press, 1991. P. 165—174.
33. Characterization of the Sox9 gene in European Atlantic sturgeon (*Acipenser sturio*) / Hett A. K. et al. // Journal of Heredity. 2005. Vol. 96. P. 150—154.
34. Choudhury A., Dick T. A. The historical biogeography of sturgeons (*Osteichthyes: Acipenseridae*): a synthesis of phylogenetics, palaeontology and palaeogeography // Journal of Biogeography. 1998. Vol. 25. P. 623—640.

35. Complete mitochondrial DNA sequence analysis of Ponto-Caspian sturgeon species / Rastorguev S. et al. // Journal of Applied Ichthyology. 2008. Vol. 24. P. 46—49.
36. Cryopreservation and short-term storage of sturgeon sperm / Billard R. et al. // Aquaculture. 2004. Vol. 236. P. 1—9.
37. Cryopreservation of Chinese sturgeon (*Acipenser sinensis*) sperm / Liu L. et al. // Journal of Applied Ichthyology. 2006. Vol. 22. P. 384—388.
38. Cytogenetic characterization of cell lines from six sturgeon species / Lanfredi M. et al. // Journal of Applied Ichthyology. 1999. P. 282—283.
39. Cytogenetic characterization of cell lines from three sturgeon species / Fontana F. et al. // Journal of Caryologia. 1997. Vol. 50. P. 91—95.
40. DeSalle R., Birstein V. J. PCR identification of black caviar // Nature. 1996. Vol. 381. P. 197—198.
41. DeWoody J. A., Avise J. C. Microsatellite variation in marine, freshwater and anadromous fishes compared with other animals // Journal of Fish Biology. 2000. Vol. 56. P. 461—473.
42. Degani G. Availability of protein and energy from throat protein sources in hybrid sturgeon *Acipenser guldenstadti* × *A. bester* // Aquaculture Research. 2002. Vol. 33. P. 725—727.
43. Di Lauro M. N., Kaboord W. S., Walsh R. A. Sperm-cell ultrastructure of North American sturgeons. IV. The lake sturgeon (*Acipenser fulvescens* Rafinisque, 1817) // Canadian Journal of Zoology. 2000. Vol. 78. P. 438—447.
44. Distribution of mitochondrial DNA variation in lake sturgeon (*Acipenser fulvescens*) from the Moose River basin, Ontario, Canada / Ferguson M. M. et al. // Journal of Fish Biology. 1993. Vol. 43. P. 91—101.
45. Distribution, biology and hybridization of *Scaphirhynchus albus* and *S. platyrhynchus* in the Missouri and Mississippi rivers. / Carlson D. M. et al. // Environmental Biology of Fish. 1985. Vol. 14. P. 51—59.
46. Dingerkus G., Howell W. M. Karyotypic analysis and evidence of tetraploidy in the North American paddlefish (*Polyodon spathula*) // Science. 1976. Vol. 194. P. 842—843.
47. Differentiation of pallid sturgeon and shovelnose sturgeon using an index based on meristics and morphometrics / Wills P. S. et al. // American Fisheries Society Symp. 2002. Vol. 28. P. 249—2258.
48. Doszpoly A., Shchelkunov I. S. Partial genome analysis of Siberian sturgeon alloverpesvirus suggests its close relation to AcHV-2 // Acta Veterinaria Hungarica. 2010. Vol. 58. P. 269—274.
49. Doukakis P., Birstein V. J., De Salle R. Intraspecific structure within three caviar-producing sturgeons (*Acipenser gueldenstaedtii*, *A. stellatus* and *Huso huso*) based on mitochondrial DNA analysis // Journal of Applied Ichthyology. 2005. Vol. 21. P. 457—460.
50. Conservation and management implications of finescale genetic structure of Gulf Sturgeon in the Pascagoula River, Mississippi / Dugo M. A. et al. // Journal of Applied Ichthyology. 2004. Vol. 20. P. 243—251.
51. Established cell lines from three sturgeon species / Foster O. et al. // The Sturgeon Quarterly 1995. Vol. 3. P. 6—7.
52. Evidence of mitochondrial DNA clones of Siberian sturgeon, *Acipenser baerii*, within Russian sturgeon, *Acipenser gueldenstaedtii*, caught in the River Volga /

- Jenneckens I. et al. // Ecol. Lett. 2000. Vol. 3. P. 503—508.
53. Evolution of ancient satellite DNAs in sturgeon genomes. / Robles, F. et al. // Gene. 2004. Vol. 338. 133—142.
 54. Findeis E. K. Osteology and phylogenetic interrelationships of sturgeons (*Acipenseridae*) // Environmental Biology of Fishes. 1997. Vol. 48. P. 73—126.
 55. First detection and identification of koi herpesvirus (KHV) in Russian sturgeon (*Acipenser gueldenstaedtii*) and Atlantic sturgeon (*Acipenser oxyrinchus*) til genetic relationships among herpes-like viruses isolated from sturgeon / Kelly G. O. et al. // Journal of Aquatic Animal Health. 2005. Vol. 17. P. 297—303.
 56. Fish cell culture: two newly developed cell lines from atlantic sturgeon (*Acipenser oxyrinchus*) and guppy (*Poecilia reticulata*) / Li M. F. et al. // Canadian Journal of Zoology. 1985. Vol. 63. P. 2867—2874.
 57. Flajshans M., Vajcova V. Odd ploidy levels in sturgeon suggest a backcross of interspecific hexaploid sturgeon hybrids to evolutionary tetraploid and octaploid parental species // Folia Zoologica. 2000. Vol. 49. P. 133—138.
 58. Fontana F. Chromosomal nucleolar organizer regions in four sturgeon species as markers of karyotype evolution in *Acipenseriformes* (Pisces) // Genome. 1994. Vol. 37. P. 888—892.
 59. Fontana F., Jankovic D., Zivkovic S. Somatic hromosomes of *Acipenser ruthenus* L. // Archives of biological sciences. 1975. Vol. 21. P. 1—2.
 60. Fontana F., Tagliavini J., Congiu L. Sturgeon genetics and cytogenetics: recent advancements and perspectives // Journal of Conservation Genetics. 2001. Vol. 111. P. 359—373.
 61. Forlani A., Fontana F., Congiu L. Isolation of microsatellite loci from the endemic and endangered Adriatic Sturgeon (*Acipenser naccarii*) // Journal of Conservation Genetics. 2008. Vol. 9. P. 461—463.
 62. Gardiner B. G. Sturgeons as living fossils: circumscription, phylogeny, polyploidy, and possible hybrid speciation // American Journal of Botany. 2004. Vol. 91. P. 707—723.
 63. Genetic issues in aquatic species management: the shortnose sturgeon (*Acipenser brevirostrum*) in the south-eastern United States / Quattro J. M. et al. // Journal of Conservation Genetic. 2002. Vol. 3. 155—166.
 64. Genetic comparison of lake sturgeon populations: differentiation based on allelic frequencies at seven microsatellite loci / Mc Quown E. C. et al. // Journal Great Lakes Res. 2003. Vol. 29. P. 3—13.
 65. Genetic differences and resemblance between *Acipenser persicus* and *Acipenser gueldenstaedtii* by means of RAPD technique / Gharaei A. et al. // Iranian Journal of Fisheries Sciences. 2005. Vol. 14. P. 91—102.
 66. Genetic differentiation of three key anadromous fish populations of the Hudson River / Waldman J. R. et al. // Estuaries. 1996. Vol. 19. P. 759—768.
 67. Genetic discrimination of middle Mississippi River *Scaphirhynchus* sturgeon into pallid, shovelnose, and putative hybrids with multiple microsatellite loci / Schrey A. W. et al. // Journal of Conservation Genetics. 2007. Vol. 8. P. 683—693.
 68. Genetic distinction of pallid, shovelnose, and alabama sturgeon: emerging species and the US endangered species act / Campton D. E. et al. // Journal of Conservation Genetics. 2000. Vol. 1. P. 17—32.
 69. Genetic divergence between *Acipenser oxyrinchus oxyrinchus* and *Acipenser oxyrinchus desotoi* as assessed by mitochondrial DNA sequencing analysis / Ong

- T.-L. et al. // Copeia. 1996. Vol. 2. P. 464—469.
70. Genetic identification of western Mediterranean sturgeons and its implication for conservation / de la Herran R. et al. // Journal of Conservation Genetics. 2004. Vol. 5. P. 545—551.
71. Genetic structure of Atlantic sturgeon populations based on mitochondrial DNA control region sequences / Wirgin I. et al. // Transactions of the American Fisheries Society. 2000. Vol. 129. P. 476—486.
72. Genome duplication events and functional reduction of ploidy levels in sturgeon (*Acipenser*, *Huso* and *Scaphirhynchus*) / Ludwig A. et al. // Journal of Conservation Genetics. 2001. Vol. 158. P. 1203—1215.
73. Genomic organization and evolution of the 5S ribosomal DNA in the ancient fish sturgeon / Robles F. et al. // Genome. 2005. Vol. 48. P. 18—28.
74. Gisbert E., Doroshov S. Allometric growth in green sturgeon larvae // Journal of Applied Ichthyology. 2006. Vol. 22. P. 202—207.
75. Grande L., Bemis W. E. Osteology and phylogenetic relationships of fossil and recent paddlefishes (*Polyodontidae*) with comments on the interrelationships of *Acipenseriformes* // Journal of Vertebrate Paleontology. 1991. Vol. 11. P. 1—121.
76. Guenette S., Fortin R., Rassart E. Mitochondrial DNA variation in lake sturgeon (*Acipenser fulvescens*) from the St. Lawrence River and James Bay Drainage Basins in Quebec, Canada // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 1993. Vol. 50. P. 659—664.
77. Hatchery manual for white sturgeon, *Acipenser transmontanus* R., with application to other North American Acipenseridae / Conte F. S. et al. Oakland : Div. Agric. Mat. Res., University of California, 1988. P. 88.
78. Henderson-Arzapalo A., King T. L. Novel microsatellite markers for Atlantic sturgeon (*Acipenser oxyrinchus*) population delineation and broodstock management // Molecular ecology Resources. 2002. Vol. 2. P. 437—439.
79. Heteroplasmy in the mtDNA control region of sturgeon (*Acipenser*, *Huso* and *Scaphirhynchus*) / Ludwig A. et al. // Journal of Conservation Genetics. 2000. Vol. 156. P. 1933—1947.
80. Hett A. K., Ludwig A. SRY-related (Sox) genes in the genome of European Atlantic sturgeon (*Acipenser sturio*) // Genome. 2005. Vol. 48. P. 181—186.
81. Hine P. M., Wain J. M. Ultrastructural and citochemical observations on the granulocytes of the sturgeons, *Asipenser brevirostrum* (*Chondrostei*) / Journal of Fish Biology. 1988. Vol. 33. P. 235—245.
82. Hybridization of *Acipenseridae* and its practical significance / Barannikova I. A. et al. // Rep. FAO/UNDP (TA). Rome, 1971. P. 328—334.
83. Identification of interspecific hybrids by amplified fragment length polymorphism: the case of sturgeon / Congiu L. et al. // Molecular ecology Resources. 2001. Vol. 10. P. 2355—2359.
84. Inheritance of microsatellite loci in the polyploid lake sturgeon (*Acipenser fulvescens*) / Pyatskowitz J. D. et al. // Genome. 2001. Vol. 44. P. 185—191.
85. Isolation and characterization of microsatellites in the Adriatic sturgeon (*Acipenser naccarii*) / Zane L. et al. // Molecular Ecology Notes. 2002. Vol. 2. P. 586—588.
86. Isolation of an epitheliotropic herpesvirus from white sturgeon (*Acipenser transmontanus*) / Hedrick R. P. et al. // Diseases of Aquatic Organisms. 1991. Vol. 11. P. 49—56.

87. Jahnichen H., Kohlmann R., Rennert B. Juvenile growth of *A. ruthenus* and 4 different sturgeon hybrids : 3 International symposium on sturgeon, July 8-11.1997 : abstracts. Piacenza, Italy. P. 71—72.
88. Kempter J. First detection and identification of koi herpesvirus (KHV) in Russian sturgeon (*Acipenser gueldenstaedtii*) and Atlantic sturgeon (*Acipenser oxyrinchus*) // 7 International Symposium on Viruses of Lower Vertebrates : proceed. Oslo, Norway, 2007. P. 15.
89. Keyvanshokoo S., Pourkazemi M., Katbassi M. R. The RAPD technique failed to identify sex-specific sequences in beluga (*Huso huso*) // Journal of Applied Ichthyology. 2007. Vol. 23. P. 1—2.
90. King T. L., Lubinski B. A., Spidle A. P. Microsatellite DNA variation in Atlantic sturgeon (*Acipenser oxyrinchus oxyrinchus*) and cross-species amplification in *Acipenseridae* // Journal of Conservation Genetics. 2001. Vol. 2. P. 103—119.
91. Krieger J. Molecular phylogenetics and evolution of the North American sturgeon and paddlefish (Order *Acipenseriformes*) : diss. thesis ... PhD. Columbus, Ohio, USA : Ohio State Univ., 2000. 248 p.
92. Krieger J., Fuerst P. A. Characterization of nuclear 18S rRNA gene sequence diversity and expression in an individual lake sturgeon (*Acipenser fulvescens*) // Journal of Applied Ichthyology. 2004. Vol. 20. P. 433—439.
93. Krieger J., Fuerst P. A. Evidence of multiple alleles of the nuclear 18S ribosomal RNA gene in sturgeon // Journal of Applied Ichthyology. 2002. Vol. 18. P. 290—297.
94. Krieger J., Fuerst P. A. Evidence for a slowed rate of molecular evolution in the order *Acipenseriformes* // Molecular Biology Evolution. 2002. Vol. 19. P. 891—897.
95. Krieger J., Fuerst P. A., Cavender T. M. Phylogenetic relationships of the North American sturgeons (Order *Acipenseriformes*) based on mitochondrial DNA sequences // Molecular Phylogenetics and Evolution. 2000. Vol. 16. P. 64—72.
96. Kuhajda B. R., Mayden R. L. Morphological comparisons of hatchery-reared specimens of *Scaphirhynchus albus*, *S. platorhynchus*, and *S. albus*, *S. platorhynchus* hybrids : Final Report US Fish and Wildlife Service Bismarck. North Dakota, 2001. 119 p.
97. Kurobe T., Kelly G. O., Waltzek T. B. Revised phylogenetic relationships among herpesviruses isolated from sturgeons // Journal of Aquatic Animal Health. 2008. Vol. 20. P. 96—102.
98. Length variation, heteroplasmy and sequence divergence in the mitochondrial DNA of four species of sturgeon (*Acipenser*) / Brown J. R. et al. // Journal of Conservation Genetics. 1996. Vol. 142. P. 525—535.
99. Length heteroplasmy of sturgeon mitochondrial DNA: an illegitimate elongation model / Buroker N. E. et al. // Genetics. 1990. Vol. 124. P. 157—163.
100. Low genetic variability in paddlefish populations / Carlson D. M. et al. // Copeia. 1982. Vol. 3. P. 721—723.
101. Ludwig A. A sturgeon view on conservation genetics // European Journal of Wild Research. 2006. Vol. 52. P. 3—8.
102. Ludwig A., Kirschbaum F. Comparison of mitochondrial DNA sequences between the European and the Adriatic sturgeon // Journal of Fisheries Biology. 1998. Vol. 52. P. 1289—1291.
103. Ludwig A., Debus L., Jenneckens I. A molecular approach for trading control of black caviar // International Review of Hydrobiology. 2002. Vol. 87. P. 661—674.

104. May B., Krueger C. C., Kincaid H. L. Genetic variation at microsatellite loci in sturgeon: primer sequence homology in *Acipenser* and *Scaphirhynchus* // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 1997. Vol. 54. P. 1542—1547.
105. May B., Kuhajda B. R. Systematics, taxonomy, and conservation status of the endangered Alabama sturgeon *Scaphirhynchus suttkusi* William and Clemmer (*Actinopteygii, Acipenseridae*) // Copeia. 1996. Vol. 2. P. 241—275.
106. McQuown E. C., Gall G. A. E., May B. Characterization and inheritance of six microsatellite loci in lake sturgeon // Transactions of the American Fisheries Society. 2002. Vol. 131. P. 299—307.
107. Microsatellite analysis of genetic variation in sturgeon: new primer sequences for *Scaphirhynchus* and *Acipenser*. / McQuown E. C. et al. // Transactions of the American Fisheries Society. Vol. 129. P. 1380—1388.
108. Mitochondrial DNA length variation and heteroplasmy in the Chinese sturgeon (*Acipenser sinensis*) / Zhang S.-M. et al. // Acta Genetica Sinica 1999. Vol. 26. P. 18—25.
109. Mitochondrial DNA sequences of six sturgeon species and phylogenetic relationships within *Acipenseridae* / Tagliavini J. et al. // Journal of Applied Ichthyology. 1999. Vol. 15. P. 17—22.
110. Miracle A. L., Campton D. E. Tandem repeat sequence variation and length heteroplasmy in the mitochondrial DNA D-loop of the threatened Gulf of Mexico sturgeon *A. oxyrinchus desotoi* // Journal of Heredity. 1995. Vol. 86. P. 22—21.
111. Molecular genetic analysis among subspecies of two Eurasian sturgeon species, *Acipenser baerii* and *A. stellatus* / Doukakis P. et al. // Molecular ecology Resources. 1999. Vol. 12. P. 117—127.
112. Morphological and genetic variation among Shortnose Sturgeon (*Acipenser brevirostrum*) from Adjacent and Distant Rivers / Walsh M. G. et al. // Estuaries. 2001. Vol. 24. P. 41—48.
113. Motility analysis and energetics of the Siberian sturgeon *Asipenser baeri* spermatozoa / Billard R. et al. // Journal of Applied Ichthyology. 1999. Vol. 15. P. 199—203.
114. Motility and fertilizing capability of cryopreserved *Acipenser ruthenus* L. sperm / Jahnichen M. et al. // Journal of Applied Ichthyology. 1999. Vol. 15. P. 204—206.
115. Nonconcordant evolutionary history of maternal and paternal lineages in Adriatic sturgeon / Ludwig A. et al. // Molecular Ecology. 2003. Vol. 12. P. 3253—3264.
116. Objective analysis of sperm motility in the lake sturgeon (*A. fulvescens*): activation and inhibition conditions / Toth G. P. et al. // Aquaculture. 1994. Vol. 154. P. 337—348.
117. Occurrence of white sturgeon iridovirus infections among cultured white sturgeon in the Pacific Northwest / La Patra S. E. et al. // Aquaculture. 1994. Vol. 126. P. 201—210.
118. Ovarian development and serum sex steroid and vitellogenin profiles in the female cultured sturgeon hybrid, the bester / Mojazi Amiri B. et al. // Journal of Fish Biology. 1996. Vol. 47. P. 1164—1178.
119. Ontogenetic behavior and migration of Volga river Russian Sturgeon, *Acipenser gueldenstaedtii*, with a note on adaptive significance of body color / Kynard B. et al. // Environmental Biology of Fish. 2002. Vol. 65. P. 411—421.
120. Phelps S. R., Allendorf F. W. Genetic identity of pallid and shovelnose sturgeon (*Scaphirhynchus albus* and *S. platyrhynchus*) // Copeia. 1983. Vol. 3. P. 696—700.

121. Population aggregation analysis of three caviar-producing species of sturgeons and implications for the species identification of black caviar / Birstein V. J. et al. // Journal of Conservation Biology. 1998. Vol. 12. P. 766—775.
122. Population genetic analysis of white sturgeon (*Acipenser fulvescens*) in the Fraser River / Smith C. T. et al. // Journal of Applied Ichthyology. 2002. Vol. 18. P. 307—312.
123. Population genetic structure and genetic diversity of the Chinese sturgeon (*Acipenser sinensis*) based on random amplified polymorphic DNA analysis / Zhang S.-M. et al. // Chinese Journal of Oceanology and Limnology. 2000. Vol. 31. P. 1—7.
124. Population genetics of shortnose sturgeon *Acipenser brevirostrum* based on mitochondrial DNA control region sequences / Grunwald G. et al. // Molecular ecology Resources. 2002. Vol. 11. P. 1885—1898.
125. Pourkazemi M., Skibinski D. O. F., Beardmore J. A. Application of mtDNA d-loop region for the study of Russian sturgeon population structure from Iranian coastline of the Caspian Sea // Journal of Applied Ichthyology. 1999. Vol. 15. P. 23—28.
126. Reproductive isolation in sympatric populations of pallid and shovelnose sturgeon / Tranah G. J. et al. // North American Journal of Fisheries Management. 2001. Vol. 21. P. 367—373.
127. Richmond A. M., Kynard B. Ontogenic Behaviour of Shortnose Sturgeon, *Acipenser brevirostrum* // Copeia. 1995. Vol. 1. P. 172—182.
128. Robinson M. R., Ferguson M. M. Genetics of North American *Acipenseriformes* // Sturgeons and Paddlefishes of North America / LeBreton G. T. O. et al. Netherlands : Springer, 2004. P. 217—230.
129. Rodzen J. A., Famula T. R., May B. Estimation of parentage and relatedness in the polyploid white sturgeon (*Acipenser transmontanus*) using a dominant marker approach for duplicated microsatellite loci // Aquaculture. 2004. Vol. 232. P. 165—182.
130. Rodzen J. A., May B. Inheritance of microsatellite loci in the white sturgeon (*Acipenser transmontanus*) // Genome. 2002. Vol. 45. P. 1064—1076.
131. Serfling S. A., Hamlin H. Culture of beluga-hybrid "bester" sturgeon (*H. huso* × *A. rnthenus*) in closed-cycle culture systems in Florida // 4th Int. Simp. on Sturgeon : abstr. bull. 2001. AQ 51.
132. Some meristic characteristics of hybrids between *Acipenser naccarii* and *Acipenser baeri* / Arlati G. et al. // Journal of Applied Ichthyology. 1999. Vol. 15. P. 54—56.
133. Sperm-cell ultrastructure of North American sturgeons. V. The pallid sturgeon (*Scaphirhynchus albus* Richardson, 1905) / Di Lauro M. N. et al. // Canadian Journal of Zoology. 2001. Vol. 79. P. 802—808.
134. Spermatozoa motility in the Persian sturgeon (*Acipenser persicus*): effects of pH, dilution rate, ions and osmolality / Alavi S. M. et al. // Reproduction. 2004. Vol. 128. 819—828.
135. Stock structure and homing fidelity in Gulf of Mexico sturgeon (*Acipenser oxyrinchus desotoi*) based on restriction fragment length polymorphism and sequence analyses of mitochondrial DNA / Stabile J. et al. // Genetics. 1996. Vol. 144. P. 767—775.

136. Straughan D. J., Burnham-Curtis M. E., Fain S. R. Experimental search for forensically useful markers in the genus *Scaphirhynchus* // Journal of Applied Ichthyology. 2002. Vol. 18. P. 621—628.
137. Testicular development and serum sex steroid profiles during the annual sexual cycle of the male sturgeon hybrid, the bester / Mojazi Amiri B. et al. // Journal of Fish Biology. 1996. Vol. 48. P. 1039—1050.
138. The molecular phylogeny of the order *Acipenseriformes* revisited / Krieger J. et al. // Journal of Applied Ichthyology. 2008. Vol. 24. P. 36—45.
139. The preliminary evidence for low genetic diversity in the Chinese sturgeon (*Acipenser sinensis*) revealed by protein electrophoresis / Zhang S.-M. et al. // Zoological Research. 1999. Vol. 20. P. 93—98.
140. The use of AFLP in sturgeon identification / Congiu L. et al. // Journal of Applied Ichthyology. 2002. Vol. 18. P. 286—289.
141. Tranah G. J., Campton D. E., May B. Genetic evidence for hybridization of pallid and shovelnose sturgeon // Journal of Heredity. 2004. Vol. 95. P. 474—480.
142. Two cell lines from white sturgeon / Hedrick R. P. et al. // Transactions of the American Fisheries Society. 1991. Vol. 120. P. 528—534.
143. Unusual intraindividual variation of the nuclear 18S rRNA gene is widespread within the *Acipenseridae* / Krieger J. et al. // Journal of Heredity. 2006. Vol. 97. P. 218—225.
144. Use of RAPD markers to determine the genetic relationships among sturgeons (*Acipenseridae*, *Pisces*) / Comincini S. et al. // Fisheries Science. 1998. Vol. 64. P. 35—38.
145. Van Eenennaam A. L., Murray J. D., Medrano J. F. Karyotype of the American green sturgeon // Transactions of the American Fisheries Society. 1999. Vol. 128. P. 175—177.
146. Van Eenennaam A. L., Murray J. D., Medrano J. F. Synaptonemal complex analysis in spermatocytes of white sturgeon, *Acipenser transmontanus* Richardson (*Pisces*, *Acipenseridae*), a fish with a very high chromosome number // Genome. 1998. Vol. 41. P. 51—61.
147. Variation in short tandem repeat sequences — a survey of twelve microsatellite loci for use as forensic identification markers / Urquhart A. et al. // International Journal of Legal Medicine. 1994. Vol. 107. P. 13—20.
148. Vasil'ev V. P. Mechanisms of Polyploid Evolution in Fish: Polyploidy in Sturgeons // Biology, Conservation and Sustainable Development of Sturgeons / Carmona R. et al. Netherlands : Springer Science + Business Media, 2009. P. 97—117.
149. Waldman J. R., Hart J. T., Wirgin I. I. Stock composition of the New York Bight Atlantic sturgeon fishery based on analysis of mitochondrial DNA // Transactions of the American Fisheries Society. 1996. Vol. 125. P. 364—371.
150. Watson L. R., Groff J. M., Hedrick R. P. Replication and pathogenesis of white sturgeon iridovirus (WSIV) in experimentally infected white sturgeon (*Acipenser transmontanus*) juveniles and sturgeon cell lines // Diseases of Aquatic Organisms. 1998. Vol. 32. P. 173—184.
151. Welsh A. B., Blumberg M., May B. Identification of microsatellite loci in lake sturgeon (*Acipenser fulvescens*), and their variability in green sturgeon (*A. medirostris*) // Molecular Ecology Resources. 2003. Vol. 3. P. 47—55.

152. Welsh A. B., May B. Development and standartization of disomic microsatellite markers for lake sturgeon genetic studies // *Journal of Applied Ichthyology*. 2006. Vol. 22. P. 337—344.
153. Wirgin I., Stabile J. E., Waldman J. R. Molecular analysis in the conservation of sturgeons and paddlefish // *Environmental Biology of Fishes*. 1997. Vol. 48. P. 385—398.
154. Wolf C., Hübner P., Lüthy J. Differentiation of sturgeon species by PCR-RFLP // *Food Res. Int.* 1999. Vol. 32. P. 699—705.
155. Zhang S.-M., Wang D.-Q., Zhang Y.-P. Mitochondrial DNA variation, effective female population size and population history of the endangered Chinese sturgeon, (*Acipenser sinensis*) // *Journal of Conservation Genetics*. 2003. Vol. 4. P. 673—683.
156. Zhang S.-M., Wu Q.-J., Zhang Y.-P. On the taxonomic status of the Yangtze sturgeon, Asian and American green sturgeons inferred from mitochondrial control region sequences // *Current Zoology*. 2001. Vol. 47. P. 632—639.

REFERENCES

1. Jenneckens, I., Meyer, J. N., Hörstgen-Schwark, G., May, B., Debus, L., & Ludwig, A. (2001). A fixed allele at microsatellite LS-39 is characteristic for the black caviar producer *Acipenser stellatus*. *Journal of Applied Ichthyology*, 17, 39-42.
2. Hedrick, R. P., Speas, J., Kent, M. L., & McDowell, T. (1985). Adeno-like virus associated with a disease of cultured white sturgeon (*Acipenser transmontanus*). *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 42, 1321-1325.
3. Adkison, M. A., Cambre, M., & Hedrick, R. P. (1998). Identification of an iridovirus in Russian sturgeon (*Acipenser gueldenstaedti*) from Northern Europe. *Bull. Eur. Ass. Fish Pathol.*, 18, 29-32.
4. Alavi, S. M. H. (2009). Sperm motility analysis for sturgeons. *Cryopreservation of sturgeon sperm: International Workshop, 28 October, 2009: proceedings*. Wuhan, China, 12-20.
5. Garrido-Ramos, M., Robles, A. F., de la Herran., Martínez-Espín José, R. E., Lorente, C. A., & Ruiz-Rejón, M. (2009). Analysis of mitochondrial and nuclear DNA markers in old museum sturgeons yield insights about the species existing in Western Europe: *A. sturio*, *A. naccarii* and *A. oxyrinchus*. *Springer Science & Business Media*, 25-49.
6. Hedrick, R. P., Groff, J. M., Mc Dowell, T. S., & Wingfield, W. H. (1990). An iridovirus infection of the integument of the white sturgeon *Acipenser transmontanus*. *Diseases of Aquatic Organisms*, 6, 39-40.
7. Arefjev, V. A. (1991). Cytogenetic aspects of differences in the quality of spawners of reciprocal hybrids between "bestor" and beluga sturgeon. *Biol. Principles of commercial culture of sturgeons: collected papers*. Moscow: VNIRO, 134-150.
8. Arefjev, V. A. (1989). Kariotype variability in successive generations after hybridization between the great sturgeon, *Huso huso* (L.), and the sterlet, *Acipenser ruthenus* (L.). *Journal of Fish Biology*, 35, 819-828.
9. Arefjev, V. A., & Nikolaev A. I. (1993). Induced polyploidy in sturgeons: back to the problem in Russia. *2nd Int Simp. on Sturgeons: Abst. Bull.* Moscow: VNIRO, 31-32.
10. Artyukhin, E. N. (1995). Morphological phylogeny of the Order *Acipenseriformes*. *The Sturgeon Quarterly*, 3, 6-8.

11. Barmintsev, V. A., Chudinov, O. S., & Abramova, A. B. (2001). Molecular and biological methods of identification and certification of sturgeons and their products. *Fisheries and Aquaculture Journal*, 1, 70-71.
12. Bemis, W. E., & Findeis, E. K. (1994). The sturgeons' plight. *Nature*, 370, 602.
13. Beyea, M. M., Benfey, T. J., & Kieffer, J. D. (2005). Hematology and stress physiology of juvenile diploid and triploid shortnose sturgeon (*Acipenser brevirostrum*). *Fish Physiology and Biochemistry*, 31, 303-313.
14. Billard, R., & Lecointre, G. (2000). Biology and conservation of sturgeon and paddlefish. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 10, 355-392.
15. Vasil'ev, A. S., Kuzmin, E. V., Luk'yanenko, V. V., Luk'yanenko, V. I., & Khabarov, M. V. (1999). Biochemical analysis of decrease in phenotypic diversity in the Volgo-Caspian Russian sturgeon population. *Journal of Applied Ichthyology*, 15, 284-285.
16. Birstein, V. J. (2000). Sturgeon species and hybrids: can hybrids produce caviar? *Environmental policy and law*, 32, 210-214.
17. Birstein, V. J., Hanner, R., & DeSalle, R. (1997). Phylogeny of the *Acipenseriformes*: cytogenetic and molecular approaches. *Environmental Biology of Fishes*, 48, 127-155.
18. Birstein, V. J., Betts, J., & De Salle, R. (1998). Molecular identification of *Acipenser sturio* specimens: A warning note for recovery plans. *Journal of Biological Conservation*, 84, 97-101.
19. Birstein, V. J., & De Salle, R. (1998). Molecular phylogeny of *Acipenserinae*. *Molecular phylogenetics and evolution*, 9, 141-155.
20. Birstein, V. J., Doukakis, P., & De Salle, R. (1999). Molecular phylogeny of *Acipenserinae* and black caviar species identification. *Journal of Applied Ichthyology*, 15, 12-16.
21. Birstein, V. J., Doukakis, P., & De Salle, R. (2000). Polyphyletic genetic structure of the Russian sturgeon and caviar species identification. *Journal of Conservation genetics*, 1, 81-88.
22. Birstein, V. J., Doukakis, P., & DeSalle, R. (2000). Polyphyly of mtDNA lineages in the Russian sturgeon, *Acipenser gueldenstaedtii*: forensic and evolutionary implications. *Journal of Conservation Genetics*, 1, 81-88.
23. Birstein, V. J., Poletaev, A. I., & Goncharov, B. F. (1993). The DNA content in Eurasian sturgeon species determined by flow cytometry. *Journal of Cytometry*, 14, 337-383.
24. Birstein, V. J., & Vasil'ev, V. P. (1987). Tetraploid-octoploid relationships and karyological evolution in the order *Acipenseriformes* (*Pisces*): karyotypes, nucleoli, and nucleolus-organizer regions in four acipenserid species. *Journal of Conservation Genetics*, 73, 3-12.
25. Bischof, R., & Szalanski, A. L. (2000). Mitochondrial-DNA variation in pallid and shovelnose sturgeons, *Scaphirhynchus* (*Pisces: Acipenseridae*). *Trans. Nebr. Acad. Sci.*, 26, 19-21.
26. Blacklidge, K. H., & Bidwell, C. A. (1993). Three ploidy levels indicated by genome quantification in *Acipenseriformes* of North America. *Journal of Heredity*, 84, 427-430.
27. Bowen, B. W., & Avise, J. C. (1990). Genetic structure of Atlantic and Gulf of Mexico populations of sea bass, menhaden, and sturgeon: influence of zoogeographic factors and life-history patterns. *Marine Biology*, 107, 371-381.

28. Brown, J. R., Beckenbach, A. T. & Smith, M. J. (1993). Intraspecific DNA sequence variation of the mitochondrial control region of white sturgeon (*Acipenser transmontanus*). *Molecular Biology Evol.*, 10, 326-341.
29. Brown, J. R., Beckenbach, A. T., & Smith, M. J. (1992). Mitochondrial DNA length variation and heteroplasmy in populations of white sturgeon (*Acipenser transmontanus*). *Journal of Conservation Genetics*, 132, 221-228.
30. Brown, J. R., Beckenbach, A. T., & Smith, M. J. (1992). Influence of Pleistocene glaciations and human intervention upon mitochondrial DNA diversity in white sturgeon (*Acipenser transmontanus*) populations. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 49, 358-367.
31. Watson, L. R., Yun, S. C., Groff, J. M., & Hedrick, R. P. (1995). Characteristics and pathogenicity of a novel herpesvirus isolated from adult and sub adult white sturgeon *Acipenser transmontanus*. *Diseases of Aquatic Organisms*, 22, 199-210.
32. Hedrick, R. P., Mc Dowell, T. S., Groff, J. M., Yun, S., & Wingfield, W. H. (1991). Characteristics of two viruses isolated from white sturgeon, *Acipenser transmontanus*. *Second Intern. Symp. Virus. Lower Verteb.: proceedings*. OR: Oregon State Univer. Press, 165-174.
33. Hett, A. K., Pitra, C., Jenneckens, I. & Ludwig, A. (2005). Characterization of the Sox9 gene in European Atlantic sturgeon (*Acipenser sturio*). *Journal of Heredity*, 96, 150-154.
34. Choudhury, A., & Dick, T. A. (1998). The historical biogeography of sturgeons (*Osteichthyes: Acipenseridae*): a synthesis of phylogenetics, palaeontology and palaeogeography. *Journal of Biogeography*, 25, 623-640.
35. Rastorguev, S., Mugue, N., Volkov, A., & Barmintsev, V. (2008). Complete mitochondrial DNA sequence analysis of Ponto-Caspian sturgeon species. *Journal of Applied Ichthyology*, 24, 46-49.
36. Billard, R., Cosson, J., Noveiri, S. B., & Pourkazemi, M. (2004). Cryopreservation and short-term storage of sturgeon sperm, a review. *Aquaculture*, 236, 1-9.
37. Liu, L., Wei, Q., Guo, F., Zhang, J., & Zhang, T. (2006). Cryopreservation of Chinese sturgeon (*Acipenser sinensis*) sperm. *Journal of Applied Ichthyology*, 22, 384-388.
38. Lanfredi, M., Rossi, R., Arlati, G., Bronzi, P., & Fontana, F. (1997). Cytogenetic characterization of cell lines from six sturgeon species. *3rd Intern. Symposium on Sturgeon*. Piacenza, Italy.
39. Fontana, F., Rossi, R., Lanfredi, M., Arlati, G., & Bronzi, P. (1997). Cytogenetic characterization of cell lines from three sturgeon species. *Journal of Caryologia*, 50, 91-95.
40. DeSalle, R., & Birstein, V. J. (1996). PCR identification of black caviar. *Nature*, 381, 197-198.
41. DeWoody, J. A., & Avise, J. C. (2000). Microsatellite variation in marine, freshwater and anadromous fishes compared with other animals. *Journal of Fish Biology*, 56, 461-473.
42. Degani, G. (2002). Availability of protein and energy from throat protein sources in hybrid sturgeon *Acipenser guldenstadti* × *A. bester*. *Aquaculture Research*, 33, 725-727.
43. Di Lauro, M. N., Kaboord, W. S., & Walsh, R. A. (2000). Sperm-cell ultrastructure of North American sturgeons. IV. The lake sturgeon (*Acipenser fulvescens* Rafinisque, 1817). *Canadian Journal of Zoology*, 78, 438-447.

44. Ferguson, M. M., Bernatchez, L., Gatt, M., Konkle, B. R., Lee, S., Malott, M. L. & McKinley, R. S. (1993). Distribution of mitochondrial DNA variation in lake sturgeon (*Acipenser fulvescens*) from the Moose River basin, Ontario, Canada. *Journal of Fish Biology*, 43, 91-101.
45. Carlson, D. M., Pflieger, W. L., Trial, L. & Haverland, P. S. (1985). Distribution, biology and hybridization of *Scaphirhynchus albus* and *S. platyrhynchus* in the Missouri and Mississippi rivers. *Environmental Biology of Fish*, 14, 51-59.
46. Dingerkus, G., & Howell, W. M. (1976). Karyotypic analysis and evidence of tetraploidy in the North American paddlefish, *Polyodon spathula*. *Science*, 194, 842-843.
47. Wills, P. S., Sheehan, R. J., Heidinger, R., Sloss, B. L., & Clevenstine R. (2002). Differentiation of pallid sturgeon and shovelnose sturgeon using an index based on meristics and morphometrics. *American Fisheries Society Symp.* 28, 249—258.
48. Doszpoly, A., & Shchelkunov, I. S. (2010). Partial genome analysis of Siberian sturgeon alloherpesvirus suggests its close relation to AciHV-2. *Acta Veterinaria Hungarica*, 58, 269-274.
49. Doukakis, P., Birstein, V. J., & De Salle, R. (2005). Intraspecific structure within three caviar-producing sturgeons (*Acipenser gueldenstaedtii*, *A. stellatus* and *Huso huso*) based on mitochondrial DNA analysis. *Journal of Applied Ichthyology*, 21, 457-460.
50. Dugo, M. A., Kreiser, B. R., Ross, S. T., Slack, W. T., Heise, R. J., & Bowen, B. R. (2004). Conservation and management implications of finescale genetic structure of Gulf Sturgeon in the Pascagoula River, Mississippi. *Journal of Applied Ichthyology*, 20, 243-251.
51. Foster, O., Patrick, A. M., Barculoo, J., Fontana, F., Lanfredi, M., Rossi, R., Bronzi, P., & Arlati, G. (1995). Established cell lines from three sturgeon species. *The Sturgeon Quarterly*, 3, 6-7.
52. Jenneckens, I., Meyer, J. N., Debus, L., Pitra, C. & Ludwig, A. (2000). Evidence of mitochondrial DNA clones of Siberian sturgeon, *Acipenser baerii*, within Russian sturgeon, *Acipenser gueldenstaedtii*, caught in the River Volga. *Ecol. Lett.*, 3, 503-508.
53. Robles, F., de la Herran, R., Ludwig, A., Ruiz-Rejon, C., Ruiz-Rejon, M., & Garrido, R. M. (2004). Evolution of ancient satellite DNAs in sturgeon genomes. *Gene*, 338, 133-142.
54. Findeis, E. K. (1997). Osteology and phylogenetic interrelationships of sturgeons (*Acipenseridae*). *Environmental Biology of Fishes*, 48, 73-126.
55. Kelly, G. O., Kurobe, T., & Waltzek, T. B. (2005). First detection and identification of koi herpesvirus (KHV) in Russian sturgeon (*Acipenser gueldenstaedtii*) and Atlantic sturgeon (*Acipenser oxyrinchus*) til genetic relationships among herpes-like viruses isolated from sturgeon. *Journal of Aquatic Animal Health*, 17, 297-303.
56. Li, M. F., Marrayatt, V., Annand, C., & Odense, P. (1985). Fish cell culture: two newly developed cell lines from atlantic sturgeon (*Acipenser oxyrhynchus*) and guppy (*Poecilia reticulata*). *Canadian Journal of Zoology*, 63, 2867-2874.
57. Flajshans, M., & Vajcova, V. (2000). Odd ploidy levels in sturgeon suggest a backcross of interspecific hexaploid sturgeon hybrids to evolutionary tetraploid and octaploid parental species. *Folia Zoologica*, 49, 133-138.
58. Fontana, F. (1994). Chromosomal nucleolar organizer regions in four sturgeon species as markers of karyotype evolution in *Acipenseriformes* (Pisces). *Genome*, 37, 888-892.

59. Fontana, F., Jankovic, D., Zivkovic, S. (1975). Somatic chromosomes of *Acipenser ruthenus* L. *Archives of biological sciences*, 21, 1-2.
60. Fontana, F., Tagliavini, J., & Congiu, L. (2001). Sturgeon genetics and cytogenetics: recent advancements and perspectives. *Journal of Conservation Genetics*, 111, 359-373.
61. Forlani, A., Fontana, F., & Congiu, L. (2008). Isolation of microsatellite loci from the endemic and endangered Adriatic Sturgeon (*Acipenser naccarii*). *Journal of Conservation Genetics*, 9, 461-463.
62. Gardiner, B. G. (2004). Sturgeons as living fossils: circumscription, phylogeny, polyploidy and possible hybrid speciation. *American Journal of Botany*, 91, 707-723.
63. Quattro, J. M., Greig T. W., Coykendall, D.K., Bowen, B.W., & Baldwin J. D. (2002). Genetic issues in aquatic species management: the shortnose sturgeon (*Acipenser brevirostrum*) in the south-eastern United States. *Journal of Conservation Genetic*, 3, 155-166.
64. Mc Quown, E. C., Krueger, C. C., Kincaid, H. L., Gall, G. A. E., & May, B. (2003). Genetic comparison of lake sturgeon populations: differentiation based on allelic frequencies at seven microsatellite loci. *Journal Great Lakes Research*, 29, 3-13.
65. Gharaei, A., Pourkazemi, M., Rezvani, S., & Mojazi Amiri, B. (2005). Genetic differences; and resemblance between *Acipenser persicus* and *Acipenser gueldenstaedtii* by means of RAPD technique. *Iranian Journal of Fisheries Sciences*, 14, 91-102.
66. Waldman, J. R., Nolan, K., Hart, J. T., & Wirgin, I. I. (1996). Genetic differentiation of three key anadromous fish populations of the Hudson River. *Estuaries*, 19, 759-768.
67. Schrey, A. W., Sloss, B. L., Sheehan, R. J., Heidinger, R. C. & Heist, E. J. (2007). Genetic discrimination of middle Mississippi River *Scaphirhynchus* sturgeon into pallid, shovelnose, and putative hybrids with multiple microsatellite loci. *Journal of Conservation Genetics*, 8, 683-693.
68. Campton, D. E., Bass, A. L., Chapman, F. A., & Bowen, B. W. (2000). Genetic distinction of pallid, shovelnose, and Alabama sturgeon: emerging species and the US endangered species act. *Journal of Conservation Genetics*, 1, 17-32.
69. Ong, T.-L., Stabile, J., Wirgin, I., & Waldman, J. R. (1996). Genetic divergence between *Acipenser oxyrinchus oxyrinchus* and *Acipenser oxyrinchus desotoi* as assessed by mitochondrial DNA sequencing analysis. *Copeia*, 2, 464-469.
70. de la Herran, R., Robles, F., Martinez-Espin, E., Lorente, J. A., Rejon, C. R., Garrido-Ramos, M. A., & Rejon, M. R. (2004). Genetic identification of western Mediterranean sturgeons and its implication for conservation. *Journal of Conservation Genetics*, 5, 545-551.
71. Wirgin, I., Waldman, J. R., Rosko, J., Gross, R., Collins, M. R., Rogers, S. G., & Stabile, J. (2000). Genetic structure of Atlantic sturgeon populations based on mitochondrial DNA control region sequences. *Transactions of the American Fisheries Society*, 129, 476-486.
72. Ludwig, A., Belfiore, N. M., Pitra, C., Svirsky, V., & Jenneckens, I. (2001). Genome duplication events and functionfl reduction of ploidy levels in sturgeon (*Acipenser*, *Huso* and *Scaphirhynchus*). *Journal of Conservation Genetics*, 158, 1203-1215.

73. Robles, F., de la Herran, R., Ludwig, A., Ruiz-Rejon, C., Ruiz-Rejon, M., & Garrido, R. M. (2005). Genomic organization and evolution of the 5S ribosomal DNA in the ancient fish sturgeon. *Genome*, 48, 18-28.
74. Gisbert, E., & Doroshov, S. (2006). Allometric growth in green sturgeon larvae. *Journal of Applied Ichthyology*, 22, 202-207.
75. Grande, L., Bemis, W. E. (1991). Osteology and phylogenetic relationships of fossil and recent paddlefishes (*Polyodontidae*) with comments on the interrelationships of *Acipenseriformes*. *Journal of Vertebrate Paleontology*, 11, 1-121.
76. Guenette, S., Fortin, R., & Rassart, E. (1993). Mitochondrial DNA variation in lake sturgeon (*Acipenser fulvescens*) from the St. Laurence River and James Bay Drainage Basins in Quebec, Canada. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 50, 659-664.
77. Conte, F. S., Doroshov, S. I., Lutes, P. B., & Strange, E. M. (1988). *Hatchery manual for white sturgeon, Acipenser transmontanus R., with application to other North American Acipenseridae*. Oakland: Div. Agric. Mat. Res., University of California, 88.
78. Henderson-Arzapalo, A., & King, T. L. (2002). Novel microsatellite markers for Atlantic sturgeon (*Acipenser oxyrinchus*) population delineation and broodstock management. *Molecular ecology resources*, 2, 437-439.
79. Ludwig, A., May, B., Debus, L., & Jenneckens, I. (2000). Heteroplasmy in the mtDNA control region of sturgeon (*Acipenser*, *Huso* and *Scaphirhynchus*). *Journal of Conservation Genetics*, 156, 1933-1947.
80. Hett, A. K., & Ludwig, A. (2005). SRY-related (Sox) genes in the genome of European Atlantic sturgeon (*Acipenser sturio*). *Genome*, 48, 181-186.
81. Hine, P. M., & Wain, J. M. (1988). Ultrastructural and citochemical observations on the granulocytes of the sturgeons, *Asipenser brevirostrum* (*Chondrostei*). *Journal of Fish Biology*, 33, 235-245.
82. Barannikova, I. A., Burtsev, L. A., Vlasenko, A. D., Gershannvieh A. D., Makarov, E. V., & Nikoljukin, N. I. (1971). Hybridization of *Acipenseridae* and its practical significance. *Rep. FAO/UNDP (TA)*. Rome, 328-334.
83. Congiu, L., Dupanloup, I., Patarnello, T., Fontana, F., Rossi, R., Arlati, G., & Zane, L. (2001). Identification of interspecific hybrids by amplified fragment length polymorphism: the case of sturgeon. *Molecular Ecology Resources*, 10, 2355-2359.
84. Pyatskowitz, J. D., Krueger, C. C., Kincaid, H. L., & May, B. Inheritance of microsatellite loci in the polyploid lake sturgeon (*Acipenser fulvescens*). *Genome*, 44, 185-191.
85. Zane, L., Patarnello, T., Ludwig, A., Fontana, F., & Congiu, L. (2002). Isolation and characterization of microsatellites in the Adriatic sturgeon (*Acipenser naccarii*). *Molecular Ecology Notes*, 2, 586-588.
86. Hedrick, R. P., Groff, J. M., Mc Dowell, T. S., & Wingfield, W. H. (1991). Isolation of an epitheliotropic herpesvirus from white sturgeon (*Acipenser transmontanus*). *Diseases of Aquatic Organisms*, 11, 49-56.
87. Jahnichen, H., Kohlmann, R., & Rennert, B. (1997). Juvenile growth of *A. ruthenus* and 4 different sturgeon hybrids. *3 International symposium on sturgeon: booklet abstracts*. Piacenza, Italy, 71-72.
88. Kempter, J., Sadowski, J., Riecherd, M., Fichtner, D., Bergmann, S. M. (2007). First detection and identification of koi herpesvirus (KHV) in Russian sturgeon (*Acipenser gueldenstaedtii*) and Atlantic sturgeon (*Acipenser oxyrinchus*). *7 International Symposium on Viruses of Lower Vertebrates*. Oslo, Norway, 15.

89. Keyvanshokoo, S., Pourkazemi, M., & Katbassi, M. R. (2007). The RAPD technique failed to identify sex-specific sequences in beluga (*Huso huso*). *Journal of Applied Ichthyology*, 23, 1-2.
90. King, T. L., Lubinski, B. A., & Spidle, A. P. (2001). Microsatellite DNA variation in Atlantic sturgeon (*Acipenser oxyrinchus oxyrinchus*) and cross-species amplification in *Acipenseridae*. *Journal of Conservation Genetics*, 2, 103-119.
91. Krieger, J. (2000). Molecular phylogenetics and evolution of the North American sturgeon and paddlefish (Order *Acipenseriformes*). *Doctor's thesis*. Columbus, Ohio, USA: Ohio State Univ.
92. Krieger, J., & Fuerst, P. A. (2002). Evidence of multiple alleles of the nuclear 18S ribosomal RNA gene in sturgeon. *Journal of Applied Ichthyology*, 18, 290-297.
93. Krieger, J., & Fuerst, P. A. (2004). Characterization of nuclear 18S rRNA gene sequence diversity and expression in an individual lake sturgeon (*Acipenser fulvescens*). *Journal of Applied Ichthyology*, 20, 433-439.
94. Krieger, J., Fuerst, P. A. (2002). Evidence for a slowed rate of molecular evolution in the order *Acipenseriformes*. *Molecular Biology Evolution*, 19, 891-897.
95. Krieger, J., Fuerst, P. A., & Cavender, T. M. (2000). Phylogenetic relationships of the North American sturgeons (Order *Acipenseriformes*) based on mitochondrial DNA sequences. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 16, 64-72.
96. Kuhajda, B. R., Mayden, R. L. (2001). Morphological comparisons of hatchery-reared specimens of *Scaphirhynchus albus*, *S. platorhynchus*, and *S. albus*, *S. platorhynchus* hybrids. *Final Report US Fish and Wildlife Service Bismarck*, 119.
97. Kurobe, T., Kelly, G. O., & Waltzek, T. B. (2008). Revised phylogenetic relationships among herpesviruses isolated from sturgeons. *Journal of Aquatic Animal Health*, 20, 96-102.
98. Brown, J. R., Beckenbach, K., Beckenbach, A. T., & Smith, M. J. (1996). Length variation, heteroplasmy and sequence divergence in the mitochondrial DNA of four species of sturgeon (*Acipenser*). *Journal of Conservation Genetics*, 142, 525-535.
99. Buroker, N. E., Brown, J. R., Gilbert, T. A., O'Hara, P. J., Beckenbach, A. T., Thomas, W. K., & Smith, M. J. (1990). Length heteroplasmy of sturgeon mitochondrial DNA: an illegitimate elongation model. *Genetics*, 124, 157-163.
100. Carlson, D. M., Kettler, M. K., Fisher, S. E., & Whitt, G. S. (1982). Low genetic variability in paddlefish populations. *Copeia*, 3, 721-723.
101. Ludwig, A. (2006). A sturgeon view on conservation genetics. *European Journal of Wild Research*, 52, 3-8.
102. Ludwig, A., & Kirschbaum, F. (1998). Comparison of mitochondrial DNA sequences between the European and the Adriatic sturgeon. *Journal of Fisheries Biology*, 52, 1289-1291.
103. Ludwig, A., Debus, L., & Jenneckens, I. (2002). A molecular approach for trading control of black caviar. *International Review of Hydrobiology*, 87, 661-674.
104. May, B., Krueger, C. C., & Kincaid, H. L. (1997). Genetic variation at microsatellite loci in sturgeon: primer sequence homology in *Acipenser* and *Scaphirhynchus*. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 54, 1542-1547.
105. May, B., & Kuhajda, B. R. (1996). Systematics, taxonomy, and conservation status of the endangered Alabama sturgeon *Scaphirhynchus suttkusi* William and Clemmer (*Actinopterygii*, *Acipenseridae*). *Copeia*, 2, 241-275.

106. McQuown, E. C., Gall, G. A. E., & May, B. (2002). Characterization and inheritance of six microsatellite loci in lake sturgeon. *Transactions of the American Fisheries Society*, 131, 299-307.
107. McQuown, E. C., Sloss, B. L., Sheehan, R. J., Rodzen, J., Tranah, G. J., & May, B. (2000). Microsatellite analysis of genetic variation in sturgeon: new primer sequences for *Scaphirhynchus* and *Acipenser*. *Transactions of the American Fisheries Society*, 129, 1380-1388.
108. Zhang, S.-M., Deng, H., Wang, D., Zhang, Y.-P., & Wu, Q.-J. (1999). Mitochondrial DNA length variation and heteroplasmy in the Chinese sturgeon (*Acipenser sinensis*). *Acta Genetica Sinica*, 26, 18-25.
109. Tagliavini, J., Conterio, F., Gandolfi, G., & Fontana, F. (1999). Mitochondrial DNA sequences of six sturgeon species and phylogenetic relationships within *Acipenseridae*. *Journal of Applied Ichthyology*, 15, 17-22.
110. Miracle, A. L., & Campton D. E. (1995). Tandem repeat sequence variation and length heteroplasmy in the mitochondrial DNA D-loop of the threatened Gulf of Mexico sturgeon *A. oxyrinchus desotoi*. *Journal of Heredity*, 86, 22-21.
111. Doukakis, P., Birstein, V. J., Ruban, G. I., & De Salle, R. (1999). Molecular genetic analysis among subspecies of two Eurasian sturgeon species, *Acipenser baerii* and *A. stellatus*. *Molecular Ecology Resources*, 12, 117-127.
112. Walsh, M. G., Bain, M. B., Squiers, T., Waldman, J. R., & Wirgin, I. (2001). Morphological and genetic variation among shortnose sturgeon *Acipenser brevirostrum* from Adjacent and Distant Rivers. *Estuaries*, 24, 41-48.
113. Billard, R., Cosson, J., Fierville F., Brun, R., Rouault, T., & Williot, P. (1999). Motility analysis and energetics of the Siberian sturgeon *Asipenser baeri* spermatozoa. *Journal of Applied Ichthyology*, 15, 199-203.
114. Jahnichen, M., Warnecre, D., Trolsch, E., Kohlmann, K., Bergler, H., & Pluta, H. J. (1999). Motility and fertilizing capability of cryopreserved *Acipenser ruthenus* L. sperm. *Journal of Applied Ichthyology*, 15, 204-206.
115. Ludwig, A., Congiu, L., Pitra, C., Fickel, J., Gessner, J., Fontana, F., Patarnello, T., & Zane, L. (2003). Nonconcordant evolutionary history of maternal and paternal lineages in Adriatic sturgeon. *Molecular Ecology*, 12, 3253-3264.
116. Toth, G. P., Ciereszko, A., Christ, S. A., & Dobrowski, K. (1994). Objective analysis of sperm motility in the lake sturgeon (*A. fulvescens*): activation and inhibition conditions. *Aquaculture*, 154, 337-348.
117. La Patra, S. E., Groff, J. M., Jones, G. R., Munn, B., Patterson, T. L., Holt, R. A., Hauck, A. K., & Hedrick, R. P. (1994). Occurrence of white sturgeon iridovirus infections among cultured white sturgeon in the Pacific Northwest. *Aquaculture*, 126, 201-210.
118. Mojazi Amiri, B., Maebayashi, M., Hara, A., Adachi, S., & Yamauchi, K. (1996). Ovarian development and serum sex steroid and vitellogenin profiles in the female cultured sturgeon hybrid, the bester. *Journal of Fish Biology*, 47, 1164-1178.
119. Kynard, B., Zhuang, P., Zhang, L., Zhang, T., & Zhang, Z. (2002). Ontogenetic behavior and migration of Volga river Russian Sturgeon, *Acipenser gueldenstaedtii*, with a note on adaptive significance of body color. *Environmental Biology of Fish*, 65, 411-421.
120. Phelps, S. R., & Allendorf, F. W. (1983). Genetic identity of pallid and shovelnose sturgeon (*Scaphirhynchus albus* and *S. platyrhynchus*). *Copeia*, 3, 696-700.

121. Birstein, V.J., Doukakis, P., Sorkin, B., & DeSalle, R. (1998). Population aggregation analysis of three caviar-producing species of sturgeons and implications for the species identification of black caviar. *Journal of Conservation Biology*, 12, 766-775.
122. Smith, C. T., Nelson, R. J., Pollard, S., Rubidge, E., Mc Kay, S. J., Rodzen, J., May B., & Koop, B. (2002). Population genetic analysis of white sturgeon (*Acipenser fulvescens*) in the Fraser River. *Journal of Applied Ichthyology*, 18, 307-312.
123. Zhang, S.-M., Deng, H., Yang, Y., & Wu, Q.-J. (2000). Population genetic structure and genetic diversity of the Chinese sturgeon (*Acipenser sinensis*) based on random amplified polymorphic DNA analysis. *Chinese Journal of Oceanology and Limnology*, 31, 1-7.
124. Grunwald, G., Stabile, J., Waldman, J. R., Gross, R., & Wirgin, I. (2002). Population genetics of shortnose sturgeon *Acipenser brevirostrum* based on mitochondrial DNA control region sequences. *Molecular Ecology Resources*, 11, 1885-1898.
125. Pourkazemi, M., Skibinski, D. O. F., & Beardmore, J. A. (1999). Application of mtDNA d-loop region for the study of Russian sturgeon population structure from Iranian coastline of the Caspian Sea. *Journal of Applied Ichthyology*, 15, 23-28.
126. Tranah, G. J., Kincaid, H. L., Krueger, C. C., Campton, D. E. & May, B. (2001). Reproductive isolation in sympatric populations of pallid and shovelnose sturgeon. *North American Journal of Fisheries Management*, 21, 367-373.
127. Richmond, A. M., & Kynard, B. (1995). Ontogenic Behaviour of Shortnose Sturgeon, *Acipenser brevirostrum*. *Copeia*, 41, 172-182.
128. Robinson, M. R., & Ferguson, M. M. (2004). Genetics of North American *Acipenseriformes*. *Sturgeons and Paddlefishes of North America*. Le Breton, G. T. O., William, F., Beamish, H., McKinley, R. S. (Eds.). Netherlands: Springer, 217-230.
129. Rodzen, J. A., & May, B. (2002). Inheritance of microsatellite loci in the white sturgeon (*Acipenser transmontanus*). *Genome*, 45, 1064-1076.
130. Rodzen, J. A., Famula, T. R., & May, B. (2004). Estimation of parentage and relatedness in the polyploid white sturgeon (*Acipenser transmontanus*) using a dominant marker approach for duplicated microsatellite loci. *Aquaculture*, 232, 165-182.
131. Serfling, S. A., & Hamlin, H. (2001). Culture of beluga-hybrid "bester" sturgeon (*H. huso* x *A. ruthenus*) in closed-cycle culture systems in Florida. *4th Int. Simp. on Sturgeon: Abstr. Bull.*, AQ 51.
132. Arlati, G., Hernando, J. A., Poliakova-Belysceva, A., & Soriguer, M. C. (1999). Some meristic characteristics of hybrids between *Acipenser naccarii* and *Acipenser baeri*. *Journal of Applied Ichthyology*, 15, 54-56.
133. Di Lauro, M. N., Walsh, R. A., Peiffer, M., & Bennet, R. M. (2001). Sperm-cell ultrastructure of North American sturgeons. V. The pallid sturgeon (*Scaphirhynchus albus* Richardson, 1905). *Canadian Journal of Zoology*, 79, 802-808.
134. Alavi, S. M., Cosson, J., Karami, M., Amiri, B. M., & Akhoundzadeh, M. A. (2004). Spermatozoa motility in the Persian sturgeon (*Acipenser persicus*): effects of pH, dilution rate, ions and osmolality. *Reproduction*, 128, 819-828.

135. Stabile, J., Waldman, J. R., Parauka, F., & Wirgin, I. (1996). Stock structure and homing fidelity in Gulf of Mexico sturgeon (*Acipenser oxyrinchus desotoi*) based on restriction fragment length polymorphism and sequence analyses of mitochondrial DNA. *Genetics*, 144, 767-775.
136. Straughan, D. J., Burnham-Curtis, M. E., & Fain, S. R. (2002). Experimental search for forensically useful markers in the genus *Scaphirhynchus*. *Journal of Applied Ichthyology*, 18, 621-628.
137. Mojazi Amiri, B., Maebayashi, M., Adachi, S., & Yamauchi, K. (1996). Testicular development and serum sex steroid profiles during the annual sexual cycle of the male sturgeon hybrid, the bester. *Journal of Fish Biology*, 48, 1039-1050.
138. Krieger, J., Hett, A. K., Fuerst, P. A., Artyukhin, E. N., & Ludwig, A. (2008). The molecular phylogeny of the order *Acipenseriformes* revisited. *Journal of Applied Ichthyology*, 24, 36-45.
139. Zhang, S.-M., Yang, Y., Deng, H., Wei, Q.-W., & Wu, Q.-J. (1999). The preliminary evidence for low genetic diversity in the Chinese sturgeon (*Acipenser sinensis*) revealed by protein electrophoresis. *Zoological Research*, 20, 93-98.
140. Congiu, L., Fontana, F., Patarnello, T., Rossi, R., & Zane, L. (2002). The use of AFLP in sturgeon identification. *Journal of Applied Ichthyology*, 18, 286-289.
141. Tranah, G. J., Campton, D. E., & May, B. (2004). Genetic evidence for hybridization of pallid and shovelnose sturgeon. *Journal of Heredity*, 95, 474-480.
142. Hedrick, R. P., McDowell, T. S., Rosemark, R., Aronstein, D., & Lannan, C. N. (1991). Two cell lines from white sturgeon. *Transactions of the American Fisheries Society*, 120, 528-534.
143. Krieger, J., Hett, A. K., Fuerst, P. A., Birstein, V. J., & Ludwig, A. (2006). Unusual intraindividual variation of the nuclear 18S rRNA gene is widespread within the *Acipenseridae*. *Journal of Heredity*, 97, 218-225.
144. Comincini, S., Lanfredi, M., Rossi, R., Fontana, F. (1998). Use of RAPD markers to determine the genetic relationships among sturgeons (*Acipenseridae*, *Pisces*). *Fisheries Science*, 64, 35-38.
145. Van Eenennaam, A. L., Murray, J. D., & Medrano, J. F. (1999). Karyotype of the American green sturgeon. *Transactions of the American Fisheries Society*, 128, 175-177.
146. Van Eenennaam, A. L., Murray, J. D., & Medrano, J. F. (1998). Synaptonemal complex analysis in spermatocytes of white sturgeon, *Acipenser transmontanus* Richardson (*Pisces*, *Acipenseridae*), a fish with a very high chromosome number. *Genome*, 41, 51-61.
147. Urquhart, A., Kimpton, C. P., Downes, T. J., & Gill, P. (1994). Variation in short tandem repeat sequences — a survey of twelve microsatellite loci for use as forensic identification markers. *International Journal of Legal Medicine*, 107, 13-20.
148. Vasil'ev, V. P. (2009). Mechanisms of Polyploid Evolution in Fish: Polyploidy in Sturgeons. *Biology, Conservation and Sustainable Development of Sturgeons*. Netherlands: Springer Science + Business Media, 97-117.
149. Waldman, J. R., Hart, J. T., & Wirgin, I. I. (1996). Stock composition of the New York Bight Atlantic sturgeon fishery based on analysis of mitochondrial DNA. *Transactions of the American Fisheries Society*, 125, 364-371.
150. Watson, L. R., Groff, J. M., & Hedrick, R. P. (1998). Replication and pathogenesis of white sturgeon iridovirus (WSIV) in experimentally infected white sturgeon

- Acipenser transmontanus* juveniles and sturgeon cell lines. *Diseases of Aquatic Organisms*, 32, 173-184.
151. Welsh, A. B., Blumberg M., & May B. (2003). Identification of microsatellite loci in lake sturgeon *Acipenser fulvescens*, and their variability in green sturgeon *A. medirostris*. *Molecular Ecology Resources*, 3, 47-55.
152. Welsh, A. B., & May, B. (2006). Development and standartization of disomic microsatellite markers for lake sturgeon genetic studies. *Journal of Applied Ichthyology*, 22, 337-344.
153. Wirgin, I., Stabile, J. E., & Waldman, J. R. (1997). Molecular analysis in the conservation of sturgeons and paddlefish. *Environmental Biology of Fishes*, 48, 385-398.
154. Wolf, C., Hübner, P., & Lüthy, J. (1999). Differentiation of sturgeon species by PCR-RFLP. *Food Res. Int.*, 32, 699-705.
155. Zhang, S.-M., Wang, D.-Q., & Zhang, Y.-P. (2003). Mitochondrial DNA variation, effective female population size and population history of the endangered Chinese sturgeon, *Acipenser sinensis*. *Journal of Conservation Genetics*, 4, 673-683.
156. Zhang, S.-M., Wu, Q.-J., & Zhang, Y.-P. (2001). On the taxonomic status of the Yangtze sturgeon, Asian and American green sturgeons inferred from mitochondrial control region sequences. *Current Zoology*, 47, 632-639.

ЮВІЛЕЇ

ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-БІОЛОГ. ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ БУЧАЦЬКОГО ЛЕОНІДА ПЕТРОВИЧА

Бучацький Л. П. — доктор біологічних наук, професор, академік АН ВШ України, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (1988 р.). Видатний фахівець з питань біотехнологій, вірусології та генетики. Співзасновник вчення про квантову генетику. З 2002 по 2013 рр. — завідувач лабораторії біотехнології Інституту рибного господарства НААН, зараз — провідний науковий співробітник цієї лабораторії.

Народився 26 листопада 1943 р. у с. Свірневе на Кропивниччині. Трудову діяльність розпочав з 1960 р., після закінчення школи; два роки працював рентгенотехніком у лікарні смт Побузьке Голованіського району (Кропивниччина).

Після проходження військової служби закінчив біологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 1968 р., після закінчення навчання в університеті, вступив до аспірантури на недавно організовану кафедру вірусології цього ж ВЗО. Проходив стажування у відділі структури білків Інституту кристалографії РАН (м. Москва), в Інституті вірусології імені Д. Й. Івановського АМН (м. Москва), у Московському державному університеті імені М. Ломоносова, в Інституті епідеміології і мікробіології імені М. Ф. Гамалії АМН (м. Москва).

Кандидатську дисертацію «Вплив вірусу грипу на деякі енергетичні та ферментативні процеси в клітині» захистив у 1972 р. Докторську дисертацію «Біологічні властивості ДНК-вмісних вірусів кровосисних комарів» захистив у 1989 р. у Всесоюзному Інституті ветеринарної вірусології і мікробіології (Росія).

Основні наукові праці Леоніда Петровича у 1970-80-х роках були спрямовані на вивчення біологічних властивостей вірусів, патогенних для кровосисних комарів (переносників збудників хвороб людей і тварин) з метою розроблення ефективних засобів захисту цивільного населення і військ від зброї масового ураження (всесоюзна програма ЗОМП). У ці роки Бучацький Л. П. досліджував, відкритий у Київському університеті новий для науки парвовірус — вірус денсонуклеозу кровосисних комарів, на основі якого за рішенням Міжнародного комітету з таксономії і класифікації вірусів згодом був утворений новий рід вірусів. За керівництва Бучацького Л. П. був створений біологічний інсектицид «Віроден», який здатний ефективно зменшувати чисельність переносників.

Під час пошукових експедицій на території України, Росії, Казахстану та Молдови Бучацьким Л. П. вперше були виявлені та вивчені такі віруси, як вірус цитоплазматичного поліедрозу, вірус віспи та іридовірус кровосисних комарів. В ці роки Бучацький Л. П. проводив також дослідження іридовірусу риби, біологічні властивості якого виявилися близькими до іридовірусу комарів. На основі порівняльного аналізу ним розроблена концепція гідробіотичних осередків інфекційних хвороб тварин та людей.

Багато уваги Бучацький Л. П. надає вивченню злоякісних пухлин безхребетних та риби. Ним описані меланотичні пухлини комарів, лімфосаркоматоз щук та судаків, карцинома ляща та піленгаса, а також інші неоплазми риби дніпровських водосховищ та Азовського моря. Разом зі співробітниками Інституту рибного господарства ним вперше виявлені на території України такі віруси риби як вірус лімфосаркоматозу, вірус герпесу третього типу (вірус кої) та вірус інфекційного панкреатичного некрозу.

З моменту створення (1994 р.) по даний час він очолює міжвідомчу групу експертів з екологічної експертизи пестицидів та отрутохімікатів Міністерства екології та природних ресурсів України, є членом науково-експертної ради цього Міністерства, членом спеціалізованих рад з питань захисту кандидатських та докторських дисертацій; членом редколегій журналів «*Biotechnologica acta*», «Тваринництво України», «Рибогосподарська наука України», «Ветеринарія сьогодні», членом-кореспондентом Міжнародної академії інформатизації, академік Екологічної академії наук України та Російської академії природничих наук (РАЕН), президентом Асоціації іхтіопатологів України, Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (1988 р.).

В 1993–1995 рр. був іноземним консультантом Департаменту сільського господарства США, нагороджений відзнакою Агентства охорони навколишнього середовища (США). Бучацький Л. П. був керівником грантів на замовлення МО СРСР, ВООЗ, SRDF, УНТЦ, Національного Інституту здоров'я (США). За його керівництва захищено вісім кандидатських та три докторські дисертації. Загальна кількість його публікацій перевищує 400, в тому числі 2 навчальні посібники та 8 монографій, зокрема: «Кріоконсервація статевих клітин тварин», «Молекулярна біологія парвовірусів», «Віруси морських та прісноводних тварин», «Іридовіруси», «Пухлини риби водойм України», а також «Квантова генетика» та «Алгебра молекул живої природи», які були перевидані у США.

Нині Бучацький Л. П. плідно працює над впровадженням сучасних біотехнологій в рибництво. Він має 16 патентів та авторських свідоцтв. За вагомий внесок в розвиток аграрної науки нагороджений відзнакою Президії НААН, відзнакою Агенства охорони навколишнього середовища (США). Крім того, він є також лауреатом нагороди Ярослава Мудрого Президії Академії наук вищої школи України.

Колектив Інституту рибного господарства НААН бажає ювіляру міцного здоров'я, щастя, добра та подальших успіхів у роботі.

*Грициняк І. І., директор Інституту рибного господарства
НААН, доктор с.-г. наук, академік НААН, професор*

Олексієнко О. О., канд. с.-г. наук, с.н.с.

ДО 80-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДУМІК ОЛЬГИ МИХАЙЛІВНИ

30 грудня 2018 року свій 80-річний ювілей відзначає Ольга Михайлівна Думік — бібліотечний фахівець вищої кваліфікації, що понад 50 років свого життя присвятила бібліотечній справі, впродовж близько 40 з яких — очолюючи наукову бібліотеку Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України.

Народилася Ольга Михайлівна в м. Києві. Юною школяркою завітала вона до Київської обласної бібліотеки для дітей ім. О. Бойченка, і ця подія стала визначальною у виборі майбутньої професії.

З 1953 по 1956 роки О. М. Думік навчалась у Київському технікумі підготовки культпрацівників освіти, закінчивши його з відзнакою; з 1956 по 1960 рр. була студенткою Ленінградського державного бібліотечного інституту ім. Н. К. Крупської, що нині носить назву Санкт-Петербурзької державної академії культури, після закінчення отримавши спеціальність бібліотекар-бібліографа вищої кваліфікації.

Свою трудову діяльність О. М. Думік розпочала з 1960 р. у науковій бібліотеці Інституту органічної хімії Академії наук України. У 1965 р. взяла участь у заснуванні бібліотеки наукового відділення щойно створеного Інституту нафтодобування (УкрНДІПНД). З 1971 і по 2013 рр. О. М. Думік очолювала наукову бібліотеку Інституту рибного господарства НААН (за винятком терміну відраджень до м. Женеви, де вона працювала на громадських засадах у бібліотеці представництва СРСР при європейському відділенні ООН з 1973 по 1979 рр.).

Високий професіоналізм, активність, сумлінність, невтомне прагнення до досконалості, значний практичний досвід, ґрунтовні знання з галузевих питань, освіченість, ерудованість, надзвичайно високий культурний рівень та безцінне вміння орієнтуватися у інформаційному просторі, відчуваючи сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи, притаманні Ользі Михайлівні, стали запорукою високої ефективності функціонування бібліотеки впродовж часу перебування Ольги Михайлівни на посаді. Своєю багаторічною відданою працею вона значно сприяла збагаченню наукових знань з рибної галузі усіх користувачів бібліотеки, здійснювала інформаційно-бібліографічний і бібліотечний супровід наукових досліджень Інституту на надзвичайно якісному рівні. Завдяки відповідальному ставленню Ольги Михайлівни до комплектування бібліотечного фонду він постійно поповнювався новими цінними науковими виданнями з питань рибного господарства, іхтіології, гідробіології та суміжних дисциплін, що зробило бібліотечне зібрання Інституту унікальним у галузі.

Органічно поєднуючи у собі відданість своїй справі з чуйністю та доброзичливістю, Ольга Михайлівна користується незмінним авторитетом і глибокою повагою співробітників. Усе життя О. М. Думік є прикладом служіння професії бібліотекаря. За багаторічну сумлінну працю їй було нагороджено медалями «За доблесну працю», «Ветеран праці», «До 1500-річчя Києва», багаторазово відмічено подяками, грамотами і почесними грамотами, а у 2008 р. — відзнакою «Ветеран рибного господарства».

Вітаючи з ювілеєм, колектив Інституту рибного господарства НААН зичить Ользі Михайлівні міцного здоров'я, довгих та щасливих літ! Нехай у домі панують затишок і достаток, у душі квітне радість, а кожен день життя щедро наповнюється любов'ю й увагою близьких, натхненням та новими приводами для щирих посмішок!

З роси і води на многії, многії літа!

*Грициняк І. І., директор Інституту рибного господарства НААН,
доктор с.-г. наук, академік НААН, професор*

TAPAS – міжнародний дослідницький проект

Пропонуємо ознайомитись та долучитись до TAPAS (Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability), що діє в межах програми Horizon 2020, з 2016 року. Його мета — консолідація стабільності європейської аквакультури шляхом розробки спеціальних підходів та умов, на основі всебічного аналізу всіх форм та типів ведення аквакультури, включно з марикультурою. Ключовою сферою діяльності є виявлення нормативних потреб існуючих й новітніх практик аквакультури. Більше інформації можна отримати відвідавши **сайт**: www.tapas-H2020.eu.

Координатор проекту: Trevor Telfer, University of Stirling.

ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ РИБ

В Інституті рибного господарства НААН працює ПЛР-лабораторія, діяльність якої спрямована на діагностику інфекційних захворювань риб. На сьогодні в арсеналі лабораторії є діагностикими для вірусних, бактеріальних та паразитарних захворювань, які, за даними Міжнародного Епізоотичного Бюро (OIE), є найбільш небезпечними для об'єктів сучасної аквакультури. При розробленні діагностичних тест-систем зверталась увага на тенденції розвитку вітчизняного рибництва та інфекційні агенти, які циркулюють в Україні або можуть проникнути у вітчизняні рибогосподарські підприємства із сусідніх країн.

Ми пропонуємо молекулярну діагностику вірусних захворювань коропових, лососевих, осетрових та інших видів риб.

Лососеві: вірус інфекційного панкреатичного некрозу IPNV; вірусна геморагічна септицемія VHSV; вірус інфекційного гемопоетичного некрозу IHNV.

Коропові: вірус весняної віремії SVCV; герпесвірус CyHV та KHV.

Осетрові: герпесвірус AcHV; іридовірус AcIV; аденовірус AcAdV.

Іctalурові: герпесвірус каналного сома CCV.

Для бактеріальних хвороб риб підібрані тест-системи для діагностики фурункульозу форелі (*Aeromonas salmonicida*), геморагічної септицемії (*Aeromonas hydrophila*), хвороби нирок лососевих (BKD) (*Renibacterium salmoninarum*), ентеричної хвороби «червоного рота» (*Yersinia ruckeri*), флавобактеріозу (*Flavobacterium columnare* і *Flavobacterium psychrophila* (BCWD) та септицемії сома (*Edwardsiella ictaluri*).

Присутні також тест-системи ідентифікації ендопаразитів *Tetracapsuloides bryosalmonae* (проліферативна хвороба нирок) та *Myxobolus cerebralis*, що інфікують райдужну форель.

Для отримання додаткової інформації можна звертатися за адресою:

Інститут рибного господарства НААН, вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164.
Лабораторія біотехнологій у рибництві.

Завідувач лабораторії: к.б.н., с.н.с. Рудь Юрій Петрович.

Тел. (097) 953-80-80 або e-mail: rudziknew@ukr.net.

FISHERIES SCIENCE OF UKRAINE

"Fisheries Science of Ukraine" — a scientific journal, has been published in Ukraine since 2007. "Fisheries Science of Ukraine" included in the List of Specialized Publications of Ukraine, which can be used for publishing results of doctor's and candidate's thesis (biological and agricultural sciences), was approved in 08.07.2009, recertification of 06.11.2014 (Ministry of Education and Science of Ukraine №1279)

Founder and publisher of the journal — Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

State registration certificate KB № 20934-10734 PR of 18.08.2014

EDITOR-IN-CHIEF

Leonid Buchatskyi, Doctor of Sciences, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Leading Research Scientist of the Laboratory of Biotechnologies in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF

Ihor Hrytsyniak, Doctor of Sciences, Professor, Academician of the NAAS of Ukraine, Director, Institute of Fisheries of the NAAS
Natalia Kolesnyk, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of International Scientific and Technical Cooperation and Intellectual Property, Institute of Fisheries of the NAAS

EDITORIAL BOARD

BIOLOGICAL SCIENCES

Boris Gomelsky, Doctor of Biological Sciences, Professor, Kentucky State University, UNITED STATES OF AMERICA

Daniel Patrick, Doctor of Biological Sciences, Head of Biology Department Laboratories of the Pyrenees and Landes, FRENCH REPUBLIC

Gautam V. Zodape, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Zoology of Shivaji University Kolhapur, REPUBLIC OF INDIA

Ihor Buzevych, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Vasyl Sondak, Doctor of Sciences, Head of "Water Bioresources", National University of Water Management and Natural Resources, UKRAINE

Yuriy Rud', PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Bio-technology in Aquaculture of the Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Oleksandr Potrokhov, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Biology of reproduction of fish, Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, UKRAINE

Oleksandr Tretiak, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Deputy Director in scientific works, Institute of Fisheries of the NAAS

Valentyna Solomatina, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Leading research scientist of the department of feeds and fish feeding, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

AGRICULTURAL SCIENCES

XU Pao, Doctor, Professor, Director of Freshwater Fisheries Research Center, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Jedrzep Krupinski, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director, National Research Institute of Animal Production, POLAND

Mykhailo Efymenko, Doctor of Sciences, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head Research Scientist, Institute of Animal Breeding and Genetics of the NAAS, UKRAINE

Serhiy Tarasiuk, Doctor of Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head of the Molecular-Genetic Research Department, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Vitaliy Bekh, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Fish Selection, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Isaak Sherman, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Aquaculture Department, Kherson State Agrarian University, UKRAINE

Natalia Matvienko, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Ichthyopathology of the Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Oleksandr Kostenko, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Veterinary Medicine and Zootechnics Department, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, UKRAINE

SCIENTIFIC EDITORS OF SECTIONS

are staff employees of the Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine: **Natalia Tushnytska**, PhD, Senior Research Scientist, Scientific Secretary of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Deren**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Feeds and Fish Feeding of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yaroslav Tuchapskyi**, PhD, Head of the Carp Breeding Laboratory of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Zaloilo**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Molecular-Genetic Studies of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Zabytivskyi**, PhD, Senior Research Scientist of Section of Sturgeon of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Antonina Mruk**, Head of the Laboratory Salmonids Culture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Tetiana Hryhorenko**, PhD, Head of the Laboratory of Hydrobiology and Technology of Invertebrates Cultivation of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Oleksandr Didenko**, PhD, Senior Research Scientist of the Department of Study Reservoirs Bioresources of the Institute of Fisheries of the NAAS.

Editorial board of the Journal "Fisheries Science of Ukraine", Institute of Fisheries NAAS, 135, Obukhivska St, Kiev-164, Ukraine, 03164; tel.: +38 (044) 223-84-34; tel/fax: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Layout design: Natalia Kolesnik, Serhiy Shinkar, Yevheniy Arkhanhelskyi, Oleksandr Bezusyi; **Making-up:** Yevheniy Arkhanhelskyi, Maria Simon; **Literature editing:** Tetiana Shvets; **Corrector:** Hanna Kovalchuk

ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НААН
вул. Обухівська, 135 м. Київ-164, 03164, Україна
тел./факс: +38(044) 423-74-62, тел.: +38(044) 423-74-65

<http://fsu.ua>

info@fsu.ua