ISSN 2312-9581 (Online)

ISSN 2075-1508 (Print)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

2/2019

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські науки), переатестація від 06.11.2014 (наказ Міністерства освіти і науки України №1279)

Засновник та видавник — Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20934-10734 ПР від 18.08.2014

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

БУЧАЦЬКИЙ Леонід Петрович, доктор біол. наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), провідний науковий співробітник лабораторії біотехнологій в рибориборстві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ГРИЦІНЯК Ігор Іванович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, директор Інституту рибного господарства НААН
КОЛЕСНИК Наталія Леонідівна, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності, Інститут рибного господарства НААН

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Гомельський Борис, доктор біол. наук, професор, Державний Університет Кентуккі, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Третяк Олександр Михайлович, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН
Патрік Даніель, доктор біол. наук, Голова департаменту біології Лабораторії Піренеїв, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА
Бузевич Ігор Юрійович, доктор біол. наук, с.н.с., завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, Україна
Зодапе Гаутам В., доктор біол. наук, професор, декан факультету зоології Державного Університету Шиваджи в Колхатурі, РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ
Діденко Олександр Володимирович, канд. біол. наук, с.н.с., старший науковий співробітник відділу вивчення біоресурсів водосховищ, УКРАЇНА
Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, зав. кафедрою водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА
Рудь Юрій Петрович, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії біотехнологій в рибориборстві ІРГ НААН, УКРАЇНА
Потрохов Олександр Спиридонович, доктор біол. наук, с.н.с., керівник лабораторії біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, УКРАЇНА
Соломатина Валентина Дмитрівна, доктор біол. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник відділу кормів та годівлі риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Ху Пао, доктор наук, професор, директор Центру прісноводного рибного господарства, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
Матвієнко Наталія Миколаївна, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу іхтіопатології ІРГ НААН, УКРАЇНА
Крупінські Єджей, доктор наук, професор, іноземний член Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут зоотехнії Польщі, ПОЛЬЩА
Тарасюк Сергій Іванович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, зав. відділу молекулярно-генетичних досліджень, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА
Бех Віталій Валерійович, доктор с.-г. наук, професор, зав. відділу селекції риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА
Шерман Ісаак Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедри рибориборства, Херсонський державний аграрний університет, Україна
Костенко Олександр Іванович, канд. с.-г. наук, с.н.с., нач. відділу ветеринарної медицини та зоотехнії, Національна академія аграрних наук України, Україна

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

є штатними працівниками Інституту рибного господарства НААН України: **Тушницька Наталія Йосифівна**, канд. ветерин. наук, с.н.с., вчений секретар ІРГ НААН; **Драган Людмила Петрівна**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії екологічних досліджень; **Тучапський Ярослав Васильович**, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу селекції риб ІРГ НААН; **Залозіло Ольга Василівна**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ІРГ НААН; **Забитівський Юрій Михайлович**, канд. біол. наук, старший науковий співробітник сектору осетрівництва ІРГ НААН; **Мрук Антоніна Іванівна**, зав. лабораторії лососівництва ІРГ НААН; **Григоренко Тетяна Володимирівна**, канд. с.-г. наук, зав. лабораторії гідробіології та технологій культивування цінних безхребетних ІРГ НААН;

Редакція журналу «Рибогосподарська наука України», вул. Обухівська, 135, м. Київ-164, 03164

тел.: +38 (044) 223-84-34, тел./факс: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Підписано до друку 17.12.2018 р. Формат 70х108/16. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 7,1. Наклад 500 прим.

Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту рибного господарства НААН

(Протокол № 4 від 05.06.2019 р.)

Дизайн макету: Колесник Н. Л., Шинкар С. В., Архангельський Є. Ю., Безусий О. Л. **Верстка:** Архангельський Є. Ю., Симон М. Ю. **Літературне редагування:** Швець Т. М. **Коректор:** Ковальчук Г. В.

Друкарня ТОВ «ПРО ФОРМАТ», 02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 45 Б, оф.16, тел.: +38(044) 353-85-58

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

2/2019(48)

Заснований у 2007 р.
Виходить 4 рази на рік

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 1-128
DOI: 10.15407/fsu2019.02

З М І С Т

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 5-20
DOI: 10.15407/fsu2019.02.005

Ю. А. Глєбова, О. В. Шкарупа

Динаміка розвитку рибного господарства України у 2016–2018 роках..... 5

БЮРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 21-41
DOI: 10.15407/fsu2019.02.021

О. В. Федоненко, Ю. В. Ніколенко

Характеристика фітопланктону Запорізького водосховища за період існування (огляд)..... 21

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 42-51
DOI: 10.15407/fsu2019.02.042

О. О. Батуревич

Вплив мінералу бентоніт на хімічний склад м'язів коропа (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) 42

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 52-66
DOI: 10.15407/fsu2019.02.052

М. В. Причєна

Вплив антропогенного забруднення водойм на морфо-фізіологічні та біохімічні показники окуня (*Perca fluviatilis* Linnaeus, 1758) в різні сезони року 52

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 67-78
DOI: 10.15407/fsu2019.02.067

М. Ю. Симон, Ю. М. Забитівський, І. І. Грициняк, Л. П. Драган

Морфологічні параметри травної системи молоді російського осетра (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt & Ratzeburg, 1833) за дії пекарських дріжджів, згодовуваних з основним кормом 67

© Інститут рибного господарства НААН України, 2019

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 79-107

DOI: 10.15407/fsu2019.02.079

Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон

Вплив важких металів на прісноводні екосистеми. Тематична
англомовна бібліографія 79

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 108-127

DOI: 10.15407/fsu2019.02.108

І. Й. Грициняк, Т. М. Швець

Методи гідробіологічних досліджень. Тематична бібліографія 108

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 5-20
DOI: 10.15407/fsu2019.02.005

Ю. А. Глебова, О. В. Шкарупа

Динамика развития рыбного хозяйства Украины в 2016–2018 годах..... 5

БИОРЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ ВОДОЕМОВ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 21-41
DOI: 10.15407/fsu2019.02.021

Е. В. Федоненко, Ю. В. Николенко

Характеристика фитопланктона Запорожского водохранилища за период существования (обзор)..... 21

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 42-51
DOI: 10.15407/fsu2019.02.042

О. А. Батуревич

Влияние минерала бентонит на химический состав мышц карпа (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758)..... 42

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 52-66
DOI: 10.15407/fsu2019.02.052

М. В. Причепя

Влияние антропогенного загрязнения водоема на морфо-физиологические и биохимические показатели окуня (*Perca fluviatilis* Linnaeus, 1758) в разные сезоны года 52

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 67-78
DOI: 10.15407/fsu2019.02.067

М. Ю. Симон, Ю. М. Забытиевский, И. И. Грициняк, Л. П. Драган

Морфологические параметры пищеварительной системы молоди русского осетра (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt & Ratzeburg, 1833) при воздействии пекарских дрожжей, скормливаемых с основным кормом 67

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 79-107
DOI: 10.15407/fsu2019.02.079

Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон

Влияние тяжелых металлов на пресноводные экосистемы. Тематическая англоязычная библиография 79

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 108-127
DOI: 10.15407/fsu2019.02.108

Ир. И. Грициняк, Т. М. Швец

Методы гидробиологических исследований. Тематическая библиография..... 108

CONTENTS

ACTUAL PROBLEMS AND PROSPECTS

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 5-20
DOI: 10.15407/fsu2019.02.005

Yu. Glebova, O. Shkarupa

Dynamics of the development of fisheries industry in Ukraine in 2016-2018..... 5

BIORESOURCES AND ECOLOGY OF WATER BODIES

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 21-41
DOI: 10.15407/fsu2019.02.021

O. Fedonenko, Yu. Nikolenko

Characteristics of phytoplankton in the Zaporizhzhia reservoir for the period of its existence (review)..... 21

FEEDS AND FEEDING

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 42-51
DOI: 10.15407/fsu2019.02.042

O. Baturevich

Effect of mineral betonit on chemical composition of carp (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) muscles 42

PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 52-66
DOI: 10.15407/fsu2019.02.052

M. Prychepa

Effect of antropogenic pollution of waterbodies on morpho-physiological and biochemical parameters of *Perca fluviatilis* Linnaeus, 1758 in different seasons of the year 52

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 67-78
DOI: 10.15407/fsu2019.02.067

M. Simon, Yu. Zabytivskyi, I. Hrytsyniak, L. Dragan

Morphological parameters of the digestive system of Russian sturgeon (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt & Ratzeburg, 1833) fry under exposure to dry baker's yeasts as an additive to the basic feed..... 67

CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 79-107
DOI: 10.15407/fsu2019.02.079

N. Kolesnyk, M. Simon

Impact of heavy metals on freshwater ecosystems. Thematic English language bibliography..... 79

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 108-127
DOI: 10.15407/fsu2019.02.108

Ir. Hrytsyniak, T. Shvets

Methods of hydrobiological research. Thematic bibliography 108

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 5-20

DOI: 10.15407/fsu2019.02.005

УДК 639.2/.3 (477)

Received 11.02.2019

Received in revised form 16.03.2019

Accepted 25.04.2019

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ У 2016–2018 РОКАХ

Ю. А. Глебова, ya_glebova@ukr.net, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

О. В. Шкарупа, knorush@ukr.net, Державне агентство рибного господарства, м. Київ

Мета. Відповідно до останніх статистичних досліджень, у світі в цілому та в Україні зокрема спостерігається тенденція до збільшення споживання продукції рибного господарства. Метою роботи є проаналізувати динаміку розвитку рибного господарства України у 2016–2018 рр., спираючись на узагальнені показники діяльності суб'єктів різних форм власності.

Методика. Основу дослідження становили наукові, статистичні та звітні дані стосовно показників розвитку рибного господарства України, а саме — виконання державної політики у сфері рибного господарства та промисловості, вилов риби й інших водних біоресурсів, відтворення гідробіонтів, виробництва товарно-харчової рибної продукції, стану економіки рибної галузі України, а також міжнародного співробітництва з питань аквакультури. Крім того, були використані законодавство України, постанови Кабінету Міністрів, постанови Міністерства аграрної політики та продовольства України. Автори застосовували методи ретроспективного аналізу та моніторингу інформаційних даних результатів діяльності в цій галузі народного господарства. Порівняльний та статистичний аналіз вилову водних живих біоресурсів у 2016–2018 рр. був проведений згідно із загальноприйнятими методиками.

Результати. У роботі наведено узагальнені дані стосовно розвитку рибної галузі України, розглянуто його актуальні проблеми та перспективи. Наприклад, завдяки поступовому втіленню в життя реформ у рибній галузі в 2017 р. загальний улов риби та інших водних біоресурсів становив 94,2 тис. т, що на 6,6% більше, ніж у 2016 р. В тому ж 2017 р. на державних риборозплідних господарствах було отримано 12,2 млн особин цінних видів риб, що становить 114,6% від державної норми з їх відтворення на рік. У 2018 р. загальний вилов водних біоресурсів у Чорному морі, в порівнянні з 2017 р. зріс на 3,3 тис. т, склавши 8,6 тис. т. Обсяг вилову в причорноморських лиманах становить 481 т, що перевищує минулорічний показник на 338,8 т. Отже, загалом спостерігається позитивна динаміка розвитку рибного господарства України.

Наукова новизна. Представлено аналітичний моніторинг результатів зміни підходів до організації діяльності різних суб'єктів рибного господарства у 2016–2018 рр., досягнутих, насамперед, внаслідок поступового запровадження реформ. Враховано істотні технологічні, економічні, організаційні й нормативно-правові особливості господарств різних форм власності та типів ведення рибництва. Узагальнено інформацію про динаміку розвитку рибної галузі України та послідовно викладено основні дані щодо відомостей стосовно сучасного стану рибогосподарського комплексу України, з урахуванням міжнародних відносин.

© Ю. А. Глебова, О. В. Шкарупа, 2019

Практичне значення. Матеріали статті стануть у пригоді в роботі науковців з біологічних та сільськогосподарських наук, а також працівників рибної галузі, зокрема, при плануванні та впровадженні в життя нових схем ведення рибного господарства України, як на місцях, так і в глобальному масштабі.

Ключові слова: рибне господарство, водні біоресурси, відтворення гідробіонтів, вилов риби, економіка рибної галузі України.

DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF FISHERIES INDUSTRY IN UKRAINE IN 2016–2018

Yu. Glebova, ya_glebova@ukr.net, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

O. Shkarupa, knopush@ukr.net, State Agency for Fisheries, Kyiv

Purpose. According to the latest statistical studies, in the world as a whole and in Ukraine in particular, there is a tendency to an increase in the consumption of fish products. The purpose of the work is to analyze the dynamics of the development of the fisheries industry of Ukraine in 2016-2018, based on the generalized performance indicators of entities of various forms of ownership.

Methodology. The basis of the study were scientific, statistical and report data on the development indicators of fisheries industry of Ukraine. Namely, the implementation of the state policy in the field of fisheries industry, commercial harvest of fish and other aquatic bioresources, propagation of hydrobionts, production of marketable-food fish products, current state of the economics of the Ukraine's fisheries industry and international cooperation in aquaculture. In addition, the laws of Ukraine, resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine, resolutions of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine were used. The authors used the methods of retrospective analysis and monitoring of information data on the results of activities in this sector of the national economy. A comparative and statistical analysis of catches of aquatic living bioresources in 2016-2018 was carried out according to generally accepted methods.

Findings. The article presents generalized data on the development of the fisheries industry in Ukraine, and addresses current problems and prospects for its development. For example, owing to the gradual implementation of reforms in the fisheries industry in 2017, the total catch of fish and other aquatic living bioresources was 94.2 thousand tons, which is 6.6% more than in 2016. In the same 2017, on the state fish farms, 12.2 million individuals of valuable fish species were received, which is 114.6% of the state norm of their annual reproduction. In 2018, the total catch of aquatic living bioresources in the Black Sea, compared to 2017, increased by 3.3 thousand tons and amounted to 8.6 thousand tons. The catch amount in 2018 in the Black Sea estuaries was 481 tons, which exceeds that in 2017 by 338.8 tons. Thus, there is a positive dynamics in the development of the fish industry of Ukraine.

Originality. The article contains an analytical monitoring of the results of changes in the approaches to the organization of activities of various fisheries entities in 2016-2018, achieved primarily due to the gradual implementation of reforms. Considerable technological, economic, organizational and regulatory features for fish farms with various forms of ownership and types of fish farming were taken into account. Summarized information about the dynamics of the development of the fish industry of Ukraine and consistently set out the basic data on the current state of the Ukraine fisheries complex, with taking into account international relations.

Practical value. Materials of the article can be used in the work of scientists of biological and agricultural specialties, as well as fish industry workers. In particular, when planning and introducing into life the new fisheries management schemes of Ukraine, both locally and globally.

Keywords: fish farming, aquatic living bioresources, propagation of hydrobionts, fish capture, economics of the fisheries industry in Ukraine.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ В 2016–2018 ГОДАХ

Ю. А. Глебова, [ya_glebova@ukr.net](mailto:glebova@ukr.net), Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

О. В. Шкарупа, knorush@ukr.net, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины, г. Киев

Цель. Согласно последним статистическим исследованиям, в мире в целом и в Украине в частности наблюдается тенденция к увеличению потребления продукции рыбного хозяйства. Цель работы — проанализировать динамику развития рыбного хозяйства Украины в 2016–2018 гг., опираясь на обобщенные показатели деятельности субъектов различных форм собственности.

Методика. Основу исследования составили научные, статистические и отчетные данные относительно показателей развития рыбного хозяйства Украины, а именно — выполнения государственной политики в сфере рыбного хозяйства и промышленности, вылова рыбы и других водных биоресурсов, воспроизводства гидробионтов, производства товарно-пищевой рыбной продукции, состояния экономики рыбной отрасли Украины, а также международного сотрудничества по вопросам аквакультуры. Кроме того, были использованы законодательство Украины, постановления Кабинета Министров Украины, постановления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Авторы применяли методы ретроспективного анализа и мониторинга информационных данных результатов деятельности в этой отрасли народного хозяйства. Сравнительный и статистический анализ вылова водных живых биоресурсов в 2016–2018 гг. был проведен по общепринятым методикам.

Результаты. В работе приведены обобщенные данные по развитию рыбной отрасли Украины, рассмотрены его актуальные проблемы и перспективы. Например, благодаря постепенному претворению в жизнь реформ в рыбной отрасли в 2017 г. общий улов рыбы и других водных живых биоресурсов составил 94,2 тыс. т, что на 6,6% больше, чем в 2016 году. В том же 2017 г. на государственных рыбопроизводных хозяйствах было получено 12,2 млн особей ценных видов рыб, что составляет 114,6% от государственной нормы по их ежегодному воспроизводству. В 2018 г. общий вылов водных живых биоресурсов в Черном море, по сравнению с 2017 г., был увеличен на 3,3 тыс. тонн и составил 8,6 тыс. т. Объем вылова за 2018 г., в причерноморских лиманах составил 481 т, что превышает показатель 2017 г. на 338,8 т. Таким образом, наблюдается положительная динамика развития рыбного хозяйства Украины.

Научная новизна. Представлен аналитический мониторинг результатов изменения подходов к организации деятельности различных субъектов рыбного хозяйства в 2016–2018 гг., достигнутых, прежде всего, вследствие постепенного внедрения реформ. Учтены существенные технологические, экономические, организационные и нормативно-правовые особенности хозяйств различных форм собственности и типов ведения рыбководства. Обобщена информация о динамике развития рыбной отрасли Украины и последовательно изложены основные данные относительно современного состояния рыбохозяйственного комплекса Украины, с учетом международных отношений.

Практическое значение. Материалы статьи могут быть использованы в работе ученых биологических и сельскохозяйственных специальностей, а также работников рыбной отрасли, в частности, при планировании и внедрении в жизнь новых схем ведения рыбного хозяйства Украины как на местах, так и в глобальном масштабе.

Ключевые слова: рыбное хозяйство, водные биоресурсы, воспроизводство гидробионтов, вылов рыбы, экономика рыбной отрасли Украины.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Рибне господарство України — це галузь народного господарства, до якої належить діяльність з добування, переробки, відтворення та збільшення запасів риби та інших водних біоресурсів у природних і штучних водоймах. Його робота спрямована на отримання цінних харчових, кормових, лікарських та технічних продуктів. Воно розподіляється на рибальство, що має на меті вилов риби та інших гідробіонтів, і рибництво, яке спрямоване на збереження та поліпшення рибопромислових запасів, а також відтворення господарсько цінних видів риб. Рибальство в Україні буває любительське, спортивне та промислове — морське, прибережне і на внутрішніх водоймах (річках, озерах, ставах, водосховищах) [1, 2].

Серед річок України основне рибогосподарське значення мають Дніпро (а з його приток — Прип'ять та Десна), Дунай, Дністер, Південний Буг і Сіверський Донець. Так, в Дніпрі є понад 66 видів риб, основними промисловими видами в яких останні 3 роки є 5 (сріблястий карась (*Carassius gibelio*), лящ (*Abramis brama*), плітка (*Rutilus rutilus*), плоскирка (*Blicca bjoerkna*) та рослиноїдні види риб). В нижній частині Дунаю, яка розташована на території України, зареєстровано 71 вид риб, з яких основне промислове значення мають 3 (оселедець (*Alosa immaculata*), короп (*Cyprinus carpio*) і карась сріблястий). У Південному Бугу близько 70 видів риб, з яких найбільш численними є 6: короп, лящ, плітка, червонопірка (*Scardinius erythrophthalmus*), окунь (*Perca fluviatilis*), карась сріблястий. Іхтіофауна Дністра становить 57 видів риб (у верхів'ї переважають марена (*Barbus barbus*), підуст (*Chondrostoma nasus*), головень (*Squalius cephalus*) та інші види, що живуть у проточній воді; у нижній — плітка, червонопірка, окунь, бичкові (*Gobiidae*), чехоня (*Pelecus cultratus*), лящ тощо) [12, 13].

Озерне рибне господарство України зосереджене переважно у Поліссі й у заплаві нижньої течії Дунаю. Зокрема, у Поліссі є понад 268 озер загальною площею 16 000 га, в яких мешкає понад 32 види риб. Найбільш численними з них є 9 — лящ, плітка, червонопірка, щука (*Esox lucius*), окунь, лин (*Tinca tinca*), карась сріблястий, йорж (*Gymnocephalus cernua*). Промислова рибопродуктивність окремих озер на Поліссі коливається від 7,5 до 40,0 кг/га. У заплаві ділянки нижньої течії Дунаю площа озер становить близько 45 000 га з рибопродуктивністю від 21,0 до 73,0 кг/га. Найчисельнішими є також 9 видів риб — короп, лящ, судак (*Sander lucioperca*), щука, окунь, червонопірка, бички, тюлька (*Clupeonella cultriventris*), верховодка (*Alburnus alburnus*) [3–5].

Найпоширенішою формою рибного господарства України є ставове — ставовий фонд налічує понад 22 000 одиниць загальною площею близько 170 000 га. Садкове рибне господарство використовують на великих річках та водосховищах, а також прибережних ділянках морів. Активно набуває широкого розповсюдження по всій Україні інтенсивне рибництво з використанням установок замкненого водопостачання (УЗВ). Специфічною є рибогосподарська діяльність у водосховищах дніпровського каскаду гідроелектростанцій, які перекрили шляхи міграцій прохідним риbam, та змусили відійти на північ реофільні види риб. В наш час основними об'єктами промислу в дніпровських

водосховищах є 4 види риб (сріблястий карась, лящ, короп і плітка), а найбільшу рибопродуктивність мають Кам'янське та Кременчуцьке водосховища [5, 6].

Загалом, іхтіофауна України налічує 266 видів риб — 221 аборигенний та 25 інтродукованих. З них 111 прісноводних видів риб, 101 морський вид, 36 солонуватоводних, 15 прохідних. Серед прохідних видів риб 14 анадромних і тільки один (вугор європейський (*Anguilla anguilla*) — катадромний [4, 7].

Деякі види є інвазійними (медака китайська (*Orizias sinensis*), ротань-головешка (*Perccottus glenii*), бички великоголові (*Millerigobius macrocephalus*), лисун (*Pomatoschistus bathi*). Вони становлять значну загрозу для флори й фауни певних екосистем, конкуруючи з автохтонними видами за екологічні ніші, а також спричиняючи загибель місцевих видів.

Належність ще двох видів — сарпи (*Sarpa salpa*) та доради (*Sparus aurata*) — до вселенців дискусійна, оскільки вони належать до аборигенної фауни південної частини Чорного моря, але раніше не відзначались поблизу українських берегів. Ще вісім видів є випадковими у наших водах, відзначені поодинокі випадки їх спостереження, тому їх належність до аборигенної фауни (можливо, рідкісні види), або до вселенців (не прижилися) — теж дискусійна.

Таким чином, рибне господарство України має значні потенційні потужності як за рахунок великого різноманіття водних біоресурсів, так і завдяки наявності значних водних площ у різних біотопах. Незважаючи на це, воно кілька десятиліть поспіль знаходилося у депресивному стані та потребувало всебічних реформ [5, 8].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

З використанням Програми діяльності Уряду в проведенні реформ, Державним агентством рибного господарства України було розроблено Концепцію реформування рибного господарства, що почала діяти у 2016 р. [9]. Вона спрямована на залучення інвестицій в аквакультуру, створення органів рибоохорони із якісною зміною принципів їхньої роботи, формування культури соціально відповідального рибалки, досягнення прозорості та відкритості в роботі Державного агентства рибного господарства, а також на підвищення ефективності функціонування державних установ [10, 11].

Актуальним є питання її ефективності, відповідності викликам економіко-політичних обставин 2017 та 2018 рр. Відтак, метою роботи є аналіз динаміки розвитку рибного господарства України у період з 2016 по 2018 рр.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Аналізу підлягав стан рибицтва та рибальства на внутрішніх та зовнішніх водоймах України за 3 роки — з 2016 по 2018 включно. Основу дослідження становили наукові, статистичні та звітні дані стосовно основних 6 показників розвитку рибного господарства України [12–14], а саме — виконання державної політики у сфері рибного господарства та промисловості, вилову риби й інших водних біоресурсів, відтворення гідробіонтів, виробництва товарно-харчової рибної продукції, стану економіки рибної галузі України, а також міжнародного співробітництва з питань аквакультури [15, 16]. Крім того, були використані

законодавство України, постанови Кабінету Міністрів, постанови Міністерства аграрної політики та продовольства України [17–23]. Автори застосовували методи ретроспективного аналізу та моніторингу інформаційних даних результатів діяльності в цій галузі народного господарства. Порівняльний та статистичний аналіз вилову водних біоресурсів у 2016–2018 рр. був проведений згідно із загальноприйнятими методиками [6].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Згідно з новими науковими дослідженнями, значення рибних продуктів зростає. Вони мають високу цінність не тільки за поживною доцільністю, а й за дієтично-лікувальною здатністю. Тому попит на них на світовому ринку збільшується [5, 15, 16]. У зв'язку з цим в Україні зосереджується увага на посиленні розвитку рибної галузі. Спрямовуючими віхами для вирішення проблеми достатнього забезпечення населення країни рибою, їстівними водними біоресурсами та харчовою продукцією їх переробки є законодавчі акти України, акти Кабінету міністрів України, нормативно-правові акти Міністерства аграрної політики та продовольства України [1, 2, 17–23]. Стан рибної галузі в Україні, основні проблеми, напрями реформ, у тому числі реформи рибоохорони та дерегуляції рибного промислу, програма спрощення діяльності в аквакультури та інші напрями розвитку рибного господарства представлені в Концепції реформування рибної галузі України, яка розміщена на сайті Державного агентства рибного господарства України [8–10].

До сфери управління Держрибагентства України належать 42 державні підприємства, установи й організації, із них: 15 — підприємства аквакультури та промислового рибальства, 7 — рибних та адміністративних портів, 6 — науково-дослідних та проектних інститутів та 8 — бюджетних установ. Крім того, також потенціал рибогосподарського фонду прісноводних внутрішніх водойм, що складає понад 1 млн га.

При цьому, загальний нагульний ставовий фонд України становить понад 120 тис. га., водосховища дніпровського каскаду — 797 тис. га, лиманні господарства — 5,9 тис. га, водойми-охолоджувачі енергетичних споруд — 13,5 тис. га та інші водойми України — 86,6 тис. га.

У 2018 р. очікуваний загальний вилов водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України був на рівні 2015 року і становив 88,6 тис. т, що на 4,4% менше показника 2017 р. у зв'язку із зменшенням вилову риби в Азовському морі. У 2017 р. загальний вилов риби та інших водних біоресурсів становить 94, 2 тис. т, що на 6,6 % більше, ніж у 2016 р. (рис. 1).

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України та на підставі науково-біологічних обґрунтувань щорічно надаються квоти на спеціальне використання водних біоресурсів. У 2017 р. ці квоти отримало більше 400 суб'єктів господарської діяльності, якими було добуто 62,3 тис. тонн риби та інших водних біоресурсів, що на 8,2% більше, ніж у 2016 р. У 2018 р. цей показник становив 430 суб'єктів господарської діяльності, якими було добуто 50,3 тис. т водних біоресурсів [13, 14]. Подібне зниження обсягів вилову в першу чергу зумовлене складною політичною ситуацією в акваторії Азовського моря. Також, слід зауважити, що основну частину промислового вилову водних біоресурсів в

Україні становить добування водних біоресурсів в Азово-Чорноморському басейні, яке значною мірою залежить від вилову 4 найбільш численних риб (шпрот (*Sprattus sprattus*), хамса (*Engraulis encrasicolus*), тюлька, бичкові), вилов яких з року в рік не буває стабільним і залежить від погодних умов [7].

Рис. 1. Загальний вилов риби та інших водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України

Fig. 1. Total capture of fish and other water living bioresources by enterprises of the Ukraine fish industry

Основну частку всього вилову (98%) в Азово-Чорноморському басейні становлять такі види риб як бичкові, тюлька, шпрот, хамса, а також червоні молюски-вселенці рапани (*Rapana*) [7]. Упродовж 2017 р. в Азово-Чорноморському басейні було зареєстровано збільшення чисельності бичкових, шпротів, сардин, скатів, оселедцевих, а також креветок та рапан. В тому ж 2017 р. зменшилась чисельність таких водних біоресурсів як тюлька, хамса, атерина (*Atherina*), кефалевих (*Mugil*), а також мідій (*Mytilus edulis*) [14].

Загальний вилов водних біоресурсів в Азовському морі становив 21,3 тис. тонн у 2018 році, що є меншим ніж обсяг вилову у 2017 р. (37,5 тис. тонн). Крім того, у 2018 році зменшився вилов 3 основних промислових видів риб Азовського моря: бичків (12,3 тис. т проти 23,6 тис. т у 2017 р.), тюльки (7,9 тис. т проти 11,5 тис. т у 2017 р.), хамси (0,7 тис. т проти 2,0 тис. т у 2017 р.). Слід підкреслити, що у 2018 були зменшені дозвільні ліміти та посилена несприятлива вітрова активність під час лову. Порівняно з 2016 р., загальний вилов водних біоресурсів в Азовському морі у 2017 р. був більшим на 13,7%, ніж такий у 2016 р. [11, 17, 18].

У 2018 р. загальний вилов водних біоресурсів у Чорному морі, в порівнянні з 2017 р., збільшився на 3,3 тис. т і становив 8,6 тис. т. Основу промислу в Чорному морі складають наступні групи водних біоресурсів: молюски рапана — 5,5 тис. тонн та мідія — 0,3 тис. т, шпрот — 1,6 тис. т і креветки — 0,5 тис. т. У 2017 р. у Чорному морі було виловлено 5,2 тис. т риби, що є більшим на 6,1% ніж такі дані у 2016 р. [11, 13, 14].

Обсяг вилову в причорноморських лиманах за 2018 р. склав 481 т, що перевищує показник 2017 р. на 338,8 т. Збільшення відбулось завдяки підвищенню чисельності атерин (432,3 т) та бичків (25 т).

У р. Дунай станом на 2018 р. загальний вилов водних біоресурсів склав 254,4 т. Найчисельнішими промисловими видами риб нижньої течії Дунаю у 2018 р. були оселедець чорноморський (*Alosa immaculata*) (126,6 т), короп (44,6 т), карась сріблястий (26,8 т) [13].

У водосховищах Дніпра в 2018 р. загальний вилов становив 13,17 тис. т, що майже на рівні 2017 р. Основу промислу у дніпровських водосховищах становили 4 види риб: карась сріблястий — 3,9 тис. т, лящ — 2,54 тис. т, плітка — 2,3 тис. т, плоскирка — 1,12 тис. т. Крім того, широко розповсюджені інтродуковані рослинні види риб далекосхідного комплексу (строкатий *Hypophthalmichthys nobilis* та білий *Hypophthalmichthys molitrix* товстолобики, білий амур *Ctenopharyngodon idella* — 0,746 тис. т.

Загалом, у внутрішніх водоймах в 2017 р. було виловлено 19,5 тис. т, що є більшим на 13,1%, порівняно з обсягом вилову у 2016 р. Це обумовлено збільшенням чисельності сріблястого карася, тюльки, синця (*Ballerus ballerus*), коропа та рослинних видів риб. В той же час, спостерігається зменшення вилову ляща, плітки, плоскирки та судака.

На озерах і водосховищах України працюють спеціальні товарні рибні господарства (СТРГ), що поєднують у собі елементи аквакультури та промислового вилову [19, 22]. У 2017 р. діяло 612 таких господарств на загальній площі 142 тис. га, з яких вилов проводили 296. Всього у 2017 р. в режимі СТРГ було добуто 7,8 тис. т риби, що на 7,4% більше порівняно з 2016 р. У 2018 р. діяло 533 СТРГ, загальною площею 144,8 тис. га, з яких вилов проводили 295, добувши 7,2 тис. т риби [13, 14].

Україна є членом міжнародної організації CCAMLR (Комісія із збереження морських живих ресурсів Антарктики), у зоні дії якої проводиться вилов риби та інших водних біоресурсів суднами під державним прапором. Основним об'єктом промислу в цій акваторії є антарктичний криль (*Euphausia superba*), якого в 2017 р. було добуто 7,9 тис. т, що перевищує показник 2016 р. на 8,1%. А в 2018 р. було виловлено 15 тис. т антарктичного криля, що майже вдвічі перевищує аналогічний показник 2017 р.

В Україні існує понад 4 тисячі (показник майже незмінний за 2017 та 2018 рр.) суб'єктів господарювання, які займаються рибогосподарською діяльністю в умовах аквакультури та надають звітність за формою № 1А-риба (річна) «Виробництво продукції аквакультури» [14]. За 2018 р. вирощування товарної риби в умовах аквакультури становило 20,2 тис. т, з яких виловлено 15,9 тис. т продукції аквакультури [13]. Короп і далеосхідні рослинні риби склали більше 87% від загальної продукції аквакультури. Виробництво додаткових об'єктів аквакультури у традиційних ставах в умовах полікультури (європейський сом (*Silurus glanis*), щука, судак звичайний, веслоніс (*Polyodon spathula*), райдужна форель (*Oncorhynchus mykiss*), осетрові (*Acipenseridae*) сумарно не перевищувало 13 від загальної продукції аквакультури.

Видобуток риби та водних біоресурсів прямо залежить від здатності водойм до відновлення рибопродуктивності. Антропогенний тиск на водойми обов'язково має компенсуватись заходами зі штучного відтворення та вселення гідробіонтів. Штучне відтворення промислово цінних видів риб з наступним вселенням їх молоді у водойми забезпечує підтримання водних екосистем, формує промислові запаси та

іхтіофауну окремих водойм. Шляхом вселення досягається отримання значної частки загальної промислової рибопродукції, а також здійснюється поповнення природних популяцій аборигенних видів риби, у тому числі — занесених до Червоної книги України. На сьогодні в Україні відтворення цінних видів риби здійснюється чотирма державними рибовідтворювальними комплексами. Географія вселення отриманої на державних відтворювальних комплексах молоді риби передбачає залучення: пониззя р. Дніпро, Дніпровсько-Бузький лиман, водосховища (Каховське, Кременчуцьке, Канівське, Київське, Дністровське), а також річки (Десна, Сугоклея, Сейм, Шостка, Південний Буг, Чайка, Конка, Серет, Черемош, Прут). Контроль щодо проведення робіт із вселення молоді господарсько цінних видів риби здійснюють комісії, до складу яких входять представники управлінь Державного агентства рибного господарства, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної екологічної інспекції України, органів місцевого самоврядування, користувачів водних біоресурсів та представники громадських організацій. У 2018 р. вищезазначені комісії зареєстрували вселення у природні водойми 14,1 млн особин молоді цінних видів риби, що становить 107,9% від виконання річного державного плану зарибнення та на 15,7% перевищує показник 2017 р. (12,2 млн екземплярів). Найбільше у 2018 р. було отримано шляхом штучного відтворення та вселено у природні водойми аборигенних видів риби (короп, щука, сом, судак) — 8,2 млн екз. та рослинних риби далекосхідного комплексу (білий амур, білий товстолобик, строкатий товстолобик) — 5,9 млн екз. Також, в 2018 р. отримано шляхом штучного відтворення та вселено у природні водойми 1,6 млн особин осетрових видів риби, таких як російський осетер та стерлядь, що відповідає аналогічному показнику у 2017 р. Для представників родини лососевих цей показник становив у 2018 р. 0,17 млн особин [13, 14].

Зарибнення в режимі спеціальних товарних рибних господарств (СТРГ) у 2017 р. здійснили 214 суб'єктів господарювання, якими було вселено 29,9 млн особин молоді риби. У 2018 р. цей комплекс дій здійснили 254 суб'єкти господарювання, якими було вселено 25,4 млн особин молоді риби.

У 2017 р. 2,5 млн. особин молоді риби було вселено у водойми України представниками територіальних органів рибохорони, користувачами, громадськими організаціями, за рахунок компенсаційних коштів та благодійних внесків. На 2018 р. цей показник зріс до 6,7 млн особин.

Загалом за 2017 р. у рибогосподарські водні об'єкти України було вселено 44,6 млн. екз. молоді риби, що на 3,8% більше, ніж у 2016 р. А у 2018 р. цей показник зріс до 46,2 млн особин молоді риби, що на 7,1% перевищує дані за 2017 р.

Селекційно-племінна робота в рибництві України знаходиться на стабільному рівні. Так, у 2017 р. за даними Державного племінного реєстру, на території України було атестовано 36 господарств (племінні заводи, племінні репродуктори, селекційний центр, лабораторія генетичного контролю), а у 2018 р. цей показник збільшився до 28 [13, 14].

Із видобутих водних біоресурсів загальний обсяг виробництва товарно-харчової рибної продукції в Україні у 2017 р. склав 63,3 тис. т, що більше на 1,1% порівняно з 2016 р. В той же час, у 2018 р. цей показник був вищим на 5,2% ніж у 2017 р., становивши 66,4 тис. т. У 2018 р., порівняно з 2017 р., збільшилось виробництво рибних консервів — з 34,1 тис. т до 35,2 тис. т, що в цілому становить

понад 50% від загального обсягу виробництва. А от випуск мороженої риби у 2018 р. зменшився до 9,2 тис. т (14% з 10,9 тис. т у 2017 р. (17% від загального обсягу). За період 2018 р. на 55% збільшено виробництво готових та консервованих оселедців (без урахування солоних оселедців) і на 30% — виробництво готового філе лосося та іншої риби (в'яленого, солоного чи в розсолі), порівняно з 2017 р. Одночасно спостерігається зменшення на 12% виробництва свіжо охолодженого філе риб у порівнянні з 2017 роком. У 2017 р., порівняно з 2016 було збільшено виробництво солоної риби на 18 %, ікри риби та її замінників на 17%, та на 8% — виробництво рибних консервів [13, 14]. Слід зазначити, що виробництво товарно-харчової рибної продукції здійснюється здебільшого з імпортованої мороженої риби (або її філе), такої як оселедець, скумбрія, сардина, кілька або шпрот. Що стосується виробництва товарно-харчової рибної продукції, виготовленої з української риби, то це риба сушена, в'ялена чи копчена (морська — бичок, тюлька, хамса, шпрот, а також прісноводна — лящ, плітка, плоскирка тощо). Слід зазначити, що вітчизняна риба на споживчому ринку України здебільшого користується попитом у свіжому або свіжомороженому вигляді (не проходить процес переробки) [24].

Попит населення на продукцію аквакультури зумовлює постійне зростання обсягів її імпорту. Так, у 2018 р. імпорт риби, рибної продукції та інших водних біоресурсів становив 379,5 тис. т, що на 15,8% більше, ніж у 2017 р. А в 2017 році він склав 327,8 тис. т, що на 9,6% більше порівняно з 2016 р. Сума імпортованої продукції у 2018 р. збільшилась на понад 108 млн дол. США, становивши 635,8 млн дол. США, що більше на 20,5%, ніж у 2017 р. У 2017 р. сума імпортованої рибопродукції збільшилась майже на 62 млн. дол. США та становивши 527,7 млн дол., що більше ніж у 2016 р. на 13,2% (рис. 2).

Рис. 2. Обсяги імпорту продукції аквакультури в Україну

Fig. 2. The volume of aquaculture imports in Ukraine

Найбільша кількість риби та рибопродукції в Україну імпортується з Королівства Норвегії, Ісландії та Естонської Республіки. Так, у 2017 р. Королівство Норвегія забезпечувала 20,6% (67, 6 тис. т на суму 145,0 млн дол.

США), Ісландія — 17,4% (56,4 тис. т на суму 72,5 млн дол. США) та Естонська Республіка — 10,2% (33,3 тис. т на суму 13,3 млн дол. США) від всього обсягу імпорту продукції аквакультури. На другому місці за обсягами постачання продукції аквакультури в Україну є такі країни як США, Латвійська Республіка, Королівство Іспанія, Канада та КНР. Більше 90% обсягу імпорту продукції аквакультури припадає на види риб, до яких Україна не має доступу (які видобуваються виключно у водах морських економічних зон інших держав). В основному — це морожена риба або її філе: оселедець, мерлуза (хек), скумбрія, сардина та кілька або шпрот. Здебільшого проходить процес їх переробки на рибних підприємствах України.

У зв'язку із збільшенням постачання імпортованої рибопродукції та вилову водних біоресурсів в 2018 р. зріс фонд споживання риби та рибопродукції до 511 тис. т, що становить близько 12,1 кг на душу населення. У 2017 році в Україні спостерігалось підвищення споживання рибопродукції до 470 тис. т, що становило близько 10,7 кг на людину. В 2016 р. цей показник складав 425 тис. тонн та 9,6 кг на одну особу. Середні споживчі ціни на рибу та рибопродукти, за даними Державної служби статистики України, у 2018 р. збільшилися на 9,3%, порівняно з 2017 роком. В основному, підвищилися ціни на копчену скумбрію (+17,7%), живу або охолоджену рибу (+11,3%) та морожену рибу (+10,3). У 2017 р. цей показник збільшився на 3,6%, порівняно з 2016 р. здебільшого піднялися ціни на морепродукти (16,1%) та на консерви рибні в олії (8%). Зменшилась ціна на оселедців (5%) та рибу живу або охолоджену (3%) [13, 14].

Експорт риби, рибопродукції та інших водних біоресурсів у 2018 р. збільшився на 2,8 млн дол. США, що на 8,1% перевищує показник 2017 р. Всього впродовж 2018 р. було експортовано 10,6 тис. т риби та продукції з водних біоресурсів на загальну суму 37,1 млн дол. США. Загалом, у 2017 р. експорт збільшився, порівняно з 2016 р. майже на 26,5%, а загальна сума експортованої рибопродукції зросла на 12,2 млн дол. США, становлячи 34,3 млн дол. США, тоді як у 2016 році цей показник складав 8,4 тис. т на загальну суму 22,1 млн дол. США (рис. 3).

Рис. 3. Обсяг експорту продукції аквакультури з України

Fig. 3. Exports of aquaculture products from Ukraine

Якщо у 2017 р. основу експорту становила готова та консервована риба (сардини, сардинела, кілька або шпроти), а також морожене рибне філе, то у 2018 році асортимент розширився за рахунок м'яса риб (лосось, тріска, судак), а також готових продуктів із сурімі (крабові палички, тощо). Географія експортних зв'язків теж дещо зазнала змін. У 2017 р. основними країнами-експортерами були Республіка Молдова, Королівство Данія, Німеччина, Грузія та Республіка Білорусь. У 2018 р. цей перелік поповнили Азербайджанська Республіка, Французька Республіка, Угорщина й Турецька Республіка [13, 14].

Ситуація на ринку продукції аквакультури в Україні залежить від багатьох чинників, зокрема стабільності курсу національної валюти, політики держави стосовно до імпортерів та експортерів, показників інфляції, купівельної спроможності населення тощо [4].

Для реалізації державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання й відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства з Державного бюджету виділяються кошти під виконання відповідних бюджетних програм. Законом України «Про державний бюджет України на 2017 р.» на фінансування програм Державного агентства рибного господарства України за рахунок загального фонду було передбачено 378 036, 5 тис. грн. В 2018 р. ця сума становила 403 919,7 тис. грн [13, 14].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Розвиток рибного господарства сприяє зайнятості сільського населення та населення прибережних територій. Продукція аквакультури, порівняно, з вирощуванням сільськогосподарської худоби та птиці, є дешевим джерелом тваринного білка.

У 2016 році були запроваджені реформи, спрямовані на розвиток рибного господарства в Україні. Нормативно-правовою підставою для цих заходів були 5 постанов Кабінету Міністрів України та 7 наказів Міністерства аграрної політики та продовольства. В межах реформ було здійснено зміни до здійснення спеціального використання водних біоресурсів, до органів, видів та умов ліцензування господарської діяльності, до встановлення квот, лімітів та прогнозів використання водних біоресурсів, до чинності державної служби Державного агентства рибного господарства.

На основі аналізу інформації з відкритих офіційних джерел за період з 2016 по 2018 рр. включно, можна стверджувати, що спостерігається позитивна динаміка розвитку рибного господарства в Україні. Так, зріс загальний обсяг виробництва товарно-харчової рибної продукції в Україні, серед якої найбільше — рибних консервів (понад 50%) та мороженої риби (понад 14%). Підвищено показники вилову водних біоресурсів з акваторії Чорного моря та причорноморських лиманів. У 2017 та 2018 рр. державними риборозплідними заводами було перевиконано плани з вселення молоді цінних видів риб. У 2018 р. було розширено географію зариблення водних біоресурсів державними відтворювальними комплексами. Станом на 2018 р. в Україні атестовано 38 господарств, яким присвоєно відповідні статуси суб'єктів плеїнної справи у рибництві. Всього присвоєно 127 статусів, з них: плеїнних репродукторів —

105, племінних заводів — 17, селекційних центрів — 4, лабораторія генетичного контролю — 1. У водосховищах Дніпра загальний вилов водних біоресурсів та склад основних господарсько-цінних видів риб за ці роки залишився практично не змінним.

В той же час, у 2018 р. очікуваний загальний вилов водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України становив 88,6 тис. т, що на 4,4% менше показника 2017 р. у зв'язку із зменшенням вилову риби в Азовському морі.

Подальший розвиток рибогосподарської галузі України безпосередньо залежить від інтенсифікації аквакультури, в першу чергу, за рахунок використання УЗВ та селекційних досягнень. Селекція в рибництві має бути спрямована на підвищення якості об'єктів аквакультури та створення національного генетичного фонду рибницьких об'єктів, оптимальних для вирощування у природних умовах України. Крім того, необхідно продовжувати роботи з відтворення водних біоресурсів з метою підвищення рибопродуктивності водойм, підтримання їх біологічного різноманіття та збереження відтворювального потенціалу природних популяцій господарсько цінних видів риб.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» № 3677-VI URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17> (дата звернення: 14.03.19).
2. Закон України «Про аквакультуру» : прийнятий 18 вересня 2012 року, № 5293-VI URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5293-17> (дата звернення: 14.03.19).
3. Тюрин П. В. Биологические обоснования регулирования рыболовства на внутренних водоемах. Москва : Пищепромиздат, 1963. 119 с.
4. Вдовенко Н. М. Сучасний стан та напрями розвитку рибного господарства в Україні // Економіка АПК. 2010. № 3. С. 15—21.
5. Сучасний стан та розвиток рибної галузі України в кризовий час / Грициняк І. І. та ін. // Рибогосподарська наука України 2015. № 1. С. 5—15.
6. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98 № 166. Київ : ІРГ УААН, 1998. 47 с.
7. Оценить состояние промысловых объектов во внутренних водоемах Северо-западного Причерноморья и на прилежащем шельфе Черного моря, изучить динамику их численности для определения возможных лимитов изъятия и регулирования рыболовства, разработать долгосрочные прогнозы промысловой обстановки: отчет о научно-исследовательской работе ред. С. Г. Бушуев. Одесса : ОдЦ ЮгНИРО, 2013. 147 с.
8. Глебова Ю. А., Шкарупа О. В. Стан рибної галузі в Україні на початку її реформування // Науковий вісник НУБіПУ. 2017. № 250. С. 7. (Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва).
9. Концепція реформування рибної галузі в Україні в 2015 р. URL: http://darg.gov.ua/_konsepcija_reformuvannja_0_0_0_1983_1.html. (дата звернення : 14.03.19).

10. Глебова Ю. А., Шкарупа О. В. Розвиток реформ у рибній галузі України // Рибогосподарська наука України. 2017. № 4. С. 7—18.
11. Про внесення змін до Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 105 та від 5 жовтня 2016 року № 808. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/808-2016-п> (дата звернення : 17.02.2019).
12. Державна служба статистики України. URL: <http://ukrstat.gov.ua> (дата звернення : 17.02.2019).
13. Публічний звіт Державного агентства рибного господарства України за 2018 р. URL: http://darg.gov.ua/_publichnij_zvit_derzhavnogo_0_0_0_8359_1.html (дата звернення : 14.03.19).
14. Публічний звіт Державного агентства рибного господарства України за 2017 р. URL: http://darg.gov.ua/files/10/02_21_zvit.doc (дата звернення : 14.03.19).
15. Ukraine Fishery products. URL: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/UA/FFP-UA_en.pdf (дата звернення : 17.02.2019).
16. Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: <http://www.fao.org>. (дата звернення : 14.03.19).
17. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 845. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/845-2016-п> (дата звернення: 17.02.2019).
18. Про затвердження режимів рибальства у 2016 році : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 січня 2016 року № 2. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0109-16> (дата звернення : 17.02.2019).
19. Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення у 2017 році : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05 грудня 2016 року № 512. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1676-16> (дата звернення : 17.02.2019).
20. Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення у 2017 році : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 грудня 2016 року № 542. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1691-16> (дата звернення : 17.02.2019).
21. Закон України № 2041-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (щодо уточнення деяких термінів та понять)» від 18 травня 2017 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4391-17> (дата звернення : 14.03.19).
22. Постанова кабінету Міністрів України №50 «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) аби відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу», від 18 січня 2017 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/801-2013-%D0%BF>. (дата звернення : 14.03.19).
23. Наказ Мінагрополітики №5 «Про затвердження режимів рибальства у 2017 році», від 18 січня 2017 року, зареєстрований в Міністерстві юстиції України

- 01 лютого 2017 року за № 134/300020. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30002.html (дата звернення : 14.03.19).
24. ДСТУ 2284:2010. Риба жива. Загальні технічні вимоги. Київ : Держспоживстандарт України, 2012. 16 с.

REFERENCE

1. Zakon Ukrainy «Pro rybne hospodarstvo, promyslove rybalstvo ta okhoronu vodnykh bioresursiv» № 3677-VI. *zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17>.
2. Zakon Ukrainy «Pro akvakulturu» № 5293-VI. *zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5293-17>.
3. Tjurin, P. V. (1963). *Biologicheskie obosnovaniya regulirovaniya rybolovstva na vnutrennih vodoemah*. Moskva: Pishhepromizdat.
4. Vdovenko, N. M. (2010). Suchasnyi stan ta napriamy rozvytku rybnoho hospodarstva v Ukraini. *Ekonomika APK*, 3, 15-21.
5. Hrytsyniak, Yu. A., Sharko, D. P., Shkarban, V. V., & Plichko, V. F. (2015). Suchasnyi stan ta rozvytok rybnoi haluzi Ukrainy v kryzovyi chas. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 5-15.
6. *Metodyka zboru i obrobky ikhtiologichnykh i hidrobiologichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoskhovyshch i lymaniv Ukrainy*: Zatv. nakazom Derzhkomrybhospu Ukrainy № 166 vid 15.12.98. (1998). Kyiv.
7. Bushuev, S. G. (Ed.). (2013). *Ocenit' sostojanie promyslovykh ob'ektov vo vnutrennih vodoemah Severo-zapadnogo Prichernomor'ja i na prilezhashhem shel'fe Chernogo morja, izuchit' dinamiku ih chislennosti dlja opredelenija vozmozhnykh limitov izhajatiya i regulirovaniya rybolovstva, razrabotat' dolgosrochnye prognozy promyslovoj obstanovki: otchet o nauchno-issledovatel'skoj rabote*. Odessa: OdC JugNIRO.
8. Hliebova, Yu. A., & Shkarupa, O. V. (2017). Stan rybnoi haluzi v Ukraini na pochatku yii reformuvannia. *Naukovyi visnyk NUBiPU, Ser.: Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva*, 250, 7.
9. Kontseptsii reformuvannia rybnoi haluzi v Ukraini v 2015 r. *darg.gov.ua*. Retrieved from http://darg.gov.ua/_konceptija_reformuvannja_0_0_0_1983_1.html.
10. Hliebova, Yu. A., & Shkarupa, O. V. (2017). Rozvytok reform u rybni haluzi Ukrainy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 7-18.
11. Pro vnesennia zmin do Poriadku zdiisnennia spetsialnogo vykorystannia vodnykh bioresursiv u vnutrishnikh rybohospodarskykh vodnykh ob'ektakh (ikh chastynakh), vnutrishnikh morskyykh vodakh, terytorialnomu mori, vykliuchnii (morskii) ekonomichnii zoni ta na kontynentalnomu shelfi Ukrainy : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 liutoho 2016 roku № 105 ta vid 5 zhovtnia 2016 roku № 808. *zakon2.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/808-2016-p>.
12. Derzhavna sluzhby statystyky Ukrainy. *ukrstat.gov.ua*. Retrieved from <http://ukrstat.gov.ua>.
13. Publichnyi zvit Derzhavnogo ahentstva rybnoho hospodarstva Ukrainy za 2018 r. *darg.gov.ua*. Retrieved from http://darg.gov.ua/_publichnyi_zvit_derzhavnogo_0_0_0_8359_1.html.

14. Publichnyi zvit Derzhavnoho ahentstva rybnoho hospodarstva Ukrainy za 2017 r. *darg.gov.ua*. Retrieved from http://darg.gov.ua/files/10/02_21_zvit.doc.
15. Ukraine Fishery products. *webgate.ec.europa.eu*. Retrieved from https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/UA/FFP-UA_en.pdf.
16. Food and Agriculture Organization of the United Nations. *www.fao.org*. Retrieved from <http://www.fao.org>.
17. Pro zatverdzhennia litsenziinykh umov provadzhennia hospodarskoi diialnosti zpromyslovoho vylovu vodnykh bioresursiv za mezhamy yurysdyksii Ukrainy : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystopada 2016 roku № 845. *zakon2.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/845-2016-p>
18. Pro zatverdzhennia rezhymiv rybalstva u 2016 rotsi : nakaz Ministerstva ahrarynoi polityky ta prodovolstva Ukrainy vid 06 sichnia 2016 roku № 2. *zakon3.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0109-16>.
19. Pro zatverdzhennia limitiv ta prohnoziv dopustymoho spetsialnoho vykorystannia vodnykh bioresursiv zahalnodержavnoho znachennia u 2017 rotsi : nakaz Ministerstva ahrarynoi polityky ta prodovolstva Ukrainy vid 05 hrudnia 2016 roku № 512. *zakon2.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1676-16>
20. Pro zatverdzhennia kvot dobuvannia vodnykh bioresursiv zahalnodержavnoho znachennia u 2017 rotsi : nakaz Ministerstva ahrarynoi polityky ta prodovolstva Ukrainy vid 16 hrudnia 2016 roku № 542. *zakon2.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1691-16>.
21. Zakon Ukrainy № 2041-VIII «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro osoblyvosti strakhuvannia silskohospodarskoi produktsii z derzhavnoiu pidtrymkoiu» (shchodo utochnennia deiakyykh terminiv ta poniat)» vid 18 travnia 2017 r. *zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4391-17>.
22. Postanova kabinetu Ministriv Ukrainy №50 «Pro vnesennia zmin do Poriadku vydachi dozvolu na spetsialne vykorystannia vodnykh bioresursiv u rybohospodarskykh vodnykh ob'iektakh (ikh chastynakh) aby vidmovy v yoho vydachi, pereoformlennia, vydachi dublikata ta anuluivannia zaznacheno do dozvolu», vid 18 sichnia 2017 r. *zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/801-2013-%D0%BF>.
23. Nakaz Minahropolityky №5 «Pro zatverdzhennia rezhymiv rybalstva u 2017 rotsi», vid 18 sichnia 2017 roku, zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytysii Ukrainy 01 liutoho 2017 roku za № 134/300020. *search.ligazakon.ua*. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30002.html.
24. Ryba zhyva. Zahalni tekhnichni vymohyiu. (2012). *DSTU 2284:2010. Natsionalnyi standart Ukrainy*. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy.

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 21-41

DOI: 10.15407/fsu2019.02.021

УДК 574.5:581.526.325 (282.247.326.8)

Received 23.03.2019

Received in revised form 25.04.2019

Accepted 05.05.2019

ХАРАКТЕРИСТИКА ФІТОПЛАНКТОНУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ЗА ПЕРІОД ІСНУВАННЯ (ОГЛЯД)

О. В. Федоненко, hydro-dnu@mail.ru, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Ю. В. Ніколенко, jul.nikolenko@gmail.com, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Мета. На основі літературних даних проаналізувати наявні праці вчених, які досліджували фітопланктон середньої частини Дніпра, яка після зарегулювання стоку ріки, внаслідок побудови греблі, стала Дніпровським (Запорізьким) водосховищем. Окреслити напрямки їх діяльності; проаналізувати і узагальнити всі відомі результати досліджень, виконаних у різні періоди функціонування водосховища, з 1918 по 2016 рр. та простежити динаміку змін кількісного і якісного складу фітопланктону на різних ділянках водосховища.

Результати. В роботі узагальнено результати досліджень різних вчених щодо кількості видів, чисельності та біомаси фітопланктону на різних ділянках водосховища. Проаналізовано зміни якісного і кількісного складу фітопланктону в різні періоди формування екосистеми Запорізького водосховища: до заповнення водосховища; в роки першого затоплення; в перший період існування водосховища; в період руйнування греблі та відновлення річкового режиму; післявоєнні роки, роки вторинного заповнення, в період інтенсивного гідробудівництва і внутрішньокаскадного існування Запорізького водосховища. Простежено, що кількість видів з 1918(22) по 2016 рр. зменшилася більше ніж удвічі, а показники чисельності і біомаси, навпаки, суттєво зросли, що пов'язано як з внутрішньокаскадним положенням водосховища, так і значним антропогенним тиском на водойму.

Практична значимість. Наведена в статті інформація висвітлює в ретроспективі розвиток досліджень якісних і кількісних характеристик фітопланктону Запорізького водосховища. Також дана інформація буде корисною при прогнозуванні змін в угрупованнях фітопланктону під впливом різних чинників середовища і дасть змогу прослідкувати динаміку його розвитку за період існування водосховища.

Ключові слова: фітопланктон, Запорізьке водосховище, чисельність, біомаса, вид, «цвітіння» води, внутрішньокаскадне положення.

CHARACTERISTICS OF PHYTOPLANKTON IN THE ZAPORIZHZHIA RESERVOIR FOR THE PERIOD OF ITS EXISTENCE (REVIEW)

O. Fedonenko, hydro-dnu@ukr.net, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

Yu. Nikolenko, jul.nikolenko@gmail.com, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

© О. В. Федоненко, Ю. В. Ніколенко, 2019

Purpose. Based of literature data, in chronological order, to compose a list of leading scientists who investigated phytoplankton in the middle part of the River Dnipro, which, after the construction of the Dniprostan dam, became the Dnipro (Zaporizhzhia) reservoir. To outline the main trends of their activities, analyze and summarize the results of studies carried out at different periods of the reservoir exploitation. To detect the dynamics of changes in the quantitative and qualitative composition of phytoplankton in different parts of the above-mentioned reservoir from 1918 to 2016.

Findings. The article shows changes in the qualitative and quantitative composition of phytoplankton in different periods of the formation of the Zaporizhzhia reservoir ecosystem. In particular, during its first filling, years of first flooding, in the first period of its existence, period of dam destruction and the restoration of the river regime, years after the Second World War, period of second filling, period of intensive building of hydrotechnical facilities and intra-cascade existence of this reservoirs.

Fundamental studies were initiated by professor-algologist A. D. Svirengo who established the species composition and basic patterns of phytoplankton vegetation in the River Dnipro, both before its regulation and during the first flooding of areas during the construction of reservoirs. He was the first in Ukraine who outlined the effect of natural rapids and dam construction on phytoplankton communities. A significant contribution to the development of these hydrobiological studies was made by Gaukhman Z. S., Primachenko A. D. and other scientists whose works are mentioned in this article.

The article presents the generalized results of studies of different scientists regarding the number of species, abundance and biomass of phytoplankton in different parts of the reservoir. It was found that the number of phytoplankton species from 1918 (22) to 2016 decreased more than two-fold. At the same time, the indicators of its abundance and biomass, on the contrary, increased significantly due to both the intra-cascade position of the Zaporizhzhia reservoir and the significant human impact on this water body.

Practical value. The information presented in the article can be used to determine the contribution of individual scientists to the development of phytoplankton studies from the Zaporizhzhia reservoir, as well as hydrobiology in general.

Key words: phytoplankton, Zaporizhzhia reservoir, abundance, biomass, species, algal bloom, intra-cascade position.

ХАРАКТЕРИСТИКА ФІТОПЛАНКТОНА ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ЗА ПЕРІОД СУЩЕСТВУВАННЯ (ОБЗОР)

Е. В. Федоненко, hydro-dnu@mail.ru, Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара, г. Дніпр

Ю. В. Николенко, jul.nikolenko@gmail.com, Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара, г. Дніпр

Цель. На основе литературных данных проанализировать имеющиеся труды ученых, исследовавших фитопланктон средней части Днепра, которая после зарегулирования стока реки, вследствие постройки плотин, стала Днепровским (Запорожским) водохранилищем, а также определить направления их деятельности; проанализировать и обобщить все известные результаты исследований, выполненных в разные периоды функционирования водохранилища, с 1918 по 2016 гг. и проследить динамику изменения количественного и качественного состава фитопланктона на разных участках водохранилища.

Результаты. В работе обобщены результаты исследований различных ученых относительно количества видов, численности и биомассы фитопланктона на разных участках водохранилища. Проанализированы изменения качественного и количественного состава фитопланктона в разные периоды формирования экосистемы Запорожского водохранилища: до заполнения водохранилища; в годы первого затопления; в первый период

существования водохранилища; в период разрушения плотины и восстановления режима; послевоенные годы, годы вторичного заполнения, в период интенсивного строительства гидротехнических сооружений и внутрикаскадного существования Запорожского водохранилища. Прослежено, что количество видов с 1918 (22) по 2016 г. уменьшились более чем вдвое, а показатели численности и биомассы, наоборот, существенно выросли, что связано как с внутрикаскадным положением водохранилища, так и значительным антропогенным прессом на водоем.

Практическая значимость. Приведенная в статье информация может показать в ретроспективе развитие исследований качественных и количественных характеристик фитопланктона Запорожского водохранилища. Также данная информация будет полезной при прогнозировании изменений в сообществах фитопланктона под влиянием различных факторов среды и дать возможность проследить динамику его развития за период существования водохранилища.

Ключевые слова: фитопланктон, Запорожское водохранилище, численность, биомасса, вид, «цветение» воды, внутрикаскадное положение.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНОЇ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Запорізьке водосховище — це перше з утворених водосховищ у каскаді на Дніпрі, яке за період свого існування зазнало низку трансформацій, викликаних зміною гідрологічного та гідохімічного режимів в процесі гідробудівництва [1] та під впливом посиленого антропогенного тиску. Оскільки фітопланктон є одним з найбільш чутливих елементів у великих річкових екосистемах, особливо в умовах зарегульованості стоку [2], вищевказані зміни в першу чергу відображаються на його якісних і кількісних показниках першого.

Особливий інтерес привертають значні вегетації синьо-зелених водоростей, що викликають «цвітіння» води та продукують ціанотоксини, що глибоко діють на живі організми та якість води, загрожуючи екологічною катастрофою [1–3].

Дослідження фітопланктону Дніпра в межах Дніпропетровської області почалося ще в 20–30 рр. ХХ ст. і з певними прогалинами триває донині. Комплексне узагальнення результатів багаторічних досліджень з урахуванням сучасного стану має важливе значення для сучасної гідробіологічної науки.

Мета роботи — проаналізувати існуючу наукову інформацію щодо розвитку фітопланктону Запорізького водосховища, узагальнити і систематизувати динаміку кількісних і якісних показників фітопланктону за період існування водосховища.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Історична довідка щодо досліджень фітопланктону Запорізького водосховища. Перші системні (фундаментальні) дослідження фітопланктону акваторії нинішнього Запорізького водосховища були проведені на момент заснування Дніпропетровської державної гідробіологічної станції, яка розпочала свою роботу 15 березня 1928 р. Головною метою створення станції було всебічне гідробіологічне дослідження порожистої частини р. Дніпро, а також його приток. Очолював станцію професор Дмитро Онисифорович Свіренко — завідувач кафедри ботаніки Дніпропетровського університету, професор-альголог. Саме з його ім'ям і пов'язані фундаментальні дослідження фітопланктону Дніпра і його

основних приток, що протікають у межах Дніпропетровської області: Самари, Вовчої, Мокрої Сури тощо. У сферу наукових інтересів Д. О. Свіренка входили не лише дослідження якісних і кількісних показників фітопланктону, а і їх зміни під впливом будівництва греблі ДніпроГЕСу [4–16].

Однак, свої перші дослідження Д. О. Свіренко почав ще в 1920-х рр., тобто ще до утворення Гідробіологічної станції і початку гідрологічних і гідрохімічних змін порожистої частини Дніпра, що дало змогу оцінити масштаби змін, які відбулися внаслідок побудови греблі, та прослідкувати їх вплив на показники розвитку фітопланктону. Дмитро Свіренко вивчав фітопланктон на ділянці річки навпроти м. Дніпро циклічно протягом 4 років (1920–1924 рр.): крім того, досліджував вплив порогів на фітопланктон [4–11].

Частково цим питанням в даному районі займався і Б. Бішов [16] в 1918 р. Хоча основну увагу автор приділяв ділянці ріки в районі м. Олександрівська (нині м. Запоріжжя), однак він також вивчав вплив порогів на фітопланктон, і з цією метою збирав матеріал на ділянці Катеринослав–Олександрія (нині м. Дніпро — Запоріжжя), тобто в межах нашого району [10, 17, 18].

У 1929 р. виходить друком робота Д. О. Свіренка з фітопланктону р. Вороної [7, 10]. В роботах Я. В. Ролла та Д. О. Радзімовського, опублікованих у 1930 р. висвітлено стан розвитку фітопланктону на ділянці Київ–Дніпро, що охоплює верхню частину Запорізького водосховища. Загалом, їх роботи підтвердили характеристику фітопланктону Дніпра, надану у працях Д. О. Свіренка (1920–1924 рр.) [19, 20].

Крім Д. О. Свіренка, вивченням фітопланктону займалися співробітники Дніпропетровської гідробіологічної станції — П. А. Герасимов і О. Я. Мусатова. П. А. Герасимов вивчав фітопланктон на ділянці м. Дніпро до початку затоплення, а О. Я. Мусатова — кількісні проби з порожистої частини Дніпра до і після затоплення. Їх роботи були представлені лише у вигляді рукописів і згодом були використані Д. О. Свіренком [10, 18].

Отже, за роки роботи Д. О. Свіренка (1920–1941 рр.), ним було встановлено видовий склад, основні закономірності формування фітопланктону р. Дніпро, що знаходиться в межах Дніпропетровської області. Робота Дмитра Свіренка та Гідробіологічної станції загалом була високо оцінена в наукових колах. Так, постановою уряду в 1934 р. на базі Дніпропетровської гідробіологічної станції створено НДІ гідробіології Дніпропетровського університету, а ініціатор заснування станції і директор НДІ гідробіології професор Д. О. Свіренко в 1934 р. обирається членом-кореспондентом АН УРСР [9–16, 21].

У післявоєнні роки гідробіологічне товариство очолював учень Свіренка — Г. Б. Мельников, який займався вивченням зоопланктону. Всі дослідження були спрямовані на вивчення акваторії Дніпровського водосховища після падіння рівня води, викликаного руйнуванням під час війни греблі ДніпроГЕСу. Фітопланктон на даний час вивчався фрагментарно [4, 22]. Так, у результаті досліджень 1944–1946 рр. друком виходить стаття В. А. Цимбалюк «Фітопланктон і фітобентос порожистої частини Дніпра» [20].

Перші ж вагомі дослідження фітопланктону в цей період пов'язані з ім'ям Зінаїди Самойлівни Гаухман. У період досліджень 1944–1946 рр., З. С. Гаухман

встановила, що фітопланктон нової порожистої частини Дніпра повторює такий до побудови греблі ДніпроГЕСа. А вже під час 1947–1952 рр. було помічено зміни в складі і співвідношенні різних систематичних груп фітопланктону, пов'язані з формуванням Дніпровського водосховища, після відновлення греблі в 1946 р. [24–28].

В наступні періоди функціонування Дніпровського водосховища вивченням фітопланктону займалися В. А. Федій [29] — в 1960–70 рр., А. Д. Приймаченко — в 1980-х рр. [17, 29] та А. В. Мисюра [31, 32] — в 1984–86 рр.

А. С. Кириленко займався системним вивченням фітопланктону Дніпра, починаючи з кінця 1990-х і на початку 2000-х рр. Автор детально розглядав річну і сезонну динаміку фітопланктону водосховища [33].

Останніми роками вивченням фітопланктону в умовах посиленого антропогенного тиску займався В.О. Яковенко та частково С. О. Мельник [34–36].

Зміна якісних та кількісних показників фітопланктону. Умовно терміни проведення досліджень фітопланктону Запорізького водосховища можна поділити на періоди: до заповнення водосховища (1918–1931 рр.); роки першого затоплення (1931–1934); перший період існування водосховища (1935–1941 рр.); руйнування греблі і відновлення річкового режиму (1941–1946 рр.); післявоєнна відбудова: вторинне заповнення, після відбудови греблі (1946–1956 рр.); період інтенсивного гідробудівництва (1956(60)–1965 рр.) і період внутрішньокаскадного існування Запорізького водосховища (донині) [21, 32].

В перший період, за даними Б. Бішофа [14], у фітопланктоні Дніпра було виявлено 182 види водоростей, з яких до *Diatomaceae* належало 56 видів, *Protococcaceae* — 34, до інших *Chlorophyceae* — 57, *Zygnematophyceae* — 10, *Flagelata* — 23 (3 до *Dinoflagellata*) і *Cyanophyceae* — 2. В кінці травня — на початку липня, відмічався значний розвиток *Asterionella* sp. та *Actinastrum hantzschii*. На кінець травня спостерігалось збільшення *Protococaceae*, однак на початку липня їх поступово витісняють *Diatomaceae*. В середині ж липня домінуючим видом став *Ceratium hirundinella*. У вересні частка *Euglena acus* збільшилась, а *Ceratium hirundinella* — зменшилась. Однак, інформації, щодо кількісного співвідношення даних груп автор не наводить [17].

Домінуючими видами в Дніпрі були: *Asterionella* sp., *Melosira varians*, *M. granulate*, *Rholcosphenia curvata*, *Navicula placentula*, *N. rhynchocephala*, *N. sphaerophora* та *Synedra acus*.

Крім того, Б. Бішоф помітив, що якісні та кількісні показники фітопланктону певною мірою залежать від швидкості течії, так чим швидше течія, тим менше видове різноманіття фітопланктону. Зокрема, на клітини фітопланктону руйнівний вплив чинять пороги і водоспади, адже колоніальні водорості не витримують дії порогів і руйнуються. На течії найчисленнішою групою були *Diatomaceae*, завдяки їх міцній оболонці [10, 17].

За даними Д. О. Свіренка, протягом 1920–1924 рр. на ділянці річки навпроти м. Дніпропетровська було виявлено 245 видів фітопланктону. Групами, які домінували за чисельністю, були *Diatomaceae* (до 77% від загальної чисельності)

та *Protococcaceae* (до 52%). Також значного розвитку набували *Uroglena volvox* (до 5%), види роду *Anabana* (8%) та вид *Aphanizomenon flos-aquae* (7%) [10–12].

Автором встановлено певну періодичність розвитку планктону: пізньої весни і на початку та в середині осені спостерігається найбільший розвиток *Asterionella* sp. (16%); влітку — видів роду *Melosira* (до 65%). Суттєвий розвиток *Uroglena volvox* (до 7%) значною мірою спостерігався тільки взимку (грудень, лютий). Чисельність *Суанопхусеае* (до 30%) досягала свого піку в липні, а *Protococcaceae* (до 60%) — в теплий період року [11, 12].

Але, на думку автора, це все відносно: в різні роки спостерігалась неоднаковість. Наприклад, *Суанопхусеае* масового розвитку набули в 1922 р, а однорогі види роду *Pediastrum*, які виявлені у пробах у вересні 1921 та 1924 рр. в 1922 і 1923 рр. — не спостерігалися. Отже, у зв'язку з метеорологічними умовами час розвитку тих чи інших форм зсувається.

Д. О. Свіренко теж підтвердив руйнівну дію порогів, під впливом яких фітопланктон біднішає і якісно, і кількісно [10–12].

Дослідження фітопланктону Дніпра до спорудження греблі ДніпроГЕСу, на базі Гідробіологічної станції розпочалось у 1927–1928 рр. і тривало приблизно 6 років. Пунктом цілорічних стаціонарних досліджень було обрано середину Дніпра нижче Мерефо-Херсонського залізничного мосту. Експедиційно вивчали порожисту ділянку ріки в 11 пунктах, починаючи від ділянки Кодацького порога і закінчуючи так званою «Кічкаською ямою» [10, 16].

За період досліджень 1927–1933 рр. було зібрано 348 якісних проб фітопланктону. Загальна кількість видів, зафіксованих за 6 років досліджень, дорівнювала 204 (табл. 1).

Таблиця 1. Склад фітопланктону Дніпра до спорудження греблі ДніпроГЕСу

Table 1. The composition of the phytoplankton of the Dnieper river to the construction of the dam Dneproges

Групи/Groups	Кількість видів/ Number of species
<i>Суанопхусеае</i>	16
<i>Chrysomonadineae</i>	4
<i>Dinoflagellata</i>	3
<i>Diatomaceae</i>	95
<i>Euglenacea</i>	13
<i>Desmidiaceae</i>	9
<i>Volvocaceae</i>	7
<i>Protococcaceae</i>	55
<i>Xanthophyceae</i>	2

Найбіднішим щодо кількості видів був зимовий період (грудень–квітень), коли середній її рівень не перевищував 19 видів (а в лютому — 12) (рис. 1). Лише в червні починалося збільшення видового складу, який досягав свого першого

максимуму, в основному, за рахунок *Diatomaceae* (78%). В липні–серпні також спостерігалось поступове незначне збільшення видового складу, в основному, за рахунок представників *Protococaceae* (50%). В першій половині вересня спостерігався другий (більший) максимум переважно завдяки збільшенню видового різноманіття представників *Diatomaceae* та *Protococaceae* майже в рівних співвідношеннях (44 та 42% відповідно) [9–10].

Рис. 1. Усереднені дані кількості форм фітопланктону за місяцями (1928–1933 та 1934–1935 рр.)

Fig. 1. Averaged data on the number of phytoplankton forms by months (1928-1933 and 1934-1935 years)

Середні показники чисельності фітопланктону коливалися в різні сезони року (рис. 2). Хоча група *Diatomaceae* і була найчисельнішою за видовим складом (47%), однак пріоритетне значення у формуванні чисельності мали лише 2 роди: *Cyclotella* до 1700 тис. кл./дм³ і *Melosira* — до 968 тис. кл./дм³, що становить відповідно 24 та 14% від чисельності всього фітопланктону, а також види *Asterionella gracillima*, *Fragilaria virescens*, *Fragilaria crotonensis* та деякі планктонні форми *Synedra* та *Cyclotella meneghiniana* [9–10].

Крім того, у складі фітопланктону суттєву роль відігравали представники *Protococaceae*. Так, наприклад, у вересні 1930 р. їх чисельність дорівнювала 1160 тис. кл./дм³, що становить 68% від всієї чисельності фітопланктону. Серед *Protococaceae* в Дніпрі зустрічалися 14 родів, на відміну від групи *Diatomaceae*, яка була представлена 8 родами. Однак, лише представники роду *Ankistrodesmus* набували чисельності понад 500 тис. кл./дм³, з максимумом в першій половині червня — 610 тис. кл./дм³, а чисельність родів *Actinastrum* та *Scenedesmus* інколи перевищувала 100 тис. кл./дм³, але не сягала вище 262 тис. кл./дм³ [9–10].

Рис. 2. Усереднені дані чисельності фітопланктону Дніпра за місяцями в період 1928–1933 рр.

Fig. 2. Average number of phytoplankton of the Dnieper River in the months of 1928-1933 years

Також суттєве значення для формування чисельності відігравали *Cyanophyceae* (14%), за домінування представників родів *Anabaena*, *Microcystis* та виду *Aphanizomenon flos-aquae*, які досягали значної чисельності та викликали «цвітіння» води. Середня чисельність представників роду *Anabaena* протягом року становила 2 тис. кл./дм³, максимальна — була зафіксована з середини літа до першої половини вересня — близько 100 тис. кл./дм³; роду *Microcystis* — в основному становила не більше 10 тис. кл./дм³, лише в серпні досягаючи максимуму — 44 тис. кл./дм³; виду *Aphanizomenon flos-aquae* — представлена декількома десятками тисяч клітин на 1 л води [10].

Згідно з експедиційними дослідженнями фітопланктону 1928–1931 рр., встановлено, що характерною рисою фітопланктону порожистої частини було кількісне і якісне збідніння в результаті «обробки» порогами, порівняно з верхньою частиною, зокрема у Дніпрі вище порогів (табл. 2). Так, вище Кодацького порога чисельність, у середньому, становила близько 2 тис. кл./дм³, а в районі Кічкас була найменшою — близько 90 кл./дм³. Результатом цього явища є те, що у фітопланктоні порожистої частини спостерігається значна кількість пошкоджених форм, уламків. Видовий склад фітопланктону берегових заростей і заток характеризувався незначною кількістю видів порівняно з відкритим Дніпром [10].

У період другого етапу зміни в угрупованнях фітопланктону, в основному, були викликані процесом підняття рівня води внаслідок будівництва греблі ДніпроГЕСу та пов'язаним з цим падінням швидкості течії. Так, зникли непланктонні форми, види, вимиті з дна та перенесені течією з північних ділянок Дніпра, а завдяки відсутності порогів припинилося руйнування клітин фітопланктону і почалося збільшення їх чисельності.

Таблиця 2. Кількісний склад фітопланктону порожитої частини Дніпра за результатами експедиційних досліджень 1928–1931 рр.

Table 2. Quantitative composition of the phytoplankton of the forested part of the Dnieper by the results of expeditionary researches of 1928–1931 years

Групи / Group	Місце відбору / Place of selection								
	Вище Кода- ка / Above Ko- dazky rapid	Ниж- че Ко- дака / Below Ko- dazky rapid	Вище Нена- си- теця/ Above Nena- sitezky rapid	Нижче Нена- сити- ця/ Below Nena- sitezky rapid	Вище Вов- ниги/ Above Vov- niga	Ниж- че Вов- ниги/ Below Vov- niga	Вище Віль- ного/ Above Vilny	Ниж- че Віль- ного/ Below Vilny	Кічкас / Keck- kass
<i>Cyanophyceae</i>	45	108	29	37	1	9	-	200	6
<i>Chrysomonadineae</i>	19	7	2	-	1	5	2	1	-
<i>Dinoflagellata</i>	4	1	3	-	3	5	2	-	-
<i>Diatomaceae</i>	521	787	752	464	389	464	655	397	124
<i>Euglenaceae</i>	6	3	3	0	3	4	8	1	-
<i>Desmidiaceae</i>	3	1	-	-	-	1	1	-	-
<i>Volvocaceae</i>	47	41	11	10	11	10	106	-	5
<i>Tetrasporaceae</i>			2						
<i>Protococaceae</i>	1418	2164	580	479	583	685	4562	421	57
<i>Xanthophyceae</i>	7	9	13	2	18	2	6	10	1

Так, наприклад, вже в серпні 1931 р. на ділянці ріки в районі Кічкас (де раніше почалося підвищення води), чисельність фітопланктону досягла 5640 тис. екз./дм³, що майже в 20 разів вище, ніж до затоплення, що також пояснюється і затопленням територій, багатих на органічні елементи. Ці зміни наростали пропорційно до підняття рівня води, щороку все далі і далі від греблі, однак їх інтенсивність у цьому напрямку знижувалась. У 1932–1933 рр. було помічено загальне збідніння складу фітопланктону, особливо серед *Diatomaceae* (25 видів) та *Protococcaceae* (19 видів) [9, 10, 13, 14].

Щодо систематики, то видовий склад, за певним винятком, залишався майже той самий, що і в період до залиття водосховища. Проте, варто відзначити наступні зміни: з'явилися деякі форми, що раніше не зустрічалися (представники родів *Attheya*, *Rhizosolenia*) та збільшилася чисельність деяких форм порядку *Protococcales*.

Влітку 1934 р. спостерігалось максимальне збільшення чисельності *Cyanophyceae* до 270 тис. кл./дм³ і величезна вегетація *Bacillariales*, що становила приблизно 1 млн кл./дм³ у верхній частині водосховища [13, 14].

Щодо кількісного розвитку планктону, то після певного зменшення чисельності в перші роки підтоплення, у 1934 р. на певних ділянках спостерігалось значне його збільшення.

Також, у зв'язку зі зменшенням, а згодом і практично припиненням течії в

порожистій частині, поступово змінився вертикальний розподіл фітопланктону. Так, спостерігалось порівняно більше різноманіття у верхніх шарах, ніж це було раніше [13].

Повного об'єму водосховище набуло весною 1934 р. і власне з цього моменту почався третій етап — початок існування Дніпровського водосховища. В Дніпрі вище зони затоплення (напроти Верхньодніпровська) кількість форм у фітопланктоні на цей час досягала 90–96 видів. Щодалі, ближче до нижньої ділянки водосховища, спостерігалась менша кількість видів фітопланктону: так, у 1934 р. в Кічкаській пробі виявлено лише 33 види [13, 14]. Однак, на ділянці ріки в районі м. Дніпропетровська відбулося збільшення якісного складу фітопланктону, яке було пов'язано з тим, що затоплення на даній ділянці відбулося лише весною 1934 р. (див. рис. 1).

Найбільш суттєве збідніння якісного складу було помічено в групі *Diatomaceae*. Так, якщо загальний видовий склад зменшився на 63 види, то в групі *Diatomaceae* зникло 40 видів, що становить 2/3 загального зменшення. Як правило, зменшення кількості видів відбувалося за рахунок випадкових (вимитих, знесених) форм. Кількість *Protococcaceae* зменшилася на 16 видів.

В інших групах, які і до залиття водосховища характеризувалися незначною кількістю видів, спостерігалось незначне її зменшення. Наприклад, *Cyanophyceae* майже на всьому протязі водосховища мали у планктоні 7–10 форм і лише в нижній точці відбору (Кінчанс) було виявлено лише 2 форми. Не виявлено зменшення чисельності *Dinoflagellata*, *Desmidiaceae* і *Chrysomonadineae*, які представлені 3–4 формами. Чисельність же форм *Volvocaceae* в нижній частині водосховища зменшилася вдвоє [9, 10, 13, 14].

Поруч зі збіднінням якісного складу у водосховищі, відбувався протилежний процес — поява у нижній ділянці форм, які раніше, до затоплення, в Дніпрі не були зафіксовані. До таких форм належали *Diplopsalis acuta*, *Cryptomonas erosa*, а також представники роду *Oocystis*.

На ділянці річки поблизу м. Дніпропетровська чисельність фітопланктону підвищилась до 2440 тис. кл./дм³. Основна роль серед *Diatomaceae* належала представникам родів *Cyclotella*, *Melosira*, *Stephanodiscus*, кількість яких у верхніх ділянках водосховища обчислювалась декількома сотнями тисяч у літрі. Значну роль також посідали форми родів *Navicula*, *Synedra* та іноді — *Asterionella*, чисельність яких частіше була меншою ніж 100 тис. кл./дм³ [10, 11, 14].

Результати вивчення стану фітопланктону Запорізького водосховища свідчать, що його видове різноманіття збільшується від греблі до вершини водосховища.

Загалом, затоплення збагатило кількісний склад фітопланктону порожистої частини Дніпра її зменшило їх видове різноманіття, в основному за рахунок *Diatomaceae*. Однак, розвиток *Cyanophyceae* у різних пунктах спостереження показав, що вони краще розвивалися в Дніпрі вище греблі, ніж у верхніх частинах. Отже, зарегулювання течії не викликало збільшення їх розвитку.

Максимальна чисельність фітопланктону в період 1934–1940 рр. була зафіксована в точці відбору проб – Вище Кодака, становлячи — 1763 тис. кл./дм³, а мінімальна — в районі Кічкас, що дорівнювало 130 тис. кл./дм³; але, треба

відзначити, що показник був вищим, ніж у минулі роки [9, 10, 18].

Чисельність фітопланктону у водосховищі впродовж вегетаційних сезонів 1934–1940 рр. зростала і мала 3 піки: квітневий (понад 1,3 млн кл./дм³), червне-липневий (понад 2 млн кл./дм³) та останній — в листопаді (до 11,5 млн кл./дм³ за рахунок масового розвитку циклотели). Максимальна біомаса досягала 12,5 мг/дм³ [21].

В період 1941–1944 рр. у зв'язку з руйнуванням греблі, на місці водосховища відновилися пороги, швидкість течії зросла [27]. В цей період розвиток фітопланктону повторював такий до створення ДніпроГЕСу. Максимальна кількість водоростей відмічалась в передпорожистій частині (до 0,5 млн кл./дм³). Домінували водорості *Diatomaceae* та *Chlorococcales*. На центральній ділянці порожистого району чисельність мікроводоростей різко зменшувалася до 0,04–0,06 млн кл./дм³, а у пункті Кічкас — до 0,26 млн кл./дм³, що підтверджує руйнівну дію порогів [26, 27].

Вторинне заповнення після відбудови греблі в 1946 р. призвело до формування фітопланктону, аналогічно першому періоду заповнення водосховища. Однак, помічено збільшення «цвітіння» води за рахунок вегетації синьо-зелених водоростей. Так, у липні–вересні чисельність водоростей у поверхневих шарах досягала декілька млн кл./дм³. В перші роки «цвітіння» спостерігалось лише у верхніх ділянках водосховища, в основному, за рахунок наявності представників роду *Anabaena* (до 70% чисельності всього фітопланктону): далі воно розповсюджувалося на інші ділянки водосховища, де провідну роль відіграли роди *Aphanizomenon* (10%) та *Microcystis* (14%), хоча за біомасою домінували представники *Diatomaceae*. Загальна чисельність у максимального розвитку фітопланктону досягала 34 млн кл./дм³ з біомасою 9,1 мг/дм³ [18, 21, 26, 27].

У період 1947–1952 рр. З. С. Гаухман досліджувала фітопланктон Дніпровського водосховища на ділянці від м. Дніпропетровська до району Кічкаса (табл. 3), де пріоритетними групами залишалися *Diatomaceae* (38%), *Protococaceae* (22%) та *Cyanophyceae* (17%) (табл. 3) [24, 26, 28].

У 1947 р. основний комплекс форм складали типові дніпровські групи — представники родів *Melosira*, *Synedra*, *Pediastrum*, *Scenedesmus*, *Dictiospharium*, *Anabaena*, *Aphanizomenon*, *Microcystis* та ін.

У серпні 1947 р. в районі м. Дніпропетровська спостерігався масовий розвиток *Cyanophyceae*, в основному, за рахунок *Anabaena flos-aque* та *A. flos-aque f. spiroides*, які викликали «цвітіння» води при чисельності 1 млн кл./дм³. Високої чисельності набули також *Melosira granulata* та *M. italica* — до 1288 тис. кл./дм³ [25, 26].

Аналогічна картина спостерігалася на ділянці річки в районі с. Старі Кодаки, однак, крім вищезгаданих груп, ще зустрічалися представники *Protococcaceae* — *Pediastrum duplex*, *Ankistrodesmus falcatus*, *Dictyospharium pulchellum* та ін.

На ділянці Старі Кодаки–Звонецьке домінуючою групою були *Diatomaceae* (*Melosira*) (35% загальної чисельності фітопланктону), а Звонецьке–Вороне — *Cyanophyceae* (16%), що спричиняли «цвітіння» водойми [25].

Таблиця 3. Кількісний склад фітопланктону Запорізького водосховища (1947-1952 р.)

Table 3. Quantitative composition of the phytoplankton of the Zaporozhye reservoir (1947-1952)

Групи / Groups	Роки/ Years					
	1947	1948	1949	1950	1951	1952
<i>Cyanophyceae</i>	47	23	34	40	29	20
<i>Chrysomonadineae</i>	4	4	6	3	6	2
<i>Cryptomonadineae</i>	1	-	1	2	2	1
<i>Euglenaceae</i>	5	5	21	10	15	4
<i>Dinoflagellata</i>	11	6	6	6	9	4
<i>Diatomaceae</i>	128	96	82	79	57	19
<i>Desmidiaceae</i>	17	7	13	5	11	-
<i>Zygnemaceae</i>	1	1	1	2	1	1
<i>Volvocaceae</i>	7	8	5	8	7	9
<i>Protococaceae</i>	54	27	49	47	42	26
<i>Ulotrichales</i>	2	1	3	1	2	-
<i>Siphonocladiales</i> та <i>siphonales</i>	1	-	1	1		-
<i>Xanthophyceae</i>	-	1	-	1	-	-

Загалом у 1947 р. було виявлено 272 види фітопланктону. На ділянці ріки в районі м. Дніпропетровська відмічалось 105 видів, а в районі Кічкаса — 28–37 видів.

Експедиційні дослідження 1948–1950 рр. підтвердили дані, наведені вище, однак кількість видів зменшилася до 178 (1948 р.), 220 (1949 р.) та 205 (1950 р), частка *Diatomaceae* зросла в середньому до 54%, *Protococcaceae* становила 15%, а *Cyanophyceae* — 13% [24–26, 28].

У 1950 р. на відміну від інших років не було виявлено масового «цвітіння» водойми, хоча місцями вегетація водоростей була значною [23].

У 1951 р. чисельність *Diatomaceae* дорівнювала 1–3 млн кл./дм³ на всьому протязі водосховища (крім нижньої ділянки), *Protococaceae* та *Cyanophyceae* становила в середньому 600 тис. кл./дм³. У нижній частині водосховища спостерігалось інтенсивне «цвітіння» за рахунок *Cyanophyceae* (5 млн кл./дм³) [24, 28].

Помічено, що у відновленому водосховищі тенденція до зменшення якісного складу фітопланктону в напрямку донизу сильніше виражена, ніж в 1934–1935 рр., до того ж, тим краще проявляється, чим більше років пройшло з моменту відбудови греблі.

В 1952 році спостерігалось «цвітіння» води на ділянці ріки поблизу с. Свистуново і до колишнього порога Вільного, знову за рахунок *Anabena*, *Aphanizomenon*, чисельність яких досягала 25,5 млн кл./дм³ та *Melosira* — до 7,5

млн кл./дм³. Однак, при перерахунку на біомасу домінували *Diatomaceae*, досягаючи 25,5 мг/дм³ [22–24, 26].

Так, «цвітіння» води за рахунок синьо-зелених водоростей є найбільш яскравою рисою фітопланктону водосховища в літній період. Ділянки, що охоплені «цвітінням», змінюються з року в рік, спускаючись все нижче водосховищем за течією.

За даними З. С. Гаухман, у 1955 р. значних змін якісних і кількісних показників фітопланктону не помічено. В літньому фітопланктоні продовжувала збільшуватися частка синьо-зелених водоростей, які в серпні–вересні викликали інтенсивне «цвітіння» [26].

В період інтенсивного гідробудівництва, після побудови Дніпродзержинської і Кременчуцької гребель, видовий склад фітопланктону Запорізького водосховища збіднів, особливо в літній період — до 8–16 видів у пробі. Значне видове різноманіття спостерігалось лише в затоках (20–40 видів). В цілому, у водосховищі в окремі сезони нараховувалося від 31 до 72 видів мікрowodоростей, що в 2–3 рази менше, ніж у річці до зарегулювання, і у водосховищі за його верхнього положення в каскаді [24–28, 38].

За період 1962–1969 р. зареєстровано 161 вид, з яких до *Chlorophyta* належить 56, *Diatomoea* — 58, *Cyanophyceae* — 28, *Volvocaceae* — 16 видів, до *Euglenophyta*, *Chrysophyta*, *Pyrrophyta* — по 9 видів, до *Xanthophyceae* — 2 види. Однак, кількісно фітопланктон Запорізького водосховища досить багатий, так його чисельність в різні роки досягала весною — 6–8 млн кл./дм³, влітку — 30–138 млн кл./дм³, восени — 12–80 млн кл./дм³, а біомаса — 3–6; 3–15 та 0,6–6,0 мг/дм³ відповідно [39].

Починаючи з 1963 р., діатомові та протококові водорості розвивалися у водосховищі в значній кількості лише весною та восени, в літній же період основну масу (90–95%) складали синьо-зелені водорості. Так, у червні 1963 р. чисельність *Diatomaceae* становила 84 тис. кл./дм³, а біомаса — 0,098 мг/дм³, тоді як *Cyanophyceae* — 50 млн кл./дм³ і 3,722 мг/дм³ відповідно; в 1964 р. чисельність *Diatomoea* — 142 тис. кл./дм³, біомаса — 0,020 мг/дм³, тоді як *Cyanophyceae* — 200 млн кл./дм³ і 13,394 мг/дм³. Останнє в свою чергу, викликало бурхливе «цвітіння» води, що розповсюдилося практично на всю акваторію водосховища [39].

Після побудови Дніпродзержинської і Кременчуцької гребель роль *Anabaena* sp. в загальній масі синьо-зелених водоростей знижується, а *Aphanizomenon flos-aquae* та *Microcystis aeruginosa* — різко зростає. Якщо до побудови Дніпродзержинської греблі домінуюча роль належала *Aphanizomenon flos-aquae* (до 30%), то після — *Microcystis aeruginosa* (до 95% в літній період). Серед діатомових у весняний період переважали *Stephanodiscus hantzschii*, *Melosira granulata* та *M. italica*, *M. varians*, *Asterionella formosa* [38, 39].

У водосховищі спостерігається яскраво виражена вертикальна стратифікація фітопланктону, особливо в літній період, коли він представлений, в основному, *Cyanophyceae* (більше 80%). В поверхневому 3–5-метровому шарі сконцентрована основна маса фітопланктону, а товща води з глибинами 20–40 м практично залишається незаселеною. В результаті цього, незважаючи на досить інтенсивний

розвиток фітопланктону, концентрація його в перерахунку на всю водну товщу становила в серпні 1963 р. 2,9 мг/дм³, а в червні 1964 р. — 5,6 мг/дм³ [40, 41].

Біомаса фітопланктону з 1963 по 1969 р. невпинно збільшувалася від 2,8 до 14,3 мг/дм³, тобто приблизно в 4–5 разів [31, 40].

До 1987 р. список водоростей налічував 204 види і внутрішньовидові таксони, хоча А. Д. Приймаченко (без публікації переліку видів) вказує, що у водосховищі знаходиться 310 (339) видів і внутрішньовидових таксонів [27–30, 38].

У 1981–1986 рр. чисельність та біомаса фітопланктону продовжує помітно збільшуватися від верхньої ділянки водосховища до греблі — від 0,375 до 25,9 млн кл/дм³ і від 2,0 до 17,0 мг/дм³ відповідно. Впродовж 1981–1986 рр. середні показники біомаси становили 6 мг/дм³ (рис. 3).

Частина водосховища/Parts of the reservoir

Рис. 3. Сезонна динаміка біомаси фітопланктону Запорізького водосховища (1981–1986 рр.)

Fig. 3. Seasonal dynamics of biomass of phytoplankton of Zaporozhye reservoir (1981–1986 years)

Максимальні показники біомаси водоростей відмічалися літом в поверхневому шарі води в Самарській затоці і ділянках ріки, що знаходяться нижче.

У 1986–1987 рр. середні показники біомаси становили весною 1,0–3,2 мг/дм³, влітку — 7,8–120,0 мг/дм³ в плямах «цвітіння», восени — 2–9 мг/дм³. За даними авторів, більше 80% площі водосховища інтенсивно «цвіте». Влітку 80–89% біомаси складають *Cyanoophyceae* [15, 32].

В період внутрішньокаскадного існування Запорізького водосховища літнє «цвітіння» *Cyanoophyceae* спостерігалось щорічно. Максимальні показники біомаси в плямах «цвітіння» сягали понад 100 мг/дм³; середні величини за вегетаційний період становили приблизно 9 мг/дм³. У багатоводні роки середня біомаса за вегетаційний період зменшувалася до 3,0 мг/дм³. Найбільш продуктивною була середня частина водосховища, де біомаса коливалась від 4,6 до 44,8 мг/дм³. У сезонній динаміці спостерігалися весняний максимум

Diatomaceae, що співпадає з паводковим припливом біогенів. Другий максимум — літній — більше весняного в 4–5 разів, відбувається загалом за рахунок цвітіння *Cyanophyceae* [10, 32, 33].

На сучасному етапі функціонування Запорізьке водосховище знаходиться під посиленням антропогенним тиском. Промислові та побутові стічні води, за неефективної роботи очисних систем, потрапляючи у водосховище, призводять до трансформації альгоценозів і посилюють «цвітіння» через вегетацію синьо-зелених водоростей [35].

У 2012 р. перший пік вегетації фітопланктону спостерігався в березні–квітні, і був подовжений до 3 тижнів через квітневе похолодання. Максимум біомаси припадав на 31 березня – до 22 мг/дм³. Другий пік, зумовлений розвитком синьо-зелених водоростей *Microcystis aeruginosa*, був зареєстрований з липня до початку жовтня з максимумом біомаси на рівні 75 мг/дм³ [21, 42, 43].

У 2015–2016 рр. фітопланктон водосховища був представлений 74 видами і внутрішньовидовими таксонами, які відносились до 5 відділів: *Chlorophyta* (33%), *Bacillariophyta* (34%), *Cyanoprocarvota* (24%), *Euglenophyta* (6%) та *Pyrrophyta* (3%). В період весняного цвітіння, яке відбувалося в основному за рахунок *Melosira islandica*, кількість фітопланктону становила в середньому 34,0 млн кл./дм³, а максимальна біомаса у поверхневому шарі води досягала 37,0 мг/дм³. Однак, синьо-зелені водорості були домінуючою групою протягом більшої частини вегетаційного періоду. Біомаса фітопланктону виду *Microcystis aeruginosa* досягла максимальних значень у серпні — понад 90 мг/дм³, а цвітіння синьо-зелених водоростей тривало до початку жовтня.

В районах, що постраждали від дії стічних вод (ділянки річки поблизу фестивального причалу в м. Дніпро, заводу імені Петровського, річкового порту, с. Військове), протягом 2015–2016 рр. спостерігалися коливання показників біомаси в широких межах — від 0,1 до 95,2 мг/дм³. Найбільші чисельність і біомаса фітопланктону були зареєстровані на ділянці біля с. Військове, де спостерігається найнижча швидкість течії [34–36].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Фундаментальні дослідження фітопланктону Запорізького водосховища були розпочаті Д. О. Свіренком, який визначив видовий склад та основні закономірності вегетації фітопланктону річки Дніпро, як до її зарегулювання, так і в період першого затоплення площ при будівництві водосховищ. Він першим в Україні окреслив вплив природних порогів та будівництва гребель на угруповання фітопланктону. Також значний внесок у розвиток гідробіологічних досліджень зробили З. С. Гаухман, В. А. Федій, А. Д. Приймаченко та інші вчені, чий праці розглянуті в даній статті.

У водосховищі, за винятком деяких років, що може бути пов'язано як із погодними умовами, так і іншими чинниками простежується тенденція щодо зменшення кількості видів від 182 (245) до зарегулювання стоку — до 80 форм — у період першого затоплення, і до 74 видів і внутрішньовидових таксонів на сьогоdnішньому етапі існування.

Показники біомаси і чисельності фітопланктону, навпаки, мають зворотну динаміку. Так, у середньому до зарегулювання чисельність фітопланктону в різних пунктах становила 40–2000 тис. кл./дм³, при першому затопленні — 130–1800 тис. кл./дм³, при другому затопленні — декілька млн клітин, і на сучасному етапі, в періоди інтенсивної вегетації досягає 34 млн кл./дм³, що приблизно в 20 разів вище, ніж до початку гідробудівництва. За період 1946–2017 рр. середня біомаса фітопланктону збільшилася приблизно в 5 разів.

За період існування водосховища відбулися і якісні зміни: так, типові домінуючі групи *Diatomaceae* та *Protococcaceae* були поступово витіснені *Cyanophyceae*, особливо в літньо-осінній період, коли чисельність і біомаса *Microcystis aeruginosa* досягали максимальних значень.

Все вищесказане свідчить про безумовний вплив на різноманітність і чисельність фітопланктону як зарегульованості стоку, так і дії інших факторів, таких як кліматичні зміни, антропогенне навантаження тощо.

ЛІТЕРАТУРА

1. Федоненко О. В., Шарамок Т. С. Видатні діячі гідробіологічної науки // Вісник Дніпропетровського університету. 2008. Т. 2, вип. 16. С. 172—177. (Біологія. Екологія).
2. Радзимовский Д. А. Дмитрий Онисифорович Свиренко (1888–1944) // Гидробиологический журнал. 1969. Т. 5, № 2. С. 91—93.
3. Байдак Л. А. Діяльність видатного українського гідробіолога Д. О. Свіренка в період побудови Дніпрогесу (1927–1941 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету. Т. 21, № 1/2. С. 126—132. (Історія і філософія науки і техніки).
4. Свіренко Д. О. Дніпропетровська гідробіологічна станція та її науково дослідча робота // Вісник Дніпропетровської гідробіологічної станції. 1929. Т. 1. С. 3—7.
5. Байдак Л. А., Свіренко Д. О. Підсумки вивчення гідроекологічних наслідків побудови Дніпрогесу (1927–1941 рр.) // Збірник наукових праць. Історія та географія. 2013. Вип. 47. С. 200—205.
6. Свіренко Д. О. Фітопланктон порожистої частини р. Дніпра, водойм її допливів і балок та його зміни під впливом побудов греблі Дніпрельстану // Вісник Дніпропетровської гідробіологічної станції. 1937. Т. 2. С. 63—69.
7. Свіренко Д. О. Дніпровське водосховище. В 5 т. Т. 4. Фітопланктон водосховища і його заток // Вісник Дніпропетровської гідробіологічної станції. 1938. Вип. 1. 306 с.
8. Свиренко Д. О. Материалы по фитопланктону низовьев р. Днепра // Труды Всеукраинской государственной Черноморско-Азовской научно-промышленной опытной станции. 1925. Т. 1. С. 205—232.
9. Свиренко Д. О. Альгологические исследования р. Днепра, 1920–1924 гг. // Русский архив протистологии. 1926. Т. 5, вып. 1–2. С. 63—109.
10. Свиренко Д. О. Исследование Днепровского водохранилища им. Ленина // Водохранилища для промышленного и питьевого водоснабжения. 1934. С. 45—57.
11. Свиренко Д. О. Исследования Днепровского водохранилища им. Ленина // Материалы совещания при институте ВОДГЕО. Москва : ВОДГЕО, 1934. С. 18—24.

12. Свіренко Д. О. Значення, завдання, план, програми і хід гідробіологічних досліджень порожистої частини Дніпра в зв'язку з побудуванням греблі Дніпрольстану // Вісник Дніпропетровської гідробіологічної станції. 1937. Т. 2. С. 3—5.
13. Свіренко Д. О. Дніпровське водосховище I. Вступ // Вісник Дніпропетровської гідробіологічної станції. 1938. Т. 3. С. 69—120.
14. Bischoff B. Das Pflanzenplankton im unteren Dnieper bei Alexandrowsk (Ukraine) // Botanic archive. 1922. № 1. P. 107—125.
15. Приймаченко А. Д. Запорожское водохранилище // Фитопланктон и первичная продукция Днепра и Днепровских водохранилищ. Киев : Наукова думка, 1981. С. 74—79.
16. Ролл Я. В. До вивчення фітопланктону середньої течії р. Дніпра // Збірник праць Дніпровської гідробіологічної станції. 1930. Ч. 5. С. 269—296.
17. Радзимовський Д. О. Про фітопланктон середньої течії р. Дніпра // Збірник праць Дніпровської гідробіологічної станції. 1930. Ч. 5. С. 403—411.
18. Запорожское водохранилище / Дворецкий А. И. и др. Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2000. 169 с.
19. Гидроэкология Приднепровья: история, современное состояние, перспективы / Дворецкий А. И. и др. Днепропетровск : Гамалія, 2010. 112 с.
20. Цимбалюк В. А. Фитопланктон и фитобентос притоков порожистой части Днепра (по данным 1944—1946 гг.) // Вестник Днепропетровского института гидробиологии. 1948. Т. VIII. С. 46—57.
21. Гаухман З. С. Фитопланктон и фитобентос среднего течения Днепра и его придаточной системы // Вестник Днепропетровского НИИ гидробиологии. 1960. Т. 12. С. 35—58.
22. Гаухман З. С. Фитопланктон и фитобентос среднего течения Днепра // Научный сборник научно-исследовательского института гидробиологии. Экспериментальная гидробиология. 1965. С. 35—55.
23. Гаухман З. С. Формирование фитопланктона Днепровского водохранилища после его восстановления // Вестник Днепропетровского научно-исследовательского института гидробиологии. 1955. Т. 11. С. 29—56.
24. Гаухман З. С. Фитопланктон порожистой части Днепра (материалы 44—46 гг.) // Вестник Днепропетровского института гидробиологии. 1948. Т. VII. С. 25—39.
25. Гаухман З. С. Фитопланктон и фитобентос среднего течения Днепра и его придаточной системы // Вестник Днепропетровского НИИ гидробиологии. 1960. Т. XII. С. 35—57.
26. Приймаченко А. Д. Закономерности формирования и развития фитопланктона в днепровских водохранилищах // Гидробиологический режим Днепра в условиях зарегулированного стока. Киев : Наукова думка, 1967. С. 176—193.
27. Федий В. А. Влияние сточных вод пищевой промышленности на фитопланктон Самарского залива Днепровского водохранилища // Гидробиологический журнал. 1966. Т. 2, № 4. С. 55.
28. Федий С. П., Мисюра А. В. Влияние промышленных сточных вод на видовой состав, численность и биомассу пресноводного фитопланктона // Биологическое самоочищение и формирование качества воды. Москва : Наука, 1975. С. 85—88.

29. Миссюра А. В. Фитопланктон и первичная продукция Запорожского водохранилища // Проблемы охраны и рационального использования ресурсов Запорожского водохранилища : сборник научных трудов. 1988. С. 74—91.
30. Кириленко А. С. Фитопланктон Запорожского водохранилища // Вода: проблемы и решения : V науч.-практ. конф. : тезисы докл. Днепропетровск : Гамалия, 1999. С. 78—81.
31. Кириленко А. С. Фітопланктон Запорізького водосховища // Вода: проблеми и решения : V науч.-практ. конф. : тезисы докл. Днепропетровск : Гамалия, 1999. С. 78—81.
32. Мельник С. Сезонна динаміка фітопланктону Запорізького водосховища 2015 року // Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи : Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 16-17 груд. 2015 р., ТДСГДС ІКСГП НААН, м. Тернопіль : тези доп. Тернопіль : Крок, 2015. С. 48—50. URL : http://econf.at.ua/publ/konferencija_2015_12_16_17 (дата звернення : 15.12.2015).
33. Yakovenko V., Melnik S., Fedonenko E. Species Composition, Seasonal Dynamics and Distribution of Phytoplankton of the Zaporizke Reservoir // International Letters of Natural Sciences. Vol. 62. P. 1—10. URL : [doi:10.18052/www.scipress.com/ILNS.62.1](https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILNS.62.1) (accessed : 13.12.2016).
34. Мельник С., Яковенко В., Федоненко Е. Фитопланктон как запас продовольствия для рыб Запорожского водохранилища // Академику Л. С. Берг — 140 : сборник научных статей. Бендеры : ELAN POLIGRAF, 2016. С. 440—443.
35. Ролл Я. В., Марковский Б. М. Планктон среднего Днепра в связи с прогнозом Кременчугского водохранилища // Зоологический журнал. 1955. № 4. С. 506—577.
36. Рябов Ф. П. Некоторые особенности физико-химического и микробиологического режимов Днепра и Днепровского водохранилища в связи с сооружением Кременчугской ГЭС и образованием Кременчугского водохранилища : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.105 «Гидробиология», 03.096 «Микробиология». Днепропетровск, 1968. 20 с.
37. Растительность и бактериальное население Днепра и его водохранилищ / Сиренко Л. А. и др. Киев : Наукова думка, 1989. 228 с.
38. Приймаченко А. Д. Закономерности формирования и развития фитопланктона в днепровских водохранилищах // Гидробиологический режим Днепра в условиях зарегулированности стока. Киев : Наукова думка, 1967. С. 176—195.
39. Приймаченко А. Д., Литвинова М. А. Распределение и динамика синезеленых водорослей в Днепровских водохранилищах // «Цветение» воды. Киев : Наукова думка, 1968. С. 42—67.
40. Дворецкий А. І., Кириленко А. С., Білоконь А. С. Сучасний гідроекологічний стан екосистеми Дніпровського водосховища // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2005. Вип. 3 (26). С. 135—136. (Серія : Біологія).
41. Самоочищение Днепровского водохранилища как ведущий фактор формирования экологически безопасной среды существования рыб / Дворецкий А. И. и др. // Рибогосподарська наука України. 2014. № 4. С. 26—36.

REFERENCES

1. Fedonenko, O. V., & Sharomok, T. S. (2008). Vydatni diiachi hidrobiolohichnoi nauky. *Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Biologiya. Ekologiya*, 2, 16, 172-177.
2. Radzimovskiy, D. A. (1969). Dmitriy Onisiforovich Svirenko (1888–1944). *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 5, 2, 91-93.
3. Baidak, L. A. (2013). Diialnist vydatnoho ukrainskoho hidrobiologa D. O. Svirenka v period pobudovy Dniprohesu (1927-1941 rr.). *Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Istorii i filosofii nauky i tekhniki*, 21, 1–2, 126-132.
4. Svirenko, D. O. (1929). Dnipropetrovska hidrobiolohichna stantsiia ta yii naukovu doslidchu robota. *Visnyk Dnipropetrovskoi hidrobiolohichnoi stantsii*, 1, 3-9.
5. Baidak, L. A., & Svirenko, D. O. (2013). Pidsumky vyvchennia hidroekolohichnykh naslidkiv pobudovy Dniprohesu (1927–1941 rr.). *Zbirnyk naukovykh prats. Seriia Istorii ta heohrafiia*, 47, 200-205.
6. Svirenko, D. O. (1937). Fitoplankton porozhystoi chastyny r. Dnipra, vodoim yii doplyviv i balok ta yoho zminy pid vplyvom pobudov hrebli Dniprelstanu. *Visnyk Dnipropetrovskoi hidrobiolohichnoi stantsii*, 2, 63-69.
7. Svirenko, D. O. (1938). Dniprovskie vodokhovysheche. (Vol. 1-5). Fitoplankton vodokhovyshecha i yoho zatok. *Visnyk Dnipropetrovskoi hidrobiolohichnoi stantsii*, 4, 1. Dnipropetrovsk.
8. Svirenko, D. O. (1925). Materialy po fitoplanktonu nizov'ev r. Dnepra. *Trudy Vseukrainskoy gosudarstvennoy Chernomorsko-Azovskoy nauchno-promyshlenoy opytной stantsii*, 1, 205-232.
9. Svirenko, D. O. (1926). Al'gologicheskie issledovaniya r. Dnepra, 1920-1924 gg. *Russkii arkhiv protistologii*, 5, 1-2, 63-109.
10. Svirenko, D. O. (1934). Issledovanie Dneprovskogo vodokhranilishcha im. Lenina. *Vodokhranilishcha dlya promyshlennogo i pit'evogo vodosnabzheniya*, 45-57.
11. Svirenko, D. O. (1934). Issledovaniya Dneprovskogo vodokhranilishcha im. Lenina. *Materialy soveshchaniya pri institute VODGEO*. Moskva : VODGEO, 18-24.
12. Svirenko, D. O. (1937). Znachennia, zavdannia, plan, prohramy i khid hidrobiolohichnykh doslidzhen porozhystoi chastyny Dnipra v zviazku z pobuduvanniam hrebli Dniprolstanu. *Visnyk Dnipropetrovskoi hidrobiolohichnoi stantsii*, 2, 3-5.
13. Svirenko, D. O. (1938). Dniprovskie vodokhovysheche I. Vstup. *Visnyk Dnipropetrovskoi hidrobiolohichnoi stantsii*, 3, 69-120.
14. Bischoff, B. (1922). Das Pflanzenplankton im unteren Dnieper bei Alexandrowsk (Ukraine). *Botanic archive*, 1, 107-125.
15. Priymachenko, A. D. (1981). *Zaporozhskoe vodokhranilishche. Fitoplankton i pervichnaya produktsiya Dnepra Dneprovskikh vodokhranilishch*. Kiev: Naukova dumka, 74-79.
16. Roll, Ya. V. (1930). Do vyvchennia fitoplanktonu serednoi techii r. Dnipra. *Zbirnyk prats Dniprovskoi hidrobiolohichnoi stantsii*, 5, 269-296.
17. Radzymovskiy, D. O. (1930). Pro fitoplankton serednoi techii r. Dnipra. *Zbirnyk prats Dniprovskoi hidrobiolohichnoi stantsii*, 5, 403-411.
18. Dvoretzkiy, A. I., Ryabov F. P., Emets, G. P., Galinskiy, V. A., Zagubizhenko, N. I., & Antonenko, G. M. (2000). *Zaporozhskoe vodokhranilishhe*. Dnipropetrovsk: Vidavnistvo Dnipropetrovskogo universitetu.

19. Dvoretzkiy, A. I., Baydak L. A., & Lomakin, P. I. (2010). *Gidrojekologija Pridneprov'ja: istorija, sovremennoe sostojanie, perspektivy*. Dnepropetrovsk: Gamaliya.
20. Tsimbalyuk, V. A. (1948). Fitoplankton i fitobentos pritokov porozhistoy chasti Dnepra (po dannym 1944–1946 gg). *Vesnik Dnepropetrovskogo isnituta gidrobiologii, VIII*, 46-57.
21. Gaukhman, Z. S. (1960). Fitoplankton i fitobentos srednego techeniya Dnepra i ego pridatochnoy sistemy. *Vestnik Dnepropetrovskogo NII gidrobiologii, 12*, 35-58.
22. Gaukhman, Z. S. (1965). Fitoplankton i fitobentos srednego techeniya Dnepra. *Nauchnyy sbornik nauchno-issledovatel'skogo instituta gidrobiologii. Eksperimental'naya gidrobiologiya*, 35-55.
23. Gaukhman, Z. S. (1955). Formirovanie fitoplanktona Dneprovskogo vodokhranilishcha posle ego vosstanovleniya. *Vesnik Dnepropetrovskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta gidrobiologii, 11*, 29-56.
24. Gaukhman, Z. S. (1960). Fitoplankton i fitobentos srednego techeniya Dnepra i ego pridatochnoy sistemy. *Vestnik Dnepropetrovskogo NII gidrobiologii, 12*, 35-58.
25. Gaukhman, Z. S. (1948). Fitoplankton porozhistoy chasti Dnepra (materially 44–46 gg.). *Vesnik Dnepropetrovskogo instituta gidrobiologii, VII*, 25-39.
26. Gaukhman, Z. S. (1960). Fitoplankton i fitobentos srednego techeniya Dnepra i ego pridatochnoy sistemy. *Vestnik Dnepropetrovskogo NII gidrobiologii, XII*, 35-57.
27. Fediy, V. A. (1966). Vliyanie stochnykh vod pishchevoy promyshlenosti na fitoplankton Samarskogo zaliva Dneprovskogo vodokhranilishcha. *Gidrobiologicheskij zhurnal, 2, 4*, 55.
28. Fediy, S. P., & Misyura, A. V. (1975). Vliyanie promyshlennykh stochnykh vod na vidovoy sostav, chislennost' i biomassu presnovodnogo fitoplanktona. *Biologicheskoe samoochishchenie i formirovanie kachestva vody*. Moskva: Nauka, 85-88.
29. Missyura, A. V. (1988). Fitoplankton i pervichnaya produktsiya Zaporozhskogo vodokhranilishcha. *Sbornik nauchnykh trudov. Problemy okhrany i ratsional'nogo ispol'zovaniya resursov Zaporozhskogo vodokhranilishcha*, 74-91.
30. Kirilenko, A. S. (1999). Fitoplankton Zaporozhskogo vodokhranilishcha. *Materialy V nauchno-prakticheskoy-konferentsii. Voda: problemy i resheniya: tezisy dop.* Dnepropetrovsk: Gamaliya, 78-81.
31. Kyrylenko, A. S. (1999). Fitoplankton Zaporizkoho vodoshkovyshcha. *Voda: problemy i rishennia : Materialy V naukovo-praktychnoi konferentsii.* Dnepropetrovsk: Hamalyia, 78-81.
32. Melnyk, S. (2015). Sezonna dynamika fitoplanktonu Zaporizkoho vodoshkovyshcha 2015 roku. Modernizatsiia natsionalnoi systemy upravlinnia derzhavnym rozvytkom: vyklyky i perspektyvy : materialy mizhnar. nauk.-prakt. Internetkonf. 16–17 hrudn. 2015 r. Ternopil: Krok, 48-50. *econf.at.ua*. Retrieved from http://econf.at.ua/publ/konferencija_2015_12_16_17.
33. Yakovenko, V., Melnik, S., & Fedonenko, E. (2017). Species Composition, Seasonal Dynamics and Distribution of Phytoplankton of the Zaporizke Reservoir. *International Letters of Natural Sciences*, 62. www.scipress.com. Retrieved from <http://doi:10.18052/www.scipress.com/ILNS.62.1>.
34. Mel'nik, S., Yakovenko, V., & Fedonenko, E. (2016). Fitoplankton kak zapas prodovol'stviya dlya ryb Zaporozhskogo vodokhranilishcha. *Akademiku L. S. Berg - 140: Sbornik nauchnykh statey*. Bendery: ELAN POLIGRAF, 440-443.

35. Roll, Ya. V. (1955). Markovskiy B.M. Plankton srednego Dnepra v svyazi s prognozom Kremenchugskogo vodokhranilishcha. *Zoologicheskij zhurnal*, 4, 506-577.
36. Ryabov, F. P. (1968). Nekotorye osobennosti fiziko-khimicheskogo i mikrobiologicheskogo rezhimov Dnepra i Dneprovskogo vodokhranilishcha v svyazi s sooruzheniem Kremenchugskoy GES i obrazovaniem Kremenchugskogo vodokhranilishcha. *Extended abstract of Doctor's thesis*. Dnepropetrovsk.
37. Sirenko, L. A., Korelyakova, I. L., & Kondrat'eva, N. V. (1989). *Rastitel'nost' i bakterial'noe naselenie Dnepra i ego vodokhranilishch*. Kiev: Naukova dumka.
38. Priymachenko, A. D. (1967). *Zakomernosti formirovaniya i razvitiya fitoplanktona v dneprovskikh vodokhranilishchakh. Hidrobiologicheskij rezhim Dnepra v usloviyakh zaregulirovanosti stoka*. Kiev: Naukova dumka, 176-195.
39. Priymachenko, A. D., & Litvinova, M. A. (1968). Raspredelenie i dinamika sinezelenykh vodorosley v Dneprovskikh vodokhranilishchakh. *Tsvetenie vody*. Kiev: Naukova dumka, 42-67.
40. Dvoret'skiy, A. I., Kirilenko, A. S., & Bilokon', A. S. (2005). Suchasniy gidroekologichniy stan ekosistemi Dniprovs'kogo vodoshkovishcha. *Naukovi zapiski TNPU im. V. Gnatyuka. Ser. Biologiya*, 3 (26), 135-136.
41. Dvoret'skiy, A. I., Zaichenko, O. I., Baidak, L. A., & Kyrylenko, A. S. (2014). *Samoochyshchennia Dniprovskoho vodoshkovyshcha yak providnyi chynnyk formuvannia ekolohichno bezpechnoho seredovyshcha isnuvannia ryb. Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 26-36.

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 42-51

DOI: 10.15407/fsu2019.02.042

УДК [639.3.043.13:636.087.72]:597-1.05

Received 08.02.2019

Received in revised form 21.03.2019

Accepted 10.05.2019

ВПЛИВ МІНЕРАЛУ БЕНТОНІТ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД М'ЯЗІВ КОРОПА (*CYPRINUS CARPIO* LINNAEUS, 1758)

О. О. Батуревич, shtefan_91@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

Мета. Вивчити вплив бентоніту — мінералу природного походження, введеного до складу основного раціону однорічок коропа — на вміст ліпідів і їх окремих класів та хімічний склад м'язів з метою встановлення ефективності та оптимальних норм використання в годівлі коропа.

Методика. Дослідження проведені в лабораторії кормів і годівлі риб на базі Інституту рибного господарства НААН в умовах акваріумів-аналогів впродовж 27 діб. Об'єктом дослідження були однорічки нивківського лускатого коропа. В експерименті було задіяно контрольну та п'ять дослідних груп. Коропам дослідних груп додатково до складу основного раціону було введено бентоніт з розрахунку 0,1%, 0,2%, 2,0%, 5,0% і 10,0% від загальної маси корм.

Визначення вмісту загальних ліпідів проводили ваговим методом Фолча, вміст окремих класів ліпідів — методом тонкошарової хроматографії. Масову частку білка визначали за методом К'ельдаля, вміст жиру — за методом С. В. Рушковського.

Експериментальні роботи проведено за загальноприйнятими у рибництві методиками.

Результати. У дослідженнях проаналізовано вплив згодовування однорічкам коропа бентоніту у складі основного раціону на біохімічні показники організму. Дано порівняльну характеристику ефективності використання даної кормової добавки в різних концентраціях під час вирощування риби в лабораторних умовах.

В результаті проведених експериментальних досліджень встановлено, що введення до складу корму бентоніту в кількості 0,2; 2,0 та 5,0% приводить до збільшення вмісту триацилгліцеролів та до зниження вмісту ефірів холестеролу в м'язах однорічок коропа. Крім того, за введення 2,0% бентоніту відмічено тенденцію до збільшення вмісту фосфоліпідів на 10,0% відносно Контролю. Вміст загальних ліпідів у м'язах коропа був найвищим за введення бентоніту до складу корму з розрахунку 10% з одночасним підвищенням вмісту сухої речовини на 6%, відносно Контролю.

За згодовування бентоніту з розрахунку 0,1; 0,2; 2,0; 5,0 та 10,0% у складі основного раціону встановлено збільшення вмісту протеїну у м'язах коропа відповідно на 7,3; 9,9; 16,2; 11,3 та 19,4% відносно Контролю.

Наукова новизна. При проведенні досліджень в акваріальних умовах, враховуючи властивості бентоніту, вперше було вивчено його вплив на поживність м'яса, вміст загальних ліпідів та співвідношення їх окремих класів у м'язах однорічок коропа. За результатами досліджень встановлено ефективні норми введення даного мінералу до складу раціону.

Практична значимість. Дослідження ефективності введення бентоніту до основного раціону коропа в лабораторних умовах є актуальним, оскільки існують проблеми пошуку засобів підвищення рибопродуктивності у процесі вирощування, що потребують нових шляхів та методів вирішення. З огляду на позитивні напрацювання, дослідження доцільності

© О. О. Батуревич, 2019

застосування та встановлення норм введення бентоніту до раціону коропа є перспективними та мають практичне значення.

Ключові слова: бентоніт, короп, фізіолого-біохімічні показники, ліпіди.

EFFECT OF MINERAL BETONIT ON CHEMICAL COMPOSITION OF CARP (*CYPRINUS CARPIO* LINNAEUS, 1758) MUSCLES

O. Baturevich, shtefan_91@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To study the effect of bentonite mineral added to the basic diet of age-1 carps on the content of lipids and their individual classes as well as on the chemical composition of muscles to establish the efficiency of its optimal rates for carp feeding.

Methodology. The study was conducted at the laboratory of fish feeds and feeding of the Institute of Fisheries NAAS in conditions of aquariums-analogues for 27 days. The object of the study were age-1 Nyvka scaled carp. The experiment included one control group and five experimental groups. Carp of experimental groups were fed with feeds with added bentonite ratios as follows: 0.1%, 0.2%, 2%, 5%, and 10%.

The determination of the content of common lipids was carried out by Folch's weight method, the content of individual lipid classes by thin-layer chromatography. The weight content of protein was determined by Kjeldahl method, fat content – by S.V. Rushkovsky method.

The experimental works were conducted according to generally accepted fisheries methods.

Findings. The study analyzed the effect of feeding age-1 carps with non-activated bentonite clay in the composition of basic ration on biochemical parameters of fish organism. A comparison of the efficiency of the use of this dietary supplement at different concentrations during fish growing in laboratory conditions was carried out.

The conducted experimental studies showed that addition of bentonite to feed composition at an amount from 0.2% to 5% of feed weight contributed to an increase in triacylglycerol and decrease in cholesterol ester content in the muscles of age-1 carp. In addition, a 10% increase in phospholipids ($P < 0.5$) after the addition of 2% bentonite to the feed relative to the control was observed. The content of total lipids in carp muscles was highest after adding bentonite to feed composition at an amount of 10% as well as a significant increase in the content of dry substance, protein, and fat compared to control by 6% ($p < 0.05$), 19.4% ($p < 0.01$) and 1.7%, respectively, was observed. Feeding with bentonite at the amount of 2 and 5% of the feed resulted in an increase in protein content by 16.2% ($p < 0.01$) and 10.2% ($p < 0.05$), respectively.

Originality. The study in aquarium conditions allowed studying the effect of bentonite on the nutritional value of meat, the content of total lipids and the ratio of their individual classes in the muscles of age-1 carp. According to the results of researches, the effective doses of the addition of this mineral to the ration composition were established.

Practical value. The study of the efficiency of addition of bentonite to the basic diet of carp in laboratory conditions is topical, since there are problems of finding tools for increasing the productivity of fish in the process of rearing, which require new ways and methods for their solution. In view of the positive obtained results, studying the advisability of the use and finding the rates of bentonite supplementation to carp diet are promising and have practical values.

Key words: bentonite, carp, physical-biochemical parameters, lipids.

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛА БЕНТОНИТ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЫШЦ КАРПА (*CYPRINUS CARPIO* LINNAEUS, 1758)

О. А. Батуревич, shtefan_91@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Изучить влияние бентонита — минерала природного происхождения, введенного в состав основного рациона годовиков карпа на содержание липидов, их отдельных классов и

химический состав мышц с целью установления эффективности и оптимальных норм использования в кормлении карпа.

Методика. Исследования проведены в лаборатории кормов и кормления рыб на базе Института рыбного хозяйства НААН в условиях аквариумов-аналогов на протяжении 27 суток. Объектом исследования были годовики нивчанского чешуйчатого карпа. В эксперименте были задействованы контрольная и пять опытных групп. Карпам опытных групп дополнительно в состав основного рациона вводили бентонит из расчета 0,1; 0,2, 0; 2,0; 5,0 и 10,0% от общей массы корма.

Определение содержания общих — липидов проводили весовым методом Фолча, содержание отдельных классов липидов — методом тонкослойной хроматографии. Массовую долю белка определяли по методу Кьельдаля, содержание жира — по методу С. В. Рушковского.

Экспериментальные работы проведены по общепринятым в рыбоводстве методиками.

Результаты. В исследованиях проанализировано влияние скармливания годовикам карпа глины бентонитовой неактивированной в составе основного рациона на биохимические показатели организма. Дана сравнительная характеристика эффективности использования данной кормовой добавки в различных концентрациях во время выращивания рыбы в лабораторных условиях.

В результате проведенных экспериментальных исследований отмечено, что введение в состав корма бентонита в количестве 0,2; 2,0 и 5,0% приводит к увеличению содержания триацилглицеролов и, параллельно, — к снижению содержания эфиров холестерина в мышцах годовиков карпа. Кроме этого, при введении 2,0% бентонита отмечено тенденцию к повышению содержания фосфолипидов на 10% относительно Контроля. Содержание общих липидов в мышцах карпа было самым высоким при введении бентонита в состав корма из расчета 10,0%, с одновременным повышением содержания сухого вещества на 6% относительно Контроля.

При скармливании бентонита из расчета 0,1; 0,2; 2,0; 5,0 и 10,0% в составе основного рациона, установлено увеличение содержания протеина в мышцах карпа соответственно на 7,3; 9,9; 16,2; 11,3 и 19,4% относительно Контроля.

Научная новизна. При проведении исследований в аквариальных условиях, исходя из свойств бентонита, впервые было изучено его влияние на питательность мяса, содержание общих липидов и соотношение их отдельных классов в мышцах годовиков карпа. По результатам исследований установлены эффективные нормы введения данного минерала в состав рациона.

Практическая значимость. Исследование эффективности введения бентонита в основной рацион карпа в лабораторных условиях является актуальным, поскольку существуют проблемы поиска средств повышения рыбопродуктивности в процессе выращивания, требующие новых путей и методов решения. Учитывая положительные наработки, исследования целесообразности применения и установления норм введения бентонита в рацион карпа являются перспективными, а также имеют практическое значение.

Ключевые слова: бентонит, карп, физиолого-биохимические показатели, липиды.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

На всіх етапах онтогенезу організм риб постійно зазнає впливу чинників техногенного та природного походження, тому дуже важливо дотримуватись оптимальних технологічних параметрів в процесі вирощування та годівлі риб. Адже відомо, що серед передумов безпечності та якості продуктів харчування особливої важливості набуває контроль якісних характеристик складових

компонентів кормів та кожного з етапів їх виробництва [1]. Збалансована та нормована годівля є вагомим аспектом під час вирощування коропа. Тому введення до основного раціону нових кормових добавок, які б могли забезпечити підвищення відсотка засвоєння кормів та їх поживних елементів, є актуальним і вкрай важливим.

Потреби риб в основних елементах живлення забезпечуються шляхом вдосконалення раціону в залежності від їх віку, виду та умов вирощування, з урахуванням впливу окремих компонентів комбікорму на обмін речовин, резистентність і фізіологічні показники організму, та, відповідно, якості отриманої рибної продукції [2]. Тому оптимізація складу раціону, безумовно, є основним засобом забезпечення енергетичних потреб організму та підвищення продуктивної дії комбікормів. Зокрема, це досягається шляхом введення до складу основного раціону риб високоенергетичних, легкоперетравних вітамінних та мінеральних добавок [3].

Серед сучасних тенденцій при вирощуванні тварин різних етапах в процесі інтенсифікації виробництва продукції, перспективним є додавання природних алюмосилікатів (цеолітів, сапонітів, бентонітів, глауконітів), які характеризуються мінеральними, іонообмінними та сорбційними властивостями і є доступними для широкого використання, оскільки їх поклади безпосередньо на території України складають сотні мільйонів тонн [4]. Серед перелічених мінералів особливий інтерес для рибицтва складає мінерал природного походження — бентоніт, що широко використовується у харчових технологіях, медицині та фармакології, при виготовленні добрив та у якості кормових добавок для тварин [5–8]. Встановлено, що бентоніт має високу ємність катіонного обміну, в'язучі властивості, пластичність та сорбційну здатність. Саме завдяки цьому даний мінерал сприяє виведенню з організму радіонуклідів, сполук важких металів і газів, що є актуальним в процесі ведення рибного господарства [9, 10].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Перспективним є використання глини бентонітової неактивованої в годівлі коропа в якості мінеральної добавки до основного раціону із сорбуючими властивостями [11–13]. Враховуючи, що мінерали природного походження використовують в сільському господарстві, тваринництві та рибицтві [3, 5, 7], актуальним є дослідження ефективності застосування бентоніту в годівлі коропа.

У наших дослідженнях вперше було застосовано мінерал природного походження — бентоніт — в годівлі однорічок коропа з метою встановлення оптимальних норм введення до складу основного раціону.

Основна мета дослідження полягала у вивченні впливу введення однорічкам коропа різних концентрацій бентоніту на деякі ланки обміну ліпідів і хімічний склад м'язів риб.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Серію експериментальних випробувань в лабораторних умовах було проведено на базі Інституту рибного господарства НААН. Дослідження з визначення впливу введення до основного раціону однорічок коропа бентоніту на

деякі біохімічні показники їх організму здійснювали за загальноприйнятими у рибництві правилами постановки дослідів. Було здійснено оцінку впливу додавання до раціону коропа бентоніту на вміст загальних ліпідів і їх окремих класів та поживність м'яса, в залежності від кількості введеної добавки.

Об'єктом дослідження були однорічки нивківського внутрішньопородного типу української лускатої породи коропа середньою масою 25 г. Для годівлі риб використовували збалансований комбікорм, до складу якого додатково вводили бентоніт методом замішування. Комбікорм вносили в акваріуми один раз на добу в ранковий час. Добова кількість комбікорму становила 3–5% від маси риби.

Предметом дослідження був бентоніт в неактивованій формі з родовища «Дашуківські бентоніти» Черкаської області.

Перед проведенням дослідів 10 діб тривав зрівняльний період, протягом якого коропів утримували в оптимальних умовах. Після адаптації риб до умов утримання сформовано експериментальні групи відповідно до мети дослідження. Коропів утримували в акваріумах з постійною аерацією за середньої температури 18–20°C. Експеримент складався із п'яти дослідних та контрольного варіантів і тривав 27 діб.

В Досліді 1 до основного раціону додатково до складу корму введено бентоніт в кількості 0,1%, в Досліді 2 — 0,2%, в Досліді 3 — 2,0%, в Досліді 4 — 5,0%, в Досліді 5 — 10,0%. Контрольна група риб утримувалася в аналогічних умовах, та отримувала основний раціон без додавання бентоніту.

Після завершення дослідів відібрано зразки скелетних м'язів із краніально-дорзальної частини тулуба для подальших досліджень.

Визначення хімічного складу м'язів проводили за традиційними методиками зоотехнічного аналізу [14].

Ліпіди із скелетних м'язів екстрагували сумішшю хлороформ-метанолу у співвідношенні 2 : 1 за методом Фолча. Ліпіди на класи розділяли методом тонкошарової хроматографії на силікагелі у системі гексан-діетиловий ефір — льодова оцтова кислота у співвідношенні 70 : 30 : 1 і визначали їх кількість біхроматним методом [15].

Отримані цифрові результати опрацьовували статистично за допомогою пакету програм «Microsoft Excel». Виразовували середні арифметичні величини ($\bar{M}$), середню квадратичну помилку (m) та вірогідність різниць між досліджуваними середньоарифметичними величинами (P) [16].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Вміст ліпідів у тканинах риб свідчить про активність анаболічних процесів в організмі і використовуються вони організмом у якості енергетичного джерела. Крім того, доведено їх залучення в адаптивних перебудовах структурних компонентів клітин, тканин та органів [17, 18]. Саме тому важливо дослідити механізм дії бентоніту на енергетичну ланку організму риб та оцінити залежність вмісту окремих класів ліпідів від різних його концентрацій в кормах.

При оцінці результатів досліджень впливу згодовування однорічкам коропа різної кількості бентоніту на вміст загальних ліпідів і співвідношення їх окремих класів (рис. 1) не встановлено різниці у загальному вмісті ліпідів у м'язах риб

Дослідів 1–4 відносно Контролю. Їх вміст у даних групах був однаковим, складаючи у кожній з груп 7,33 мг/г тканин.

Дещо більший вміст загальних ліпідів виявлено в Досліді 5 (на 9,1%) відносно Контролю. Такі зміни свідчать про те, що згодовування бентоніту в кількості 10,0% від корму здатне приводити до інтенсивнішого засвоєння поживних речовин з їжі за рахунок сповільнення її просування у кишечнику та збільшення в'язкості кормової грудки [11].

Важливою ліпідною фракцією в організмі коропа є фосфоліпіди, які виступають структурними складовими елементами біологічних мембран та беруть участь у різних біохімічних та фізіологічних процесах [19].

Згідно з отриманими результатами наших досліджень, можна відзначити, що вміст фосфоліпідів у тканинах м'язів досліджуваних риб був вищим у Дослідах 3 і 5, в порівнянні з контролем, на 9,9 та 5,9% відповідно.

Таке незначне підвищення рівня фосфоліпідів в тканинах коропа, найімовірніше, пов'язано з інтенсифікацією фосфорного обміну, що є одним із проявів активізації адаптаційно-приспосувальних реакцій організму [18].

Щодо інших класів ліпідів, встановлено збільшення частки резервних ліпідів — триацилгліцеролів у Дослідах 2–5 у порівнянні з контролем. Найбільший відсоток їх підвищення відносно контролю встановлено в Дослідах 3 і 5 (на 12,4 та 23,8% відповідно), що пояснюється типовою реакцією у відповідь на дію токсичного чинника за рахунок ущільнення мембран [20]; разом з тим, у цих групах не встановлено зростання вмісту диацилгліцеролів, що свідчить лише про позитивний вплив на організм риб, оскільки в подальшому вони будуть використані в енергетичних процесах, що особливо важливо у період зимового голодування [21, 22].

Рис. 1. Загальний вміст ліпідів, (мг/г сирової маси) та співвідношення їх окремих класів у скелетних м'язах одnorічок коропа, % ($M \pm m$, $n = 3$)

Fig. 1. Total lipid content, (mg / g of crude mass) and the ratio of their individual classes in the skeletal muscle of the carp, % ($M \pm m$, $n = 3$)

При дослідженні класу ліпідів за впливу бентоніту було встановлено зниження вмісту ефірів холестеролу в Дослідах 2, 3 і 4 відповідно на 3,4; 3,6 та 11,0% в порівнянні з Контролем. Ймовірно, це пов'язано з підвищенням функціональної активності тканин, що можливо, вказує на зміни процесів гідролізу холестеролу [23]. Зазначимо незначне збільшення вмісту ненасичених жирних кислот відносно контролю у Досліді 2 на 9,2% і зниження їх концентрації у Досліді 3 на 8,9%, що є проявом критеріїв оцінки спрямування ліпідного метаболізму: збільшення їх кількості є свідченням ліполізу, а зменшення — активації синтезу ліпідів [24].

Наступним кроком експериментальних досліджень було проведення оцінки поживності м'яса коропів експериментальних груп (табл. 1).

Таблиця 1. Хімічний склад м'язів однорічок коропа, % ($M \pm m$, $n = 3$)

Table 1. Chemical composition in the carp muscle, % ($M \pm m$, $n = 3$)

Група риб / Group of fishes	Суха речовина / Dry basis	Протеїн / Protein	Жир / Fat
Контроль / Control	19,80 $\pm$ 0,56	12,37 $\pm$ 0,17	4,10 $\pm$ 0,10
Дослід 1 / Experiment 1	20,47 $\pm$ 0,15	13,27 $\pm$ 0,27*	3,93 $\pm$ 0,07
Дослід 2 / Experiment 2	19,83 $\pm$ 0,12	13,60 $\pm$ 0,32*	1,73 $\pm$ 0,09***
Дослід 3 / Experiment 3	19,50 $\pm$ 0,15	14,37 $\pm$ 0,20**	2,27 $\pm$ 0,22**
Дослід 4 / Experiment 4	20,23 $\pm$ 0,15	13,77 $\pm$ 0,26*	2,57 $\pm$ 0,43*
Дослід 5 / Experiment 5	21,00 $\pm$ 0,00*	14,77 $\pm$ 0,13***	4,17 $\pm$ 0,03

Примітка. Різниця статистично вірогідна порівняно з контрольною групою: * — $P < 0.05$, ** — $P < 0.01$, *** — $P < 0,001$.

Note. Difference is statistically significant compared to the control group: * — $P < 0.05$, ** — $P < 0.01$, *** — $P < 0,001$.

Згідно з отриманими результатами біохімічних досліджень, за умови збагачення раціону однорічок коропа бентонітом у різних концентраціях встановлено покращення біохімічного складу м'язів за рахунок підвищення в дослідних зразках вмісту протеїну. Так, у м'язах цього літо коропа вміст протеїну у всіх дослідних групах був достовірно вищим в порівнянні з Контролем. Найкращі показники були представлені в Дослідах 3 і 5, де протеїн був вищим на 16,2 та 19,4% відповідно.

Низькі концентрації вмісту жиру у дослідних та контрольному зразках, на нашу думку, пов'язані з його активним використанням під час зимівлі, оскільки, ймовірно, в тілі досліджуваних риб його концентрація була вищою, ніж така протеїну, що й спричинило більші його витрати [25]. У поданих варіантах досліджень, в порівнянні з контролем, не підвищується вміст жиру за рахунок внесення бентоніту, що, за нашим припущенням, може бути пов'язано з виснаженням досліджуваних риб після зимівлі.

В Дослідах 1, 4 і 5 в порівнянні з Контролем, встановлено незначне збільшення сухої речовини за рахунок зростання вмісту протеїну в тканинах, що відповідно на 3,4; 2,2 та 6,0% більше, ніж в м'язах риб Контрольної групи. Разом з тим, в Дослідах 2 та 3 суттєвих змін даного показника не встановлено.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

В результаті проведення експериментальних досліджень у акваріальних умовах, при внесенні до основного раціону однорічок коропа бентоніту у різних концентраціях, встановлено збільшення вмісту триацилгліцеролів у м'язах Дослідних груп 2–4 та зниження при цьому ефірів холестеролу відносно Контролю.

Одночасно з цим, у цьоголіток коропа відмічається зростання вмісту протеїну у всіх Дослідних групах в порівнянні з Контролем на 7,3; 9,9; 16,2; 11,3 та 19,4%, відповідно до збільшення кількості бентоніту неактивованого у раціоні.

В подальшому плануються дослідження з визначення дії бентоніту на організм коропа в природних умовах, з метою оцінювання ефективності його впливу на основні рибогосподарські показники.

ЛІТЕРАТУРА

1. Левицький Т. Р. Оцінка безпечності технологічних кормових // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. 2014. Вип. 15, № 4. С. 76—82.
2. Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб / Шерман І. М. та ін. Київ : Вища освіта, 2002. 130 с.
3. Ермакова С. В. Применение природных цеолитов в промышленном рыбоводстве // Биологические ресурсы водоемов бассейнов Балтийского моря : XXII науч. конф. по изучению водоемов Прибалтики : тезисы докл. Вильнюс, 1987. С. 52—53.
4. Проскурко А. И. Минеральные ресурсы Украины: охрана и рациональное использование. Київ : Вища школа, 1989. 179 с.
5. Наседкин В. В., Кваша Ф. С., Стаханов В. В. Бентонит в промышленности России. Москва : ГЕОС, 2001. 136 с.
6. Сало Д. П., Овчаренко Ф. Д., Круглицкий Н. Н. Высокодисперсные минералы в фармации и медицине. Киев: Наукова думка, 1969. 226 с.
7. Кармацких Ю. А. Использование бентонита в кормлении лошадей // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2007. № 1 (13). С. 134—137.
8. Цуциев А. В., Дзагуров Б. А. Бентонитовая підкормка в рационе свиней // Зоотехнія. 2008. № 11. С. 19—20.
9. Нікіпелова О. М. Результати фізико-хімічних досліджень бентоніту Дашуковського родовища // Вісник Одеського національного університету. 2014. Т. 19, вип. 3. С. 70—75.
10. Аракелян Ф. Р. Биологические основы применения бентонита в животноводстве : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. биол. наук. Ереван : ЕрЗВИ, 1991. 47 с.
11. Безкровна Н. І. Використання природних цеолітів для підвищення ефективності годівлі коропа за умов вирощування на теплих скидних водах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.10 «Іхтіологія». Київ, 1994. 25 с.
12. Сатретдинов А. К. Бентониты в кормлении свиней // Зоотехнологія. 2004. № 4. С. 7—9.

13. Гелета О. Л., Кічняєв А. М., Ляшок В. І. Мінеральні ресурси України: глини. Ч. 1. Генезис та основні властивості глин. Коштовне та декоративне каміння, 2011. № 3. С. 20—31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ktdk_2011_3_7 (дата звернення: 10.04.19).
14. Методики зоотехнических и биохимических анализов кормов, продуктов обмена и животноводческой продукции. Дубровицы : ВНИИЖ, 1978. 128 с.
15. Kates M. Techniques of lipidology. Amsterdam : Elsevier, 1986. 451 p.
16. Руководство по биометрии для зоотехников / Плохинский Н. А. Москва : Колос, 1969. 256 с.
17. Храбко М. І., Рівіс Й. Ф., Грициняк І. І. Вплив згодовуваного цинку на рівень ліпідів у тканинах організму та ріст коропів // Рибогосподарська наука України. 2011. № 1. С. 85—88.
18. Вплив добавок хлориду хрому на обмін ліпідів в печінці, скелетних м'язах і зябрах дворічок коропа / Смолянінов К. Б. та ін. // Біологія тварин. 2011. Т. 13, № 1–2. С. 239—242. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bitv_2011_13_1-2_38. Дата звернення (12.04.19).
19. Steffens W. Effects of variation in essential fatty acids in fish feeds on nutritive value of freshwater fish for humans // Aquaculture, 1997. Vol. 151. P. 97—119.

REFERENCES

1. Levytskyi, T. R. (2014). Otsinka bezpechnosti tekhnolohichnykh kormovykh dobavok. *Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu biolohii tvaryn i Derzhavnoho naukovo-doslidnoho kontrolnoho instytutu vetpreparativ ta kormovykh dobavok*, 4, 76-82.
2. Sherman , I. M., Hrynzhovskyi, M. V., Zheltov, Yu. O., Pylypenko, Yu. V., Volichenko, M. I., & Hrytsyniak, I. I. (2002). *Naukove obhruntuvannia ratsionalnoi hodivli ryb*. Kyiv: Vyshcha osvita.
3. Ermakova, S. V., & Arshavskij, D. S. (1987). Primenenie prirodnyh ceolitov v industrial'nom rybovodstve. *Biologicheskie resursy vodoemov bassejnov Baltijskogo morja: XXII nauch. konf. po izucheniju vodoemov Pribaltiki: Tez. dokl. Vil'njus*, 52-53.
4. Proskurko, A. I. (1989). *Mineral'nye resursy Ukrainy: ohrana i racional'noe ispol'zovanie*. Kiev: Vyshcha shkola.
5. Nasedkin, V. V., Kvasha, F. S., & Stahanov, V. V. (2001). *Bentonit v promyshlennosti Rossii*. Moskva: GEOS.
6. Salo, D. P., Ovcharenko, F. D., & Kruglickij, N. N. (1969). *Vysokodispersnye mineraly v farmacii i medicine*. Kiev: Naukova dumka.
7. Karmackih, Ju. A. (2007). Ispol'zovanie bentonita v kormlenii loshadej. *Izvestija Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*, 1(13), 134-137.
8. Cuciev, A. V., & Dzagurov, B. A. (2008). Bentonitovaja pidkormka v racione svinej *Zootehnija*, 11, 19-20.
9. Nikipelova, O. M. (2014). Rezultaty fizyko-khimichnykh doslidzhen bentonitu Dashukovskoho rodovyshcha. *Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu*, 3, 70-75.
10. Arakeljan, F. R. (1991). Biologicheskie osnovy primenenija bentonita v zhivotnovodstve. *Extended abstract of Doctor's thesis*. Erevan: ErZVI.

11. Bezкровна, N. I. (1994). Vykorystannia pryrodnykh tseolitiv dlia pidvyshchennia efektyvnosti hodivli koropa za umov vyroshchuvannia na teplykh skydnykh vodakh. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv.
12. Satretidinov, A. K. (2004). Bentonity v kormlenii svinej. *Zootehnologija*, 4, 7-9.
13. Heleta, O. L., Kichniaiev, A. M., & Liashok, V. I. (2011). Mineralni resursy Ukrainy: hlyny. Henezys ta osnovni vlastyvoli hlyn Koshtovne ta dekoratyvne kaminnia 3. *nbuv.gov.ua*. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ktdk_2011_3_7.
14. *Metodiki zootehnicheskikh i biohimicheskikh analizov kormov, produktov obmena i zhivotnovodcheskoj produkcii*. (1978). Dubrovicy: VNIIZh.
15. Kates, M. (1986). *Techniques of lipidology*. Amsterdam: Elsevier.
16. Plohinskij, N. A. (1969). *Rukovodstvo po biometrii dlja zootehnikov*. Moscow: Kolos.
17. Khrabko, M. I., Ravis, Y. F., & Hrytsyniak, I. I. (2011). Vplyv zghodovuvanoho tsynku na riven lipidiv u tkanynakh orhanizmu ta rist koropiv. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 85-88.
18. Smolianinov, K. B., Nevostruieva, I. V., Holova, N. V., Vudmaska, I. V., & Yanovych, V. H. (2011). Vplyv dobavok khlorydu khromu na obmin lipidiv v pechintsi, skeletnykh miazakh i ziabrah dvorichok koropa. *Biolohiia tvaryn*. *nbuv.gov.ua*. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bitv_2011_13_1-2_38.
19. Steffens, W. (1997). Effects of variation in essential fatty acids in fish feeds on nutritive value of freshwater fish for humans. *Aquaculture*, 151, 97-119.

ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ НА МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОКУНЯ (*PERCA FLUVIATILIS* LINNAEUS, 1758) В РІЗНІ СЕЗОНИ РОКУ

М. В. Причеп, prichepa1987@ukr.net, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Мета. Вивчити зміну морфо-фізіологічних та біохімічних показників самиць окуня річкового за різних сезонів та за впливу антропогенного навантаження.

Методика. Відлов риб здійснювали з використанням гачкових знарядь лову. В роботі були визначені морфо-фізіологічні показники окуня річкового, зокрема гонадосоматичний індекс, гепатосоматичний індекс, індекс селезінки. Також було досліджено біохімічні показники: вміст білка, ліпідів, глікогену та малонового діальдегіду у тканинах.

Результати. Було розглянуто зміну морфо-фізіологічних (індекс печінки, індекс селезінки, гонадосоматичний індекс) та біохімічних (вміст глікогену, ліпідів та білка) показників у самиць окуня за надмірного антропогенного впливу. Значне зниження вмісту енергемістких сполук, зокрема глікогену, білка та жирів у печінці риб у весняний та осінній періоди, а також зростання вмісту малонового діальдегіду вказують на порушення швидкості процесів пластичного й енергетичного обміну у цій тканині. Зміна зазначеного показника підтверджує наявність несприятливих умов існування для окуня під час проведення досліджень. Водойма характеризується найбільшим антропогенним навантаженням на екосистему. В результаті цього додатково витрачаються енергемісткі сполуки, зокрема ліпіди та глікоген. Показано суттєву варіабельність індексу печінки у риб за надмірного антропогенного впливу. Цьому сприяли особливості накопичення та використання енергемістких сполук залежно від умов існування. Було показано вірогідно нижчі величини індексу селезінки у риб оз. Кирилівського порівняно з аналогічним показником з водосховища. Також було встановлено зниження гонадосоматичного індексу (ГСІ) у самиць окуня з антропогенно забрудненого оз. Кирилівське в 1,6 раза порівняно з рибами з умовно чистого водосховища. Це свідчить про напружене функціонування репродуктивної системи в умовах хронічного забруднення водойми. У тканинах печінки виявлено менший (на 43%) вміст білка у риб із оз. Кирилівського протягом усіх сезонів порівняно з окунем, виловленим у водосховищі. Це вказує на додаткове використання білкових сполук на адаптивні процеси. Різниця між досліджуваними вибірками риб за фізіолого-біохімічними та морфо-фізіологічними показниками доводить, що вони перебувають у суттєво відмінних екологічних та токсикологічних умовах. Погіршення умов існування спричиняє перевитрати енергемістких сполук, зокрема глікогену, білка та ліпідів.

Наукова новизна. Вперше представлені результати зміни морфо-фізіологічних та біохімічних показників самиць окуня річкового залежно від сезону та рівня антропогенного навантаження.

Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані як критерії для оцінки фізіологічного стану окуня та екологічного стану окремого озера чи малого водосховища в цілому.

Ключові слова: окунь, самиця, морфо-фізіологічні показники, енергемісткі сполуки, адаптивна реакція, антропогенний вплив, метаболізм.

EFFECT OF ANTROPOGENIC POLLUTION OF WATERBODIES ON MORPHO-PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF *PERCA FLUVIATILIS* LINNAEUS, 1758 IN DIFFERENT SEASONS OF THE YEAR

М. Prychepa, prichepa1987@ukr.net, Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv

Purpose. To study the change in morphophysiological and biochemical parameters of perch females during different seasons and under the effect of human impact.

Methodology. Fish were caught with the use of hook and line gears. Morpho-physiological parameters of the perch, including gonadosomatic index, hepatosomatic index, spleen index were determined. The biochemical parameters were also determined including protein content, lipids, glycogen and malonic dialdehyde in tissues.

Findings. Changes in morpho-physiological (liver index, spleen index, gonadosomatic index) and biochemical (glycogen, lipid and protein content) parameters in perch females for under excessive human impact were examined. In this paper, only a part of the total amounts of results were presented. A significant decrease in the content of energy-intensive compounds, in particular glycogen, protein and fats in fish liver in spring and autumn periods, as well as an increase in the content of malonic dialdehyde indicates an impairment of the rate of processes of plastic and energy metabolism in it. The change in this parameter confirms the presence of unfavorable conditions for the perch during the study. This water body is characterized by the most significant human impact on the ecosystem. As a result, stored compounds such as lipids and glycogen are additionally used. A significant variability of the liver index in fish with excessive human impact was shown. This was due to the peculiarities of the accumulation and use of energy-intensive compounds depending on the conditions of existence. Significantly lower values of the spleen index were observed in fish from the Lake Kyrilovske compared with the same parameter of fish from the reservoir. A 1.6-fold reduction in the gonadosomatic index (GSI) in perch females from the artificially polluted Lake Kyrilovske compared with fish from conditionally clean reservoir was also observed. This indicates the intense functioning of the reproductive system in conditions of chronic pollution of the lake. The liver tissues showed lower (by 43%) protein content in fish from the Lake Kyrilovske during all seasons compared to the perch caught in the reservoir. This indicates an additional use of protein compounds for adaptive processes. A difference between the studied fish samples according to physiological, biochemical, and morphophysiological indicators proves that they are in significantly different ecological and toxicological conditions. The deterioration of living conditions causes over-expenses of energy-intensive compounds, in particular glycogen, protein and lipids.

Originality. For the first time, the results of changes in morphophysiological and biochemical parameters of perch females depending on the season and the level of human impact have been presented.

The practical value. The obtained results can be used as criteria for assessing the physiological state of the perch and the ecological state of an individual lake or small reservoir as a whole.

Key words: perch, female, morpho-physiological indices, energy-intensive compounds, adaptive reaction, human impact, metabolism.

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОЕМА НА МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОКУНЯ (*PERCA FLUVIATILIS* LINNAEUS, 1758) В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА

М. В. Причепя, prichepa1987@ukr.net, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

Цель. Изучить изменение морфо-физиологических и биохимических показателей самок окуня речного в различные сезоны и при влиянии антропогенной нагрузки.

Методика. Отлов рыб осуществляли с использованием крючковых орудий лова. В

работе были определены морфо-физиологические показатели окуня речного, в частности гонадосоматический индекс, гепатосоматический индекс, индекс селезенки. Также были определены биохимические показатели: содержание белка, липидов, гликогена и малонового диальдегида в тканях.

Результаты. Были рассмотрены изменения морфо-физиологических (индекс печени, индекс селезенки, гонадосоматический индекс) и биохимических (содержание гликогена, липидов и белка) показателей у самок окуня при чрезмерном антропогенном воздействии. Значительное снижение содержания энергоемких соединений, в частности гликогена, белка и жиров в печени рыб в весенний и осенний периоды, а также рост содержания малонового диальдегида указывают на нарушение скорости процессов пластического и энергетического обмена в этой ткани. Изменение указанного показателя подтверждает наличие неблагоприятных условий существования для окуня во время проведения исследований. Водоем характеризуется наибольшей антропогенной нагрузкой на экосистему. В результате этого дополнительно расходуются энергоемкие соединения, в частности липиды и гликоген. Показана существенная вариабельность индекса печени у рыб при избыточном антропогенном воздействии. Этому способствовали особенности накопления и использования энергоемких соединений в зависимости от условий существования. Были показаны достоверно меньшие величины индекса селезенки у рыб оз. Кирилловского по сравнению с аналогичным показателем из водохранилища. Также было установлено снижение гонадосоматического индекса (ГСИ) у самок окуня из антропогенно загрязненного оз. Кирилловское на 1,6 раза по сравнению с рыбами из условно чистого водохранилища. Это свидетельствует о напряженном функционировании репродуктивной системы в условиях хронического загрязнения водоема. В тканях печени выявлено меньшее (на 43,3%) содержание белка у рыб из оз. Кирилловского в течение всех сезонов по сравнению с окунем, выловленным в водохранилище. Это указывает на дополнительное использование белковых соединений на адаптивные процессы. Разница между исследуемыми выборками рыб по физиолого-биохимическим и морфо-физиологическим показателям доказывает, что они находятся в существенно отличных экологических и токсикологических условиях. Ухудшение условий существования вызывает перерасход энергоемких соединений, в частности гликогена, белка и липидов.

Научная новизна. Впервые представлены результаты изменения морфо-физиологических и биохимических показателей самок окуня речного в зависимости от сезона и уровня антропогенной нагрузки.

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы в качестве критериев для оценки физиологического состояния окуня и экологического состояния отдельного озера или малого водохранилища в целом.

Ключевые слова: окунь, самка, морфо-физиологические показатели, энергоемкие соединения, адаптивная реакция, антропогенное воздействие, метаболизм.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Відомо, що зростання рівня урбанізації неминуче призводить до збільшення антропогенного впливу на водойми [1, 2]. Передусім це відображається на видовому розподілі гідробіонтів, а також може виступати в якості негативного чинника щодо структурно-функціональних показників їх угруповань [3]. Вивчення специфічних та загальних змін в їх організмі є одним із завдань на шляху до розробки критеріїв екологічного моніторингу водойм [4]. Риби (особливо хижаки), як кінцева трофічна ланка водних систем характеризуються здатністю накопичувати в собі цілий комплекс впливів чинників природного та антропогенного походження [5, 6]. Це робить їх чудовими моделями для

проведення моніторингових досліджень, зокрема це стосується тих показників, які б характеризували фізіологічний стан та якість середовища існування [4]. Як правило, мінливість абіотичних та біотичних чинників, зокрема, трофності водойм, вмісту розчиненого кисню, температури, у комплексі з антропогенним навантаженням сприяє змінам морфо-фізіологічних та біохімічних показників, що характеризують стан організму [7]. Сьогодні для оцінки якості водного середовища та його придатності для існування організмів все частіше застосовуються екотоксикологічні методи, які останнім часом набувають більшої популярності серед вчених багатьох країн світу [8, 9]. Вони дозволяють за реакціями біоти, які виявляються на всіх рівнях організації, оцінити екологічний стан місця існування живих організмів [10, 11].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Враховуючи той факт, що антропогенне навантаження продовжує посилюватись, надалі слід очікувати погіршення екологічної ситуації навіть у відносно чистих за показниками якості води водних об'єктах. Саме тому пошуки та розробка наукових основ охорони природного різноманіття водних екосистем в умовах урбанізації сьогодні є надзвичайно актуальними [1]. Для оцінки наслідків антропогенного впливу на водойму важливо не тільки визначити вміст у ній тих чи інших токсичних сполук, але й встановити рівень їх впливу на біоту. Методи біоіндикації, що набули популярності останнім часом, досить чутливі, оскільки живий організм здатен сприймати нижчі концентрації токсикантів, ніж будь-який аналітичний датчик [9]. Нині значною мірою оцінку екологічного стану проводять за змінами видового та кількісного складу організмів макрзообентосу, фітопланктону, макрофітів. Проте вони дають лише поверхневу картину якості водного середовища. Для виявлення хронічної дії токсикантів на біоту необхідно використовувати зміни фізіологічного стану організмів із тривалим циклом розвитку, зокрема риб [4]. Для повнішого зображення картини екологічного стану водойми, важливу роль відіграє вибір модельних об'єктів для біомоніторингу. Доцільно використовувати ті види риб, які займають різні екологічні ніші, розділені таксономічно і мають широкі межі поширення [12]. Враховуючи біологічні особливості окуня річкового як активного пелагічно-придонного хижака, він є перспективним модельним об'єктом для проведення біомоніторингу якості води для водойм, що підлягають надмірному антропогенному навантаженню. Найбільшою мірою привертають увагу водойми, що мають рекреаційне та природоохоронне значення. Саме завдяки цьому можуть бути розроблені рекомендації щодо мінімізації наслідків антропогенного забруднення за умов мегаполісу. Тому метою роботи було вивчення змін морфо-фізіологічних та біохімічних показників окуня річкового за різних сезонів та за впливу антропогенного навантаження.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Для досліджень було обрано дві водойми, що суттєво різняться між собою за гідрохімічними та токсикологічними параметрами, які наведені у таблиці 1. Оз. Кирилівське (оз. Опечень верхнє) — водойма, яка розташована в густозаселеній ділянці м. Київ та зазнає періодичного і сезонного забруднення з боку промислових зон Куренівки та Сирця, зокрема нафтопродуктами, фенолами,

важкими металами [2, 13]. Іншою небезпекою для біоти в цій водоймі є значне накопичення донних відкладів у придонних шарах води. Це у подальшому сприяє вторинному забрудненню через накопичення амонійного азоту, неорганічного фосфору, марганцю й заліза, а також органічних речовин у придонному шарі води [13,14]. Білоцерківське середнє водосховище — це мале водосховище на р. Рось, розташоване вище м. Біла Церква, яке фактично не зазнає впливу антропогенного навантаження. Це підтверджується низкою робіт стосовно токсикологічної та екологічної ситуації в цій водоймі [15].

Таблиця 1. Характеристика гідрохімічних та токсикологічних показників досліджуваних водойм

Table 1. The characteristic hydrochemistry and toxicological indices of the studied water body

Показник/Indicator	Озеро Кирилівське/ Kyrylivske Lake	Середнє Білоцерківське водосховище / Medium Bila Tserkva reservoir
Ni, мкг/дм ³ /mkg/dm ³	52,0	0,5
Cu, мкг/дм ³ /mkg/dm ³	39,4	1,0
Mn, мкг/дм ³ /mkg/dm ³	90,9	4,0
Cd, мкг/дм ³ /mkg/dm ³	0,06	≤0,05
Co, мкг/дм ³ /mkg/dm ³	2,20	0,29
Fe, мкг/дм ³ /mkg/dm ³	670	170
Zn, мкг/дм ³ /mkg/dm ³	58,8	4,0
Нафтопродукти / Petroleum products, мг/дм ³ /mg/dm ³	0.199–0.492	0,05
Натрій/Sodium, мг/дм ³ mg/dm ³	18,2	27
Хлориди/Chlorides, мг/дм ³ /mg/dm ³	118,8–133,5	30,1-33,0
Сульфати/ Sulfates, мг/дм ³ /mg/dm ³	60,0–137,0	10,0
Магній/Magnesium, мг/дм ³ /mg/dm ³	11,42	16,00
Кальцій/Calcium, мг/дм ³ /mg/dm ³	70,1	66,1
Мінералізація/Mineralization, мг/дм ³ /mg/dm ³	520–640	420–470
Розчинений кисень / Dissolved oxygen, мгО/дм ³ /mgO/dm ³	1,3–10,8	6,0-10,8
pH	7,8–8,2	8,2
Температура/Temperature, ° C	12,5–28,2	12,5–25,1

Вміст розчиненого у воді кисню визначали методом Вінклера [16]. Значення рН середовища виявляли за допомогою рН-метра PH-009. Загальну мінералізацію визначають за допомогою TDS-метра IDS-2. Вміст металів (Zn, Cd, Co, Ni, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, Cu) у дослідних резервуарах вимірювали після концентрування вибраних зразків води шляхом кип'ятіння на атомно-абсорбційному спектрофотометрі С-115 з використанням відповідних стандартів. Температуру води вимірювали за допомогою спиртового термометра. Дослідження проводили навесні (квітень), влітку (липень) та восени (вересень–жовтень). Об'єктами дослідження були статевозрілі особини самиць окуня річкового *Perca fluviatilis*

Linnaeus, 1758, віком 3 роки. Відлов риб проводили гачковими знаряддями лову. Розміри риб становили: весною — довжина — $123,1 \pm 7,95$ мм, маса — $24,25 \pm 1,07$ г, влітку — довжина — $148,7 \pm 8,78$ мм, маса — $32,36 \pm 4,26$ г, восени — довжина — $157,8 \pm 1,65$ мм, маса — $43,67 \pm 5,72$ г. Для морфо-фізіологічного аналізу використовували 10–15 екземплярів окуня, для біохімічних — 6 екземплярів.

Було виміряно загальну (TL), стандартну (SL) довжину, масу риби, масу соми, гонад, печінки та селезінки. Гонадосоматичний індекс (ГСІ), гепатосоматичний індекс (ПІ) та індекс селезінки (ІС) були розраховані з використанням величини маси риби з рівнянь: $ГСІ = (\text{маса гонад (г)} / \text{маса риби (г)}) \times 100$; $ПІ\% = (\text{маса печінки (г)} / \text{маса риби (г)}) \times 100$; $ІС\% = (\text{маса селезінки (г)} / \text{маса риби (г)}) \times 100$ [17, 18]. Рівень перокисного окиснення ліпідів у тканинах печінки визначали за стандартною методикою [19], заснованою на реагуванні малонового діальдегіду з тіобарбітуровою кислотою з утворенням кольорового триметинового комплексу. Вимірювання проводили на спектрофотометрі СФ-26 за довжини хвилі 532 нм. Вміст загальних ліпідів (мг/г) визначали за допомогою стандартного комерційного набору «Загальні ліпіди» («Філісіт Діагностика») за довжини хвилі 545 нм, вміст глікогену (мг/г) — за допомогою антронового реагента за довжини хвилі 620 нм [20], вміст білка (мг/г) — за методом Лоурі при довжині хвилі 750 нм [21]. Вимірювання проводили на фотокалориметрі КФК-2МП.

Отримані цифрові дані були статистично оброблені за загальноприйнятими методами варіаційної статистики [22]. Дані були виражені як $M \pm m$. Ймовірність відмінностей між значеннями оцінювали за допомогою критерію Стюдента за рівнем ймовірності $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

У процесі досліджень нами були розглянуті морфо-фізіологічні показники як першочергові критерії оцінки фізіологічного стану риб. Індекс селезінки (ІС) — важливий морфо-фізіологічний показник, що у риб характеризує процеси еритропоезу та депонування еритроцитів. Мінливість цього показника вказує на зміну параметрів довкілля [23]. Відомо, що маса селезінки, порівняно з іншими органами, варіює у значних межах, що пов'язано з її функціями: продукуванням формених елементів крові (еритроцити та лейкоцити), депонуванням крові та утворенням лімфоцитів. При вивченні впливу умов існування на величину ІС, перш за все потрібно керуватися характеристикою району дослідження [24]. Через надходження до оз. Кирилівське великої кількості комунально-побутових стоків відбувається насичення водойми біогенними, органічними та токсичними сполуками [1]. Це викликає порушення кисневого режиму та сприяє виникненню гіпоксичних зон, особливо у придонних шарах води [14]. Внаслідок цього у риб знижується ІС. У окуня з оз. Кирилівське навесні ІС був вірогідно ($p < 0,05$) нижчим (в 1,7 раза), ніж у риб з Білоцерківського водосховища (табл. 2). Відомо, що за умов хронічного забруднення водного середовища величина ІС у риб знижується [23]. При інтоксикації організму змінюється кровонаповнення селезінки. Влітку було встановлено зростання ІС у риб з оз. Кирилівське (в 1,3 раза), що, вочевидь, було викликано реакцією риб на суттєве зниження у придонних шарах води вмісту розчиненого кисню ($0\text{--}0,8$ мг/дм³), яке неодноразово відмічалось у цій водоймі нами та іншими дослідниками [14]. За

умов стресу підвищується потреба організму у кисні. Це компенсується додатковим надходженням у кровоносну систему еритроцитів із селезінки [25]. Маса селезінки зростає за рахунок збільшення у ній молодих еритроцитів.

Таблиця 2. Соматичні індекси окуня за різних екологічних умов, $M \pm m$, $n = 10-15$

Table 2. Somatic index of perch for differ ecological condition, $M \pm m$, $n = 10-15$

Сезон / Season	Білоцерківське водосховище / Bila Tserkva reservoir			Оз. Кирилівське / Kyrilivske Lake		
	ІП/ІІ	ІС/ІS	ГСІ/HSI	ІП/ІІ	ІС/ІS	ГСІ/HSI
Весна / Spring	1,39±0,08	0,14±0,01	0,73±0,04	0,97±0,11*	0,08±0,01*	2,62±0,45*
Літо / Summer	0,73±0,1	0,09±0,009	0,94±0,09	1,02±0,06*	0,12±0,006*	0,89±0,06
Осінь / Autumn	1,27±0,21	0,13±0,01	4,32±0,21	0,84±0,06*	0,15±0,05	2,64±0,57*

Примітка. * — вірогідна різниця між вибірками за рівня ймовірності $p < 0,05$

Note. * — significant difference between samples at probability level $p < 0,05$

Індекс печінки (ІП) є досить інформативним при фізіологічних та екологічних дослідженнях. Відомо, що його величина залежить від статі, стадії розвитку статевих продуктів, віку (розмірів) особин, а також рівня забруднення [10]. Так, ІП у самиць з оз. Кирилівське у квітні був на 43,3% вірогідно ($p < 0,05$) нижчим, ніж аналогічний показник у риб із водосховища. Такий стан могло спричинити виснаження риб після нересту, а також значне використання енергомістких сполук. Відомо, що печінка риб найбільш чутлива до хімічних забрудників, що акумулюються в цьому органі та підлягають біотрансформації [26, 27].

Цілком очевидно, що функціональна активність печінки організмів, які протягом тривалого періоду існують у несприятливих екологічних умовах, відчувають підвищене навантаження, що відображається на морфо-фізіологічному та біохімічному статусі. У цьому випадку ІП та його варіація дозволяють отримати інформацію про фізіологічний стан організму та його стійкість до ушкоджуючих чинників [11]. Так, було встановлено вищий ІП (на 39,7%) влітку у риб з оз. Кирилівське порівняно з окунем із водосховища. Підвищення ІП може бути наслідком як задовільного стану кормової бази водойми (за рахунок накопичення рибами достатньої кількості енергомістких сполук) так і адаптивною реакцією (при зростанні вмісту глікогену) риб у відповідь на несприятливі чинники довкілля [10]. Восени ІП у риб із озера був на 51,2% нижчим, ніж у риб із водосховища. Цьому сприяв, наймовірніше характер накопичення та використання енергомістких сполук залежно від екологічної ситуації у досліджуваній ділянці водойм. Зміна маси печінки за рахунок накопичення чи використання вуглеводів, білків та жирів дозволяє опосередковано робити висновок про характер метаболізму окуня. Зміни на глибших рівнях відображаються також на різних метаболічних процесах, зокрема на білковому обміні — синтезі та розпаді білків, взаємоперетворенні амінокислот, а також на активності ферментів пластичного обміну [26].

На період досліджень у окуня пройшов нерест, що візуально виявлялося за порожніми ястиками. Гонади риб із оз. Кирилівське були ще на VI стадії зрілості. У риб з водосховища вони перебували на II стадії зрілості, що вказує на нормальне проходження овуляції під час нересту та відсутність стресових явищ під час зимового і раннього переднерестового періоду. У самок окуня із оз. Кирилівське гонадосоматичний індекс (ГСІ) був у 3,5 рази вищий, ніж аналогічна величина показника у риб із водосховища. Протягом літнього періоду істотної різниці за показником ГСІ встановлено не було. За візуальною оцінкою гонад, ікра перебувала на II стадії зрілості. Було встановлено, що ГСІ у риб з водосховища був вірогідно ($p < 0,05$) вищий у 1,6 раза, ніж у окуня із оз. Кирилівське. Зниження ГСІ у досліджуваного виду свідчить про неоптимальний стан репродуктивної системи. На фоні високої фізіологічної активності організму окуня відмічалось зниження генеративного росту ооцитів. Відомо, що індустриальні стічні води можуть порушувати відтворювальну здатність тварин, зокрема й риб. Різними дослідниками встановлено, що за умов хронічного забруднення водного середовища величина ГСІ у риб знижується [28, 29].

Згідно з дослідженнями різних авторів, встановлена залежність перерозподілу енергомістких сполук між тканинами та органами у риб від рівня антропогенного навантаження [4, 24, 30]. У тканинах печінки виявлено менший вміст білка у риб із оз. Кирилівського (на 43,3%) порівняно з окунем, виловленим у водосховищі (табл. 3). Це, вочевидь, пов'язане, з істотним коливанням екологічних чинників, зокрема вмісту розчиненого кисню, температури, вмісту токсичних сполук (мідь, цинк, нікель, марганець). У весняний період — це надходження до водойми токсичних сполук із Куренівської промзони, які потрапляли до місць нерестовищ окуня. Протягом літньо-осіннього сезону також встановлено, що у особин окуня з оз. Кирилівське вміст білка був нижчим. Проте відмінності між досліджуваними вибірками були не достовірними. Крім того, протягом зимового періоду візуально також було неодноразово помічено скидання з промислових цехів відпрацьованих вод, які містили у своєму складі неочищені стоки, зокрема нафтопродукти. Восени також відмічалась посилена евтрофікація у поєднанні із забрудненням досліджуваної ділянки озера через колектор (нафтопродукти, важкі метали) (табл. 1). Відомо, що за використання значної кількості вуглеводів наступним альтернативним джерелом енергії у риб зазвичай є білки, які використовуються за зростаючих потреб в енергоресурсах [31, 32]. Це характерно для риб, що мешкають у надмірно забруднених токсикантами водоймах [24]. Зниження вмісту білка у риб може вказувати на наявність стресових явищ, які стимулювали його протеоліз. Як правило, у період стресу баланс між катаболізмом та анаболізмом білка порушується. Вільні амінокислоти мобілізувались щоб подолати зростаючі потреби в енергоресурсах. Це свідчить про залучення білків як альтернативних енергомістких сполук, необхідних для протидії токсичному середовищу.

Глікоген — легкодоступна енергомістка сполука, що використовується організмом для забезпечення енергією багатьох фізіологічних процесів, які лежать в основі реакцій на нетипові чи екстремальні чинники середовища. Численні дослідження стосовно впливу токсикантів на вуглеводневий обмін риб свідчать про можливе використання важливих показників цього обміну (вміст цукру та глікогену) як біохімічних індикаторів [32].

Таблиця 3. Вміст енергомістких сполук, мг/г, в тканинах печінки окуня річкового, $n = 6$ ($M \pm m$)

Table 3. Content of energetic compounds, mg/g, in tissues liver tissues of river perch, $n = 6$ ($M \pm m$)

Сезон / Season	Білоцерківське водосховище / Bila Tserkva reservoir			оз. Кирилівське / Kyrilivske Lake		
	Білок / Protein	Глікоген / Glycogen	Ліпіди / Lipid	Білок / Protein	Глікоген / Glycogen	Ліпіди / Lipid
Весна / Spring	125,70±10,2	87,69±9,72	53,69±5,8*	87,40±2,3*	70,00±3,5*	51,20±8,2
Літо / Summer	121,00±12,1	98,90±9,71	75,70±9,71*	92,69±5,7	105,20±6,4*	77,00±3,5
Осінь / Autumn	98,50±8,8	78,51±10,1	82,20±9,6*	63,80±1,7	63,18±1,0*	39,20±2,9

Примітка. * – вірогідна різниця між вибірками за рівня ймовірності $p < 0,05$

Note. * - significant difference between samples at probability level $p < 0,05$

Відомо, що зниження вмісту глікогену пов'язане з посиленням процесу глікогенолізу, що вкрай важливо для подолання явищ стресу [3]. На це також вказують дослідження [12], де в окуня з оз. Кирилівське відмічено вищий вміст глюкози, ніж такий у риб з водосховища. Встановлено, що у весняний період у самиць окуня вміст глікогену був на 43,5%; $p < 0,05$ нижчий, ніж у риб із водосховища (див. табл. 2).

У літній сезон у риб із оз. Кирилівське, навпаки, відмічено вищий вміст глікогену (на 22,4%; $p < 0,05$) порівняно з рибами з водосховища р. Рось. Це, вочевидь, зумовлено посиленням синтезом вуглеводів із амінокислот, утворених у результаті катаболізму білка як своєрідною протидією несприятливим умовам існування [31], зокрема, незадовільному кисневому режиму (див. табл. 1). Відомо, що при зміні чинників зовнішнього середовища, особливо токсичної дії, спостерігається адаптивна реакція риб на токсичний вплив, яка включає в себе посилення інтенсивності окиснювальних процесів у тканинах і у подальшому підвищує використання вуглеводів [24]. Це, можливо, ілюструє вищий вміст глікогену у риб із оз. Кирилівське.

Через несприятливі токсикологічні та кисневі умови в оз. Кирилівське, порівняно з водосховищем, ми виявили суттєві відмінності у вмісті глікогену у печінці окуня. Відомо, що в умовах гіпоксії риби отримують енергію шляхом анаеробного катаболізму вуглеводів, зокрема глікогену, який у процесі глікогенолізу перетворюється на глюкозу [3, 30], яка у подальшому забезпечує вчасне надходження енергії до уражених тканин [11, 30]. Враховуючи, що до водойми через колектор надходить значна кількість токсичних сполук, зокрема йонів важких металів (цинк, мідь, кадмій, нікель) (див. табл. 1), це може викликати їх накопичення у тканинах риб [3]. Враховуючи, що важкі метали знижують вміст резервного глікогену, це впливає на активність ферментів, що беруть участь у регуляції вуглеводного обміну [30]. Встановлено, що у окуня з оз. Кирилівське вміст вуглеводів у печінці був на 28,8% нижчим, ніж у риб із водосховища (див. табл. 2). Зменшення вмісту глікогену у печінці риб з оз. Кирилівське порівняно з водосховищем вказує на можливий вплив забруднювальних речовин на організм. Зниження вмісту глікогену могло стати наслідком його інтенсивного використання в процесах детоксикації тканин. Запаси глікогену в печінці риб використовуються як джерело енергії. У свою

чергу, зміни вмісту глікогену у печінці за несприятливих умов можуть вказувати на незадовільний фізіологічний стан риб [24].

У випадку нестачі вуглеводів для задоволення потреб організму в енергії посилено «спалюються» жири як наступні енергомісткі сполуки [30]. Динамічність вмісту ліпідів дає можливість риbam адаптуватися до зміни умов існування, в тому числі і за токсичного навантаження [33, 34]. У післянерестовий період менший вміст ліпідів (на 36,7%; $p < 0,05$) був у самок окуня риб з оз. Кирилівське, ніж аналогічна величина показника у водосховищі. Крім того, у літній період відмічено аналогічну ситуацію, коли не відбувалось суттєвого накопичення рибами із оз. Кирилівське ліпідів (див. табл. 3). На користь цього вказує вищий (на 37,2%; $p < 0,05$) вміст ліпідів у риб із водосховища. Це могло спричинити використання зазначених енергомістких сполук на адаптивні процеси, необхідні, зокрема, для подолання нестачі кисню у воді. Восени спостерігалась аналогічна картина за вмістом ліпідів у печінці окуня (вміст ліпідів був меншим на 61,2%). Оскільки зазначене озеро глибоководне та ще й з високим рівнем трофності, то для нього характерне перенасичення киснем води поверхневого горизонту та його дефіцит і, відповідно, формування анаеробних умов у придонному горизонті. Це добре корелює із вмістом марганцю у придонному шарі води [13]. Саме тут дефіцит кисню неодноразово відмічався протягом усього року (власні дані). Крім того, відомо, що для подолання гіпоксичного стресу, спричиненого мінливістю умов водного середовища окуневі риби використовують енергетичні ресурси у вигляді ліпідів печінки. Крім того, відомо, що окуневі риби активно використовують енергомісткі сполуки для протидії гіпоксичним умовам [35]. Цей факт свідчить про менш інтенсивне накопичення ліпідів у риб, що мешкають у зоні антропогенного забруднення.

Малоновий діальдегід є одним із кінцевих продуктів перекисного окиснення (ПОЛ), і накопичення саме цієї сполуки у тканинах свідчить про інтенсивність ПОЛ. Реакція на токсичний вплив у риб, як правило, корелює із різким збільшення інтенсивності перекисних процесів, оцінити які можна за накопиченням малонового діальдегіду (МДА) [36]. На рівень ПОЛ впливають такі чинники як температура, хімічний склад води, насиченість її киснем тощо. Процеси ПОЛ є однією з перших та найбільш мобільних складових адаптаційної перебудови організму за дії екстремальних чинників. За вмістом МДА можна судити про стресові явища, викликані несприятливими умовами існування [4]. У окуня відмічено зростання вмісту малонового діальдегіду у тканинах печінки у весняний період (на 20,3%; $p < 0,05$) (табл. 4).

Враховуючи післянерестовий стан досліджуваних риб, а також періодичний токсичний вплив на їх організм, це могло сприяти посиленню перекисних процесів у тканинах. У літній період, коли відмічались перепади кисневого режиму у придонних шарах води, вміст малонового діальдегіду також зростав у риб з оз. Кирилівське (на 33,5%; $p < 0,05$) порівняно з окунем, виловленим у водосховищі на р. Рось. Так, за дії несприятливого кисневого режиму ($1,3 \text{ мг/дм}^3$), у оз. Кирилівське відбувалось посилення перекисного окиснення ліпідів у печінці окуня. Така активація обміну речовин потребує додаткових енерговитрат, що викликає зниження рівня енергомістких сполук у печінці окуня (див. табл. 3). Відмічені закономірності свідчать, що риби із забрудненої водойми не забезпечувались достатньою мірою резервними енергоємними сполуками.

Таблиця 4. Вміст малонового діальдегіду у тканинах печінки окуня, мМоль/г

Table 4. Content of malonic dyaldehyde in liver tissues of Perch, mMol/g

Сезон / Season	Водойма / Water body	
	Білоцерківське водосховище / Bila Tserkva reservoir	Озеро Кирилівське / Kyrilivske Lake
Весна / Spring	12,01±1,1*	14,4 ±0,81
Літо / Summer	11,4±0,55*	15,2±2,19
Осінь / Autumn	13,1±0,80*	18,8±3,5

Примітка. * — вірогідна різниця між вибірками за рівня ймовірності $p < 0,05$

Note. * — significant difference between samples at probability level $p < 0,05$

Це також позначилось і на формуванні статевих клітин у період вітелогенезу, що, беззаперечно, здійснювало вплив на успіх наступної нерестової кампанії риб.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

На основі проведених досліджень було показано, що за умов надмірного забруднення водойм мегаполісу (на прикладі оз. Кирилівське) у риб істотно змінюються величини індексів печінки, селезінки та гонад, що відображало функціональну активність цих органів як адекватну реакцію на умови існування.

Порівняно з окунем із Білоцерківського середнього водосховища, вміст ліпідів у печінці окуня з оз. Кирилівське був нижчим на 36,7–61,2%, вміст глікогену — нижчим на 28,8–43,5%. Це свідчить про інтенсивне використання енергомістких сполук у процесі адаптивних реакцій на вплив надмірного антропогенного забруднення водойми. На це також вказує зростання вмісту малонового діальдегіду на 20,30–44,06% у тканинах печінки окуня протягом періоду дослідження. Це, у свою чергу, засвідчує наявність стресових явищ у зазначені періоди проведення досліджень.

Дослідження показали, що у риб із оз. Кирилівського катаболітичні процеси переважали над анаболітичними, що негативно відображалось на процесах формування статевих клітин та процесах нересту. Це у подальшому неминуче призведе до суттєвого коливання чисельності угруповань окуня у зазначеній водоймі.

Отримані результати дають можливість контролювати фізіологічний стан риб на прикладі самиць окуня річкового, що мешкають на урбанізованих територіях, та прогнозувати негативні наслідки антропогенного впливу на умови існування риб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Якість води у міських водоймах та характер освоєння водоохоронних зон (на прикладі озер системи «Опечень», м. Київ) / Панасюк І. В. та ін. // Екологічна безпека та природокористування. 2015. № 4 (20). С. 63—69.
2. Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій / Романенко О. В. та ін. Київ : Наукова думка, 2015. 189 с.
3. Fatma A. S., Gad M. N. S. Environmental pollution-induced biochemical changes

- in tissues of *Tilapia zillii*, *Solea vulgaris* and *Mugil carpito* from lake Qarun, Egypt // *Global Veterenaria*. 2008. Vol. 2 (6). P. 327—336.
4. Немова Н. Н., Высоцкая Р. В. Биохимическая индикация состояния рыб. Москва : Наука, 2004. 225 с.
 5. Федоненко О. В., Ананьева Т. В. Еколого-біохімічні показники тканин та органів основних видів хижих риб Запорізького водосховища // *Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія*. 2011. Т. 1 (22). С. 184—191.
 6. Шакирова Г. Р., Бактатева Ф. Х. Морфологические изменения печени, почек, сердца окуня *Perca fluviatilis* L. и щуки *Esox lucius* L. из озера Асылкуль в результате загрязнения воды тяжелыми металлами // *Известия Оренбургского государственного аграрного ун-та*. 2010. № 2. С. 117—180.
 7. State of Black Scorpion fish (*Scorpaena porcus* L., 1758) inhabited coastal area of Sevastopol region (Black Sea) in 1998—2008 / Kuz'minova N. et al. // *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*. 2011. Vol. 11. P. 101—111.
 8. Monitoring pollution in Esmorzi-Paramos lagoon, Portugal: liver histological and biochemical effects in *Liza sapiens* / Fernandes C. et al. // *Environmental Monitoring and Assessment*. 2008. Vol. 145. P. 315—322.
 9. Руднева И. И. Применение биомаркеров рыб для экотоксикологической диагностики водной среды // *Рибне господарство України*. 2006. № 1 (42). С. 20—23.
 10. Кузьминова Н. С. Индекс печени черноморской ставриды как индикатор ее физиологического состояния // *Рибне господарство України*. 2006. № 2 (43). С. 36—38.
 11. Metabolical changes induced by chronic phenol exposure in matrinxã *Brycon cephalus* (Teleostei: Characidae) juveniles / Hori T. S. F. et al. // *Comparative Biochemical Physiology*. 2006. Vol. 143 (1). P. 67—72.
 12. Причепа М. В., Потрохов О. С., Зінковський О. Г. Особливості зміни деяких біохімічних показників у різних екологічних груп риб за дії антропогенного навантаження // *Біологічні системи*. 2017/ Т. 9. вип. 1. С. 39—43.
 13. Жежеря В. А., Линник П. М., Зубенко І. Б. Уміст та форми знаходження металів у озерах системи «Опечень» (м. Київ) // *Наукові праці УкрНДГМІ*. 2016. Вип. 269. С. 70—86.
 14. Численность бактерий и протеолитическая активность в воде озера, расположенного в городской черте / Якушин В. М. и др. // *Гидробиологический журнал*. 2015. Т. 51, № 1. С. 83—92.
 15. Польові та лабораторні дослідження хімічного складу води р. Рось / Хільчевський В. К. та ін. Київ : Київський університет, 2012. 143 с.
 16. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. 406 с.
 17. Яржомбек А. А., Ламанский В. В., Щербина Т. В. Справочник по физиологии рыб. Москва : Агропромиздат, 1986. 192 с.
 18. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1966. 376 с.
 19. Стальная И. Д., Гаришвили Т. Г. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты // *Современные методы в биологии*. Москва : Методика, 1977. С. 66—68.
 20. Северин С. Е., Соловьева Г. А. Практикум по биохимии : учеб. пособие. Москва : Моск. ун-т, 1989. 509 с.

21. Protein measurement with the folin phenol reagent / Lowry O. H. et al. // J. Biol. Chem. 1951. Vol. 193, № 1. P. 265—275.
22. Лакин Г. Ф. Биометрия. Москва : Наука, 1990. 296 с.
23. Кузьмина Н. С. Видовые сезонные и половые отличия индекса селезенки некоторых видов черноморских рыб и его подверженность антропогенному фактору // Вестник зоологии. 2008. Т. 42 (2). С. 135—142.
24. Сергеева Н. Р., Лукьяненко В. И. Общая ихтиотоксикология. Краснодар : Наука, 2008. 157 с.
25. Лапирова Т. Б. Реакция иммунофизиологических показателей молоди сибирского осетра (*Acipenser baerii* Brandt) на действие перметрина // Вестник Томского гос. ун-та. Биология. 2011. № 4 (16). С. 124—135.
26. Дорохова И. Н. Новоселова Ю. Особенности морфофизиологических и биохимических параметров печени морского ерша из бухт с различным уровнем загрязнения // Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов. Экология физиология и биохимия водных организмов : обзор статей. Петрозаводск, 2010. С. 44—47.
27. Adams S. M. Assessing cause and effect of multiple stressors on marine systems // Mar. Pollut. Bull. 2005. Vol. 51, № 8—12. P. 649—657.
28. Руднева И. И., Кузьмина Н. С. Изменение биомаркеров гонад некоторых видов черноморских рыб, обитающих в условиях хронического загрязнения // Экологические системы и приборы. 2011. № 2. С. 8—12.
29. Kime D. E. A strategy for assessing the effects of xenobiotics on fish reproduction // Sci. Total. Environ. 1999. Vol. 225 (1—2). P. 3—11.
30. Cicik B., Engin K. The effects of cadmium on levels of glucose in serum and glycogen reserves in the liver and muscle tissues of *Cyprinus carpio* (Linnaeus, 1758) // Turk J. vet. 2005. Vol. 29. P. 113—117.
31. Neft H. M. Use of biochemical measurement to detect pollutant-mediated damage to fish. ASTM // Spec tech. publ. 1985. Vol. 854. P. 155—183.
32. Fertilizer industry effluent induced biochemical changes in fresh water teleost, *Channa striatus* (Bloch) // Yadav A. et al. / Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2007. Vol. 79. P. 588—595.
33. Acute effects of glyphosate herbicide on metabolic and enzymatic parameters of silver catfish (*Rhammatia quelen*) / Gluszcak L. et al. // Comp. Biochem. Physiol. 2007. Vol. 146. P. 519—524.
34. Попова Е. М., Кошій І. В. Ліпіди як компонент адаптації риб до екологічного стресу // Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 49—56.
35. Причепя М. В., Потрохов О. С. Фізіолого-біохімічний статус окуневих риб у зимовий період // Гидробиологический журнал. 2014. Т. 50, № 5. С. 102—110.
36. Особа І. А. Біологічна роль перекисного окиснення ліпідів у забезпеченні функціонування організму риб // Рибогосподарська наука України. 2013. № 1. С. 88—96.

REFERENCES

1. Panasiuk, I. V., Tomiltseva, A. I., Zub, L. M., & Pohorielova, Yu. V. (2015). Yakist vody u miskykh vodoimakh ta kharakter osvoiennia vodookhoronnykh zon (na prykladi ozer systemy «Opechen», m.Kyiv). *Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannia*, 4 (20), 63-69.
2. Romanenko, O. V., Arsan, O. M., Kipnis, L. S., & Sytnyk, Yu. M. (2015). *Ekolohichni problemy kyivskykh vodoim i prylyhlykh terytorii*. Kyiv: Naukova dumka.

3. Fatma, A. S., & Gad, M. N. S. (2008). Environmental pollution-induced biochemical changes in tissues of *Tilapia zillii*, *Solea vulgaris* and *Mugil carpito* from lake Qarun, Egypt. *Global Veterenaria*, 2 (6), 327-336.
4. Nemova, N. N., & Vysotskaia, R. V. (2004). *Biokhimicheskaia indykatsiia sostoiannya ryb*. Moskva: Nauka.
5. Fedonenko, O. V., & Ananieva, T. V. (2011). Ekoloho-biokhimichni pokaznyky tkanyu ta orhaniv osnovnykh vydiv khyzhykh ryb Zaporizkoho vodoskhovyscha. *Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia*, 1 (22), 184-191.
6. Shakyrova, H. R., & Baktateva, F. Kh. (2010). Morfolohycheskye yzmeneniya pecheny, pochet, serdtsa okunia *Perca fluviatilis* L. y shchuky *Esox lucius* L. iz ozera Asylkul v rezultate zahriazneniia vody tiazhelymy metallami. *Izvestiia Orenburskogo gosudarstvennogo ahrarnogo un-ta*, 2, 117-180.
7. Kuz'minova, N., Rudneva, I., Salekhova, L. & Shevchenko, N., Oven, L. (2011). State of Black Scorpion fish (*Scorpaena porcus* L., 1758) inhabited coastal area of Sevastopol region (Black Sea) in 1998–2008. *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 11, 101-111.
8. Fernandes, C., Fontainhas-Fernandes, A., Rocha, E., & Salgado, M. A. (2008). Monitoring pollution in Esmorzi-Paramos lagoon, Portugal: liver histological and biochemical effects in *Liza sapiens*. *Environmental Monitoring and Assessment*, 145, 315-322.
9. Rudneva, I. I. (2006). Prymenenye byomarkerov ryb dlia ekotoksykologicheskoi dyagnostyky vodnoi sredy. *Rybne hospodarstvo Ukrainy*, 1 (42), 20-23.
10. Kuzminova, N. S. (2006). Indeks pecheny chernomorskoï stavrydy kak indikator yeyo fyziologicheskoho sostoiannya. *Rybne hospodarstvo Ukrainy*, 2 (43), 36-38.
11. Hori, T. S. F., Avilez, I. M., Inoue, L. K. & Moraes, G. (2006). Metabolical changes induced by chronic phenol exposure in matrinxã *Brycon cephalus* (Teleostei: Characidae) juveniles. *Comparative Biochemical Physiology*, 143(1), 67-72.
12. Prychepa, M. V., Potrokhov, O. S., & Zinkovskiy, O. H. (2017). Osoblyvosti zminy deiakykh biokhimichnykh pokaznykiv u riznykh ekolohichnykh hrup ryb za dii antropohennoho navantazhennia. *Biologichni systemy*, 9 (1), 39-43.
13. Zhezheria, V. A., Lynnyk, P. M., & Zubenko, I. B. (2016). Umist ta formy znakhodzhennia metaliv u ozerakh systemy «Opechen» (m. Kyiv). *Naukovi pratsi Ukr NDHMI*, 269, 70-86.
14. Yakushyn, V. M., Potrokhov, A. S., Zynkovskiy, O. H., Romanushyn, H. M., Kalenyuchenko, K. P., & Lynchuk, M. Y. (2015). Chyslennost bakteriy y proteolytycheskaia aktyvnost v vode ozera, raspolozhennoho v horodskoi cherte. *Hydrobiol. zhurn*, 51, 1, 83-92.
15. Arsan, O. M., Davydov, O. A., Yevtushenko, M. Iu., & Zhukynskiy, V. M. (2006). Metody hidro ekolohichnykh doslidzhen poverkhnevnykh vod. Kyiv : Lohos.
16. Khilchevskiy, V. K., Savytskyi, V. M., Krasova, L. A., & Honchar, O. M. (2012). *Polovi ta laboratorni doslidzhennia khimichnoho skladu vody r. Ros : navch. posibnyk*. Khilchevskoho, V. K. (Ed.). Kyiv: Tsentr.
17. Yarzhombek, A. A., Lamanskyi, V. V., & Shcherbyna, T. V. (1986). *Spravochnyk po fyziolohii ryb*. Moskva: Ahropromyzzdat.
18. Pravdyn, Y. F. (1966). *Rukovodstvo po yzucheniiu ryb*. Moskva: Pyshevaia promyshlennost.

19. Stalnaia, Y. D., & Haryshvily, T. H. (1977). Metod opredeleniya malonovoho dyaldehyda s pomoshchiu tyabarbyurovoi kysloty. *Sovremennye metody v biologii*. Moskva: Metodyka, 66-68.
20. Severyn, S. E., & Soloveva, H. A. (1989). *Praktykum po byokhymyy: ucheb. posobie*. Moskva: Mosk. un-t.
21. Lowry, O. H., Rosenberg, N. J., Farr, A. L., & Randall, R. J. (1951). Protein measurement with the folin phenol reagent. *Journal Biological Chemistry*, 193, (1), 265-275.
22. Lakin, H. F. (1990). *Biometriia*. Moskva: Nauka.
23. Kuzminova, N. S. (2008). Vydovye sezonnye y polovye otlychiya indeksa selebenky nekotorykh vydov chernomorskykh ryb y eho podverzhennost antropohennomu faktoru. *Vestnyk zoolohyy*, 42 (2), 135-142.
24. Serheeva, N. R., & Lukianenko, V. Y. (2008). *Obshchaia ikhtyotoksikologhiya*. Krasnodar: Nauka.
25. Lapyrova, T. B. (2011). Reaktsiya immunofiziologicheskikh pokazatelei molodi sibirskogo osetra (*Acipenser baerii* Brandt) na deistvie permetryna. *Vestnyk Tomskoho hos. un-ta. Byolohiya*, 4 (16), 124-135.
26. Dorokhova, Y. N., & Novoselova, Yu. (2010). Osobennosti morfofyziologicheskikh y byokhymicheskikh parametrov pecheny morskogo ersha yz bukht s razlychnym urovnem zahriazneniya. *Sovremennye problemy fyziolohyy y byokhymyy vodnykh orhanyzmov. Ekolohiya fyziolohiya y byokhymiya vodnykh orhanyzmov: Obzor statei*. Petrozavodsk, 44-47.
27. Adams, S. M. (2005). Assessing cause and effect of multiple stressors on marine systems. *Mar. Pollut. Bull.*, 51, (8-12), 649-657.
28. Rudneva, I. I., & Kuzmynova N. S. (2011). Izmeneniye byomarkerov honad nekotorykh vydov chernomorskykh ryb, obytailushchykh v usloviyakh khronicheskoho zahriazneniya. *Ekolohicheskyye systemy y prybory*, 2, 8-12.
29. Kime, D. E. (1999). A strategy for assessing the effects of xenobiotics on fish reproduction. *Sci. Total. Environ*, 225 (1-2), 3-11.
30. Cicik, B., & Engin, K. (2005). The effects of cadmium on levels of glucose in serum and glycogen reserves in the liver and muscle tissues of *Cyprinus carpio* (Linnaeus, 1758). *Turk. J. vet.*, 29, 113-117.
31. Neft, H. M. (1985). Use of biochemical measurement to detect pollutant-mediated damage to fish. *ASTM. Spec tech. publ.*, 854, 155-183.
32. Yadav, A., Gopesh, A., Pandey, R. S., & Rai, D. K. (2007). Fertilizer industry effluent induced biochemical changes in fresh water teleost, *Channa striatus* (Bloch). *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*, 79, 588-595.
33. Gluszczak, L., Miron, S., Moraes, B., & Simoes, R. (2007). Acute effects of glyphosate herbicide on metabolic and enzymatic parameters of silver catfish (*Rhamatia quelen*). *Comp. Biochem. Physiology*, 146, 519-524.
34. Popova, E. M., & Koshchii, I. V. (2007). Lipidy yak komponent adaptatsii ryb do ekolohichnoho stresu. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 49-56.
35. Prychepa, M. V., & Potrokhov, O. S. (2015) Physiological and biochemical status of fishes of the fam. Percidae in winter. *Hydrobiological Journal*, 51, 1, 90-97.
36. Osoba, I. A. (2013). Biolohichna rol perekysnoho okysnennia lipidiv u zabezpechenni funktsionuvannia orhanizmu ryb. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 88-96.

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 67-78
DOI: 10.15407/fsu2019.02.067
УДК [639.3.043.13:636.087.73]:[597.442]

Received 10.04.2019
Received in revised form 06.05.2019
Accepted 22.05.2019

MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE DIGESTIVE SYSTEM OF RUSSIAN STURGEON (*ACIPENSER GUELLENSTAEDTII* BRANDT & RATZEBURG, 1833) FRY UNDER EXPOSURE TO DRY BAKER'S YEASTS AS AN ADDITIVE TO THE BASIC FEED

M. Simon, seemann.sm@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Yu. Zabytivskyi, yurafish@ukr.net, Lviv Experimental Station of Institute of Fisheries
NAAS, Velykyi Lyubin

I. Hrytsyniak, info@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

L. Dragan, dragan_l@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To analyze the effect of different concentrations of dry inactivated baker's yeasts on the morphological parameters of the digestive system of Russian sturgeon fry, using enterocytes and hepatocytes as an example, to determine the optimal concentrations that could be used as a part of starter feeds when growing the above mentioned fish species in recirculating aquaculture systems (RAS).

Methodology. Classical histological methods were used in the study. Russian sturgeon fry were sampled every 7 days from the beginning of experimental feeding. After anesthesia, they were placed in a Buen solution (15 parts of a saturated aqueous solution of picric acid, 5 parts of formalin, 1 part of acetic acid) for 24 hours. After rinsing, the specimens were stored in 70% ethanol (C_2H_5OH). Specimens were processed through alcohols and embedded in paraffin in accordance with the generally accepted technique. Histologic sections were stained with hematoxylin ($C_{16}H_{14}O_6 \cdot 3H_2O$, M. w. 356.33) and eosin ($C_{20}H_8Br_4O_5$, M. w. 647.89052).

Findings. The study demonstrated the effect of different concentrations of baker's yeasts in the composition of the starter feed for Russian sturgeon on the morphometric parameters of their digestive system using the example of enterocytes and hepatocytes. The positive effect of dry baker's yeasts, which is manifested in an increase in the absorption of enterocyte surface and an improvement in the locality in glycocalyx, both for enzymes and symbiotic microorganisms playing an active role in extracellular digestion, has been shown. In addition, no toxic effect of a high concentration of baker's yeasts in the diet on the organism of Russian sturgeon fry was registered.

Scientific novelty. For the first time the analysis of the effect of different concentrations of inactivated baker's yeast, as part of the diet of Russian sturgeon fry, on the morphometric parameters of its digestive system has been performed.

Practical value. Dry inactivated baker's yeasts were proved to be advisable to add to the starter feed for the Russian sturgeon as a biologically active dietary supplement because they have a positive effect on fish digestive system.

Key words: Russian sturgeon fingerling, inactivated baker's yeast, digestive system, enterocytes, hepatocytes, started diet for fish.

© M. Simon, Yu. Zabytivskyi, I. Hrytsyniak, L. Dragan, 2019

**МОРФОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ МОЛОДІ РОСІЙСЬКОГО
ОСЕТРА (*ACIPENSER GUELLENSTAEDTII* BRANDT & RATZEBURG, 1833)
ЗА ДІЇ ПЕКАРСЬКИХ ДРІЖДЖІВ, ЗГОДОВУВАНИХ З ОСНОВНИМ КОРМОМ**

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

Ю. М. Забитівський, yurafish@ukr.net, Львівська дослідна станція ІРГ НААН,
сmt. Великий Любінь

І. І. Грициняк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Л. П. Драган, dragan_l@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Провести аналіз дії різних концентрацій сухих інактивованих пекарських дріжджів на морфологічні параметри травної системи молоді російського осетра на прикладі ентероцитів та гепатоцитів для встановлення оптимальних концентрацій, які могли б бути використані в складі стартових кормів, під час вирощування вищезгаданого виду риб в установках замкненого водопостачання (УЗВ).

Методика. Для досягнення мети роботи були використані класичні гістологічні методи досліджень. Так, кожних 7 діб з початку експериментальної годівлі відбирали молодь російського осетра, яку після анестезії поміщали на 24 години в розчин Буена (15 частин насиченого водного розчину піринової кислоти, 5 частин формаліну, 1 частина оцтової кислоти). Після ополіскування препарат зберігали у 70%-му розчині етанолу (C_2H_5OH). Препарати переводили через спирти і заливали в парафін за загальноприйнятою методикою. Гістологічні зрізи забарвлювали гематоксиліном ($C_{16}H_{14}O_6 \cdot 3H_2O$, М. м. 356,33) та еозином ($(C_{20}H_8Br_4O_5)$, М. w. 647.89052).

Результати. Продемонстровано вплив різних концентрацій пекарських дріжджів у складі стартового корму для російського осетра на морфометричні параметри його травної системи на прикладі ентероцитів та гепатоцитів. Виявлено позитивний вплив дріжджів, що проявляється у збільшенні всмоктувальної поверхні ентероцитів та покращенні локалітету у глікокалікс як для ензимів, так і для симбіотичних мікроорганізмів, що відіграють активну роль у позаклітинному травленні. Одночасно, не зареєстровано токсичного ефекту високої концентрації дріжджів в раціоні на організм молоді російського осетра.

Наукова новизна. Вперше здійснено аналіз впливу різних концентрацій інактивованих пекарських дріжджів у складі раціону молоді російського осетра на морфометричні показники травної системи останнього.

Практична значимість. Доведено, що сухі інактивовані пекарські дріжджі доцільно вводити в стартові корми для російського осетра в якості біологічно активної добавки, оскільки вони справляють позитивний вплив на його травну систему.

Ключові слова: молодь російського осетра, інактивовані пекарські дріжджі, травна система, ентероцити, гепатоцити, стартові корми для риб.

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОЛОДИ
РУССКОГО ОСЕТРА (*ACIPENSER GUELLENSTAEDTII* BRANDT & RATZEBURG,
1833) ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЕКАРСКИХ ДРОЖЖЕЙ, СКАРМЛИВАЕМЫХ С
ОСНОВНЫМ КОРМОМ**

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН, г. Киев

Ю. М. Забытиский, yurafish@ukr.net, Львовская опытная станция ИРХ НААН,
пгт Великий Любень

И. И. Грициняк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, г. Киев

Л. П. Драган, dragan_l@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, г. Київ

Цель. Осуществить анализ воздействия различных концентраций сухих инактивированных пекарских дрожжей на морфологические параметры пищеварительной системы молоди русского осетра на примере энтероцитов и гепатоцитов для установления оптимальных концентраций, которые могли бы быть использованы в составе стартовых кормов при выращивании вышеупомянутого вида рыб в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ).

Методика. Для достижения цели работы были использованы классические гистологические методы исследований. Так, каждые 7 дней с начала экспериментального кормления отбирали молодь русского осетра, которую после анестезии помещали на 24 часа в раствор Буэна (15 частей насыщенного водного раствора пикриновой кислоты, 5 частей формалина, 1 часть уксусной кислоты). После ополаскивания препарат хранили в 70% растворе этанола (C_2H_5OH). Препараты проводили через спирты и заливали в парафин по общепринятой методике. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином ($C_{16}H_{14}O_6 \cdot 3H_2O$, М.м. 356,33) и эозином ($C_{20}H_8Br_4O_5$, М.м. 647,89052).

Результаты. Продемонстрировано влияние различных концентраций пекарских дрожжей в составе стартового корма для русского осетра на морфометрические параметры его пищеварительной системы на примере энтероцитов и гепатоцитов. Выявлено, положительное влияние дрожжей, проявляющееся в увеличении всасывающей поверхности энтероцитов и улучшении локалитета в гликокаликсе как для энзимов так и симбиотических микроорганизмов, которые играют активную роль во внеклеточном пищеварении. Кроме того, не был зарегистрирован токсический эффект высокой концентрации дрожжей в рационе на организм молоди русского осетра.

Научная новизна. Впервые осуществлен анализ влияния различных концентраций инактивированных пекарских дрожжей в составе рациона молоди русского осетра на морфометрические показатели его пищеварительной системы.

Практическая значимость. Доказано, что сухие инактивированные пекарские дрожжи целесообразно вводить в стартовые корма для русского осетра в качестве биологически активной добавки, поскольку они оказывают положительное влияние на его пищеварительную систему.

Ключевые слова: молодь русского осетра, инактивированные пекарские дрожжи, пищеварительная система, энтероциты, гепатоциты, стартовые корма для рыб.

PROBLEM STATEMENT AND ANALYSIS OF LAST ACHIEVEMENTS AND PUBLICATIONS

The digestive system of Russian sturgeon combines not only signs of cartilaginous (*Chondrichthyes*) and bony (*Teleostei*) fishes, but also batrachians (*Anura*, *Salientia*, *Ecaudata*). There are a number of species-specific characteristics inherent in their digestive system described in detail by D. A. Bednyakov and others [1–4]. First, it is the activity of enzymes in the intestinal mucosa, which are involved in membrane (perineal) digestion and its dependence on abiotic and biotic factors. Secondly, morphological characteristics of the microvilli of intestinal mucosa. Thirdly, the asynchronous development of the digestive tract, the formation of which is as follows: spiral intestine → colon → stomach. Thus, the formation of the digestive system in Russian sturgeon begins in the period of embryogenesis, and ends at an age of 40–50 days, in other words during the fry period of development. In the early ontogeny of this species, there is a close correlation between the development of the structure and function of the digestive system and food needs. Data on the functioning of the digestive system, in particular

morphological parameters of the intestine and liver, are needed to understand the course of metabolic processes in the organism of Russian sturgeon.

The most important components of the digestive system of Russian sturgeon are the intestine and the liver, which are formed by enterocytes and hepatocytes, respectively. When studying the peculiarities of the digestion processes of Russian sturgeon it is not possible to ignore the morphological parameters of the above-mentioned groups of cells [5–7].

Thus, studies of the morphological parameters of enterocytes and hepatocytes are capable of providing the necessary for predicting the feasibility of using one or another diet in feeding juvenile fish.

HIGHLIGHT OF THE EARLIER UNRESOLVED PARTS OF THE GENERAL PROBLEM. AIM OF THE STUDY

The use of products of microbiological synthesis, namely, yeasts of various etiologies, has been widely used in sturgeon culture since the 1950s. However, baker's yeast, which is the most common in the world, is not a traditional dietary supplement for sturgeon (*Acipenseridae*) feeding [8]. Therefore, the aim of this work was to investigate the effect of different concentrations of inactivated baker's yeasts on the morphological parameters of the digestive system of Russian sturgeon (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt) fry. The dynamics of the morphological state of enterocytes and hepatocytes when feeding fish with dry baker's yeasts as an additive to the basic feed is an important indicator of the metabolic processes in the development of the organism of juvenile fish. In general, this provides an opportunity to predict the success of feeding Russian sturgeon fry and increase the effectiveness of this process.

MATERIALS AND METHODS

Studies have been carried out during the last few years (2016–2018), at the Experimental Fish Farm of Lviv Research and Experimental Station of the Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine.

The objects of study were yolk sac larvae of Russian sturgeon placed in a recirculating aquaculture system (RAS). The larvae were raised at a temperature of 16°C. The dissolved oxygen content in water was 7.00 – 8.12 mg/dm³.

After 10 days of adaptation, sturgeon fry were divided into 3 groups of 1000 specimens each in order to determine the effect of inactivated baker's yeasts on productive characteristics. In the experimental group No. 1, the basic feed was supplemented with 10% inactivated dry baker's yeasts, while in the experimental group No. 2, the basic feed was supplemented with 40% inactivated dry baker's yeasts. The diet of the control group of fish did not contain yeasts. Yeasts were manually introduced into the basic feed immediately after their inactivation by freezing in the freezer and before giving the feed to the test specimens.

The basic feed was the specialized starter feed "Inicio Plus" for sturgeons manufactured by "Biomar", which is widely represented on the Ukrainian market. The above-mentioned starter feed contains 58% of crude protein, 14% of crude fat, 10% of carbohydrates, 0.4% of fiber, 11.5% of ash and 1.7% of total phosphorus.

The fish were fed six times during the day, taking into account their biorhythms, where 50% of the daily ration was given in the morning and evening, and the remaining feed was evenly distributed among four feedings in the afternoon. The daily control of growth rate, mortality, and teratological observations were made on the number and condition of specimens with physiological abnormalities.

For histological studies, a whole body of larvae was used. After anesthesia (by preparation «Propiscyn»), they were placed into a Buen solution (15 parts of a saturated aqueous solution of picric acid, 5 parts of formalin, 1 part of acetic acid) for 24 hours. After rinsing, the specimens were stored in 70% ethanol. Specimens were processed through alcohols and embedded in paraffin in accordance with the generally accepted technique. Histologic sections were stained with hematoxylin ($C_{16}H_{14}O_6 \cdot 3H_2O$, M.w. 356.33) and eosin ($C_{20}H_8Br_4O_5$, M.w. 647.89052). Also, we used electron microscopes and photographs of the preparations obtained.

After feeding the Russian sturgeon fry with different concentrations of inactivated baker's yeasts, we analyzed the morphological structure of the most important organs, which was involved in the digestive processes – intestine and liver. This was done by analyzing the morphological parameters (shape, size etc.) of the state of enterocytes and hepatocytes, depending on the different concentrations of inactivated baker's yeasts fed by the of the Russian sturgeon fry.

STUDY RESULTS AND THEIR DISCUSSION

The histological sections of the intestinal specimens showed that experimental feeding with inactivated baker's yeasts affects the height of the brush border and the thickness of the mucopolysaccharide layer, and the height of enterocytes of the Russian sturgeon fry (Fig. 1).

Fig. 1. Formation of the enterocyte surface in the intestine of the Russian sturgeon fry of the control group after the first day of experimental feeding (x 1600), E - enterocyte, N – glycocalyx

During the experiment, significant changes in the shape and size of hepatocytes

and the amount of glycogen accumulated in them were detected.

The ratio of the glycocalyx thickness to the enterocyte length in the intestine of the Russian sturgeon fry in the control and experimental groups is approximately the same and is $8.7 \pm 2.0\%$. The surface of the mucopolysaccharide layer often contains settled groups of microorganisms that perform the function of mediated digestion by discharging own enzymes into the intestinal lumen. In general, in the control group, normal development of the intestine surface with a developed brush border is clearly visible after 24 days of the experiment (Fig. 2, 3).

The enterocyte nuclei are not located uniformly all cells: they are displaced closer to their apical part in 30% of cases, while others are located closer to the basal membrane. This reflects the intense processes of fission and growth in intestinal microvilli of Russian sturgeon fry.

Fig. 2. Section of the mid-intestine of Russian sturgeon fry from the control group after 24 days of experimental feeding (x 160)

Fig. 3. Enterocytes on a microvillus in the mid-intestine of Russian sturgeon fry from the control group after 24 days of experimental feeding (x 1600)

After 24 days of experimental feeding of sturgeon in the control group, the relative thickness of the microvillus layer increased significantly indicating an intensification of digestive processes (Fig. 4).

Fig. 4. Transverse section through the surface of an enterocyte in the mid-intestine of Russian sturgeon fry after 24 days of experimental feeding with a feed containing 10% of baker's yeasts (x 1600)

The average relative thickness of microvillus layer in the control group was $12.41 \pm 0.89\%$. This natural phenomenon is also associated with an increase in the activity of membrane digestion, which depends on the thickness of the glycocalyx, in which both own intestinal enzymes and those synthesized in enterocytes are absorbed.

Promising results were obtained in a group of Russian sturgeon fry fed with 10% baker's yeast. In this group, the relative thickness of the microvillus layer covered with glycocalyx was $17.16 \pm 2.26\%$.

The presence of inactivated baker's yeasts in the feed seems to contribute to an increase in the thickness of glycocalyx that in general has a positive effect on digestive processes. One of the reasons for this is the increased likelihood of a higher number of loci for symbiotic microorganisms that play an active role in extracellular digestion.

Enterocytes in sturgeon fry fed with a feed containing 40% baker's yeasts had a normal appearance with distinct nuclei displaced in the basal direction (Fig. 5).

There are no phenomena of enterocyte desquamation that indicates a positive effect of the experimental supplementation with baker's yeasts on the digestive tract of Russian sturgeon fry.

The microvillus layer was not always uniform and formed a wave-like structure. Its thickness relative to the height of the cell was $11.31 \pm 1.57\%$. The average height of the mucopolysaccharide layer was lower than the control results of 8.9%. The enterocyte nuclei were located mostly in the basal part of these cells, with a small percentage in their apical part.

Fig. 5. Transverse section through enterocyte surface in the mid-intestine of Russian sturgeon fry after 24 days of experimental feeding with a feed containing 40% of baker's yeasts (xX 1600)

The inhomogeneous and lower height of glycocalyx indicates a deterioration of digestive processes and, consequently, of absorption. It also negatively affects the location of symbiotic organisms.

Thus, feeding with the strater feed containing 40% of baker's yeasts during 24 days did not improve the digestive process and therefore is inappropriate. Instead, , feeding with the strater feed containing 10% of yeasts during the same period of time positively affected the morphological parameters of the digestive tract resulting in an increase in the glycocalyx layer and microvillus height by 38.2% relative to the control parameters. This creates a positive precondition for optimizing the digestive processes and, as a consequence, the growth of the Russian sturgeon organism.

Let's consider the effect of experimental feeding with the use of baker's yeasts on hepatocytes of Russian sturgeon fry. Fig. 6 shows their hepatocytes at the beginning of the experiment.

The hepatopancreas of Russian sturgeon after metamorphosis in the juvenile period contains a large number of fat vacuoles and glycogen grains that plays an important role of energy depot. In the future, with an increase in the activity of lipolytic processes, the amount of fat in the liver will decrease. However, the quality of fats in feeds consumed by sturgeon juveniles plays an important role during this period. In our case, the starter feed contained 15% of fat, which led to its intense accumulation in the liver. Fig. 6 shows clear large hollow vacuoles among hepatocytes.

It is known that accumulation of lipid drops in liver tissues at the beginning of active nutrition is a temporary phenomenon. The reason for this may be the low activity of lipolysis and slow transport of fats. However, during active feeding, this situation may change rapidly. To investigate this aspect, let's consider the morphological structure of the liver of Russian sturgeon fry after 24 days of experiment (Fig. 7).

Fig. 6. Hepatocytes of Russian sturgeon fry after the first day of experimental feeding with noticeable fat vacuoles (x 1600)

Fig. 7. Hepatocytes of Russian sturgeon fry of the control group after 24 days of experimental feeding filled with vacuoles containing accumulated substances (x 1600)

Figure 7 shows that with a relatively stable density of lipid vacuoles in liver tissues, their size decreased by 23% relative to the state at the beginning of the experiment. Here, there is a normalization of lipid metabolism, which was confirmed by our studies of the activity of lipolytic enzymes (lipases) [9, 10].

Let's consider the morphological structure of hepatocytes when exposed to different concentrations of baker's yeasts added to the basic starter feed for sturgeon fry. Fig. 8 shows a fragment of the liver of this fish fed with a feed containing 24% of baker's yeasts during 24 days.

Fig. 8. Hepatocytes of Russian sturgeon fry of the control group after 24 days of experimental feeding with 10% of baker's yeasts (x 1600)

Normally developed hepatocytes are visible near connective cells of the hepatic stroma. By size – they are similar to those in the control group of fish. In cells, there are noticeably small granules of accumulated substances that is normal for this stage of development. There are no signs of excessive fat accumulation beyond hepatocytes. Fat cells are present, but they are small in size. Their number is lower by 12% relative to that in the control group of fish. This concentration of yeasts seems to have a positive effect on the morphological structure of the liver, and, accordingly, on the digestion processes.

Let's consider the structure of hepatocytes in the experimental group of fish fed with a starter feed containing 40% of inactivated baker's yeasts (Fig. 9).

Fig. 9. Hepatocytes of Russian sturgeon fry of the control group after 24 days of experimental feeding with a feed containing 40% of baker's yeasts (x 1600)

Fig. 9 shows that the size of hepatocytes is slightly increased compared to the control group. Their average length is $611, 21 \pm 241.71 \mu\text{m}$, which is 23% higher than the maximum length of hepatocytes in the control group. Fat vacuoles are presented in the form of small grains that are chaotically located among hepatocytes. Obviously, this

is due to insufficient amount of fat in the diet and its reserve use from the liver. In general, there are many inclusions in the hepatocytes of fish in the experimental group. Thus, the use of 40% yeasts in the diet seems to lead to metabolic changes that are associated with the utilization of nutrients in the liver and ineffective energy costs.

It is important to emphasize that the toxic effect of high concentrations of inactivated baker's yeasts in the starter feed for Russian sturgeon was not confirmed.

CONCLUSION AND PERSPECTIVES OF FURTHER DEVELOPMENT

Consequently, the use of dry baker's yeasts inactivated by cold as a biologically active supplement to the basic feed is a promising trend in sturgeon culture.

Analysis of the morphological structure of enterocytes and hepatocytes of sturgeon fry in conditions of feeding with feeds containing 10% and 40% of baker's yeasts by weight for 24 days suggests a positive effect of low baker's yeasts concentration. First of all, the positive effect of using baker's yeasts manifests in a 38.4% increase in the absorption surface of enterocytes. Secondly, there is an improvement in the localization in glycocalyx both for enzymes and for symbiotic microorganisms that play an active role in extracellular digestion. Thirdly, the optimal regulation of lipid metabolism of the liver and the maintenance of its trophic structure was noted.

All this defines the relevance of further research on the selection and scientific justification of the optimal concentration of baker's yeasts, which would be appropriate to be used in feeding of Russian sturgeon fry.

BIBLIOGRAPHY

1. Волкова И. В. Особенности функционирования пищеварительной системы рыб различных трофических групп : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. биол. наук : спец. 03.03.01 «Физиология». Астрахань, 2010. 44 с.
2. Бедняков Д. А. Структурно-функциональные особенности мембранного пищеварения у осетрообразных видов рыб и их гибридов : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. биол. наук : спец. 03.03.01 «Физиология». Астрахань, 2014. 44 с.
3. Бедняков Д. А., Мартыанов А. С. Сравнительный анализ воздействия pH среды на уровень активности пищеварительных ферментов русского осетра, ленского осетра и их гибрида с помощью неметрического многомерного шкалирования // Вестник АГТУ. 2013. № 2. С. 145—149.
4. Бедняков Д. А., Неваленный А. Н., Новинский В. Ю. Исследование некоторых характеристик ферментов, обеспечивающих процесс мембранного пищеварения у веслоноса и стерляди // Физиологические, биохимические и молекулярно-генетические механизмы адаптаций гидробионтов : Всерос. конф. с междунар. участием : матер. Борок, 2012. С. 36—39.
5. Пегель В. А. Физиология пищеварения рыб. Томск : Том. гос. ун-т, 1950. 200 с.
6. Строганов Н. С. Экологическая физиология рыб. Москва : МГУ, 1962. 444 с.
7. Справочник по физиологии рыб / Яржомбек А. А. и др. Москва : Агропромиздат, 1986. 192 с.
8. Симон М. Ю. Використання кормових дріжджів у годівлі осетрових видів риб (*Acipenseridae*) (Огляд) // Рибогосподарська наука України. 2015. № 4 (34). С. 100—126.

9. Симон М. Ю. Особливості окисних процесів у осетрових видів риб (*Acipenseridae*) (Огляд) // Рибогосподарська наука України. 2016. № 1 (35). С. 106—126.
10. Симон М. Ю., Грициняк І. І., Забитівський Ю.М. Вплив пекарських дріжджів на ліпідний обмін молоді російського осетра // Рибогосподарська наука України. 2018. № 2 (44). С. 137—143.

REFERENCES

1. Volkova, I. V. (2010). Osobennosti funktsionirovaniya pishchevaritel'noy sistemy ryb razlichnykh troficheskikh grup. *Extended abstract of doctor's thesis*. Astrakhan'.
2. Bednyakov, D. A. (2014). Strukturno-funktsional'nye osobennosti membrannogo pishchevareniya u osetroobraznykh vidov ryb i ikh gibridov. *Extended abstract of doctor's thesis*. Astrakhan'.
3. Bednyakov, D. A., & Mart'yanov, A. S. (2013). Sravnitel'nyy analiz vozdeystviya pH sredy na uroven' aktivnosti pishchevaritel'nykh fermentov russkogo osetra, lenskogo osetra i ikh gibrida s pomoshch'yu nemetricheskogo mnogomernogo shkalirovaniya. *Vestnik AGTU, Seria: Rybnoe khozyaystvo*, 2, 145-149.
4. Bednyakov, D. A., Nevalenny, A. N., & Novinskiy, V. Yu. (2012). Issledovanie nekotorykh kharakteristik fermentov, obespechivayushchikh protsessov membrannogo pishchevareniya u veslonosa i sterlyadi. *Fiziologicheskie, biokhimicheskie i molekulyarno-geneticheskie mekhanizmy adaptatsiy gidrobiontov: Vserossiyskoy konferentsiya s mezhdunarodnym uchastiem*. Borok, 36-39.
5. Pegel', V. A. (1950). *Fiziologiya pishchevareniya ryb*. Tomsk: Tom. gos. un-t.
6. Stroganov, N. S. (1962). *Ekologicheskaya fiziologiya ryb*. Moskva: Izd-vo MGU.
7. Yarzhombek, A. A., Limanskiy, V. V., & Shcherbina, T. V. et al. (1986). *Spravochnik po fiziologii ryb*. Yarzhombek, A. A. (Ed.). Moskva: Agropromizdat.
8. Symon, M. Yu. (2016). Osoblyvosti oksynykh protsesiv u osetrovykh vydiv ryb (*Acipenseridae*) (Ohliad). *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1(35), 106-126.
9. Symon, M. Yu. (2015). Vykorystannia kormovykh drizhdzhiv u hodivli osetrovykh vydiv ryb (*Acipenseridae*) (Ohliad). *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4(34), 100-126.
10. Symon M. Yu., Hrytsyniak, I. I., & Zabytivskyi, Yu. M. (2018). Vplyv pekarskykh drizhdzhiv na lipidnyi obmin molodi rosiiskoho osetra. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2(44), 137-143.

IMPACT OF HEAVY METALS ON FRESHWATER ECOSYSTEMS. THEMATIC ENGLISH LANGUAGE BIBLIOGRAPHY

N. Kolesnyk, kolenataleo@gmail.com, Institute of Fisheries, NAAS, Kyiv

M. Simon, seemann.sm@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Creation of a reference bibliographic list of English-language open access publications from the Internet on the issues of the specific effects of heavy metals on freshwater ecosystems, their bioaccumulation and bioindication, as well as the functions of microelements in the hydrobionts organisms.

Methodology. In the process of preparing the thematic list, in the course of systemic search, holistic and selective methods were applied. The bibliographic core consists of literature sources from archives of scientific publications, in particular, such world-famous journals as *Environmental Contamination Toxicology*, *Ecotoxicology*, *Aquatic Science*, *Aquatic Toxicology*, *Environmental Bioindicators*, *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* and many others.

Results. A thematic bibliographic list of major works has been formed: specialized scientific collections, materials of international scientific conferences, scientific papers, articles and extended dissertation abstracts. It includes 227 sources, all of them are in English and are publicly available on the Internet. The presented publications cover a time interval from 1953 to 2018. However, most of them were published after 2000. In selected works, studies on the bioaccumulation and bioindication of heavy metals in freshwater ecosystems are highlighted, and data on the effect of trace elements on the organism of hydrobionts are given. Literature sources are arranged in alphabetical order according to the author or title, which corresponds to GOST 8302: 2015 "Information and documentation. Bibliography link. General provisions and rules for drafting, as amended (OCD code 01.140.40), as well as in accordance with the requirements for the design of the list of references according to the international standard APA style.

Practical value. The presented list will be useful for scientists, practitioners, students whose research concerns the analysis of the effects of heavy metals on freshwater ecosystems and patterns of bioindication and bioaccumulation of toxicants in hydrobionts, as well as the role of trace elements in their body.

Key words: heavy metals, bioaccumulation, bioindication, sedimentation, freshwater ecosystems, hydrobionts, fish, microelements, metallothioneins, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn.

ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛЛІВ НА ПРІСНОВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ. ТЕМАТИЧНА АНГЛОМОВНА БІБЛІОГРАФІЯ

Н. Л. Колесник, kolenataleo@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

© N. Kolesnyk, M. Simon, 2019

Мета. Формування довідкового бібліографічного переліку англomовних публікацій. Розміщених у відкритому доступі в мережі Інтернет, присвячених питанням специфіки впливу важких металів на прісноводні екосистеми, їх біоаккумуляції та біоіндикації, а також функціям мікроелементів в організмі гідробіонтів.

Методика. У процесі підготовки тематичного списку, в ході системного пошуку було застосовано цілісний та вибірковий методи. Бібліографічне ядро складало літературні джерела з архівів наукових видань, зокрема таких всесвітньо відомих журналів як «Environmental Contamination Toxicology», «Ecotoxicology», «Aquatic Science», «Aquatic Toxicology», «Environmental Bioindicators», «Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences» та багатьох інших.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік основних робіт: спеціалізованих наукових збірників, матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій, наукових праць, статей і авторефератів дисертацій. Він налічує 227 джерел, всі вони є англomовними та розміщеними у відкритому доступі в мережі Інтернет. Представлені публікації охоплюють часовий інтервал з 1953 по 2018 рр., але більшість з них видана після 2000 р. В обраних працях висвітлено дослідження стосовно біоаккумуляції та біоіндикації важких металів у прісноводних екосистемах, наведені дані стосовно впливу мікроелементів на організм гідробіонтів. Літературні джерела розміщені в алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Представлений перелік буде корисним для науковців, практиків, студентів, сфера досліджень яких стосується аналізу впливу важких металів на прісноводні екосистеми та закономірностей біоіндикації й біоаккумуляції токсикантів у гідробіонтах, а також ролі мікроелементів у організмі останніх.

Ключові слова: важкі метали, екосистема, біоаккумуляція, біоіндикація, седиментація, прісні водойми, гідробіонти, риба, мікроелементи, металотіонеїни, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn.

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ПРЕСНОВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ. ТЕМАТИЧЕСКАЯ АНГЛОЯЗЫЧНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Н. Л. Колесник, kolenataleo@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН, г. Київ
М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН, г. Київ

Цель. Формирование справочного библиографического перечня англоязычных публикаций из открытого доступа в сети Интернет, посвященных вопросам специфики влияния тяжелых металлов на пресноводные экосистемы, их биоаккумуляции и биоиндикации, а также функциям микроэлементов в организме гидробионтов.

Методика. В процессе подготовки тематического списка, в ходе системного поиска были применены целостный и выборочный методы. Библиографическое ядро составляли литературные источники из архивов научных изданий, в частности таких всемирноизвестных журналов как «Environmental Contamination Toxicology», «Ecotoxicology», «Aquatic Science», «Aquatic Toxicology», «Environmental Bioindicators», «Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences» и многих других.

Результаты. Сформирован тематический библиографический перечень основных работ: специализированных научных сборников, материалов международных научно-практических конференций, научных трудов, статей и авторефератов диссертаций. Он насчитывает 227 источников, все они англоязычные и находятся в открытом доступе в сети Интернет. Представленные публикации охватывают временной интервал с 1953 по 2018 гг., но большинство из них изданы после 2000 г. В избранных трудах освещены исследования по биоаккумуляции и биоиндикации тяжелых металлов в пресноводных экосистемах, приведены данные о влиянии микроэлементов на организм гидробионтов.

Литературные источники размещены в алфавитном порядке согласно автору или названию, что соответствует ДСТУ 8302:2015 «Информация и документация. Библиографическая ссылка. Общие положения и правила составления», с учетом поправок (код УКНД 01.140.40), а также в соответствии с требованиями оформления списка литературы по международному стандарту APA style.

Практическая значимость. Представленный перечень будет полезным для ученых, практиков, студентов, сфера исследований которых касается анализа влияния тяжелых металлов на пресноводные экосистемы и закономерностей биоиндикации и биоаккумуляции токсикантов в гидробионтах, а также роли микроэлементов в организме последних.

Ключевые слова: тяжелые металлы, экосистема, биоаккумуляция, биоиндикация, седиментация, пресные водоемы, гидробионты, рыба, микроэлементы, металлотioneины, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn.

1. Adelman I. R., Smith L. L. Effect of hydrogen sulfide on northern pike eggs and sac fry // Trans. American Fishery Society. 1970. Vol. 99(3). P. 501—509.
2. Al-Attar A. M. Changes in haematological parameters of the fish, *Oreochromis niloticus* treated with sublethal concentration of cadmium // Pakistan Journal Biology Science. 2005. Vol. 8(3). P. 421—424.
3. Aliokhina T. M., Bobko A. O., Malakhov I. M. Content of the heavy metals in water and bottom sediments of the Ingulets River // Hydrobiological Journal. 2008. Vol. 44(5). P. 105—110.
4. Alipour H., Pourkhabbaz A., Hassanpour M. Assessing of heavy metal concentrations in the tissue of *Rutilus rutilus caspicus* and *Neogobius gorlap* from Miankaleh international wetland // Environmental Contamination Toxicology. 2013. Vol. 91, № 5. P. 517—521.
5. Apparent protein digestibility and mineral availabilities in various feed ingredients for salmonid feeds / Sugiura S. H. // Aquaculture. 1998. Vol. 159, iss. 34. P. 177—202.
6. Askary S. A., Mohammadi M. Lead bioaccumulation and toxicity in tissue of economically fish species from river and marine water // Environmental Contamination Toxicology. 2012. Vol. 89, № 1. P. 82—85.
7. Assessment of genotoxic and mutagenic potential of hexavalent chromium in the freshwater fish *Labeo rohita* (Hamilton, 1822) / Nagpure N. S. et al. // Drug and Chemical Toxicology. 2015. Vol. 38(1). P. 9—15.
8. Association of methylmercury with dissolved humic acids / Amirbahman A. et al. // Environmental Science Technology. 2002. Vol. 36. P. 690—695.
9. Atchison G. J., Henry M. G., Sandheinrich M. B. Effects of metals on fish behavior: a review // Environmental Biology Fishery. 1987. Vol. 18. P. 11—25.
10. Atli G., Canli M. Essential metal (Cu, Zn) exposures alter the activity of ATPases in gill, kidney and muscle of Tilapia *Oreochromis niloticus* // Ecotoxicology. 2011. Vol. 20(8). P. 1861—1869.
11. Atmospheric mercury deposition during the last 270 years: a glacial ice core record of natural and anthropogenic sources / Schuster P. F. et al. // Environmental Science Technology. 2002. Vol. 36, № 11. P. 2303—2310.
12. Aquatic toxicity tests on inorganic elements occurring in oil shale / Birge W. J. et al. // Oil shale symposium: sampling, analysis and quality assurance. Springfield, VA. : Nat. Techn. Inform. Serv., 1980. P. 519—534.

13. Bagger S., Breddam K., Byberg B. R. Binding of mercury (II) to protein thiol groups: a study of proteinase K and carboxypeptidase Y // Journal Inorganic Biochemistry. 1991. Vol. 42. P. 97—103.
14. Baker R. J., Knittel M. D., Fryer J. L. Susceptibility of Chinook salmon, *Oncorhynchus tshawytscha* (Walbaum), and Rainbow trout, *Salmo gairdneri* Richardson, to infection with *Vibrio anguillarum* following sublethal copper exposure // Journal Fish Diseases. 1983. Vol. 6. P. 267—275.
15. Baldwin D. H., Tataara C. P., Scholz N. L. Copper-induced olfactory toxicity in salmon and steelhead: extrapolation across species and rearing environments // Aquatic Toxicology. 2011. Vol. 101. P. 295—297.
16. Bentley R. E. Acute toxicity of ammonium molybdate and molybdic trioxide to Bluegill (*Lepomis macrochirus*) and Rainbow trout (*Salmo gairdneri*): bionomics bioassay report submitted to Climax Molybdenum Company. U.S.A. : Massachusetts, 1975. 39 p.
17. Bengtsson B. E. Vertebral damage to minnows *Phoxinus phoxinus* reposed to zinc // Oikos, 1974. Vol. 25. P. 354—363.
18. Bioaccumulation and subcellular partitioning of zinc in Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*): cross-talk between waterborne and dietary uptake / Sappal R. et al. // Aquatic Toxicology. 2009. Vol. 9. P. 281—290.
19. Biomarkers as a diagnostic tools for evaluating effects of unknown past water quality conditions on stream organisms / Triebleskorn, R. et al. // Ecotoxicology. 2002. Vol. 11. P. 451—465.
20. Birge W. J. Aquatic toxicology of trace elements of coal and fly ash // Energy and environmental stress in aquatic systems. 1978. P. 219—240.
21. Birge W. J., Black J. A., Westerman A. G. Evaluation of aquatic pollutants using fish and amphibian eggs as bioassay organisms // Symp. Animals Monitors Environ. Pollut. Storrs, CT. 1979. Vol. 12. P. 108—118.
22. Black J. A., Barnum J. B., Birge W. J. An integrated assessment of the effects of boron to the Rainbow trout // Chemosphere. 1993. Vol. 26. P. 1383—1413.
23. Bols N. C., Brubacher J. L., Ganassin R. C. Ecotoxicology and innate immunity in fish // Developmental and Comparative Immunology. 2001. Vol. 25. P. 853—873.
24. Bose S., Ghosh P., Bhattacharya S. Distribution kinetics of inorganic mercury in the subcellular fractions of fish liver // Science Total Environmental. 1993. Vol. 1. P. 533—538.
25. Borbely G., Nagy, E. Removal of zinc and nickel ions by complexation-membrane filtration process from industrial wastewater // Desalination. 2009. Vol. 240(13). P. 218—226.
26. Bornette G., Puijalon S. Response of aquatic plants to abiotic factors: a review // Aquatic Science. 2011. Vol. 73. P. 1—14.
27. Bowen H. J. M. Trace elements in biochemistry. N.Y. : Acad. Press, 1966. 241 p.
28. Brix H., Lyngby J. E. The influence of size upon the concentration of Cd, Cr, Cu, Hg, Pb and Zn in the common mussel (*Mytilus edulis*) // Heavy metals in water organism: Simposia biologica Hungarica. Budapest, 1985. P. 23—28.
29. Brown V. M. The calculation of the acute toxicity of mixtures of poisons to Rainbow trout // Water Research. 1968. Vol. 2. P. 723—733.
30. Bruins M. R., Kapil S., Oehme F. W. Microbial resistance to metals in the environment // Ecotoxicology and Environmental Safety. 2000. Vol. 45(3). P. 198—207.

31. Burger J. Bioindicators: a review of their use in the environmental literature 1970–2005 // *Environmental Bioindicators*. 2006. Vol. 1, № 2. P. 136–144.
32. Bury N. R., Walker P. A., Glover C. N. Nutritive metal uptake in teleost fish // *Journal Experimental Biology*. 2003. Vol. 206(1). P. 11–23.
33. Cadmium accumulation in the rootless macrophyte *Wolffia globosa* and its potential for phytoremediation / Xie W. Y. et al. // *International Journal Phytoremediation*. 2013. Vol. 15, № 4. P. 385–397.
34. Calcium & cadmium interactions at uptake surfaces in Rainbow trout: waterborne versus dietary routes of exposure / Franklin N. M. et al. // *Environmental Toxicology Chemistry*. 2005. Vol. 24(11). P. 2954–2964.
35. Carignan R., Tessier A. Zinc deposition in acid lakes: the role of diffusion // *Science*. 1985. Vol. 228. P. 1524–1526.
36. Cellular responses in primary epidermal cultures from Rainbow trout exposed to zinc chloride / Ni S. S. et al. // *Ecotoxicology Environmental Safe*. 2006. Vol. 65(3). P. 332–341.
37. Chapman G. A. Effects of continuous zinc exposure on Sockeye salmon during adult-to-smolt freshwater residency // *Trans. American Fishery Society*. 1978. Vol. 107(6). P. 828–836.
38. Chapman G. A., Stevens D. G. Acutely lethal levels of cadmium, copper, and zinc to adult male Coho salmon and Steelhead // *Trans. American Fishery Society*. 1978. Vol. 107(6). P. 837–840.
39. Chesters J. K. Trace element-gene interactions // *Nutritional Review*. 1992. Vol. 50. P. 217–223.
40. Chowdhury M. J., Baldisserotto B., Wood C. M. Tissue-specific calcium and metallothionein levels in Rainbow trout chronically acclimated to waterborne of dietary cadmium // *Environmental Contamination Toxicology*. 2005. Vol. 48(3). P. 381–390.
41. Chu K. W., Chow K. L. Synergistic toxicity of multiple heavy metals is revealed by a biological assay using a nematode and its transgenic derivative // *Aquatic Toxicology*. 2002. Vol. 61. P. 53–64.
42. Copper toxicity on the marine microalga *Phaeodactylum tricornutum*: effects on photosynthesis and related parameters / Cid A. et al. // *Aquatic Toxicology*. 1995. Vol. 31. P. 165–174.
43. Cooley H. M., Evans R. E., Klavercamp J. F. Baseline measurements of indicators for sublethal effects of metals in lake whitefish (*Coregonus clupeaformis*) // *Environmental Contamination Toxicology*. 2002. Vol. 43. P. 418–424.
44. Dastoor A. P., Larocque Y. Global circulation of atmospheric mercury: a modeling study // *Atmosphere Environmental*. 2004. Vol. 38. P. 147–161.
45. Dave G. Effects of waterborne iron on growth, reproduction, survival and hemoglobin in *Daphnia magna* // *Comparative Biochemistry Physiology*. 1984. Vol. 78. P. 433–438.
46. Davies P. H., Brinkman S. F. Toxicity of manganese to early-life stage and fry of Brook trout (*Salvelinus fontinalis*) and Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) in water hardnesses of 30 and 150 mg/L: Federal Aid in Fish and Wildlife Restoration Job Progress Report, Colorado Division of Wildlife, Fish Research Section. Fort Collins, CO, U.S., 1998. 28 p.
47. Davies T. D., Pickard J., Hall K. J. Acute molybdenum toxicity to Rainbow trout and other fish // *Journal Environmental English Science*. 2005. Vol. 4(4). P. 481–485.

48. Davis J. C., Manson B. J. Toxicity of boron to pacific salmon, and boron uptake experiments with pacific salmon and oysters. Zinc and boron pollution in coastal waters of British Columbia by effluents from the pulp and paper industry. Vancouver, B. C. : Environment Canada, Pacific Region, 1973. 14 p.
49. Dauvalter V. Heavy metal concentrations in lake sediments as an index of freshwater ecosystem pollution // Disturbance and recovery in Arctic lands; an ecological perspective. 1997. P. 333—351.
50. De Schampelaere K. A. C., Lofts S., Janssen C. R. Bioavailability models for predicting acute and chronic toxicity of zinc to algae, daphniids, and fish in natural surface waters // Environmental Toxicology Chemistry. 2005. Vol. 24(5). P. 1190—1197.
51. De Vries W., Banker D. J. Manual for calculating critical load of heavy metals for soils and surface water. DLO Winland Staring Centre, Wageningen (The Netherlands) : report № 114. 1996. 133 p.
52. Delgado M., Bigeriego M., Guardiola E. Uptake of Zn, Cr and Cd by water hyacinths // Water Research. 1993. Vol. 27, № 2. P. 269—272.
53. Desjardins L. M., Hicks B. D., Hilton J. W. Iron catalyzed oxidation of trout diets and its effect on the growth and physiological response of Rainbow trout // Fish Biochemistry Physiology. 1987. Vol. 3. P. 173—182.
54. Development of genotoxicity assay systems that use aquatic organisms / Hayashi M. et al. // Mutation Research. 1998. Vol. 399. P. 125—133.
55. Dhote S., Dixit S. Water quality improvement through macrophytes – a review // Environmental Monitoring Assessment. 2009. Vol. 152. P. 149—153.
56. Dietary and waterborne mercury accumulation by yellow perch: a field experiment / Hrenchuk L. E. et al. // Environmental Science Technology. 2012. Vol. 46. P. 509—516.
57. Dixon D. G., Sprague J. B. Acclimation-induced changes in toxicity of arsenic and cyanide to Rainbow trout, *Salmo gairdneri* Richardson // Journal Fish Biology. 2006. Vol. 18(5). P. 579—589.
58. Doudoroff P., Katz M. Critical review of literature on the toxicity of industrial wastes and their components to fish. II. The metals as salts // Sewage Industrial Wastes. 1953. Vol. 25(7). P. 802—839.
59. Dyer K. R. Sedimentation in estuaries // The Estuarine Environment. 1972. P. 10—32.
60. Eaton J. G. Chronic toxicity of a copper, cadmium and zinc mixture to the Fathead minnow (*Pimephales promelas* Rafinesque) // Water Research. 1973. Vol. 7. P. 1723—1736.
61. Ecophysiological tolerance of duckweeds exposed to copper / Kanoun-Boule M. et al. // Aquatic Toxicology. 2009. Vol. 91. P. 1—9.
62. Effect of heavy metals on fish larvae deformities: A review / Sfakianakis D. G. // Environmental Research, 2015. Vol. 137. P. 246—255.
63. Effects of superparamagnetic iron oxide nanoparticles on photosynthesis and growth of the aquatic plant *Lemna gibba* / Barhoumi L. et al. // Environmental Contamination Toxicology. 2015. Vol. 68, № 3. P. 510—520.
64. Effects of sodium selenite on some biochemical and hematological parameters of Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum, 1792) exposed to Pb²⁺ and Cu²⁺ / Ates B. et al. // Fish Physiology Biochemistry. 2008. Vol. 34(1). P. 53—59.
65. Effects of sublethal, acidic aluminum exposure on blood ions and metabolites, cardiac output, heart rate, and stroke volume of Rainbow trout, *Oncorhynchus*

- mykiss* / Dussault E. B. // Fishery Physiology Biochemistry. 2001. Vol. 25. P. 347—357.
66. Effects of long term sublethal Cd exposure in rainbow trout during soft water exposure: implications for biotic ligand modelling / Hollis L. et al. // Aquatic Toxicology. 2000. Vol. 51(1). P. 93—105.
 67. Effects of acute iron overload on Atlantic salmon (*Salmo salar*) and Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) / Standal H. et al. // Biology Trace Element Reserch. 1997. Vol. 59(13). P. 13—22.
 68. Effect of Cu on some biochemical parameters of fishes / Nemscok J. et al. // Heavy Metals Water Organ. 1985. P. 413—425.
 69. Effects on growth and mineral composition of carp on deletion of trace elements or magnesium from fish meal diet / Satoh S. et al. // Nippon Suisan Gakkaishi. 1983. Vol. 49. P. 431—435.
 70. Effects of pollution on freshwater fish / Spehar R. L. et al. // Journal Water Pollution. 1981. Vol. 53(6). P. 1028—1076.
 71. Eichenberger E. The interrelation between essentiality and toxicity of metals in the aquatic ecosystem // Metal ions in biological systems. 1982. Vol. 20. P. 67—100.
 72. *Eichhornia crassipes* as biosorbent for heavy metal ions / Schneiders I. A. H. // Minerals Engineering. 1995. Vol. 8, № 9. P. 979—988.
 73. Eisler R. Zinc hazards to fish, wildlife, and invertebrates: a synoptic review: U.S. Fish Wildl. Serv. Biology, 1993. Rep. № 10. 106 p.
 74. Embryo-larval bioassays on inorganic coal elements and in situ biomonitoring of coal-waste effluents / Birge W. J. et al. // Surface mining and fish/wildlife needs in the eastern United States. Wash., D.C. : Fish and Wildlife Service, 1979. P. 97—104.
 75. Evaluation of micronucleus test's sensitivity in freshwater fish species / Jiraungkoorskul W. et al. // Research Journal of Environmental Sciences. 2007. Vol. 1, № 2. P. 56—63.
 76. Exposure to waterborne copper reveals differences in oxidative stress response in three freshwater fish species / Eyckmans M. et al. // Aquatic Toxicology. 2011. Vol. 103. P. 112—120.
 77. Fish and amphibian embryos – a model system for evaluating teratogenicity / Birge W. J. et al. // Fundamental Applied Toxicology. 1983. Vol. 3. P. 237—242.
 78. Fish as indicators of environmental degradation / Fausch K. D. et al. // American Fisheries Society Symposium 8. 1990. P. 123—144.
 79. Fitzgerald W. P., Mason R. P. The Global Mercury Cycles: Oceanic and Anthropogenic Aspects // Global and Regional Mercury Cycles: Sources, Fluxes and Mass Balance. Vol. 1. 1996. P. 85—108.
 80. Finlayson B. J., Verrue K. M. Estimated safe zinc and copper levels for Chinook salmon, *Oncorhynchus tshawytscha*, in the upper Sacramento River, California // Californian Fish Game. 1980. Vol. 66(2). P. 68—82.
 81. Finlayson B. J., Verrue K. M. Toxicities of copper, zinc, and cadmium mixtures to juvenile Chinook salmon // Trans. American Fishery Society. 1982. Vol. 111(5). P. 645—650.
 82. Food as the dominant pathway of methylmercury uptake by fish / Hall B. D. et al. // Water Air Soil Pollution. 1997. Vol. 100. P. 13—24.
 83. Forstner U., Wittmann G. T. W. Metal Pollution in the Aquatic Environment. Berlin : Springer-Verlag, 1979. 210 p.

84. Frieden E. Caeruloplasmin, a link between copper and iron metabolism // Advanced Chemistry. 1971. Vol. 100. P. 292—321.
85. Freeman R. A., Everhart W. H. Toxicity of aluminum hydroxide complexes in neutral and basic media to Rainbow trout // Trans. American Fishery Society. 1971. Vol. 100(4). P. 644—658.
86. Fu F., Wang Qi. Removal of heavy metal ions from wastewaters: A review // Journal of Environmental Management. 2011. Vol. 92. P. 407—418.
87. Gagne F., Marion M., Denizeau F. Metal homeostasis and metallothionein induction in rainbow trout hepatocytes exposed to cadmium // Fundamental Applied Toxicology. 1990. Vol. 14. P. 429—437.
88. Gatlin D. M., Wilson R. P. Characterization of iron deficiency and the dietary iron requirements of fingerling channel catfish // Aquaculture. 1986. Vol. 52. P. 191—198.
89. Gatlin D. M., Wilson R. P. Dietary zinc requirements of fingerling channel catfish // Journal Nutritional. 1983. Vol. 113, № 3. P. 630—635.
90. Gautam R. K., Ritesh P. Lead and mercury alters lipid contents in liver and kidney of *Heteropneustes fossilis* // Uttar Pradesh Journal Zoology. 1996. Vol. 16, № 1. P. 28—30.
91. Genotoxic effect of zinc and cadmium following single and binary mixture exposures in tilapia (*Oreochromis niloticus*) using micronucleus test / Abu Bakar S. N. N. et al. // Sains Malaysiana. 2014. Vol. 43, № 7. P. 1053—1059.
92. Genotoxicity and antioxidant enzyme activity induced by hexavalent chromium in *Cyprinus carpio* after in vivo exposure / Kumar P. et al. // Drug and Chemical Toxicology. 2013. Vol. 36, № 4. P. 451—460.
93. Genotoxic and mutagenic assessment of hexavalent chromium in fish following in vivo chronic exposure / Kumar P. et al. // Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal. 2012. Vol. 18, № 4. P. 9—15.
94. Geochronology of priority pollutants in sedimentation zones of the Volga and Danube delta in comparison with the Rhone delta / Winkels H. J. et al. // Applied Geochemistry. 1998. Vol. 13. P. 581—591.
95. Gerhardt F. Effects of subacute doses of iron (Fe) on *Leptophlebia marginata* (Insecta: Ephemeroptera) // Freshwater Biology. 1992. Vol. 27. P. 79—84.
96. Gilderhus P. A. Some effects of sublethal concentrations of sodium arsenite on bluegills and the aquatic environment // Trans. American Fishery Society. 1966. Vol. 95. P. 289—296.
97. Global mercury assessment. Issued by UNEP Chemicals. Switzerland : Geneva, 2002. 270 p.
98. Glucose metabolism in the common carp (*Cyprinus carpio* L.): the effects of cobalt and chromium / Hertz Y. et al. // Aquaculture. 1989. Vol. 76. P. 255—267.
99. Golovanova I. L. Effect of heavy metals on physiological and biochemical status of fishes and aquatic invertebrates // Biology of Inland Water. 2008. Vol. 1. P. 99—108.
100. Golovanova I. L., Chuiko G. M., Pavlov D. F. Effects of cadmium, Naphthalene and DDVP on Gut Carbohydrases Activity in Bream (*Abramis brama* L.) and Mozambique Tilapia (*Oreochromis mossambicus* Peters) // Environmental Contamination Toxicology. 1994. Vol. 52, № 3. P. 338—345.
101. Grande M., Andersen S. Lethal effects of hexavalent chromium, lead and nickel on young stages of Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) in soft water // Vatten. Water. 1983. Vol. 39(4). P. 405—416.

102. Grosell M., Wood C. M. Cooper uptake across Rainbow trout gills: mechanisms of apical entry // J. Exp. Biol. 2002. Vol. 205(8). P. 1179—1188.
103. Growth, photosynthetic and respiratory responses to sub-lethal copper concentrations in *Scenedesmus incrassatulus* (*Chlorophyceae*) / Perales-Vela H. V. et al. // Chemosphere. 2007. Vol. 67. P. 2274—2281.
104. Hakanson L. An ecological risk index for aquatic pollution control – a sedimentological approach // Water Research. 1980. Vol. 14. P. 975—1001.
105. Hakanson L. 1984. Sediment sampling in different aquatic environments: Statistical aspects // Water Reserch. Vol. 20. P. 41—46.
106. Hamilton S. J. Review of selenium toxicity in the aquatic food chain // Science Total Enviroment. 2004. Vol. 326. P. 1—31.
107. Hamilton S. J., Buhl K. J. Acute toxicity of boron, molybdenum, and selenium to fry of Chinook salmon and Coho salmon // Environmental Contamination Toxicology. 1990. Vol. 19(3). P. 366—373.
108. Handy R. D. The effect of acute exposure to dietary Cd and Cu on organ toxicant concentrations in rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss* // Aquatic Toxicology. 1993. Vol. 27(12). P. 1—14.
109. Harabawy A. S., Mosleh Y. Y. The role of vitamins A, C, E and selenium as antioxidants against genotoxicity and cytotoxicity of cadmium, copper, lead and zinc on erythrocytes of Nile tilapia, *Oreochromis niloticus* // Ecotoxicology Environmental Safe. 2014. Vol. 104. P. 28—35.
110. Harris H. H., Pickering I. J., George G. N. The chemical form of mercury in fish // Science. 2003. Vol. 301. P. 12—13.
111. Hayes F. R., Mac Aulay N. A. Lake water and sediment. Oxygen consumed in water over sediment cores // Limnology and Oceanography. 1959. Vol. 4, № 3. P. 291—298.
112. Heavy metal pollution in surface water and sediment: A preliminary assessment of an urban river in a developing country / Islam M. et al. // Ecological Indicators. 2015. Vol. 48. P. 282—291.
113. Hill C. H., Stratcher B., Kim C. Role of copper in the formation of elastin // Federal Procreeding. 1967. Vol. 26. P. 129—133.
114. Histopathological effects of waterborne copper nanoparticles and copper sulphate on the organs of Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) / Al-Bairuty G. et al. // Aquatic Toxicology. 2013. Vol. 126. P. 104—115.
115. Hodson P. V., Hilton J. W. The nutritional requirements and toxicity to fish of dietary and waterborne selenium // Environmental Biogeochemistry : 5th Int. Symp. ISEB : proceed. Stockholm, 1983. P. 355—340.
116. Hogendoorn-Roozemond A. S., Tenholder J. J., Stirk J. J. The influence of pH on the toxicity of hexavalent chromium to rainbow trout (*Salmo gairdneri*) // Aquatic Pollutants-Transformation and Biological Effects : Second International Symposium on Aquatic Pollutants : proceed. Oxford : Pergamon Press, 1977. P. 477—478.
117. Horowitz A. J. A primer on trace metal-sediment chemistry. Chelsea, Michigan : Lewis Publishers, 1991. 136 p.
118. *In vitro* effects of cadmium and DDVP (Dichlorvos) on intestinal carbohydrase and protease activities in freshwater teleost / Golovanova I. L. et al. // Comparative Biochemistry Physiology. 1999. Vol. 122, № 1. P. 21—25.

119. Influence of lake chemistry and fish age of cadmium, copper and zinc concentrations in various organs of indigenous Yellow perch (*Perca flavescens*) / Giguere A. et al. // Canadian Journal Fishery Science. 2003. Vol. 61(9). P. 1702—1716.
120. Influx, transport and accumulation of cadmium in plant species grown at different Cd^{2+} activities / Yang X. E. et al. // Journal of Environmental Science and Health. 1995. Vol. 30. P. 569—583.
121. Investigations into the mechanism of lead toxicity to the freshwater pulmonate snail, *Lymnaea stagnalis* / Brix K. V. et al. // Aquatic Toxicology. 2012. Vol. 106—107. P. 147—156.
122. Janz D. M. Selenium in Homeostasis and Toxicology of Essential Metals // Fish Physiology. 2012. Vol. 314. P. 327—374.
123. Jezierska B., Witeska M. The metal uptake and accumulation in fish living in polluted waters // Soil Water Pollution. 2006. Vol. 3(23). P. 107—114.
124. Kjoss V. A., Grosell M., Wood C. M. The influence of dietary Na on Cu accumulation in juvenile Rainbow trout exposed to combined dietary and waterborne Cu in soft water // Environmental Contamination Toxicology. 2005. Vol. 49(4). P. 520—527.
125. Knox D., Cowey C. B., Adron J. W. The effect of low dietary manganese intake on rainbow trout (*Salmo gairdneri*) // British Journal Nutrition. 1981. Vol. 3(46). P. 495—501.
126. Kodama M., Ogata T., Yamamori K. Acute toxicity of zinc to Rainbow trout *Salmo gairdneri* // Bulletin Japanese Society Science Fishery. 1982. Vol. 48(8). P. 1055—1058.
127. Krishnaja A. P., Rege M. S. Induction of chromosomal aberrations in fish *Boleophthalmus dussumieri* after exposure *in vivo* to mitomycin C and heavy metals mercury, selenium and chromium // Mutation Research. 1982. Vol. 102, № 1. P. 71—82.
128. Lagerwerff J. V. Lead, cadmium and mercury as environmental contaminants // Micronutrients in Agriculture. 1972. P. 593—636.
129. Leach R. M. The role of trace elements in the development of cartilage matrix // Trace Element in Man and Animals / eds. Lonnerdal B., Rucker R. B. Plenum, New York, 1988. P. 267—271.
130. Leach R. M. Role of manganese in mucopolysaccharide metabolism // Fed. Proc. 1971. Vol. 30. P. 991—994.
131. Lead-induced biochemical changes in freshwater fish *Oreochromis mossambicus* / Ruparel S. G. et al. // Environmental Contamination Toxicology. 1989. Vol. 43. P. 310—314.
132. Leaner J. J., Mason R. P. Methyl mercury accumulation and fluxes across the intestine of channel catfish, *Ictalurus punctatus* // Comparative Biochemistry Physiology Toxicology. 2002. Vol. 132, № 2. P. 247—259.
133. Le Blanc G. A., Bain L. J. Chronic toxicity of environmental contaminants: sentinels and biomarkers // Environmental Health Perspectives. 1997. Vol. 105. P. 65—80.
134. Lemly A. D. Toxicology of selenium in a freshwater reservoir: implications for environmental hazard evaluation and safety // Ecotoxicology Environmental Safe. 1985. Vol. 10(2). P. 314—338.

135. Lim C., Sealey W. M., Klesius P. H. Iron methionine and iron sulfate as sources of dietary iron for channel catfish (*Ictalurus punctatus*) // Journal World Aquaculture Society. 1996. Vol. 27, № 3. P. 290—296.
136. Linnik P. N., Zhezherya V. A., Zubenko I. B. Content of metals and forms of their migration in the water of the rivers of the Pripyat River Basin // Hydrobiological Journal. 2012. Vol. 48, № 2. P. 85—101.
137. Linnik P. N., Zhezherya V. A. Peculiarities of metals migration in the «bottom sediments – water» system with decreasing pH and increasing the concentration of fulvic acids // Hydrobiological Journal. 2011. Vol. 47, № 5. P. 86—101.
138. Linnik P. N. Heavy metals in surface waters of Ukraine: Their content and forms of migration // Hydrobiological Journal. 2000. Vol. 36, № 3. P. 31—54.
139. Lovell R. T. Selenium in fish feeds: nutritional, environmental and legal aspects // Aquaculture Magazine. 1996. Vol. 22, № 1. P. 76—81.
140. Maage A., Sveier H., Julshamn K. A comparison of growth rate and trace element accumulation in Atlantic salmon (*Salmo salar*) fry fed four different commercial diets // Aquaculture. 1989. Vol. 79(14). P. 267—273.
141. Madoni P. The acute toxicity of nickel to freshwater ciliates // Environmental Pollution. 2000. Vol. 109. P. 53—59.
142. Madoni P., Romeo M. G. Acute toxicity of heavy metals towards freshwater ciliated protists // Environmental Pollution. 2006. Vol. 141. P. 1—7.
143. Iron uptake by *Pasteurella piscicida* and its role in pathogenicity for fish / Magarios B. et al. // Applied Environmental Microbiology. 1994. Vol. 60. P. 2990—2998.
144. Maier K. J., Knight A.W. The toxicity of waterborne boron to *Daphnia magna* and *Chironomus decorus* and the effects of water hardness and sulfate on boron toxicity // Environmental Contamination Toxicology. 1991. Vol. 20(2). P. 282—287.
145. May T. W., McKinney G. L. Cadmium, lead, mercury, arsenic, and selenium concentrations in freshwater fish 1976–1977 // Pesticide monitoring Journal. 1981. Vol. 15. P. 14—38.
146. Mazen A. M. A., El-Maghraby O. M. O. Accumulation of cadmium, lead and strontium, and a role of calcium oxalate in water hyacinth tolerance // Biology Plantarum. 1998. Vol. 40, № 3. P. 411—417.
147. Mebane C. A., Hennessy D. P., Dillon F. S. Developing acute-to-chronic toxicity ratios for lead, cadmium, and zinc using Rainbow Trout, a mayfly, and a midge // Water, Air, & Soil Pollution. 2008. Vol. 188(14). P. 41—66.
148. Miller P. A., Munkittrick K. R., Dixon D. G. Relationship between concentrations of copper and zinc in water, sediment, benthic invertebrates, and tissues of white sucker (*Catostomus commersoni*) at metal-contaminated sites // Canadian Journal Fishery Science. 1992. Vol. 49. P. 978—984.
149. Modeling of heavy metal transport in a contaminated soil / Cernic M. et al. // Journal Environmental Quality. 1994. Vol. 23. P. 1239—1248.
150. Moss B. Water pollution by agriculture // Philosophical Transactions of The Royal Biological Sciences. 2008. Vol. 363. P. 659—666.
151. Nam S. H., Yang C. Y., An Y. J. Effects of antimony on aquatic organisms (larva and embryo of *Oryzias latipes*, *Moina macrocopa*, *Simocephalus mixtus*, and *Pseudokirchneriella subcapitata*) // Chemosphere. 2009. Vol. 75(7). P. 889—893.
152. Nduka J. K. C., Constance E., Obiakor E. Selective bioaccumulation of metals by different parts of some fish species from crude oil polluted water // Bulletin Environmental Contamination Toxicology. 2006. Vol. 77, № 5. P. 846—853.

153. Neville C. M. Physiological response of juvenile Rainbow trout, *Salmo gairdneri*, to acid and aluminium – prediction of field responses from laboratory data // Canadian Journal Fishery Science. 1985. Vol. 42. P. 2004—2019.
154. Newcombe C. P., MacDonald D. D. Effects of suspended sediments on aquatic ecosystems // North American Journal Fishery Management. 1991. Vol. 11. P. 72—82.
155. Nriagu J. O. Global metal pollution // Environment. 1990. Vol. 32. P. 6—21.
156. Pacyna E. G., Pacyna J. M. Global emission of mercury from anthropogenic sources in 1995 // Water Air Soil Pollution. 2002. Vol. 137(14). P. 149—165.
157. Parameters for removal of toxic heavy metals by water milfoil (*Myriophyllum spicatum*) / Wang T. C. et al. // Environmental Contamination Toxicology 1996. № Vol. 57. P. 779—786.
158. Penrose W. R. Arsenic in the marine and aquatic environment: analysis, occurrence and significance // Environmental Control. 1972. Vol. 4(14). P. 465—482
159. Pickering Q. H., Henderson C. The acute toxicity of some heavy metals to different species of warm water fishes // Air Water Pollution International Journal. 1966. Vol. 10. P. 453—463.
160. Poleo A. B. S., Hytterod S. The effect of aluminium in Atlantic salmon (*Salmo salar*) with special emphasis on alkaline water // Journal Inorganic Biochemistry. 2003. Vol. 97. P. 89—96.
161. Ptashynski M. D., Klaverkamp J. F. Accumulation and distribution of dietary nickel in lake whitefish (*Coregonus clupeaformis*) // Aquatic Toxicology. 2002. Vol. 58. P. 249—264.
162. Physiological Responses of *Lemna trisulka* L. (Duckweeds) to Cadmium and Copper Bioaccumulation / Prasad M. N. V. et al. // Plant Science. 2001. Vol. 161. P. 881—889.
163. Phytoremediation potential of aquatic macrophyte, *Azolla* / Sood A. et al. // Ambio. 2012. Vol. 41, № 2. P. 122—137.
164. pH, hardness, and humic acid influence aluminum toxicity to Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) in weakly alkaline waters / Gundersen D. T. et al. // Canadian Journal Fishery Science. 1994. Vol. 51. P. 1345—1355.
165. Rabajczyk A. The relationship between metal forms found in river bottom sediments and land development (review) // Water pollution / ed. Balkis N. Rijeka : InTech, 2012. P. 189—202.
166. Rai P. K. Heavy metal pollution in lentic ecosystem of sub-tropical industrial region and its phytoremediation // International Journal Phytoremediation. 2010. Vol. 12, № 3. P. 226—242.
167. Rama D. S., Prasad M. N. V. Heavy metal stress in plants. From molecules to ecosystems. Berlin, 1999. P. 99—117.
168. Rana S. V. S., Singh R., Verma S. Mercury induced lipid peroxidation in the liver, kidney, brain and gills of a fresh water fish *Channa punctatus* // Japanese Journal Ichthyology. 1995. Vol. 43. P. 255—259.
169. Rankin M. G., Dixon D. G. Acute and chronic toxicity of waterborne arsenite to Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) // Canadian Journal Fisheries Science. 1994. Vol. 51. P. 372—380.
170. Ray J., Brown M. W., Solbe J. F. Metallothionein gene expression and cadmium toxicity in freshwater fish // Metallothionein 2 : 2nd Int. Meet. Metallothionein and

- Low Mol. Weight Metal-bind. Proteins, Aug. 21. Basel : proc. Boston, 1987. P. 627—630.
171. Redding M. DNA synthesis after exposure to heavy metals in the testis of the Spiny dogfish // *Aquatic Toxicology: Mechanisms and Consequences*. 2002. P. 27—30.
 172. Reduced trace element concentrations in fast-growing juvenile Atlantic salmon in natural streams / Ward D. M. et al. // *Environmental Science Technology*. 2010. Vol. 44(9). P. 3245—3251.
 173. Reid S. D. Physiological impact of acute molybdenum exposure in juvenile Kokanee salmon (*Oncorhynchus nerka*) // *Comparative Biochemistry Physiology*. 2002. Vol. 133(3). P. 355—367.
 174. Relationship between exposure duration, tissue residues, growth, and mortality in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) juveniles sub-chronically exposed to copper / Hansen J. A. et al. // *Aquatic Toxicology*. 2002. Vol. 58. P. 175—188.
 175. Reza R., Singh G. Heavy metal contamination and its indexing approach for river water // *International Journal of Environmental Science & Technology*. 2010. Vol. 7 (4). P. 785—792.
 176. Ristenbil Y. W., Gerringa L. G. A. Interaction of algal ligands, metal complexation and availability and cell responses of the diatom *Ditulum brightwellii* with a gradual of copper // *Aquatic Toxicology*. 2002. Vol. 56. P. 115—131.
 177. Roualt T. A., Tong W. H. Iron-sulphur cluster biogenesis and mitochondrial iron homeostasis // *Natural Review Molecular Cell Biology*. 2005. Vol. 6, № 4. P. 345—351.
 178. Samkaram U. K., Philip S. Heavy metal uptake and accumulation by *Thypha angustifolia* from wetlands around thermal power station // *International Journal Ecology and Environmental Science*. 1990. Vol. 23. P. 133—144.
 179. Seasonal accumulation of some heavy metals in water, sediment and tissue of black chinned tilapia *Sarotherodon metanotheron* from Bietri Bay in Ebrie Lagoon, Ivory Coast / Coulibaly S. et al. // *Environmental Contamination Toxicology*. 2012. Vol. 88, № 4. P. 571—576.
 180. Seasonal variations in metal content of two *Unio pictorum* mancus (*Mollusca, Unionidae*) populations from two lakes of different trophic state / Ravera et al. // *Journal Limnology*. 2007. Vol. 66. P. 28—39.
 181. Selenium supplementation changes glutathione peroxidase activity and thyroid hormone production in Senegalese sole (*Soleasene galensis*) larvae / Ribeiro A. R. A. et al. // *Aquaculture Nutrition*. 2012. Vol. 18, № 5. P. 559—567.
 182. Selenocompounds in juvenile white sturgeon: evaluating blood, tissue and urine selenium concentrations in juvenile sturgeon after a single oral dose / Huang S. S-Y. et al. // *Aquatic Toxicology*. 2012. Vol. 109. P. 158—165.
 183. Senn D. B., Hemond H. F. Particulate arsenic and iron during anoxia in a eutrophic, urban lake // *Environmental Toxicology Chemistry*. 2004. Vol. 23. P. 1610—1616.
 184. Shehata S., Bard S. Growth response of *Scenedesmus* to different concentrations of copper, cadmium, nuckei, zinc and lead // *Environmental International*. 1980. Vol. 4, № 56. P. 431—434.
 185. Shiau S. Y., Lin S. F. Effect of supplemental dietary chromium and vanadium on the utilization of different carbohydrates in tilapia, *Oreochromis nilotius*, *O. aureus* // *Aquaculture*. 1990. Vol. 110. P. 321—330.

186. Simkiss K., Taylor M. G. Metal fluxes across the membranes of aquatic organisms // Critical Review Aquatic Science. 1989. Vol. 1. P. 173—179.
187. Skidmore J. F. Respiration and osmoregulation in rainbow trout with gills damaged by zinc sulphate // Journal Experimental Biology. 1970. Vol. 52. P. 481—494.
188. Sonesten L. Fish mercury levels in lakes – adjusting for Hg and fish-size covariation // Environmental Pollution 2003. Vol. 125. P. 255—265
189. Sokolova I. M., Lannig G. Interactive effects of metal pollution and temperature on metabolism in aquatic ectotherms: implications of global climate change // Climatuc Reserch. 2008. Vol. 37. P. 181—201.
190. Sorensen E. M. Metal poisoning in fish. U.S.A. Texas : CRC Press, 1992. 362 p.
191. Speyer M. R., Leduc G. Effects of arsenic trioxide on growth on Rainbow trout // Int. Conf. Heavy Metals in the Environment : abstracts. Toronto, Canada, 1975. P. 17—19.
192. Spry D. J., Wiener J. G. Metal bioavailability and toxicity to fish in low-alkalinity lakes: a critical review // Environmental Pollution. 1991. Vol. 71. P. 243—304.
193. Sublethal concentration of copper stimulate photosystem II photoinhibition in *Chlorella pyrenoidosa* / Vavilin D. V. et al. // Plant Physiology. 1995. Vol. 146. P. 609—614.
194. Supra-nutritional dietary intake of selenite and selenium yeast in normal and stressed Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*): implications on selenium status and health responses / Rider S. A. et al. // Aquaculture. 2009. Vol. 295(34). P. 282—291.
195. Survival, sublethal responses and tissue residues of Atlantic salmon exposed to acidic pH and aluminum / Buckler D. R. et al. // Aquatic Toxicology. 1995. Vol. 31. P. 203—216.
196. Suns K., Hitchin G. Interrelationships between mercury levels in yearling yellow perch, fish condition and water quality // Water Air Soil Pollution. 1990. Vol. 650. P. 255—265.
197. Sutherland D. E., Stillman M. J. The «magic numbers» of metallothionein // Metallomics. 2011. Vol. 3(5). P. 444—463.
198. Tamaki S., Frankenberger Jr. W.T. Environmental chemistry of arsenic // Environmental Contamination Toxicology. 1992. Vol. 124. P. 79—110.
199. The chronic toxicity of molybdate to freshwater organisms / De Schamphelaere K. A. C. et al. // Science Total Environmental. 2010. Vol. 408(22). P. 5362—5371.
200. The effects of chronic and acute exposure to hydrogen sulphide on Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) / Kierner M. et al. // Aquaculture. 1995. Vol. 135(4). P. 311—327.
201. The acute and chronic toxicity of antimony to *Daphnia magna* and Rainbow Trout / Doe K. G. et al. // Proceedings of the 13-th Annual Aquatic Toxicology Workshop. Moncton; New Brunswick, Canada, 1987. P. 40—43.
202. Thomas D. J., Styblo M., Lin S. The cellular metabolism and systemic toxicity of arsenic // Toxicology Applied Pharmacology. 2001. Vol. 176. P. 127—144.
203. Thompson J., Davis J. C., Drew R. E. Toxicity, uptake and survey studies of boron in the marine environment // Water Reserch. 1976. Vol. 10. P. 869—875.
204. Toxicity of cobalt and copper to Rainbow trout: application of a mechanistic model for predicting survival / Marr J. C. A. et al. // Aquatic Toxicology. 1998. Vol. 43. P. 225—238.

205. Toxic effects of organic and inorganic pollutants on young salmon and trout / Holland G. A. et al. // Fishery Research Bulletin. 1960. Vol. 5. 264 p.
206. Travieso L., Conizares R. O., Borya R. Heavy metal removal by Microalgae // Environmental Contamination Toxicology. 1999. Vol. 62. P. 144—151.
207. Valee B. L., Ulmer D. D. Biochemical effects of mercury, cadmium and lead // Annual Review Biochemistry. 1972. Vol. 41. P. 91—128.
208. Vankhede G. N. Effect of CuSO_4 and ZnSO_4 on branchial $\text{Na}^+\text{-K}^+$ - ATPase activity the fish, *Channa punctatus* // Journal Ecobiology. 2003. Vol. 15(4). P. 287—293.
209. Varanasi U., Gmur D. J. Influence of water-borne and dietary calcium on uptake and retention of lead by Coho salmon (*Oncorhynchus kisutch*) // Toxicology Applied Pharmacology. 1978. Vol. 46(1). P. 65—75.
210. Velma V., Tchounwou P. B. Oxidative stress and DNA damage induced by chromium in liver and kidney of goldfish *Carassius auratus* // Biomarker Insights. 2013. Vol. 8. P. 43—51.
211. Vesk P. A., Nockolds C. E., Allaway W. G. Metal localization in water hyacinth roots from an urban wetland // Plant Cell Environmental. 1999. Vol. 22, № 2. P. 149—158.
212. Vetra M. Changes in fish mercury concentrations in an intensively fished lake // Canadian Journal Fishery Science. 1990. Vol. 47. P. 1888—1897.
213. Vincent J. B. The biochemistry of chromium // Journal of Nutrition. 2000. Vol. 130. P. 715—718.
214. Vinodhini R., Narayanan M. The impact of toxic heavy metals on the hematological parameters in common carp (*Cyprinus carpio* L.) // Iranian Journal Environmental Health Science. 2009. Vol. 6(1). P. 23—28.
215. Volesky Z. R., Holan A. Biosorption of heavy metals // Biotechnology Progress. 1995. Vol. 11. P. 235—250.
216. Vuori K. M. Direct and indirect effects of iron on river ecosystems // Annual Zoology Fennici. 1995. Vol. 32. P. 317—329.
217. Wang D. The Environmental Biogeochemistry of Selenium in Natural Water Ecosystem. Helsinki : National Public Health Institute, 1994. 244 p.
218. Wang W. Chromate ions, as a reference toxicant for aquatic phytotoxicity test // Environmental Toxicology and Chemistry. 1987. Vol. 6, № 12. P. 953—960.
219. Wastewater treatability potential of some aquatic macrophytes: removal of heavy metal / Rai U. N. et al. // Ecological engineering. 1995. № 5. P. 5—12.
220. Watanabe T., Kiron V., Satoh H. Trace minerals in fish nutrition // Aquaculture. 1997. Vol. 151, № 14. P. 185—207.
221. Waser W., Bausheva O., Nikinmaa M. The copper-induced reduction of critical swimming speed in Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) is not caused by changes in gill structure // Aquatic Toxicology. 2009. Vol. 94. P. 77—79.
222. Wester P. W. Histopathological effects of environmental pollutants b-HCH and methylmercury on reproductive organs in freshwater fish // Comparison Biochemistry and Physiology. 1991. Vol. 100, № 12. P. 237.
223. Winfrey M. R., Rudd J. W. M. Environmental factors affecting the formation of methylmercury in low pH lakes: a review // Environmental Toxicology Chemistry. 1990. Vol. 9. P. 853—869.
224. Wright D. A. Trace metal and major ion interactions in aquatic animals // Marine Pollution Bulletin. 1995. Vol. 31 (13). P. 8—18.

REFERENCES

1. Adelman, I. R., & Smith, L. L. (1970). Effect of hydrogen sulfide on northern pike eggs and sac fry. *Trans. American Fishery Society*, 99(3), 501-509.
2. Al-Attar, A. M. (2005). Changes in haematological parameters of the fish, *Oreochromis niloticus* treated with sublethal concentration of cadmium. *Pakistan Journal Biology Science*, 8(3), 421-424.
3. Aliokhina, T. M., Bobko, A. O., & Malakhov, I. M. (2008). Content of the heavy metals in water and bottom sediments of the Ingulets River. *Hydrobiological Journal*, 44(5), 105-110.
4. Alipour, H., Pourkhabbaz, A. & Hassanpour, M. (2013). Assessing of heavy metal concentrations in the tissue of *Rutilus rutilus caspicus* and *Neogobius gorlap* from Miankaleh international wetland. *Environmental Contaminational Toxicology*, 91, 5, 517-521.
5. Sugiura, S. H., Dong, F. M., Rathbone, C. K., & Hardy, R. W. (1998). Apparent Protein digestibility and mineral availabilities in various feed ingredients for salmonid feeds. *Aquaculture*, 159(34), 177-202.
6. Askary, Sary A., & Mohammadi, M. (2012). Lead bioaccumulation and toxicity in tissue of economically fish species from river and marine water. *Environmental Contamination Toxicology*, 89, 1, 82-85.
7. Nagpure, N. S., Srivastava, R., Kumar, R., Kushwaha, B., Srivastava, Satish K., Kumar, P., & Dabas A. (2015). Assessment of genotoxic and mutagenic potential of hexavalent chromium in the freshwater fish *Labeo rohita* (Hamilton, 1822). *Drug and Chemical Toxicology*, 38(1), 9-15.
8. Amirbahman, A., Reid, A. L., Haines, T. A., Kahl J. S. & Arnold C. (2002). Association of methylmercury with dissolved humic acids. *Environmental Science Technology*, 36, 690-695.
9. Atchison, G. J., Henry, M. G., & Sandheinrich, M. B. (1987). Effects of metals on fish behavior: a review. *Environmental Biology Fishery*, 18, 11-25.
10. Atli, G., & Canli, M. (2011). Essential metal (Cu, Zn) exposures alter the activity of ATPases in gill, kidney and muscle of *Tilapia Oreochromis niloticus*. *Ecotoxicology*, 20(8), 1861-1869.
11. Schuster, P. F., Krabbenhof, D. P., Naftz, D. L., Cecil, L. D., Olson, M. L., Dewild, J. F., Susong, D. D., & Green, J. R. (2002). Atmospheric mercury deposition during the last 270 years: a glacial ice core record of natural and anthropogenic sources. *Environmental Science Technology*, 36(11), 2303-2310.
12. Bagger, S., Breddam, K., & Byberg, B. R. (1991). Binding of mercury (II) to protein thiol groups: a study of proteinase K and carboxypeptidase Y. *Journal Inorganic Biochemistry*, 42, 97-103.
13. Birge, W. J., Black, J. A., Westerman, A. G., & Hudson, J. E. (1980). Aquatic toxicity tests on inorganic elements occurring in oil shale. *Oil shale symposium: sampling, analysis and quality assurance*. Springfield, VA.: Nat. Techn. Inform. Serv., 519-534.
14. Baker, R. J., Knittel, M. D., & Fryer, J. L. (1983). Susceptibility of Chinook salmon, *Oncorhynchus tshawytscha* (Walbaum), and Rainbow trout, *Salmo gairdneri* Richardson, to infection with *Vibrio anguillarum* following sublethal copper exposure. *Journal of Fish Diseases*, 6, 267-275.

15. Baldwin, D. H., Tatara, C. P., & Scholz, N. L. (2011). Copper-induced olfactory toxicity in salmon and steelhead: extrapolation across species and rearing environments. *Aquatic Toxicology*, 101, 295-297.
16. Bentley, R. E. (1975). Acute toxicity of ammonium molybdate and molybdenic trioxide to Bluegill (*Lepomis macrochirus*) and Rainbow trout (*Salmo gairdneri*): *Bionomics bioassay report* submitted to Climax Molybdenum Company. Massachusetts, U. S.
17. Bengtsson, B. E. (1974). Vertebral damage to minnows *Phoxinus phoxinus* reposed to zinc. *Oikos*.
18. Sappal, R., Burka, J., Dawson, S., & Kamunde C. (2009). Bioaccumulation and subcellular partitioning of zinc in Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*): cross-talk between waterborne and dietary uptake. *Aquatic Toxicology*, 9, 281-290.
19. Triebleskorn, R., Adam, S., Casper, H., Honnen, W., Pawert, M., Schramm, M., Schwaiger, J., & Kohler, H. (2002). Biomarkers as a diagnostic tools for evaluating effects of unknown past water quality conditions on stream organisms. *Ecotoxicology*, 11, 451-465.
20. Birge, W. J. (1978). *Aquatic toxicology of trace elements of coal and fly ash*. Augusta, GA, US.
21. Birge, W. J., Black, J. A. & Westerman, A. G. (1979). Evaluation of aquatic pollutants using fish and amphibian eggs as bioassay organisms. *Symp. Animals Monitors Environ.*, 12, 108-118.
22. Black, J. A., Barnum, J. B., & Birge, W. J. (1993). An integrated assessment of the effects of boron to the Rainbow trout. *Chemosphere*, 26, 1383-1413.
23. Bols, N. C., Brubacher, J. L., & Ganassin, R.C. (2001). Ecotoxicology and innate immunity in fish. *Developmental and Comparative Immunology*, 25, 853-873.
24. Bose, S., Ghosh, P. & Bhattacharya, S. (1993). Distribution kinetics of inorganic mercury in the subcellular fractions of fish liver. *Science Total Environmental*, 1, 533-538.
25. Borbely, G., & Nagy, E. (2009). Removal of zinc and nickel ions by complexation-membrane filtration process from industrial wastewater. *Desalination*, 240(13), 218-226.
26. Bornette, G., & Puijalon, S. (2011). Response of aquatic plants to abiotic factors: a review. *Aquatic Science*, 73, 1-14.
27. Bowen, H. J. M. (1966). *Trace elements in biochemistry*. N.Y.: Acad. Press.
28. Brix, H., & Lyngby, J. E. (1985). The influence of size upon the concentration of Cd, Cr, Cu, Hg, Pb and Zn in the common mussel (*Mutilus edulis*). *Heavy metals in water organism: Simposia biologica Hungarica*. Budapest, 23-28.
29. Brown, V. M. (1968). The calculation of the acute toxicity of mixtures of poisons to Rainbow trout. *Water Research*, 2, 723-733.
30. Bruins, M. R., Kapil, S., & Oehme, F. W. (2000). Microbial resistance to metals in the environment. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 45(3), 198-207.
31. Burger, J. (2006). Bioindicators: a review of their use in the environmental literature 1970-2005. *Environmental Bioindicators*, 1, 2, 136-144.
32. Bury, N. R., Walker, P. A., & Glover, C. N. (2003). Nutritive metal uptake in teleost fish. *Journal Experimental Biology*, 206(1), 11-23.
33. Xie, W. Y., Huang, Q., Li, G., Rensing, C., & Zhu, Y. G. (2013). Cadmium accumulation in the rootless macrophyte *Wolffia globosa* and its potential for phytoremediation. *International Journal Phytoremediation*, 15(4), 385-397.

34. Franklin, N. M., Glover, C. N., Nicol, J. A., & Wood, C. M. (2005). Calcium/cadmium interactions at uptake surfaces in Rainbow trout: waterborne versus dietary routes of exposure. *Environmental Toxicology Chemistry*, 24(11), 2954-2964.
35. Carignan, R., & Tessier, A. (1985). Zinc deposition in acid lakes: the role of diffusion. *Science*, 228, 1524-1526.
36. Ni, S. S., Mothersill, C., Sheehan, D., O'Brien, N. M., O'Halloran, J., Van Pelt, F. N., Kieldmade, M., & Davoren, M. (2006). Cellular responses in primary epidermal cultures from Rainbow trout exposed to zinc chloride. *Ecotoxicology Environmental Safe*, 65(3), 332-341.
37. Chapman, G. A. (1978). Effects of continuous zinc exposure on Sockeye salmon during adult-to-smolt freshwater residency. *Trans. American Fishery Society*, 107(6), 828-836.
38. Chapman, G. A., & Stevens, D. G. (1978). Acutely lethal levels of cadmium, copper, and zinc to adult male Coho salmon and Steelhead. *Trans. American Fishery Society*, 107(6), 837-840.
39. Chesters, J. K. (1992). Trace element-gene interactions. *Nutritional Review*, 50, 217-223.
40. Chowdhury, M. J., Baldisserotto, B., & Wood, C. M. (2005). Tissue-specific calcium and metallothionein levels in Rainbow trout chronically acclimated to waterborne of dietary cadmium. *Environmental Contamination Toxicology*, 48(3), 381-390.
41. Chu, K. W., & Chow, K. L. (2002). Synergistic toxicity of multiple heavy metals is revealed by a biological assay using a nematode and its transgenic derivative. *Aquatic Toxicology*, 61, 53-64.
42. Cid, A., Herrero, C., Enrique, T., & Yulio, A. (1995). Copper toxicity on the marine microalga *Phaeodactylum tricornutum*: effects on photosynthesis and related parameters. *Aquatic Toxicology*, 31, 165-174.
43. Cooley, H. M., Evans, R. E., & Klavercamp, J. F. (2002). Baseline measurements of indicators for sublethal effects of metals in lake whitefish (*Coregonus clupeaformis*). *Environmental Contamination Toxicology*, 43, 418-424.
44. Dastoor, A. P., & Larocque, Y. (2004). Global circulation of atmospheric mercury: a modeling study. *Atmosphere Environmental*, 38, 147-161.
45. Dave, G. (1984). Effects of waterborne iron on growth, reproduction, survival and hemoglobin in *Daphnia magna*. *Copmparative Biochemistry Physiology*, 78, 433-438.
46. Davies, P. H., & Brinkman, S. F. (1998). *Toxicity of manganese to early-life stage and fry of Brook trout (Salvelinus fontinalis) and Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in water hardnesses of 30 and 150 mg/L: federal Aid in Fish and Wildlife Restoration Job Progress Report, Colorado Division of Wildlife, Fish Research Section*. Fort Collins, CO, U.S.
47. Davies, T. D., Pickard, J., & Hall, K. J. (2005). Acute molybdenum toxicity to Rainbow trout and other fish. *Journal Environmental English Science*, 4(4), 481-485.
48. Davis, J. C., & Manson, B. J. (1973). Toxicity of boron to pacific salmon, and boron uptake experiments with pacific salmon and oysters. *Zinc and boron pollution in coastal waters of British Columbia by effluents from the pulp and paper industry*. Vancouver, B. C.: Environment Canada, Pacific Region.

49. Dauvalter, V. (1997). Heavy metal concentrations in lake sediments as an index of freshwater ecosystem pollution. *Disturbance and recovery in Arctic lands; an ecological perspective*. Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 333-351.
50. De Schampelaere, K. A. C., Lofts, S., & Janssen, C. R. (2005). Bioavailability models for predicting acute and chronic toxicity of zinc to algae, daphniids, and fish in natural surface waters. *Environmental Toxicology Chemistry*, 24(5), 1190-1197.
51. De Vries, W., & Banker, D. J. (1996). *Manual for calculating critical load of heavy metals for soils and surface water*. DLO Winland Staring Centre, Wageningen (The Netherlands). Report 114.
52. Delgado, M., Bigeriego, M., & Guardiola, E. (1993). Uptake of Zn, Cr and Cd by water hyacinths. *Water Research*, 27, 2, 269-272.
53. Desjardins, L. M., Hicks, B. D., & Hilton, J. W. (1987). Iron catalyzed oxidation of trout diets and its effect on the growth and physiological response of Rainbow trout. *Fish Biochemistry Physiology*, 3, 173-182.
54. Hayashi, M., Ueda, T., Uyeno, K., Wada, K., Kinae, N., Saotome, K., Tanaka, N., Takai, A., Sasaki, Y. F., Asano, N., Sofuni, T., & Ojima Y. (1998). Development of genotoxicity assay systems that use aquatic organisms. *Mutation Research*, 399, 125-133.
55. Dhote, S. & Dixit, S. (2009). Water quality improvement through macrophytes - a review. *Environmental Monitoring Assessment*, 152, 149-153.
56. Hrenchuk, L. E., Blanchfield, P. J., Paterson, M. J., & Hintelmann, H. H. (2012). Dietary and waterborne mercury accumulation by yellow perch: a field experiment. *Environmental Science Technology*, 46, 509-516.
57. Dixon, D. G., & Sprague, J. B. (2006). Acclimation-induced changes in toxicity of arsenic and cyanide to Rainbow trout, *Salmo gairdneri* Richardson. *Journal Fish Biology*, 8(5), 579-589.
58. Doudoroff, P., & Katz, M. (1953). Critical review of literature on the toxicity of industrial wastes and their components to fish. II. The metals as salts. *Sewage Industrial Wastes*, 25(7), 802-839.
59. Dyer, K. R. (1972). Sedimentation in estuaries. *The Estuarine Environment*, 10-32.
60. Eaton, J. G. (1973). Chronic toxicity of a copper, cadmium and zinc mixture to the Fathead minnow (*Pimephales promelas* Rafinesque). *Water Reserch*, 7, 1723-1736.
61. Kanoun-Boule, M., Vicente, J. A. F., Nabais, C., Prasad, M. N. V., & Freitas, H. (2009). Ecophysiological tolerance of duckweeds exposed to copper. *Aquatic Toxicology*, 91, 1-9.
62. Sfakianakis, D. G., Renieri, E., Kentouri, M., & Tsatsakis, A. M. (2015). Effect of heavy metals on fish larvae deformities: a review. *Environmental Research*, 137, 246-255.
63. Barhoumi, L., Oukarroum, A., Taher, L. B., Smiri, L. S., Abdelmelek, H., & Dewez, D. (2015). Effects of superparamagnetic iron oxide nanoparticles on photosynthesis and growth of the aquatic plant *Lemna gibba*. *Environmental Contamination Toxicology*, 68, 3, 510-520.
64. Ates, B., Orun, I., Talas, Z. S., Orun, I., Durmaz, G., & Yilmaz, I. (2008). Effects of sodium selenite on some biochemical and hematological parameters of Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum, 1792) exposed to Pb²⁺ and Cu²⁺. *Fish Physiology Biochemistry*, 34(1), 53-59.

65. Dussault, E. B., Playle, R. C., Dixon, D. G., & McKinley R. S. (2001). Effects of sublethal, acidic aluminum exposure on blood ions and metabolites, cardiac output, heart rate, and stroke volume of Rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*. *Fish Physiology Biochemistry*, 25, 347-357.
66. Hollis, L., McGeer, J. C., McDonald, D. G., & Wood, C. M. (2000). Effects of long term sublethal Cd exposure in rainbow trout during soft water exposure: implications for biotic ligand modeling. *Aquatic Toxicology*, 51 (1), 93-105.
67. Standal, H., Rorvik, K. A., Lien, H., & Andersen, O. (1997). Effects of acute iron overload on Atlantic salmon (*Salmo salar*) and Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Biology Trace Element Research*, 59(13), 13-22.
68. Nemscok, J., Orbah, L., & Vig, E. (1985). Effect of Cu on some biochemical parameters of fishes. *Heavy Metals Water Organism*, 413-425.
69. Satoh, S., Yamamoto, H., Takeuchi, T., & Watanabe T. (1983). Effects on growth and mineral composition of carp on deletion of trace elements or magnesium from fish meal diet. *Nippon Suisan Gakkaishi*, 49, 431-435.
70. Spehar, R. L., Lemke, A. E., Pickering, Q. H., Carlson, R. W., & Mount, D. I. (1981). Effects of pollution on freshwater fish. *Journal Water Pollution*, 53(6), 1028-1076.
71. Eichenberger, E. (1982). The interrelation between essentiality and toxicity of metals in the aquatic ecosystem. *Metal ions in biological systems*, 20, 67-100.
72. Schneiders, I. A. H., Ribios, J., Misrat, M., & Smitth, R. W. (1995). *Eichhornia crassipes* as biosorbent for heavy metal ions. *Minerals Engineering*, 8(9), 979-988.
73. Eisler, R. (1993). *Zinc hazards to fish, wildlife, and invertebrates: a synoptic review*. U.S. Fish Wildl. Serv. Biol.
74. Birge, W. J., Hudson, J. E., Black, J. A., & Westerman, A. G. (1979). Embryolarval bioassays on inorganic coal elements and in situ biomonitoring of coal-waste effluents. *Surface mining and fish/wildlife needs in the eastern United States*. Wash., D.C.: Fish and Wildlife Service, 97-104.
75. Jiraungkoorskul, W., Kosai, P., Sahaphong, S., Kirtputra, P., Chawlab, J., & Charucharoen, S. (2007). Evaluation of micronucleus test's sensitivity in freshwater fish species. *Research Journal of Environmental Sciences*, 1(2), 56-63.
76. Eyckmans, M., Celis, N., Horemans, N., Blust, R., & De Boeck, G. (2011). Exposure to waterborne copper reveals differences in oxidative stress response in three freshwater fish species. *Aquatic Toxicology*, 103, 112-120.
77. Birge, W. J., Black, J. A., Westerman, A. G., & Ramey, B. A. (1983). Fish and amphibian embryos – a model system for evaluating teratogenicity. *Fundamental Applied Toxicology*, 3, 237-242.
78. Fausch, K. D., Lyons, J., Karr, J. R., & Angermeier, P. L. (1990). Fish as indicators of environmental degradation. *American Fisheries Society Symposium*, 8, 123-144.
79. Fitzgerald, W. P., & Mason, R. P. (1996). The Global Mercury Cycles: Oceanic and Anthropogenic Aspects. *Global and Regional Mercury Cycles: Sources, Fluxes and Mass Balance*. (Vol. 1), 85-108.
80. Finlayson, B. J., & Verrue, K. M. (1980). Estimated safe zinc and copper levels for Chinook salmon, *Oncorhynchus tshawytscha*, in the upper Sacramento River, California. *Californian Fish Game*, 66(2), 68-82.
81. Finlayson, B. J., & Verrue, K. M. (1982). Toxicities of copper, zinc, and cadmium mixtures to juvenile Chinook salmon. *Trans. American Fishery Society*, 111(5), 645-650.

82. Hall, B. D., Bodaly, R. A., Furge, R. J. P., Rudd, J. W. M., & Rosenberg, D. M. (1997). Food as the dominant pathway of methylmercury uptake by fish. *Water Air Soil Pollut*, 100, 3-24.
83. Forstner, U., & Wittmann, G. T. W. (1979). *Metal Pollution in the Aquatic Environment*. Berlin: Springer-Verlag.
84. Frieden, E. (1971). Caeruloplasmin, a link between copper and iron metabolism. *Advanced Chemistry*, 100, 292-321.
85. Freeman, R. A., & Everhart, W. H. (1971). Toxicity of aluminum hydroxide complexes in neutral and basic media to Rainbow trout. *Trans. American Fishery Society*, 100(4), 644-658.
86. Fu, Fenglian, & Qi, Wang (2011). Removal of heavy metal ions from wastewaters: A review. *Journal of Environmental Management*, 92, 407-418.
87. Gagne, F., Marion, M., & DenizEAU, F. (1990). Metal homeostasis and metallothionein induction in rainbow trout hepatocytes exposed to cadmium. *Fundamental Applied Toxicology*, 14, 429-437.
88. Gatlin, D. M., & Wilson, R. P. (1986). Characterization of iron deficiency and the dietary iron requirements of fingerling channel catfish. *Aquaculture*, 52, 191-198.
89. Gatlin, D. M., & Wilson, R. P. (1983). Dietary zinc requirements of fingerling channel catfish. *Journal Nutrition*, 113, 3, 630-635.
90. Gautam, R. K., & Ritesh, P. (1996). Lead and mercury alters lipid contents in liver and kidney of *Heteropneustes fossilis*. *Uttar Pradesh Journal Zoology*, 16, 1, 28-30.
91. Bakar, A., Ashriya, A., Shuib, A. S. & Razak, S.A. (2014). Genotoxic effect of zinc and cadmium following single and binary mixture exposures in tilapia (*Oreochromis niloticus*) using micronucleus test. *Sains Malaysiana*, 43(7), 1053-1059.
92. Kumar, P., Kumar, R., Naresh, S., Nagpure, S., Nautiyal, P., Kushwaha, B., & Anurag, D. (2013). Genotoxicity and antioxidant enzyme activity induced by hexavalent chromium in *Cyprinus carpio* after in vivo exposure. *Drug and Chemical Toxicology*, 36(4), 451-460.
93. Kumar, P., Kumar, R., Nagpure, N. S., Nautiyal, P., Dabas, A., Kushwaha, B., & Lakra W. S. (2012). Genotoxic and mutagenic assessment of hexavalent chromium in fish following in vivo chronic exposure. *Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal*, 18, 9-15.
94. Winkels, H. J., Kroonenberg, S. B., Lychagin, M. Y., Marin, G., Rusakov, G. V., & Kasimov, N. S. (1998). Geochronology of priority pollutants in sedimentation zones of the Volga and Danube delta in comparison with the Rhone delta. *Applied Geochemistry*, 13, 581-591.
95. Gerhardt, F. (1992). Effects of subacute doses of iron (Fe) on *Leptophlebia marginata* (Insecta: Ephemeroptera). *Freshwater Biology*, 27, 79-84.
96. Gilderhus, P. A. (1966). Some effects of sublethal concentrations of sodium arsenite on bluegills and the aquatic environment. *Trans. American Fishery Society*, 95, 289-296.
97. *Global mercury assessment*. (2002). Issued by UNEP Chemicals. Switzerland: Geneva.
98. Hertz, Y., Madar, Z., Hepper, B., & Gertler, A. (1989). Glucose metabolism in the common carp (*Cyprinus carpio* L.): the effects of cobalt and chromium. *Aquaculture*, 76, 255-267.

99. Golovanova, I. L. (2008). Effect of heavy metals on physiological and biochemical status of fishes and aquatic invertebrates. *Biology of Inland Water*, 1, 99-108.
100. Golovanova, I. L., Chuiko, G. M., & Pavlov, D. F. (1994). Effects of cadmium, Naphthalene and DDVP on Gut Carbohydases Activity in Bream (*Abramis brama* L.) and Mozambique Tilapia (*Oreochromis mossambicus* Peters). *Environmental Contamination Toxicology*, 52, 3, 338-345.
101. Grande, M., & Andersen, S. (1983). Lethal effects of hexavalent chromium, lead and nickel on young stages of Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) in soft water. *Vatten Water*, 39(4), 405-416.
102. Grosell, M., & Wood, C. M. (2002). Cooper uptake across Rainbow trout gills: mechanisms of apical entry. *Journal Experimental Biology*, 205(8), 1179-1188.
103. Perales-Vela, H. V., Gonsalez-Moreno, S., Montes-Horeasitas, C., & Canizares-Villanueva, R. O. (2007). Growth, photosynthetic and respiratory responses to sub-lethal copper concentrations in *Scenedesmus incrassatulus* (*Chlorophyceae*). *Chemosphere*, 67, 2274-2281.
104. Hakanson, L. (1980). An ecological risk index for aquatic pollution control - a sedimentological approach. *Water Reserch*, 14, 975-1001.
105. Hakanson, L. (1984). Sediment sampling in different aquatic environments: Statistical aspects. *Water Reserch*, 20, 41-46.
106. Hamilton, S. J., & Buhl, K. J. (1990). Acute toxicity of boron, molybdenum, and selenium to fry of Chinook salmon and Coho salmon. *Environmental Contamination Toxicology*, 19(3), 366-373.
107. Hamilton, S. J. (2004). Review of selenium toxicity in the aquatic food chain. *Science Total Enviroment*, 326, 1-31.
108. Handy, R. D. (1993). The effect of acute exposure to dietary Cd and Cu on organ toxicant concentrations in rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*. *Aquatic Toxicology*, 27, (12), 1-14.
109. Harabawy, A. S., & Mosleh, Y. Y. (2014). The role of vitamins A, C, E and selenium as antioxidants against genotoxicity and cytotoxicity of cadmium, copper, lead and zinc on erythrocytes of Nile tilapia, *Oreochromis niloticus*. *Ecotoxicology Environmental Safe*, 104, 28-35.
110. Harris, H. H., Pickering, I. J., & George, G. N. (2003). The chemical form of mercury in fish. *Science*, 301, 12-13.
111. Hayes, F. R. & Mac Aulay N. A. (1959). Lake water and sediment. Oxygen consumed in water over sediment cores. *Limnology and Oceanography*, 4, 3, 291-298.
112. Islam, M., Ahmed, M., Raknuzzaman, M., Habibullah-Al-Mamun, M., & Islam, M. K. (2015). Heavy metal pollution in surface water and sediment: A preliminary assessment of an urban river in a developing country. *Ecological Indicators*, 48, 282-291.
113. Hill, C. H., Stratcher, B., & Kim, C. (1967). Role of copper in the formation of elastin. *Federal Proceeding*, 26, 129-133.
114. Al-Bairuty, G., Shaw, B. J., Handy, R.D. & Henry, T. B. (2013). Histopathological effects of waterborne copper nanoparticles and copper sulphate on the organs of Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Aquatic Toxicology*, 126, 104-115.
115. Hodson, P. V., & Hilton, J. W. (1983). The nutritional requirements and toxicity to fish of dietary and waterborne selenium. *Environmental Biogeochemistry Proceeding. 5th Int. Symp. ISEB*. Stockholm, 355-340.

116. Hogendoorn-Roozemon, A. S., Tenholder, J. J., & Stirk, J. J. (1977). The influence of pH on the toxicity of hexavalent chromium to rainbow trout (*Salmo gairdneri*). *Aquatic pollutants – transformation and biological effects : Proceedings of the Second International Symposium on Aquatic Pollutants*. Oxford: Pergamon Press, 477-478.
117. Horowitz, A. J. (1991). *A primer on trace metal-sediment chemistry*. Chelsea, Michigan: Lewis Publishers.
118. Golovanova, I. L., Kuz'mina, V. V., Gobzhel'ian, T. E., Pavlov, D. F., & Chuiko, G. M. (1999). In vitro effects of cadmium and DDVP (Dichlorvos) on intestinal carbohydrase and protease activities in freshwater teleost. *Comparative Biochemistry Physiology*, 122, 1, 21-25.
119. Giguere, A., Campbell, P. G. C., Hare, L., McDonald, D. G., & Rasmussen, J. B. (2003). Influence of lake chemistry and fish age of cadmium, copper and zinc concentrations in various organs of indigenous Yellow perch (*Perca flavescens*). *Canadian Journal of Fisheries Science*, 61(9), 1702-1716.
120. Yang, X. E., Baligar, V. C., Martens, D. C., & Clark, R. B. (1995). Influx, transport and accumulation of cadmium in plant species grown at different Cd^{2+} activities. *Environmental Journal of Environmental Science and Health*, 30, 569-583.
121. Brix, K. V., Esbaugh, A. J., Munley, K. M., & Grosell, M. (2012). Investigations into the mechanism of lead toxicity to the freshwater pulmonate snail, *Lymnaea stagnalis*. *Aquatic Toxicology*, 106-107, 147-156.
122. Janz, D. M. (2012). Selenium in Homeostasis and Toxicology of Essential Metals. *Fish Physiology*, 314, 327-374.
123. Jezierska, B., & Witeska, M. (2006). The metal uptake and accumulation in fish living in polluted waters. *Soil Water Pollution*, 3(23), 107-114.
124. Kjoss, V. A., Grosell, M., & Wood, C. M. (2005). The influence of dietary Na on Cu accumulation in juvenile Rainbow trout exposed to combined dietary and waterborne Cu in soft water. *Environmental Contamination Toxicology*, 49(4), 520-527.
125. Knox, D., Cowey, C. B., & Adron, J. W. (1981). The effect of low dietary manganese intake on rainbow trout (*Salmo gairdneri*). *British Journal of Nutrition*, 46(3), 495-501.
126. Kodama, M., Ogata, T., & Yamamori, K. (1982). Acute toxicity of zinc to Rainbow trout *Salmo gairdneri*. *Japanese Society Science Fishery*, 48(8), 1055-1058.
127. Krishnaja, A. P., & Rege, M. S. (1982). Induction of chromosomal aberrations in fish *Boleophthalmus dussumieri* after exposure *in vivo* to mitomycin C and heavy metals mercury, selenium and chromium. *Mutational Research*, 102(1), 71-82.
128. Lagerwerff, J. V. (1972). Lead, cadmium and mercury as environmental contaminants. *Micronutrients in Agriculture*, 593-636.
129. Leach, R. M. (1988). The role of trace elements in the development of cartilage matrix. *Trace Element in Man and Animals*. Plenum, New York, 267-271.
130. Leach, R. M. (1971). Role of manganese in mucopolysaccharide metabolism. *Federal Proceedings*, 30, 991-994.
131. Ruparelia, S. G., Verma, Y. V., Menhta, N. S., & Salyed, S. R. (1989). Lead-induced biochemical changes in freshwater fish *Oreochromis mossabicus*. *Environmental Contamination Toxicology*, 43, 310-314.

132. Leaner, J. J., & Mason, R. P. (2002). Methyl mercury accumulation and fluxes across the intestine of channel catfish, *Ictalurus punctatus*. *Comparative Biochemistry Physiology*, 132(2), 247-259.
133. Le Blanc, G. A., & Bain, L. J. (1997). Chronic toxicity of environmental contaminants: sentinels and biomarkers. *Environmental Health Perspectives*, 105, 65-80.
134. Lemly, A. D. (1985). Toxicology of selenium in a freshwater reservoir: implications for environmental hazard evaluation and safety. *Ecotoxicology Environmental Safe*, 10(2), 314-338.
135. Lim, C., Sealey, W. M., & Klesius, P. H. (1996). Iron methionine and iron sulfate as sources of dietary iron for channel catfish (*Ictalurus punctatus*). *Journal World Aquaculture Society*, 27(3), 290-296.
136. Linnik, P. N., Zhezherya, V. A., & Zubenko, I. B. (2012). Content of metals and forms of their migration in the water of the rivers of the Pripyat River Basin. *Hydrobiological Journal*, 48(2), 85-101.
137. Linnik, P., & Zhezherya, V. (2011). Peculiarities of metals migration in the "bottom sediments – water" system with decreasing pH and increasing the concentration of fulvic acids. *Hydrobiological Journal*, 47(5), 86-101.
138. Linnik, P. N. (2000). Heavy metals in surface waters of Ukraine: Their content and forms of migration. *Hydrobiological Journal*, 36(3), 31-54.
139. Lovell, R. T. (1996). Selenium in fish feeds: nutritional, environmental and legal aspects. *Aquaculture Magazine*, 22(1), 76-81.
140. Maage, A., Sveier, H., & Julshamn, K. (1989). A comparison of growth rate and trace element accumulation in Atlantic salmon (*Salmo salar*) fry fed four different commercial diets. *Aquaculture*, 79(14), 267-273.
141. Madoni, P. (2000). The acute toxicity of nickel to freshwater ciliates. *Environmental Pollution*, 109, 53-59.
142. Madoni, P., & Romeo, M. G. (2006). Acute toxicity of heavy metals towards freshwater ciliated protists. *Environmental Pollution*, 141, 1-7.
143. Magarios, B., Romalde, J. L., & Lemos, M. L. (1994). Iron uptake by *Pasteurella piscicida* and its role in pathogenicity for fish. *Applied Environmental Microbiology*, 60, 2990-2998.
144. Maier, K. J., & Knight, A. W. (1991). The toxicity of waterborne boron to *Daphnia magna* and *Chironomus decorus* and the effects of water hardness and sulfate on boron toxicity. *Environmental Contamination Toxicology*, 20(2), 282-287.
145. May, T. W., & McKinney, G. L. (1981). Cadmium, lead, mercury, arsenic, and selenium concentrations in freshwater fish 1976-1977. *Pesticide Monitoring Journal*, 15, 14-38.
146. Mazen, A. M. A., & El-Maghraby, O. M. O. (1998). Accumulation of cadmium, lead and strontium, and a role of calcium oxalate in water hyacinth tolerance. *Biology Plantarum*, 40, 3, 411-417.
147. Mebane, C. A., Hennessy, D. P., & Dillon, F. S. (2008). Developing acute-to-chronic toxicity ratios for lead, cadmium, and zinc using Rainbow Trout, a mayfly, and a midge. *Water, Air, & Soil Pollut*, 188(14), 41-66.
148. Miller, P. A., Munkittrick, K. R., & Dixon, D. G. (1992). Relationship between concentrations of copper and zinc in water, sediment, benthic invertebrates, and tissues of white sucker (*Catostomus commersoni*) at metal-contaminated sites. *Canadian Journal Fishery Science*, 49, 978-984.

149. Cernik, M., Federer, P., Borkovec, M., & Sticher, H. (1994). Modeling of heavy metal transport in a contaminated soil. *Journal Environmental Quality*, 23, 1239-1248.
150. Moss, B. (2008). Water pollution by agriculture. *Philosophical Transactions of The Royal Biological Sciences*, 363, 659-666.
151. Nam, S. H., Yang, C. Y., & An, Y. J. (2009). Effects of antimony on aquatic organisms (larva and embryo of *Oryzias latipes*, *Moina macrocopa*, *Simocephalus mixtus*, and *Pseudokirchneriella subcapitata*). *Chemosphere*, 75(7), 889-893.
152. Nduka, J. K. C., Constance, E., & Obiakor, E. (2006). Selective bioaccumulation of metals by different parts of some fish species from crude oil polluted water. *Environmental Contamination Toxicology*, 77(5), 846-853.
153. Neville, C. M. (1985). Physiological response of juvenile Rainbow trout, *Salmo gairdneri*, to acid and aluminium – prediction of field responses from laboratory data. *Canadian Journal Fishery Science*, 42, 2004-2019.
154. Newcombe, C. P., & MacDonald, D. D. (1991). Effects of suspended sediments on aquatic ecosystems. *North American Journal Fishery Management*, 11, 72-82.
155. Nriagu, J. O. (1990). Global metal pollution. *Environment*, 32, 6-21.
156. Pacyna, E. G., & Pacyna, J. M. (2002). Global emission of mercury from anthropogenic sources in 1995. *Water Air Soil Pollution*, 137(14), 149-165.
157. Wang, T. C., Weissman, J. C., Ramesh G., Varadarajan, R., & Benemann, J. R. (1996). Parameters for Removal of Toxic Heavy Metals by Water Milfoil (*Myriophyllum spicatum*). *Environmental Contamination Toxicology*, 57, 779-786.
158. Penrose, W. R. (1972). Arsenic in the marine and aquatic environment: analysis, occurrence and significance. *Environmental Control*, 4(14), 465-482.
159. Pickering, Q. H., & Henderson, C. (1966). The acute toxicity of some heavy metals to different species of warm water fishes. *Air Water Pollution International Journal*, 10, 453-463.
160. Poleo, A. B. S., & Hytterod, S. (2003). The effect of aluminium in Atlantic salmon (*Salmo salar*) with special emphasis on alkaline water. *Journal Inorganic Biochemistry*, 97, 89-96.
161. Ptashynski, M. D., & Klaverkamp, J. F. (2002). Accumulation and distribution of dietary nickel in lake whitefish (*Coregonus clupeaformis*). *Aquatic Toxicology*, 58, 249-264.
162. Prasad, M. N. V., Malec, P., Waloszek, A., Bojko, M., & Strzaeka, K. (2001). Physiological Responses of *Lemna trisulka* L. (Duckweeds) to Cadmium and Copper Bioaccumulation. *Plant Science*, 161, 881-889.
163. Sood, A., Uniyal, P. L., Prasanna, R., & Ahluwalia, A. S. (2012). Phytoremediation potential of aquatic macrophyte *Azolla*. *Ambio*, 41(2), 122-137.
164. Gundersen, D. T., Bustaman, S., Seim, W. K., & Curtis, L. R. (1994). pH, hardness, and humic acid influence aluminum toxicity to Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) in weakly alkaline waters. *Canadian Journal Fishery Science*, 51, 1345-1355.
165. Rabajczyk, A. (2012). The relationship between metal forms found in river bottom sediments and land development (review). *Water pollution*. Rijeka: InTech, 189-202.
166. Rai, P. K. (2010). Heavy metal pollution in lentic ecosystem of sub-tropical industrial region and its phytoremediation. *International Journal Phytoremediation*, 12(3), 226-242.

167. Rama, D. S., & Prasad, M. N. V. (1999). Heavy metal stress in plants. *From molecules to ecosystems*, 99-117.
168. Rana, S. V. S., Singh, R., & Verma, S. (1995). Mercury-induced lipid peroxidation in the liver, kidney, brain and gills of a fresh water fish, *Channa punctatus*. *Japanese Journal Ichthyology*, 43, 255-259.
169. Rankin, M. G., & Dixon, D. G. (1994). Acute and chronic toxicity of waterborne arsenite to Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Canadian Journal Fisheries Science*, 51, 372-380.
170. Ray, J., Brown, M. W., & Solbe J. F. (1987). Metallothionein gene expression and cadmium toxicity in freshwater fish. *Metallothionein 2: Proc. 2nd Int. Meet. Metallothionein and Low Mol. Weight Metal-bind. Proteins*, Zürich, Aug. 24. Basel; Boston, 627-630.
171. Redding, M. (2002). DNA synthesis after exposure to heavy metals in the testis of the Spiny dogfish. *Aquatic Toxicology: Mechanisms and Consequences: Symp. Proceed.* Vancouver, B. C., 27-30.
172. Ward, D. M., Nilsow, K. H., Chen, C. Y., & Folt, C. L. (2010). Reduced trace element concentrations in fast-growing juvenile Atlantic salmon in natural streams. *Environmental Science Technology*, 44(9), 3245-3251.
173. Reid, S. D. (2002). Physiological impact of acute molybdenum exposure in juvenile Kokanee salmon (*Oncorhynchus nerka*). *Comparative Biochemistry Physiology*, 133(3), 355-367.
174. Hansen, J. A., Lipton J., Welsh, P.G., Morris, J., Cacela, D., & Suedkamp, M. J. (2002). Relationship between exposure duration, tissue residues, growth, and mortality in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) juveniles sub-chronically exposed to copper. *Aquatic Toxicology*, 58, 175-188.
175. Reza, R., & Singh, G. (2010). Heavy metal contamination and its indexing approach for river water. *International Journal of Environmental Science & Technology*, 7(4), 785-792.
176. Ristenbil, Y. W., & Gerringa, L. G. A. (2002). Interaction of algal ligands, metal complexation and availability and cell responses of the diatom *Ditulum brightwellii* with a gradual of copper. *Aquatic Toxicology*, 56, 115-131.
177. Roualt, T. A., & Tong, W. H. (2005). Iron-sulphur cluster biogenesis and mitochondrial iron homeostasis. *Natural Review Molecular Cell Biology*, 6(4), 345-351.
178. Samkaram, U. K., & Philip, S. (1990). Heavy metal uptake and accumulation by *Thypha angustifolia* from wetlands around thermal power station. *International Journal Ecology and Environmental Science*, 2(3), 133-144.
179. Coulibaly, S., Atse, B. C., Koffi, K. M., Sylla, S., Konan, K. J., & Kouassi, N. J. (2012). Seasonal accumulation of some heavy metals in water, sediment and tissue of black chinned tilapia *Sarotherodon melanocheilus* from Biétri Bay in Ebrié Lagoon, Ivory Coast. *Environmental Contamination Toxicology*, 88, 571-576.
180. Ravera, O., Beone, G. M., Trinchini, P. R., & Riccardi, N. (2007). Seasonal variations in metal content of two *Unio pictorum* populations from two lakes of different trophic state. *Journal Limnology*, 66, 28-39.
181. Ribeiro, A. R. A., Ribeiro, L., Saele, O., Hamre, K., Dinis, M. T., & Mjren, M. (2012). Selenium supplementation changes glutathione peroxidase activity and

- thyroid hormone production in Senegalese sole (*Soleasene galensis*) larvae. *Aquaculture Nutrition*, 18(5), 559-567.
182. Huang, S. S.-Y., Strathe, A. B., Wang, W.-F., Deng, D.-F., J. G., Fadel, J. G., & Hung, S. S. O. (2012). Selenocompounds in juvenile white sturgeon: Evaluating blood, tissue and urine selenium concentrations in juvenile sturgeon after a single oral dose. *Aquatic Toxicology*, 109, 158-165.
 183. Senn, D. B., & Hemond, H. F. (2004). Particulate arsenic and iron during anoxia in a eutrophic, urban lake. *Environmental Toxicology Chemistry*, 23, 1610-1616.
 184. Shehata, S., & Bard, S. (1980). Growth response of *Scenedesmus* to different concentrations of copper, cadmium, nuckei, zinc and lead. *Environmental International*, 4(6), 431-434.
 185. Simkiss, K., & Taylor, M. G. (1989). Metal fluxes across the membranes of aquatic organisms. *Critical Review Aquatic Science*, 1, 173-179.
 186. Shiau, S. Y., & Lin, S. F. (1990). Effect of supplemental dietary chromium and vanadium on the utilization of different carbohydrates in tilapia, *Oreochromis niloticus*, *O. aureus*. *Aquaculture*, 110, 321-330.
 187. Skidmore, J. F. (1970). Respiration and osmoregulation in rainbow trout with gills damaged by zinc sulphate. *Journal Experimental Biology*, 52, 481-494.
 188. Sonesten, L. (2003). Fish mercury levels in lakes – adjusting for Hg and fish-size covariation. *Environmental Pollution*, 125, 255-265.
 189. Sokolova, I. M., & Lannig, G. (2008). Interactive effects of metal pollution and temperature on metabolism in aquatic ectotherms: implications of global climate change. *Climatuc Reserch*, 37, 181-201.
 190. Sorensen, E. M. (1992). *Metal poisoning in fish*. U. S. A. Texas: CRC Press.
 191. Speyer, M. R., & Leduc, G. (1975). Effects of arsenic trioxide on growth on Rainbow trout. *Abstracts of Int. Conf. Heavy Metals in the Environment*. Toronto, Canada, 17-19.
 192. Spry, D. J., & Wiener, J. G. (1991). Metal bioavailability and toxicity to fish in low-alkalinity lakes: a critical review. *Environmental Pollution*, 71, 243-304.
 193. Vavilin, D. V., Polynov, V. A., Matorin, D. N., & Venediktov, P. S. (1995). Sublethal concentration of copper stimulate photosystem II photoinhibition in *Chlorella pyrenoidosa*. *Plant Physiology*, 146, 609-614.
 194. Rider, S. A., Davies, S. J., Jha, A. N., Fisher, A. A., Knight, J., & Sweetman J. W. (2009). Supra-nutritional dietary intake of selenite and selenium yeast in normal and stressed Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*): implications on selenium status and health responses. *Aquaculture*, 295(34), 282-291.
 195. Buckler, D. R., Cleveland, L., Little, E. E., & Brumbaugh, W. G. (1995). Survival, sublethal responses and tissue residues of Atlantic salmon exposed to acidic pH and aluminum. *Aquatic Toxicology*, 31, 203-216.
 196. Suns, K., & Hitchin, G. (1990). Interrelationships between mercury levels in yearling yellow perch, fish condition and water quality. *Water Air Soil Pollution*, 650, 255-265.
 197. Sutherland, D. E., & Stillman, M. J. (2011). The «magic numbers» of metallothionein. *Metallomics*, 3(5), 444-463.
 198. Tamaki, S., & Frankenberger, Jr. W. T. (1992). Environmental chemistry of arsenic. *Environmental Contamination Toxicology*, 124, 79-110.
 199. De Schamphelaere, K. A. C., Stubblefield, W., Rodriguez K. & Janssen C. R. (2010). The chronic toxicity of molybdate to freshwater organisms // *Science Total Environmental*, 408(22), 5362-5371.

200. Kierner, M., Black, K. D., Lussot, D., Bullock, A. M., & Ezzi I. (1995). The effects of chronic and acute exposure to hydrogen sulphide on Atlantic salmon (*Salmo salar* L.). *Aquaculture*, 135(4), 311-327.
201. Doe, K. G., Parker, W. R., Ponsford, S. J., & Vaughan, J. D. A. (1987). The acute and chronic toxicity of antimony to *Daphnia magna* and Rainbow Trout. *Proceedings of the 13-th Annual Aquatic Toxicology Workshop*. Moncton; New Brunswick, Canada, 40-43.
202. Thomas, D. J., Styblo, M., & Lin, S. (2001). The cellular metabolism and systemic toxicity of arsenic. *Toxicology Applied Pharmacology*, 176, 127-144.
203. Thompson, J., Davis, J. C., & Drew, R. E. (1976). Toxicity, uptake and survey studies of boron in the marine environment. *Water Reserch*, 10, 869-875.
204. Marr, J. C. A., Hansen J. A., Meyer J. S., Cacula, D., Podrabsky, T., & Lipton, J. (1998). Toxicity of cobalt and copper to Rainbow trout: application of a mechanistic model for predicting survival. *Aquatic Toxicology*, 43, 225-238.
205. Holland, G. A., Lasater, J. E., Neumann, E. D., & Eldridge, W. E. (1960). Toxic effects of organic and inorganic pollutants on young salmon and trout. *Fishery Research Bulletin*, 5.
206. Travieso, L., Conizares, R. O., & Borya R. (1999). Heavy metal removal by Microalgae. *Environmental Contamination Toxicology*, 62, 144-151.
207. Valee, B. L., & Ulmer, D. D. (1972). Biochemical effects of mercury, cadmium and lead. *Annual Review Biochemistry*, 41, 91-128.
208. Vankhede, G. N. (2003). Effect of CuSO_4 and ZnSO_4 on branchial $\text{Na}^+\text{-K}^+$ – ATPase activity the fish, *Channa punctatus*. *Journal Ecobiology*, 15(4), 287-293.
209. Varanasi, U., & Gmur, D. J. (1978). Influence of water-borne and dietary calcium on uptake and retention of lead by Coho salmon (*Oncorhynchus kisutch*). *Toxicology Applied Pharmacology*, 46(1), 65-75.
210. Velma, V., & Tchounwou, P. B. (2013). Oxidative stress and DNA damage induced by chromium in liver and kidney of goldfish *Carassius auratus*. *Biomarker Insights*, 8, 43-51.
211. Vesk, P. A., Nockolds, C. E., & Allaway, W. G. (1999). Metal localization in water hyacinth roots from an urban wetland. *Plant Cell Environmental*. 22(2), 149-158.
212. Vetra, M. (1990). Changes in fish mercury concentrations in an intensively fished lake. *Cananadian Journal Fishery Science*, 47, 1888-1897.
213. Vincent, J. B. (2000). The biochemistry of chromium. *Journal of Nutrition*, 130, 715-718.
214. Vinodhini, R., & Narayanan, M. (2009). The impact of toxic heavy metals on the hematological parameters in common carp (*Cyprinus carpio* L.). *Iranian Journal Environmental Health Science*, 6(1), 23-28.
215. Volesky, Z. R., & Holan, A. (1995). Biosorption of heavy metals. *Biotechnology Progress*, 11, 235-250.
216. Vuori, K. M. (1995). Direct and indirect effects of iron on river ecosystems. *Annual Zoology Fennici*, 32, 317-329.
217. Wang, D. (1994). *The Environmental Biogeochemistry of Selenium in Natural Water Ecosystem*. Helsinki: National Public Health Institute.
218. Wang, W. (1987). Chromate ions, as a reference toxicant for aquatic phytotoxicity test. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 6(12), 953-960.
219. Rai, U. N., Sinha, S., Tripathi, R. D., & Chandra, P. (1995). Wastewater treatability potential of some aquatic macrophytes: removal of heavy metal. *Ecological engineering*, 5, 5-12.

220. Watanabe, T., Kiron, V., & Satoh H. (1997). Trace minerals in fish nutrition. *Aquaculture*, 151(14), 185-207.
221. Waser, W., Bausheva, O., & Nikinmaa, M. (2009). The copper-induced reduction of critical swimming speed in Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) is not caused by changes in gill structure. *Aquatic Toxicology*, 94, 77-79.
222. Wester, P. W. (1991). Histopathological effects of environmental pollutants b-HCH and methylmercury on reproductive organs in freshwater fish. *Comparison Biochemictry and Physiology*, 100(12), 237.
223. Winfrey, M. R., & Rudd, J. W. M. (1990). Environmental factors affecting the formation of methylmercury in low pH lakes: a review. *Environmental Toxicology Chemistry*, 9, 853-869.
224. Wright, D. A. (1995). Trace metal and major ion interactions in aquatic animals. *Marine Pollution Bulletin*, 31(13), 8-18.

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 108-127
DOI: 10.15407/fsu2019.02.108
УДК 016:574.5.08

Received 11.02.2019
Received in revised form 16.03.2019
Accepted 25.04.2019

МЕТОДИ ГІДРОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ТЕМАТИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

І. Й. Грициняк, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Формування довідкового переліку україно- та російськомовних публікацій з питань застосування класичних та сучасних методів дослідження біоти водойм — бактеріо-, фіто-, зоопланктону, зообентосу, вищої водної рослинності.

Методика. Під час системного пошуку у процесі підготовки тематичного переліку було застосовано як цілісний, так і вибірковий методи. Бібліографічне ядро складало виключно україно- та російськомовні наукові видання, наявні у фонді наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 150 джерел, що охоплюють часовий інтервал з 1949 по 2017 рр., і присвячені розробці та впровадженню методів досліджень водних біоценозів, їх окремих компонентів та продуктивних характеристик. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Підготовлений список публікацій може бути використаний науковцями, практиками, студентами, до сфери інтересів яких належать питання гідробіології, гідроecології, зоології та аквакультури.

Ключові слова: бактеріопланктон, фітопланктон, макрофіти, зоопланктон, зообентос, продуктивність, гідробіонти.

METHODS OF HYDROBIOLOGICAL RESEARCH. THEMATIC BIBLIOGRAPHY

Ir. Hrytsyniak, library@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
T. Shvets, library@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Creation of a thematic bibliographic list of publications on the use of classical and modern methods for studying the biota of water bodies - bacterio-, phyto-, zooplankton, zoobenthos, higher aquatic plants.

Methods. The complete and selective methods were applied in the process of the systematic search. The bibliographic core have been formed with the publications exclusively in Ukrainian and Russian from the fund of scientific library of the Institute of Fisheries NAAS of Ukraine.

Results. A thematic list of publications with a total quantity of 150 sources covering the time interval from 1949 to 2017, and devoted to the development and application of methods for studying aquatic biocenoses, their individual components and productive characteristics has been composed. The literary sources are arranged in alphabetical order by author or title, and described according to DSTU 8302:2015 "Information and documentation. Bibliographic reference. General principles and rules of composition", with the amendments (code UKND 01.140.40), as well as in accordance with the requirements of APA style — international standard of references.

© І. Й. Грициняк, Т. М. Швець, 2019

Practical value. The list may be useful for scientists, practitioners, students, whose area of interests covers the questions of hydrobiology, hydroecology, zoology and aquaculture.

Key words: bacterioplankton, phytoplankton, macrophytes, zooplankton, zoobenthos, productivity, hydrobionts.

МЕТОДЫ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ТЕМАТИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Ир. И. Грициняк, library@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Т. М. Швець, library@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Формирование справочного перечня украино- и русскоязычных публикаций по вопросам использования классических и современных методов исследования биоты водоемов — бактерио-, фито-, зоопланктона, зообентоса, высшей водной растительности.

Методика. В ходе системного поиска в процессе подготовки тематического перечня были применены как целостный, так и выборочный методы. Библиографическое ядро составляли исключительно украино- и русскоязычные научные издания, имеющиеся в фонде научной библиотеки Института рыбного хозяйства НААН Украины.

Результаты. Сформирован тематический библиографический перечень публикаций в количестве 150 источников, охватывающих временной интервал с 1949 по 2017 гг., и посвященных разработке и внедрению методов изучения водных биоценозов, их отдельных компонентов и продуктивных характеристик. Литературные источники размещены в алфавитном порядке по автору или названию, описаны согласно ДСТУ 8302:2015 «Информация и документация. Библиографическая ссылка. Общие положения и правила составления», с учетом поправок (код УКНД 01.140.40), а также в соответствии с требованиями к оформлению списка литературы по международному стандарту APA style.

Практическая значимость. Подготовленный список публикаций может быть использован учеными, практиками, студентами, в сферу интересов которых входят вопросы гидробиологии, гидроэкологии, зоологии и аквакультуры.

Ключевые слова: бактериопланктон, фитопланктон, макрофиты, зоопланктон, зообентос, продуктивность, гидробионты.

1. Алеев М. Ю. Новый метод определения скорости плавания планктонных организмов // Гидробиологический журнал. 1991. Т. 27, № 6. С. 70—74.
2. Андреев А. А. Методика измерения напряжения кислорода в мышечных тканях свободноплавающих гидробионтов // Гидробиологический журнал. 1977. Т. 13, № 4. С. 118—119.
3. Андроникова И. Н. Оценка двух методов расчета продукции пресноводного зоопланктона // Гидробиологический журнал. 1976. Т. 12, № 1. С. 71—75.
4. Андронникова И. Н. Соотношение биомасс протозойного и метазойного планктона как экспресс-метод для расчета продукции простейших в озерах разного трофического типа // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1983. Вып. 196. С. 50—56.
5. Апонасенко А. Д., Сидько Ф. Я., Васильев В. А. Определение концентраций хлорофилла фитопланктона по дифференциальным спектрам поглощения света // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеиздат, 1993. С. 97—100.
6. Асочаков А. А. К методике измерения длины тела амфипод // Гидробиологический журнал. 1993. Т. 29, № 2. С. 90—93.

7. Афанасьев С. А. К методике изучения сообществ перифитона в условиях высокогетерогенного биотопа // Гидробиологический журнал. 1988. Т. 24, № 4. С. 86—87.
8. Баканов А. И. Методы повышения достоверности оценки кормовой базы рыб-бентофагов // Гидробиологический журнал. 1977. Т. 13, № 4. С. 107—111.
9. Белова С. Л. К методике определения объемов простейших // Гидробиологический журнал. 1982. Т. 18, № 1. С. 110—112.
10. Богатов В. В. Метод расчета миграционной активности и дистанции дрейфа бентоса в крупных реках // Гидробиологический журнал. 1985. Т. 21, № 3. С. 86—89.
11. Бойко Е. Г. Обработка материалов сезонных сборов графическим методом // Гидробиологический журнал. 1978. Т. 14, № 2. С. 92—95.
12. Бульон В. В. Внеклеточная продукция фитопланктона и методы ее исследования // Гидробиологический журнал. 1988. Т. 24, № 3. С. 64—73.
13. Бульон В. В. Радиоуглеродный метод определения первичной продукции фитопланктона, его возможности и ограничения в сравнении с кислородным методом // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеиздат, 1993. С. 14—20.
14. Буяновский А. И. Прогноз потенциального вылова прибрежных беспозвоночных при затруднении с оценкой запаса. Методические рекомендации. Москва : ВНИРО, 2012. 222 с.
15. Вехов Н. В. Методические рекомендации по изучению биологии *Anostraca* (Crustacea, Branchiopoda) в мелких водоемах // Гидробиологический журнал. 1989. Т. 25, № 5. С. 74—77.
16. Використання нетрадиційних біоресурсів внутрішніх водойм на основі підвищення їх біорізноманітності методами культивування та інтродукції : науково-практична інструкція / Харченко Т. А. та ін. Київ : Інститут гідробіології НАНУ, 2000. 64 с.
17. Винберг Г. Г. Сравнительная оценка некоторых распространенных методов расчета продукции водных бактерий // Гидробиологический журнал. 1971. Т. 7, № 4. С. 86—96.
18. Владимирова К. С. Методика изучения первичной продукции донных водорослей // Гидробиологический журнал. 1969. Т. 5, № 4. С. 128—130.
19. Воскресенский К. А., Лебедева Л. И. Изучение популяций кладоцер методом полуизоляции в водоеме // Зоологический журнал. 1964. Т. 43, вып. 4. С. 518—524.
20. Гавриленко М. Я., Биргер Т. И., Гусынская С. Л. К методике разделения зоопланктона и фитопланктона в сестоне // Гидробиологический журнал. 1975. Т. 11, № 6. С. 106—109.
21. Гаврилов Е. Н., Зубов В. И. Методические особенности оценки запасов ламинариевых водорослей гидроакустическим методом // Гидроакустические исследования на внутренних водоемах : Всерос. конф., Борок, 2-4 дек. 2008 г. : матер. докл. Борок, 2008. С. 19—25.
22. Гаевский Н. А., Шатров И. Ю., Гольд В. М. Флуоресцентный анализ пигментов фитопланктона // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеиздат, 1993. С. 101—109.

23. Гайсина Л. А., Фазлутдинова А. И., Кабиров Р. Р. Современные методы выделения и культивирования водорослей : учебное пособие. Уфа : БГПУ, 2008. 152 с.
24. Галковская Г. А. Методы определения продукции планктонных коловраток // Вопросы рыбного хозяйства Белоруссии. 1972. Т. 8. С. 98—104.
25. Гидробиологический практикум. Ч. 2 : Методы определения биологической продуктивности. Москва : МГУ им. М. В. Ломоносова, 1999. 111 с.
26. Голубкова М. Г. Методы физиолого-биохимического исследования водорослей в гидробиологической практике // Гидробиологический журнал. 1976. Т. 12, № 3. С. 110.
27. Гольд В. М., Попельницкий В. А. Определение фотосинтеза фитопланктона флуоресцентным методом // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеиздат, 1993. С. 25—29.
28. Горячев Ю. В. Методика объективной регистрации движения инфузорий // Гидробиологический журнал. 1969. Т. 5, № 6. С. 107—109.
29. Давидов О. А. Методи визначення характеристик головних угруповань гідробіонтів водних екосистем: Епіфітні угруповання водоростей // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 33—37.
30. Дружков Н. В. Метод хранения проб морского скелетного протозойного микропланктона // Гидробиологический журнал. 1991. Т. 27, № 3. С. 97—98.
31. Дыхание фитопланктона. Проблемы и методы / Гольд В. М. и др. // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеиздат, 1993. С. 66—74.
32. Дьяченко Т. М. Макрофіти. Визначення видового складу і структури рослинних угруповань // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 42—44.
33. Дьяченко Т. М. Макрофіти. Визначення фітомаси і продукції рослинних угруповань // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 48—52.
34. Дьяченко Т. М. Макрофіти. Визначення характеру заростання і розподілу рослинності // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 44—46.
35. Дьяченко Т. М. Макрофіти. Визначення ценотичного складу водної рослинності // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 46—48.
36. Дьяченко Т. М. Макрофіти. Оцінка стану екосистем водних об'єктів за структурно-функціональними характеристиками макрофітів // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 53—58.
37. Елизарова В. А. Опыт определения продукции фитопланктона альгологическим методом // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеиздат, 1993. С. 52—58.
38. Заходнова Т. А. Определение продукции микрофитобентоса двумя способами // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1983. Вып. 196. С. 31—33.

39. Иванков В. Н. К методике определения плодовитости пойкилотермных животных // Гидробиологический журнал. 1974. Т. 10, № 1. С. 99—102.
40. Иоффе Ц. И. К методике изучения сноса бентических организмов рекой и его роль в заселении водохранилища // Известия ВНИОРХ. 1949. Т. 29. С. 96—105.
41. Калайда М. Л., Говоркова Л. К. Методы рыбохозяйственных исследований : учебное пособие. Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2013. 288 с.
42. Катанская В. М. Высшая водная растительность континентальных водоёмов СССР: методы изучения. Ленинград : Наука, 1981. 187 с.
43. Ковалевский В. Н. Методы оценки состояния популяций кубанского рака, прогнозирование промысловых запасов // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 253—255.
44. Коваленко В. Ф. К методике определения газообмена у водных животных // Гидробиологический журнал. 1986. Т. 22, № 4. С. 102—104.
45. Кокина А. Г. Использование метода прямого счета бактерий при изучении процесса самоочищения подземных вод // Гидробиологический журнал. 1970. Т. 6, № 1. С. 104—108.
46. Колупаев Б. И., Андреев А. А., Самойленко Ю. К. Оптический метод регистрации сердечного ритма у дафний // Гидробиологический журнал. 1977. Т. 13, № 3. С. 119—120.
47. Константинов А. С. К методике определения продукции кормовых для рыб животных // Биологические науки. 1960. № 4. С. 59—62.
48. Корнюшенко Г. А. Хроматографический метод и возможности его использования для изучения пигментов фитопланктона // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеиздат, 1993. С. 86—96.
49. Коцарь Н. И. Методика определения двуокси углерода внешнего дыхания гидробионтов при различном ее уровне в водной среде // Гидробиологический журнал. 1988. Т. 24, № 1. С. 72—74.
50. Кравчук Т. С. К методам исследования математических моделей регулирования биоценозов // Гидробиологический журнал. 1973. Т. 9, № 1. С. 107—113.
51. Кравчук Т. С., Мырзакова Л. И. Исследование конкуренции нескольких видов высших водных растений с применением математических методов // Гидробиологический журнал. 1987. Т. 23, № 2. С. 86—93.
52. Кражан С. А., Лупачева Л. Ю. Естественная кормовая база водоёмов и методы её определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства (Справочный материал для работников прудовых хозяйств УССР). Львов, 1991. 102 с.
53. Крылов П. И. Радиоизотопные методы изучения питания и трансформации энергии пищи зоопланктоном // Гидробиологический журнал. 1980. Т. 16, № 6. С. 63—79.
54. Кузнецов С. И., Дубинина Г. А. Методы изучения водных микроорганизмов. Москва : Наука, 1989. 285 с.
55. Кутикова Л. А. К методике исследований коловраток // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1983. Вып. 196. С. 61—66.
56. Ладейщикова Е. Н., Васильева Г. Л. К методике обработки некоторых экспериментальных материалов по зоопланктону // Гидробиологический

- журнал. 1976. Т. 12, № 3. С. 97—103.
57. Лебедев Ю. М. Балансовый метод и определение первичной продукции в водотоках // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеиздат, 1993. С. 59—65.
 58. Лебедева М. Н. Планирование эксперимента при изучении времени генерации бактерии методом склянок // Гидробиологический журнал. 1970. Т. 6, № 3. С. 116—122.
 59. Левадная Г. Д. Методы исследования фитобентоса континентальных водоемов // Гидробиологический журнал. 1975. Т. 11, № 3. С. 85—90.
 60. Ляшенко А. В. Методи визначення характеристик головних угруповань гідробіонтів водних екосистем: Макрозообентос // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 101—118.
 61. Максимов В. Н., Горидченко Т. П. Применение метода функции желательности для оценки качества воды по составу перифитона // Биологические науки. 1985. № 8. С. 105—110.
 62. Мамонтова Л. М., Кожова О. М. Бактериопланктон ангарских водохранилищ и статистические методы его анализа. Ленинград, 1979. 119 с.
 63. Матвеев В. Ф. Оценка конкуренции в природе с помощью метода множественной регрессии. Анализ взаимодействия трех видов зоопланктона // Журнал общей биологии. 1976. Т. 37, № 6. С. 822—830.
 64. Метод комплексной оценки токсичности донных отложений с применением бентосных и планктонных организмов / Романенко В. Д. и др. // Гидробиологический журнал. 2011. Т. 48, № 6. С. 32—42.
 65. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Задачи и методы изучения использования кормовой базы рыбой / сост. Салазкин А. А., Огородникова В. А. Ленинград : ГосНИОРХ ; Промрыбвод ; Зоологический институт, 1984. 19 с.
 66. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Бактериопланктон и его продукция / сост. Романова Ю. А., Фурсенко М. В. Ленинград : ГосНИОРХ ; Зоологический институт, 1984. 22 с.
 67. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция / сост. Салазкин А. А. и др. Ленинград : ГосНИОРХ ; Зоологический институт, 1984. 52 с.
 68. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зоопланктон и его продукция / сост. Салазкин А. А., Иванова М. Б., Огородникова В. А. Ленинград : ГосНИОРХ ; Зоологический институт, 1982. 34 с.
 69. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Фитопланктон и его продукция / сост. Лаврентьева Г. М., Бульон В. В. Ленинград : ГосНИОРХ ; Зоологический институт, 1981. 32 с.
 70. Методичні основи гідробіологічних досліджень водних екосистем. Київ, 2002. 52 с.

71. Методы гидробиологических исследований планктона // Сборник классических методов гидробиологических исследований для использования в аквакультуре / сост. Плотников Г. К. и др. Даугавпилс : Сауле, 2017. С. 56—68.
72. Методы гидробиологического исследования : учеб. пособие. Москва : Высшая школа, 1960. 192 с.
73. Методы исследований перифитона // Сборник классических методов гидробиологических исследований для использования в аквакультуре / сост. Плотников Г. К. и др. Даугавпилс : Сауле, 2017. С. 115—122.
74. Методы исследований фитофильной фауны // Сборник классических методов гидробиологических исследований для использования в аквакультуре / сост. Плотников Г. К. и др. Даугавпилс : Сауле, 2017. С. 123—124.
75. Методы исследования зоопланктона // Сборник классических методов гидробиологических исследований для использования в аквакультуре / сост. Плотников Г. К. и др. Даугавпилс : Сауле, 2017. С. 69—79.
76. Методы исследования фитопланктона // Сборник классических методов гидробиологических исследований для использования в аквакультуре / сост. Плотников Г. К. и др. Даугавпилс : Сауле, 2017. С. 80—99.
77. Методы определения продукции водных животных. Методическое руководство и материалы / общ. ред. Винберг Г. Г. Минск : Вышэйшая школа, 1968. 248 с.
78. Методы сбора и обработки бентоса // Сборник классических методов гидробиологических исследований для использования в аквакультуре / сост. Плотников Г. К. и др. Даугавпилс : Сауле, 2017. С. 100—114.
79. Методы сбора и обработки гидробиологических проб / Студеникина Е. И. и др. // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 50—59.
80. Методы физиолого-биохимического исследования водорослей в гидробиологической практике. Киев : Наукова думка, 1975. 247 с.
81. Михайловский Г. Е. Описание и оценка состояний планктонных сообществ. Москва : Наука, 1988. 214 с.
82. Мусатов А. П. Оценка параметров экосистем внутренних водоемов. Москва : Научный мир, 2001. 192 с.
83. Нестерова Д. А. К методике сбора фитопланктона в приповерхностном слое моря // Гидробиологический журнал. 1969. Т. 5, № 3. С. 87—89.
84. Нефедов В. Н., Колесников Г. В. Особенности роста и методы определения возраста у речных раков // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1984. Вып. 215. С. 76—104.
85. Новокшенов Ю. Д., Безруков Н. П. Сравнительная характеристика методов определения первичной продукции и деструкции планктона рыбоводных прудов // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1981. Вып. 162. С. 205—210.
86. Новосадов А. Г. Альтернативные методы декапсуляции яиц артемии // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : Междунар. науч.-практ. конф., 17-19 дек. 2007 г. : матер. и докл. Москва : Россельхозакадемия, 2007. С. 193—195.

87. Оксийук О. П., Давыдов О. А., Меленчук Г. В. Применение метода Браун-Бланке при ценологическом анализе микрофитобентоса // Гидробиологический журнал. 2004. Т. 41, № 5. С. 101—114.
88. Оксийук О. П., Юрченко В. В. К методике определения биомассы фитопланктона // Гидробиологический журнал. 1969. Т. 5, № 6. С. 104—107.
89. Олійник Г. М. Визначення загальної чисельності бактерій у воді при забарвленні акридиноранжем // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 63—64.
90. Олійник Г. М. Визначення загальної чисельності бактерій у воді при забарвленні 4,6-діамідино-2-фенілоіндолом (DAPI) // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 65—66.
91. Олійник Г. М. Визначення метаболічно активних бактерій у воді і донних відкладах водойм // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 81—84.
92. Определение первичной продукции и деструкции органического вещества // Сборник классических методов гидробиологических исследований для использования в аквакультуре / сост. Плотников Г. К. и др. Даугавпилс : Сауле, 2017. С. 125—128.
93. Определение продукции популяций водных сообществ : учебно-методическое пособие. Новосибирск : Наука, 2000. 63 с.
94. Оптимизация метода тотального учета бентосных бактерий / Дзюбан А. Н. и др. // Гидробиологический журнал. 2001. Т. 37, № 4. С. 102—107.
95. Особенности диагностики функционального состояния одноклеточных водорослей в жидких средах люминесцентными методами / Вакуленко О. В. и др. // Гидробиологический журнал. 2013. Т. 49, № 5. С. 111—119.
96. Оценка погрешностей методов гидробиологических и ихтиологических исследований // Труды ИБВВ АН СССР. 1982. Вып. 49 (57). 165 с.
97. Панов В. Е., Павлов А. М. Методика количественного учета водных беспозвоночных в зарослях камыша и тростника // Гидробиологический журнал. 1986. Т. 22, № 6. С. 87—89.
98. Пашкова О. В. Методи визначення характеристик головних угруповань гідробіонтів водних екосистем: Зоопланктон // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 85—100.
99. Петров А. А. Использование метода графов при исследовании миграции в морских экосистемах // Гидробиологический журнал. 1979. Т. 15, № 5. С. 90—93.
100. Поздняков Д. В. Определение концентрации хлорофилла фитопланктона по данным дистанционного зондирования // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеиздат, 1993. С. 114—119.
101. Полищук Л. В. Сравнительная оценка различных методов определения рождаемости и смертности планктонных животных // Журнал общей биологии. 1980. Т. 41, № 1. С. 125—137.
102. Потапова Н. А., Королевская Т. В. К методике определения биомассы бактериальных клеток // Гидробиологический журнал. 1991. Т. 27, № 1. С. 83—88.

103. Приходько Т. И. Исследование продукционного процесса популяций и сообществ пресноводного зоопланктона методом математического моделирования : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Ленинград, 1975. 20 с.
104. Протасов А. А., Стародуб К. Д., Афанасьев С. А. Водолазный метод исследований пресноводного перифитона // Гидробиологический журнал. 1982. Т. 18, № 4. С. 91—93.
105. Протасов О. О., Силаєва А. А. Методи визначення характеристик головних угруповань гідробіонтів водних екосистем: Зооперифітон // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 119—132.
106. Пырина И. Л. Кислородный метод определения первичной продукции фитопланктона // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеиздат, 1993. С. 10—13.
107. Пырина И. Л., Сметанин М. М. Расчет интегральных и средних величин первичной продукции и оценка их точности // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеиздат, 1993. С. 30—40.
108. Радченко М. И., Масюк Н. П. К методике хроматографического изучения пигментов полиблефаридовых водорослей // Гидробиологический журнал. 1969. Т. 5, № 4. С. 130—132.
109. Распопов И. М., Доценко О. Н. Методы изучения водной растительности // Гидробиологический журнал. 1983. Т. 19, № 6. С. 86—87.
110. Расчетный метод определения первичной продукции фитопланктона на основе измерений флуоресценции и интенсивности света / Гаевский Н. А. и др. // Гидробиологический журнал. 2003. Т. 40, № 3. С. 105—114.
111. Родина А. Г. Методы водной микробиологии. Практическое руководство. Москва — Ленинград : Наука, 1965. 364 с.
112. Романенко В. И. К методике определения количества бактерий в водоемах // Гидробиологический журнал. 1971. Т. 7, № 1. С. 122—123.
113. Россова Э. Я., Гаран Ю. С. К методике количественного учета колоний сапрофитных бактерий // Гидробиологический журнал. 1982. Т. 18, № 4. С. 93—95.
114. Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем / ред. Абакумов В. А. Санкт-Петербург : Гидрометеиздат, 1992. 317 с.
115. Сагайдачный А. Ю., Гиляров А. М., Матвеев В. Ф. Исследование пространственного распределения зоопланктона методом главных компонент // Журнал общей биологии. 1977. Т. 38, № 2. С. 218—227.
116. Садчиков А. П. Методы изучения пресноводного фитопланктона. Москва : Университет и школа, 2003. 157 с.
117. Садчиков А. П., Макаров А. А. Прижизненное выделение органического вещества фитопланктоном трех водоемов различной трофности (методические аспекты) // Гидробиологический журнал. 1997. Т. 33, № 2. С. 104—107.
118. Сахаров В. Б., Ильяш Л. В. Метод функции желательности при анализе сезонной сукцессии планктона // Биологические науки. 1982. № 1. С. 59—65.

119. Сигарева Л. Е. Пигментная модель фитопланктона и ее использование // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеиздат, 1993. С. 120—125.
120. Сигарева Л. Е. Спектрофотометрический метод определения пигментов фитопланктона в смешанном экстракте // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеиздат, 1993. С. 75—85.
121. Силина Н. И. О методике количественного учета коловраток // Гидробиологический журнал. 1987. Т. 23, № 5. С. 97—103.
122. Сорокин Ю. И. К методике концентрирования фитопланктона // Гидробиологический журнал. 1979. Т. 15, № 2. С. 71—75.
123. Стадниченко А. П. *Limnaeidae* и *Acroloxidae* Украины. Методы сбора и изучения, биология, экология, полезное и вредное значение. Житомир : Рута, 2006. 168 с.
124. Стариков Е. А. Культивирование *Daphnia magna* в выростных прудах и экономическая эффективность метода // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1974. Вып. 11. С. 315—326.
125. Старосила Е. В. Новые методы и направления исследований в водной микробиологии (обзор) // Гидробиологический журнал. 2006. Т. 43, № 3. С. 51—66.
126. Степанов В. Д., Огурцов Г. И., Степанова Р. П. Модифицированные методы сбора и определение биомассы зоопланктона // Гидробиологический журнал. 1991. Т. 27, № 4. С. 92—95.
127. Сурешкумар П., Томас Дж., Субрамания Дж. Быстрый метод одновременной дискриминации микроводорослей и определения их биохимического состава на основе вибрационной спектроскопии // Альгология. 2017. Т. 27, № 4. С. 403—414.
128. Тевяшова О. Е. Сбор и обработка зоопланктона в рыбоводных водоемах. Методическое руководство (с определителем основных пресноводных видов). Ростов-на-Дону : АзНИИРХ, 2009. 84 с.
129. Телеш И. В. Сравнительная эффективность методов количественного учета планктонных коловраток // Гидробиологический журнал. 1986. Т. 22, № 4. С. 99—102.
130. Трифонова И. С. Оценка трофического статуса водоемов по содержанию хлорофилла «а» в планктоне // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеиздат, 1993. С. 158—166.
131. Трохимець В. М. Методика комплексних досліджень гідробіонтів у водоймах різного типу // Рибогосподарська наука України. 2011. № 1. С. 16—23.
132. Усовершенствование методов инкубации и биоинкапсуляции науплиусов артемии / Корентович М. А. и др. // Вестник рыбохозяйственной науки. 2017. Т. 4, № 1. С. 4—19.
133. Федоров В. Д., Максимов В. Н. Изучение процессов первичной продуктивности водоемов методом планируемых добавок биогенных элементов // Биологические науки. 1967. № 4. С. 132—142.
134. Филенко О. Ф., Дмитриева А. Г., Марушкина Е. В. Исследование структуры лабораторной популяции водоросли *Scenedesmus quadricauda* Turp. (Breb)

- методом микрокультур // Гидробиологический журнал. 2006. Т. 43, № 5. С. 80—87.
135. Фурсенко М. В. Метод определения гетеротрофной активности популяций бактерий в природных водах // Гидробиологический журнал. 1972. Т. 8, № 1. С. 127—133.
136. Хайлов К. М., Юрченко Ю. Ю., Смолев Д. М. Методология исследования биокосной системы «твердый субстрат — организмы — обтекающая их вода» // Гидробиологический журнал. 2000. Т. 36, № 3. С. 79—90.
137. Хижняк М. І., Євтушенко М. Ю., Кражан С. А. Біологічні методи дослідження водойм : монографія. Київ : Український фітосоціологічний центр, 2013. 404 с.
138. Шаповалова И. М., Вологдин М. П. К методике количественного учета погруженной растительности и фитофильной фауны // Гидробиологический журнал. 1979. Т. 15, № 4. С. 111—112.
139. Шевченко Н. Ф. Методика збору та кількісна оцінка зоопланктосток понизя Дніпра // Таврійський науковий вісник., 2002. Вип. 24. С. 126—130.
140. Шелюк Ю. С. Сравнительная оценка методов определения продукции фитопланктона водных объектов различной трофности и проточности // Гидробиологический журнал. 2017. Т. 53, № 4. С. 41—53.
141. Шишкин Б. А., Фикс Б. В., Галеева Т. И. Метод расчета основных параметров культуры водных беспозвоночных животных // Гидробиологический журнал. 1981. Т. 17, № 2. С. 105—112.
142. Щербак В. И. Определение первичной продукции отдельных видов водорослей авторадиграфическим методом // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеиздат, 1993. С. 47—51.
143. Щербак В. І. Визначення первинної продукції фітомікробентосу // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 30—32.
144. Щербак В. І. Визначення первинної продукції фітопланктону і деструкції органічних речовин // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 12—23.
145. Щербак В. І. Оцінка різноманітності фітопланктону // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 23—25.
146. Щербак В. І. Оцінка стану водних об'єктів за рівнем розвитку фітопланктону // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 25—27.
147. Якушин В. М. Визначення чисельності сапрофітних бактерій // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 66—71.
148. Якушин В. М. Оцінка трофності водних об'єктів за рівнем розвитку бактеріопланктону // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 74—75.
149. Якушин В. М., Олійник Г. М. Визначення біомаси бактерій // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 71—74.
150. Якушин В. М., Олійник Г. М. Методи визначення характеристик головних угруповань гідробіонтів водних екосистем: Бактеріобентос // Методи

гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 76—80.

REFERENCES

1. Aleev, M. Yu. (1991). Novyy metod opredeleniya skorosti plavaniya planktonnykh organizmov. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 27, 6, 70-74.
2. Andreev, A. A. (1977). Metodika izmereniya napryazheniya kisloroda v myshechnykh tkanyakh svobodnoplavayushchikh gidrobiontov. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 13, 4, 118-119.
3. Andronikova, I. N. (1976). Otsenka dvukh metodov rascheta produktsii presnovodnogo zooplanktona. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 12, 1, 71-75.
4. Andronnikova, I. N. (1983). Sootnoshenie biomass protozoynogo i metazoynogo planktona kak ekspress-metod dlya rascheta produktsii prosteyskh v ozerakh raznogo troficheskogo tipa. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 196, 50-56.
5. Aponasenko, A. D., Sid'ko, F. Ya., & Vasil'ev, V. A. (1993). Opredelenie kontsentratsiy khlorofilla fitoplanktona po differentsial'nym spektram pogloshcheniya sveta. *Metodicheskie voprosy izucheniya pervichnoy produktcii planktona vnutrennikh vodoemov*. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 97-100.
6. Asochakov, A. A. (1993). K metodike izmereniya dliny tela amfipod. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 29, 2, 90-93.
7. Afanas'ev, S. A. (1988). K metodike izucheniya soobshchestv perifitona v usloviyakh vysokoeterogennogo biotopa. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 24, 4, 86-87.
8. Bakanov, A. I. (1977). Metody povysheniya dostovernosti otsenki kormovoy bazy ryb-bentofagov. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 13, 4, 107-111.
9. Belova, S. L. (1982). K metodike opredeleniya ob'emov prosteyskh. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 18, 1, 110-112.
10. Bogatov, V. V. (1985). Metod rascheta migratsionnoy aktivnosti i distantsii drifta bentosa v krupnykh rekakh. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 21, 3, 86-89.
11. Boyko, E. G. (1978). Obrabotka materialov sezonnykh sborov graficheskim metodom. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 14, 2, 92-95.
12. Bul'on, V. V. (1988). Vnekletochnaya produktsiya fitoplanktona i metody ee issledovaniya. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 24, 3, 64-73.
13. Bul'on, V. V. (1993). Radiouglerodnyy metod opredeleniya pervichnoy produktcii fitoplanktona, ego vozmozhnosti i ogranicheniya v sravnenii s kislorodnym metodom. *Metodicheskie voprosy izucheniya pervichnoy produktcii planktona vnutrennikh vodoemov*. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 14-20.
14. Buyanovskiy, A. I. (2012). *Prognoz potentsial'nogo vylova pribrezhnykh bespozvonochnykh pri zatrudnenii s otsenkoy zapasa. Metodicheskie rekomendatsii*. Moskva: VNIRO.
15. Vekhov, N. V. (1989). Metodicheskie rekomendatsii po izucheniyu biologii *Anostraca* (Crustacea, Branchiopoda) v melkikh vodoemakh. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 25, 5, 74-77.
16. Kharchenko, T. A., et al. (2000). *Vikoristannya netraditsiynikh bioresursiv vnutrishnikh vodoym na osnovi pidvishchennya ikh bioriznomanitnosti metodami kul'tivuvannya ta introduktsii: naukovo-praktichna instruktsiya*. Kyiv: Institut gidrobiologii NANU.
17. Vinberg, G. G. (1971). Sravnitel'naya otsenka nekotorykh rasprostranennykh

- metodov rascheta produktsii vodnykh bakteriy. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 7, 4, 86-96.
18. Vladimirova, K. S. (1969). Metodika izucheniya pervichnoy produktsii donnykh vodorosley. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 5, 4, 128-130.
 19. Voskresenskiy, K. A., & Lebedeva, L. I. (1964). Izuchenie populyatsiy kladotser metodom poluizolyatsii v vodoeme. *Zoologicheskii zhurnal*, 43, 4, 518-524.
 20. Gavrilenko, M. Ya., Birger, T. I., & Gusynskaya, S. L. (1975). K metodike razdeleniya zooplanktona i fitoplanktona v sestone. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 11, 6, 106-109.
 21. Gavrilov, E. N., & Zubov V. I. (2008). Metodicheskie osobennosti otsenki zasobov laminariyevykh vodorosley gidroakusticheskim metodom. *Gidroakusticheskie issledovaniya na vnutrennikh vodoemakh: Vseros. konf., Borok, 2-4 dek. 2008 g.: mater. dokl. Borok*, 19-25.
 22. Gaevskiy, N. A., Shatrov, I. Yu., & Gol'd, V. M. (1993). Fluoretsentnyy analiz pigmentov fitoplanktona. *Metodicheskie voprosy izucheniya pervichnoy produktsii planktona vnutrennikh vodoemov*. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 101-109.
 23. Gaysina, L. A., Fazlutdinova, A. I., & Kabirov, R. R. (2008). *Sovremennye metody vydeleniya i kul'tivirovaniya vodorosley: uchebnoe posobie*. Ufa: BGPU.
 24. Galkovskaya, G. A. (1972). Metody opredeleniya produktii planktonnykh kolovratok. *Voprosy rybnogo khozyaystva Belorussii*, 8, 98-104.
 25. *Gidrobiologicheskii praktikum. Ch. 2: Metody opredeleniya biologicheskoy produktivnosti*. (1999). Moskva: MGU im. M. V. Lomonosova.
 26. Golubkova, M. G. (1976). Metody fiziologo-biokhimicheskogo issledovaniya vodorosley v gidrobiologicheskoy praktike. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 12, 3, 110.
 27. Gol'd, V. M., & Popel'nitskiy, V. A. (1993). Opredelenie fotosinteza fitoplanktona fluoretsentnym metodom. *Metodicheskie voprosy izucheniya pervichnoy produktsii planktona vnutrennikh vodoemov*. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 25-29.
 28. Goryachev, Yu. V. (1969). Metodika ob"ektivnoy registratsii dvizheniya infuzoriy. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 5, 6, 107-109.
 29. Davidov, O. A. (2006). Metody viznachennya kharakteristik golovnykh ugrupovan' gidrobiontiv vodnykh ekosistem: Epifitni ugrupovannya vodorostey. *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 33-37.
 30. Druzhkov, N. V. (1991). Metod khraneniya prob morskogo skeletnogo protozoynogo mikroplanktona. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 27, 3, 97-98.
 31. Gol'd, V. M., et al. (1993). Dykhanie fitoplanktona. Problemy i metody. *Metodicheskie voprosy izucheniya pervichnoy produktsii planktona vnutrennikh vodoemov*. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 66-74.
 32. D'yachenko, T. M. (2006). Makrofiti. Viznachennya vidovogo skladu i strukturi roslinnykh ugrupovan'. *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 42-44.
 33. D'yachenko, T. M. (2006). Makrofiti. Viznachennya fitomasi i produktii roslinnykh ugrupovan'. *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 48-52.
 34. D'yachenko, T. M. (2006). Makrofiti. Viznachennya kharakteru zarostannya i rozpodilu roslinnosti. *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 44-46.

35. D'yachenko, T. M. (2006). Makrofity. Vyznachennya tsenotichnogo skladu vodyanoi roslinnosti. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 46-48.
36. D'yachenko, T. M. (2006). Makrofity. Otsinka stanu ekosistem vodnykh ob'ektiv za strukturno-funktsional'nimi kharakteristikami makrofitiv. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 53-58.
37. Elizarova, V. A. (1993). Opyt opredeleniya produktsii fitoplankterov al'gologicheskimi metodami. *Metodicheskie voprosy izucheniya pervichnoy produktsii planktona vnutrennykh vodoemov*. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 52-58.
38. Zakhodnova, T. A. (1983). Opredelenie produktsii mikrofitobentosa dvumya sposobami. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 196, 31-33.
39. Ivankov, V. N. (1974). K metodike opredeleniya plodovitosti poikilothermnykh zhivotnykh. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 10, 1, 99-102.
40. Ioffe, Ts. I. (1949). K metodike izucheniya snosa benticheskikh organizmov rekoy i ego rol' v zaselenii vodokhranilishcha. *Izvestiya VNIORKh*, 29, 96-105.
41. Kalayda, M. L., & Govorkova, L. K. (2013). *Metody rybokhozyaystvennykh issledovaniy: uchebnoe posobie*. Sankt-Peterburg: Prospekt Nauki.
42. Katanskaya, V. M. (1981). *Vysshaya vodnaya rastitel'nost' kontinental'nykh vodoemov SSSR: metody izucheniya*. Leningrad: Nauka.
43. Kovalevskiy, V. N. (2005). Metody otsenki sostoyaniya populyatsiy kubanskogo raka, prognozirovaniye promyslovykh zapasov. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom basseyne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot*. Krasnodar: AzNIIRKh, 253-255.
44. Kovalenko, V. F. (1986). K metodike opredeleniya gazoobmena u vodnykh zhivotnykh. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 22, 4, 102-104.
45. Kokina, A. G. (1970). Ispol'zovaniye metoda pryamogo scheta bakteriy pri izuchenii protsessov samoochishcheniya podzemnykh vod. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 6, 1, 104-108.
46. Kolupaev, B. I., Andreev, A. A., & Samoylenko, Yu. K. (1977). Opticheskii metod registratsii serdechnogo ritma u dafniy. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 13, 3, 119-120.
47. Konstantinov, A. S. (1960). K metodike opredeleniya produktsii kormovykh dlya ryb zhivotnykh. *Biologicheskie nauki*, 4, 59-62.
48. Korniyushenko, G. A. (1993). Khromatograficheskii metod i vozmozhnosti ego ispol'zovaniya dlya izucheniya pigmentov fitoplanktona. *Metodicheskie voprosy izucheniya pervichnoy produktsii planktona vnutrennykh vodoemov*. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 86-96.
49. Kotsar', N. I. (1988). Metodika opredeleniya dvoukisi ugleroda vneshnego dykhaniya gidrobiontov pri razlichnom ee urovne v vodnoy srede. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 24, 1, 72-74.
50. Kravchuk, T. S. (1973). K metodam issledovaniya matematicheskikh modeley regulirovaniya biotsenozov. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 9, 1, 107-113.
51. Kravchuk, T. S., & Myrzakova, L. I. (1987). Issledovaniye konkurentsii neskol'kikh vidov vysshikh vodnykh rasteniy s primeneniem matematicheskikh metodov. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 23, 2, 86-93.
52. Krazhan, S. A., & Lupacheva, L. Yu. (1991). *Estestvennaya kormovaya baza vodoemov i metody ee opredeleniya pri intensivnom vedenii rybnogo khozyaystva (Spravochnyy material dlya rabotnikov prудovykh khozyaystv USSR)*. L'vov.

53. Krylov, P. I. (1980). Radioizotopnye metody izucheniya pitaniya i transformatsii energii pishchi zooplanktonom. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 16, 6, 63-79.
54. Kuznetsov, S. I., & Dubinina, G. A. (1989). *Metody izucheniya vodnykh mikroorganizmov*. Moskva: Nauka.
55. Kutikova, L. A. (1983). K metodike issledovaniy kolovratok. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 196, 61-66.
56. Ladeyshchikova, E. N., & Vasil'eva, G. L. (1976). K metodike obrabotki nekotorykh eksperimental'nykh materialov po zooplanktonu. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 12, 3, 97-103.
57. Lebedev, Yu. M. (1993). Balansovyy metod i opredelenie pervichnoy produktsii v vodotokakh. *Metodicheskie voprosy izucheniya pervichnoy produktsii planktona vnutrennikh vodoemov*. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 59-65.
58. Lebedeva, M. N. (1970). Planirovanie eksperimenta pri izuchenii vremeni generatsii bakterii metodom sklyanok. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 6, 3, 116-122.
59. Levadnaya, G. D. (1975). Metody issledovaniya fitobentosa kontinental'nykh vodoemov. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 11, 3, 85-90.
60. Lyashenko, A. V. (2006). Metody viznachennya kharakteristik golovnikh ugrupovan' gidrobiontiv vodnikh ekosistem: Makrozoobentos. *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 101-118.
61. Maksimov, V. N., & Goridchenko, T. P. (1985). Primenenie metoda funktsii zhelatel'nosti dlya otsenki kachestva vody po sostavu perifitona. *Biologicheskie nauki*, 8, 105-110.
62. Mamontova, L. M., & Kozhova, O. M. (1979). *Bakterioplankton angarskikh vodokhranilishch i statisticheskie metody ego analiza*. Leningrad.
63. Matveev, V. F. (1976). Otsenka konkurentsii v prirode s pomoshch'yu metoda mnozhestvennoy regressii. Analiz vzaimodeystviya trekh vidov zooplanktona. *Zhurnal obshchey biologii*, 37, 6, 822-830.
64. Romanenko, V. D., et al. (2011). Metod kompleksnoy otsenki toksichnosti donnykh otlozheniy s primeneniem bentosnykh i planktonnykh organizmov. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 48, 6, 32-42.
65. Salazkin, A. A., & Ogorodnikova, V. A. (Comp.) (1984). *Metodicheskie rekomendatsii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskikh issledovaniyakh na presnovodnykh vodoemakh. Zadachi i metody izucheniya ispol'zovaniya kormovoy bazy ryboy*. Leningrad: GosNIORKh; Promrybvod; Zoologicheskii institut.
66. Romanova, Yu. A., & Fursenko, M. V. (Comp.). (1984). *Metodicheskie rekomendatsii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskikh issledovaniyakh na presnovodnykh vodoemakh. Bakterioplankton i ego produktsiya*. Leningrad: GosNIORKh; Zoologicheskii institut.
67. Salazkin, A. A., et al. (Comp.). (1984). *Metodicheskie rekomendatsii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskikh issledovaniyakh na presnovodnykh vodoemakh. Zoobentos i ego produktsiya*. Leningrad: GosNIORKh; Zoologicheskii institut.
68. Salazkin, A. A., Ivanova, M. B., & Ogorodnikova, V. A. (Comp.). (1982). *Metodicheskie rekomendatsii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskikh issledovaniyakh na presnovodnykh vodoemakh. Zooplankton i ego produktsiya*. Leningrad: GosNIORKh; Zoologicheskii institut.
69. Lavrent'eva, G. M., & Bul'on, V. V. (Comp.). (1981). *Metodicheskie rekomendatsii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskikh*

- issledovaniyakh na presnovodnykh vodoemakh. Fitoplankton i ego produktsiya.* Leningrad: GosNIORKh; Zoologicheskii institut.
70. *Metodichni osnovi gidrobiologichnikh doslidzhen' vodnikh ekosistem.* (2002). Kyiv.
 71. *Metody gidrobiologicheskikh issledovaniy planktona.* (2017). *Sbornik klassicheskikh metodov gidrobiologicheskikh issledovaniy dlya ispol'zovaniya v akvakul'ture.* Daugavpils: Saule, 56-68.
 72. *Metody gidrobiologicheskogo issledovaniya: ucheb. posobie.* (1960). Moskva: Vysshaya shkola, 1960. 192 s.
 73. *Metody issledovaniy perifitona.* (2017). *Sbornik klassicheskikh metodov gidrobiologicheskikh issledovaniy dlya ispol'zovaniya v akvakul'ture.* Daugavpils: Saule, 2017, 115-122.
 74. *Metody issledovaniy fitofil'noy fauny.* (2017). *Sbornik klassicheskikh metodov gidrobiologicheskikh issledovaniy dlya ispol'zovaniya v akvakul'ture.* Daugavpils: Saule, 123-124.
 75. *Metody issledovaniya zooplanktona.* (2017). *Sbornik klassicheskikh metodov gidrobiologicheskikh issledovaniy dlya ispol'zovaniya v akvakul'ture.* Daugavpils: Saule, 69-79.
 76. *Metody issledovaniya fitoplanktona.* (2017). *Sbornik klassicheskikh metodov gidrobiologicheskikh issledovaniy dlya ispol'zovaniya v akvakul'ture.* Daugavpils: Saule, 80-99.
 77. Vinberg, G. G. (Ed.). (1968). *Metody opredeleniya produktsii vodnykh zhyvotnykh. Metodicheskoe rukovodstvo i materialy.* Minsk: Vysheyshaya shkola.
 78. *Metody sbora i obrabotki bentosa.* (2017). *Sbornik klassicheskikh metodov gidrobiologicheskikh issledovaniy dlya ispol'zovaniya v akvakul'ture.* Daugavpils: Saule, 100-114.
 79. Studenikina, E. I., et al. (2005). *Metody sbora i obrabotki gidrobiologicheskikh prob. Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom bassejne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot.* Krasnodar: AzNIIRKh, 50-59.
 80. *Metody fiziologo-biokhimicheskogo issledovaniya vodorosley v gidrobiologicheskoy praktike.* (1975). Kiev: Naukova dumka.
 81. Mikhaylovskiy, G. E. (1988). *Opisanie i otsenka sostoyaniy planktonnykh soobshchestv.* Moskva: Nauka.
 82. Musatov, A. P. (2001). *Otsenka parametrov ekosistem vnutrennikh vodoemov.* Moskva: Nauchnyy mir.
 83. Nesterova, D. A. (1969). K metodike sbora fitoplanktona v pripoverkhnostnom sloe morya. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 5, 3, 87-89.
 84. Nefedov, V. N., & Kolesnikov, G. V. (1984). Osobennosti rosta i metody opredeleniya vozrasta u rechnykh rakov. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 215, 76-104.
 85. Novokshonov, Yu. D., & Bezrukov, N. P. (1981). Sravnitel'naya kharakteristika metodov opredeleniya pervichnoy produktsii i destrukttsii planktona rybovodnykh prudov. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 162, 205-210.
 86. Novosadov, A. G. (2007). Al'ternativnye metody dekapulyatsii yaits artemii. *Ratsional'noe ispol'zovanie presnovodnykh ekosistem - perspektivnoe napravlenie realizatsii natsional'nogo proekta «Razvitie APK»: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 17-19 dek. 2007 g.: mater. i dokl.* Moskva: Rossel'khozakademiya, 193-195.

87. Oksiyuk, O. P., Davydov, O. A., & Melenchuk, G. V. (2004). Primenenie metoda Braun-Blanke pri tsenologicheskom analize mikrofitobentosa. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 41, 5, 101-114.
88. Oksiyuk, O. P., & Yurchenko, V. V. (1969). K metodike opredeleniya biomassy fitoplanktona. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 5, 6, 104-107.
89. Oliynik, G. M. (2006). Vyznachennya zagal'noi chisel'nosti bakteriy u vodi pri zabarvlenni akridinoranzhem. *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 63-64.
90. Oliynik, G. M. (2006). Vyznachennya zagal'noi chisel'nosti bakteriy u vodi pri zabarvlenni 4,6-diamidino-2-fenilindolom (DAPI). *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 65-66.
91. Oliynik, G. M. (2006). Vyznachennya metabolichno aktivnikh bakteriy u vodi i donnikh vidkladakh vodoym. *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 81-84.
92. Opredelenie pervichnoy produktsii i destruktzii organicheskogo veshchestva. (2017). *Sbornik klassicheskikh metodov gidrobiologicheskikh issledovaniy dlya ispol'zovaniya v akvakul'ture*. Daugavpils: Saule, 125-128.
93. *Opredelenie produktsii populyatsiy vodnykh soobshchestv: uchebno-metodicheskoe posobie*. (2000). Novosibirsk: Nauka.
94. Dzyuban, A. N. et al. (2001). Optimizatsiya metoda total'nogo ucheta bentosnykh bakteriy. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 37, 4, 102-107.
95. Vakulenko, O. V. et al. (2013). Osobennosti diagnostiki funktsional'nogo sostoyaniya odnokletochnykh vodorosley v zhidkikh sredakh lyuminestsentnymi metodami. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 49, 5, 111-119.
96. Otsenka pogreshnostey metodov gidrobiologicheskikh i ikhtologicheskikh issledovaniy. (1982). *Trudy IBVV AN SSSR*, 49 (57).
97. Panov, V. E., & Pavlov, A. M. (1986). Metodika kolichestvennogo ucheta vodnykh bespozvonochnykh v zaroslyakh kamysha i trostnika. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 22, 6, 87-89.
98. Pashkova, O. V. (2006). Metody vyznachennya kharakteristik golovnikh ugrupovan' gidrobiontiv vodnykh ekosistem: Zooplankton. *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 85-100.
99. Petrov, A. A. (1979). Ispolzovanie metoda grafov pri issledovanii migratsii v morskikh ekosistemakh. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 15, 5, 90-93.
100. Pozdnyakov, D. V. (1993). Opredelenie kontsentratsii khlorofilla fitoplanktona po dannym distantsionnogo zondirovaniya. *Metodicheskie voprosy izucheniya pervichnoy produktsii planktona vnutrennikh vodoemov*. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 114-119.
101. Polishchuk, L. V. (1980). Sravnitel'naya otsenka razlichnykh metodov opredeleniya rozhdaemosti i smertnosti planktonnykh zhivotnykh. *Zhurnal obshchey biologii*, 41, 1, 125-137.
102. Potapova, N. A., & Korolevskaya, T. V. (1991). K metodike opredeleniya biomassy bakterial'nykh kletok. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 27, 1, 83-88.
103. Prikhod'ko, T. I. (1975). Issledovanie produktsionnogo protsessa populyatsiy i soobshchestv presnovodnogo zooplanktona metodom matematicheskogo modelirovaniya. *Extended abstracts of candidate's thesis*. Leningrad.
104. Protasov, A. A., Starodub, K. D., & Afanas'ev, S. A. (1982). Vodolaznyy metod issledovaniy presnovodnogo perifitona. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 18, 4, 91-93.

105. Protasov, O. O., & Silaieva, A. A. (2006). Metody viznachennya kharakteristik golovnikh ugrupovan' gidrobiontiv vodnikh ekosistem: Zooperifiton. *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 119-132.
106. Pyrina, I. L. (1993). Kislorodnyy metod opredeleniya pervichnoy produktsii fitoplanktona. *Metodicheskie voprosy izucheniya pervichnoy produktsii planktona vnutrennikh vodoemov*. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 10-13.
107. Pyrina, I. L., & Smetanin, M. M. (1993). Raschet integral'nykh i srednikh velichin pervichnoy produktsii i otsenka ikh tochnosti. *Metodicheskie voprosy izucheniya pervichnoy produktsii planktona vnutrennikh vodoemov*. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 30-40.
108. Radchenko, M. I., & Masyuk, N. P. (1969). K metodike khromatograficheskogo izucheniya pigmentov poliblefaridovykh vodorosley. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 5, 4, 130-132.
109. Raspopov, I. M., & Dotsenko, O. N. (1983). Metody izucheniya vodnoy rastitel'nosti. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 19, 6, 86-87.
110. Gaevskiy, N. A., et al. (2003). Raschetnyy metod opredeleniya pervichnoy produktsii fitoplanktona na osnove izmereniy fluorestsentsii i intensivnosti sveta. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 40, 3, 105-114.
111. Rodina, A. G. (1965). *Metody vodnoy mikrobiologii. Prakticheskoe rukovodstvo*. Moskva - Leningrad: Nauka.
112. Romanenko, V. I. (1971). K metodike opredeleniya kolichestva bakteriy v vodoemakh. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 7, 1, 122-123.
113. Rossova, E. Ya., & Garan, Yu. S. (1982). K metodike kolichestvennogo ucheta koloniy saprofitnykh bakteriy. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 18, 4, 93-95.
114. Abakumov, V. A. (Ed.). (1992). *Rukovodstvo po gidrobiologicheskomu monitoringu presnovodnykh ekosistem*. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat.
115. Sagaydachnyy, A. Yu., Gilyarov, A. M., & Matveev, V. F. (1977). Issledovanie prostranstvennogo raspredeleniya zooplanktona metodom glavnykh komponent. *Zhurnal obshchey biologii*, 38, 2, 218-227.
116. Sadchikov, A. P. (2003). *Metody izucheniya presnovodnogo fitoplanktona*. Moskva: Universitet i shkola.
117. Sadchikov, A. P., & Makarov, A. A. (1997). Prizhiznennoe vydelenie organicheskogo veshchestva fitoplanktonom trekh vodoemov razlichnoy trofnosti (metodicheskie aspekty). *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 33, 2, 104-107.
118. Sakharov, V. B., & Il'yash, L. V. (1982). Metod funktsii zhelatel'nosti pri analize sezonnoy suksessii planktona. *Biologicheskii nauki*, 1, 59-65.
119. Sigareva, L. E. (1993). Pigmentnaya model' fitoplanktona i ee ispol'zovanie. *Metodicheskie voprosy izucheniya pervichnoy produktsii planktona vnutrennikh vodoemov*. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 120-125.
120. Sigareva, L. E. (1993). Spektrofotometricheskii metod opredeleniya pigmentov fitoplanktona v smeshannom ekstrakte. *Metodicheskie voprosy izucheniya pervichnoy produktsii planktona vnutrennikh vodoemov*. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 75-85.
121. Silina, N. I. (1987). O metodike kolichestvennogo ucheta kolovratok. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 23, 5, 97-103.
122. Sorokin, Yu. I. (1979). K metodike kontsentriruvaniya fitoplanktona. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 15, 2, 71-75.
123. Stadnichenko, A. P. (2006). *Lymnaeidae i Acroloxidae Ukrainy. Metody sbora i izucheniya, biologiya, ekologiya, poleznoe i vrednoe znachenie*. Zhitomir: Ruta.

124. Starikov, E. A. (1974). Kul'tivirovanie *Daphnia magna* v vyrostnykh prudakh i ekonomicheskaya effektivnost' metoda. *Sbornik nauchnykh trudov VNIIPRKh*, 11, 315-326.
125. Starosila, E. V. (2006). Novye metody i napravleniya issledovaniy v vodnoy mikrobiologii (obzor). *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 43, 3, 51-66.
126. Stepanov, V. D., Ogurtsov, G. I., & Stepanova, R. P. (1991). Modifitsirovannye metody sbora i opredelenie biomassy zooplanktona. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 27, 4, 92-95.
127. Sureshkumar, P., Tomas, Dzh., & Subramanyan, Dzh. (2017). Bystryy metod odnovennoy diskriminatsii mikrovodorosley i opredeleniya ikh biokhimicheskogo sostava na osnove vibratsionnoy spektroskopii. *Al'gologiya*, 27, 4, 403-414.
128. Tevyashova, O. E. (2009). *Sbor i obrabotka zooplanktona v rybovodnykh vodoemakh. Metodicheskoe rukovodstvo (s opredelitelem osnovnykh presnovodnykh vidov)*. Rostov-na-Donu: AzNIIRKh.
129. Telesh, I. V. (1986). Sravnitel'naya effektivnost' metodov kolichestvennogo ucheta planktonnykh kolovratok. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 22, 4, 99-102.
130. Trifonova, I. S. (1993). Otsenka troficheskogo statusa vodoemov po sodержaniyu khlorofilla «a» v planktone. *Metodicheskie voprosy izucheniya pervichnoy produktsii planktona vnutrennykh vodoemov*. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 158-166.
131. Trokhimets', V. M. (2011). Metodika kompleksnykh doslidzhen' gidrobiontiv u vodoymakh riznogo tipu. *Rybohospodars'ka nauka Ukrainy*, 1, 16-23.
132. Korentovich, M. A., et al. (2017). Uovershenstvovanie metodov inkubatsii i bioinkapsulyatsii naupliusov artemii. *Vestnik rybokhozyaystvennoy nauki*, 4, 1, 4-19.
133. Fedorov, V. D., & Maksimov, V. N. (1967). Izuchenie protsessov pervichnoy produktivnosti vodoemov metodom planiruemykh dobavok biogennykh elementov. *Biologicheskie nauki*, 4, 132-142.
134. Filenko, O. F., Dmitrieva, A. G., & Marushkina, E. V. (2006). Issledovanie struktury laboratornoy populyatsii vodorosli *Scenedesmus quadricauda* Turp. (Breb) metodom mikrokul'tur. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 43, 5, 80-87.
135. Fursenko, M. V. (1972). Metod opredeleniya geterotrofnoy aktivnosti populyatsiy bakteriy v prirodnykh godakh. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 8, 1, 127-133.
136. Khaylov, K. M., Yurchenko, Yu. Yu., & Smolev, D. M. (2000). Metodologiya issledovaniya biokosnoy sistemy «tverdyy substrat - organizmy - obtekayushchaya ikh voda». *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 36, 3, 79-90.
137. Khizhnyak, M. I., IEvtushenko, M. Yu., & Krazhan, S. A. (2013). Biologichni metody doslidzhennya vodoym: monografiya. Kyiv: Ukrains'kiy fitosotsiologichniy tsentr.
138. Shapovalova, I. M., & Vologdin, M. P. (1979). K metodike kolichestvennogo ucheta pogruzhennoy rastitel'nosti i fitofil'noy fauny. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 15, 4, 111-112.
139. Shevchenko, N. F. (2002). Metodika zboru ta kil'kisna otsinka zooplanktostoku ponizyya Dnipra. *Tavriys'kiy naukoviy visnik*, 24, 126-130.
140. Shelyuk, Yu. S. (2017). Sravnitel'naya otsenka metodov opredeleniya produktsii fitoplanktona vodnykh ob'ektov razlichnoy trofnosti i protochnosti. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 53, 4, 41-53.

141. Shishkin, B. A., Fiks, B. V., & Galeeva, T. I. (1981). Metod rascheta osnovnykh parametrov kul'tury vodnykh bespozvonochnykh zhivotnykh. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 17, 2, 105-112.
142. Shcherbak, V. I. (1993). Opredelenie pervichnoy produktsii otdel'nykh vidov vodorosley avtoradiograficheskim metodom. *Metodicheskie voprosy izucheniya pervichnoy produktsii planktona vnutrennikh vodoemov*. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 47-51.
143. Shcherbak, V. I. (2006). Vyznachennya pervinnoi produktsii fitomikrobentosu. *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 30-32.
144. Shcherbak, V. I. (2006). Vyznachennya pervinnoi produktsii fitoplanktonu i destrukttsii organichnikh rechovin. *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 12-23.
145. Shcherbak, V. I. (2006). Otsinka riznomanitnosti fitoplanktonu. *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 23-25.
146. Shcherbak, V. I. (2006). Otsinka stanu vodnikh ob'ektiv za rivnem rozvitku fitoplanktonu. *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 25-27.
147. Yakushin, V. M. (2006). Vyznachennya chisel'nosti saprofitnikh bakteriy. *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 66-71.
148. Yakushin, V. M. (2006). Otsinka trofnosti vodnikh ob'ektiv za rivnem rozvitku bakterioplanktonu. *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 74-75.
149. Yakushin, V. M., & Oliynik, G. M. (2006). Vyznachennya biomasi bakteriy. *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 71-74.
150. Yakushin, V. M., & Oliynik, G. M. (2006). Metody viznachennya kharakteristik golovnikh ugrupovan' gidrobiontiv vodnikh ekosistem: Bakteriobentos. *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 76-80.

TAPAS – міжнародний дослідницький проект

Пропонуємо ознайомитись та долучитись до **TAPAS (Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability)**, що діє в межах програми Horizon 2020, з 2016 року. Його мета — консолідація стабільності європейської аквакультури шляхом розробки спеціальних підходів та умов, на основі всебічного аналізу всіх форм та типів ведення аквакультури, включно з марикультурою. Ключовою сферою діяльності є виявлення нормативних потреб існуючих й новітніх практик аквакультури. Більше інформації можна отримати відвідавши **сайт**: www.tapas-H2020.eu.

Координатор проекту: Trevor Telfer, University of Stirling.

ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ РИБ

В лабораторії біотехнологій у рибництві проводять високо-специфічну та сучасну діагностику інфекційних захворювань риб. Для ідентифікації збудників хвороб використовуються молекулярно-біологічні методи, а саме полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) та її різновиди. Перелік збудників інфекційних захворювань риб та діагностичні тест-системи в лабораторії біотехнологій у рибництві ІРГ НААН представлено в таблиці.

№	Інфекційний агент	Вид риб	Метод
Вірусні захворювання			
1	Вірус інфекційного панкреатичного некрозу (IPNV)	Лососеві	ЗТ-ПЛР
2	Вірус геморагічної септицемії (VHSV)	Лососеві	ЗТ-ПЛР
3	Вірус інфекційного гематопоетичного некрозу (IHNV)	Лососеві	ЗТ-ПЛР
4	Альфавірус лососевих (SAV)	Лососеві	ЗТ-ПЛР
5	Вірус інфекційної анемії лососевих (ISAV)	Лососеві	ЗТ-ПЛР
6	Реовірус лососевих (PRV)	Лососеві	ЗТ-ПЛР
7	Вірус весняної віремії коропа (SVCV)	Коропові	ЗТ-ПЛР
8	Герпес вірус коропа (CyHV, KHV)	Коропові	ПЛР
9	Вірус віспи коропа (Carp Edema Virus, CEV)	Коропові	ПЛР
10	Герпес вірус осетра (AcHV)	Осетрові	ПЛР
11	Мімівірус (Іридовірус) осетра (AcIV)	Осетрові	ПЛР
12	Аденовірус осетра (AcAdV)	Осетрові	ПЛР
13	Герпес вірус канал'ного сома (CCV)	Іctalурові	ПЛР
14	Рабдовірус щуки (PFRV)	Щукові	ЗТ-ПЛР
15	Вірус лімфосаркоми щуки та судака	Окуневі	ЗТ-ПЛР
Бактеріальні захворювання			
16	Бактеріальна хвороба нирок (BKD) <i>Renibacterium salmoninarum</i>	Лососеві	ПЛР
17	Фурункульоз <i>Aeromonas salmonicida</i>	Лососеві	ПЛР
18	Єрсиніоз (Enteric redmouth disease) <i>Yersinia ruckeri</i>	Лососеві	ПЛР
19	Бактеріальна геморагічна септицемія <i>Aeromonas hydrophila</i>	Коропові	ПЛР
20	Стрептококова інфекція осетра та тилапії <i>Streptococcus iniae</i>	Осетрові Цихлові	ПЛР
21	Флавобактеріоз (Bacterial cold water disease, BCWD) <i>Flavobacterium psychrophila</i>	Лососеві	ПЛР
22	Колумнарна хвороба (Columnaris disease) <i>Flavobacterium columnarum</i>	Лососеві	ПЛР
23	Бактеріальна септицемія сома <i>Edwardsiella ictaluri</i>	Іctalурові	ПЛР
24	Вібріоз <i>Vibrio anguillarum</i>	Іctalурові Лососеві	ПЛР
Паразити			
25	Проліферативна хвороба нирок <i>Tetracapsuloides bryosalmonae</i>	Лососеві	ПЛР
26	Whirling disease <i>Myxobolus cerebralis</i>	Лососеві	ПЛР

Для одержання додаткової інформації можна звертатися за адресою:

Інститут рибного господарства НААН, вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164.

Лабораторія біотехнологій у рибництві, зав. лаб., к.б.н., с.н.с. Рудь Юрій Петрович: (097) 953-80-80, rudziknew@ukr.net.

FISHERIES SCIENCE OF UKRAINE

“Fisheries Science of Ukraine” — a scientific journal, has been published in Ukraine since 2007. “Fisheries Science of Ukraine” included in the List of Specialized Publications of Ukraine, which can be used for publishing results of doctor’s and candidate’s thesis (biological and agricultural sciences), was approved in 08.07.2009, recertification of 06.11.2014 (Ministry of Education and Science of Ukraine №1279)

Founder and publisher of the journal — Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

State registration certificate KB № 20934-10734 PR of 18.08.2014

EDITOR-IN-CHIEF

Leonid Buchatskyi, Doctor of Sciences, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Leading Research Scientist of the Laboratory of Biotechnologies in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF

Ihor Hrytsyniak, Doctor of Sciences, Professor, Academician of the NAAS of Ukraine, Director, Institute of Fisheries of the NAAS
Natalia Kolesnyk, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of International Scientific and Technical Cooperation and Intellectual Property, Institute of Fisheries of the NAAS

EDITORIAL BOARD

BIOLOGICAL SCIENCES

Boris Gomelsky, Doctor of Biological Sciences, Professor, Kentucky State University, UNITED STATES OF AMERICA

Oleksandr Tretiak, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Deputy Director in scientific works, Institute of Fisheries of the NAAS

Daniel Patrick, Doctor of Biological Sciences, Head of Biology Department Laboratories of the Pyrenees and Landes, FRENCH REPUBLIC

Ihor Buzevych, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Gautam V. Zodape, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Zoology of Shivaji University Kolhapur, REPUBLIC OF INDIA

Vasyl Sondak, Doctor of Sciences, Head of "Water Bioresources", National University of Water Management and Natural

Oleksandr Potrokhov, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Biology of reproduction of fish, Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, UKRAINE
Resources, UKRAINE

Valentyna Solomatina, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Leading research scientist of the department of feeds and fish feeding, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Yuriy Rud', PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Bio-technology in Aquaculture of the Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

AGRICULTURAL SCIENCES

XU Pao, Doctor, Professor, Director of Freshwater Fisheries Research Center, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Natalia Matvienko, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Ichthyopathology of the Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Jedrzej Krupinski, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director, National Research Institute of Animal Production, POLAND

Serhiy Tarasiuk, Doctor of Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Head of the Molecular-Genetic Research Department, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Vitaliy Bekh, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Fish Selection, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Isaak Sherman, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Aquaculture Department, Kherson State Agrarian University, UKRAINE

Oleksandr Kostenko, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Veterinary Medicine and Zootechnics Department, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, UKRAINE

SCIENTIFIC EDITORS OF SECTIONS

are staff employees of the Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine: **Natalia Tushnyska**, PhD, Senior Research Scientist, Scientific Secretary of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Dragan Liudmyla**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of ecological studies; **Yaroslav Tuchapskyi**, PhD, Head of the Carp Breeding Laboratory of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Zaloilo**, PhD, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Molecular-Genetic Studies of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Zabytivskyi**, PhD, Senior Research Scientist of Section of Sturgeon of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Antonina Mruk**, Head of the Laboratory Salmonids Culture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Tetiana Hryhorenko**, PhD, Head of the Laboratory of Hydrobiology and Technology of Invertebrates Cultivation of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Oleksandr Didenko**, PhD, Senior Research Scientist of the Department of Study Reservoirs Bioresources of the Institute of Fisheries of the NAAS.

Editorial board of the Journal “Fisheries Science of Ukraine”, Institute of Fisheries NAAS, 135, Obukhivska St, Kiev-164, Ukraine, 03164; tel.: +38 (044) 223-84-34; tel/fax: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Layout design: Natalia Kolesnik, Serhiy Shinkar, Yevheniy Arkhanhelskyi, Oleksandr Bezusyi; **Making-up:** Yevheniy Arkhanhelskyi, Maria Simon; **Literature editing:** Tetiana Shvets; **Corrector:** Hanna Kovalchuk

ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НААН
вул. Обухівська, 135 м. Київ-164, 03164, Україна
тел./факс: +38(044) 423-74-62, тел.: +38(044) 423-74-65

<http://fsu.ua>

info@fsu.ua