ISSN 2312-9581 (Online)

ISSN 2075-1508 (Print)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

3/2019

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські науки), переатестація від 06.11.2014 (наказ Міністерства освіти і науки України №1279)

Засновник та видавник — Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20934-10734 ПР від 18.08.2014

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Тарасюк Сергій Іванович, доктор с.-г. наук, професор, член-кор. НААН, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ГРИЦІНЯК Ігор Іванович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, директор Інституту рибного господарства НААН, УКРАЇНА

КОЛЕСНИК Наталія Леонідівна, кандидат с.-г. наук, с. н. с., зав. лаб. міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Гомельський Борис, доктор біол. наук, професор, Державний Університет Кентуккі, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Патрік Даніель, доктор біол. наук, голова департаменту біології Лабораторії Піренеїв, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА

Бузевич Ігор Юрійович, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, Україна

Бучацький Леонід Петрович, доктор біол. наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), провідний науковий співробітник лаб. біотехнологій в рибицтві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Матвієнко Наталія Миколаївна, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу іхтіопатології, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Зодапе Гаутам В., доктор біол. наук, професор, декан факультету зоології Державного Університету Шиваджі в Колхатурі, РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ

Діденко Олександр Володимирович, канд. біол. наук, с.н.с., відділ вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, зав. каф. водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА

Рудь Юрій Петрович, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії біотехнологій в рибицтві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Потрохов Олександр Спиридонович, доктор біол. наук, с.н.с., зав. лаб. біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, УКРАЇНА

Кутіщев Павло Сергійович, канд. біол. наук, зав. каф. водних біоресурсів та аквакультури, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

Драган Людмила Петрівна, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лаб. екологічних досліджень, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Маренков Олег Миколайович, канд. біол. наук, доцент

каф. загальної біології та водних біоресурсів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Ху Пао, доктор с.-г. наук, професор, директор Центру прісноводного рибного господарства, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

Крупінські Єджей, доктор с.-г. наук, професор, іноземний член Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут зоотехнії Польщі, ПОЛЬЩА

Третяк Олександр Михайлович, доктор с.-г. наук, с.н.с., заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН

Бех Віталій Валерійович, доктор с.-г. наук, професор, зав. відділу селекції риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Шерман Ісаак Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, зав. каф. рибицтва, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

Костенко Олександр Іванович, канд. с.-г. наук, с.н.с., зав. відділу ветеринарної медицини та зоотехнії, Національна академія аграрних наук України, УКРАЇНА

Шарамок Тетяна Сергіївна, канд. с.-г. наук, доцент каф. загальної біології та водних біоресурсів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, УКРАЇНА

Чепіль Людмила Василівна, канд. с.-г. наук, доцент каф. біології тварин, Національний університет біоресурсів і природокористування, Україна

Жигмонд Женей, доктор с.-г. наук, професор, Паннонський університет, УГОРЩИНА

Клименко Микола Олександрович, доктор с.-г. наук, професор, зав. каф. екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА

Бреус Денис Сергійович, канд. с.-г. наук, доцент каф. екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

є штатними працівниками Інституту рибного господарства НААН України: **Тушницька Наталія Йосифівна**, канд. вет. наук, с.н.с., вчений секретар ІРГ НААН; **Тучапський Ярослав Васильович**, канд. с.-г. наук, с. н. с. відділу селекції риб ІРГ НААН; **Залоїло Ольга Василівна**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лаб. молекулярно-генетичних досліджень ІРГ НААН; **Забитівський Юрій Михайлович**, канд. біол. наук, с. н. с. сектору осетрівництва ІРГ НААН; **Мрук Антоніна Іванівна**, зав. лаб. лососівництва ІРГ НААН; **Григоренко Тетяна Володимирівна**, канд. с.-г. наук, зав. лаб. гідробіології та технологій культивування цінних безхребетних ІРГ НААН.

Редакція журналу «Рибогосподарська наука України», вул. Обухівська, 135, м. Київ-164, 03164

тел. город. +38(044) 227-01-86; тел. моб. +38(094) 827-01-86, +38(097) 700-77-25; <http://fsu.ua>; fsu.journal@gmail.com

Підписано до друку 05.06.2019 р. Формат 70х108/16. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 7,1. Наклад 500 прим.

Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту рибного господарства НААН (Протокол № 4 від 05.06.2019 р.)

Дизайн макету: Колесник Н. Л., Шинкар С. В., Архангельський Є. Ю., Безусий О. Л. **Верстка:** Архангельський Є. Ю., Симон М. Ю. **Літературне редагування:** Швець Т. М. **Коректор:** Ковальчук Г. В.

Друкарня ТОВ «ПРО ФОРМАТ», 02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 45 Б, оф.16, тел.: +38(044) 353-85-58

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

3/2019(49)

Заснований у 2007 р.
Виходить 4 рази на рік

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 1-132
DOI: 10.15407/fsu2019.03

З М І С Т

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 5-15
DOI: 10.15407/fsu2019.03.005

П. О. Корженевська, Т. С. Шарамок, С. О. Мушун

Сезонна динаміка морфо-фізіологічних показників молоді коропа лускатого (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) Таромського рибного господарства 5

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 16-31
DOI: 10.15407/fsu2019.02.016

Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон, О. М. Маренков, О. С. Несцеренко

Культивування нематод з родів *Panagrellus*, *Turbatrix* (*Anguillula*) і *Rhabditis* для використання в годівлі риб 16

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 32-47
DOI: 10.15407/fsu2019.03.032

О. М. Ключко, Л. П. Бучацький, О. В. Мележик

Конструювання інформаційних баз даних риб: підготовка даних і об'єктно-орієнтований системний аналіз 32

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 48-58
DOI: 10.15407/fsu2019.03.048

М. М. Пашко, С. І. Тарасюк, О. М. Третьак, Н. О. Борисенко, О. Ю. Белікова

До питання генетичної структури племінних груп стерляді (*Acipenser ruthenus* Linnaeus) в індустріальній аквакультурі 48

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 59-71
DOI: 10.15407/fsu2019.03.059

І. Ю. Бобель, Я. І. Півторак

Гематологічні та продуктивні показники форелі за згодовування кормів «Aller Aqua» і «Aquafeed Fischfutter» 59

© Інститут рибного господарства НААН України, 2019

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 72-88

DOI: 10.15407/fsu2019.03.072

- Ю. О. Коваленко, О. О. Шлапак, О. С. Потрохов, О. Г. Зінковський*
Вплив антропогенного забруднення водойм на фізіолого-біохімічні
показники риб та склад їхніх паразитоценозів **72**

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 89-100

DOI: 10.15407/fsu2019.03.089

- М. З. Кориляк, О. І. Віщур, І. І. Грициняк*
Вплив розторопші плямистої (*Silybum marianum*) на стан Т- і В-
клітинного імунітету та природну резистентність дволіток коропа..... **89**

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 101-129

DOI: 10.15407/fsu2019.03.101

- І. Й. Грициняк, Т. М. Швець*
Методи досліджень у гідрохімії, гідроекології та водній токсикології.
Тематична бібліографія..... **101**

ХРОНІКА

- Пам'яті колеги і учителя..... **130**

СОДЕРЖАНИЕ

БИОРЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ ВОДОЕМОВ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 5-15
DOI: 10.15407/fsu2019.03.005

П. А. Корженевская, Т. С. Шарамок, С. А. Мушин

Сезонная динамика морфо-физиологических показателей молоди карпа чешуйчатого (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) Таромского рыбного хозяйства 5

ТЕХНОЛОГИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 16-31
DOI: 10.15407/fsu2019.02.016

Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон, О. Н. Маренков, О. С. Нестеренко

Культивирование нематод из родов *Panagrellus*, *Turbatrix* (*Anguillula*) и *Rhabditis* для использования в кормлении рыб..... 16

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 32-47
DOI: 10.15407/fsu2019.03.032

Е. М. Ключко, Л. П. Бучацкий, О. В. Мележик

Конструирование информационных баз данных рыб: подготовка данных и объектно-ориентированный системный анализ..... 32

СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 48-58
DOI: 10.15407/fsu2019.03.048

М. М. Пауко, С. И. Тарасюк, А. М. Третьяк, Н. А. Борисенко, Е. Ю. Беликова

К вопросу генетической структуры племенных групп стерляди (*Acipenser ruthenus* Linnaeus) в индустриальной аквакультуре 48

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 59-71
DOI: 10.15407/fsu2019.03.059

И. Ю. Бобель, Я. И. Пивторак

Гематологические и продуктивные показатели форели при скармливании кормов «Aller Aqua» и «Aquafeed Fischfutter»..... 59

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 72-88
DOI: 10.15407/fsu2019.03.072

Ю. А. Коваленко, О. О. Шлапак, А. С. Потрохов, О. Г. Зиньковский

Влияние антропогенного загрязнения на физиолого-биохимические показатели рыб и состав их паразитоценозов 72

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 89-100
DOI: 10.15407/fsu2019.03.089

М. З. Кориляк, О. И. Вицур, И. И. Грициняк

Влияние расторопши пятнистой (*Silybum marianum*) на состояние Т- и В-клеточного иммунитета и естественную резистентность двухлетков карпа..... 89

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 101-129
DOI: 10.15407/fsu2019.03.101

Ир. И. Грициняк, Т. М. Швец

Методы исследований в гидрохимии, гидроэкологии и водной токсикологии. Тематическая библиография 101

ХРОНИКА

Памяти коллеги и учителя 130

CONTENTS

BIORESOURCES AND ECOLOGY OF WATER BODIES

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 5-15

DOI: 10.15407/fsu2019.03.005

P. Korzhenevska, T. Sharamok, S. Mushyt

Seasonal dynamics of morphological and physiological parameters of scaly carp (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) juveniles from the Taromske fish farm 5

TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 16-31

DOI: 10.15407/fsu2019.02.016

N. Kolesnik, M. Simon, O. Marenkov, O. Nesterenko

The cultivation of the nematodes *Panagrellus*, *Turbatrix* (*Anguillula*) and *Rhabditis* for using in fish feeding..... 16

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 32-47

DOI: 10.15407/fsu2019.03.032

O. Klyuchko, L. Buchatsky, O. Melezhyk

Fish information databases construction: data preparation and object-oriented system analysis 32

SELECTION, GENETICS AND BIOTECHNOLOGY

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 48-58

DOI: 10.15407/fsu2019.03.048

M. Pashko, S. Tarasjuk, O. Tretiak, N. Borysenko, O. Bielikova

On the genetic structure of brood groups of the sterlet (*Acipenser ruthenus* Linnaeus) in industrial aquaculture..... 48

FEEDS AND FEEDING

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 59-71

DOI: 10.15407/fsu2019.03.059

I. Bobel, Ya. Pivtorak

Hematological and productive parameters of trout fed with “Aller Aqua” and “Aquafeed Fischfutter” feeds..... 59

PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 72-88

DOI: 10.15407/fsu2019.03.072

Ju. Kovalenko, O. Shlapak, A. Potrokhov, O. Zin'kovskiy

Effect of antropogenic pollution on physiological and biochemical parameters of fish and composition of their parasitocenoses 72

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 89-100

DOI: 10.15407/fsu2019.03.089

M. Korylak, O. Vishchur, I. Hrytsyniak

The effect of milk thistle (*Silybum marianum*) on the state of T- and B-cell immunity and natural resistance of the immune system of age-2 carp..... 89

CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 101-129

DOI: 10.15407/fsu2019.03.101

Ir. Hrytsynyak, T. Shvets

Research methods in hydrochemistry, hydroecology and aquatic toxicology. Thematic bibliography..... 101

CHRONICLE

Memories of colleagues and teachers 130

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 5-15

DOI: 10.15407/fsu2019.03.005

УДК 639.3:597.551.2:616.15(477.7)

Received 14.07.19

Received in revised form 27.07.19

Accepted 25.08.19

СЕЗОННА ДИНАМІКА МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МОЛОДІ КОРОПА ЛУСКАТОГО (*CYPRINUS CARPIO* LINNAEUS, 1758) ТАРОМСЬКОГО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

П. О. Корженевська, polinka@3g.ua, Дніпровський національний університет імені
Олеся Гончара, м. Дніпро

Т. С. Шарамок, sharamok@i.ua, Дніпровський національний університет імені
Олеся Гончара, м. Дніпро

С. О. Мушит, mushyt@vsau.vin.ua, Вінницький національний аграрний
університет, м. Вінниця

Мета. Дослідити сезонну динаміку морфо-фізіологічних показників молоді коропа лускатого, що вирощувався в умовах Таромського рибного господарства Дніпропетровської області.

Методика. Морфо-фізіологічні дослідження цьогоріток та однорічок коропа лускатого виконані за загальноприйнятими методиками. Морфо-фізіологічні показники у цьогоріток коропа визначали у кінці вегетаційного періоду; у однорічок — при розвантаженні зимувального ставу.

Результати. Представлено дані морфологічних показників, індексів органів, коефіцієнтів вгодованості та гематологічних показників крові цьогоріток та однорічок коропа лускатого, що вирощувались у Таромському рибному господарстві. Стан крові однорічок коропа характеризується високою кількістю еритроцитів, підвищеним кольоровим показником, високою швидкістю осідання еритроцитів, зниженням вмісту лімфоцитів з підвищенням частки нейтрофільних гранулоцитів в лейкоцитарній формулі та збільшенням моноцитів. Зміни параметрів гематологічного профілю молоді коропа лускатого свідчить про наявність певних зсувів у показниках крові після зимового утримання. Найменші показники індексів усіх органів відзначені у риб, виловлених навесні, що є наслідком виснаження організму після зимівлі. Зменшення коефіцієнтів вгодованості за Фультоном та Кларк пояснюються впливом стресу на фізіологічний стан організму риби після зимового періоду. Досліджені морфо-фізіологічні показники коропа лускатого свідчать про достатній ступінь підготовки рибопосадкового матеріалу до зимівлі, що забезпечило високий відсоток його виживання.

Наукова новизна. Визначені індекси внутрішніх органів та гематологічний профіль цьогоріток та однорічок коропа лускатого, що вирощувався в зоні рибництва Північного Степу за екстенсивною технологією. Досліджені морфо-фізіологічні показники залежать від сезонних чинників та характеризують фізіологічний стан молоді коропа.

Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для додаткової оцінки якості та загального стану рибопосадкового матеріалу коропа.

Ключові слова: молодь, короп лускатий, зимівля, рибне господарство, індекси внутрішніх органів, гематологічні показники.

© П. О. Корженевська, Т. С. Шарамок, С. О. Мушит, 2019

SEASONAL DYNAMICS OF MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL
PARAMETERS OF SCALY CARP (*CYPRINUS CARPIO* LINNAEUS, 1758)
JUVENILES FROM THE TAROMSKE FISH FARM

P. Korzhenevskaya, polinka@3g.ua, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

T. Sharamok, sharamok@i.ua, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

S. Mushyt, mushyt@vsau.vin.ua, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Purpose. To investigate of the seasonal dynamics of morphological and physiological parameters of scaly carp juveniles reared under the conditions of the Taromske fish farm in the Dnipropetrovsk region.

Methodology. Morphological and physiological studies of the young-of-the-year and yearlings of the scaly carp were carried out according to conventional methods. Morphological and physiological parameters of carp young-of-the-year were determined at the end of the growing season; yearlings – during unloading of the wintering pond.

Findings. The presented data shows morphological parameters, indices of organs, condition factor and hematological parameters of the young-of-the-year and yearlings of the scaly carp reared in the Taromske fish farm. The blood condition of carp yearlings was characterized by a high number of red blood cells, increased color index, high erythrocyte sedimentation rate, a decrease in lymphocytes with an increase in the proportion of neutrophils in the leukocyte formula and an increase in the number of monocytes. Changes in the hematological profile parameters of scaly carp juveniles indicate the presence of certain changes in blood parameters after wintering. The lowest indices of all organs were observed in fish caught in the spring, which is a consequence of body depletion after wintering. The reductions in the Fulton and Clark condition factors can be caused by the effect of stress on the physiological state of the fish body after the wintering period. The morphological and physiological parameters of the scaly carp indicated a sufficient degree of the preparation of fish juveniles for wintering that ensured a high survival rate.

Originality. The indices of internal organs and hematological profile of this year and yearlings of scaly carp grown in the fishery zone of the Northern Steppe by extensive technology were determined. The investigated morpho-physiological parameters depended on seasonal factors and characterized the physiological state of carp juveniles.

Practical significance. The obtained results can be used for additional assessment of the quality and general condition of carp seeds.

Key words: juveniles, scaly carp, Taromske fish farm, wintering, indices of internal organs, hematological parameters.

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МОЛОДИ КАРПА ЧЕШУЙЧАТОГО (*CYPRINUS CARPIO* LINNAEUS, 1758)
ТАРОМСКОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

П. А. Корженевская, polinka@3g.ua, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр

Т. С. Шарамок, sharamok@i.ua, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр

С. А. Мушит, mushyt@vsau.vin.ua, Винницкий национальный аграрный университет, г. Винница

Цель. Исследовать сезонную динамику морфо-физиологических показателей молоди карпа чешуйчатого, выращиваемого в условиях Таромского рыбного хозяйства Днепропетровской области.

Методика. Морфо-физиологические исследования сеголетков и годовиков карпа

чешуйчатого выполнены по общепринятым методикам. Морфо-физиологические показатели у сеголетков карпа определяли в конце вегетационного периода; у годовиков — при разгрузке зимовального пруда.

Результаты. Представлены данные морфологических показателей, индексов органов, коэффициентов упитанности и гематологических показателей крови сеголетков и годовиков карпа чешуйчатого, выращиваемых в Таромском рыбном хозяйстве. Состояние крови годовиков карпа характеризуется высоким количеством эритроцитов, повышенным цветным показателем, высокой скоростью оседания эритроцитов, снижением содержания лимфоцитов с повышением доли нейтрофилов в лейкоцитарной формуле и увеличением моноцитов. Изменения параметров гематологического профиля молоди карпа чешуйчатого свидетельствует о наличии определенных сдвигов в показателях крови после зимнего содержания. Наименьшие показатели индексов всех органов отмечены у рыб, выловленных весной, что является следствием истощения организма после зимовки. Уменьшение коэффициентов упитанности по Фультону и Кларк объясняются влиянием стресса на физиологическое состояние организма рыбы после зимнего периода. Исследованные морфо-физиологические показатели карпа чешуйчатого указывают на достаточную степень подготовки рыбопосадочного материала к зимовке, что обеспечило высокий процент его выживания.

Научная новизна. Определены индексы внутренних органов и гематологический профиль сеголетков и годовиков карпа чешуйчатого, выращиваемого в зоне рыбоводства Северной Степи по экстенсивной технологии. Исследованные морфо-физиологические показатели зависят от сезонных факторов и характеризуют физиологическое состояние молоди карпа.

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы для дополнительной оценки качества и общего состояния рыбопосадочного материала карпа.

Ключевые слова: молодь, карп чешуйчатый, зимовка, рыбное хозяйство, индексы внутренних органов, гематологические показатели.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Для економіки України важливу практичну задачу являє собою вивчення впливу негативних факторів навколишнього середовища на фізіологічний стан риб, вирощуваних в умовах рибницьких підприємств.

Короп — традиційний та перспективний об'єкт рибництва в Україні. При товарному вирощуванні молоді коропа велике значення має період зимівлі, коли риба за низьких температур води практично припиняє жити та стає більш вразливою до захворювань та паразитів. Дослідження крові дозволяє визначити адаптаційні можливості риб в умовах конкретних водойм. Зміни в системі крові відображають адаптацію організму риб до змін зовнішніх і внутрішніх факторів. Гематологічні показники є високоспецифічними для кожного виду і змінюються у вузьких межах, що дозволяє використовувати їх у якості індикаторів загального стану організму [3].

У зв'язку з цим, доцільно застосовувати метод морфо-фізіологічних показників, який дозволяє оцінити фізіологічний стан особин з урахуванням вікової та сезонної специфіки риби. Відносна маса деяких життєвоважливих органів (печінки та нирок) дозволяє проаналізувати стан організму в цілому в тих чи інших умовах [12, 18].

Саме тому особливої актуальності набувають дослідження, присвячені

визначенню закономірностей адаптації риб до мінливих умов навколишнього середовища.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Протягом останніх років у науці набуває великого значення питання вивчення крові риб як інтегрального показника, який дозволяє простежити стан організму, його особливості функціонування та вплив навколишнього середовища. Але, незважаючи на численні дослідження з гематології риби, кількість довідкових даних про аналіз крові молоді риби недостатня [2, 7]. Особливо це відмічається у даних, що відображають гематологічний профіль молоді корокових риб, враховуючи особливості фізико-географічної зони України.

Зимовий період — один з найскладніших періодів у житті риб, особливо молоді, на першому році життя. Вимушене голодування в період зимівлі при несприятливих абіотичних умовах призводить до втрати маси та ослаблення імуніфізіологічного статусу [1]. Тому зимостійкість риб, тобто їх здатність протистояти несприятливим впливам навколишнього середовища у зимовий період, визначається фізіологічним станом особин перед зимівлею, який характеризується певними показниками, наприклад, вгодованістю, індексами органів та гематологічними параметрами крові.

У зв'язку з цим, метою досліджень було дослідження сезонної динаміки морфо-фізіологічних показників молоді коропа лускатого, що вирощувався в умовах Таромського рибного господарства Дніпропетровської області.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проводилися у 2018–2019 рр. на базі Таромського рибного господарства в Дніпропетровській області. Це повносистемне рибне господарство, в якому в даний час використовуються 2 вирощувальних та 1 зимувальний стави.

Матеріалом для досліджень були цьоголітки та однорічки коропа лускатого (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758). При облові ставів методом рандомізації відбирали по 30–50 екз. риб.

Збір та обробку матеріалу проводили за загальноприйнятими методиками [8, 11]. Довжину риб визначали за допомогою штангенциркуля з точністю до 1 мм, зважування проводили на електронних вагах з точністю до 0,1 г. Визначення індексів органів здійснювали прирівнюючи масу органів до маси тіла риби [9]. Коефіцієнти вгодованості за Фультоном та Кларк визначали згідно з методикою [8].

Показники крові у цьоголіток коропа визначали у кінці вегетаційного періоду; у однорічок — при розвантаженні зимувального ставу. Гематологічні дослідження базувалися на відборі проб крові за рекомендованими методиками [15, 17]. Відбір проб крові проводили з хвостової вени, шляхом ампутації стебла хвостового плавця. Проби фіксували за допомогою 0,2%-ого розчину гепарину за концентрації 1000 м.од./мл. У крові коропа визначали рівень гемоглобіну, кольоровий показник, швидкість осідання еритроцитів, кількість еритроцитів,

кількість лейкоцитів та лейкоцитарну формулу за допомогою гематологічного аналізатора «Abacus 3 СТ». Кількість різних груп лейкоцитів виражали у відсотках (%) [13].

Опрацювання статистичного матеріалу проводили за допомогою програми «Excel» із пакету «MS Office».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Індивідуальна мінливість екстер'єрних (вагових і лінійних) показників, що характеризують форму та розміри тіла риби, залежить від комплексу абіотичних і біотичних факторів навколишнього середовища. Для оцінки якості рибопосадкового матеріалу використовувалися такі морфометричні ознаки: маса риби, абсолютна довжина тіла, промислова довжина тіла, висота тіла. В результаті проведених досліджень встановлено, що середня маса тіла коропа в осінній період складала $24,83 \pm 2,25$ г, абсолютна довжина тіла — $11,50 \pm 0,36$ см, промислова довжина — $9,21 \pm 0,30$ см, висота тіла — $3,36 \pm 0,09$ см, ширина тіла — $1,72 \pm 0,07$ см (табл. 1).

Таблиця 1. Морфометричні показники молоді коропа лускатого Таромського рибного господарства ($M \pm m$, $n = 30$).

Table 1. Morphometric parameters of young carp scaly Taromsky fisheries ($M \pm m$, $n = 30$).

Показники / Parameters	Осінь 2018 / Fall 2018, $M \pm m$	CV, %	Весна 2019 / Spring 2019, $M \pm m$	Cv, %
Маса, г / Weight, g	$24,83 \pm 2,25$	55,07	$20,99 \pm 1,41$	50,40
Абсолютна довжина, см / Absolute length, cm	$11,50 \pm 0,36$	18,64	$11,57 \pm 0,25$	16,60
Промислова довжина, см / Industrial length, cm	$9,21 \pm 0,30$	19,16	$9,29 \pm 0,20$	16,17
Висота тіла, см / Body height, cm	$3,36 \pm 0,09$	16,84	$3,52 \pm 0,12$	19,20
Ширина тіла, см / Width of body, cm	$1,72 \pm 0,07^*$	18,61	$1,37 \pm 0,09^*$	31,86

Примітка.* — різниця між показниками достовірна, $p \leq 0,05$.

Note: * — the difference between the indices is significant, $p \leq 0.05$.

Маса однорічок коропа весною зменшилася на 15,47%; ця зміна пов'язана з тривалим періодом голодування під час зимівлі риби. Показники абсолютної та промислової довжини майже не змінилися. Ширина тіла коропа, навпаки, зменшилась на 20,35% ($P \leq 0,05$).

Основою для більш чіткого уявлення про особливості стану риб можуть слугувати закономірності росту їхніх внутрішніх органів. Вивчення цих закономірностей можливе за допомогою методу морфо-фізіологічних індексів, заснованому на тому, що спосіб та умови життя риби тісно пов'язані з деякими її морфологічними особливостями [18]. Індокси органів риб є показниками змін, що відбуваються у водоймі [10]. Для досліджень адаптації риби до впливу

навколишнього середовища вираховувались індекси печінки, серця, селезінки та нирок у процентах від маси тіла коропа (табл. 2).

Таблиця 2. Морфологічні індекси внутрішніх органів молоді коропа лускатого Таромського рибного господарства ($M \pm m$, $n = 30$).

Table 2. Morphophysiological indices of internal organs of young carp scaly Taromsky fisheries ($M \pm m$, $n = 30$).

Показники / Parameters	Осінь 2018 / Fall 2018, $M \pm m$	CV, %	Весна 2019 / Spring 2019, $M \pm m$	Cv, %
Індекси / Indexes:				
– печінка / liver	4,06 $\pm$ 0,29	35,22	3,56 $\pm$ 0,21	35,89
– серце / heart	0,38 $\pm$ 0,03*	23,83	0,26 $\pm$ 0,04*	87,40
– селезінка / spleen	–	–	0,33 $\pm$ 0,10	147,52
– нирки / kidneys	1,12 $\pm$ 0,13*	37,93	0,76 $\pm$ 0,04*	31,86

Примітка. * — різниця між показниками достовірна, $p \leq 0,05$.

Note: * — the difference between the indices is significant, $p \leq 0.05$.

Індекс нирок є показником інтенсифікації обміну речовин організму, та він не пов'язаний зі збільшенням рухової активності [10]. У однорічок коропа індекс нирок знизився на 32,14% ($P \leq 0,05$) в порівнянні з цьогорітками.

Після зимівлі показник індексу серця у коропа знизився на 31,58% ($P \leq 0,05$) в порівнянні з осінніми показниками. З віком та збільшенням маси тіла у риб спостерігається зниження рівня індексу серця, що пояснюється зменшенням енергетичних витрат зі зростанням розміру риби [12].

Загальним показником забезпеченості організму кормами є індекс печінки, який також слугує індикатором напруженості енергетичного обміну та токсичності навколишнього середовища [10]. Навесні у однорічок коропа лускатого спостерігалась тенденція до зменшення показника індексу печінки на 12,32%.

Індекс селезінки відображає залежність організму риби від різних умов середовища, токсикозів та стресів різної природи, радіаційного навантаження, умов утримання [14]. Індекс селезінки коропа після зимівлі складав $0,33 \pm 0,10$ г.

Перед посадкою цьогоріток коропа їхній коефіцієнт вгодованості за Фультоном відповідав нормі, та становив 2,84 [15]. Після зимівлі він зменшився на 13,38% ($P \leq 0,05$). Спостерігалось зменшення коефіцієнта вгодованості за Кларк у однорічок коропа на 14,29% ($P \leq 0,05$) (рис. 1). Ці зміни пояснюються впливом стресу на фізіологічний стан організму риби після зимового періоду.

Високі показники індексу печінки цьогоріток коропа вказують на активне накопичення запасів жирів і глікогену на зимовий період. Оцінка морфометричних показників та індексів органів цьогоріток коропа Таромського рибного господарства свідчить про оптимальні умови вирощування молоді коропа лускатого та його підготовленість до зимівлі. Про це свідчить і високий вихід однорічок коропа, що складав 86%. Найменші показники індексів усіх органів відзначені у риб, виловлених навесні, що є наслідком виснаження організму після зимівлі.

Рис. 1. Характеристика молоді коропа лускатого Таромського рибного господарства, ($M \pm m$, $n = 30$).

Fig. 1. Characteristics of young carp scaly Taromsky fisheries, ($M \pm m$, $n = 30$).

Вплив різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів призводить до відповідної реакції організму, що відображається у змінах його гематологічних показників. Зміни в системі крові дозволяють оцінити не тільки фізіологічний стан риби, а й встановити ступінь сприятливості умов навколишнього середовища (табл. 3).

Таблиця 3. Показники крові коропа лускатого Таромського рибного господарства ($M \pm m$, $n = 5$)

Table 3. Blood parameters of carp scaly Taromsky fisheries ($M \pm m$, $n = 5$)

Період року / The period of the year	Гемоглобін, г/л / Hemoglobin, g/l	Еритроцити, Т/л / Erythrocytes, T/l	Кольоровий показник / Color indicator	ШОЕ, мм/год / ESR, mm / hour
Осінь 2018 / Fall 2018	57 ± 6,84	2,6 ± 0,17*	0,72 ± 0,01*	1,67 ± 0,33*
Весна 2019 / Spring 2019	59 ± 6,50	1,9 ± 0,10*	1,03 ± 0,05*	7,5 ± 1,50*

Примітка.* — різниця між показниками достовірна, $p \leq 0,05$.

Note: * — the difference between the indices is significant, $p \leq 0.05$.

Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) — відомий, але неспецифічний показник; він залежить від властивостей білків плазми та заряду мембрани еритроцитів, змін в складі білкових фракцій крові, співвідношення холестерину і лецитину, від кількості еритроцитів в крові. Його значення використовується для діагностики захворювань риби різноманітного генезу. За довідниковими даними для коропа ШОЕ коливається в межах 1,5–4,0 мм/год [15] та зазнає сезонних змін. У цьоголіток коропа лускатого показник ШОЕ входить у ці межі та складає 1,67

мм/год. Значення ШОЕ у однорічок перевищує значення цього показника у цьоголіток в 4,5 рази ($P \leq 0,05$). Найчастіше спостерігається збільшення ШОЕ при різних запальних процесах.

Кольоровий показник – це співвідношення між кількістю гемоглобіну та числом еритроцитів. Він показує ступінь насичення еритроцитів гемоглобіном. Це важливо знати при діагностиці задухи, при порушеннях гідрохімічних режимів у водоймах, при отруєннях і ураженнях риб паразитами [4]. Весняне значення кольорового показника крові коропа було вищим ніж осіннє на 43%, складаючи 1,03 ($P \leq 0,05$).

Гемоглобіну належить роль транспортування кисню. Також він забезпечує енергетичні процеси життєдіяльності риб. Тому значення цього показника є важливою складовою фізіологічного стану організму риби в навколишньому середовищі. Середнє значення даного показника становило $58,00 \pm 6,67$ г/л, вміст гемоглобіну у крові коропа після зимівлі значно не змінився.

Головна функція еритроцитів — дихальна; також вони здійснюють транспорт кисню, вуглекислого газу (частково) та амінокислот. Тривалість життя еритроцитів може бути більше року, і це залежить від інтенсивності їхнього функціонування [3]. Кількість еритроцитів в крові коропа після зимівлі складала 1,9 Т/л та була на 26,92% ($P \leq 0,05$) меншою, ніж у коропа до зимівлі.

Лейкоцитарна формула крові лускатого коропа стабілізується на першому році його життя. Процеси лейкоцитопоезу залежать від активності риби і температури води [6]. Як до, так і після зимівлі кров лускатого коропа носить лімфоїдний характер (рис. 2). Рівень лімфоцитів у цьоголіток коропа лускатого становив 85,33%, а у однорічок коропа — 72,5%. Період зимівлі суттєво впливає на фізіологічний стан риби, зокрема це відбивається на лейкоцитарній формулі крові лускатого коропа. Так, загальна кількість лімфоцитів у коропа після зимівлі зменшується на 15,03%, що може вказувати на певне зниження рівня імунітету.

Рис. 2. Склад білої крові молоді коропа лускатого Таромського рибного господарства ($n = 5$): 1 — еозинофіли, 2 — сегментноядерні нейтрофіли, 3 — паличкоядерні нейтрофіли, 4 — лімфоцити, 5 — моноцити.

Fig. 2. The composition of white blood carp scaly Taromic fisheries ($n = 5$): 1 — eosinophils, 2 — segmented neutrophils, 3 — rod-shaped neutrophils, 4 — lymphocytes, 5 — monocytes.

Нейтрофіли високочутливі до змін внутрішнього середовища, які порушують нормальну життєдіяльність організму риби. За патологічного стану організму нейтрофіли виділяють в кров речовини, що характеризуються бактерицидними, антитоксичними та регенеративними властивостями [16]. Але збільшення їх кількості свідчить про високу фагоцитарну активність. Процент еозинофілів та паличкоядерних нейтрофілів залишився у однорічок коропа на рівні 1%, але рівень сегментоядерних нейтрофілів зріс на 18,39%, складаючи 15%. Підвищена кількість нейтрофілів, порівняно з осінніми показниками, свідчить про можливість розвитку запального процесу в організмі риби.

Моноцити є активними фагоцитами, що характеризуються значною міграційною здатністю. Вони беруть участь в регуляції імуногенезу і гранулопоезу. Зміни у кількості моноцитів виникають за наявності токсичних агентів в організмі риби, а також за вірусних та паразитарних захворювань [5]. Кількість моноцитів, що виконують фагоцитарну функцію в організмі риб, достовірно збільшується з 1% восени до 10,5% ($P \leq 0,05$) у весняний період.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Таким чином, зміни параметрів гематологічного профілю молоді коропа лускатого свідчить про наявність певних зсувів у показниках крові після зимового утримання. Стан крові однорічок коропа характеризується високою кількістю еритроцитів, підвищеним кольоровим показником, високою швидкістю осідання еритроцитів, зниженням вмісту лімфоцитів з підвищенням частки нейтрофільних гранулоцитів в лейкоцитарній формулі та збільшенням моноцитів. Гематологічні показники можуть бути використані для додаткової оцінки якості та загального фізіологічного стану рибопосадкового матеріалу коропа.

Досліджені морфо-фізіологічні показники коропа лускатого свідчать про достатній ступінь підготовки рибопосадкового матеріалу до зимівлі, що забезпечило високий відсоток його виживання. Найменші показники індексів усіх органів та коефіцієнтів вгодованості відзначені у риб, виловлених навесні, що є наслідком виснаження організму після зимівлі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Валова В. Н. Реакция периферической крови и пищеварительной системы сеголеток амурского осетра на условия зимовки в садках тепловодного хозяйства // Известия ТИНРО. 2013. Т. 173. С. 259—268.
2. Воліченко Ю. М., Пентилук С. І., Шерман І. М. Сезонні зміни морфофізіологічного стану коропових риб, вирощених за пасовищної технології в умовах півдня України // Рибогосподарська наука України. 2017. № 1. С. 84—91.
3. Головина Н. А. Морфофункциональная характеристика крови рыб – объектов аквакультуры : автореф. дис. на соискание наук. степени докт. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология». Москва : ВНИИПРХ, 1996. 53 с.
4. Давыдов О. Н., Темниханов Ю. Д., Куровская Л. Я. Патология крови рыб. Киев : ИНКОС, 2006. 206 с.
5. Иванова Н. Т. Атлас клеток крови рыб. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1999. 50 с.

6. Лазаренко П. В. Особливості гематологічних показників лускатого коропа при садковому вирощуванні // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. 2009. № 11(3). С. 119—122.
7. Лянзберг О. В., Шерман І. М. Динаміка гематологічних показників коропових риб протягом зимового утримання // Рибогосподарська наука України. 2008. № 4. С. 104—107.
8. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / ред. Романенко В. Д. Київ : ЛОГОС, 2006. 408 с.
9. Методика морфо-фізіологічних і біохімічних досліджень риб. Москва : ВНИРО, 1972. 118 с.
10. Мурадова Л. В., Сиротина М. В. Мониторинг состояния популяции карася серебряного (*Carassius gibelio*) озера Каменик Костромской области // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. Вып. 2. С. 150—154.
11. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1966. 375 с.
12. Причепа М. В. Вплив екологічних чинників водного середовища на морфофізіологічні показники судака та окуня // Рибогосподарська наука України. 2013. № 4. С. 75—85.
13. Рокицкий П. Ф. Основы вариационной статистики для биологов. Минск, 1961. 217 с.
14. Рыжков Л. П., Кучко Т. Ю. Селезенка — морфофизиологический индикатор качества состояния популяции рыб // Экологическая физиология водных организмов. 1992. С. 11—17.
15. Фізіологія риб / Дехтярьов П. А. та ін. Київ : Вища школа, 2001. 128 с.
16. Шарамок Т. С., Єсіпова Н. Б. Вплив антропогенних факторів на гематологічні показники риб // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2015. Вип. 3/4. С. 722—726.
17. Шатуновский М. И. Методика морфо-физиологических исследований рыб. Москва : Агропромиздат, 1972. 90 с.
18. Шварц С. С. Метод морфо-физиологических индикаторов в экологии наземных позвоночных животных // Зоологический журнал. 1958. № 2. С. 161—173.

REFERENCES

1. Valova, V. N. (2013). Reaktsiya perifericheskoy krovi i pishchevaritel'noy sistemy segoletok amurskogo osetra na usloviya zimovki v sadkakh teplovodnogo khozyaystva. *Izvestiya TINRO*, 173, 259-268.
2. Volichenko, Yu. M., Pentyliuk, S. I., & Sherman, I. M. (2017). Sezonni zminy morfofiziologichnoho stanu koropovykh ryb, vyroshchennykh za pasovyshchnoi tekhnologii v umovakh pivdnia Ukrainy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 84-91.
3. Golovina, H. A. (1996) Morfofunktsional'naya kharakteristika krovi ryb – ob"ektov akvakul'tury. *Extended abstract of Doctor's thesis*. Moskva: VNIIPRKh.
4. Davydov, O. N., Temnikhanov, Yu. D., & Kurovskaya, L. Ya. (2006). *Patologiya krovi ryb*. Kiev: INKOS.

5. Ivanova, N. T. (1999). *Atlas kletok krvi ryb*. Moskva: Legkaya i pishchevaya promyshlennost'.
6. Lazarenko, P. V. (2009). Osoblyvosti hematolohichnykh pokaznykiv luskatoho koropa pry sadkovomu vyroshchuvanni. *Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Gzhytskoho*, 11(3), 119-122.
7. Lianzberh, O. V., & Sherman, I. M. (2008). Dynamika hematolohichnykh pokaznykiv koropovykh ryb protiahom zymovoho utrymannia. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 104-107.
8. Romanenko, V. D. (Ed.). (2006). *Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevyykh vod*. Kyiv: LOHOS.
9. *Metodika morfo-fiziologicheskikh i biokhimicheskikh issledovaniy ryb*. (1972). Moskva: VNIRO.
10. Muradova, L. V., & Sirotina, M. V. (2016). Monitoring sostoyaniya populyatsii karasya serebryanogo (*Carassius gibelio*) ozero Kamenik Kostromskoy oblasti. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk*, 2, 150-154.
11. Pravdin, I. F. (1966). *Rukovodstvo po izucheniiu ryb*. Moskva: Pishchevaia promyshlennost'.
12. Prychepa, M. V. (2013). Vplyv ekolohichnykh chynnykiv vodnoho seredovyscha na morfofiziologichni pokaznyky sudaka ta okunia. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 75-85.
13. Rokitskiy, P. F. (1961). *Osnovy variatsionnoy statistiki dlya biologov*. Minsk.
14. Ryzhkov, L. P., & Kuchko, T. Yu. (1992). Selezhenka — morfofiziologicheskii indikator kachestva sostoyaniya populyatsii ryb. *Ekologicheskaya fiziologiya vodnykh organizmov*, 11-17.
15. Dehtiarov, P. A., Sherman, I. M., Pylypenko, Yu. V., Yarzhombek, O. O., & Vovchenko, S. H. (2001). *Fiziologhiia ryb*. Kyiv: Vyscha shkola.
16. Sharamok, T. S., & Yesipova, N. B. (2015). Vplyv antropohennykh faktoriv na hematolohichni pokaznyky ryb. *Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka*, 3/4, 722-726.
17. Shatunovskiy, M. I. (1972). *Metodika morfo-fiziologicheskikh issledovaniy ryb*. Moskva: Agropromizdat.
18. Shvarts, S. S. (1958). Metod morfo-fiziologicheskikh indikatorov v ekologii nazemnykh pozvonochnykh zhivotnykh. *Zoologicheskii zhurnal*, 2, 161-173.

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 16-31
DOI: 10.15407/fsu2019.02.016
УДК 639.3.043.2:639.4/.5

Received 12.05.19
Received in revised form 23.06.19
Accepted 28.07.19

THE CULTIVATION OF THE NEMATODES *PANAGRELLUS*, *TURBATRIX* (*ANGUILLULA*) AND *RHABDITIS* FOR USING IN FISH FEEDING

N. Kolesnik, kolenataleo@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

M. Simon, seemann.sm@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

O. Marenkov, gidrobions@gmail.com, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

O. Nesterenko, nefesst@gmail.com, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

Purpose. To analyze professional literature and summarize the information on the cultivation of the representatives of three nematode (*Nematoda*) genera. To highlight the optimal biotechnology of the cultivation of banana nematode (*Panagrellus redivivus*), vinegar eelworm (*Turbatrix aceti*) and rhabditis (*Rhabditis*). To review the biological characteristics of these species along with the possibilities for their use as food objects in aquaculture.

Results. This work contains brief information on the biology and cultivation features of the above-mentioned worms. It presents the most cost-effective and simple mass production biotechnology of the cultivation of banana and vinegar nematodes and rhabditis. It can be used under different conditions due to its simplicity and cost-effectiveness.

The data regarding the use of nematodes in feeding fish juveniles in general and ornamental fish culture in particular are presented. The chemical composition and nutritional value of these worms, as well as their behavior in aquariums are described.

Practical significance. The summarized information will be useful for researchers who are exploring the ways to optimize fish feeding as well as for aquarists. The presented technology of cultivation of banana and vinegar nematodes and rhabditis can be used by a broad range of stakeholders.

Key words: live food cultivation, fish fry, nematodes (*Nematoda*), banana nematode (*Panagrellus redivivus*), vinegar eelworm (*Turbatrix aceti*), rhabditis (*Rhabditis*), aquarium husbandry.

КУЛЬТИВУВАННЯ НЕМАТОД З РОДІВ *PANAGRELLUS*, *TURBATRIX* (*ANGUILLULA*) І *RHABDITIS* ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ГОДІВЛІ РИБ

Н. Л. Колесник, kolenataleo@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

О. М. Маренков, gidrobions@gmail.com, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

О. С. Нестеренко, nefesst@gmail.com, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

© N. Kolesnik, M. Simon, O. Marenkov, O. Nesterenko, 2019

Мета. Проаналізувати масив фахових літературних джерел та узагальнити отриману інформацію з культивування представників трьох родів круглих червів нематод (Nematoda). Викласти оптимальну біотехнологію культивування бананової нематоди (*Panagrellus redivivus*), оцтової нематоди (*Turbatrix aceti*) та рабдитисів (*Rhabditis*). Розглянути біологічні особливості цих видів, а також можливості й перспективи використання в якості кормових об'єктів у аквакультури.

Результати. Дана робота містить коротку інформацію з біології та специфіки культивування вищезазначених червів. Представлені найбільш економічно вигідні та доступні у впровадженні до виробництва біотехнології культивування бананової й оцтової нематод, а також рабдитисів. Вони можливі для застосування в різних умовах за рахунок своєї простоти та невибагливості.

Наведені дані стосовно специфіки використання нематод в годівлі молоді риб взагалі, й в акваріумистиці зокрема. Описано хімічний склад і поживну цінність цих червів, а також їхню поведінку в умовах акваріумів.

Практична значимість. Масив узагальненої інформації буде корисним для науковців, які досліджують шляхи оптимізації годівлі риб, а також акваріумистів. Представлена технологія культивування бананової і оцтової нематод, а також рабдитисів можлива для використання широким колом осіб.

Ключові слова: культивування живих кормів, молодь риб, нематоди (Nematoda), бананова нематода (*Panagrellus redivivus*), оцтова нематода (*Turbatrix aceti*), рабдитис (*Rhabditis*), акваріумістика.

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НЕМАТОД ИЗ РОДОВ *PANAGRELLUS*, *TURBATRIX* (*ANGUILLULA*) И *RHABDITIS* ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОРМЛЕНИИ РЫБ

Н. Л. Колесник, kolenataleo@gmail.com, Інститут рыбного хозяйства НААН України, г. Киев

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рыбного хозяйства НААН України, г. Киев

О. Н. Маренков, gidrobions@gmail.com, Днепроvский национальный университет имени Олеса Гончара, г. Днепр

О. С. Нестеренко, nefesst@gmail.com, Днепроvский национальный университет имени Олеса Гончара, г. Днепр

Цель. Проанализировать массив специальной литературы и обобщить полученную информацию по культивированию представителей трех родов круглых червей нематод (Nematoda). Изложить оптимальную биотехнологию культивирования банановой нематоды (*Panagrellus redivivus*), уксусной нематоды (*Turbatrix aceti*) и рабдитисов (*Rhabditis*). Рассмотреть биологические особенности этих видов, а также возможности и перспективы использования в качестве кормовых объектов в аквакультуре.

Результаты. Данная работа содержит краткую информацию по биологии и специфике культивирования вышеупомянутых червей. Представлены наиболее экономически выгодные и легкие во внедрении в производство технологии культивирования банановой и уксусной нематод, а также рабдитисов. Они возможны для применения в различных условиях за счет своей простоты и неприязательности.

Приведены данные относительно специфики использования нематод в кормлении молоді риб в целом и в аквариумистике в частности. Описаны химический состав и питательная ценность этих червей, а также их поведение в условиях аквариума.

Практическая значимость. Массив обобщенной информации будет полезен для ученых, исследующих пути оптимизации кормления рыб, а также аквариумистов. Представленная технология культивирования банановой и уксусной нематод, а также

рабдитисов возможна для использования широким кругом лиц.

Ключевые слова: культивирование живых кормов, молодь рыб, нематоды (*Nematoda*), банановая нематода (*Panagrellus redivivus*), уксусная нематода (*Turbatrix aceti*), рабдитисы (*Rhabditis*), аквариумистика.

PROBLEM STATEMENT AND ANALYSIS OF LAST ACHIEVEMENTS AND PUBLICATIONS

High reproductive capacity, short life cycle and tolerance to changes in environmental conditions cause a constant demand for brood cultures of free-living nematodes among aquarists [1, 2]. The most popular of them are representatives of the *Panagrellus*, *Turbatrix* (*Anguillula*) and *Rhabditis* genera, which are known among aquarists as "Micra" [3, 4].

These nematodes are valuable forage organisms for juvenile fish, because they contain about 76% of water, 24% of dry matter consisting of 40% of protein and 19.5% of fat [5, 6]. Compared to other invertebrates, the fat content in the body of nematodes is very high, thus, they should be alternated with other feeds [7, 8]. However, they can withstand salinity up to 40‰ for 8 hours, which is important for marine aquariums [9, 10]. It should be noted that the nematodes could live in aquarium water for several days [11, 12].

Nematodes have not yet been widely used in production, but with further improvement of the cultivation technology, they can be widely used as starting live feeds for fish larvae [13-15]. For this reason, we review in detail the main links of the cultivation biotechnology for the most common representatives of the above genera for the needs of fish farming.

STUDY RESULTS AND THEIR DISCUSSION

Taxonomically, banana (*Panagrellus redivivus*) and acetic nematodes (*Turbatrix aceti*), and rhabditis (*Rhabditis*), according to the classification of 2011 are related to the domain: eukaryote (*Eukaryota*), Kingdom: animals (*Animalia*), group: Bilaterians (*Bilateria*), Taxon: Protostomes (*Protostomia*), superphylum: (*Lophotrochozoa*), phylum: nematodes (*Nematoda* Rudolphi, 1808), class: *Chromadore* (Inglis, 1932), infraclass: *Plectia* (Hodda, 2007) [5, 16, 17].

Nematodes appeared in the Upper Carbonic, the last period of the Paleozoic era, which lasted about 360 – 300 million years ago [18, 19]. Today these worms exist in all of the known habitats [5, 20, 21]. First of all, they are often found in bottom deposits of reservoirs of all types of salinity, from the North to the South poles of the planet [17, 22, 23]. However, in addition to free-living nematodes, this class includes widespread parasites of plants, fish, birds, mammals and humans [16, 24, 25].

The total number of nematode species has not yet been determined by science. Thus, currently, more than 24 thousand species of parasitic and free-living nematodes have been described, but estimates of real diversity, based on the rate of description of new species (especially specialized insect parasites), give reason to believe that the total number of species is near one million [5, 18, 26, 27].

The body of nematodes is elongated, typical for worms, filamentous or elongated and fusoid, round on the cross section [28, 29]. It is covered with a strong and elastic

cuticle [5, 17]. Under it there is the muscular system with only by longitudinal fibers that do not form a full composite [21, 24]. They form four strands (lateral, dorsal and abdominal), divided into epithelial rolls. In the middle of the side rolls there are organs [16, 23]. Nematodes do not have circular muscular fibres, due to the appearance of a primary body cavity in these animals, which acts as a hydrostatic skeleton [10, 27].

Fig. 1. Structure of free-living nematodes: A — General view of the female; B — the tail end of the male body; 1 — head bristles; 2 — esophagus; 3 — nerve ring; 4 — cervical gland; 5 —intestine; 6 —sex glands; 7 — female genital opening; 8 —anus; 9 —tail glands; 10 — spicules; 11 — tail bristles.

A special feature of nematodes is that their muscle cells are elongated and oriented in one direction, and also form filamentous processes [16]. They approach the nerve cords and thus synchronize the processes of contraction and relaxation, allowing more complex movements [18]. Directly under the muscular system there is the archicoel, filled with liquid, without its own tissue lining (in contrast to the coelom) [23, 24]. All internal organs and their systems are in it [28].

The main part of nervous system of nematodes is nerve cords; abdominal cords are more developed and spinal ones are less developed; they are connected by semicircular webs or commissures [24]. In front of the body of these worms, at the head end, there is a circumpharyngeal nerve ring, which covers the front of the digestive tube (Fig. 4) [23, 28].

Fig. 4. Nervous system of free-living nematodes

Sense organs of nematodes are poorly developed [5, 29]. First of all, they include tactile tubercles or papillomas, which are located around the oral and anal openings in males, and help them navigating during mating [26]. In addition, at the head end of the body of nematodes organs of chemical senses or amphids, and primitive eyes in the form of pigment spots are concentrated [18, 29].

The digestive system of nematodes is a relatively complex structure. Thus, in their intestines there are three parts: anterior, middle and posterior. Anterior and posterior parts have ectodermal origin, middle one is endodermal [5, 16]. The anterior part or pharynx includes the oral cavity and esophagus [24, 30]. The mouth opening is surrounded by three lips and is located on the front end of the body. The cells of the esophagus secrete enzymes, which help in digesting food. The middle part of the intestine corresponds to the middle intestine, and the posterior part corresponds to the posterior intestine, which opens with the anus [23, 27].

The circulatory and respiratory systems are absent. The absorption of oxygen is carried out by the entire surface of the body. The epithelial cells contain hemoglobin [28, 30].

The excretory system is represented by lateral channels or rennet glands located in the epidermal side rolls. These channels merge in the front part of the body into one excretory duct opening behind the head end on the abdominal side [10, 24]. In addition, there are epidermal glands associated with the lateral excretory channels, first of all – cervical, and phagocytic cells or pseudocoelomocytes, which contact chamber fluid. In addition, ammonia can be released from the nematode body by diffusion through the body wall [17, 27].

The reproductive system of nematodes has a number of features. Thus, they are dioecious, and some species have sexual dimorphism [3, 9]. Among free-living nematodes there are both oviparous and viviparous species. The genitals of nematodes are paired tubes, while in females the bigeminy is preserved, and in males one of the tubes is reduced [23, 30]. Thus, the male reproductive system in the nematode is represented by a single seminal gland. The spermaducts are connected to the seminal bladder, which passes into the spermatic duct, opening into the posterior intestine. It contains a copulative bag with two bristles [24]. During mating, the bristles push the vaginal lumen apart, which facilitates the fertilization process. The female reproductive system is represented by two ovaries, merging into the oviducts, which, expanding, form two tubes of the uterus. They group together, resulting in a vagina that opens with an unpaired sexual opening on the abdominal side (Fig. 5) [2, 9, 23, 30].

Free-living nematodes retain mobility at temperatures from 10 degrees below zero to 30 degrees Celsius, but the optimal temperatures for the growth of their population are +22 – 23 °C [31, 32]. They prefer acidic reactions (pH 3.4 to 4.2) of the medium. They prefer the high level of humidity, but are able to withstand prolonged droughts, restoring their livelihoods after moistening. [33-35].

Fig. 5. Reproductive system of free-living nematodes, A – General view (next to the eggs) under a microscope; B – view in longitudinal section.

Banana nematode (*Panagrellus redivivus* or *Panagrellus nepenthicola*) is a small, 1.5 – 2.5 mm long, whitish, very motile nematode (Fig. 6) [5, 36].

Fig. 6. Banana nematode (*Panagrellus redivivus*)

It is characterized by sexual dimorphism; males are smaller than females, have a coiled tail [1, 3, 37]. It inhabits areas with excessive humidity: landfills, among decaying vegetation, in substrates with fermentation and even in the culture of other worms, such as pot worms (*Enchytraeidae*) [6, 7, 38].

Cultivation of banana nematode. Usually culture has 1 male per 4 females. At extinction of culture, there are only 2 females per 1 male. The average fecundity of *P. redivivus* females is 12 – 40 eggs. Until age 20 – 25 days they produce about 15 generations, approximately 300 individuals in each. At a temperature of 20°C, intrauterine development of eggs in banana nematodes lasts for 2 – 2.5 days [4, 39-42].

The substrate for the cultivation of *P. redivivus* is prepared from oatmeal or barley, cooked as porridge, or boiled vegetables. In both cases, it is desirable to add a little

milk, however, even without it the culture of banana nematodes turns out to be quite hardy [10, 30, 31].

The nutritional substrate for *P. redivivus* should be thick. In this case, its surface is quickly populated by banana nematodes, this rate prevents the development of concomitant microflora. In contrast, the liquid substrate is covered with a bacterial film at the end of the first day and the rate of worm culture development reduces [8, 11, 28]. The nutrient substrate of the desired consistency is obtained when brewing of one of the following products in 1 liter of boiling water: oatmeal (150 g), oat flour (200 g), feed oat (300 g) barley flour (250 g). All these products have to be boiled for 7-10 minutes, except for feed oats, which should be boiled for 40-50 minutes. In addition, boiled vegetables with the addition of a small amount of milk, soy peptone, casein, liver extract, vitamins can be used. The nutrient substrate is used cooled and thoroughly mixed [5, 32, 36, 38].

Prepared nutrient substrate should be put in a clean, dry cuvette with a layer thickness of 1-1.5 cm. After that, the stock culture of banana nematodes with an initial stocking density of 300 ind./cm² or 400 thousand individuals per cuvette is applied to its surface, which corresponds to 350-400 mg of pure culture per cuvette [4, 6, 31]. It should be noted that the rate of maturation and general state of culture of *P. redivivus* largely depends on the initial number of individuals. If the initial number of worms is small, a significant part of the nutrient substrate is quickly populated by various groups of microorganisms that liquefy and ferment it [43, 44].

Banana nematodes inhabit mainly the upper 5 mm layer of the substrate, during the period of active population growth it can be reduced to 2-3 mm. It was shown that a layer of nutrient substrate with a thickness of 10-15 mm is sufficient for the successful growth of *P. redivivus* (Fig. 7). When using a smaller layer, the substrate dries rapidly and it becomes necessary to transplant the banana nematode culture more often [7, 8, 45, 46].

Fig. 7. The culture of banana nematodes (*Panagrellus redivivus*)

Such reservoirs as a cuvette, made of any material (wood, glass, enameled, plastic and so on) can serve as reservoirs for cultivation of *P. redivivus* [11, 12]. Thus, for the mass breeding of banana nematodes, enameled cuvettes with a size of 30x40 cm, with a wall height of 4 cm are used. Each cuvette of this size requires 1.5–2 liters of nutrient substrate [7, 8, 10]. These cuvettes are covered with glass; a wet sponge is attached to its inner side. Glass protects the culture from drying out, and a wet sponge creates the necessary moisture. Cuvettes are placed on wooden racks (Fig. 8) [5, 36, 38].

Fig 8. Scheme of a cultivator for nematodes

Cultivation of banana nematode is usually carried out at a room temperature (20 – 25°C), but the best results are obtained at lower temperatures (7 – 10°C). In the latter case, biomass growth is somewhat slower, but *P. redivivus* culture remains in good state longer [46, 47]. This is explained by the fact that under such conditions there is no rapid development of microorganisms that liquefy the nutrient substrate after 15 days [28, 31].

The pH should be in the range of 3.5–4.5 (up to a maximum of 7.5) [30].

The maturing time of *P. redivivus* culture is easily determined by the appearance of clusters of banana nematodes on the walls of the cuvette and the glass covering it [12, 48].

Vinegar eelworm (*Turbatrix aceti* or *Anguillula aceti*) got its name because it is most common in unpasteurized vinegar. They feed on acetic acid bacteria. Nematodes can live in the acidic environment, pH of which ranges from 1.6 to 1.1. Generally, these nematodes live and breed under conditions of vinegar fermentation [5, 30, 48, 49]. The size of an adult is 1 – 2 mm (fig 9). The length of the esophagus is 1/9 the length of the whole body in females and 1/7 in males [50].

Fig. 3. Vinegar nematode (*Turbatrix aceti*)

Vinegar nematodes are dioecious, viviparous. Under a microscope, young individuals twisted in a spiral are clearly visible inside the females of *T. aceti*; their development lasts about 8 days [51, 52].

Cultivation of the vinegar nematode is quite simple, and can occur in two ways:

1) in cuvettes. The nutrient substrate is porridge-like oatmeal, oat flakes, soaked bread, grated boiled carrots, etc. [35, 37]. For the cultivation of *T. aceti*, enameled, glass or plastic cuvettes with a lid are used, which should be sterilized before use [53, 54]. On

the inner surface of their covers, a piece of sponge is attached, which is moistened in water, thus creating a moist environment in the cuvette. The cuvette is set in an inclined position, placing a plate under one corner [2, 8]. After that, in the lower part of the cuvette a nutrient substrate is added. Stock culture of vinegar nematodes is added to the surface of the nutrient substrate. After 2 – 4 days at a temperature of 20 – 22°C, these worms crawl out on wet areas of the walls and the substrate-free part of the bottom of the cuvette [3, 4, 55, 56]. There they are removed with a brush and placed in a glass of water for washing from the substrate. As the vinegar nematode breeds (after about 1 – 3 months), the nutrient substrate becomes liquid, which indicates the need to replace it [2, 5, 7];

2) in 3 L glass jars. One jar of this volume will need 1.5 liters of distilled water, 1.5 liters of vinegar, a small opaque plastic bag, a small apple. Vinegar should not be discolored or flavored [57, 58]. Distilled water and vinegar should be mixed to obtain 3 liters of 50/50 solution. Peeled and cut apple is added to the obtained solution. It is better to use a dense, not loose apple, so that its particles sink to the bottom, and do not float on the surface. After that, the jar is placed under bright lighting and after one–two weeks its content becomes cloudy from bacteria, which are the food for the vinegar nematode [35, 37]. At this stage, the stock culture of vinegar nematode is added to the jar and it is wrapped in a plastic bag, so that light does not get it. After 3 – 4 weeks of development at a room temperature in a shaded area, the culture will be suitable for use as food for juvenile fish. Such a culture can be used for many months without any care, except for darkness and, occasionally, adding an additional piece of apple [6, 58-60].

***Rhabditis* (*Rhabditis*)** is a very interesting genus biologically, as it is a good example of heterogony [30]. Namely, one generation of its members is dioecious and have dimorphism (i.e. males differ from females in appearance), it is free-living and was described under the name of *Rhabditis* and the other in the next generation, is hermaphroditic and leads a parasitic way of life. In the past, the latter has been described as an independent genus called *Rhabdonema* [61, 62].

Cultivation of rhabditis is carried out by two main methods:

1) With the substrate – in containers filled with garden soil or a mixture of chernozem soil (50%), sand (30%), peat and moss. On the surface of the substrate, a nutrient medium and the original culture are added, and then covered with glass. Worms are fed several times a week [4, 9, 59];

2) Without substrate – rhabditis are cultivated directly in medium without substrate [1, 2].

Densely cooked oatmeal, soaked bread, oatmeal, grated carrots, moistened flour, yogurt can serve as the nutrient medium [3, 6, 7].

With any recipe, sterility should be maintained, since the appearance of fungi makes the culture of rhabditis die [5, 60].

CONCLUSION AND PERSPECTIVES OF FURTHER DEVELOPMENT

Based on the above, it can be argued that the use of nematodes of genres *Panagrellus*, *Turbatrix* (*Anguillula*) and *Rhabditis* in fish farming is promising, in particular in feeding juveniles. This is due to the fact that they are not only a source of animal protein (100 g of nematode biomass contains 10.1 protein and 19.5 g of fat), but

also due to their size (they are much smaller than *Artemia nauplii* and *Cyclops*), allowing completely abandon the cultivation of ciliates. In addition, the use of nematodes in aquarium husbandry is especially convenient because they are able to live in water of different salinity up to 4 days and not reproduce. However, it should be noted that not all fish species react in the same way on nematodes in the aquarium – the best reaction is observed in such genres of the family *Poeciliidae* as guppies (*Poecilia reticulata*), moonfishes (*Xiphophorus*), mollie (*Poecilia sphenops*) and bellyfish (*Poecilia*).

Regarding the cultivation of the above-mentioned roundworms, it is quite simple and cost-effective, nematode cultures almost do not get sick and give a high increase in biomass under a wide range of environmental conditions. The basis of cultivation is the use of plastic cuvettes and a small amount of vegetables or cereals at room temperature and moderate lighting.

BIBLIOGRAPHY

1. Нематоды или микрокорм. URL: <http://www.aqualover.ru/fauna/nematode-worms.html> (дата обращения 16.01.2019).
2. Как самостоятельно разводить живой корм для аквариумных рыбок. URL: <https://pets2.me/bok/1212-kak-samostoyatelno-razvodit-zhivoy-korm-dlya-akvariumnyh-rybok.html> (дата обращения 16.01.2019).
3. Нематоды, укусная угрица, панагреллы, микрокорм. URL: <http://aquaplantfish.ru/kormlenie/nematoda/nematoda.htm> (дата обращения 16.01.2019).
4. Нематода — корм для рыб микрочервь. URL: http://aquarion.ru/view_post.php?id=535 (дата обращения 16.01.2019).
5. Basics of aquaculture and hydrobiotechnology / Fedonenko O. et al. // WSN. 2017. Vol. 88(1). P. 1—57.
6. Корм для аквариумных рыб: нематоды. URL: <http://gambusia.ru/2012/11/korm-dlya-akvariumnyh-ryb-nematody> (дата обращения 16.01.2019).
7. Нематоды (микрокорм). URL: http://aquariumistika.ru/?page_id=733 (дата обращения 16.01.2019).
8. Разведение нематоды в домашних условиях. Корм для мальков нематода. URL: <https://okorme.ru/korm/korm-dlya-malkov-nematoda.html> (дата обращения 16.01.2019).
9. Микулин А. Е. Живые корма. Москва : Дельфин, 1994. 104 с.
10. Технология культивирования живых кормов: краткий курс лекций для студентов 3 курса направления подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» / сост. Кияшко В. В. Саратов : Саратовский ГАУ, 2016. 26 с.
11. Моисеев Н. Н. Живые корма (выращивание и использование). Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет, 2003. 115 с.
12. Кокова В. Е. Непрерывное культивирование беспозвоночных. Новосибирск : Наука, 1982. 168 с.
13. Kahan D., Bar-El T. Free living nematodes as a dietary supplement in the rearing of fish fry and hatcheries // General Fisheries Council for the Mediterranean. Studies and Reviews. 1980. № 57. P. 67—78.
14. Nutrition and Feeding of Fish and Crustaceans / Guillaume J. et al. Chichester, Great Britain : Springer Praxis, 2001. 408 p.

15. Digestion of free-living nematodes fed to fish / Hofsten A. V. et al. // Journal of Fish Biology. 1983. № 23. P. 419—428.
16. Malakhov V. V. Nematodes: Structure, Development, Classification, and Phylogeny. Washington, DC : Smithsonian Institution Press, 1994. 286 p.
17. Соловьева Г. И., Васильева А. П., Груздева Л. И. Свободноживущие и фитопаразитические нематоды северо-запада СССР. Ленинград : Наука, 1976. 107 с.
18. Andrassy I. Evolution as a basis for the systematization of nematodes. San Francisco : Pitman Publishing, 1976. 573 p.
19. Фауна печер України / ред. Загороднюк І. І. Київ, 2004. 248 с.
20. Шевченко В. Л., Жиліна Т. М. Вплив антропогенного фактора на різноманіття фітонематод в ґрунті // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. 2012. С. 192—197.
21. Feeding habits on soil nematode families and genera – an outline for soil ecologists / Yeates G. W. et al. // Journal of Nematology. 1993. Vol. 25. P. 315—331.
22. Жиліна Т. М., Шевченко В. Л., Моніторинг стану популяцій фітонематод у природних та антропогенно трансформованих ценозах // Науковий вісник Ужгородського університету. 2012. Вип. 32. С. 135—139. (Серія : Біологія).
23. Lee D. L. The Biology of Nematodes. [S. l.] : CRC Press, 2002. 648 p.
24. Bird A. F., Bird J. The Structure of Nematodes. [S. l.] : Academic Press, 2012. 317 p.
25. Аквакультура / Козлов В. И. и др. Москва : КолосС, 2006. 445 с.
26. Sommer R. J., Streit A. Comparative genetics and genomics of nematodes: genome structure, development, and lifestyle // Annual Review Genetic. 2011. № 45. P. 1—20.
27. Wharton D. A. A Functional Biology of Nematodes. [S. l.] : Springer Science & Business Media, 2012. 192 p.
28. Окулова Ю. В., Окулов В. В. Аквариум для всех. Москва : Олма-Пресс, 2002. 175 с.
29. Boyd W. A., Williams P. L. Comparison of the sensitivity of three nematode species to copper and their utility in aquatic and soil toxicity tests // Environmental Toxicology Chemistry. 2003. № 22. P. 2768—2774.
30. Класс Нематоды, или Круглые черви – *Nematoda*. URL: http://www.internevod.com/rus/show/aq/info/04/kl_nematod.shtml (дата обращения 16.01.2019).
31. Lavens P., Sorgeloos P. Manual in the Production and Use of Live Food for Aquaculture // FAO Fisheries Technical Paper. Vol. 361. Rome, Italy : FAO, 1996. 305 p.
32. Власов В. А. Рыбоводство : учебное пособие. Санкт-Петербург : Лань, 2012. 352 с.
33. Рыжков Л. П., Кучко Т. Ю., Дзюбук И. М. Основы рыбоводства : учебник. Санкт-Петербург : Лань, 2011. 528 с.
34. Jones D. A., Yule A. B., Holland D. L. Larval nutrition // Advances in World Aquaculture. 1997. Vol. 6. P. 353—389.
35. Микрочерви нематоды – корм для мальков в аквариуме. URL: <https://www.aqa.ru/forum/mikrochervi-nematodyi---korm-dlya-malkov-v-akvariume-332136-page1> (дата обращения 16.01.2019).

36. Use of the nematode *Panagrellus redivivus* as an *Artemia* replacement in a larval penaeid diet / Biedenbach J. M. // Journal of the World Aquaculture Society. 1989. № 20. P. 61—71.
37. Микрочерви нематоды — корм для мальков в аквариуме. URL: <http://aquamegapedia.ru/3/mikrochervi-nematody-korm-dlya-malkov-v-akvariume> (дата обращения 16.01.2019).
38. Velu C. S., Munuswamy N. Nutritional evaluation of decapsulated cysts of fairy shrimp (*Streptocephalus dichotomus*) for ornamental fish larval rearing // Aquaculture Research. 2003. Vol. 34, iss. 11. P. 967—974.
39. Ferris H. The beer mat nematode, *Panagrellus redivivus*: a study of the connectedness of scientific discovery // Journal of Nematode Morphology & Systematic. 2009. № 12. P. 19—25.
40. Sex-specific mating pheromones in the nematode *Panagrellus redivivus* // Choe A. et al. // Proceedings of Natural Academician Science USA. 2012. № 109. P. 20949—20954.
41. The Draft Genome and Transcriptome of *Panagrellus redivivus* Are Shaped by the Harsh Demands of a Free-Living Lifestyle / Srinivasan J. et al. // Genetics. 2013. № 193(4). P. 1279—1295.
42. *Panagrellus redivivus* mass produced on solid media as live food for *Litopenaeus vannamei* larvae / Focken U. et al. // Aquaculture Research. 2006. № 37. P. 1429—1436.
43. Schlechtriem C., Focken U., Becker K. Digestion and assimilation of the free-living nematode *Panagrellus redivivus* fed to first feeding coregonid larvae: evidence from histological and isotopic studies // Journal of the World Aquaculture Society. 2005. № 36. P. 24—31.
44. The suitability of the free living nematode *Panagrellus redivivus* as live food for first-feeding fish larvae / Schlechtriem C. et al. // Journal of Applied Ichthyology. 2004. № 20. P. 161—168.
45. Mass produced nematodes *Panagrellus redivivus* as live food for rearing carp larvae. Preliminary results / Schlechtriem C. et al. // Aquaculture Research. 2004. № 35. P. 547—551.
46. Incorporation and metabolism of fatty acids by desaturation and elongation in the nematode *Panagrellus redivivus* / Schlechtriem C. et al. // Nematology. 2004. № 6. P. 783—795.
47. Hechler H. C. Reproduction, chromosome number, and postembryonic development of *Panagrellus redivivus* (Nematoda: Cephalobidae) // Journal of Nematology. 1970. № 2. P. 355—361.
48. Ells H. A., Read C. P. Physiology of the vinegar eel, *Turbatrix aceti* (Nematoda) // The Biological bulletin. 1961. Vol. 120. P. 326—336.
49. Studies on ageing in *Turbatrix aceti* / Kisiel M. J. et al. // Mechanisms of Ageing and Development. 1975. Vol. 4. P. 81—88.
50. Solieri L., Giudici P. Vinegars of the World. [S. l.] : Springer Science & Business, 2009. 300 p.
51. Fatty acid composition of *Turbatrix aceti* and its use in feeding regimes of *Coregonus maraena* (Bloch, 1779): is it really a suitable alternative to *Artemia* nauplii? / Hundt M. et al. // Journal of Applied Ichthyology. 2015. № 31(2). P. 343—348.
52. Krusberg L. R. Fatty acid composition of *Turbatrix aceti* and its culture medium // Comparison Biochemistry Physiology. 1972. Vol. 41. P. 89—98.

53. Разведение кормовых объектов в домашних условиях. URL: <http://aquafish-books.narod.ru/sekrety/08.html> (дата обращения 16.01.2019).
54. Разведение нематоды в домашних условиях. URL: <https://blog-akvariumista.ru/korm-dlya-rybok/razvedenie-nematody-v-domashnikh-usloviyakh.html> (дата обращения 16.01.2019).
55. Разведение уксусной нематоды. URL: <http://aquamegapedia.ru/2905/razvedenie-uksusnoj-nematody> (дата обращения 16.01.2019).
56. Нематода (микрочерви). Разведение. URL: <https://akvastv.jimdo.com> (дата обращения 16.01.2019).
57. Уксусные угрицы или нематоды (микрокорм). URL: <http://aquafisher.org.ua/acvarium/nematodyi/> (дата обращения 16.01.2019).
58. Микрокорм для личинок хвостатых земноводных. URL: <https://zooclub.ru/amfibii/soderzhanie/korm-dlja-lichinok-hvostatyh-amfibijs.shtml> (дата обращения 16.01.2019).
59. Нематоды. URL: <http://quarium.org.ua/korm-dlya-rib/132-nematodi> (дата обращения 16.01.2019).
60. Кормление аквариумных рыбок. URL: <http://www.petshealth.ru/pets/fish/carefull/food.php> (дата обращения 16.01.2019).
61. Grover C., Smart Jr., Nguyen K. B. *Rhabditis (Oscheius) pheropsophi* n. sp. (*Rhabditida: Rhabditidae*) // Journal of Nematology. 1994. № 26(1). P. 19—24.
62. *Rhabditis* Морфология. URL: <https://www.nies.go.jp/chiiki1/protoz/morpho/nematoda/n-rhabdi.htm> (дата обращения 16.01.2019).

REFERENCES

1. Nematody ili mikroform. *aqualover.ru*. Retrieved from <http://www.aqualover.ru/fauna/nematode-worms.html>.
2. Kak samostoyatel'no razvodit' zhivoy korm dlya akvariumnykh rybok. *pets2.me*. Retrieved from <https://pets2.me/bok/1212-kak-samostoyatelno-razvodit-zhivoy-korm-dlya-akvariumnykh-rybok.html>.
3. Nematody, uksusnaya ugritsa, panagrelly, mikroform. *aquaplantfish.ru*. Retrieved from <http://aquaplantfish.ru/kormlenie/nematoda/nematoda.html>.
4. Nematoda – korm dlya ryb, mikrocherv'. *aquarion.ru*. Retrieved from http://aquarion.ru/view_post.php?id=535.
5. Fedonenko, O., Marenkov, O., Sharamok, T., Kolesnik, N., Grygorenko, T., & Symon M. (2017). Basics of aquaculture and hydrobiotechnology. *WSN*, 88(1), 1-57.
6. Korm dlya akvariumnykh ryb: nematody. *gambusia.ru*. Retrieved from <http://gambusia.ru/2012/11/korm-dlya-akvariumnyx-ryb-nematody>.
7. Nematody (mikroform). *aquariumistika.ru*. Retrieved from http://aquariumistika.ru/?page_id=733.
8. Razvedenie nematody v domashnikh usloviyakh. Korm dlya mal'kov nematoda. *okorme.ru*. Retrieved from <https://okorme.ru/korm/korm-dlya-malkov-nematoda.html>.
9. Mikulin, A. E. (1994). *Zhivye korma*. Moskva: Del'fin.
10. Kiyashko, V. V. (Ed.). (2016). *Tekhnologiya kul'tivirovaniya zhivyykh kormov: kratkiy kurs leksiy dlya studentov 3 kursa napravleniya podgotovki 35.03.08 Vodnye bioresursy i akvakul'tura*. Saratov: Saratovskiy GAU.

11. Moiseev, N. N. (2003). *Zhivye korma (vyrashchivanie i ispol'zovanie)*. Novosibirsk: Novosibirsky gosudrstenyyni agrarnyi universitet.
12. Kokovaya, V. E. (1982). *Nepreryvnoe kul'tivirovanie bespozvonochnykh*. Novosibirsk: Nauka.
13. Kahan, D., & Bar-El, T. (1980). Free living nematodes as a dietary supplement in the rearing of fish fry and hatcheries. *General Fisheries Council for the Mediterranean*, 57, 67-78.
14. Guillaume, J., Kaushik, S., Bergot, P., & Metailler, R. (2001). *Nutrition and Feeding of Fish and Crustaceans*. Chichester, Great Britain: Springer Praxis.
15. Malakhov, V. V. (1994). *Nematodes: Structure, Development, Classification, and Phylogeny*. Washington, DC: Smithsonian Institution Press.
16. Hofsten, A. V., Kahan, D., Katznelson, R., & Bar-El, T. (1983). Digestion of free-living nematodes fed to fish. *Journal of Fisheries Biology*, 23, 419-428.
17. Solov'eva, G. I., Vasil'eva, A. P., & Gruzdeva, L. I. (1976). *Svobodnozhivushchie i fito-paraziticheskie nematody severo-zapada SSSR*. Leningrad: Nauka.
18. Andrassy, I. (1976). *Evolution as a basis for the systematization of nematodes*. San Francisco: Pitman Publishing.
19. Zahorodniuk, I. (Eds.). (2004). *Fauna pecher Ukrainy*. Kyiv.
20. Shevchenko, V. L., & Zhylyna, T. M. (2012). Vplyv antropohennoho faktora na riznomanittia fitonematod v grunti. *Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii*, 192-197.
21. Yeates, G. W., Bongers, T., de Goede, R. G. M., Freckman, D. W., & Georgieva, S. S. (1993). Feeding habits on soil nematode families and genera – an outline for soil ecologists. *Journal of Nematology*, 25, 315-331.
22. Zhylyna, T. M., & Shevchenko, V. L. (2012). Monitorynh stanu populiatsii fitonematod u pryrodnykh ta antropohenno transformovanykh tsenozakh. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriya: Biologiya*, 32, 135-139.
23. Lee, D. L. (2002). *The Biology of Nematodes*. CRC Press.
24. Bird, A. F., & Bird, J. (2012). *The Structure of Nematodes*. Academic Press.
25. Kozlov, V. I., Nikiforov, I. A., Nikishin, A. L., & Borodin V. I. (2006). *Akvakul'tura*. Moskva: KolosS.
26. Sommer, R. J., & Streit, A., (2011). Comparative genetics and genomics of nematodes: genome structure, development, and lifestyle. *Annual Review Genetic*, 45, 1-20.
27. Wharton, D. A. (2012). *A Functional Biology of Nematodes*. Springer Science & Business Media.
28. Okulova, Yu., V. & Okulov, V. V. (2002). *Akvarium dlya vsekh*. Moskva: Olma-Press.
29. Boyd, W. A., & Williams, P. L. (2003). Comparison of the sensitivity of three nematode species to copper and their utility in aquatic and soil toxicity tests. *Environmental Toxicology & Chemistry*, 22, 2768-2774.
30. Klass Nematody, ili Kruglye chervi – Nematoda. *internevod.com*. http://www.internevod.com/rus/show/aq/info/04/kl_nematod.shtml.
31. Lavens, P., & Sorgeloos, P. (1996). Manual in the Production and Use of Live Food for Aquaculture. *FAO Fisheries Technical Paper*, 361.
32. Vlasov, V. A. (2012). *Rybovodstvo*. Sankt-Peterburg: Lan'.
33. Ryzhkov, L. P., Kuchko, T. Yu., & Dzyubuk, I. M. (2011). *Osnovy rybovodstva*. Sankt-Peterburg: Lan'.

34. Jones, D. A., Yule, A. B., & Holland, D. L. (1997). *Larval nutrition. Advances in World Aquaculture*, 6, 353-389.
35. Mikrochervi nematody – korm dlya mal'kov v akvariume. *aqa.ru*. Retrieved from <https://www.aqa.ru/forum/mikrochervi-nematodyi---korm-dlya-malkov-v-akvariume-332136-page1>.
36. Biedenbach, J. M., Smith, L. L., Thomsen, T. K., & Lawrence, A. L. (1989). Use of the nematode *Panagrellus redivivus* as an *Artemia* replacement in a larval penaeid diet. *Journal of the World Aquaculture Society*, 20, 61-71.
37. Mikrochervi nematody – korm dlya mal'kov v akvariume. *aquamegapedia.ru*. Retrieved from <http://aquamegapedia.ru/3/mikrochervi-nematody-korm-dlya-malkov-v-akvariume>.
38. Velu, C. S., & Munuswamy, N. (2003). Nutritional evaluation of decapsulated cysts of fairy shrimp (*Streptocephalus dichotomus*) for ornamental fish larval rearing. *Aquaculture Research*, 34, 967-974.
39. Ferris, H. (2009). The beer mat nematode, *Panagrellus redivivus*: a study of the connectedness of scientific discovery. *Journal of Nematode Morphology & Systematic*, 12, 19-25.
40. Choe, A., Chuman, T., von Reuss, S. H., Dossey, A. T., Yim, J. J., Ajredini, R., Kolawa, A. A., et al. (2012). Sex-specific mating pheromones in the nematode *Panagrellus redivivus*. *Proceedings of Natural Academician Science of USA*, 109, 20949-20954.
41. Srinivasan, J., Dillman, A. R., Macchietto, M. G., Heikkinen, L., Lakso, M., Fracchia, K. M., Antoshechkin, I., et al. (2013). The Draft Genome and Transcriptome of *Panagrellus redivivus* Are Shaped by the Harsh Demands of a Free-Living Lifestyle. *Genetics*, 193(4), 1279-1295.
42. Focken, U., Schlechtriem, C., von Wuthenau, M., Garcia-Ortega, A., Puello-Cruz, A., & Becker, K. (2006). *Panagrellus redivivus* mass produced on solid media as live food for *Litopenaeus vannamei* larvae. *Aquaculture Research*, 37, 1429-1436.
43. Schlechtriem C., Focken U., & Becker K. (2005). Digestion and assimilation of the free-living nematode *Panagrellus redivivus* fed to first feeding coregonid larvae: evidence from histological and isotopic studies. *Journal of the World Aquaculture Society*, 36, 24-31.
44. Schlechtriem, C., Ricci, M., Focken, U., & Becker, K. (2004). The suitability of the free living nematode *Panagrellus redivivus* as live food for first-feeding fish larvae. *Journal of Applied Ichthyology*, 20, 161-168.
45. Schlechtriem, C., Ricci M., Focken U., & Becker, K. (2004). Mass produced nematodes *Panagrellus redivivus* as live food for rearing carp larvae. *Aquaculture Research*, 35, 547-551.
46. Schlechtriem, C., Tocher, D. R., Dick, J. R. & Becker, K. (2004). Incorporation and metabolism of fatty acids by desaturation and elongation in the nematode *Panagrellus redivivus*. *Nematology*, 6, 783-795.
47. Hechler, H. C. (1970). Reproduction, chromosome number, and postembryonic development of *Panagrellus redivivus* (Nematoda: Cephalobidae). *Journal of Nematology*, 2, 355-361.
48. Ells, H. A. & Read, C. P. (1961). Physiology of the vinegar eel, *Turbatrix Aceti* (Nematoda). *The Biological bulletin*, 120, 326-336.
49. Kisiel, M. J., Castillo, J. M., Zuckerman, L. S., Zuckerman, B. M., & Himmelhoch, S. (1975). Studies on ageing in *Turbatrix aceti*. *Mechanisms of Ageing and Development*, 4, 81-88.

50. Solieri, L., & Giudici, P. (2009). *Vinegars of the World*. Springer Science & Business Media.
51. Hundt, M., Brüggemann, J., Grote, B., Bischoff, A., Martin-Creuzburg, D., Gergs, R., & Buck, B. H. (2015). Fatty acid composition of *Turbatrix aceti* and its use in feeding regimes of *Coregonus maraena* (Bloch, 1779): is it really a suitable alternative to *Artemia* nauplii? *Journal of Applied Ichthyology*, 31(2), 343-348.
52. Krusberg, L. R. (1972). Fatty acid composition of *Turbatrix aceti* and its culture medium. *Comparison Biochemistry Physiology*, 41, 89-98.
53. Razvedenie kormovykh ob"ektov v domashnikh usloviyakh. *aquafish-books.narod.ru*. Retrieved from <http://aquafish-books.narod.ru/sekrety/08.html>.
54. Razvedenie nematody v domashnikh usloviyakh. *blog-akvariumista.ru*. Retrieved from <https://blog-akvariumista.ru/korm-dlya-rybok/razvedenie-nematody-v-domashnikh-usloviyakh.html>.
55. Razvedenie uksusnoy nematody. *aquamegapedia.ru*. Retrieved from <http://aquamegapedia.ru/2905/razvedenie-uksusnoj-nematody>.
56. Nematoda (mikrochervi). Razvedenie. *akvastv.jimdo.com*. Retrieved from <https://akvastv.jimdo.com>.
57. Uksusnye ugritsy ili nematody (mikrokorm). *aquafisher.org.ua*. Retrieved from <http://aquafisher.org.ua/acvarium/nematodyi>.
58. Mikrokorm dlya lichinok khvostatykh zemnovodnykh. *zooclub.ru*. Retrieved from <https://zooclub.ru/amfibii/soderzhanie/korm-dlja-lichinok-hvostatykh-amfibiy.shtml>.
59. Nematody. *quarium.org.ua*. Retrieved from <http://quarium.org.ua/korm-dlya-rib/132-nematodi>.
60. Kormlenie akvariumnykh rybok. *petshealth.ru*. Retrieved from <http://www.petshealth.ru/pets/fish/carefull/food.php>.
61. Grover, C., Smart, Jr., & Nguyen, K. B. (1994). *Rhabditis (Oscheius) pheropsophi* n. sp. (*Rhabditida: Rhabditidae*). *Journal of Nematology*, 26(1), 19-24.
62. *Rhabditis* Morfology. *nies.go.jp*. Retrieved from <https://www.nies.go.jp/chiiki1/protoz/morpho/nematoda/n-rhabdi.htm>.

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 32-47
DOI: 10.15407/fsu2019.03.032
UDC 004:591.5:612:616-006

Received 13.07.19
Received in revised form 28.07.19
Accepted 24.08.19

FISH INFORMATION DATABASES CONSTRUCTION: DATA PREPARATION AND OBJECT-ORIENTED SYSTEM ANALYSIS

O. Klyuchko, kelenaxx@ukr.net, Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology NAS of Ukraine, Kyiv

L. Buchatsky, irido1@bigmir.net, Institute of Fisheries NAAS of Ukraine, Kyiv

O. Melezhyk, o_melezhyk@ukr.net, Open International University of Human Development "Ukraine", Kyiv

Purpose. The purpose of the work was to demonstrate the applications of methods of database construction on the example of information about rainbow trout and viral infections affecting it. In process of such databases construction for electronic information systems it is necessary to find the ways of biological data preparation for each of solved tasks, than to make an adequate processing of these input data. Further step is the use of the methods of object-oriented system analysis for the aforementioned database construction in optimal way.

Methodology. The methods of object-oriented system analysis, ER-diagram design, and the methods of computer databases construction were used in process of present work fulfillment.

Findings. At the initial stage of the work some fish databases known in the world were observed. The peculiarities of biological objects (fishes) that have to be taken into account for this task fulfillment were analyzed. Further the approach of object-oriented analysis for constructing of computer databases in optimal manner was suggested. The first logical steps of algorithm for construction of databases with relative information about fish were described as well the practical recommendations for the development of databases with information concerning domestic biological organisms (on example of rainbow trout, its viral infection) for electronic information systems were done.

Originality. No large-scale implementation of contemporary information-computer technologies in Ukraine was done yet. The obtained results would be contributed to further intensive implementation of contemporary information technologies for the development of domestic fishery industry.

Practical value. Rainbow trout is important specie for fishery economy; its studying as well as viral infections affecting it are of great value for food safety. Information computer technologies application suggested in the work would make this branch of economy more effective in Ukraine and in the whole world.

Keywords: fish, fishery economy, trout, databases, electronic information systems object-oriented system analysis.

КОНСТРУЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ РИБ: ПІДГОТОВКА ДАНИХ І ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

О. М. Ключко, kelenaxx@ukr.net, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. М.В. Кавецького НАН України, м. Київ

Л. П. Бучацький, irido1@bigmir.net, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

О. В. Мележик, o_melezhyk@ukr.net, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

© О. Klyuchko, L. Buchatsky, O. Melezhyk, 2019

Мета. Мета роботи — продемонструвати застосування методів створення бази даних риб на прикладі інформації про райдужну форель та вірусні інфекції, що її уражують. У процесі конструювання таких баз даних для електронних інформаційних систем необхідно визначити шляхи підготовки біологічних показників для кожного з вирішуваних завдань, надалі здійснити адекватну обробку цих вхідних даних. Наступним кроком є застосування методів об'єктно-орієнтованого системного аналізу для побудови біологічної бази даних оптимальним чином.

Методика. У процесі виконання робіт використано методи об'єктно-орієнтованого системного аналізу, проектування ER-діаграм, методи конструювання комп'ютерних баз даних.

Результати. На початковому етапі було виконано огляд низки відомих у світі баз даних риб. Проаналізовано особливості біологічних об'єктів (риб), які необхідно враховувати при конструюванні баз даних. Надалі запропоновано підхід об'єктно-орієнтованого аналізу для конструювання комп'ютерних баз даних оптимальним чином. Описано перші логічні етапи алгоритму конструювання баз даних з відповідною інформацією, а також практичні рекомендації з розробки баз даних з інформацією про вітчизняні біологічні організми (на прикладі райдужної форелі, її вірусних інфекцій) для електронних інформаційних систем.

Наукова новизна. Масштабне впровадження сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій на основі біологічних баз даних в Україні ще не здійснено. Отримані результати сприятимуть подальшому інтенсивному впровадженню сучасних інформаційних технологій для розвитку вітчизняної рибної промисловості.

Практична значимість. Райдужна форель є цінним об'єктом для рибного господарства; дослідження її особливостей та вірусних інфекцій, що її уражують, мають суттєве значення для продовольчої безпеки. Застосування інформаційних комп'ютерних технологій, запропонованих у роботі, зробить цю галузь економіки в Україні та світі більш ефективною.

Ключові слова: риба, рибне господарство, форель, бази даних, електронно-інформаційні системи, об'єктно-орієнтований системний аналіз.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ РЫБ: ПОДГОТОВКА ДАННЫХ И ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Е. М. Ключко, kelenaXX@ukr.net, Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. М.В. Кавецкого НАН Украины, г. Киев

Л. П. Бучацкий, irido1@bigmir.net, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

О. В. Мележик, o_melezhnyk@ukr.net, Открытый международный университет развития человека «Украина», г. Киев

Цель. Цель работы — продемонстрировать применение методов создания базы данных рыб на примере информации о радужной форели и поражающих ее вирусных инфекциях. В процессе конструирования таких баз данных для электронных информационных систем необходимо определить пути подготовки биологических показателей для каждого решаемого задания, в дальнейшем осуществить адекватную обработку этих входных данных. Следующий шаг — это применение объектно-ориентированного системного анализа для построения биологической базы данных оптимальным образом.

Методика. В процессе выполнения работы использованы методы объектно-ориентированного системного анализа, проектирование ER-диаграмм, методы конструирования компьютерных баз данных.

Результаты. На начальном этапе был выполнен обзор ряда известных в мире баз данных рыб. Проанализированы особенности биологических объектов (рыб), которые необходимо учитывать при конструировании баз данных. Далее предложен подход объектно-

ориентированного анализа для конструирования компьютерных баз данных оптимальным образом. Описаны первые логические этапы алгоритма конструирования баз данных с соответствующей информацией, а также практические рекомендации по разработке баз данных с информацией об отечественных биологических объектах (на примере радужной форели, ее вирусных инфекций) для электронных информационных систем.

Научная новизна. Масштабное внедрение современных информационно-компьютерных технологий на основании баз данных в Украине еще не осуществлено. Полученные результаты будут способствовать дальнейшему интенсивному внедрению современных информационных технологий для развития отечественной рыбной промышленности.

Практическое значение. Радужная форель является ценным объектом для рыбного хозяйства; исследование ее особенностей и поражающих ее вирусных инфекций имеет существенное значение для продовольственной безопасности. Использование информационных компьютерных технологий, предложенных в работе, сделает эту сферу экономики в Украине и мире более эффективной.

Ключевые слова: рыба, рыбное хозяйство, форель, базы данных, электронно-информационные системы, объектно-ориентированный системный анализ.

PROBLEM STATEMENT AND ANALYSIS OF THE LAST STUDIES AND PUBLICATIONS

Biodiversity of species is a beautiful treasure that the Nature gave us. However during the last two decades, the development of information and computer technology (ICT) gives us a possibility not to understand only the beauty and grandeur of biodiversity, but also to display them in adequate numerical characteristics, to organize vast amounts of information about living organisms in databases that allow this information automatic processing. Respectively, the possibility of the new methods of science-intensive economy organization, its control, the account of biological organisms for the purpose of their protection, and etc. appeared with ICT development. In addition to the reports, tables, lists of species in the past, that biologists of previous generations prepared carefully that play an important role in conservation measures, pest control, increase of productivity and prevent starvation of the population, modern ICTs offer new methods and tools. One of the important sets of such ICT methods is the development of databases (DB) of living organisms with further their connection to electronic information systems (ICs).

In our previous publications, we have already written about the development of such ICs with DB in Ukraine for fishes [1] and arthropods [2, 3, 24]. We set ourselves the goal to contribute to the development of living organisms databases in Ukraine (and, first of all, fish DB), linked with ISs that visualized DB in the Internet. The development of IS with DB of living organisms (including fishes) is becoming more popular and more widespread in the world today [4-23]. However, the electronic databases of organisms developed by the inhabitants of each country who knows local fauna and the most interested in such ISs have the greatest value [24]. Therefore, in our own work we based, first of all, on fish research of contemporary scientists of Ukraine [25-41, 52, 58]. In previous publications our experience of DBs construction for biology is disclosed [42-51] as well as the achievements of other professionals in DBs construction was also studied during this work [55-57]. In one of our previous articles the authors have already published the results of some theoretical generalizations of the first stages of fishes' DB development [1]. Present work is its continuation with the practical recommendations for application of previously described methods of the DB development.

An overview of some foreign fish databases. Fishery industry is an important component of economies in many countries of the world. That is why successful experience on the development of fish databases exists already (industrial DBs and high-quality amateur DBs) [4-23]. A brief review of some fish databases we have already given [1]. In present work we would like to continue the works in this direction on example of rainbow trout, and to add more material about word fish databases.

“FishTraits Database” is known in the world database [22]. It was written that “the need for integrated and widely accessible sources of species traits data to facilitate studies of ecology, conservation, and management has motivated development of traits databases for various taxa. In spite of the increasing number of traits-based analyses of freshwater fishes in the United States, no consolidated database of traits of this group exists publicly, and much useful information on these species is documented only in obscure sources. The largely inaccessible and unconsolidated traits information makes large-scale analysis involving many fishes and/or traits particularly challenging”. Characterizing this DB the authors gave the following information: “FishTraits is a database of more than 100 traits for 809 (731 native and 78 exotic) fish species found in freshwaters of the conterminous United States, including 37 native families and 145 native genera. The database contains information concerning four major categories of traits: (1) trophic ecology, (2) body size and reproductive ecology (life history), (3) habitat associations, and (4) salinity and temperature tolerances. Information on geographic distribution and conservation status is also included. Together, we refer to the traits, distribution, and conservation status information as attributes. Descriptions of attributes are available here. Many sources were consulted to compile attributes, including state and regional species accounts and other databases.

FishTraits provides many opportunities for conducting research on fish species traits and constitutes the first step toward establishing a central repository for a continually expanding set of traits and species of North” [22].

“SalmonDB” is another important new multiorganism database [23] containing the information about fishes’ genome sequences, for example, EST sequences from *Salmo salar*, *Oncorhynchus mykiss* and the whole genome sequence of *Danio rerio*, *Gasterosteus aculeatus*, *Tetraodon nigroviridis*, *Oryzias latipes* and *Takifugu rubripes*, built with core components from GMOD project, GOPArc system and the BioMart project. The information provided by this resource includes Gene Ontology terms, metabolic pathways, SNP prediction, CDS prediction, orthologs prediction, several precalculated BLAST searches and domains. SalmonDB also provides a BLAST server for matching user-provided sequences to any of the databases and an advanced query tool (BioMart) that allows easy browsing of EST databases with user-defined criteria. These tools make SalmonDB database a valuable resource for researchers searching for transcripts and genomic information regarding *S. salar* and other salmonid species. The database is expected to grow in the near future, particularly with the *S. salar* genome sequencing project [23].

DEFINING OF PARTS OF THE PROBLEM THAT WERE NOT SOLVED BEFORE. THE PURPOSE OF THE WORK

In process of fish computer databases construction for electronic information systems it is necessary to find the ways of biological data preparation for each of solved tasks, than to make an adequate processing of these input data. Further it is necessary to

use the methods of object-oriented system analysis for the successful construction of biological database in optimal way and among them – the method of design of ER-diagram as result of analysis of the future DB content organization. Below the authors will demonstrate all of these methods applications on the example of database with the data about rainbow trout, its' viral infections, and virus carrier.

MATERIALS AND METHODS

The methods of analysis of objects, potentially suitable for ordering in database, object-oriented system analysis, ER-diagram design, and the methods of computer databases construction were used in process of the work fulfillment.

RESULTS OF THE STUDIES AND THEIR DISCUSSION

Features of biological objects that are important for databases construction. Lets consider some important features of biological objects that are necessary to take into account for databases construction [53]. From the very beginning of the practice of biological data processing it was noted that during the application of information technologies/computer technologies (IT/CT) in the field of biology it was necessary to remember the following features of the objects of nature, which complicate the computer processing of data and results. First of all, it was necessary to concentrate our attention on the problem of complexity of biological objects, which had several reasons.

1. The first of the reasons - *objective* - is the complexity of biological organisms by itself. After all, there are millions of species on the Earth that are characterized by great variability of individual organisms, populations, and so on. The species have complex chemistry, physiology, developmental cycles and behavior, which are the result of millions of years of evolution. There are hundreds, if not thousands of ecosystems, in which many species are inked between themselves with a large number of complex relationships.

2. The second reason of the complexity is a *subjective* one. Since ecosystems are located in different territories of different countries, they often interfere with the interests of different groups of people: scientific, economic, commercial, others; and this is reflected on the process their data registration for future DB. Observational data obtained in different ecosystems often differ in precision and accuracy; they are made in different meteorological or geographical conditions. Many of these observations (often valuable) were made by amateurs. It is clear that all such field data observations and experiments when creating electronic databases should be formalized, unified and standardized.

If to speak about genetic material that characterizes certain types of ecosystems, then obtained data are really accurate, meet generally accepted standards and they are often the ideal material for development of electronic databases and ISs. The ambiguity arises when IT professional during his work must match these exact data, for example, with the name of the type. But the fullness of the names of the kinds of humanity still does not exist; the systematic of species is constantly revised, the evolutionary changes of organisms happen constantly, and many species on the Earth still have no names... This situation complicates greatly the use of IT/CT in biology.

The application of IT/CT in biology is complicated also the fact that most of the

existing computer methods were developed for certain conditions, certain tasks, limited time periods. In reality, scientists deal with evolution, processes that are developing during hundreds and thousands of years, organisms that consist of billions of molecules. To solve such problems the standard methods do not exist yet, they need to be invented and developed. With simple transfer of the already developed techniques or precise discipline methods a large amount of valuable biologic information is lost.

A particular problem is the digitization of biological data accumulated over the centuries; all modern biological knowledge is based on such digitalization. So, even in the United States on 2001, where the biological data digitalization was initiated, it was necessary to digitize information on more than 750 million biological species [53]. So, this task needs to be solved globally, despite the fact that it is extremely labour-intensive.

This is only a brief list of biological objects specific characteristics that are need to be taken into account during the biological databases development. Additional list of such specific for biological objects characteristics is given in our articles [2, 3, 24].

Fig. 1. Hierarchic classification of *Oncorhynchus mykiss* (Walbaum, 1792)

Object-oriented programming and hierarchical model of biological objects. Hierarchy of objects is one of cornerstones of object-oriented programming. From the other side, hierarchical model is an extremely important model of objects organization and classification in living Nature [24, 54]. Similarity of these two ideas is a great philosophic problem, but now we are interested in possibility how to use it and other object-oriented programming approaches for the construction of databases with information about biological objects (Fig. 1).; and such databases have to be as more adequate as possible to biological objects hierarchy in the Nature. On Fig. 1 we have

represented hierarchical scheme of rainbow trout - *Oncorhynchus mykiss* (Walbaum, 1792) that belongs to the animals from *Eukaryota* Domain (according to Linne classic hierarchical scheme [54]).

Approach of Object Oriented Analysis (OOA) for analyzing and constructing of models. OOA methods enable to construct the DB with optimal characteristics. This is really important because 1) numerical recordings of DB need great volumes of computer memory and if not to optimize DB structure from the very beginning it cause great memory losses with time; 2) some sectors of DB may be accessible ONLY being linked through the “keys” after OOA and ER-diagram development. In general, OOA is a method, which provides simulation of *object model* (OM) and formation of requirements for subject space (SbS) by means of a notion “entity-relationship ER”, specification of data streams and related processes [55-57].

Analysis of SbS is carried out using object-oriented methods and corresponding standards. The ultimate objective of the object-oriented analysis of SbS is the *definition* of the *object model* (OM) with the help of selected objects, the relations between them and their properties and characteristics. For analytical design of objects, their attributes and relations between them the scheme called ER-diagram was developed. On Fig. 2 we have depicted ER-diagram for the abstract objects “Fish”, “Virus”, and “Carrier” of this virus.

It means that in our investigation we united in linked databases the information about fishes (for example, about the rainbow trout *Oncorhynchus mykiss*), viruses that are the reasons of *O.mykiss* diseases, and organisms-carriers of these viruses. For example, for *O.mykiss* it is known that they have such virus diseases: viral hemorrhagic septicemia, trout infectious anemia, infectious necrosis of salivary hematopoietic tissue, herpesvirus disease of salmon, and etc., which are characterized by the high mortality of fishes that causes significant economic losses to world aquaculture.

At the next step we have to describe at one scheme these 3 objects (trout – virus - virus carrier) with all their important characteristics and relations between objects. Such scheme one could see on Fig. 2, that is “ER-diagram” for the fish “Rainbow trout”. It is necessary to mention that these three objects for our database we picked up on the base of experimental results. In these experiments two groups of fishes were in the pool: salmon and trout [58]. Both species became sick after they had been infected by alfavirus; and *Talitrus saltator* was the carrier for this alfavirus [58].

ER-diagram description. *Objects* here are the nouns, the main entities, information about them have to be included into the DB (rectangles): fish, virus, and virus carrier. *Attributes* there are object characteristics, necessary for object description (ovals): Latin name, native name, location of living, and etc. *Relations* (rhombus) here mean links that unite the objects if they are logically linked (for example, “trout” is infected by “virus”). Important characteristics of the relations between objects are the “Power of relation” (Fig. 3). If one fish species is infected by one virus strain the “power of relation” is 1:1. Similarly, if 1 specie of carrier carries 1 virus strain the “power of relation” is 1:1. But if “M species of fishes were infected by N strains of viruses” “power of relation” is M:N and so on. More about the art of DB construction one can read in [1, 2, 3, 24].

Fig. 2. Fragment of ER-diagram «Rainbow Trout *Oncorhynchus mykiss* and Its Virus Diseases»

2. a. Fragment of ER-diagram (explanations see in text). Points indicate that there are more attributes depending on the task.
2.b. Symbolic denotation of objects, relations and attributes at the scheme.

ER-diagram was designed on the base of results of experiment with two groups of fishes in the pool: salmon and trout. Both species became sick after they had been infected by alfavirus; and *Talitrus saltator* was the carrier of this alfavirus [58].

Fig. 3. Power of relations between the 3 objects during the database elaboration.

Above: "M : N" - "many-to-many". In this example, this means:

"M species of fishes were infected by N strains of viruses" [1]

Below: "1 : 1" - "one-to-one". In this example, this means:

"1 specie of carrier carries 1 strain of virus"

CONCLUSIONS AND PROSPECTS OF FURTHER DEVELOPMENT

At the beginning of this article we observed some fish databases known in the world. Than the peculiarities of biological objects that have to be taken into account during DB construction were analyzed. Further the approaches of object-oriented analysis for DB construction in optimal manner were suggested. The first logical steps of algorithm of DB with information about fish (trout) development have been described as well. At this step of DB construction some practical recommendations for the development of databases with information about domestic biological organisms for electronic information systems may be done: maximal accuracy in data mining, standardization of input data about fishes, using of approach of object-oriented system analysis with further ER-diagram designing, and so on.

It is necessary to emphasize the originality of results in the present article. No large-scale implementation of contemporary information-computer technologies in Ukraine was done yet and our findings described in the article will contribute to further intensive development of fishery industry here.

We would like to hope that practical implementation of our work results will have good prospects in Ukraine. Rainbow trout is important specie for fishery economy; it and its viral infections affecting it are of great value for food safety. Information computer technologies applying suggested in the present article, will make this sphere of economy more effective in Ukraine and in the whole world.

BIBLIOGRAPHY

1. Klyuchko O. M., Buchatsky L. P., Melezhyk, O. V. Biological databases construction using object-oriented system analysis // *Biotechnol. Acta*. 2019. Vol. 12 (3). P. 5—22.
2. Klyuchko O. M., Klyuchko Z. F. Electronic databases for Arthropods: methods and applications // *Biotechnol. Acta*. 2018. Vol. 11 (4) P. 28—49. <https://doi.org/10.15407/biotech11.04.028>.
3. Klyuchko O. M., Klyuchko Z. F. (2018). Electronic information systems for monitoring of populations and migrations of insects. *Biotechnol. acta*. 2018. Vol.

- 11 (5). P. 5—25. <https://doi.org/10.15407/biotech11.05.005>.
4. Duan Y., Fu Z., Li D. Toward Developing and Using Web-based Tele-Diagnosis in Aquaculture // Expert System ith Applications. 2003. Vol. 25 (2). P. 247—254.
5. Creation of Information retrieval systems on collections of marine animals (fishes and invertebrates) in the Zoological Institute of RAS / Smirnov I. S. et al. // Sixth National Russian Research Conference RCDL'2004, Pushchino, September 29 - October 1, 2004 : proceed. Moscow, 2004. P. 30—33.
6. FVD: The fish-associated virus database / Chen Y. et al. // Infect Genet. 2018. Vol. 58. P. 23—26. doi: 10.1016/j.meegid.2017.11.004.
7. Crane M., Hyatt A. Viruses of fish: an overview of significant pathogens // Viruses. 2011. Vol. 3 (11). P. 2025—2046. doi: 10.3390/v3112025.
8. Zhang Q., Gui J. F. Virus genomes and virus-host interactions in aquaculture animals // Sci. China Life Sci. 2015. Vol. 58 (2). P. 156—169. doi: 10.1007/s11427-015-4802-y.
9. Using eDNA to biomonitor the fish community in a tropical oligotrophic lake / Valdez-Moreno M. et al. // PloS One. 2019. Vol. 14 (4). e0215505. doi: 10.1371/journal.pone.0215505.
10. Differentiation and Authentication of Fishes at Species Level Through Analysis of Fish Skin by MALDI TOF MS / Bi H. et al. // Rapid Commun. Mass. Spectrom. 2019. doi: 10.1002/rcm.8474.
11. User Reference for Fisheries Improvement ProjectsDatabase (FIP-DB) and Query Viewer. URL: <https://ru.scribd.com/document/385739269/Readme-File-for-FIP-DB#download> (accessed: 01.08.2019).
12. Froese R., Pauli D. FishBase 2000: Concepts, designs and data sources. Los Banos, Philippines : ICLARM, 2000.
13. Moreau J., Costa-Pierce B. Introduction and present status of exotic carp in Africa // Aquacult. Res. 1997. Vol. 28. P. 717—732.
14. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to food security and nutrition for all. Rome : FAO, 2016. 200 p. URL: <http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf> (accessed: 01.08.2019).
15. Effects of Global Climate Change on Marine and Estuarine Fishes and Fisheries / Roessig J. M. et al. [S. l.] : Springer, 2004.
16. A Global Information System on Fishes. URL: <https://www.fishbase.se/home.htm> (accessed: 01.08.2019).
17. A database of fish biotransformation rates for organic chemicals / Arnot J. A. et al. // Environmental Toxicology and Chemistry. 2008. Vol. 27 (11). P. 2263—2270. URL: <https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1897/08-058.1>. doi: 10.1897/08-058.1 (accessed: 01.08.2019).
18. A global database on freshwater fish species occurrence in drainage basins / Tedesco P. A. et al. // Sci. Data. 2017. Vol. 4. 170141. doi: 10.1038/sdata.2017.141.
19. Van der Laan R., Eschmeyer W. N., Fricke R. Family-group names of Recent fishes // Zootaxa Monograph. 2014. Vol. 3882 (1). P. 1—230. doi:10.11646/zootaxa.3882.1.1.
20. Fricke R., Eschmeyer W. N., van der Laan R. Eschmeyer's catalog of fishes: genera, species. 2019. URL: <http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog> (accessed: 01.08.2019).
21. Zeldis D., Prescott S. Fish disease diagnosis program—Problems and some solutions // Aquacultural Engineering. 2000. Vol. 23 (1—3). P. 3—11.

22. Daoliang Li, Zetian Fu, Yanqing Duan. (2002). Fish-Expert: a web-based expert system for fish disease diagnosis // Expert Systems with Applications. 2002. Vol. 23. P. 311—320.
23. Frimpong E. A., Paul L. Welcome to the FishTraits Database. URL: <http://www.fishtraits.info> (accessed: 01.08.2019).
24. SalmonDB: a bioinformatics resource for *Salmo salar* and *Oncorhynchus mykiss*. Database / Di Génova A. D. et al. Oxford, 2011: bar050. doi: 10.1093/database/bar050. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3225076> (accessed: 01.08.2019).
25. Ключко О. М. Інформаційно-комп'ютерні технології в біології та медицині. Київ : НАУ-друк, 2008. 282 с.
26. Майстренко М. І., Рудь Ю. П., Бучацький Л. П. Накопичення вірусу інфекційного панкреатичного некрозу на культурах клітин риб // Біологія тварин. 2014. Т. 16, № 4. С. 93—99.
27. Matvienko N. M., Buchatsky L. P. The use of immunomodulating preparations in fish farming // Modern problems of theoretical and practical ichthyology. 2014. P. 33—35 (In Ukrainian).
28. New hosts of the third-type of carp herpes virus (CyHV-3) / Gavrilova I. P. et al. // Scientific notes of the Ternopil Ped. University. Series Biology. 2014. Vol. 58 (1). P. 16—20 (In Ukrainian).
29. Maistrenko M. I., Buchatsky L. P. (2014). Biology of Herpesvirus Fish // Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology. 2014. Vol. 3 (123). P. 19—35 (In Ukrainian).
30. Experimental infection of long-winded cancer (*Pontastacus leptodactylus*) with virus of infectious pancreatic necrosis / Rud Yu. P. et al. // Bulletin of Biology and Medicine. 2014. Is. 4, 1 (113). P. 70—74 (In Ukrainian).
31. Matvienko N., Rud Yu., Buchatsky L. (2014). Replication of infectious pancreatic necrosis virus in different cell lines and organism of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) fingerlings // Arch. Pol. Fish. 2014. Vol. 222. P. 127—133.
32. Matvienko N. M., Buchatsky L. P. Study of reproduction of hemorrhagic septicemia trout virus // Bulletin of Problems of Biology and Medicine. Is. 2 (3). P. 118—121 (In Russian).
33. Matvienko N. M., Buchatsky L. P., Deriabin O. M. Application of a reverse transcriptase polymerase chain reaction for the detection and identification of the virus of infectious pancreatic necrosis of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) // Microbiology and biotechnology. 2013. Vol. 4 (24). P. 46—54 (In Ukrainian).
34. Characteristics of spring viraemia of carp virus strains isolated in different regions of Ukraine / Matvienko N. et al. // Zoology and Ecology. 2013. Vol. 23 (3). P. 198—202.
35. Matvienko N., Rud Y., Buchatsky L. (2013). Replication of infectious pancreatic necrosis virus in different cell lines and organism of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) fingerlings // Archives of Polish Fisheries. 2013. Iss. 4. P. 127—133.
36. Rud Yu. P., Maistrenko M. I., Buchatsky L. P. (2013). Amplification and analysis of the nucleotide sequence of VP2 TA NS IPNV genes isolated in Western Ukraine // Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology. 2013. Vol. 4 (118). P. 34—40 (In Ukrainian).
37. Штам герпесвірусу кої (KHV) ІМВ V-4 для отримання вакцини проти вірусу герпесу кої : пат. 79945 Україна. № u201212254 ; заявл. 26.10.2012 ; опубл. 13.05.2013, Бюл. № 9.

38. Rud Yu., Maistrenko M., Buchatsky L. Isolation of IPNV from wild-life rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) in Western Ukraine // *Biology*. 2013. Vol. 3 (65). P. 63—65.
39. Identification of virus SyNV-3 by the methods of electron microscopy and polymerase chain reaction / Maistrenko M. I. et al. // *Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine*. 2013. Vol. 4. P. 139—143 (In Ukrainian).
40. Results of surveillance studies of infectious fish diseases in freshwater aquaculture of Ukraine / Matvienko N. M. et al. // *Agricultural science and practice*. 2015. Vol. 2 (2). P. 32—38.
41. Rud Y. P., Buchatsky L. P. Detection of infectious pancreatic necrosis virus in the western Ukraine // *Virologica sinica*. 2015. Vol. 30 (2). P. 1—4.
42. Movchan Yu. V. Fishes of Ukraine (taxonomy, nomenclature, remarks) // *Collection of works of Zoological Museum*. 2009. Vol. 40. P. 47—87.
43. Спосіб проведення моніторингу впливу хімічних речовин на біоорганізми у кількох інтервалах часу пат. 134575 Україна. № u201812443 ; заявл. 14.12.2018 ; опубл. 27.05.2019, Бюл. № 10.
44. Klyuchko O. M. On the mathematical methods in biology and medicine // *Biotechnol. Acta*. 2017. Vol. 10 (3). P. 31—40. <https://doi.org/10.15407/biotech10.03.031>.
45. Klyuchko O. M. Application of artificial neural networks method in biotechnology // *Biotechnol. Acta*. 2017. Vol. 10 (4). P. 5—13. <https://doi.org/10.15407/biotech10.04.005>.
46. Klyuchko O. M. Cluster analysis in biotechnology // *Biotechnol. Acta*. 2017. Vol. 10 (5). P. 5—18. <https://doi.org/10.15407/biotech10.05.005>.
47. Klyuchko O. M., Onopchuk Yu. M. Some trends in mathematical modeling for biotechnology // *Biotechnol. Acta*. 2018. Vol. 11 (1). P. 39—57. <https://doi.org/10.15407/biotech11.01.039>.
48. Klyuchko O. M. Electronic information systems in biotechnology // *Biotechnol. Acta*. 2018. Vol. 11 (2). P. 5—22. <https://doi.org/10.15407/biotech11.02.005>.
49. Klyuchko O. M. Information computer technologies for biotechnology: electronic medical information systems // *Biotechnol. Acta*. 2018. Vol. 11 (3). P. 5—26. <https://doi.org/10.15407/biotech11.03.005>.
50. Klyuchko O. M. Expert systems for biology and medicine // *Biotechnol. Acta*. 2018. Vol. 11 (6). P. 5—28. <https://doi.org/10.15407/biotech11.06.005>.
51. Klyuchko O. M. Biotechnical information systems for monitoring of chemicals in environment: biophysical approach // *Biotechnol. Acta*. 2019. Vol. 12 (1). P. 5—28.
52. Klyuchko O. M., Aralova N. I., Aralova A. A. Electronic automated work places for biological investigations // *Biotechnol. Acta*. 2019. Vol. 12 (2). P. 5—22.
53. Sachnyuk G. V., Melezhyk O. V. Current state of water resources protection against pollution // *Youth: education, science, spirituality : XV Ukr. Sci. conf. Kyiv, April 17-19 : theses of reports*. Kyiv, 2007. P. 409—410.
54. Schnase J. L., Cushing J., Frame M. Information technology challenges of biodiversity and ecosystems informatics // *Inform. syst.* 2003. Vol. 28 (4). P. 339—345.
55. Linne C. *Fauna Suecica*. Stocholmiac, 1761.
56. Microsoft Academy: Methods and means of software engineering. URL: <https://www.intuit.ru/studies/courses/2190/237/lecture/6124> (accessed: 01.08.2019).

57. Хомоненко А. Д. Базы данных : учебник. 5-е изд., доп. Санкт-Петербург : Корона Принт ; Москва : Бином-Пресс, 2006. 736 с.
58. Harrington Jan L. Object-oriented database design clearly explained. USA: Academic Press, 2005.
59. Бучацький Л. П. Альфавірусні хвороби лососевих риб // Рибогосподарська наука України. 2012. № 1. С. 105—110.

REFERENCES

1. Klyuchko, O. M., Buchatsky, L. P., & Melezhyk, O. V. (2019). Biological databases construction using object-oriented system analysis. *Biotechnol. acta*, 12 (3), 5-22.
2. Klyuchko, O. M., & Klyuchko, Z. F. (2018). Electronic databases for Arthropods: methods and applications. *Biotechnol. acta*, 11 (4), 28-49. <https://doi.org/10.15407/biotech11.04.028>.
3. Klyuchko, O. M., & Klyuchko, Z. F. (2018). Electronic information systems for monitoring of populations and migrations of insects. *Biotechnol. acta*, 11 (5), 5-25. <https://doi.org/10.15407/biotech11.05.005>.
4. Duan, Y., Fu, Z., & Li, D. (2003). Toward Developing and Using Web-based Tele-Diagnosis in Aquaculture. *Expert System with Applications*, 25 (2), 247-254.
5. Smirnov, I. S., Voronina, E. P., Lobanov, A. L., Golikov, A. A., & Neyelov, A. V. (2004). Creation of Information retrieval systems on collections of marine animals (fishes and invertebrates) in the Zoological Institute of RAS. *Proceedings of the Sixth National Russian Research Conference RCDL'2004, Pushchino, September 29 - October 1, 2004*. Moscow, 30-33.
6. Chen, Y., Shi, M., Cheng, Y., Zhang, W., Tang, Q., & Xia, Q. (2018). FVD: The fish-associated virus database. *Infect Genet.*, 58, 23-26. doi: 10.1016/j.meegid.2017.11.004.
7. Crane, M., & Hyatt, A. (2011). Viruses of fish: an overview of significant pathogens. *Viruses*, 3 (11), 2025-2046. doi: 10.3390/v3112025.
8. Zhang, Q., & Gui, J. F. (2015). Virus genomes and virus-host interactions in aquaculture animals. *Sci. China Life Sci.*, 58 (2), 156-169. doi: 10.1007/s11427-015-4802-y.
9. Valdez-Moreno, M., Ivanova, V., Elías-Gutiérrez, M., Pedersen, L., Bessonov, K., & Hebert, N. (2019). Using eDNA to biomonitor the fish community in a tropical oligotrophic lake. *PloS One*, 14 (4), e0215505. doi: 10.1371/journal.pone.0215505.
10. Bi, H., Zhong, C., Shao, M., Wang, C., Yi, J., Qiao, L., & Zhang, J. (2019). Differentiation and Authentication of Fishes at Species Level Through Analysis of Fish Skin by MALDI TOF MS. *Rapid Commun. Mass. Spectrom.* doi: 10.1002/rcm.8474.
11. User Reference for Fisheries Improvement ProjectsDatabase (FIP-DB) and Query Viewer. ru.scribd.com. Retrieved from <https://ru.scribd.com/document/385739269/Readme-File-for-FIP-DB#download>.
12. Froese, R., & Pauli, D. (2000). *FishBase 2000: Concepts, designs and data sources*. Los Banos, Philippines: ICLARM.
13. Moreau, J., & Costa-Pierce, B. (1997). Introduction and present status of exotic carp in Africa. *Aquacult. Res.*, 28, 717-732.
14. FAO. (2016). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to food security and nutrition for all. Rome. 200 p. fao.org. Retrieved from

- <http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf>.
15. Roessig, J. M., Woodley, Ch. M., Cech, J. J., & Hansen L. J. (2004). *Effects of Global Climate Change on Marine and Estuarine Fishes and Fisheries*. Springer.
 16. A Global Information System on Fishes. *fishbase.se*. Retrieved from <https://www.fishbase.se/home.htm>.
 17. Arnot, J. A., Mackay, D., Parkerton, T. F., & Bonnell, M. (2008). A database of fish biotransformation rates for organic chemicals. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 27 (11), 2263-2270. Retrieved from <https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1897/08-058.1>. doi: 10.1897/08-058.1.
 18. Tedesco, P. A., Beauchard, O., Bigorne, R., Blanchet, S., Buisson, L., Conti, L., Cornu, J.-F., Dias, M. S., Grenouillet, G., Hugueny, B., Jézéquel, C., Leprieur, F., Brosse, S., & Oberdorff, T. (2017). A global database on freshwater fish species occurrence in drainage basins. *Sci. Data*, 4, 170141. doi: 10.1038/sdata.2017.141.
 19. Van der Laan, R., Eschmeyer, W. N., & Fricke, R. (2014). Family-group names of Recent fishes. *Zootaxa Monograph.*, 3882 (1), 1-230. doi:10.11646/zootaxa.3882.1.1.
 20. Fricke, R., Eschmeyer, W. N., & van der Laan, R. Eschmeyer's catalog of fishes: genera, species, 2019. *researcharchive.calacademy.org*. Retrieved from: <http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog>.
 21. Zeldis, D. & Prescott, S. (2000). Fish disease diagnosis program—Problems and some solutions. *Aquacultural Engineering*, 23 (1-3), 3-11.
 22. Daoliang, Li, Zetian, Fu, & Yanqing, Duan. (2002). Fish-Expert: a web-based expert system for fish disease diagnosis. *Expert Systems with Applications*, 23, 311-320.
 23. Frimpong, E. A., & Paul, L. Welcome to the FishTraits Database. *fishtraits.info*. Retrieved from <http://www.fishtraits.info>.
 24. Di Génova, A. D., Aravena, A., Zapata, L., González, M., Maass, A., & Iturra, L. (2011). SalmonDB: a bioinformatics resource for *Salmo salar* and *Oncorhynchus mykiss*. *Database (Oxford)*. 2011: bar050. doi: 10.1093/database/bar050. *ncbi.nlm.nih.gov*. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3225076>.
 25. Klyuchko, O. M. (2008). *Information and computer technologies in biology and medicine*. Kyiv: Nat. Acad. Scienc. Ukraine-druk. (In Ukrainian).
 26. Maistrenko, M. I., Rud, Yu. P., & Buchatsky, L. P. (2014). Accumulation of IPNV on the culture of fish cells. *Animal Biology*, 16 (4), 93-99 (In Ukrainian).
 27. Matvienko, N. M., & Buchatsky, L. P. (2014). The use of immunomodulating preparations in fish farming. *Modern problems of theoretical and practical ichthyology*, 33-35 (In Ukrainian).
 28. Gavrilova, I. P., Maistrenko, M. I., Rumar, V. I., Buchatsky, L. P., & Rud, Yu. P. (2014). New hosts of the third-type of carp herpes virus (CyHV-3). *Scientific notes of the Ternopil Ped. University. Series Biology*, 58 (1), 16-20 (In Ukrainian).
 29. Maistrenko, M. I., & Buchatsky, L. P. (2014). Biology of Herpesvirus Fish. *Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology*, 3 (123), 19-35 (In Ukrainian).
 30. Rud, Yu. P., Maistrenko, M. I., Bezusy, O. L. & Buchatsky, L. P. (2014). Experimental infection of long-winded cancer (*Pontastacus leptodactylus*) with virus of infectious pancreatic necrosis. *Bulletin of Biology and Medicine*, 4, 1 (113), 70-74 (In Ukrainian).

31. Matvienko, N., Rud, Yu., & Buchatsky, L. (2014). Replication of Infectious Pancreatic Necrosis Virus in different cell lines and organism of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) fingerlings. *Arch. Pol. Fish.*, 222, 127-133.
32. Matvienko, N. M., & Buchatsky, L. P. Study of reproduction of hemorrhagic septicemia trout virus. *Bulletin of Problems of Biology and Medicine*, 2 (3), 118-121 (In Russian).
33. Matvienko, N. M., Buchatsky, L. P., & Deriabin, O. M. (2013). Application of a reverse transcriptase polymerase chain reaction for the detection and identification of the virus of infectious pancreatic necrosis of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Microbiology and biotechnology*, 4 (24), 46-54 (In Ukrainian).
34. Matvienko, N., Kharkavlyuk, N., Buchatsky, L., & Didenko A. (2013). Characteristics of spring viraemia of carp virus strains isolated in different regions of Ukraine. *Zoology and Ecology*, 23 (3), 198-202.
35. Matvienko, N., Rud, Y., & Buchatsky, L. (2013). Replication of infectious pancreatic necrosis virus in different cell lines and organism of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) fingerlings. *Archives of Polish Fisheries*, 4, 127-133.
36. Rud, Yu. P., Maistrenko, M. I., & Buchatsky, L. P. (2013). Amplification and analysis of the nucleotide sequence of VP2 TA NS IPNV genes isolated in Western Ukraine. *Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology*, 4 (118), 34-40 (In Ukrainian).
37. Maistrenko, M. I., Buchatsky, L. P., & Matvienko, N. M. (2013). *Strain of herpesvirus IMB B-4 for the obtaining a vaccine against herpes virus koi*. Patent of Ukraine. (In Ukrainian).
38. Rud, Yu., Maistrenko, M., & Buchatsky, L. (2013). Isolation of IPNV from wild-life rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) in Western Ukraine. *Biology*, 3 (65), 63-65.
39. Maistrenko, M. I., Rud, Yu. P., Matvienko, N. M., Cholodna, L. S., & Buchatsky, L. P. (2013). Identification of virus SyNV-3 by the methods of electron microscopy and polymerase chain reaction. *Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine*, 4, 139-143 (In Ukrainian).
40. Matvienko, N. M., Vashchenko, A. V., Tsiganok, I. O., & Buchatsky, L. P. (2015). Results of surveillance studies of infectious fish diseases in freshwater aquaculture of Ukraine. *Agricultural science and practice*, 2 (2), 32-38.
41. Rud, Y. P., & Buchatsky, L. P. (2015). Detection of infectious pancreatic necrosis virus in the Western Ukraine. *Virologica sinica*, 30 (2), 1-4.
42. Movchan, Yu. V. (2009). Fishes of Ukraine (taxonomy, nomenclature, remarks). *Collection of works of Zoological Museum*, 40, 47-87.
43. Klyuchko, O. M. (2018). *Method for monitoring of chemicals influence on bioorganisms in few time intervals*. Patent of Ukraine №134575 (In Ukrainian).
44. Klyuchko, O. M. (2017). On the mathematical methods in biology and medicine. *Biotechnol. acta*, 10 (3), 31-40. <https://doi.org/10.15407/biotech10.03.031>.
45. Klyuchko, O. M. (2017). Application of artificial neural networks method in biotechnology. *Biotechnol. acta*, 10 (4), 5-13. <https://doi.org/10.15407/biotech10.04.005>.
46. Klyuchko, O. M. (2017). Cluster analysis in biotechnology. *Biotechnol. acta*, 10 (5), 5-18. <https://doi.org/10.15407/biotech10.05.005>.
47. Klyuchko, O. M., & Onopchuk Yu. M. (2018). Some trends in mathematical modeling for biotechnology. *Biotechnol. acta*, 11 (1), 39-57. <https://doi.org/10.15407/biotech11.01.039>.

48. Klyuchko, O. M. (2018). Electronic information systems in biotechnology. *Biotechnol. acta*, 11 (2), 5-22. <https://doi.org/10.15407/biotech11.02.005>.
49. Klyuchko, O. M. (2018). Information computer technologies for biotechnology: electronic medical information systems. *Biotechnol. acta*, 11 (3), 5-26. <https://doi.org/10.15407/biotech11.03.005>.
50. Klyuchko, O. M. (2018). Expert systems for biology and medicine. *Biotechnol. acta*, 11 (6), 5-28. <https://doi.org/10.15407/biotech11.06.005>.
51. Klyuchko, O. M. (2019). Biotechnical information systems for monitoring of chemicals in environment: biophysical approach. *Biotechnol. acta*, 12 (1), 5-28.
52. Klyuchko, O. M., Aralova, N. I., & Aralova, A. A. (2019). Electronic automated work places for biological investigations. *Biotechnol. acta*, 12 (2), 5-22.
53. Sachnyuk, G. V., & Melezhyk, O. V. (2007). Current state of water resources protection against pollution. *Youth: education, science, spirituality: theses of reports XV Ukr. Sci. conf. Kyiv, April 17-19*, 409-410.
54. Schnase, J. L., Cushing, J., & Frame, M. (2003). Information technology challenges of biodiversity and ecosystems informatics. *Inform. syst.*, 28 (4), 339-345.
55. Linne, C. (1761). *Fauna Suecica*. Stocholmiac.
56. Microsoft Academy: Methods and means of software engineering. *intuit.ru*. Retrieved from <https://www.intuit.ru/studies/courses/2190/237/lecture/6124>.
57. Chomonenko, A. D., Tzygankov, V. M., & Maltzev, M. G. (2006). *Databases*. (5-th edn.). Moscow: Binom Press. (In Russian).
58. Harrington, Jan L. (2005). *Object-oriented database design clearly explained*. USA: Academic Press.
59. Buchatsky, L. P. (2012). Alfaviral diseases of salmon fishes. *Fisheries science of Ukraine*, 1, 105-110 (In Ukrainian).

ДО ПИТАННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПЛЕМІННИХ ГРУП СТЕРЛЯДІ (*ACIPENSER RUTHENUS* LINNAEUS) В ІНДУСТРІАЛЬНІЙ АКВАКУЛЬТУРІ

М. М. Пашко, marina-fish@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. І. Тарасюк, tarasjuk@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Третяк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. О. Борисенко, b_Natalia@i.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. Ю. Белікова, belikova.e.y@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

Мета. Дослідити генетичну структуру племінного стада стерляді, сформованого в умовах плавучих садків рибного господарства індустріального типу.

Методика. Штучне відтворення та вирощування стерляді здійснювали із застосуванням індустріальних технологій рибництва. Аналіз поліморфізму білкових речовин проводили з використанням методів електрофорезу в поліакриламідному гелі. У якості молекулярно-генетичних маркерів для оцінки генетичної структури групи риб чотиришестилітнього віку ($n = 30$) розглядали розподіл алельних та генотипних частот за локусами, що кодують низку білків і ферментів крові тварин: трансферину (TF), посттрансферину (PTF), альбуміну (ALB). Статистичне опрацювання отриманих даних виконували із застосуванням традиційних прийомів.

Результати. Установлено, що генетична структура групи племінних особин стерляді із масою тіла в межах 1,0–2,3 кг (в середньому $1,68 \pm 0,07$ кг, $C_v = 22,3\%$) характеризується значним рівнем гетерозиготності (66,7%). Із розглянутих генетико-біохімічних систем найбільш інформативними для виявлення міжгрупових відмінностей за генетичними структурами виявились системи TF та ALB. Отримані дані дають змогу припустити, що оцінка поліморфізму за локусами трансферину та альбуміну може сприяти об'єктивному контролю ступеня інбредності племінних груп стерляді за індустріальних методів ведення аквакультури. Наголошується на необхідності проведення комплексних генетичних досліджень у процесі формування племінних стад осетрових риб в індустріальному рибництві.

Наукова новизна. Досліджено генетичну структуру стерляді за нетрадиційного для аквакультури України технологічного варіанту формування та експлуатації племінних стад осетрових риб.

Практична значимість. Результати досліджень являють інтерес для контролю та поліпшення стану племінних ресурсів осетрових риб в аквакультурі України.

Ключові слова: племінні групи стерляді, генетична структура, біохімічні маркери, контроль генофонду, індустріальне рибництво.

ON THE GENETIC STRUCTURE OF BROOD GROUPS OF THE STERLET (*ACIPENSER RUTHENUS* LINNAEUS) IN INDUSTRIAL AQUACULTURE

M. Pashko, marina-fish@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

S. Tarasjuk, tarasjuk@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

O. Tretiak, info@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

N. Borysenko, b_Natalia@i.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

O. Bielikova, belikova.e.y@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To investigate the genetic structure of the brood stock of the sterlet formed in the conditions of floating cages of an industrial type farm.

Methodology. Artificial reproduction and rearing of the sterlet were conducted with the use of industrial aquaculture technologies. The analysis of the polymorphism of protein substances was performed with the use of electrophoresis in polyacrylamide gel. As molecular-genetic markers for the assessment of the genetic structure of age-4-6 fish ($n=30$), we used the distribution of allele and genotypic frequencies by loci coding a number of animal blood proteins and enzymes: transferrin (TF), post-transferrin (PTF), albumin (ALB). Statistical processing of the obtained data was performed with the use of traditional methods.

Findings. It was found that the genetic structure of the brood sterlet group with the body weight of 1.0-2.3 kg (1.68 ± 0.07 kg, $C_v=22.3\%$) was characterized by a significant level of heterozygosity (66.7%). From examined genetic-biochemical systems, the most informative for the detection of inter-group differences by genetic structures were the TF and ALB systems. The obtained data give an opportunity to suppose that the polymorphism assessment by transferrin and albumin loci can contribute to objective control of the inbreeding degree of sterlet brood stocks in industrial aquaculture methods. Attention is drawn to the need for comprehensive genetic studies in the formation of sturgeon breeding stocks in industrial fish farming.

Originality. We studied the genetic structure of the sterlet in the case of a technological variant of the formation and exploitation of sturgeon breeding stocks that is not traditional for aquaculture of Ukraine.

Practical value. The research results are of interest for monitoring and improving the condition of the breeding resources of sturgeons in aquaculture of Ukraine.

Key words: breeding groups of sterlet, genetic structure, biochemical markers, genetic pool control, industrial aquaculture.

К ВОПРОСУ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПЛЕМЕННЫХ ГРУПП СТЕРЛЯДИ (*ACIPENSER RUTHENUS* LINNAEUS) В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ АКВАКУЛЬТУРЕ

М. М. Пашко, marina-fish@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

С. И. Тарасюк, tarasjuk@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

А. М. Третьяк, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Н. А. Борисенко, b_Natalia@i.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Е. Ю. Беликова, belikova.e.y@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Исследовать генетическую структуру племенного стада стерляди, сформированного в условиях плавучих садков рыбного хозяйства индустриального типа.

Методика. Искусственное воспроизводство и выращивание стерляди осуществляли с применением индустриальных технологий рыбоводства. Анализ полиморфизма белковых веществ проводили с использованием методов электрофореза в полиакриламидном геле. В качестве молекулярно-генетических маркеров для оценки генетической структуры группы рыб четырех-шестилетнего возраста ($n = 30$) рассматривали распределение аллельных и генотипных частот по локусам, кодирующим ряд белков и ферментов крови животных:

трансферина (TF), посттрансферина (PTF), альбуміна (ALB). Статистическу обробку отриманих даних виконували з використанням традиційних прийомів.

Результати. Установлено, що генетическа структура групи племенних особей стерляди з масою тіла в межах 1,0–2,3 кг (в середньому $1,68 \pm 0,07$ кг, $C_v = 22,3\%$) характеризується значительним рівнем гетерозиготності (66,7%). Из рассмотренных генетико-биохимических систем наиболее информативными для выявления межгрупповых отличий по генетическим структурам оказались системы TF и ALB. Полученные данные дают возможность допустить, что оценка полиморфизма по локусам трансферина и альбумина может способствовать объективному контролю степени инбридности племенных стад стерляди при индустриальных методах ведения аквакультуры. Обращено внимание на необходимость проведения комплексных генетических исследований в процессе формирования племенных стад осетровых рыб в индустриальном рыбоводстве.

Научная новизна. Исследована генетическая структура стерляди при нетрадиционном для аквакультуры Украины технологическом варианте формирования и эксплуатации племенных стад осетровых рыб.

Практическая значимость. Результаты исследований представляют интерес для контроля и улучшения состояния племенных ресурсов осетровых рыб в аквакультуре Украины.

Ключевые слова: племенные группы стерляди, генетическая структура, биохимические маркеры, контроль генофонда, индустриальное рыбоводство.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Надмірний неконтрольований вилов і антропогенні зміни середовища існування осетрових риб, насамперед незворотні порушення умов їхнього природного відтворення, стали вирішальними чинниками, що призвели до катастрофічного зменшення чисельності цих найцінніших представників світової іхтіофауни. Тому цілком обґрунтовано майже повсюдно удаються до повної заборони промислової експлуатації осетрових запасів у природних водоймах [1, 2]. Як наслідок — прискорюється розвиток товарного осетрівництва за промислового відтворення та вирощування найпродуктивніших об'єктів осетрової аквакультури в умовах господарств з різним рівнем інтенсифікації виробництва. Зростає актуальність робіт з формування маточних стад осетрових риб у контрольованих умовах рибогосподарських підприємств [2–7].

У ситуації, що склалась, особливого значення набуває моніторинг генетичних структур природних популяцій та штучно відтворюваних племенних стад осетрових риб. З урахуванням невеликої кількості особин у племенних групах осетрових риб, з метою підтримання необхідного генетичного різноманіття плідників слід забезпечити своєчасний генетичний контроль у створених ремонтно-маточних стадах за відпрацювання системи поліпшення наявного генофонду [6–8].

За результатами наукових досліджень та практичних робіт, доведено, що одним з «найтехнологічніших» об'єктів індустріального осетрівництва є стерлядь [2, 7, 9–11]. Безумовно, це підвищує інтерес до вивчення генофонду останньої в аквакультурі України.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

У більшості випадків внутрішньовидову генетичну структуру природних

популяцій стерляді досліджували з метою визначення відмінностей між різними популяціями локалізованими у географічно відокремлених водоймах [2, 12, 13]. Обговоренню питань щодо генетичної структури окремих племінних груп стерляді в аквакультурі України приділялась недостатня увага.

На сучасному етапі розвитку індустріальних методів ведення національного осетрівництва однією з поширених технологічних схем є вирощування маточного матеріалу осетрових риб у водоймах з природним температурним режимом (у плавучих садках, басейнах, ставах) у поєднанні зі штучним відтворенням з регульованим режимом температури води як у традиційні нерестові періоди, так і зі зміщенням звичайних строків виконання рибницьких робіт. Остання технологічна модифікація з управлінням процесами гаметогенезу плідників застосовується, зокрема, для розвитку в Україні ікр'яно-товарного напрямку осетрівництва, досить часто із використанням маточного поголів'я стерляді [7]. Крім того, підвищена адаптивність стерляді до індустріальних технологій відтворення та вирощування сприяє освоєнню методів її розмноження у нетрадиційні рибницькі строки (січень–березень), що надає можливість істотного подовження технологічного етапу для вирощування високоякісного рибопосадкового матеріалу не лише для потреб інтенсивної аквакультури, але й для зариблення природних водойм [7, 14]. Зазначені обставини підвищують актуальність досліджень з визначення генетичної структури ремонтно-маточних груп стерляді в умовах індустріальних господарств садкового і басейнового типів. Отже, основною метою наших досліджень є визначення генетичної структури племінного стада стерляді, сформованого в умовах плавучих садків за природного температурного режиму водойм північних областей України.

Слід відмітити, що наразі особливого значення набувають дослідження генетичних структур культивованих видів риб з використанням методів молекулярної генетики та різних типів молекулярно-генетичних маркерів. Зважаючи на обмеженість даних щодо генетичної структури племінних груп стерляді в умовах інтенсивної аквакультури, на даному етапі досліджень нами застосовувався аналіз поліморфізму й розподілу алейних та генотипних частот за локусами, що кодують низку білків і ферментів крові риб.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Матеріал для досліджень відібрано у 2018 р. від особин стерляді кожної статі чотири–шестилітнього віку ($n = 30$) з масою тіла 1,0–2,3 кг (в середньому $1,68 \pm 0,07$ кг, $C_v = 22,3\%$). Заводське відтворення та наступне вирощування досліджуваної групи риб проводили в умовах господарства індустріального типу ТОВ-СРП «Осетр», розташованого на території Київської області у лісостеповій фізико-географічній зоні на штучно створеній водоймі з водопостачанням із Канівського водосховища дніпровського каскаду. Вирощування стерляді здійснювали у плавучих садках площею 24 м^2 з годівлею спеціалізованими комбікормами західноєвропейського виробництва.

Відбір зразків крові у риб виконували стандартним способом з хвостової вени в пластикові пробірки типу «Eppendorf», дотримуючись правил асептики та антисептики, з антикоагулянтом (гепарин, в розрахунку 25 МО на 1 мл крові). Центрифугували проби в режимі 3 тис. обертів/хв упродовж 10 хв та відбирали

плазму в окремі пробірки. Транспортування зразків проводили в холодильних камерах за температури 4°C. Зразки плазми та еритроцитів заморожували та зберігали за температури –20°C.

Молекулярно-генетичними маркерами для оцінки генетичної структури досліджуваної групи стерляді були локуси, що кодують низку білків і ферментів крові тварин: трансферину (TF), посттрансферину (PTF), альбуміну (ALB).

Дослідження проводили із використанням вертикального поліакриламідного гелю-електрофорезу з подальшим гістохімічним фарбуванням та генотипуванням за алейними варіантами досліджуваних локусів генетико-біохімічних систем крові [15–18]. Для проведення електрофоретичного розподілу білків використовували спеціальні камери, виготовлені з органічного скла різних розмірів, зокрема і власних модифікацій. Залежно від білкового маркера, що вивчався, використовували різні буферні системи і підбирали концентрацію гелю (10–14%).

Статистичну обробку результатів та оцінку основних популяційно-генетичних параметрів, зокрема відхилення генотипних частот від стану рівноваги згідно із законом Харді-Вайнберга (на основі критерію Пірсона) виконували за використання методів математичної статистики та біометрії відповідно до існуючих методик, а також за допомогою стандартних комп'ютерних програм «Biosys-1» [19–22]. Критичне значення χ^2 обрано для 5% рівня значущості.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Аналіз генетичної структури племінної групи стерляді за використаних генетико-біохімічних маркерів дав змогу виявити окремі її особливості.

За всіма дослідженими біохімічними маркерами (локуси TF, ALB, PTF) виявлено поліморфізм. Розподіл алейних частот за цими локусами наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Розподіл частот алейних варіантів за окремими генетико-біохімічними маркерами у стерляді

Table 1. Frequency distribution of allelic variants by individual genetic and biochemical markers in sterlet

Локуси / Locus					
TF		ALB		PTF	
A	B	A	B	F	S
0,633	0,367	0,583	0,417	0,483	0,517

Такий генетико-біохімічний маркер як альбумін привертає увагу дослідників у сфері популяційної генетики з тієї причини, що у багатьох видів риб він є поліморфним. Трактують фореграм за електрофоретичного розділення фракцій альбуміну в більшості випадків не викликає труднощів завдяки чіткості бендів. З літератури відомі багаторазові свідчення щодо поліморфізму у стерляді за фракціями альбуміну, трансферину та лактатдегідрогенази [23].

У наших дослідженнях локус ALB стерляді представлений у вигляді алейних варіантів А (швидка зона) і В (повільна зона). За дослідженим локусом частота обох алейних варіантів істотно не відрізнялась і становила: Alb A – 0,583

та Alb B – 0,417.

За даними окремих авторів, відомо, що для стерляді є характерною менша гетерогенність альбуміну (2–3 компоненти) порівняно з такими представниками роду *Acipenser* як російський та сибірський осетри, у яких за локусом альбуміну виявлено відповідно 5–9 та 4–5 компонентів. За нашими даними у досліджуваній групі стерляді не виявлено повільно мігруючого альбумін-компоненту С, наявність якого у 1,3–18,4% особин із різних європейських популяцій стерляді раніше звертали увагу окремі дослідники [24].

У досліджуваній групі стерляді локус трансферину розподілявся на два компоненти, позначені у порядку зменшення електрофоретичної рухливості як Tf A та Tf B. За локусом TF спостерігалось переважання швидкомігруючого алеля А над повільномігруючим В (див. табл. 1). Трансферин належить до групи білків з максимально вираженим поліморфізмом. За цим локусом поліморфізм виявлений у понад 30 видів риб. У всіх досліджених видів трансферин кодується одним геном [25].

За ферментною системою PTF також виявлено два алельні варіанти F і S. За локусом PTF спостерігали більш рівномірний розподіл частот алелів Ptf F — 0,483, та Ptf S — 0,517.

Слід також відмітити, що використання таких генетико-біохімічних систем, як ALB, TF, PTF, які зручно типувати на одній фореграмі, є набагато ефективнішим для моніторингу генетичної структури стад стерляді, на відміну від таких ізоферментів, наприклад, як мелатдегідрогеназа (MDH) або лактатдегідрогеназа (LDH), оскільки типування цих ферментів після крохмального гель-електрофорезу вимагає проведення фарбування за спеціальними методиками.

Аналіз частот генотипів за критерієм відповідності χ^2 за локусами трансферину та посттрансферину показав відсутність статично значущих відхилень розподілу генотипів від рівноваги Харді-Вайнберга за рівня значущості $\alpha = 0,05$ (табл. 2). Досліджувана група стерляді характеризувалась таким розподілом особин: з генотипом Tf AA — 40%, Tf AB — 47% та 13% — з генотипом Tf BB.

У досліджуваній групі стерляді достовірний надлишок гетерозигот присутній за локусом ALB ($P < 0,05$). За критерієм Пірсона виявлено, що група риб за локусом ALB не знаходиться в стані рівноваги за законом Харді-Вайнберга ($\chi^2 > \chi^2_{\text{табл}}$, $P < 0,05$). Аналіз розподілу частот генотипів показав, що за локусом PTF із рівнем значущості $\alpha = 0,05$ ($P > 0,05$) спостерігається статистично достовірне переважання фактичної частоти гетерозиготних генотипів над очікуваними.

Дослідження гетерогенності окремих племінних груп стерляді насамперед необхідне для підтримання аутбридингу зі збереженням наближеного до природного генетичного різноманіття, оскільки відомо, що у риб за тривалого (в багатьох поколіннях) утримування в умовах аквакультури може змінюватись генотип за набуття доместикованими особинами нових ознак фенотипу. Зручним інструментом у популяційній генетиці є біохімічні маркери. Поліморфізм ізоферментів дає змогу оцінити гетерогенність популяцій, а також дає уявлення про рівень адаптаційної пластичності виду до умов навколишнього середовища [26].

Таблиця 2. Розподіл частот генотипів за локусами TF, ALB, PTF у стерляді
Table 2. Frequency distribution of sterlet genotypes by TF, ALB, PTF loci

Локус / Locus	Генотип / Genotype	G _{obs}	G _{exp}	χ ²	p-level	P
TF	AA	12	11,915	0,004	0,998	>0,05
	AB	14	14,169			
	BB	4	3,915			
ALB	AA	5	10,085	14,622	0,001	<0,05
	AB	25	14,831			
	BB	0	5,085			
PTF	FF	4	6,881	4,439	0,109	>0,05
	FS	21	15,237			
	SS	5	7,881			

Примітка. G_{obs} — фактичні генотипи; G_{exp} — очікувані генотипи.

Note. G_{obs} — are actual genotypes; G_{exp} — expected genotypes.

Здійснено розрахунок фактичної (H_o) та очікуваної (H_e) гетерозиготності за дослідженими локусами. Розрахований рівень середньої гетерозиготності дав змогу говорити про значну гетерогенність дослідженого стада, яка, в свою чергу, свідчить про високий рівень генетичної мінливості.

Значення очікуваної гетерозиготності за трьома локусами коливались у діапазоні 0,472–0,508. За локусами альбуміну та посттрансферину значення фактичної гетерозиготності становили відповідно 0,833 та 0,700. За локусом трансферину зареєстровано менше значення показника — 0,467 (табл. 3).

Фактичний та очікуваний рівні середньої гетерозиготності на локус істотно не відрізнялись і становили відповідно 66,7 та 49,2%. В середньому значення фактичної та очікуваної гетерозиготності за трьома локусами відрізнялось на 17,5%, що свідчить про надлишок гетерозигот у досліджуваній групі риб.

На основі рівнів гетерозиготності було розраховано індекс фіксації F_{is}, що дає змогу оцінити міру відхилення генотипових частот від очікуваних за рівнянням Харді-Вайнберга за рахунок нестачі або надлишку гетерозиготних особин. Цей показник коливався в межах від -0,005 до -0,714 (рис. 1).

Таблиця 3. Рівень середньої гетерозиготності за біохімічними маркерами у стерляді

Table 3. The level of average heterozygosity by biochemical markers in sterlet

Показник / Indicator	Локус / Locus			
	TF	ALB	PTF	Середня гетерозиготність / Average heterozygosity
H _o	0,467	0,833	0,700	0,667 ± 0,107
H _e	0,472	0,494	0,508	0,492 ± 0,010

Примітка. H_o — фактичний рівень гетерозиготності; H_e — очікуваний рівень гетерозиготності.

Note. H_o — observed heterozygosity level; H_e — expected heterozygosity level.

Індекс фіксації в середньому становив $-0,381$, що вказує на відсутність явища інбридингу, оскільки від'ємне значення показника вказує на переважання гетерозигот у межах субпопуляцій порівняно з очікуваним значенням у стані рівноваги за Харді-Вайнбергом. За отриманим значенням F_{is} можна зробити висновок, що для досліджуваного стада стерляді є характерним неспоріднене схрещування.

Рис. 1. Показники гетерозиготності за генетико-біохімічними маркерами
Fig. 1. Indicators of heterozygosity by the genetic and biochemical markers

Можна стверджувати, що за розглянутими генетико-біохімічними системами крові риб виявлена середня гетерозиготність стерляді вказує на достатню консолідованість досліджуваного виду порівняно з іншими описаними в літературі видами риб [25].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Із розглянутих генетико-біохімічних маркерів найбільш інформативними для виявлення міжгрупових відмінностей за генетичними структурами виявились системи TF та ALB. Аналіз різноманіття генотипів досліджуваної групи стерляді дав можливість виявити за локусом трансферину специфічні генотипи за відсутності деяких із теоретично очікуваних, а саме — Tf AB і Tf BB. У стерляді в умовах індустріальної аквакультури спостерігається оптимальний рівень гетерозиготності (66,7%).

Проведені дослідження виявили певні генетичні особливості племінної групи стерляді, що сприятиме кращому розумінню механізмів підтримання відносно стабільного стану наявного стада зі збереженням специфічності його генетичної структури. Водночас, можна припустити, що оцінка поліморфізму за розглянутими біохімічними маркерами сприятиме об'єктивному контролю ступеня інбредності племінних стад стерляді в аквакультурі за можливості прогнозування змін генетичної структури маточних стад у поколіннях та за різних умов відтворення і вирощування.

Застосовані методи контролю генетичної структури племінних груп осетрових риб дають змогу отримати необхідну інформацію у стислі терміни за відносно невеликих матеріальних витрат.

Виконання комплексного генетичного контролю ремонтно-маточних груп осетрових риб в аквакультурі України має стати важливою складовою частиною наукового супроводу національного осетрівництва, як неодмінний елемент моніторингових і оперативних досліджень, спрямованих на підвищення

ефективності ведення племінної роботи та удосконалення методичної бази сучасного рибництва.

REFERENCES

1. Shlyakov V. A., Daskalov G. M. The state of marine living resources – State of the Environment of the Black Sea (2001–2006/7) / ed. Temel Ogus. Istanbul, Turkey : Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution (BSC), 2008. Vol. 3. P. 321—364.
2. Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні / Третяк О. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2010. № 4. С. 4—22.
3. Виноградов В. К., Ерохина Л. В., Мельченков Е. А. Биологические основы разведения и выращивания веслоноса (*Polyodon spathula* (Walbaum)). Москва : Росинформагротех, 2003. 344 с.
4. Шерман І. М., Корнієнко В. О., Шевченко В. Ю. Актуальність та передумови domestикації представників родини осетрових в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2006. Вип. 44. С. 145—154.
5. Козлов В. И., Козлов А. В. Осетроводство. Москва : МГУТУ, 2011. 336 с.
6. Кольман Р. Искусственное размножение осетровых рыб // Проблемы производства посадочного материала исчезающих популяций осетровых рыб. Олыштын : MIR DRUK, 2012. С. 31—43.
7. Пашко М. М., Третяк О. М., Колос О. М. До питання вирощування плідників стерляді (*Acipenser ruthenus* Linnaeus) у плавучих садках за природної температури води Лісостепу України // Рибогосподарська наука України. 2019. № 1. С. 48—59.
8. Грициняк І. І., Тарасюк С. І. Актуальні завдання генетичних досліджень у рибному господарстві // Проблеми розвитку морської та прісноводної аквакультури : семінар : матер. Київ, 2009. С. 98—106.
9. Шерман І. М., Ігнатов О. В. Вирощування цьоголітків стерляді в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2007. Вип. 50. С. 129—133.
10. Кончиц В. В. Первоочередные задачи развития осетроводства в республике Беларусь // Рибогосподарська наука України. 2008. № 3. С. 68—72.
11. Хрусталеv Е. В., Куранова Т. М., Хойновский К. Б. Искусственное воспроизводство стерляди *Acipenser ruthenus* L. // Биотехника искусственного воспроизводства рыб, раков и сохранение запасов промысловых рыб. Вильнюс, 2008. С. 8—16.
12. Microsatellite DNA analysis of starlet from five European river drainage areas / Fopp-Bayat D. et al. // Actual status and active protection fish populations endangered by extinction : International scientific conference : proceed. Olsztyn : IR, 2008. P. 223—234.
13. Кончиц В. В., Мамедов Р. А. Состояние и перспективы восстановления численности стерляди в водоемах Беларуси // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. Київ : ДІА, 2011. С. 48—58.
14. Результати штучного відтворення осетрових риб, вирощених у садках за природного температурного режиму водойм лісостепової зони України / Пашко М. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2018. № 3. С. 39—49.
15. Davis B. J. Disc electrophoresis. II. Method and application to human serum proteins // Ann. N.Y. Acad. Sci. 1964. Vol. 121. P. 404—408.

16. Gahne B., Juneja R. K., Grolmus J. Horizontal polyacrylamide gradient gel electrophoresis for the simultaneous phenotyping of transferrin, post-transferrin, albumin and post-albumin in the blood plasma of cattle // *Anim. Blood Groups Biochem. Genet*, 1977. Vol. 8, № 3. P. 127—137.
17. Harris H., Hopkinson D. A. Handbook of enzyme electrophoresis in human genetics. Amsterdam : North-Holland Publ. Comp., 1976. 680 p.
18. Генетика изоферментов / Корочкин Л. И. и др. Ленинград — Москва : Наука, 1977. 275 с.
19. Ивантер Э. В., Коросов А. В. Элементарная биометрия : учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. Петрозаводск : ПетрГУ, 2013. 110 с.
20. Кузнецов В. М. F – статистики Райта : оценка и интерпретация // *Проблемы биологии продуктивных животных*. 2014. № 4. С. 80—104.
21. Плохинский Н. А. Биометрия. Москва : Моск. ун-т, 1969. 368 с.
22. Swofford D. L., Selander R. B. BIOSYS-1: a Fortrain program for the comprehensive analysis of electrophoretic data in population genetics and systematics // *J. Heredity*. 1981. Vol. 72. P. 281—283.
23. Андреева А. М. Структурно-функциональная организация альбуминовой системы крови рыб // *Вопросы ихтиологии*. 1999. Т. 39, № 6. С. 825—832.
24. Кузьмин Е. В. Альбуминовая система сыворотки крови осетрообразных в репродуктивный период жизни // *Вопросы ихтиологии*. 1996. Т. 36, № 1. С. 101—108.
25. Кирпичников В. С. Генетика и селекция рыб. Ленинград : Наука, 1987. 520 с.
26. Особливості білкового складу плазми крові хребетних: еволюційно-екологічний аспект / Грубінко В. В. та ін. // *Біологія тварин*, 2010. Т. 12, № 1. С. 64—67.

ЛІТЕРАТУРА

1. Shlyakov, V. A., & Daskalov, G. M. (2008). *The state of marine living resources – State of the Environment of the Black Sea (2001-2006/7)*. Temel Ogus (Ed.). (Vol. 3). Istanbul, Turkey: Publication of the Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution (BSC), 321-364.
2. Tretiak, O. M. et al. (2010). Stan zapasiv osetrovkykh ryb ta rozvytok osetrovoi akvakultury v Ukraini. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 4-22.
3. Vinogradov, V. K., Erokhina, L. V., & Melchenkov, E. A. (2003). *Byolohycheskiye osnovy razvedeniya i vyrashchivaniya veslonosa (Polyodon spathula (Walbaum))*. Moskva: Rosynformahrotekh.
4. Sherman, I. M., Korniienko, V. O., & Shevchenko, V. Yu. (2006). Aktualnist ta peredumovy domestykatsii predstavnykiv rodyny osetrovkykh v umovakh pivdnia Ukrainy. *Tavriiskyi naukovyi visnyk*, 44, 145-154.
5. Kozlov, V. Y., & Kozlov, A. V. (2011). *Osetrovodstvo*. Moskva: MHUTU.
6. Kol'man, R. (2012). Iskusstvennoe razmnzhenie osetrovkykh ryb. *Problemy proizvodstva posadochnogo materiala ischezayushchikh populyatsiy osetrovkykh ryb*. Ol'shtyn: MIR DRUK, 31-43.
7. Pashko, M. M., Tretiak, O. M., & Kolos, O. M. (2019). Do pytannia vyroshchuvannia plidnykiv sterliadi (*Acipenser ruthenus* Linnaeus) u plavuchykh sadkakh za pryrodnoi temperatury vody Lisostepu Ukrainy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 48-59.
8. Hrytsyniak, I. I., & Tarasiuk, S. I. (2009). Aktualni zavdannia henetychnykh doslidzhen u rybnomu hospodarstvi. *Problemy rozvytku morskoi ta prysnovodnoi akvakultury: materialy seminaru*. Kyiv, 98-106.

9. Sherman, I. M., & Ihnatov, O. V. (2007). Vyroshchuvannia tsoholitkiv sterliadi v umovakh pivdnia Ukrainy. *Tavriiskiyi naukovyi visnyk*, 50, 129-133.
10. Konchyts, V. V. (2008). Pervoocherednye zadachy razvytiya osetrovodstva v respublyke Belarus. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 3, 68-72.
11. Khrustalev, E. V., Kuranova, T. M., & Khoynovskiy, K. B. (2008). Iskusstvennoe vosproizvodstvo sterlyadi *Acipenser ruthenus* L. *Biotehnika iskusstvennogo vosproizvodstva ryb, rakov i sokhranenie zapasov promyslovykh ryb*. Vil'nyus, 8-16.
12. Fopp-Bayat, D., Kolman, R., Tretyak, A. M., & Woznicki, P. (2008). Microsatellite DNA analysis of starlet from five European river drainage areas. *Actual status and active protection fish populations endangered by extinction: International scientific conference*. Olsztyn: IRS, 223-234.
13. Konchits, V. V., & Mamedov, R. A. (2011). Sostoyanie i perspektivy vosstanovleniya chislennosti sterlyadi v vodoemakh Belarusi. *Zberezheniya genofondu ta vidnovlennya populyatsiy tsinnikh vydiv ryb: Mizhnar. nauk. konf.: mater*. Kyiv: DIA, 48-58.
14. Pashko, M. M., Tretiak, O. M., Pashko, S. M., Kolos, O. M., & Mykhailenko, H. N. (2018). Rezultaty shtuchnoho vidtvorennia osetrovyykh ryb, vyroshchenykh u sadkakh za pryrodnoho temperaturnoho rezhymu vodoim lisostepovoi zony Ukrainy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 3, 39-49.
15. Davis, B. J. (1964). Disc electrophoresis. II. Method and application to human serum proteins. *Ann. N.Y. Acad. Sci.*, 121, 404-408.
16. Gahne, B., Juneja, R. K., & Grolmus, J. (1977). Horizontal polyacrylamide gradient gel electrophoresis for the simultaneous phenotyping of transferrin, post-transferrin, albumin and post-albumin in the blood plasma of cattle. *Anim. Blood Groups Biochem. Genet*, 8(3), 127-137.
17. Harris, H., & Hopkinson, D. A. (1976). *Handbook of enzyme electrophoresis in human genetics*. Amsterdam: North-Holland Publ. Comp.
18. Korochkin, L. I., Serov, O. L., & Pudovkin, A. I., et al. (1977). *Genetika izofermentov*. Leningrad-Moskva: Nauka.
19. Ivanter, E. V., & Korosov, A. V. (2013). *Elementarnaya biometriya: uchebnoe posobie*. (3rd edn.). Petrozavodsk: Petr.GU.
20. Kuznetsov, V. M. (2014). F – statistiki Rayta: otsenka i interpretatsiya. *Problemy biologii produktivnykh zhivotnykh*, 4, 80-104.
21. Plokhinskiy, N. A. (1969). *Biometriya*. Moskva: Moskovskiy universitet.
22. Swofford, D. L., & Selander, R. B. (1981). BIOSYS-1: a Fortrain program for the comprehensive analysis of electrophoretic data in population genetics and systematics. *J. Heredity*, 72, 281-283.
23. Andreeva, A. M. (1999). Strukturno-funktsional'naya organizatsiya al'buminovoy sistemy krovi ryb. *Voprosy ikhtiologii*, 39(6), 825-832.
24. Kuz'min, E. V. (1996). Al'buminovaya sistema syvorotki krovi osetroobraznykh vrechnoy period zhizni. *Voprosy ikhtiologii*, 36(1), 101-108.
25. Kirpichnikov, V. S. (1987). *Genetika i selektsiya ryb*. Leningrad: Nauka.
26. Hrubinko, V. V., Kurant, V. Z., Khomenchuk, V. O., Byiak, V. Ya., & Syniuk, Yu. V. (2010). Osoblyvosti bilkovoho skladu plazmy krovi khrebetnykh:evoliutsiino-ekolohichniy aspekt. *Biologiya tvaryn*, 12(1), 64-67.

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 59-71
DOI: 10.15407/fsu2019.03.059
УДК [639.3.043:639.371.13]:597-11

Received 17.07.19
Received in revised form 29.07.19
Accepted 18.08.19

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ ФОРЕЛІ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ КОРМІВ «ALLER AQUA» І «AQUAFEED FISCHFUTTER»

І. Ю. Бобель, IrynaBobel@gmail.com, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів
Я. І. Півторак, feeding@lvet.edu.ua, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів

Мета. Вивчення впливу кормів виробників «Aller Aqua» рецептур Futura, Performa та Gold, а також «Aquafeed Fischfutter» рецептур LF 44/26 EX, FM 50/16 EX, FB 52/20 EX на темп росту, гематологічні та продуктивні показники райдужної форелі, у залежності від вікової групи.

Методика. Дослідження проводились за загальноприйнятими у рибництві методиками. Зразки крові відбирали з серця з допомогою шприца і ін'єкційної голки, яку вводили із черевної сторони по сагітальній лінії між грудними плавцями. Дослідження зразків крові здійснювали за методиками, отриманими В. В. Влізлом та І. П. Кондрахіним. Гематологічні показники визначали за стандартними методами, прийнятими у рибництві. Концентрацію еритроцитів визначали пробірковим методом із використанням консервувального розчину, мікроскопа і камери Горяєва, лейкоцити — непрямым методом на мазку крові, гемоглобін — гемоглобінціанідним методом на спектрометрі. Окрім цього, був визначений загальний білок у сироватці крові рефрактометрично, швидкість осідання еритроцитів за допомогою ШОЕ-метра.

Статистичну обробку матеріалів досліджень здійснювали загальноприйнятими методами варіаційної статистики з оцінкою (M), його похибки (m) і розрахунками вірогідності різниць за критеріями Стьюдента з використанням програмного забезпечення «Microsoft Excel».

Результати. Науково-виробничий дослід проводився в умовах ПП «Західна рибна компанія» Пустомитівського району Львівської області. В основу проведення досліджень покладено завдання з оптимізації нормованої годівлі райдужної форелі за схемою, яка передбачала надання порівняльної оцінки впливу вищеназваних гранульованих кормів на рибницькі показники і економіку вирощування, а також на морфологічні та біохімічні показники крові, зокрема оцінку динаміки змін лейкоцитарної формули, що дозволяє врахувати стан кровотворних органів та імунної системи в цілому.

Основним завданням товарного форелівництва є вирощування риби в найбільш оптимальний проміжок часу із мінімальними витратами. Одним з основних чинників, який впливає на інтенсивність росту риби, є дотримання оптимальних умов вирощування і повноцінної збалансованої годівлі. Саме такий підхід відображено у матеріалах науково-практичної публікації щодо порівняльної оцінки ефективності кормів «Aller Aqua» і «Aquafeed Fischfutter» в годівлі райдужної форелі.

Встановлено, що дослідні рецепти кормів різним чином впливають на досліджувані показники. Так, отримано дещо кращі результати, як за морфологічними, так і за біохімічними компонентами крові за згодовування гранульованого корму фірми «Aller Aqua» (рецептур Futura, Performa та Gold). Слід також наголосити, що, незважаючи на дещо

© І. Ю. Бобель, Я. І. Півторак, 2019

вищу вартість цього корму, економічна ефективність, у порівнянні з кормом фірми «Aquafeed Fischfutter», є вищою. Рентабельність виробництва була на 2% більшою.

Наукова новизна. Вперше здійснено порівняльні дослідження росту та розвитку райдужної форелі за умов використання гранульованих кормів виробників фірм «Aller Aqua» і «Aquafeed Fischfutter», а також економічної ефективності їх згодовування.

Практична значимість. Розроблено та запропоновано удосконалену програму годівлі форелі, яка забезпечує потреби риб на кожному етапі вирощування. Доведено економічну ефективність впровадження удосконаленої технології годівлі, яка апробована у виробничих умовах ПП «Західна рибна компанія». Зоотехнічну ефективність використання у годівлі райдужної форелі кормів «Aller Aqua» із рецептурами, що відповідають віку риб, доведено на усіх вікових групах.

Ключові слова: райдужна форель, корми фірм «Aller Aqua» та «Aquafeed Fischfutter», нормована годівля, темп росту, морфологічні, біохімічні та продуктивні показники.

HEMATOLOGICAL AND PRODUCTIVE PARAMETERS OF TROUT FED WITH “ALLER AQUA” AND “AQUAFEED FISCHFUTTER” FEEDS

I. Bobel, Irynabobel@gmail.com, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z.Gzhytsky, Lviv

Ya. Pivtorak, feeding@lvet.edu.ua, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z.Gzhytsky, Lviv

Purpose. Study of the effects of “Aller Aqua” and “Aquafeed Fischfutter” feeds on functional growth status, hematological and productive parameters of rainbow trout, from fry to commercial product.

Methodology. The study was carried out according to the commonly accepted methods in fish culture. Samples of blood were taken from the heart using a syringe and an injection needle, which was injected from the abdominal wall along the sagittal line between the pectoral fins.

Blood samples were analyzed according to the methods obtained by V. Vlyzlo and I. Kondrakhin [1, 2].

Statistical processing of study materials was carried out using generally accepted methods of variation statistics with an estimate of means (M), errors (m), and calculations of the probability of differences using Student’s methods in Microsoft Excel.

Findings. The scientific and production experiment was conducted at the private enterprise “Western fish company” of Pustomyts district, Lviv region. The basis of the study was the task of optimizing the normalized feeding of rainbow trout according to the scheme, which provided for a comparative assessment of the effect of the above-mentioned granulated feed mixtures, as well as on the morphological and biochemical components of blood, an assessment of the dynamics of changes in the leukocyte formula, which gives a reason to take into account the state the hematopoietic organs and the immune system as a whole [3].

The picture of trout blood is a very distinct indicator of changes in the body, the physiological parameters of blood in trout can indicate the quality of fish products due to the nutritional conditions that need to be taken into account in the technological process of fish growing, in particular, trout. The main task of table trout culture is to grow fish in the best possible time and with minimal cost. One of the main factors influencing the intensity of fish growth is maintaining optimal conditions of cultivation and fully balanced nutrition. This approach is reflected in the scientific and practical publications on the effectiveness of the comparative assessment of “Aller Aqua” and “Aquafeed Fischfutter” for feeding rainbow trout.

According to the results of the study, the proposed types of feed were found to affect the studied parameters in different ways. Thus, the best positive results were obtained in the assessment of both the morphological and biochemical components of the blood when feeding fish with “Aller Aqua” granulated feed. It should also be emphasized that, despite some higher cost of this feed, the

economic efficiency compared to the "Aquafeed Fischfutter" feed is higher.

Originality. A comparative study of the growth and development of rainbow trout, as well as its table value, was carried out under the conditions of using "Aller Aqua" granular feeds and "Aquafeed Fischfutter".

Practical value. The main task of table trout culture is to grow fish in the best possible time and with minimal costs. One of the main factors influencing the intensity of fish growth is maintaining optimal conditions of cultivation and fully balanced nutrition. This approach is reflected in the materials of the scientific and practical publication on the effectiveness of the comparative assessment of "Aller Aqua" and "Aquafeed Fischfutter" for feeding rainbow trout. The efficient use of feed mixtures will allow obtaining high qualitative table products in a short time.

Key words: hematological parameters, rainbow trout, "Aller Aqua" feed, "Aquafeed Fischfutter", fish industry, trout mix, metabolic processes, diet, growth rate, fishery research, fish production, feed rate, feed costs, energy value, feed nutritive value.

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОРЕЛИ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ КОРМОВ «ALLER AQUA» И «AQUAFEEF FISCHFUTTER»

І. Ю. Бобель, Irynabobel@gmail.com, Львовський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, г. Львів

Я. І. Пивторак, feeding@lvet.edu.ua, Львовський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, г. Львів

Цель. Изучение влияния кормов производителей «Aller Aqua» рецептур Futura, Performa и Gold, а также «Aquafeed Fischfutter» рецептур LF 44/26 EX, FM 50/16 EX, FB 52/20 EX на темп роста, гематологические и продуктивные показатели радужной форели, в зависимости от возрастной группы.

Методика. Исследования проводились по общепринятым в рыбоводстве методикам. Образцы крови отбирали из сердца с помощью шприца и инъекционной иглы, которую вводили с брюшной стороны по сагиттальной линии между грудными плавниками. Исследование образцов крови осуществляли по методикам, полученным В. В. Влизло и И. П. Кондрахиным. Гематологические показатели определяли стандартными методами, принятыми в рыбоводстве. Концентрацию эритроцитов определяли пробирочным методом с использованием консервирующего раствора, микроскопа и камеры Горяева, лейкоциты — косвенным методом на мазке крови, гемоглобин — гемиглобинцианидным методом на спектрометре. Кроме этого, был определен общий белок в сыворотке крови рефрактометрически, скорость оседания эритроцитов — с помощью СОЭ-метра.

Статистическую обработку материалов исследований осуществляли общепринятыми методами вариационной статистики с оценкой (M), его погрешности (m) и расчетами достоверности различий по критериям Стьюдента с использованием программного обеспечения «Microsoft Excel».

Результаты. Научно-производственный эксперимент проводился в условиях ООО «Западная рыбная компания» Пустомытовского района Львовской области. В основу проведения исследований легла задача по оптимизации нормированного кормления радужной форели по схеме, предусматривающей сравнительную оценку влияния вышеуказанных гранулированных кормов на рыбоводные показатели и экономику выращивания, а также на морфологические и биохимические показатели крови, в частности оценку динамики изменений лейкоцитарной формулы, позволяющей учесть состояние кроветворных органов и иммунной системы в целом.

Основной задачей товарного форелеводства является выращивание рыбы в наиболее оптимальный промежуток времени с минимальными затратами. Одним из основных факторов, который влияет на интенсивность роста рыбы, является соблюдение

оптимальных условий выращивания и полноценного сбалансированного кормления. Именно такой подход отражен в материалах научно-практической публикации, касающейся сравнительной оценки эффективности кормов «Aller Aqua» и «Aquafeed Fischfutter» в кормлении радужной форели.

Установлено, что опытные рецепты кормов по-разному влияют на исследуемые показатели. Так, получены несколько лучшие результаты, как по морфологическим, так и биохимическим компонентам крови, при скармливании гранулированного корма фирмы «Aller Aqua» (рецептур Futura, Performa и Gold). Следует также отметить, что, несмотря на несколько более высокую стоимость этого корма, экономическая эффективность по сравнению с кормами фирмы «Aquafeed Fischfutter» оказалась выше. Рентабельность производства была на 2% больше.

Научная новизна. Впервые осуществлены сравнительные исследования роста и развития радужной форели, при использовании гранулированных кормов производства фирм «Aller Aqua» и «Aquafeed Fischfutter», а также экономической эффективности их скармливания.

Практическая значимость. Разработана и предложена усовершенствованная программа кормления форели, обеспечивающая потребности рыб на каждом этапе выращивания. Доказана экономическая эффективность внедрения усовершенствованной технологии кормления, которая апробирована в производственных условиях ООО «Западная рыбная компания». Зоотехническая эффективность использования в кормлении радужной форели кормов Aller Aqua с рецептурами, соответствующими возрасту, доказана на всех возрастных группах.

Ключевые слова: радужная форель, корма фирм «Aller Aqua» и «Aquafeed Fischfutter», нормированное кормление, темп роста, морфологические, биохимические и продуктивные показатели.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Завдяки інтенсивному розвитку промислового виробництва гранульованих кормів для годівлі риб у водоймах із замкнутим водопостачанням, починаючи з початку 90-х років минулого століття їх ефективність різко зросла, що було досягнуто в результаті підвищення рівня енергії, кормів, а також врівноваженим балансуванням кількості необхідних поживних та біологічно-активних речовин [4]. Повноцінна нормована годівля справляє безпосередній вплив на економічну ефективність вирощування риби, зокрема, форелі [3]. Норми згодовування корму залежать від його рецептури, температури води і вмісту в ній розчиненого кисню, фізіологічного стану організму риби [5, 6].

Лососеві риби оксифільні, в процесі їх вирощування вміст розчиненого кисню у воді повинен бути не менше 7 мг/дм³. Оптимальна температура води при годівлі форелі становить 14–16°C. Величину добового раціону розраховують з урахуванням цих параметрів та маси риб, що залежить від функціонального стану їхнього організму, активності та умов утримання. Вона може коливатися в межах 20% від норми. Окрім цього, на ефективність годівлі в форелевих господарствах негативно впливають високі щільності посадки, антисанітарні умови утримання, хвороби, рівень водообміну та вмісту у воді кисню [7]. У зв'язку з тим, що витрати на корми при вирощуванні форелі складають понад 60% від усіх витрат, проблема раціонального їхнього використання та економії є пріоритетним завданням. Важливо також наголосити і на якісних характеристиках кормів, із врахуванням регіональних особливостей виробничих потужностей [8].

Таким чином, прослідковується необхідність подальшого вивчення впливу кормового чинника на інтенсивність росту і розвитку райдужної форелі при вирощуванні в умовах замкнутого водопостачання.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Одним з основних чинників, який впливає на інтенсивність росту риби, є дотримання оптимальних умов вирощування і повноцінно збалансованої годівлі. Основним завданням товарного форелівництва є вирощування риби в найбільш оптимальний проміжок часу із мінімальними звитратами. Саме такий підхід відображено у матеріалах науково-практичної публікації щодо порівняльної оцінки ефективності кормів «Aller Aqua» і «Aquafeed Fischfutter» в годівлі райдужної форелі [9]. Рациональне використання кормів дозволить отримати якісну товарну продукцію у короткі терміни.

Дослідження морфологічних і біохімічних компонентів крові за згодовування різних видів гранульованих кормів має важливе значення при оцінці якості годівлі, оскільки кров є чутливим та інформативним індикатором стану організму, швидко реагує на зміни як екзогенних, так і ендогенних чинників [10]. Динаміка біохімічних показників може слугувати маркером стану організму риб, характеризувати якість годівлі, дозволяє отримати додаткові дані щодо фізіологічного стану риби. Окрім цього, проблема годівлі посідає важливе місце при оцінці економічної ефективності виробництва.

Мета роботи полягала у вивченні впливу кормів «Aller Aqua» і «Aquafeed Fischfutter» на темпи росту, гематологічні та продуктивні показники райдужної форелі, починаючи від малька до товарної продукції.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Основний етап науково-господарського досліді проводився в умовах ПП «Західна рибна компанія» Пустомитівського району Львівської області. Об'єктом досліджень була молодь райдужної форелі. За принципом аналогів сформовано дві групи по 300 особин в кожній середньою масою 55,5 г (табл. 1). Дослідження проводили у басейнах круглої форми об'ємом 2 м³. Тривалість експерименту склала 360 діб.

Форель першої дослідної групи споживала комбікорм фірми Aller Aqua, відповідної до віку рецептури, що задавався у кількості, яка б відповідала періоду вирощування, масі риби та розміру гранул. Форель 2-ї дослідної групи споживала комбікорм виробництва фірми Aquafeed Fischfutter, рецептури, яка б відповідала віку вирощування, у розрахунку на 1 кг маси риби.

Корм рецептури Aller Futura EX — 1.5 мм, містить у своєму складі вітаміни і мінерали, дріжджі, крилеве борошно, пшеницю, пшеничну клейковину, риб'ячий жир та рибне борошно. Вміст протеїну становить 58%, жиру — 17%, вуглеводів — 7%, золи — 10,1%, фосфору — 1,2 %. Енергетична цінність корму складає 21,6 МДж [11].

Aller Performa — 2 мм, за своїм складом відрізняється додатково вмістом кукурудзяної клейковини, борошна з домашньої птиці, пір'яного борошна, соняшникового протеїну, рапсової олії, соєвого протеїну та сої. Відповідно до

складу вміст протеїну становить 45%, жиру — 20%, вуглеводів — 17,9%, золи — 7,1%, фосфору — 1,0%. Енергетична цінність корму складає 21,9 МДж [11].

Продукційний корм рецептури Aller Gold — 4,5 мм, містить вітаміни і мінерали, боби, крилеве борошно, кукурудзяну клейковину, борошно з домашньої птиці, пир'яне борошно, соняшниковий протеїн, пшеницю, пшеничну клейковину, рапсову олію, риб'ячий жир, рибне борошно, соєвий протеїн та сою. Вміст протеїну у даному кормі складає 42–44%, жиру — 28–30%, вуглеводів — 12,5–15,5%, золи — 6–8%, фосфору — 0,9%. Енергетична цінність корму складає 23,9–26,9 МДж [11].

Корм Aquafeed Fischfutter FB 52/20 EX є стартовим, із оптимальним співвідношенням енергії і протеїну. Виключне використання рибного борошна в якості єдиного джерела сирого протеїну гарантує максимальну біологічну цінність білка. Кількість крохмалю, що створює затримку при обміні речовин, зведено на мінімум. Корм характеризується оптимальним зануренням і стабільністю у воді протягом 24 год. Енергетична цінність корму складає 22,3 МДж, вміст протеїну — 52%, жиру — 20%, БЕР — 11,4%, золи — 6,8%, клітковини — 1,0% та фосфору — 1,4% [12].

Aquafeed Fischfutter FM 50/16 EX є двошнековим екструдатом. Співвідношення енергії і протеїну становить 441 кДж перетравної енергії. Таким чином, корм FM 50/16 EX призначений для цього літо і гарантує плавний перехід від високоспеціалізованих кормів для форелі до продукційних. Високий вміст обмінної енергії є передумовою для збільшення показників засвоєння поживних речовин корму. Енергетична цінність корму складає 21 МДж, вміст протеїну — 50%, жиру — 16%, БЕР — 7%, золи — 6,6%, клітковини — 1,7% та фосфору — 1,2% [12].

Гранульований корм Aquafeed Fischfutter рецептури LF 44/26 EX містить у своєму складі рибне борошно, риб'ячий жир, пшеницю, піддану гідротермічній обробці, борошно з м'яса птиці, гемоглобіновий порошок, рапсове насіння, пир'яне борошно, високопротеїнову сою, премікс вітамінів і мікроелементів. Енергетична цінність даного корму становить 23,8 МДж, протеїну — 44,0%, жиру — 26,0%, БЕР — 8,5%, золи — 6%, клітковини — 1,5% та фосфору — 1,1% [12].

У період дослідження температура води у басейнах коливалась в межах від 9 до 16°C, в зимовий — від 4 до 8°C. Повна заміна води в басейнах проводилась кожні 60 хвилин. Витрати води на 1 кг живої маси риб склали 2 дм³/хв.

Вода, яка надходила з підземних природних джерел, містила недостатню для життєдіяльності форелі кількість кисню, тому її додатково аерували. Оскільки форель є надзвичайно вимогливою до вмісту кисню у воді, то необхідно забезпечити потрібний рівень вказаного показника, що для даного виду риби становить 11 мг/дм³. Дільниця господарства оснащена двома турбоаераційними колонами, де здійснюється насичення води киснем. Концентрація кисню на виході із системи складає 15 мг/дм³, що неможливо отримати іншими методами оксигенерації.

Упродовж експерименту проводили дослідження росту і розвитку райдужної форелі. Для цього щомісяця вибірково зважували по 10 екз. форелей з кожного басейну: на початку, середині і кінці досліду, та визначали відносний і абсолютний темпи росту.

Таблиця 1. Схема науково-виробничого досліджу, n = 300

Table 1. Scheme of scientific and industrial experiment, n = 300

Дослідні басейни / Experimental pools	
1	2
Особливості годівлі форелі / Features of feeding trout	
Гранульована кормова суміш фірми Aller Aqua / Granulated feed mixture of the company Aller Aqua	Гранульована кормова суміш фірми Aquafeed Fischfutter / Granulated feed mixture of the company Aquafeed Fischfutter

Зразки крові відбирали з серця за допомогою ін'єкційної голки, яку вводили із черевного боку по сагітальній лінії між грудними плавцями. Гематологічні показники визначали за стандартними методами, прийнятими у рибництві. Концентрацію еритроцитів визначали пробірковим методом із використанням консервуючого розчину, мікроскопа і камери Горяєва, лейкоцити — непрямим методом на мазку крові, гемоглобін — гемоглобінціанідним методом на спектрометрі. Окрім цього, був визначений загальний білок у сироватці крові рефрактометрично, швидкість осідання еритроцитів за допомогою ШОЕ-метра.

Статистичну обробку матеріалів досліджень здійснювали загальноприйнятими методами варіаційної статистики з оцінкою (M), його похибки (m) і розрахунками вірогідності різниць за критеріями Стьюдента з використанням програмного забезпечення «Microsoft Excel».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Дослідження метаболітів крові з метою контролю функціонального стану організму форелі в залежності від впливу досліджуваного годівельного чинника наведені у таблиці 2. Порівняльний аналіз гематологічних показників за умов впливу годівельного чинника показав незначне підвищення вмісту еритроцитів, а також гемоглобіну на 10,7-9,7% в крові риб, яким згодовувались корми Aller Aqua.

Таблиця 2. Морфологічні компоненти крові піддослідних груп форелі та фагоцитарна активність (M ± m, n = 10)

Table 2. Morphological components of blood of trout and phagocytic activity (M ± m, n = 10)

Показник / Indicator	Басейни і періоди досліджу / Pools and periods of experiment					
	1			2		
	початок / start	середина / middle	кінець / end	початок / start	середина / middle	кінець / end
Еритроцити, Т/л / Erythrocytes, ths/l	1,08 ± 0,07	1,18 ± 0,09***	1,21 ± 0,11	1,09 ± 0,06	1,10 ± 0,05***	1,13 ± 0,09
Гемоглобін, г/л / Hemoglobin, g/l	103 ± 0,08***	108 ± 0,11***	114 ± 0,14***	104 ± 0,12***	105 ± 0,12***	106 ± 0,09***

Продовження табл. 2
Continuation of the table. 2

Показник / Indicator	Басейни і періоди дослідів / Pools and periods of experiment					
	1			2		
	початок / start	середина / middle	кінець / end	початок / start	середина / middle	кінець / end
Лейкоцити, Г/л / Leukocytes, g/l	22,3 ± 0,09	22,2 ± 0,12	22,0 ± 0,09	22,2 ± 0,10	22,3 ± 0,09	22,3 ± 0,09
Фагоцитарна активність, % / Phagocytic activity, %	40,1 ± 2,21	43,7 ± 1,87	44,1 ± 1,91	40,2 ± 2,20	40,8 ± 2,22	41,1 ± 2,19

Примітка: *p < 0,05, **p < 0,01, *** p < 0,001

Notes: *p < 0,05, **p < 0,01, *** p < 0,001

У риб еритроцити виконують функції транспортування кисню, вуглекислого газу та інших поживних речовин [6].

Що стосується лейкоцитів, їхній вміст знаходився на однаковому рівні і не залежав від досліджуваного чинника.

Проте, за фагоцитарною активністю нейтрофілів у крові піддослідних риб спостерігало незначне їх зростання на 4,0–0,9% у басейні, де згодовувались корми Aller Aqua.

Біохімічний профіль крові піддослідних риб в залежності від згодовування різного виду кормів наведений у таблиці 3.

Таблиця 3. Біохімічний профіль крові піддослідних груп форелі (M ± m, n = 10)

Table 3. Biochemical blood profile of experimental trout groups (M ± m, n = 10)

Показник / Indicator	Басейни і періоди дослідів / Pools and periods of experiment					
	1			2		
	початок / start	середина / middle	кінець / end	початок / start	середина / middle	кінець / end
Загальний білок, г/л / Total protein, g/l	60,00 ± 1,36	61,70 ± 1,37	62,70 ± 1,44	59,60 ± 1,19	60,10 ± 1,21	60,50 ± 1,21
Альбуміни, г/л /, Albumins g/l	24,50 ± 1,62	24,60 ± 1,61	24,90 ± 1,63	24,20 ± 1,33	24,50 ± 1,34	24,30 ± 1,34
Глобуліни, г/л / Globulins, g/l	35,50 ± 2,07	37,10 ± 2,11	37,80 ± 2,13	35,40 ± 2,05	35,60 ± 2,08	36,20 ± 2,12
α-глобуліни, г/л / α-globulins, g/l	11,80 ± 0,65	12,04 ± 0,57	12,60 ± 0,67	11,80 ± 0,53	11,90 ± 0,51	12,00 ± 0,63
β-глобуліни, г/л / β-globulins, g/l	12,40 ± 0,45	13,00 ± 0,35	13,20 ± 0,38	12,10 ± 0,40	12,20 ± 0,41	12,10 ± 0,40

Показник / Indicator	Басейни і періоди дослід / Pools and periods of experiment					
	1			2		
	початок / start	середина / middle	кінець / end	початок / start	середина / middle	кінець / end
γ-глобуліни, г/л / γ-globulins, g/l	11,30 ± 0,65	11,70 ± 0,63	12,00 ± 0,67	11,50 ± 0,65	11,50 ± 0,63	12,10 ± 0,68
Білковий коефіцієнт, Ai / Albumin-globulin ratio, Ai	0,59 ±0,05***	0,60 ± 0,03	0,60 ± 0,04	0,59 ±0,05***	0,59 ± 0,05	0,60 ± 0,05
АсАТ, од./л / Aspartate aminotransferase, units/l	45,00 ± 1,77	43,00 ± 1,58	41,00 ± 1,09	46,00 ± 1,58	42,00 ± 1,09	41,00 ± 1,70
АлАТ, од./л / Serum glutamic pyruvic transaminase, units/l	23,00 ± 1,40	22,00 ± 1,84	20,00 ± ,15	22,00 ± 1,45	20,00 ± 1,74	21,00 ± 1,17
Глюкоза, ммоль/л / Glucose, mmol / l	2,56 ± 0,07	2,90 ± 0,05	2,94 ± 0,05	2,51 ± 0,06	2,77 ± 0,08	2,79 ± 0,07
Каротин, мг% / Carotene, mg%	0,50	0,52	0,52	0,51	0,51	0,52
Кальцій загальний, ммоль/л / Total calcium, mmol/l	2,61 ± 0,70	2,68 ± 0,90	2,84 ± 0,76	2,60 ± 0,68	2,67 ± 0,71	2,74 ± 0,76
Фосфор неорганічний, ммоль/л / Phosphorus inorganic, mmol/l	1,59 ± 0,44	1,62 ± 0,42	1,67 ± 0,36	1,60 ± 0,45	1,65 ± 0,43	1,66 ± 0,44

Примітка: *p < 0,05, **p < 0,01, *** p < 0,001.

Notes: *p < 0,05, **p < 0,01, *** p < 0,001.

Білки крові є будівельним матеріалом, як для клітин, так і тканин організму [6]. Тому рівень основних білків крові — альбумінів і глобулінів — характеризує забезпеченість риби білками корму.

Аналізуючи ці показники, встановлено, що кількість загального білка і його фракцій в крові форелі постійно зростала, особливо у риб першого басейну. На початку дослідів вміст загального білка у крові риб становив у середньому 60,0 г/л, збільшившись до 62,7 г/л до кінця досліджень.

Ферменти крові є біологічними каталізаторами, які беруть участь у всіх життєво важливих процесах організму, і за якими також можна робити висновок про їх перебіг. Враховуючи те, що в синтезі білка найбільше значення мають ферменти, які каталізують ці перетворення, активну участь при цьому бере глутамінова кислота, а саме, так звані трансамінази крові [13]. В зв'язку з цим,

нами було проаналізовано активність аспартат- (АсАТ) та аланінамінотрансферази (АлАТ) за дії досліджуваного чинника.

Проведені дослідження встановили деяке зниження активності цих ферментів, яка підвищується за нестачі глюкози та її синтезу з амінокислот [5].

Швидкість ферментних реакцій залежить і від концентрації мінеральних елементів. Зокрема, особливу увагу приділяють кальцію і фосфору. Результати наших досліджень встановили підвищення мінерального статусу крові при годівлі риб кормами Aller Aqua та Aquafeed Fischfutter, зокрема, кальцію — у середньому на 7%, та фосфору — на 4,4%.

При оцінці показників білої крові риб (табл. 4) не виявлено відмінностей в кількості лейкоцитів у риб як першого, так і другого басейнів. Важливе значення при їх визначенні має диференційований підрахунок окремих видів білих клітин. Зміни умов годівлі, а також вирощування можуть підсилювати функції одних лейкоцитів та послаблювати інші [14]. Так, на початку дослідів кількість нейтрофілів у крові риб обох басейнів в середньому становила 18,8%. За впливу досліджуваного кормового чинника встановлено їх зростання в середині та кінці дослідів, особливо у риб першого басейну, де їхня кількість збільшилась до 19,9%. В той же час, спостерігала тенденція до зменшення кількості поліморфноядерних клітин.

Таблиця 4. Динаміка змін лейкоцитарної формули та вміст загальних ліпідів в крові дослідних груп риб ($M \pm m$, $n = 10$)

Table 4. Dynamics of changes in leukocyte formula and total lipid content in the blood of experimental groups of fish ($M \pm m$, $n = 10$)

Показник / Indicator	Басейни і періоди дослідів / Pools and periods of experiment					
	1			2		
	початок / start	середина / middle	кінець / end	початок / start	середина / middle	кінець / end
Лейкоцити, г/л / Leukocytes, g/l	22,30 $\pm 0,09$	22,20 $\pm 0,12$	22,3 $\pm 0,09$	22,20 $\pm 0,10$	22,30 $\pm 0,09$	22,30 $\pm 0,09$
Нейрофіли, % / Neutrophils, %	18,95 $\pm 0,12$	19,40 $\pm 0,020$	19,90 $\pm 0,17^*$	18,65 $\pm 0,11$	19,65 $\pm 0,11$	19,25 $\pm 0,15$
Поліморфноядерні, % / Polymorphonuclear, %	4,75 $\pm 0,07^{***}$	4,30 $\pm 0,05^*$	3,60 $\pm 0,11^{***}$	4,15 $\pm 0,06^{***}$	4,50 $\pm 0,08^*$	4,20 $\pm 0,06^{***}$
Лімфоцити, % / Lymphocytes, %	59,5 $\pm 0,55$	59,65 $\pm 0,60$	60,45 $\pm 0,48$	59,80 $\pm 0,41$	59,30 $\pm 0,40$	61,35 $\pm 0,48$
Моноцити, % / Monocytes, %	16,80 $\pm 0,13^{**}$	16,65 $\pm 0,12$	16,05 $\pm 0,09^{***}$	17,40 $\pm 0,13^{**}$	16,55 $\pm 0,11$	15,20 $\pm 0,07^{***}$
Загальні ліпіди, ммоль/л / Total lipids, mmol/l	3,66 $\pm 3,33$	3,74 $\pm 3,83$	3,80 $\pm 3,71$	3,64 $\pm 3,22$	3,68 $\pm 3,61$	3,70 $\pm 3,06$

Примітка: * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$.

Notes: * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$.

Не виявлено суттєвого впливу кормового чинника на зміни кількості моноцитів та лімфоцитів від загальної концентрації лейкоцитів.

Для детальнішої оцінки впливу досліджуваного кормового чинника на функціональний стан організму райдужної форелі ми провели дослідження показника загальних ліпідів у крові риб. Рівень жирів в плазмі крові на початковому етапі в обох басейнах експерименту складав в середньому 3,65 ммоль/л. в середині досліду спостерігалось зростання даного показника, особливо у крові форелі першого басейну, де цей показник зріс на 2%. На кінець досліду ця тенденція дещо нівелювала.

За результатами фізіолого-біохімічних досліджень встановлено, що досліджувані рецепти кормів різним чином впливають на вищевказані показники. Так, отримано дещо кращі результати як за морфологічними, так і за біохімічними компонентами крові за згодовування гранульованого корму рецептур, які відповідають віку вирощуваної риби, виробництва фірми Aller Aqua.

Попри дещо вищу вартість цього корму, економічна ефективність, у порівнянні з кормом досліджуваних рецептур виробництва фірми Aquafeed Fischfutter, є вищою (табл. 5).

Зокрема, отримано від реалізації риби першого басейну 9 372 грн чистого прибутку, у порівнянні із другим — 8 606 грн, або на 766 грн більше. Рентабельність становила відповідно 58,6 та 56,6%, або ж на 2,0% вище при використанні корму Aller Aqua (див. табл. 5).

Таблиця 5. Оцінка продуктивної та економічної ефективності вирощуваних груп риб

Table 5. Assessment of productive and economic efficiency of fish groups

Показники / Indicator	Басейни / Pools	
	1	2
Кількість риби, екз. / Number of fish, ind.	300	300
m _{сер.} початкова, г / m _{middle} start, g	55,5	55,5
m _{сер.} кінцева, г / m _{middle} end, g	355,6	337,7
Приріст, кг / Rate of growth, kg	0,30	0,28
Витрати кормів на приріст маси риб, од. / Feed costs for the rate of fish weight growth, units	1,00	1,12
Вартість корму, грн/кг / Cost of feed, UAH / kg	51	48
Вартість всієї продукції, грн / The cost of all products, UAH	16 002	15 196
Собівартість отриманої продукції, грн / The cost of the result products, UAH	6 630	6 590
Чистий прибуток, грн / Net profit, UAH	9 372	8 606
Рентабельність, % / Profitability, %	58,6	56,6

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Отримані результати досліджень відображають наявність прямого зв'язку між фізіолого-біохімічними показниками організму форелі та годівельним чинником.

Важливо при цьому відмітити, що годівля риб гранульованими кормами Aller Aqua і Aquafeed Fischfutter різним чином впливала на продуктивні та економічні показники при вирощуванні форелі.

Отже, проведені експериментальні дослідження дають підставу стверджувати про дещо кращі кормові показники гранульованого корму фірми Aller Aqua та рекомендувати його до використання у годівлі райдужної форелі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині : довідник / Влізло В. В. та ін. ; ред. Влізло В. В. Львів : Сполом, 2012. 764 с.
2. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики : справочник / ред. Кондрахин И. П. Москва : Колос, 2004. 520 с.
3. Півторак Я. І., Бобель І. Ю. Інтенсивність росту і розвитку райдужної форелі за використання кормів Aller Aqua та Aquafeed Fischfutter // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. 2017. Т. 19, № 79. С. 73—77. (Серія : Сільськогосподарські науки). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2017_19_79_17 (дата звернення 20.01.2019).
4. Божик В. Й., Бачук Є. О. Сучасний стан і перспективи розвитку форелівництва в Західному регіоні України // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Гжицького. 2014. Т. 16, № 3(3). С. 26—31. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_3\(3\)_7](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_3(3)_7) (дата звернення 20.01.2019).
5. Грициняк І. І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб. Київ, 2007. 239 с.
6. Єгоров Б. В. Технологія виробництва комбікормів : підруч. для вищих навч. закладів. Одеса : Друкарський дім, 2011. 448 с.
7. Гриневич Н. Є. Динаміка змін фізіологічного стану і гематологічних показників райдужної форелі під час запуску біофільтра в установках замкненого водовикористання // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. 2018. Т. 20, № 83. С. 19—24. (Серія : Ветеринарні науки). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnuvmvbn_2018_20_83_6 (дата звернення 20.01.2019).
8. Бобель І. Ю., Півторак Я. І. Стратегія ефективності годівлі форелі кормами Aller aqua // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. 2018. Т. 20, № 84. С. 88—92. (Серія : Сільськогосподарські науки). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnuvmvbcgn_2018_20_84_18 (дата звернення 20.01.2019).
9. Бобель І. Ю., Півторак Я. І. Економічна ефективність вирощування товарної форелі у фермерських господарствах Західної України за умов годівлі кормами Aller Aqua // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. 2018. Т. 20, № 89. С. 71—74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnuvmvbcgn_2018_20_89_18 (дата звернення 20.01.2019).

10. Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб / Шерман І. М. та ін. Київ : Вища освіта, 2002. 128 с.
11. Активність трансаміназ в організмі прісноводних риб за дії йонів заліза / Рабченко О. О. та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2016. № 1. С. 130—134. (Серія : Біологія). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_2016_1_23 (дата звернення 20.01.2019).
12. Методические указания по проведению гематологического обследования рыб / Минсельхозпрод России. Москва, 1999. 16 с.

REFERENCES

1. Vlizlo, V. V., Fedoruk, R. S., & Ratych, I. B. (2012). *Laboratorni metody doslidzhen'u biologii', tvarynnyctvi ta veterynarnij medycyni: dovidnyk*. L'viv: Spolom.
2. Kondrahin, Y. P., Arhipov, A. V., & Levchenko, V. Y., et al. (2004). *Metody veterynarnoj klini`cheskoj laboratornoj diagnostiki: spravochnik*. Moskva: Kolos.
3. Pivtorak, J. I., & Bobel, I. Y. (2017). Intensity of growth and development of rainbow trout using feeds Aller Aqua and Aquafeed Fischfutter. *Scientific Messenger LNUVMB*, 19(79), 73-77.
4. Bozhyk, V. Y. (2014). Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku foelivnytstva v zakhidnomu rehioni Ukrainy. *Naukovyi visnyk LNUVMBT im. Hzhetskoho*, 3(60), 2-31.
5. Grycynyak, I. I. (2007). *Naukovo-praktchni osnovy racionalnoyi godivli ryb*. Kyiv: Rybka moja.
6. Yegorov, B. V. (2011). *Tehnologiya vyrobnyctva kombikormiv*. Odesa: Drukarskyj dim.
7. Grynevych, N. Y. (2018). Dynamika zmin fiziologichnogo stanu i gematologichnykh pokaznykiv rajduzhnoyi foreli pid chas zapusku biofiltra v ustanovkakh zamknenogo vodovykorystannya. *Naukovyy visnyk LNUVMB imeni S.Z. Gzhczkogo*, 20(83), 19-24.
8. Bobel, I. Y., & Pivtorak, J. I. (2018). Strategia efektyvnosti hodivli foreli kormamy Aller aqua. *Scientific Messenger LNUVMB*, 20 (84), 88-92.
9. Bobel, I. Y., Pivtorak, J. I. (2018). Economic efficiency of growing commodity trout in farms in the Western Ukraine while feeding with forages Aller Aqua. *Scientific Messenger LNUVMB*, 20 (79), 71-74.
10. Sherman, I. M., Grynzhovskyj, M. V., & Zheltov, Yu. O., et al. (2002). *Naukove obgruntuvannya racionalnoyi godivli ryb*. Kyiv: Vyshcha osvita.
11. Rabcheniuk, O. O., Byiak, V. Ia., Khomenchuk, V. O., & Kurant, V. Z. (2016). Aktyvnist transaminaz v orhanizmi prsnovodnykh ryb za dii yoniv zaliza. *Naukovi zapysky TNPU im. Volodymyra Hnatiuka. Seriya: Biolohiia*, 1 (65), 130-134.
12. *Metodicheskie ukazaniya po provedeniju gematologicheskogo obsledovaniya ryb* (1999). Moskva: Minsel'hozprod.

ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РИБ ТА СКЛАД ЇХНІХ ПАРАЗИТОЦЕНОЗІВ

Ю. О. Коваленко, kovalenkoyuliia888@gmail.com, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

О. О. Шлапак, olga.shlapak@outlook.com, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

О. С. Потрохов, alport@bigmir.net, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

О. Г. Зіньковський, hydrobiol@igb.abc.com.ua, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Мета роботи. Встановити характер змін фізіолого-біохімічних показників риб, якісного та кількісного складу їхніх паразитоценозів залежно від різного ступеня забруднення водойм.

Методика. У роботі наведені результати визначення гідрохімічного складу води озер м. Києва, структури їхньої кормової бази (зообентосу). Як маркерні морфо-фізіологічні ознаки карася сріблястого, краснопірки звичайної та плітки звичайної використовували індекс печінки та селезінки. У плазмі крові риб досліджено вміст глюкози, кортизолу та тиреоїдних гормонів. Збір та опрацювання іхтіологічного матеріалу виконано у відповідності до загальновизнаних методів. Встановлення таксономічної належності паразитів здійснювались за відповідними визначниками.

Результати. У роботі наведено декілька важливих гідрохімічних характеристик дослідних озер, розвиток кормової бази риб — організмів зообентосу, фізіолого-біохімічних показників окремих представників корокових видів риб у озерах м. Києва, які зумовлені різним ступенем антропогенного навантаження. Насамперед, було досліджено індекси внутрішніх органів та низку біохімічних показників плазми крові риб.

Паразитоценози виявилися специфічними для кожного озера. Найменша їх чисельність була в оз. Лугове, яке характеризується суттєвим антропогенним навантаженням. В оз. Бабиному, яке взято за умовний контроль, були наявні паразити риб, що не зустрічалися в інших озерах. У краснопірки з оз. Кирилівське, інвазованої паразитами, спостерігався вищий індекс селезінки на 13% ($r = 0,98$). Також у заражених риб з оз. Кирилівське та Лугове був встановлений вищий вміст трийодтироніну (T_3) у плазмі крові у 2,2 рази ($r = 0,82$ та $r = 0,75$ відповідно) порівняно з рибами з оз. Бабине.

Встановлено, що у плітки з оз. Кирилівське індекс селезінки більший на 16% ($r = -0,83$) відносно плітки з оз. Бабине. У плітки з оз. Кирилівське вміст кортизолу в крові виявився меншим у 4,7 ($r = -0,83$) та T_3 у 4,0 рази ($r = -0,71$) порівняно з рибами з оз. Бабине. У карася з оз. Кирилівське та Лугове індекси селезінки були меншими на 44 та 37%, у порівнянні з рибами з оз. Бабине. Крім того, у карася з оз. Лугове відмічався менший вміст кортизолу та T_3 у 1,7 та 1,5 рази відповідно порівняно з рибами оз. Бабине. Можна припустити, що досліджені види риб різним чином реагують на сукупний вплив антропогенного навантаження.

© Ю. О. Коваленко, О. О. Шлапак, О. С. Потрохов, О. Г. Зіньковський, 2019

Наукова новизна. Вперше використано різнорівневі маркери (морфо-фізіологічні, біохімічні та паразитологічні) для встановлення реакції риб на комплексний антропогенний вплив в умовах водойм урбанізованих територій.

Практична важливість. Отримані дані необхідні для визначення закономірностей пристосувальних реакцій господарсько цінних видів корокових риб, їхніх паразитів і кормових об'єктів за дії несприятливих умов урбанізації. Досліджені фізіолого-біохімічні показники риб можна використовувати для оцінки якості води водойм.

Ключові слова: карась, краснопірка, плітка, пристосування, озеро, антропогенне навантаження, кормова база, ектопаразити, ендопаразити.

EFFECT OF ANTROPOGENIC POLLUTION ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF FISH AND COMPOSITION OF THEIR PARASITOCENOSES

Ju. Kovalenko, kovalenkoyuliia888@gmail.com, Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv

O. Shlapak, olga.shlapak@outlook.com, Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv

A. Potrokhov, alport@bigmir.net, Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv

O. Zin'kovskiy, hydrobiol@igb.ibc.com.ua, Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv

Purpose. To establish the nature of changes in physiological and biochemical parameters of fish, the qualitative and quantitative composition of their parasitocenoses, depending on the degree of the pollution of water bodies.

Methodology. The paper contains the results of the determination of hydrochemical composition of water from the lakes of Kyiv, the structure of their food supply (zoobenthos). As a marker of morpho-physiological features of the Prussian carp, rudd and roach, their liver and spleen indices were used. The content of glucose, cortisol and thyroid hormones was determined in fish blood plasma. The collection and processing of ichthyological material was performed in accordance with generally accepted methods. The taxonomic identification of parasites was carried out according to the appropriate identification keys.

Findings. The work presents some hydrochemical characteristics of the lakes under study, the development of the natural food supply for fish - zoobenthic organisms, changes in the physiological and biochemical parameters of some representatives of cyprinids in the lakes of Kyiv, which are subjected to different degrees of human impact. First of all, the indices of internal organs and a number of biochemical parameters of fish blood plasma were studied.

Parasitocenoses were specific for each lake. Their smallest number was in the lake Luhove, which was characterized by a significant human impact. The lake Babyne, which was taken as conditional control, had some fish parasites, which were not found in other lakes. The rudd from the lake Kyrylivske invaded with parasites had a 13% higher spleen index ($r = 0.98$). Also, the infected fish from the Kyrylivske and Luhove lakes had a 2.2-fold higher content of triiodothyronine (T_3) in the blood plasma ($r = 0.82$ and $r = 0.75$, respectively) compared with fish from the lake Babyne.

The spleen index of the roach from the lake Kyrylivske is 16% more ($r = -0.83$) compared to this species from the lake Babyne. The roach from the lake Kyrylivske had a 4.7 times smaller number of cortisol in the blood ($r = -0.83$) and 4 times lower T_3 level ($r = -0.71$) compared to fish from the lake Babyne. The Prussian carp from the Kyrylivske and Luhove lakes had spleen indices were lower by 44 and 37%, and the glucose content was 3.6 and 2.7 times lower in comparison with fish from the lake Babyne. In addition, the Prussian carp from lake Luhove had a lower content of cortisol and T_3 by 1.7 and 1.5 times, respectively, compared with fish from the lake Babyne. It can be assumed that the studied fish species have different sensitivity to the cumulative or individual effects of anthropogenic stress and parasites.

Originality. For the first time, multilevel markers (morphophysiological, biochemical and parasitological) were used to establish the response of fish to the complex human impact in the conditions of water bodies in urbanized territories.

Practical Value. The obtained data are necessary to determine the patterns of adaptive

reactions of economically valuable cyprinids, their parasites and forage objects under the action of adverse conditions of urbanization. The biochemical parameters of fish that can be used to assess the quality of water in water bodies were also studied.

Keywords: Prussian carp, rudd, roach, adaptations, lake, human impact, food supply, ectoparasites, endoparasites.

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫБ И СОСТАВ ИХ ПАРАЗИТОЦЕНОЗОВ

Ю. А. Коваленко, kovalenkoyuliia888@gmail.com, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

О.О. Шлапак, olga.shlapak@outlook.com, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

А. С. Потрохов, alport@bigmir.net, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

О. Г. Зиньковский, hydrobiol@igb.ibc.com.ua, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

Цель работы. Установить характер изменений физиолого-биохимических показателей рыб, качественного и количественного состава их паразитоценозов в зависимости от степени загрязнений водоемов.

Методика. В работе приведены результаты исследования гидрохимического состава воды из озер г. Киева, структуры их кормовой базы (зообентоса). В качестве маркерных морфо-физиологических признаков карася серебристого, красноперки обыкновенной и плотвы обыкновенной использовали индекс печени и селезенки. В плазме крови рыб было исследовано содержание глюкозы, кортизола и тиреоидных гормонов. Сбор и обработка ихтиологического материала выполнены в соответствии с общепринятыми методиками. Установление таксономической принадлежности паразитов осуществлялось по соответствующим определителям.

Результаты. В работе приведены некоторые гидрохимические характеристики исследуемых озер, развитие кормовой базы рыб — организмов зообентоса, изменения физиолого-биохимических показателей некоторых представителей карповых видов рыб в озерах г. Киева, которые подвергаются разной степени антропогенной нагрузки. Прежде всего, были исследованы индексы внутренних органов и ряд биохимических показателей плазмы крови рыб.

Паразитоценозы оказались специфическими для каждого озера. Наименьшая их численность была в оз. Луговом, которое характеризуется существенной антропогенной нагрузкой. В оз. Бабьем, принятом за условный контроль, были найдены паразиты рыб, которые не встречались в других озерах. У красноперки из оз. Кирилловское, инвазированной паразитами, наблюдался более высокий индекс селезенки — на 13% ($r = 0,98$). Также у зараженных рыб из оз. Кирилловское и Луговое наблюдалось более высокое содержание трийодтиронина (Т3) в плазме крови — в 2,2 раза ($r = 0,82$ и $r = 0,75$ соответственно) по сравнению с рыбами из оз. Бабье.

Установлено, что у плотвы из оз. Кирилловское индекс селезенки оказался больше на 16% ($r = -0,83$) относительно плотвы из оз. Бабье. Также у плотвы из оз. Кирилловское наблюдалось меньшее содержание кортизола в крови в 4,7 ($r = -0,83$) и Т3 в 4,0 раза ($r = -0,71$) по сравнению с рыбами из оз. Бабье. У карася из оз. Кирилловское и Луговое индексы селезенки были меньше на 44 и 37% по сравнению с рыбами из оз. Бабье. Кроме того, у карася из оз. Луговое отмечалось меньшее содержание кортизола и Т3 в 1,7 и 1,5 раза соответственно по сравнению с рыбами оз. Бабье. Можно предположить, что исследованные виды рыб имеют различную чувствительность к совокупному или отдельному влиянию антропогенной нагрузки и паразитов.

Научная новизна. Впервые использованы разноуровневые маркеры (морфо-физиологические, биохимические и паразитологические) для установления реакции рыб на комплексное антропогенное воздействие в условиях водоемов урбанизированных территорий.

Практическая значимость. Полученные данные необходимы для определения закономерностей приспособительных реакций хозяйственно ценных видов карповых рыб, их паразитов и кормовых объектов при воздействии неблагоприятных условий урбанизации. Исследованные биохимические показатели рыб можно использовать для оценки качества воды водоемов.

Ключевые слова: карась, красноперка, плотва, приспособления, озеро, антропогенная нагрузка, кормовая база, эктопаразиты, эндопаразиты.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Загальновідомо, що екологічна ситуація водойм України погіршується через значне техногенне забруднення води. Особливо це стосується озер, які мають невеликі об'єми води та знаходяться в межах мегаполісів [1]. Озер в нашій країні налічується близько 20 тис., і більшість з них вразливі до прямого або опосередкованого впливу людської діяльності, які викликають гідрохімічні зміни, а разом з ними і зміни у біоценозах [2]. Сукупність екосистемних змін, викликаних антропогенним впливом, може призвести до деградації популяцій окремих видів гідробіонтів, в тому числі — зменшення чисельності видів риби у водоймах [3].

Токсиканти, які потрапляють у водойми, призводять до виникнення явищ гострого чи хронічного стресу у гідробіонтів, зокрема риби. Вони можуть спричинити загибель чутливих автотрофів (продуцентів) та консументів першого рівня (зоопланктону, зообентосу). Це модифікує трофічну ланку або може її розірвати. Крім того, токсичне забруднення води впливає на життєдіяльність консументів другого й третього рівня (риби), у яких може виникати необхідність споживання нетипової для них їжі. Отруйні речовини можуть мати безпосередній або опосередкований вплив на розповсюдженість, інтенсивність та патогенність паразитів [4], що, у свою чергу, впливає на фізіологічний стан риби, адже комплексний вплив паразитів і забруднення може бути синергічним, та в кінцевому результаті більш шкідливим [4].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Озера м. Києва мають комплексне призначення, багато з них знаходяться у зонах значної урбанізації та використовуються для рекреації й любительського рибальства. Основними джерелами забруднення цих водойм є надходження токсикантів з поверхневим стоком, з каналізаційними стоками, з техногенним забрудненням (промислові, побутові підприємства, автозаправки тощо). Прикладом таких водних об'єктів є озера системи «Опечень» (Оболонський район, м. Києва), які характеризуються істотними екологічними та гідрохімічними порушеннями [5]. Дослідження домінуючих представників іхтіофауни та їхніх фізіолого-біохімічних показників, порівняння видового складу екто- та ендопаразитів риби у водоймах з різним ступенем антропопресії актуальні

з точки зору пошуку біомаркерів санітарно-паразитологічного стану водойм урбанізованих територій.

Загальний фізіологічний стан риб можна визначити, перш за все, за одними з найбільш поширених у діагностиці екологічного моніторингу показників зміни рівня гормонального фону, зокрема гормонів інтерренальної (кортизол) та тиреоїдної (тироксин, трийодтиронін) залоз, враховуючи їх здатність до швидкої реакції на зміни токсикологічних та гідрохімічних показників у водоймах, що викликані надходженням токсичних речовин [6]. Крім того, важливістю для досліджень зазначених гормонів є те, що вони пов'язані з регуляцією енергетичного обміну, адже для протидії негативному впливу отруйних сполук, організм риб залучає більшу кількість енергії, яка, у свою чергу, регулюється завдяки змінам у обміні речовин, що пов'язаний із мобілізацією або заощадженням енергетичних сполук [7], насамперед згаданими вище гормонами: кортизолом, тироксином та трийодтироніном. Особливу цікавість становить порівняння вмісту досліджуваних гормонів із вмістом глюкози як джерела енергетичного забезпечення клітин організму, зокрема в умовах стресу.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проводились у весняно-літній період 2018 р. на трьох озерах з різним ступенем антропогенного навантаження: оз. Бабине, оз. Кирилівське та оз. Лугове.

Визначення концентрації розчиненого кисню у воді, рН, загального вмісту солей, карбонатної твердості, хімічного споживання кисню (дихроматного) та окисно-відновного потенціалу проводилось загальноприйнятими методами [8]. Впродовж дослідного періоду температуру води вимірювали щоденно у ранковий період.

Риб виловлювали із озер гачковими знаряддями лову. Дослідження проводились на найбільш поширених видах риб у міських водоймах та тих, що зустрічаються у аматорському лові, а саме на карась сріблястому (*Carassius auratus* Bloch, 1782), краснопірці звичайній (*Scarbinius erythrophthalmus* Linnaeus, 1758) та плітці звичайній (*Rutilus rutilus* Linnaeus, 1758). Риби характеризувались наступними масо-розмірними показниками: карась — середня довжина 21,9 см, середня маса 196,5 г, середній вік — 4 роки; краснопірка — відповідно 12,6 см, 21,7 г; 2 роки; плітка — 15,5 см, 18,8 г, 2 роки.

Вгодованість риб, індекси їх печінки та селезінки розраховували загальноприйнятими методиками, порівнюючи масу органів із масою тіла риб [9]. Встановлення таксономічної належності паразитів здійснювали за відповідними визначниками [10, 11]. Статистичну обробку чисельності та біомаси зообентосу здійснювали за загальноприйнятими гідробіологічними методиками [12] та класифікували за відповідним визначником [13].

Кров відбирали із серця, використовуючи гепаринізований шприц. У лабораторних умовах її центрифугували для відділення плазми протягом 15 хв при 3000 R-ротора. У плазмі крові визначали вміст глюкози глюкозооксидазним методом з використанням стандартних комерційних наборів «Філісіт-Діагностика» (Україна). Загальний вміст трийодтироніну, тироксину та кортизолу у плазмі крові риб встановлювали імуноферментним методом з використанням

наборів «Т3–ІФА», «Т4–ІФА» (НВЛ «Гранум», Україна) та «ДС–ІФА–Стероїд–Кортизол» (НВО «Діагностичні системи», Росія) на аналізаторі Rayto RT-2100С.

Статистичну обробку цифрового матеріалу проводили з використанням програм «Statistica.10» та «Excel» з пакету «Microsoft Office».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Умовно контрольне оз. Бабине знаходиться у лісопарковій зоні м. Києва на території Труханового острова, розміщеного посеред Дніпра, і входить до складу заплавних водойм лівого берега Канівського водосховища. Площа водного дзеркала водойми становить 9,5 га, середня глибина — 2 м, максимальна — 5 м., довжина — 1,7 км, ширина — 35–80 м, площа прибережної смуги — 51,2 га. Наприкінці ХХ ст. оз. Бабине не зазнавало суттєвого спрямованого впливу антропогенних чинників. Вода з цього озера відповідає класу II категорії 3 (добра, досить чиста) [14, 15].

На період досліджень оз. Бабине характеризувалося наступними показниками: температура води становила 19–24°C; концентрація розчиненого кисню у воді — 6,23 мг/дм³; рН — 8,23; загальний вміст солей — 131 мг/дм³; твердість карбонатна — 2,2 моль/дм³; хімічне споживання кисню (дихроматне) — 5,39 мг О/дм³; окисно-відновний потенціал — +271,3 мВ. За даними багаторічних досліджень (2007–2012 рр.), проведених співробітниками Інституту гідробіології НАН України (Романенко О. В., Арсан О. М., Кіпніс Л. С. та Ситник Ю. М.) у воді оз. Бабине було відмічено концентрацією нафтопродуктів — 52,4–109,2 мкг/дм³, загальних фенолів 167,0–172,0 мкг/дм³ у літній період, хрому (III) — 11,4–33,6 мкг/дм³ [15].

Особливістю озер системи «Опечень» є те, що їх утворили на місці правобережної притоки Дніпра — р. Почайни, адже наприкінці 1970-х – на початку 1980-х рр. будувався сучасний житловий масив Оболонь, створений в результаті наміву піску. Ґрунт для наміву території забирався саме з місця, де текла р. Почайна. Потужність насипного техногенного шару тут змінюється від 3 до 7 м і більше [17]. Внаслідок перебудови утворились переважно глибоководні озера, більшість з яких сполучені колекторами. На сьогодні «Опечень» та її прибережна територія знаходяться у занедбаному стані: засмічені побутовим сміттям, автомобільними шинами, будівельними матеріалами тощо [16]. За даними низки авторів, якість води відзначається як незадовільна. Озера Лугове, Андріївське, Кирилівське, Йорданське за окремими показниками класифікувалися як «брудні» та «дуже брудні» за IV і V класами якості води — «погана» та «дуже погана» [17].

Оз. Кирилівське — довжиною 760 м, з найбільшою шириною — 380 м, площа водного дзеркала — 19 га, об'єм — 2,28 млн. м³, середня глибина — 12 м, а найбільша — 15 м. В це озеро впадають річка Сирець та Кирилівський струмок [18]. Стік р. Сирець формується підземними, поверхневими та скидними водами промислових підприємств, зливових систем житлових масивів Сирець, Куренівка, Виноградар [14, 15]. Озеро з'єднується з оз. Богатирським та оз. Йорданським трубопроводами: сумарна величина притоку поверхневих вод до оз. Кирилівського становить 2988 тис. м³ за рік [16].

Під час досліджень в оз. Кирилівське температура води становила 18–21°C;

концентрація O_2 — 8,33 мг/дм³; рН — 8,55; загальний вміст солей — 379 мг/дм³; твердість карбонатна — 2,7 моль/дм³; хімічне споживання кисню (дихроматне) — 6,76 мг O /дм³, окисно-відновний потенціал — +160,9 мВ. Вміст NO_2^- становив 0,018 мг N /дм³, що також відповідає результатам досліджень Панасюк І. В. та ін [16]. В період 2007–2012 рр. (за даними Романенко О. В. та ін.) в озері містились нафтопродукти у концентрації 194,4–380,4 мкг/дм³, феноли — 167,7–225,0 мкг/дм³, АСПАР — 43,4–455,3 мкг/дм³ [15].

Оз. Лугове — довжина 1,1 км, ширина коливається на різних ділянках в межах 70–120 м, площа водного дзеркала — 11,9 га [18]. Це озеро зазнає найбільшого забруднення, адже, за даними моніторингових спостережень низки дослідників, з 1990 по 2003 рр. відбулося збільшення концентрації нафтопродуктів у 23 рази, а вміст органічних речовин збільшився у 2,2 раза [17]. Також в цю водойму щорічно скидається 3,83 млн. м³/рік неочищених стічних вод, що майже в 3 рази перевищує об'єм самих водойм. Стік забруднювальних речовин із території басейну водозбору становить: нафтопродуктів — 50,6 т/рік [17; 18], завислих речовин — 5497,75 т/рік, БСКп — 226,14 т/рік [17].

За період досліджень в оз. Лугове температура води коливалась у межах 21–24°C, концентрація O_2 становила 5,53 мг/дм³; рН — 8,53; загальний вміст солей — 344 мг/дм³; твердість карбонатна — 2,7 моль/дм³; хімічне споживання кисню (дихроматне) — 7,42 мг O /дм³; окисно-відновний потенціал — +186,9 мВ.

Істотні відмінності гідрологічних та гіdroхімічних режимів водойм можуть справляти прямий вплив на їхню іхтіофауну та/або опосередкований, позначаючись на представниках зообентосу [4, 19], які є кормовими об'єктами для низки видів риб.

Порівняльну оцінку потенційних кормових організмів риб у модельних водоймах за чисельністю та біомасою донних безхребетних було проведено в літній період (червень 2018 р.). Біомаса кормових організмів оз. Бабине становила 2,16 г/м³ (без урахування молюсків). Щільність черевоногих молюсків (клас *Gastropoda*) складала 32 ос./м², а біомаса — 13,44 г/м², двостулкових молюсків (клас *Bivalvia*) — 8 ос./м², а біомаса — 96 г/м²; личинок комарів-дзвінців (родина *Chironomidae*) — 153 мг/м². Зустрічалися личинки комах: ряд бабки (*Odonata*) (підряди: рівнокрилі бабки (*Zygoptera*) та різнокрилі бабки (*Anisoptera*)); одноденки (ряд *Ephemeroptera*); веснянки (ряд *Plecoptera*) — 1999 мг/м³, малощетинкові черви (клас *Oligochaeta*) 13,3 мг/м², а також поодинокі п'явки (клас *Hirudinea*) тощо.

У оз. Кирилівське було відмічено найбільшу загальну біомасу бентосних організмів — 7,7 г/м² (без урахування молюсків). Переважну більшість становили малощетинкові черви (клас *Oligochaeta*) — 236 ос./м² за численністю та за масою — 1,61 г/м². Їхнє домінування узгоджується з дослідженнями інших авторів у 2007–2012 рр. [15]. Олігохети здатні виживати у водоймах з істотним забрудненням води органічними речовинами [20]. Здебільшого у озері траплялись п'явки (клас *Hirudinea*) — 10 ос./м², з масою 1,09 г/м². Щільність черевоногих молюсків (клас *Gastropoda*) становила 13 ос./м², а їхня маса — 64 мг/м². Крім того, зустрічалися личинки комарів-дзвінців (родина *Chironomidae*) — 42 ос./м², масою 3,1 г/м²; личинки комах ряду бабки (*Odonata*) підряду рівнокрилі бабки (*Zygoptera*) — 1,8 г/м², інші організми — 0,1 мг/м².

Загальна маса бентосних організмів у оз. Лугове склала $1,53 \text{ г/м}^2$, без врахування черевоногих молюсків (клас *Gastropoda*), щільність яких становила 4 ос./м^2 , а біомаса — 30 г/м^2 , та двостулкових молюсків (клас *Bivalvia*) щільність — 2 ос./м^2 , а біомаса — $0,04 \text{ г/м}^2$. Серед інших представників зустрічались поодинокі личинки комах ряд Бабки (*Odonata*) підряду рівнокрилі бабки (*Zygoptera*) та веснянки — $1,5 \text{ г/м}^2$, та личинки комарів-дзвінців (*Chironomidae*) — 30 мг/м^2 .

Отже, у помірно забрудненому оз. Кирилівське була найбільша біомаса кормових організмів з поміж інших дослідних озер, а домінуючим видом у цій водоймі були малощетинкові черви. Проте, оз. Бабине характеризувалось найбільшим видовим різноманіттям, хоча переважали молюски. У свою чергу, оз. Лугове виявилось досить бідним на бентос у порівнянні з іншими дослідними озерами.

Дослідження паразитоценозу карася сріблястого з оз. Бабине виявило лише ектопаразитів — інфузорій *Trichodina* sp. (екстенсивність інвазії (EI) — 100%), моногеней роду *Dactylogyrus* (EI — 100%; інтенсивністю інвазії (II) — 50 екз./ос.), та риб'ячих п'явок — *Piscicola geometra* (EI — 14%; II — 1 екз./ос.).

У краснопірки звичайної були виявлені ектопаразити — моногеней роду *Dactylogyrus* (EI — 50%; II — 74 екз./ос.), паразитичні інфузорії *Trichodina* sp. (EI — 14%), риб'ячі п'явки *Piscicola geometra* (EI — 14%; II — 3 екз./ос.), паразитичні ракоподібні роду *Argulus* (EI — 28%; II — 3 екз./ос.), а також ендopазити — *Diplostomum* sp. (EI — 100%; II — 15 екз./ос.).

Плітка звичайна була інвазована ендopазитами роду *Diplostomum* sp. (EI — 83%; II — 14 екз./ос.). Оскільки пісциколюз зустрічався тільки у контрольній водоймі, можна зауважити, що кисневий режим цього озера має стабільні високі значення, що забезпечує існування цього ектопаразита [20].

Риби з оз. Кирилівське характеризувалися наступним видовим складом паразитів:

Карась сріблястий: ектопаразити представлені інфузоріями роду *Trichodina* (EI — 100%) та моногенейми роду *Dactylogyrus* (EI — 100%, II — 78 екз./ос.), ендopазити — цестодою *Caryophyllaeus laticeps* (EI — 14%; II — 1 екз./ос.).

Краснопірка звичайна була заражена лише ендopазитами — цестода *Caryophyllaeus laticeps* (EI — 20%; II — 3 екз./ос.) та метацеркарії який *Diplostomum* sp. (EI — 60%; II — 11 екз./ос.).

У плітки звичайної представниками ендopазитів були метацеркарії *Diplostomum* sp. (EI — 80%; II — 19 екз./ос.) та *Tylodelphys* sp. (EI — 20%; II — 7 екз./ос.).

Оскільки деякі паразити розміщуються в життєво важливих органах, то вони впливають на фізіологічний стан риб. Реакція на паразитарний вплив може виявлятися у зміні поведінки заражених риб [22, 23]. Прикладом подібного явища може бути вплив метацеркарій *Tylodelphys clavata* та *Diplostomum* sp., які локалізуються в скловидному тілі очного яблука, та можуть порушувати гостроту зору риб. Вражені риби гірше знаходять кормові об'єкти, зрештою втрачають вгодованість та стають жертвою основних хазяїв паразита — рибоїдних птахів [24].

В оз. Лугове карась сріблястий був заражений лише ектопаразитами — моногеніями роду *Dactylogyrus* (EI — 100%, II — 70 екз./ос.) та *Gyrodactylus* (EI — 20%, II — 4 екз./ос.). Краснопірка звичайна була заражена ектопаразитами — моногенією роду *Dactylogyrus* (EI — 33%; II — 96 екз./ос.) та ендопаразитами — *Diplostomum* sp. (EI — 67%; II — 3 екз./ос.). Варто звернути увагу, що в цьому озері не було виявлено ектопаразитів *Trichodina* sp.

Паразитофауна досліджуваних видів риб наведена у таблиці 1.

Таблиця 1. Паразитофауна досліджуваних видів риб

Table 1. Parasitic Fauna of the studied fish species

Паразитичні угруповання / Parasitic groups:	Водні об'єкти / Waterbodies		
	оз. Бабіне / Babynе	оз. Кирилівське / Kyrylivske	оз. Лугове / Luhove
Ектопаразити / Ectoparasites:			
<i>Dactylogyrus</i> sp.:	1, 2	1	1, 2
– <i>D. extensus</i>	1	–	–
– <i>D. vastator</i>	1	–	–
– <i>D. wegneri</i>	–	1	1
– <i>D. anchoratus</i>	–	1	1
– <i>D. minutus</i>	–	1	–
<i>Trichodina</i> sp.	1, 2	1	–
<i>Gyrodactylus</i> sp.	–	–	1
<i>Piscicola geometra</i>	1, 2	–	–
<i>Argulus foliaceus</i>	2	–	–
Ендопаразити / Endoparasites:			
<i>Caryophyllaeus laticeps</i>	–	1, 2	–
<i>Diplostomum</i> sp.	2, 3	2, 3	2
<i>Tylodelphys clavata</i>	–	3	–

Примітка. 1 — карась; 2 — краснопірка; 3 — плітка.

Notes. 1 — crucian carp; 2 — rudd; 3 — roach.

У карася сріблястого в оз. Лугове та Кирилівське були встановлені представники тих самих видів — *D. anchoratus* та *D. wegneri*, однак у оз. Бабіне ці види не зустрічалися, а були визначені *D. extensus* та *D. vastator*.

З огляду на те, що паразити разом з комплексним забрудненням водойм чинять істотний вплив на фізіологічний стан риб, існує необхідність дослідження морфологічних характеристик та фізіолого-біохімічних показників у риб, зокрема маси внутрішніх органів та їхніх індексів. Дослідження індексів печінки та селезінки дають можливість отримати об'єктивну інформацію, яка може бути критерієм визначення фізіологічного стану риб. Ці індекси свідчать про наявність патологій з урахуванням фізико-хімічних параметрів середовища [25–27].

Індекси печінки карася із оз. Кирилівське та Лугове не мали вірогідної відмінності у порівнянні з рибами з оз. Бабіне, що свідчить на користь більшої

толерантності цього виду до несприятливого впливу. На противагу, індекс селезінки у цих риб був меншим з оз. Кирилівське на 44% та з оз. Лугове на 37% відповідно, порівняно з карасем з оз. Бабіне (Рис. 2 А). Через необхідність більш інтенсивного постачання кисню та поживних речовин в органи та тканини риб, можна припустити знижене депонування крові у цьому органі, що, можливо, призводить до зменшення індексу селезінки. Високі значення індексів органів у карася з оз. Бабіне, однак, спостерігались на тлі високої зараженості риб'ячими п'явками, що могло позначитися на загальному фізіологічному стані риб.

Краснопірка з оз. Кирилівське мала індекс печінки та селезінки на 34 та 13% вищі у порівнянні з рибами з оз. Бабіне, а з оз. Лугового — навпаки, індекс селезінки був у 2 рази нижчим у порівнянні з умовним контролем (рис. 1 Б). Відмічена пряма залежність між індексом селезінки та наявністю паразитів у риб з оз. Кирилівське ($r = 0,98$).

Плітка з оз. Кирилівське також мала вищі індекси печінки (на 16,5%) та селезінки (16%), порівняно з рибами з оз. Бабіне. Збільшення розмірів печінки може бути зумовлене детоксикацією та виведенням токсичних речовин за умов хронічного забруднення водного середовища [26].

Рис. 1. Індекси печінки (А) та селезінки (Б) у карася (1), краснопірки (2) та плітки (3) з оз. Бабіне, Кирилівське та Лугове ($M \pm m$, $n = 5-8$)

Fig. 1. Liver indices (A) and spleen (B) in a crucian carp (1); rudd (2) and roach (3) from the lakes: Babyne, Kyrylivske and Luhove ($M \pm m$, $n = 5-8$)

Одним з найбільш поширених діагностичних критеріїв фізіологічного стану живих організмів є вміст глюкози у крові, яка є основним енергетичним джерелом для проходження метаболічних процесів [28]. Кортизол, в свою чергу, регулює вуглеводний обмін в організмі та бере участь в розвитку стрес-реакцій [29]. За його участю відбувається заощадження наявних енергетичних ресурсів організму та відтворення втрачених через посилення синтезу глюкози. Крім того, кортизол регулює обмінні процеси, зокрема, пригнічує розклад глюкози та посилює синтез білків [29].

Вміст глюкози у плазмі крові у карася з оз. Кирилівське був вищим у 3,6 раза, у краснопірки на — 22,4% порівняно з умовним контролем. Проте, у плітки він був у 3 рази нижче, ніж у контролі. Карась з оз. Лугове також характеризувався

більшим вмістом глюкози у 2,7 раза, а у краснопірки її вміст не мав вірогідних відмінностей, у порівнянні з краснопіркою з оз. Бабіне (рис. 2 А).

Краснопірка з оз. Кирилівське відзначилась на 30,2% вищим вмістом кортизолу в плазмі крові, на відміну від плітки, у якої він був у 4,7 раза нижчий. Карасі з цих водойм не відрізнялися за вмістом цього гормону у крові. Залежність між його вмістом та ступенем паразитарного ураження плітки з оз. Кирилівське була зворотною ($r = 0,83$), що може відображати особливості загальної реакції риб на паразитування метацеркарій трематод родини *Diplostomatidae*.

Зміни вмісту глюкози у крові риб дозволяють активно протидіяти токсичному впливу. У досліджених водоймах спостерігались зміни вмісту глюкози та кортизолу у плазмі крові риб в залежності від виду риб, ступеня антропогенного навантаження, зараженості паразитами.

В особливо несприятливих умовах (оз. Лугове) карась характеризується зниженням вмісту кортизолу в крові у 1,7 раза, а краснопірка — збільшенням у 4,2 раза порівняно з рибами контрольної водойми. Несприятливі умови навколишнього середовища, які пов'язані з істотним забрудненням води, на нашу думку, викликають стресовий стан у більш чутливого виду — краснопірки. Відомо, що високий вміст кортизолу у крові супроводжується змінами індексів селезінки та печінки [26]. Кортизол, гормон стресу, пригнічує імунну систему, в результаті чого можуть відбутись порушення у функціонуванні селезінки та, як наслідок, — зменшитись її індекс. У риб з оз. Кирилівське відмічена зворотна кореляція між індексом селезінки та кількістю паразитів у плітки ($r = 0,83$), що є ознакою їх впливу на кровоносну систему і, можливо, пригнічення імунної системи внаслідок тривалої дії стресових факторів.

Зменшення вмісту кортизолу в плазмі крові карася з оз. Лугове у 1,7 раза та плітки з оз. Кирилівське у 4,7 раза відносно контролю може свідчити про певну перебудову їх енергетичного обміну залежно від особливостей умов існування.

Рис. 2. Вміст глюкози (А) та кортизолу (Б) у плазмі крові у карася (1), краснопірки (2) та плітки (3) з оз. Бабіне, Кирилівське та Лугове ($M \pm m$, $n = 5-8$)

Fig. 2. Content of glucose (A) and cortisol (Б) in blood plasma in crucian carp (1), rudd (2) and roach (3) from the lakes: Babyne, Kyrylivske and Luhove ($M \pm m$, $n = 5-8$)

Тироксин (T_4) та трийодтиронін (T_3) залучені у процеси, що пов'язані, в першу чергу, з обміном речовин, статевим розвитком та осморегуляцією [29]. T_3 та T_4 виконують роль стимуляторів окиснювальних процесів, регулюють ліпідний обмін, беруть участь в реакціях при надходженні отруйних речовин до тканин організму риб [31]. Близько 80% T_3 утворюється у результаті дейодування T_4 у печінці та нирках, а 20% у клітинах, що виконують функцію щитоподібної залози [30].

Карась з оз. Кирилівське та оз. Лугове характеризувався меншим у 4,7 та 1,5 раза відповідно вмістом T_3 у плазмі крові порівняно з рибами з оз. Бабине. Крім того, у карася з оз. Бабине спостерігалась позитивна кореляція між наявністю паразитів та вмістом T_3 у крові ($r = 0,9$). Це може свідчити про недостатнє надходження поживних речовин в організм внаслідок численної паразитарної інвазії. Також карась з оз. Кирилівське мав у 2 рази вищий вміст T_4 , що вказує на стресовий стан у риб. Оскільки T_3 у 10 разів активніший, ніж T_4 , природним є посилення синтезу T_4 як компенсаторної реакції риб. Слід зазначити, що нижчий вміст T_3 у поєднанні зі зниженим вмістом кортизолу у крові карася, ймовірно, вказує на уповільнення проходження обмінних процесів. Коефіцієнт кореляції між вмістом T_3 і кортизолом, та вмістом T_3 і глюкозою у риб з оз. Кирилівське становить $r = 0,74$ та $r = 0,98$ відповідно.

У свою чергу, в плітки з оз. Кирилівське всі досліджувані показники крові були значно меншими, ніж у риб з оз. Бабине, а саме — вміст T_3 та T_4 у 2 та 4 рази нижчий порівняно з контролем (рис. 3 Б). Відмічена і негативна кореляція між ступенем паразитного ураження та вмістом T_3 у крові ($r = 0,71$). Це може вказувати на пригнічення активності проходження метаболічних процесів через надмірний вплив всіх чинників на організм.

Рис. 3. Вміст трийодтироніну (А), тироксину (Б) у плазмі крові у 1 — карася; 2 — краснопірки та 3 — плітки. з оз. Бабине, Кирилівське та Лугове ($M \pm m$, $n = 5-8$)

Fig. 3. The content of triiodothyronine (A), thyroxine (B) in blood plasma in crucian carp (1), rudd (2) and roach (3) from the lakes: Babyne, Kyrylivske and Luhove ($M \pm m$, $n = 5-8$)

У краснопірки з обох забруднених водойм спостерігався більший у 2,2 раза вміст T_3 у крові, а у риб з оз. Кирилівське був вищим і вміст T_4 — у 2,1 раза.

Проте, у риб з оз. Лугове він був меншим на 22,4%, порівняно з контролем. Це може свідчити про коригування проходження обмінних процесів в залежності від конкретних екологічних умов.

Помічена пряма залежність між вмістом глюкози та тиреоїдних гормонів у краснопірки з оз. Кирилівське ($r = 0,94$, $r = 0,73$). Вона вказує на те, що вищий вміст глюкози у плазмі крові риб з забруднених озер пов'язаний з гуморальною регуляцією обмінних процесів за дії токсичних чинників, адже кореляції між ступенем паразитарної інвазії та вмістом T_3 та T_4 були зворотні — $r = 0,75$, $r = 0,96$ відповідно.

Таким чином, при застосуванні різнорівневих біомаркерів (морфо-фізіологічні, біохімічні та паразитологічні) отримано реакції риб різних видів, які дозволяють встановити відмінності між модельними водними об'єктами в умовах урбанізації та комплексного антропогенного впливу. Виявлено міжвидові відмінності у способах енергетичного забезпечення обмінних процесів у карася, краснопірки та плітки за дії паразитарних та антропогенних чинників.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Встановлено, що антропогенне навантаження знижує біорізноманіття паразитофауни риб. Найменше паразитарне ураження риб спостерігалось у більш забрудненій водоймі. Це свідчить про наявність негативного впливу токсикантів на риб та й їх паразитів.

При токсичному навантаженні у краснопірки істотно підвищується вміст T_3 та T_4 у плазмі крові порівняно до контролю. Проте, паразитарне ураження риб дещо знижує вміст тиреоїдних гормонів у крові, коефіцієнт кореляції між цими показниками становить $r = -0,75$, $r = -0,96$ відповідно. Це свідчить про модифікуючий вплив паразитарної інвазії на гуморальну регуляцію обмінних процесів у риб за токсичного навантаження.

У плітки навпроти за підвищеним антропогенним впливом зменшується вміст тиреоїдних гормонів у плазмі крові. Це призводить до пригнічення енергетичного обміну у риб. Паразитарне ураження ще більше знижує вміст цих гормонів ($r = -0,71$).

Карась сріблястий за посиленням антропогенним тиском реагує подібним до плітки чином за вмістом гормонів у плазмі крові. Проте, у відповідь на більшу паразитарну інвазію збільшується вміст T_3 у крові, що призводить до посилення енергетичного обміну в риб за цих умов ($r = 0,9$).

Таким чином норма реакції риб на токсичне навантаження та/або паразитологічне ураження носить видоспецифічний характер.

Перспективою подальших досліджень є розширення оцінки екологічного стану водойм та можливості адаптації корошових риб, що знаходяться в межах мегаполісу до умов навколишнього середовища під дією різних рівнів антропогенного навантаження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вміст іонів важких металів у органах та тканинах молюсків деяких водойм міської зони Києва / Ситник Ю. М. та ін. // Наукові записки Тернопільського

- Національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. 2012. № 2 (51). С. 230—236. (Серія : Біологія).
2. Клименко В. Г. Гідрологія України: Навчальний посібник для студентів-географів // Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. С. 74—75.
3. Биоиндикация экологического состояния водоемов в черте г. Киева / Романенко В. Д. и др. // Гидробиологический журнал. 2010. Т. 46, № 2. С. 3—24.
4. Khan R. A., Thulin J. Influence of Pollution on Parasites of Aquatic Animals // Advances in Parasitology. 1991. Vol. 30. P. 201—238.
5. Гідрохімічний режим озер системи Опечень (м. Київ) / Линник П. М. та ін. // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. 2016. Вип. 269. С. 59—69.
6. Микряков Д. В., Силкина Н. И., Микряков В. Р. Влияние гормона стресса кортизона на окислительные процессы в иммунокомпетентных органах карпа *Cyprinus carpio* L. // Биология внутренних вод. 2007. № 3. С. 84—86.
7. Peter M. C. The role of the thyroid hormones in stress response of fish // Gen. Comp. Endocrinol. 2011. Vol. 172, № 2. P. 198—210.
8. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1966. 376 с.
9. Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Т. 2: Паразитические многоклеточные (Первая часть). Москва : Наука ; Зоол. ин-т АН СССР, 1985. 425 с. (Определители по фауне СССР ; № 143).
10. Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Т. 3: Паразитические многоклеточные (Вторая часть). Москва : Наука ; Зоол. ин-т АН СССР, 1987. 583 с. (Определители по фауне СССР ; № 149).
11. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция. Санкт-Петербург : ГосНИОРХ, 1984. 52 с.
12. Кутикова Л. А., Старобогатов Я. И. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон и бентос). Ленинград : Гидрометеиздат, 1977. 513 с.
13. Щербак В. И., Семенюк Н. Е. Разнообразие фитопланктона некоторых водоемов г. Киева // Альгология. 2006. Т. 16, № 4. С. 467-478.
14. Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій / Романенко О. В. та ін. Київ : Наукова думка, 2015. 189 с.
15. Батог С. В. Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук. Київ, 2018. 20 с.
16. Якість води у міських водоймах та характер освоєння водоохоронних зон (на прикладі озер системи «Опечень», м. Київ) / Панасюк І. В. та ін. // Екологічна безпека та природокористування. 2015. Вип. 4 (20). С. 63—69.
17. Жежеря В. А., Линник П. М., Зубенко І. Б. Уміст та форми знаходження металів у озерах системи Опечень (м. Київ) // Наукові праці УкрНДГМІ. 2016. Вип. 269. С. 70—86.
18. Романенко В. Д. Основи гідроекології. Київ : Обереги, 2001. 728 с.
19. Mundoli S., Manjunath B., Nagendra H. Effects of urbanisation on the use of lakes as commons in the peri-urban interface of Bengaluru, India // International Journal of Urban Sustainable Development. 2014. Vol. 7 (1). P. 89—108.

20. Koyun, M., Tepe, Y., Mart, A. First Record of *Piscicola geometra* (Annelida, Hirudinea) on some Species of *Cyprinidae* from Euphrates-Tigris Basin in Turkey // Journal of Fisheries and Aquatic Science. 2015. Vol. 10. P. 575—580.
21. Barber I., Wright H. A. Effects of parasites on fish behaviour: interactions with host physiology // Fish physiology / eds. Katherine R. W. W., Sloman A., Sigal B. San Diego : Academic Press, 2005. P. 109—149.
22. Barber I. Hoare D., Krause J. Effects of parasites on fish behaviour: an evolutionary perspective and review // Rev Fish Biol Fish. 2000. P. 131—165.
23. Different seasonal infection dynamics of two species of eye-flukes (*Diplostomum spathaceum* and *Tylodelphys clavata*) in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) / Buchmann K. et al. // Bull Eur Assoc Fish Pathol. 1997. Vol. 17. P. 165—170.
24. Динаміка змін фізичних параметрів кровотворних органів коропа впродовж вегетаційного періоду / Клименко О. М. та ін. // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2013. Вип. 10. С. 44—46.
25. Рыжков Л. П., Кучко Т. Ю. Селезенка — морфофизиологический индикатор качества состояния популяции рыб // Экологическая физиология водных организмов. 1992. С. 11—17.
26. Руднева И. И., Кузьмина Н. С. Изменение биомаркеров гонад некоторых видов черноморских рыб, обитающих в условиях хронического загрязнения // Экологические системы и приборы. 2011. № 2. С. 8—12.
27. Kennish M. J. Environmental threats and environmental future of estuaries // Environmental Conservation. [S. l.], 2002. 107 p.
28. Особливості пристосування риб до зміни температури і мінералізації води за показниками вмісту трийодтироніну, кортизолу і глюкози у плазмі крові / Потрохов О. С. та ін. // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. Б. Гнатюка. 2017. № 1. С. 89—95. (Серія : Біологія).
29. A journey through the gonadotropin-inhibitory hormone dytem of fish / Munoz-Cueto Jose A. et al. // Frontiers in endocrinology. 2017. Vol. 8. P. 285.
30. Geven E. J., Klaren P. H. M. The teleost head kidney: Integrating thyroid and immune signalling // Developmental and Comparative Immunology. 2017. Vol. 66. P. 73—83.

REFERENCES

1. Sytnyk, Yu. M., Arsan O. M., Kyrychuk H. Ye., & Liashenko, A. V. (2012). Vmist ioniv vazhkykh metaliv u orhanakh ta tkanynakh moliuskiv deiakykh vodoim miskoi zony Kyieva. *Naukovi zapysky Ternopilskoho Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Hnatiuka. Serii: Biolohiia*, 2(51), 230-236.
2. Klymenko, V. H. (2010). *Hidrolohiia Ukrainy*. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina.
3. Romanenko, V. D., Ljashhenko, A. V., Afanas'ev, S. A., & Zorina-Saharova, E. E. (2010). Bioindikacija jekologicheskogo sostojanija vodoemov v cherte g. Kieva. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 46(2), 3-24.
4. Khan, R. A., & Thulin, J. (1991). Influence of Pollution on Parasites of Aquatic Animals. *Advances in Parasitology*, 30, 201-238.
5. Lynnyk, P. M., Zhezheria, V. A., Zhezheria, T. P., Ivanechko, Ya. S., & Ihnatenko, I. I. (2016). Hidrokhimichniy rezhym ozer systemy Opechen (m. Kyiv). *Naukovi*

- pratsi Ukrainskoho naukovo-doslidnoho hidrometeorologichnoho instytutu*, 269, 59-69.
6. Mikrjakov, D. V., Silkina, N. I., & Mikrjakov, V. R. (2007). Vlijanie gormona stressa kortizona na okislitel'nye processy v immunokompetentnyh organah karpa *Cyprinus carpio* L. *Biologija vnutrennih vod*, 3, 84-86.
 7. Peter, M. C. (2011). The role of the thyroid hormones in stress response of fish. *Gen. Comp. Endocrinol.*, 172, (2), 198-210.
 8. Pravdin, I. F. (1966). *Rukovodstvo po izucheniju ryb*. Moskva: Pishh. prom-st'.
 9. *Opredelitel' parazitov presnovodnyh ryb fauny SSSR*. (1985). Vol. 2: Paraziticheskie mnogokletochnye (Part I). *Opredeliteli po faune SSSR*. Iss. 143. Moskva: Nauka; Zool. in-t AN SSSR.
 10. *Opredelitel' parazitov presnovodnyh ryb fauny SSSR*. (1987). Vol. 3: Paraziticheskie mnogokletochnye (Part II). *Opredeliteli po faune SSSR*. Iss. 143. Moskva: Nauka; Zool. in-t AN SSSR.
 11. *Metodicheskie rekomendacii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskikh issledovanijah na presnovodnyh vodoemah. Zoobentos i ego produkcija*. (1984). Leningrad: GosNIORH.
 12. Kutikova, L. A., & Starobogatov, Ja. I. (1977). *Opredelitel' presnovodnyh bespozvonochnyh Evropejskoj chasti SSSR (plankton i bentos)*. Leningrad: Gidrometeoizdat.
 13. Shherbak, V. I., & Semenjuk, N. E. (2006). Raznoobrazie fitoplanktona nekotoryh vodoemov g. Kieva. *Al'gologija*, 16(4), 467-478.
 14. Romanenko, O. V. (2015). *Ekologichni problemy kyivskykh vodoim i prylehlykh terytorii*. Kyiv: Naukova dumka.
 15. Batoh, S. V. (2018). *Ekoloho-hidrolohichna kharakterystyka vodoim m Kyieva. Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv.
 16. Panasiuk, I. V., Tomiltseva, A. I., Zub, L. M., & Pohorielova, Yu. V. (2015). Yakist vody u miskykh vodoimakh ta kharakter osvoiennia vodookhoronnykh zon (na prykladi ozer systemy «Opechen», m. Kyiv). *Ekologichna bezpeka ta pryrodokorystuvannia*, 4(20), 63-69.
 17. Zhezheria, V. A., Lynnyk, P. M., & Zubenko, I. B. (2001). *Umist ta formy znakhodzhenia metaliv u ozerakh systemy Opechen (m. Kyiv)*. *Naukovi pratsi UkrNDHMI*, 269, 70-86.
 18. Romanenko, V. D. (2001). *Osnovy hidroekologii*. Kyiv: Oberehy.
 19. Mundoli, S., Manjunath, B., & Nagendra, H. (2014). Effects of urbanisation on the use of lakes as commons in the peri-urban interface of Bengaluru, India. *International Journal of Urban Sustainable Development*, 7, (1), 89-108.
 20. Koyun, M., Tepe, Y., & Mart, A. (2015). First Record of *Piscicola geometra* (Annelida, Hirudinea) on some Species of *Cyprinidae* from Euphrates-Tigris Basin in Turkey. *Journal of Fisheries and Aquatic Science*, 10, 575-580.
 21. Barber, I., & Wright H. A. (2005). Effects of parasites on fish behaviour: interactions with host physiology. *Fish physiology*. Katherine, R. W. W., Sloman, A., Sigal, B. (eds). San Diego: Academic Press, 109-149.
 22. Barber, I., Hoare, D., Krause, J. (2000). Effects of parasites on fish behaviour: an evolutionary perspective and review. *Rev Fish Biol Fish*, 10, 131-165.
 23. Buchmann, K., Moller, S. H., Uldal, A., & Bresciani, J. (1997). Different seasonal infection dynamics of two species of eye-flukes (*Diplostomum spathaceum* and *Tylodelphys clavata*) in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Bull Eur Assoc Fish Pathol*, 17, 165-170.

24. Klymenko, O. M., Kunovskyi, Yu. V., Prysiazhniuk, N. M., Mykhalskyi, O. R., & Heiko L. M. (2013). Dynamika zmin fizychnykh parametriv krovotvornykh orhaniv koropa vprodovzh vehetatsiinoho periodu. *Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktii tvarynnystva*, 10, 44-46.
25. Ryzhkov, L. P., & Kuchko, T. Ju. (1992). Selezenka – morfofiziologicheskij indikator kachestva sostoianija populjacii ryb. *Jekologicheskaja fiziologija vodnyh organizmov*, 11-17.
26. Rudneva, I. I., & Kuz'minova, N. S. (2011). Izmenenie biomarkerov gonad некotoryh vidov chernomorskih ryb, obitajushhih v uslovijah hronicheskogo zagriznenija. *Jekologicheskie sistemy i pribory*, 2, 8-12.
27. Kennish, M. J. (2002). Environmental threats and environmental future of estuaries. *Environmental Conservation*, 107.
28. Potrokhov, O. S. (2017). Osoblyvosti prystosuvannia ryb do zminy temperatury i mineralizatsii vody za pokaznykamy vmistu tryiodtyroninu, kortyzolu i hliukozy u plazmi krovi. *Nauk. zap. Ternop. nats. ped. un-tu im. V. Hnatiuka. Serii: Biolohiia*, 1, 89-95.
29. Munoz'Cuerto, Jose A., Paullada'Salmaron, Jos A, Aliaga'Guerrero, Maria, Cowan, Mairi E., Parhar, Ishwar S., & Ubuka, Takayoshi (2017). A journey through the gonadotropin'inhibitory hormone system of fish. *Frontiers in endocrinology*, 8, 285.
30. Geven, E. J., & Klaren, P. H. M. (2017). The teleost head kidney: Integrating thyroid and immune signalling. *Developmental and Comparative Immunology*, 66, 73-83.

ВПЛИВ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ (*SILYBUM MARIANUM*) НА СТАН Т- І В-КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ ТА ПРИРОДНУ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ДВОЛІТОК КОРОПА

М. З. Коріляк, stasiv8@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. І. Віщур, vishchur_oleg@ukr.net, Інститут біології тварин НААН, м. Львів
І. І. Грициняк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити вплив введення до складу основного раціону дволіток коропа насіння різної кількості насіння розторопші плямистої (*Silybum marianum*) на стан Т- і В-клітинного імунітету та показники природної резистентності їхнього організму.

Методика. Експериментальна частина роботи виконана на базі ДП «ДГ Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН України». Дослідження проведено на трьох групах дволіток любінського лускатого коропа, яких вирощували в умовах ставів-аналогів упродовж 60 днів вегетаційного періоду. Матеріалом для досліджень слугувала кров риб, яку відбирали у кінці експерименту. У стабілізованій гепарином крові визначали кількість Т- і В-лімфоцитів та їхню функціональну активність методом розеткоутворення. Показники фагоцитозу гранулоцитів крові оцінювали за фагоцитарною активністю (ФА), фагоцитарним числом (ФЧ) та фагоцитарним індексом (ФІ). Лізоцимну активність сироватки крові (ЛАСК) визначали за реакцією на мікробну тест-культуру *Micrococcus lysodeikticus* фотонейлометричним методом. При визначенні бактерицидної активності сироватки крові в якості тест-мікроба використовували *Aeromonas hydrophila*.

Результати. В результаті додавання до раціону дволіток коропа насіння розторопші плямистої у кількості 5% встановлено зменшення кількості Т-лімфоцитів (загальних, активних і теофілін-резистентних) та імуносупресивний вплив на їхню функціональну активність за рахунок перерозподілу рецепторного апарату імункомпетентних клітин. Зокрема, зафіксовано збільшення кількості неактивних у функціональному сенсі Т-лімфоцитів крові і зменшення частки клітин з середньою і високою щільністю рецепторів. Водночас, за умов застосування даної рослинної добавки у кількості 1% у крові коропів виявлено тенденцію до збільшення кількості вказаних популяцій Т-лімфоцитів крові і підвищення їх функціональної активності. При цьому у коропів обох дослідних груп, відносно контрольної, зросла кількість високоавідних В-лімфоцитів крові ($p < 0,05$). Ці дані свідчать про дозозалежний вплив насіння розторопші плямистої на стан Т- і В-клітинної ланки специфічного захисту організму коропів.

Констатовано стимулювальний вплив досліджуваної добавки на активність клітинної і гуморальної ланки природної резистентності організму дволіток коропа, про що свідчать вірогідно вища бактерицидна, лізоцимна та фагоцитарна активність у крові коропів дослідних груп щодо контрольної. Водночас, цей вплив був виражений більшою мірою у коропів, яким до складу основного раціону вводили розторопшу плямисту у кількості 1%.

Наукова новизна. Вперше досліджено вплив розторопші плямистої на активність Т- і В-клітинної ланки імунітету та показники неспецифічної резистентності організму дволіток коропа.

Практична значимість. Введення розторопші плямистої до складу кормів в процесі товарного вирощування коропа дозволить підвищити природну резистентність їхнього організму.

Ключові слова: дволітки коропа, розторопша плямиста, Т- і В-лімфоцити, лізоцимна, бактерицидна та фагоцитарна активності, резистентність.

THE EFFECT OF MILK THISTLE (*SILYBUM MARIANUM*) ON THE STATE
OF T- AND B-CELL IMMUNITY AND NATURAL RESISTANCE
OF THE IMMUNE SYSTEM OF AGE-2 CARP

M. Korylak, stasiv8@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

O. Vishchur, vishchur_oleg@ukr.net, Institute of Animal Biology NAAS, Lviv

I. Hrytsyniak, info@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To investigate the effect of the supplementation of the basic diet of age-2 carp with different amounts of milk thistle (*Silybum marianum*) seeds on the state of T- and B-cell immunity and indicators of the natural resistance of their organism.

Methodology. The experimental part of the work was performed at the Lviv Research Station of the Institute of Fisheries NAAS. The study was conducted using three groups of age-2 Lubin scaly carp, which were reared under conditions of analogue ponds for 60 days of the culture season. The material for the study was fish blood, which was sampled at the end of the experiment. The numbers of T- and B-lymphocytes and their functional activity in the heparin-stabilized blood were determined using the rosette test. Phagocytosis parameters of granulocytes were evaluated by phagocytic activity (FA), phagocytic number (FN) and phagocytic index (FI). Lysozyme activity of serum (LAS) was determined by the response to the microbic test culture of *Micrococcus lysodeikticus* using the photonephelometric method. When determining the bactericidal activity of blood serum, *Aeromonas hydrophila* was used as a test microbe.

Findings. The supplementation of the diet of age-2 carp with milk thistle seeds at an amount of 5% resulted in a decrease in the number of T-lymphocytes (common, active and theophylline-resistant) and caused immunosuppressive effects on their functional activity due to the redistribution of the receptor apparatus of immunocompetent cells. In particular, an increase in the number of functionally inactive T-lymphocytes and reduction of the proportion of cells with medium and high density of receptors were observed. At the same time, when using this plant supplement at an amount of 1% in the blood of carp, a tendency to an increase in the number of these populations of T-lymphocytes and an increase in their functional activity were observed. At the same time, carp of both experimental groups, compared to the control, had the number of high-grade B-lymphocytes increased ($p < 0.05$). These data indicate the dose-dependent effect of the milk thistle supplement on the state of the T- and B-cell system of the specific protection of the fish body.

The stimulatory effect of the studied supplement on the activity of the cellular and humoral components of age-2 carp resistance was found. This was evidenced by higher bactericidal, lysozyme and phagocytic activities in the blood of experimental groups compared to the control. This effect was expressed to a greater extent in carp, the basic diet of which was supplemented with 1% of milk thistle.

Originality. For the first time, the effect of milk thistle on the activity of T- and B-cell immunity and non-specific resistance of the body of age-2 carp have been investigated.

Practical value. Supplementation of the carp feeds with milk thistle in the process of commercial carp rearing allows increasing the natural resistance of their organism.

Key words: age-2 carp, milk thistle, T-and B-lymphocytes, lysozyme, bactericidal and phagocytic activity, resistance.

ВЛИЯНИЕ РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ (*SILYBUM MARIANUM*)
НА СОСТОЯНИЕ Т- И В-КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА И ЕСТЕСТВЕННУЮ
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ДВУХЛЕТКОВ КАРПА

М. З. Кориляк, stasiv8@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

О. И. Вищур, vishchur_oleg@ukr.net, Институт биологии животных НААН, г. Львов

И. И. Грициняк, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Исследовать влияние введения в состав основного рациона двухлетков карпа разного количества семян расторопши пятнистой (*Silybum marianum*) на состояние Т- и В-клеточного иммунитета и показатели естественной резистентности организма рыб.

Методика. Экспериментальная часть работы выполнена на базе ГП «ОХ Львовской опытной станции Института рыбного хозяйства НААН Украины». Исследование проведено на трех группах двухлетков любеньского чешуйчатого карпа, выращиваемых в условиях прудов-аналогов течение 60-дневного вегетационного периода. Материалом для исследований выступала кровь рыб, которую отбирали в конце эксперимента. В стабилизированной гепарином крови определяли количество Т- и В-лимфоцитов и их функциональную активность методом розеткообразования. Показатели фагоцитоза гранулоцитов крови оценивали по фагоцитарной активности (ФА), фагоцитарному числу (ФЧ) и фагоцитарному индексу (ФИ). Лизоцимную активность сыворотки крови (ЛАСК) определяли по реакции на микробную тест-культуру *Micrococcus lysodeikticus* фотонейфелометрическим методом. При определении бактерицидной активности сыворотки крови в качестве тест-микроба использовали *Aeromonas hydrophila*.

Результаты. В результате добавления в рацион двухлетков карпа семян расторопши пятнистой в количестве 5% установлено уменьшение количества Т-лимфоцитов (общих, активных и теофиллин-резистентных) и иммуносупрессивное влияние на их функциональную активность за счет перераспределения рецепторного аппарата иммунокомпетентных клеток. В частности, зафиксировано увеличение количества неактивных в функциональном отношении Т-лимфоцитов крови и уменьшение доли клеток со средней и высокой плотностью рецепторов. В то же время, в условиях применения данной растительной добавки в количестве 1% в крови карпов выявлена тенденция к увеличению количества указанных популяций Т-лимфоцитов крови и повышение их функциональной активности. При этом у карпов обеих экспериментальных групп, относительно контрольной, возросло количество высокоавидных В-лимфоцитов крови ($p < 0,05$). Эти данные свидетельствуют о дозозависимом влиянии семян расторопши пятнистой на состояние Т- и В-клеточного звеньев специфической защиты организма карпов.

Констатировано стимулирующее влияние исследуемой добавки на активность клеточного и гуморального звеньев естественной резистентности организма двухлетков карпа. Об этом свидетельствуют достоверно более высокая бактерицидная, лизоцимная и фагоцитарная активность в крови карпов экспериментальных групп относительно контрольной. Одновременно, это влияние было выражено в большей степени у карпов, которым в состав основного рациона вводили расторопшу пятнистую в количестве 1%.

Научная новизна. Впервые исследовано влияние расторопши пятнистой на активность Т- и В-клеточного звеньев иммунитета и показатели неспецифической резистентности организма двухлетков карпа.

Практическая значимость. Введение расторопши пятнистой в состав кормов в процессе товарного выращивания карпа позволит повысить естественную резистентность их организма.

Ключевые слова: двухлетки карпа, расторопша пятнистая, Т- и В-лимфоциты, лизоцимная, бактерицидная и фагоцитарная активности, резистентность.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Основним завданням при товарному вирощуванні коропа є досягнення високих показників продуктивності та якості отриманої продукції. Ефективність вирощування коропа залежить від низки чинників, зокрема: технологічних аспектів, обґрунтованого балансування та нормування раціону, генетичного потенціалу організму тощо. В процесі вирощування рибної продукції практично

неможливо забезпечити оптимальні умови утримання в ставах упродовж усього вегетаційного періоду, адже на водне середовище безпосередньо діє низка чинників екзогенного походження, які негативно впливають на функціональний стан організму риб [1, 2].

Відомо, що імунна система риб здійснює захист внутрішнього середовища від впливу чужорідних антигенів і є досить чутливим показником стану як самого організму, так і середовища існування [3, 4]. Саме тому важливим є пошук засобів та способів забезпечення належного рівня резистентності організму риб. Розрізняють неспецифічну резистентність організму, тобто стійкість до будь-яких патогенних чинників, незалежно від їхньої природи, і специфічну — зазвичай до певного конкретного агента [5]. Специфічна резистентність організму риб забезпечується реакціями імунітету, і значною мірою залежить від умов середовища існування [6, 7].

З метою попередження захворювань і підвищення інтенсивності росту риб у рибництві успішно використовують добавки та препарати рослинного походження, для яких характерні: широкий спектр дії, високий вміст біологічно активних речовин, низька токсичність і відсутність негативного впливу на організм за умов тривалого їх застосування [8, 9].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

З огляду на вищевказане, перспективним є дослідження ефективності застосування розторопші плямистої (*Silybum marianum*) у складі раціону при вирощуванні коропа. Відомо, що насіння розторопші містить близько 200 різних за дією компонентів. Біологічно активні речовини, що містяться у плодах розторопші плямистої (флавоноїд силімарин і його головний ізомер — силібін), зумовлюють гепатопротекторну, жовчогінну, мембраностабілізуючу дії препарату, а саме: нормалізують обмінні процеси у печінці, підвищують стійкість гепатоцитів, знижуючи сприйнятливості клітин до багатьох шкідливих впливів за рахунок блокування транспортних систем, які сприяють переносу токсичних речовин через мембрану [10, 11]. Силібін підвищує концентрацію антиоксидантів і опірність організму під час захворювань, які супроводжуються оксидативними пошкодженнями. Лікування силібініном асоційоване із захистом від токсинів [12]. Також флавоноїди розторопші стимулюють синтез білків і підтримують процес регенерації гепатоцитів [13], секреторну та рухову функції шлунково-кишкового тракту [14].

На підставі результатів експериментальних робіт з використанням тетрахлорметану, атофану та тетрацикліну дослідниками визначено, що додавання до раціону риб розмелених плодів розторопші плямистої за дози 25 мг/кг корму сприяє зменшенню явища цитолізу, концентрації ТБК-активних продуктів, холестерину та нормалізації рівня відновленого глутатіону, до того ж більш активно, ніж фармпрепарат [15, 16].

До теперішнього часу доступна обмежена інформація відносно використання розторопші плямистої та біологічно активних речовин у її складі як у ветеринарній медицині, так і у рибництві. Тому дослідження з визначення доз, кінетики та ефектів використання розторопші плямистої з метою підвищення імунного потенціалу та життєздатності риб є доцільним та актуальним.

Мета досліджень полягала у з'ясуванні впливу введення до складу основного раціону дволіток коропа різної кількості насіння розторопші плямистої на стан Т- і В-клітинного імунітету та показники природної резистентності організму.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проводились на базі ДП «ДГ Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН». Об'єктом дослідження були дволітки любінського лускатого коропа (*Cyprinus carpio* L.). Контрольна група складала 225 особин і утримувалася у ставу площею 0,15 га. Перша дослідна група (Дослід 1) налічувала 210 екз. і утримувалася у ставу площею 0,14 га; друга дослідна група (Дослід 2) складала 165 екз. і утримувалась у ставу площею 0,11 га. Риби контрольної групи споживали збалансований комбікорм рецепту № ПК АВО МІКС-100 без добавок. Коропам дослідних груп (Дослід 1 і Дослід 2) до складу вказаного комбікорму методом гранулювання додатково вводили розмелені плоди розторопші плямистої в кількості 1 і 5% відповідно. Після завершення вегетаційного періоду було здійснено вилов риби та відібрано зразки для проведення імунологічних досліджень. Усі маніпуляції з тваринами проводили відповідно до вимог Європейської конвенції «Про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і наукових цілей» [17].

Матеріалом для імунологічних досліджень слугувала кров, яку брали безпосередньо з серця риб. Досліджували кількість Т- і В-лімфоцитів та їх функціональну активність, а також показники природної резистентності: фагоцитарну активність гранулоцитів та бактерицидну і лізоцимну активності сироватки крові [18, 19].

Лімфоцити виділяли зі стабілізованої гепарином крові у градієнті фіколоворографіну ($\rho=1,077$ г/мл). Загальну кількість Т-лімфоцитів (Е-РУЛ) визначали в реакції спонтанного розеткоутворення з еритроцитами вівці, їх субпопуляції — Т-хелпери (Th-РУЛ); кількість «активних» Т-лімфоцитів (ТА-РУЛ); кількість Т-клітин із переважно супресорною активністю (Ts-РУЛ) — відніманням кількості теофілін — резистентних Т-клітин від загальної кількості Т-лімфоцитів. Диференціювали лімфоцити на нульові, низькоавідні, середньоавідні та високоавідні. Показники фагоцитозу гранулоцитів крові оцінювали за фагоцитарною активністю (ФА), фагоцитарним числом (ФЧ) та фагоцитарним індексом (ФІ). Лізоцимну активність сироватки крові (ЛАСК) визначали за реакцією на мікробну тест-культуру *Micrococcus lysodeikticus* фотонейлометричним методом. При визначенні бактерицидної активності (БАСК) в якості тест-мікроба використовували *Aeromonas hydrophila*. Виконання вказаних методик проводили у відповідності до рекомендацій, описаних В. Р. Мікряковим [20].

Опрацювання результатів досліджень проводили методом варіаційної статистики. Статистично вірогідну різницю показників оцінювали за t-критерієм Стьюдента [21].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Відомо, що для оцінки резистентності риб до захворювань використовують різноманітні методичні прийоми аналізу структурно-функціонального стану імунної системи. Одним з таких є дослідження кількості і функціональної

активності Т- і В-лімфоцитів крові та їхніх регуляторних субпопуляцій [22, 23].

З наведених у таблиці 1 даних бачимо, що кількість Т-лімфоцитів (загальних, активних і теофілін-резистентних) у крові коропів Досліді 2 вірогідно менша, ніж в особин контрольної групи. При дослідженні рецепторного апарату імунокомпетентних клітин в особин цієї групи необхідно зауважити, що кількість вказаних популяцій Т-лімфоцитів з високою і середньою щільністю рецепторів була меншою ($p < 0,05-0,001$), а «нульових», недиференційованих у функціональному відношенні — більшою ($p < 0,05-0,001$), ніж у контролі. Водночас у крові коропів Досліді 1, яким додатково до основного раціону вводили 1% розторопші плямистої, вірогідних змін у кількості вказаних популяцій Т-лімфоцитів відносно контролю не зафіксовано. При цьому виявлено тенденцію до збільшення кількості високоавідних Т-лімфоцитів (загальних і активних). Таким чином результати проведених досліджень свідчать, що застосування в годівлі дволіток коропа розмелених плодів розторопші плямистої упродовж вегетаційного періоду спричиняє дозозалежний вплив на кількість Т-лімфоцитів та їхню функціональну активність.

При дослідженні В-клітинної ланки специфічного захисту організму риби звертає на себе увагу вірогідне зростання кількості високоавідних субпопуляцій В-лімфоцитів у крові коропів обох дослідних груп відносно контрольної. При цьому зафіксовано тенденцію до збільшення у крові загальної кількості В-лімфоцитів у коропів Досліді 2 і середньоавідних ЕАС-РУЛ. В-лімфоцити — попередники клітин, що є продуцентами антитіл; відповідно, збільшення їхньої кількості у крові коропів Досліді 2 є ознакою зростання здатності організму до активного синтезу захисних антитіл.

При цьому імунорегуляторний індекс, який визначає співвідношення субпопуляційного складу Т-лімфоцитарної ланки клітинного імунітету і опосередковано характеризує фазу імунної відповіді організму, знижується в Досліді 1 і Досліді 2 на 20,8 і 23,6% відповідно. Тобто знижується кількість Т-хелперів і зростає Т-супресорів у крові коропів дослідних груп, що може свідчити про супресивну спрямованість імунних реакцій.

Отже, при проведенні досліджень встановлено, що застосування у складі комбікорму для дволіток коропа розмелених плодів розторопші плямистої упродовж вегетаційного періоду спричиняє дозозалежний вплив на клітинну ланку специфічного імунітету. Зокрема, констатовано імуносупресивний вплив досліджуваної добавки за умов використання в кількості 5% у складі комбікорму і активуючий — в кількості 1%. Застосування у складі раціону для коропів 1% розторопші плямистої зумовлює збільшення на поверхні Т- і В-лімфоцитів кількості рецепторів, здатних взаємодіяти з більшою кількістю антигенних детермінант, внаслідок чого зростає функціональна активність імунної відповіді організму [24]. Підвищення функціональної активності Т- і В-лімфоцитів у крові коропів, очевидно, можна пояснити як прямим, так і опосередкованим впливом 1% розторопші плямистої у складі комбікорму на експресію Т- і В-лімфоцитів на плазматичні мембрани.

Таблиця 1. Кількість Т- і В-лімфоцитів та їхня функціональна активність

у крові дволіток коропа за впливу розторопші плямистої ($M \pm m, n = 4$)

Table 1. The number of T- and B-lymphocytes and their functional activity in the blood of two-year-old carp when exposed to milk thistle ($M \pm m, n = 4$)

Показники / Indicators		Контроль / Control	Дослід 1 / Experiment 1	Дослід 2 / Experiment 2	
Т-активні А-РУЛ / T-active A-RUL	0	71,5 ± 1,23	70,8 ± 1,40	76,0 ± 0,36***	
	3-5	18,5 ± 1,36	15,5 ± 0,67	21,2 ± 0,49	
	6-10	7,0 ± 1,29	7,7 ± 0,56	2,7 ± 0,42***	
	М	4,0 ± 0,63	6,0 ± 0,89	0,0	
	%	28,5 ± 1,23	29,2 ± 1,40	24,0 ± 0,36***	
Т-загальні Е-РУЛ / T-total E-RUL	0	52,0 ± 1,57	51,0 ± 1,46	55,7 ± 0,49*	
	3-5	28,5 ± 2,63	26,8 ± 3,66	31,0 ± 0,36	
	6-10	13,2 ± 1,56	13,0 ± 1,0	9,5 ± 0,43*	
	М	6,3 ± 1,28	9,2 ± 1,96	3,8 ± 0,48	
	%	48,0 ± 1,57	49,0 ± 1,46	44,3 ± 0,49*	
Т-РУЛ / T-RUL	0	70,8 ± 1,40	69,8 ± 0,60	74,5 ± 0,50*	
	3-5	18,7 ± 1,41	20,5 ± 1,31	21,5 ± 0,43	
	6-10	6,7 ± 0,76	5,8 ± 0,60	4,0 ± 0,45**	
	М	3,8 ± 0,17	2,83 ± 0,65	0,0	
	%	29,2 ± 1,40	28,2 ± 0,60	25,5 ± 0,50*	
Т-супресори / suppressor-cytotoxic T cells		%	18,8 ± 2,50	20,8 ± 1,66	18,8 ± 0,31
Імунорегуляторний індекс (Т-хелпери / Т-супресори) /Immunoregulatory index (helper-suppressor cell ratio)		од.	1,78 ± 0,368	1,41 ± 0,137**	1,36 ± 0,040**
В-РУЛ / B-RUL	0	58,5 ± 0,99	57,5 ± 0,99	56,2 ± 0,40	
	3-5	31,2 ± 0,70	29,3 ± 0,76	31,2 ± 0,30	
	6-10	7,8 ± 1,28	8,8 ± 0,87	8,0 ± 0,63	
	М	2,5 ± 0,41	4,7 ± 0,71*	4,3 ± 0,56*	
	%	41,5 ± 0,99	41,5 ± 0,99	43,8 ± 0,40	

Примітка. У цій і наступній таблиці різниця статистично вірогідна порівняно з контрольною групою: * — $p < 0,05$, ** — $p < 0,01$, *** — $p < 0,001$.

Note. In this and the following table, the difference is statistically significant compared to the control group: * — $p < 0,05$, ** — $p < 0,01$, *** — $p < 0,001$.

Відомо, що імунна система риб, як і вищих хребетних, забезпечує саморегуляцію за допомогою безпосереднього контакту клітин, а також за участю специфічних та неспецифічних факторів захисту. Неспецифічні механізми захисту мають значно більший діапазон функцій і використовуються для знешкодження навіть тих чужорідних тіл, із якими організм взагалі не

контактував [25]. До неспецифічних факторів захисту відносять фагоцитоз лейкоцитів [25], неспецифічні цитотоксичні клітини [26]. Водночас, у риб виявлено низку філогенетично закріплених неспецифічних гуморальних факторів, які мають протимікробну дію: лізоцим, фібриноген, бактерицидна активність сироватки крові [7].

Одним із важливих чинників природної резистентності організму, який має властивість піддавати лізису клітини мікроорганізмів, які потрапляють в організм, є лізоцим. Даний ензим з одного боку, може розщеплювати полісахариди, а з іншого — мобілізувати інші неспецифічні чинники захисту [7]. Як бачимо з даних, наведених у таблиці 2, у коропів Дослід 1 і Дослід 2 лізоцимна активність сироватки крові була відповідно на 8,2 ($p < 0,001$) і 5,7% ($p < 0,001$) вищою, ніж у контролі. При цьому, у коропів Дослід 1 виявлено тенденцію до зростання іншого важливого інтегрального показника природної резистентності — бактерицидної активності сироватки крові. Відомо, що даний показник пов'язаний з наявністю у сироватці крові компонентів, що знешкоджують і розчиняють мікробні клітини [27]. Зростання бактерицидної активності сироватки крові у коропів за використання 1% розторопші плямистої у складі комбікорму можна пояснити адитивною дією компонентів цієї рослини у підвищенні функціональної активності клітин крові, відповідальних за продукцію опсонізуючих факторів, а також посиленням кооперативної взаємодії клітинних компонентів імунної системи.

Таблиця 2. Показники неспецифічної резистентності організму дволіток коропа за впливу розторопші плямистої ($M \pm m$, $n = 4$)

Table 2. Indicators of two-year-old carp organism nonspecific resistance when exposed to milk thistle ($M \pm m$, $n = 4$)

Показники / Indicators	Контроль / Control	Дослід 1 / Experiment 1	Дослід 2 / Experiment 2
Лізоцимна активність,% / Lysozyme activity,%	35,3 $\pm$ 0,67	43,5 $\pm$ 0,56***	41,0 $\pm$ 0,97***
Бактерицидна активність,% / Bactericidal activity,%	48,8 $\pm$ 3,04	53,3 $\pm$ 3,65	43,4 $\pm$ 4,10
Фагоцитарна активність,% / Phagocytic activity,%	34,5 $\pm$ 1,41	43,3 $\pm$ 0,80***	43,7 $\pm$ 1,05***
Фагоцитарний індекс, од. / Phagocytic index, units	7,80 $\pm$ 0,25	7,12 $\pm$ 0,27	6,99 $\pm$ 0,27
Фагоцитарне число, од. / Phagocytic number, units	2,70 $\pm$ 0,161	3,23 $\pm$ 0,12*	3,05 $\pm$ 0,11

При дослідженні показників, що характеризують клітинну ланку природної резистентності звертають на себе увагу вищі показники фагоцитозу гранулоцитів крові у коропів дослідних груп відносно контрольної. Зокрема, фагоцитарна активність нейтрофілів крові коропів Дослід 1 і Дослід 2 була відповідно на 8,8 ($p < 0,001$) і 9,2% ($p < 0,001$) вищою, ніж у контролі (табл. 2). При цьому фагоцитарний індекс, який характеризує кількість захоплених мікроорганізмів одним активним фагоцитом, у крові коропів дослідних груп був на рівні контрольного, а фагоцитарне число, що вказує на кількість фагоцитованих

мікробних клітин на 100 підрахованих лейкоцитів, було на 19,6% ($p < 0,05$) вищим у риб Досліді 1.

Загалом, отримані результати досліджень свідчать, що згодовування розмелених плодів розторопші плямистої у складі комбікорму для дволіток коропа впродовж вегетаційного періоду спричиняє дозозалежний вплив на функціонування механізмів природного й адаптивного імунного захисту риб.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Введення насіння розторопші плямистої у кількості 5% до складу раціону дволіток коропа зменшувало кількість Т-лімфоцитів (загальних, активних і теофілін-резистентних) та спричиняло імуносупресивний вплив на їхню функціональну активність. Натомість, введення до складу комбікорму даної рослинної добавки у кількості 1% викликало тенденцію до збільшення кількості вказаних популяцій Т-лімфоцитів крові і підвищення їхньої функціональної активності, що свідчить про дозозалежний її вплив на активність Т- і В-клітинної ланок специфічного захисту риб. Констатовано вищий потенціал природних факторів захисту в організмі коропів, яким згодовували комбікорм з добавкою розмелених плодів розторопші плямистої у кількості 1%.

У подальшому дослідження будуть присвячені поглибленому вивченню впливу розторопші плямистої на організм різновікових груп коропа, відповідно до спектру її біологічно активних властивостей. Буде визначено ефективність та здійснено порівняльний аналіз використання даної рослинної добавки в годівлі коропа за різних умов вирощування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Секретарюк К. В., Стрижак О. І., Лобойко Ю. В. Вплив основних гідрохімічних показників на організм вирощуваних риб // Сільський господар. 2003. № 9–10. С. 29–30.
2. Zelikoff J. T. Biomarkers of immunotoxicity in fish and other non-mammalian sentinel species: predictive value for mammals // Toxicology. 1998. Vol. 1. P. 63–71.
3. Bubanovic I. V. Crossroads of extrathymic lymphocytes maturation pathways // Med. Hypotheses. 2003. Vol. 2. P. 235–239.
4. Echinoderm immunity and evolution of the complement system / Gross P. S. et al. Developmental & Comparative Immunology. 1999. Vol. 23. P. 429–442.
5. Иванов А. А. Физиология рыб. Москва : Мир, 2003. 280 с.
6. Ecotoxicology and innate immunity in fish / Bols N. C. et al. // Developmental & Comparative Immunology. 2001. Vol. 25. P. 853–873.
7. Кондратьева И. А., Киташова А. А., Ланге М. А. Современные представления об иммунной системе рыб. Организация иммунной системы рыб // Вестн. Моск. ун-та. 2001. № 4. С. 11–23. (Серия : Биология).
8. Доклиническое изучение безопасности фитопрепаратов, обладающих гепатопротекторными свойствами / Крепова Л. В. и др. // Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения : 8 Междунар. съезд «Фитофарм 2004», 21-23 июня 2004 г. : матер. Санкт-Петербург, 2004. С. 111–114.
9. Никиткина А. К., Гущина В. А., Агапкина Н. Д. Расторопша пятнистая. Пенза : Пензенская гос. с-х. акад., 2003.

10. Münter K., Mayer D., Faulstich H. Characterization of a transporting system in rat hepatocytes. Studies with competitive and non-competitive inhibitors of phalloidin transport // *Biochimica & Biophysica Acta*. 1986. Vol. 860 (1). P. 91—98.
11. Особливості хімічного складу розторопші плямистої / Колесник М. Д. та ін. // Вісник Полтавської державної академії. 2007. № 1. С. 93—95.
12. Pradhan S. C., Girish C. Hepatoprotective herbal drug, silymarin from experimental pharmacology to clinical medicine // *Indian J. Med. Res.* 2006. Vol. 124 (5). P. 491—504.
13. Sonnenbichler J., Zetl I. Biochemical effects of the flavonolignane silibinin on RNA, protein and DNA synthesis in rat livers // *Prog. Clin. Biol. Res.* 1986. Vol. 213. P. 319—331.
14. Дослідження впливу нових лікарських препаратів на функціональний стан шлунково-кишкового тракту / Геруш О. В. та ін. // Клінічна фармація. 2017. № 1. С. 45—49.
15. Yagi K. Active oxygens, lipid peroxides, and antioxidants. Tokyo : Japan Scientific Societies Press ; New York : CRC Press, 1993. P. 289—298.
16. A review of the main bacterial fish diseases in mariculture systems / Alicia E. et al. // *Aquaculture*. 2005. Vol. 246. P. 37—61.
17. European Commission. Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes. URL: : <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033: 0079:en:PDF> (accessed 01.08.2019).
18. Иванова Н. Т. Атлас клеток крови рыб. Сравнительная морфология и классификация форменных элементов крови рыб. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1983. 184 с.
19. Ecotoxicology and innate immunity in fish / Bols N. C. et al. // *Developmental and Comparative Immunol.* 2001. Vol. 25. P. 853—873.
20. Микряков В. Р. Закономерности формирования приобретенного иммунитета у рыб Рыбинск : ИБВВ РАН, 1991. 153 с.
21. Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичной обработки данных. Москва : Финансы и статистика, 1983. 471 с.
22. Immunotoxicology of amphibians / Fournier M. et al. // *Applied Herpetology*. 2005. Vol. 2. P. 297—309.
23. Blood parameters of carp (*Cyprinus carpio* L.) kept in heated water culture at different feeding regimes / Serpunin G. G. et al. // *Acta scientiarum Polonorum*. 2002. Vol. 1(2). P. 121—128.
24. Дранник Г. П. Клиническая иммунология и аллергология. Одесса : Астропринт, 1999. 604 с.
25. Secomber C. J. The nonspecific immune system: cellular defences // *The fish immune system : Fish physiology series*. 1996. Vol. 15. P. 63—103.
26. Biochemistry and molecular biology of fishes : Metabolic biochemistry. Vol. 4 / eds. Hochachka P. W., Mommsen T. P. Amsterdam : Elsevier Science, 1995.
27. Маслянко Р. П. Основы иммунології. Львів : Вертикаль, 1999. 472 с.

REFERENCES

1. Sekretariuk, K. V., Stryzhak, O. I., & Loboiko, Yu. V. (2003). Vplyv osnovnykh hidrokhimichnykh pokaznykiv na orhanizm vyroshchuvanykh ryb. *Sil'skyi hospodar*, 9-10, 29-30.
2. Zelikoff, J. T. (1998). Biomarkers of immunotoxicity in fish and other non-mammalian sentinel species: predictive value for mammals. *Toxicology*, 1, 63-71.
3. Bubanovic, I. V. (2003). Crossroads of extrathymic lymphocytes maturation pathways. *Med. Hypotheses*, 2, 235-239.
4. Gross, P. S., Al-Sharif, W. Z., Clow, L. A., & Smith, L. C. (1999). Echinoderm immunity and evolution of the complement system. *Developmental & Comparative Immunology*, 23, 429-442.
5. Ivanov, A. A. (2003). *Fiziologiya ryb*. Moskva: Mir.
6. Bols, N. C., Brubacher, J. L., Ganassin, R. C., & Lee, E. J. (2001). Ecotoxicology and innate immunity in fish. *Developmental & Comparative Immunology*, 25, 853-873.
7. Kondrat'eva, I. A., Kitashova, A. A., & Lange, M. A. (2001). Sovremennye predstavleniya ob immunnoy sisteme ryb. Organizatsiya immunnoy sistemy ryb. *Vestn. Mosk. un-ta. Seriya Biologiya*, 4, 11-23.
8. Krepova, L. V., Bortnikova, V. V., & Shkarenko, A. A. (2004). Doklinicheskoe izuchenie bezopasnosti fitopreparatov, obladayushchikh gepatoprotektnymi svoystvami. *Aktual'nye problemy sozdaniya novykh lekarstvennykh preparatov prirodnogo proiskhozhdeniya : Materialy 8 Mezhdunar. S"ezda «Fitofarm 2004»*. Sankt-Peterburg, 111-114.
9. Nikitkina, A. K., Gushchina, V. A., & Agapkina N. D. (2003). *Rastoropsha pyatnistaya*. Penza: Penzenskaya gos. s-kh. akad.
10. Münter, K., Mayer, D., & Faulstich H. (1986). Characterization of a transporting system in rat hepatocytes. Studies with competitive and non-competitive inhibitors of phalloidin transport. *Biochimica & Biophysica Acta*, 860 (1), 91-98.
11. Kolesnyk, M. D., Semenov, S. O., Bankovska, I. B., & Trotskyi, M. Ia. (2007). Osoblyvosti khimichnoho skladu roztoropshi pliamystoi. *Visnyk Poltavskoi derzhavnoi akademii*, 1, 93-95.
12. Pradhan, S. C., & Girish, C. (2006). Hepatoprotective herbal drug, silymarin from experimental pharmacology to clinical medicine. *Indian. J. Med. Res*, 124 (5), 491-504.
13. Sonnenbichler, J., & Zetl, I. (1986). Biochemical effects of the flavonolignane silibinin on RNA, protein and DNA synthesis in rat livers. *Prog. Clin. Biol. Res*, 213, 319-331.
14. Herush, O. V., Yakovlieva, L. V., Spyrydonov, S. V., & Hrashchenkova, S. A. (2017). Doslidzhennia vplyvu novykh likarskykh preparativ na funktsionalnyi stan shlunkovo-kyshkovoho traktu. *Klinichna farmatsiia*, 1, 45-49.
15. Yagi, K. (1993). Active oxygens, lipid peroxides, and antioxidants. *Japan Scientific Societies Press Tokyo. New York: CRC Press*, 289-298.
16. Alicia, E., Toranzo, T., Magarin, O. S. B., & Romalde, J. L. (2005). A review of the main bacterial fish diseases in mariculture systems. *Aquaculture*, 246, 37-61.
17. European Commission. Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:en:PDF>.

18. Ivanova, N. T. (1983). *Atlas kletok krovi ryb. Sravnitel'naya morfologiya i klassifikatsiya formennykh elementov krovi ryb*. Moskva: Legkaya i pishchevaya promyshlennost'.
19. Bols, N. C., Brubacher, J. L., Ganassin, R. C., & Lee, L. E. J. (2001). Ecotoxicology and innate immunity in fish. *Developmental and Comparative Immunol*, 25, 853-873.
20. Mikryakov, V. R. (1991). *Zakonomernosti formirovaniya priobretennogo immuniteta u ryb*. Rybinsk: IBVV RAN.
21. Ayvazyan, S. A., Enyukov, I. S., & Meshalkin, L. D. (1983). *Prikladnaya statistika. Osnovy modelirovaniya i pervichnoy obrobotki dannykh*. Moskva: Finansy i statistika.
22. Fournier, M., Salo Robert, H. M., Dautremepuits, C., & Brousseau, P. (2005). Immunotoxicology of amphibians. *Applied Herpetology*, 2, 297—309.
23. Serpunin, G. G., Lihaceva, O. A., Trzebiatowski, R., Sadowski, J., & Odebralska, D. (2002). Blood parameters of carp (*Cyprinus carpio* L.) kept in heated water culture at different feeding regimes. *Acta scientiarum polonorum*, 1(2), 121-128.
24. Drannik, G. P. (1999). *Klinicheskaya immunologiya i alergologiya*. Odessa: Astroprint.
25. Secomber, C. J. (1996). The nonspecific immune system: cellular defences. *The fish immune system. Fish Physiology series*, 15, 63-103.
26. Hochachka, P. W., & Mommsen, T. P. (Ed.). (1995). *Biochemistry and molecular biology of fishes. Metabolic biochemistry*. (Vol. 4). Amsterdam: Elsevier Science.
27. Maslianko, R. P. (1999). *Osnovy imunolohii*. Lviv: Vertykal.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГІДРОХІМІЇ, ГІДРОЕКОЛОГІЇ ТА ВОДНІЙ ТОКСИКОЛОГІЇ. ТЕМАТИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

І. Й. Грициняк, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Т. М. Швець, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Формування довідкового переліку україно- та російськомовних публікацій з питань застосування класичних та розробки нових методів досліджень гідрохімічних показників природних та штучних водойм, а також визначення якості води.

Методика. Під час системного пошуку у процесі підготовки тематичного переліку було застосовано як цілісний, так і вибіркового методи. Бібліографічне ядро склали виключно україно- та російськомовні наукові видання, наявні у фонді наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 200 джерел, що охоплюють часовий інтервал з 1967 по 2017 рр., та висвітлюють методи досліджень, що використовуються у гідрохімії, гідроекології, еко- та іхтіотоксикології, за біомоніторингу якості вод. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Підготовлений список публікацій може бути використаний науковцями, практиками, спеціалістами, студентами, до сфери інтересів яких входять питання аналізу якості води, дослідження її хімічного складу, проблеми біоіндикації та біотестування.

Ключові слова: гідрохімічні показники, гідроекологія, іхтіотоксикологія, токсиканти, якість води, біомоніторинг.

RESEARCH METHODS IN HYDROCHEMISTRY, HYDROECOLOGY AND AQUATIC TOXICOLOGY. THEMATIC BIBLIOGRAPHY

Ir. Hrytsyniak, library@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

T. Shvets, library@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Forming a thematic bibliographic list of publications regarding the use of classical and the development of new methods for studying the hydrochemical parameters of natural and artificial water bodies as well as the determination of water quality.

Methods. The complete and selective methods were applied in the process of the systematic search. The bibliographic core has been formed with the publications exclusively in Ukrainian and Russian languages from the fund of the scientific library of the Institute of Fisheries NAAS of Ukraine.

© І. Й. Грициняк, Т. М. Швець, 2019

Results. The thematic list of publications consists of a total quantity of 78 sources covering the time interval from 1967 to 2017 and devoted to research methods used in hydrochemistry, hydroecology, eco- and ichthyotoxicology, and biomonitoring of water quality. The literary sources are arranged in alphabetical order by author or title, and described according to DSTU 8302:2015 "Information and documentation. Bibliographic reference. General principles and rules of composition", with the amendments (code UKND 01.140.40), as well as in accordance with the requirements of APA style — international standard of references.

Practical value. The list may be useful for scientists, practitioners, students, whose area of interests includes water quality analysis, the study of water chemical composition, bioindication and bioassay problems.

Key words: hydrochemical parameters, hydroecology, ichthyotoxicology, toxicants, water quality, biomonitoring.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГИДРОХИМИИ, ГИДРОЭКОЛОГИИ И ВОДНОЙ ТОКСИКОЛОГИИ. ТЕМАТИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Ир. И. Грициняк, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, г. Киев

Т. М. Швець, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, г. Киев

Цель. Формирование справочного перечня украино- и русскоязычных публикаций по вопросам применения классических и разработки новых методов исследования гидрохимических показателей естественных и искусственных водоемов, а также определения качества воды.

Методика. В ходе системного поиска, в процессе подготовки тематического перечня были применены как целостный, так и выборочный методы. Библиографическое ядро составляли исключительно украино- и русскоязычные научные издания, имеющиеся в фонде научной библиотеки Института рыбного хозяйства НААН Украины.

Результаты. Сформирован тематический библиографический перечень публикаций в количестве 200 источников, охватывающих временной интервал с 1967 по 2017 гг., и освещающих методы исследований, применяемые в гидрохимии, гидроэкологии, эко- и ихтиотоксикологии, при биомониторинге качества вод. Литературные источники размещены в алфавитном порядке по автору или названию, описаны согласно DSTU 8302:2015 «Информация и документация. Библиографическая ссылка. Общие положения и правила составления», с учетом поправок (код УКНД 01.140.40), а также в соответствии с требованиями к оформлению списка литературы по международному стандарту APA style.

Практическая значимость. Подготовленный список публикаций может быть использован учеными, практиками, студентами, в сферу интересов которых входят вопросы анализа качества воды, изучения ее химического состава, проблемы биоиндикации и биотестирования.

Ключевые слова: гидрохимические показатели, гидроэкология, ихтиотоксикология, токсиканты, качество воды, биомониторинг.

1. Александрова З. В., Долженко Л. С., Ромова М. Г. Методы гидрохимических исследований // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне: сборник научно-методических работ. Краснодар: АзНИИРХ, 2005. С. 23—49.
2. Анализ воды. Справочник: пер. с англ. 2-го изд. / ред. Ноллет Л. М. Л., Де Гелдер Л. С. П. Санкт-Петербург: Профессия, 2013. 920 с.

3. Аналітична хімія поверхневих вод / Набиванець Б. Й. та ін. Київ : Наукова думка, 2007. 457 с.
4. Андрушайтис А. Г., Авенс А. Х., Сейсума З. К. Методика постановки экотоксикологического эксперимента *in situ* // Гидробиологический журнал. 1984. Т. 20, № 1. С. 76—82.
5. Аристархова Е. О. Експрес-оцінка потенційної небезпеки води методом біотестування на *Daphnia magna* S. // Вісник аграрної науки. 2017. № 2. С. 50—54.
6. Аристархова Е. О. Оцінювання токсичності забруднених амоніаком вод на *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) методом «Time sampling» // Рибогосподарська наука України. 2017. № 4. С. 33—41.
7. Арсан О. М., Ситник Ю. М., Шаповал Т. М. Визначення вмісту аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) з метиленовим блакитним у природних водах // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 286—289.
8. Арсан О. М., Ситник Ю. М., Шаповал Т. М. Визначення вмісту нафтопродуктів у воді // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 279—280.
9. Арсан О. М., Ситник Ю. М., Шаповал Т. М. Визначення вмісту пестицидів у рибі // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 285—286.
10. Арсан О. М., Ситник Ю. М., Шаповал Т. М. Визначення вмісту у воді летких фенолів // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 280—283.
11. Арсан О. М., Ситник Ю. М., Шаповал Т. М. Визначення вмісту у воді пестицидів // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 283—284.
12. Ахмедов А. А., Перевозников М. А. Методика определения остаточных количеств купрохина (8-оксихинолят меди) и 3,4,5-трибромсалициланилида в воде // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1979. Вып. 146. С. 87—93.
13. Баринова С. С., Клоченко П. Д., Белоус Е. П. Водоросли как индикаторы экологического состояния водных объектов: методы и перспективы // Гидробиологический журнал. 2015. Т. 51, № 4. С. 3—23.
14. Барсукова М. М. Анализ токсического действия на рыб пятиокси ванадия гистологическим методом // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1986. Вып. 250. С. 58—65.
15. Белецкий В. И. Методика оценки сравнительной токсичности химических агентов для гидробионтов // Биотестирование природных и сточных вод : сборник научных трудов. Москва : ВНИРО, 1981. С. 75—77.
16. Болдирев Д. А. Санітарна оцінка води, донних відкладень і гідробіонтів узбережжя Криму та біоіндикація рибопродукції тест-об'єктом *Artemia salina* (L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 16. 00. 06 — гігієна тварин і ветеринарна санітарія. Харків : Харківська державна зооветеринарна академія, 2013. 24 с.
17. Брагинский Л. П. Интегральная токсичность водной среды и ее оценка с помощью методов биотестирования // Гидробиологический журнал. 1993. Т. 29, № 6. С. 66—73.
18. Брагинский Л. П., Давыдов О. Н. Экологическая экспертиза причин массовой гибели рыб. Киев : Институт зоологии НАНУ, 1996. 130 с.

19. Брагинский Л. П., Линник П. Н. К методике токсикологического эксперимента с тяжелыми металлами на гидробионтах // Гидробиологический журнал. 2003. Т. 40, № 1. С. 92—104.
20. Бурковский А. Л., Кулькин С. Г. Метод одновременного приготовления мазков крови и отпечатков почек рыб для сравнительной токсикологической диагностики // Гидробиологический журнал. 1981. Т. 17, № 6. С. 108—111.
21. Быкова А. В. Методы определения предельно допустимых концентраций токсичных веществ в рыбохозяйственных водоемах // Рыбохозяйственное использование внутренних водоемов : обзорная информация. Вып. 1. Москва : ЦНИИТЭИРХ, 1981. 60 с.
22. Волков И. В. Изучение интоксикации рыб методом теплового гемолиза эритроцитов // Биологические науки. 1969. № 8. С. 159—160.
23. Волкова И. В., Ершова Т. С., Шипулин С. В. Оценка качества воды водоемов рыбохозяйственного назначения с помощью гидробионтов : учебное пособие. Москва : Колос, 2009. 352 с.
24. Воскресенский К. А., Дмитриева Н. Г. Выявление сублетальных токсических загрязнений водоемов методом оценки адаптационных реакций тест-организмов // Биологические науки. 1977. № 10. С. 132—136.
25. Вятчанина Л. И., Гончаренко Н. И. Опыт применения экспресс-метода оценки токсичности водной среды по состоянию респираторного аппарата рыб // Проблемы производства и переработки рыбы и других гидробионтов : науч.-практ. конф., Киев, 24-25 нояб 1993 г. : матер. Киев, 1993. С. 69—70.
26. Ганджа Х. Д., Ганжа Д. Д., Канцева І. М. Екологічна індикація стану літоральних екосистем методом оцінки флуктуючої асиметрії // Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений-2 : Междунар. науч. конф., Херсон, 26-29 авг. 2008 г. : матер. Херсон, 2008. С. 102—105.
27. Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень. Теорія, методи, практика використання. Львів : Світ, 1995. 438 с.
28. Глазачева И. В. Применение метода агрессивной окисляемости воды для характеристики некоторых гидрохимических показателей рыбоводных прудов // Гидробиологический журнал. 1977. Т. 13, № 5. С. 128—131.
29. Головин А. Н., Кириченко С. Г., Демина Л. Л. Спектрографический метод определения содержания кадмия в мышечной ткани рыб // Рыбное хозяйство. 1975. № 8. С. 68—70.
30. Гончаренко Н. И. Использование чешуи рыб в диагностике водной среды // Методи іхтіологічних досліджень : І Всеукр. школа-семінар, 20-22 вер. 2007 р. : матер. Мелітополь, 2007. С. 5—8. (Бюлетень Іхтіологічної спілки України ; вип. 1).
31. Дементьева М. А., Шишина В. П. Сравнительная оценка качества среды обитания рыб методами биотестирования и морфофизиологического контроля при экстремальных ситуациях на рыбоводных хозяйствах // Первый конгресс ихтиологов России, Астрахань, сент. 1997 г. : тезисы докл. Москва : ВНИРО, 1997. С. 273.
32. Добрынский В. А., Рогаль И. В. Применение методов математического моделирования к изучению круговорота фосфора в пресноводных экосистемах // Гидробиологический журнал. 1993. Т. 29, № 5. С. 73—88.
33. ДСТУ ISO 10229:2005. Якість води. Визначення пролонгованої токсичності речовин на прісноводних рибах. Методика оцінювання дії речовин на темп

- росту райдужної форелі (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum (*Teleostei, Salmonidae*)). Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 14 с. (Національний стандарт України).
34. Дудкин С. И. Биохимические методы биоиндикации токсического воздействия на гидробионты // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне. Краснодар, 2005. С. 292—315.
 35. Евтушенко Н. Ю. Методологические аспекты ихтиотоксикологических исследований на основе биомониторинга // Развитие гидробиологических исследований в Украине. Киев : Наукова думка, 1993. С. 26—36.
 36. Зайдинер Ю. И. Методы оценки ущерба биоресурсам водоема антропогенной деятельностью // Рыбное хозяйство. 1993. № 3. С. 18—19.
 37. Звенигородский Э. Л. Использование методов теории нечетких множеств для оценки экологического статуса водохранилищ // Гидробиологический журнал. 1999. Т. 35, № 6. С. 90—98.
 38. Звенигородский Э. Л. Методика экологической оценки качества поверхностных вод на основе нечеткой логики // Гидробиологический журнал. 1999. Т. 35, № 1. С. 102—109.
 39. Золотов А. А. Классификация методов очистки сточных вод // Рыбне господарство України. 2007. № 6. С. 39—42.
 40. Зубенко И. Б., Белоконов В. Н. Источники и методы устранения ошибок в атомно-абсорбционном определении тяжелых металлов в объектах гидросферы // Гидробиологический журнал. 1997. Т. 33, № 2. С. 108—112.
 41. Инкина Г. А., Дубко Н. В. Применение метода Кнеппа для оценки процессов самоочищения в водоемах и водотоках // Гидробиологический журнал. 1980. Т. 16, № 3. С. 102—108.
 42. Инструментальный экспресс-метод оценки токсичности сточных вод по реакции ухода рыб / Власенко А. Г. и др. // Теоретические вопросы биотестирования. Волгоград, 1983. С. 100—104.
 43. Использование методов биотестирования и биоиндикации для эколого-токсикологического мониторинга пресноводных водоемов, испытывающих воздействие атмосферного загрязнения / Томилина И. И. и др. // Физиология и токсикология пресноводных животных. Рыбинск, 2007. С. 205—230.
 44. Качмар Т. М. Биоэлектрическая активность миокарда рыб как тест-метод разработки ПДК некоторых пестицидов в водоемах рыбохозяйственного назначения // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1988. Вып. 288. С. 159—160.
 45. Кирпенко Н. І. Тест А-Z за Кньопом для орієнтовного визначення токсичності води // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 327—331.
 46. Кленус В. Г. Визначення вмісту специфічних речовин радіаційної дії в гідробіонтах різного трофічного рівня // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 319—320.
 47. Кожова О. М., Шастина Н. А., Мельник Н. Г. Статистические методы оценки состояния водных экосистем // Гидробиологический журнал. 1979. Т. 15, № 3. С. 3—13.
 48. Козлов В. И. Методы экологического мониторинга эволюции экосистемы низовьев крупных рек // Рыбне господарство. 2009. Вип. 67. С. 100—106.

49. Комаровский Ф. Я., Клисенко М. А., Пищолка Ю. К. Определение содержания остатков пестицидов в органах и тканях пресноводных рыб // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 3. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1978. С. 36—49.
50. Комплексна оцінка екологічного стану басейну Дніпра / Романенко В. Д. та ін. Київ : Інститут гідробіології НАНУ, 2000. 103 с.
51. Коновець І. М., Кіпніс Л. С. Біотестування токсичності поверхневих вод та донних відкладів за допомогою гіллястовусих ракоподібних *Daphnia magna* Straus та *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 340—364.
52. Контроль качества воды : справочник. Ч. 1 : Методики аналитических исследований / ред. Минеев В. Г. ; сост. Овцов Л. П. и др. Москва : Издательство Мурашкина, 2004. 222 с.
53. Контроль органолептических показателей и физико-химических характеристик [воды] // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 128—191.
54. Контроль токсичности по поглощению кислорода // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 604—612.
55. Контроль токсичности по росту микроорганизмов активного ила // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 612—618.
56. Корпакова И. Г., Цыбульский И. Е. Методы биотестирования качества природной среды // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 98—115.
57. Критерий токсичности и принципы методик по водной токсикологии : сборник научных трудов. Москва : Московский университет, 1971. 307 с. (Известия ГосНИОРХ ; т. 78).
58. Крылов О. Н. Методика токсикологических опытов на рыбах с целью установления пограничных концентраций вредных веществ // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1979. Вып. 146. С. 100—116.
59. Лаврик В. И., Скуратовская И. А. Исследование устойчивости кислородного режима водных экосистем методами математического и имитационного моделирования // Гидробиологический журнал. 2007. Т. 44, № 1. С. 111—117.
60. Лебединский Н. А. Применение метода эмиссионного спектрального анализа при изучении действия на рыб токсических веществ // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 3. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1978. С. 61—67.
61. Левич А. П., Терехин А. Т. Метод расчета экологически допустимых уровней воздействия на пресноводные экосистемы // Водные ресурсы. 1997. Т. 24, № 3. С. 328—335.

62. Линник П. М. Визначення дихроматної окисності води // *Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод* / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 255—257.
63. Линник П. М. Визначення загальної мінералізації (суми іонів) // *Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод* / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 225—226.
64. Линник П. М. Визначення концентрації розчиненого у воді кисню // *Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод* / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 248—252.
65. Линник П. М. Визначення концентрації у воді амонійного азоту // *Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод* / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 240—242.
66. Линник П. М. Визначення концентрації у воді гідрокарбонат-іонів // *Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод* / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 232—233.
67. Линник П. М. Визначення концентрації у воді заліза (феруму) загального // *Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод* / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 272—275.
68. Линник П. М. Визначення концентрації у воді іонів Ca^{2+} // *Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод* / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 233—235.
69. Линник П. М. Визначення концентрації у воді іонів Mg^{2+} // *Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод* / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 235—237.
70. Линник П. М. Визначення концентрації у воді марганцю (мангану) хемілюмінесцентним методом // *Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод* / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 275—276.
71. Линник П. М. Визначення концентрації у воді миш'яку (арсену) // *Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод* / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 270—272.
72. Линник П. М. Визначення концентрації у воді нікелю // *Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод* / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 268—270.
73. Линник П. М. Визначення концентрації у воді нітратного азоту // *Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод* / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 244—246.
74. Линник П. М. Визначення концентрації у воді нітритного азоту // *Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод* / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 242—244.
75. Линник П. М. Визначення концентрації у воді ртуті (меркурію) // *Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод* / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 261—262.
76. Линник П. М. Визначення концентрації у воді сульфат-іонів // *Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод* / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 229—231.
77. Линник П. М. Визначення концентрації у воді фосфору фосфатів // *Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод* / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 246—248.

78. Линник П. М. Визначення концентрації у воді фторид-іонів // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 276—278.
79. Линник П. М. Визначення концентрації у воді хлорид-іонів // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 226—229.
80. Линник П. М. Визначення концентрації у воді хрому загального // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 265—267.
81. Линник П. М. Визначення концентрації у воді цинку, кадмію, свинцю (плюмбуму) та міді (купруму) методом анодної інверсійної вольтамперометрії // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 263—265.
82. Линник П. М. Визначення перманганатної окисності води // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 252—254.
83. Линник П. М. Встановлення іонного складу води // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 237—238.
84. Линник П. М. Встановлення концентрації водневих іонів (рН води) // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 239—240.
85. Линник П. М. Хемілюмінесцентний метод визначення концентрації у воді хрому тривалентного Cr (III) // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 267—268.
86. Линник П. Н. Методика исследований процессов комплексообразования ионов металлов в природных водах // Гидробиологический журнал. 1980. Т. 16, № 6. С. 61—63.
87. Линник П. Н., Линник Р. П., Запорожец О. А. Методы исследования сосуществующих форм металлов в природных водах (обзор) // Методы и объекты химического анализа. 2006. Т. 1, № 1. С. 4—26.
88. Лукьяненко В. И. Биохимические тесты в ихтиотоксикологии // Теоретические вопросы биотестирования. Волгоград, 1983. С. 38—45.
89. Лукьяненко В. И., Карпович Т. А. Биотестирование на рыбах (Методические рекомендации). Москва. : АН СССР, 1989. 96 с.
90. Мальцев В. И., Карпова Г. О., Зуб Л. М. Визначення якості води методами біоіндикації : науково-методичний посібник. Київ : Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАНУ ; Недержавна наукова установа Інститут екології ІНЕКО, 2011. 112 с.
91. Маляревская А. Я., Биргер Т. И., Комаровский Ф. Я. Определение накопления токсинов синезеленых водорослей в тканях рыб // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 3. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1978. С. 22—30.
92. Маляревская А. Я., Биргер Т. И., Комаровский Ф. Я. Оценка влияния токсических веществ синезеленых водорослей на организм пресноводных рыб // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их

- ареалов. Ч. 3. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1978. С. 31—35.
93. Мартемьянов В. И. Методы оценки действия неблагоприятных факторов на гидробионты по показателям ионного обмена // Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы : III Всерос. конф. по водной токсикологии, посвящ. памяти Б. А. Флерова : матер. Ч. 2. Борок, 2008. С. 87—91.
94. Методи контролю за абіотичними та біотичними компонентами екосистем / укл. Литвинова Т. Г. та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2010. 19 с.
95. Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України : проект / Романенко В. Д. та ін. Київ : ВПОЛ, 2001. 48 с.
96. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / Романенко В. Д. та ін. Київ : Символ-Т, 1998. 28 с.
97. Методика определения токсичности водной среды по изменениям жаберного аппарата рыб / Андронников С. Б. и др. // Гидробиологический журнал. 1987. Т. 23, № 3. С. 92—95.
98. Методика оценки экологических рисков, возникающих при воздействии источников загрязнения на водные объекты / Афанасьев С. А., Гродзинский М. Д. Киев : АйБи, 2004. 59 с.
99. Методика подсчета ущерба, нанесенного рыбному хозяйству в результате сброса в рыбохозяйственные водоемы сточных вод и других отходов. Москва, 1967. 11 с.
100. Методика получения водных вытяжек из донных отложений для их биотестирования / Щербань Э. П. и др. // Гидробиологический журнал. 1994. Т. 30, № 4. С. 100—111.
101. Методики биологических исследований по водной токсикологии. Москва : Наука, 1971. 300 с.
102. Методические аспекты дешифрирования космических изображений водных растительных ландшафтов для оценки экологического состояния устьевых участков рек / Федоровский А. Д. и др. // Гидробиологический журнал. 2000. Т. 36, № 2. С. 84—94.
103. Методические указания по гематологическому обследованию рыб в водной токсикологии. Ленинград : ГосНИОРХ, 1974. 40 с.
104. Методические указания по установлению предельно допустимых концентраций вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов и дополнительных характеристик, нужных для расчета ПДС / Лесников Л. А. и др. Ленинград : ГосНИОРХ, 1989. 50 с.
105. Методичні рекомендації щодо визначення ступеню забруднення хлорорганічними пестицидами водойм комплексного та рибогосподарського призначення / Мельник А. П. та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2015. 18 с.
106. Методичні рекомендації щодо оцінки екологічного стану водойм рибогосподарського призначення з використанням системи біомоніторингу / укл. Євтушенко М. Ю., Шевченко П. Г., Хижняк М. І. Київ : НУБіП України, 2011. 60 с.
107. Методы анализа природных и сточных вод. Москва : Наука, 1977. 264 с.
108. Методы биоиндикации окружающей среды в районах АЭС : сборник научных трудов. Москва : Наука, 1988. 165 с.

109. Методы исследований токсичности на рыбах. Москва : Агропромиздат, 1985. 120 с.
110. Методы ихтиотоксикологических исследований : I Всесоюзный симпозиум по методам ихтиотоксикологических исследований, Ленинград, октябрь 1987 г. : тезисы докл. Ленинград, 1987. 141 с.
111. Методы определения загрязняющих веществ / Корпакова И. Г. и др. // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АЗНИИРХ, 2005. С. 79—97.
112. Михайлова Л. В. Исследование влияния нефти на рыб с помощью метода радиоизотопной индикации // X съезд Гидробиологического общества при РАН, Владивосток, 28 сент. – 2 окт. 2009 г. : тезисы докл. Владивосток, 2009. С. 273—274.
113. Мороз Т. Г. Сравнение различных методов оценки качества воды по индикаторным донным беспозвоночным // Гидробиологический журнал. 1978. Т. 14, № 3. С. 115—118.
114. Морозов Н. П., Петухов С. А. Определение содержания микроэлементов группы тяжелых и переходных металлов в рыбах // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 3. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1978. С. 50—60.
115. Набиванец Б. И., Линник П. Н., Удовиченко В. В. Методы определения химического потребления кислорода в природных водах // Гидробиологический журнал. 2000. Т. 36, № 4. С. 84—98.
116. Никаноров А. М. Гидрохимия и методы исследования качества вод суши. Ростов-на-Дону, 2017. 571 с.
117. Новиков Ю. В., Ласточкина К. О., Болдина З. Н. Методы исследования качества воды водоемов. Москва : Медицина, 1990. 400 с.
118. Новый экспресс-метод определения средних летальных концентраций ксенобиотиков для гидробионтов / Фрумин Г. Т. и др. // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1993. Вып. 335. С. 30—37.
119. Онищенко Л. С., Аршаница Н. М. Сравнительная характеристика различных методик оценки качества сточных вод предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и их влияния на водоемы // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1990. Вып. 313. С. 78—121.
120. Определение адсорбируемых галогенорганических соединений // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 441—446.
121. Определение азот- и фосфорорганических средств защиты растений // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 475—482.
122. Определение азота // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 215—229.
123. Определение активности липаз [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем,

- перспективних для промисла і марикультури / ред. Агатова А. І. Москва : ВНИРО, 2004. С. 83—84.
124. Определение активности нуклеаз [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промисла и марикультуры / ред. Агатова А. І. Москва : ВНИРО, 2004. С. 81—83.
125. Определение активности окислительно-восстановительных ферментов [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промисла и марикультуры / ред. Агатова А. І. Москва : ВНИРО, 2004. С. 68—73.
126. Определение активности протеолитических ферментов [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промисла и марикультуры / ред. Агатова А. І. Москва : ВНИРО, 2004. С. 77—81.
127. Определение активности фосфатазы [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промисла и марикультуры / ред. Агатова А. І. Москва : ВНИРО, 2004. С. 73—77.
128. Определение алюминия // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 252—260.
129. Определение аммония // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 229—252.
130. Определение белка в осадках по Лоури // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промисла и марикультуры / ред. Агатова А. І. Москва : ВНИРО, 2004. С. 40.
131. Определение бензола // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 451—465.
132. Определение бората // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 260—263.
133. Определение железа // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 263—267.
134. Определение кадмия // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 268—272.
135. Определение кадмия, никеля, кобальта, свинца и цинка // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по

- международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 272—281.
136. Определение калия // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 282—283.
137. Определение калия и натрия // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 285—287.
138. Определение кальция // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 288—290.
139. Определение легколетучих галогенированных углеводородов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 446—451.
140. Определение липидов [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 58—62.
141. Определение марганца // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 290—295.
142. Определение мышьяка // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 295—301.
143. Определение натрия // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 283—285.
144. Определение неорганических анионов и катионов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 301—335.
145. Определение нефтяных углеводородов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 422—430.
146. Определение нитратов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 335—344.
147. Определение нитратов и нитритов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным

- стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 347—350.
148. Определение нитритов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 344—347.
149. Определение нуклеиновых кислот и азотистых оснований [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 46—52.
150. Определение органических средств защиты растений // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 482—489.
151. Определение органического вещества [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 14—30.
152. Определение органического углерода // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 417—421.
153. Определение поверхностно-активных веществ // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 430—440.
154. Определение растворенного белка с Кумасси R-250 // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 32—37.
155. Определение растворенного и взвешенного белка по Лоури // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 38—40.
156. Определение растворенного кислорода // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 192—200.
157. Определение ртuti // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 350—360.
158. Определение свободного и общего хлора // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 201—212.
159. Определение свободных и связанных аминокислот [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных

- экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 41—46.
160. Определение селена // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 360—363.
161. Определение сульфатов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 363—365.
162. Определение сульфидов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 366—371.
163. Определение углеводов [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 52—57.
164. Определение феноксиалкановых гербицидов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 489—495.
165. Определение фенолов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 465—472.
166. Определение фосфора и фосфатов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 371—380.
167. Определение фторидов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 380—385.
168. Определение химических показателей качества воды // Сборник классических методов гидробиологических исследований для использования в аквакультуре / сост. Плотников Г. К. и др. Даугавпилс : Сауле, 2017. С. 129—180.
169. Определение хлоридов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 385—387.
170. Определение хлорорганических средств защиты растений // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 472—475.
171. Определение хлорофилла а // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам :

- энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 658—660.
172. Определение хрома // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 387—394.
173. Определение цианидов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 394—412.
174. Оцінка екологічного стану водойм методами біоіндикації. Перші кроки до оцінки якості води / Карпова Г. та ін. Бережани, 2010. 32 с.
175. Пашкевич А. И. Методы определения минерального фосфора в воде и их применение в гидробиологических исследованиях (Обзор) // Гидробиологический журнал. 1983. Т. 19, № 5. С. 16—27.
176. Перспективные методы биомониторинга внутренних водоемов / Федотов В. П. и др. // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : Междунар. науч.-практ. конф., 17-19 дек. 2007 г. : матер. и докл. Москва : Россельхозакадемия, 2007. С. 83—85.
177. Пилипенко Ю. В., Клименко М. О., Бедункова О. О. Метод інтегрованої діагностики стану гідроекосистем за цитогенетичним гомеостазом аборигенних видів риб // Водні біоресурси та аквакультура. 2017. № 2. С. 83—93.
178. Пилипенко Ю. В., Плоткін С. Я. Екологічна індикація екосистем малих водосховищ геоінформаційними методами // Таврійський науковий вісник. 2007. Вип. 52. С. 360—365.
179. Предеина Л. М. Экспресс-методика биотестирования поверхностных вод суши при загрязнении тяжелыми металлами // Проблемы рационального использования биоресурсов водохранилищ : Междунар. науч. конф., Киев, 6-8 сент. 1995 г. : матер. Киев, 1995. С. 173—174.
180. Приемы биоиндикации и биотестирования при текущем надзоре за загрязненностью водных объектов и выявлении превышения их ассимилирующей способности: методические указания. Санкт-Петербург, 1992. 28 с.
181. Применение математических методов к прогнозированию и управлению качеством воды в речных бассейнах / Литвинчук Г. С. и др. Киев : Наукова думка, 1979. 156 с.
182. Применение метода хромато-масс-спектрометрии для определения полихлорированных дифенилов в икре дунайской рыбы / Бродский Е. С. и др. // Гидробиологический журнал. 1992. Т. 28, № 6. С. 104—107.
183. Руководство по химическому анализу морских и пресных вод при экологическом мониторинге рыбохозяйственных водоемов и перспективных для районов Мирового океана / ред. Сапожников В. В. Москва : ВНИРО, 2003. 202 с.
184. Салазкин А. А. Методика постановки опыта по определению влияния различных ядохимикатов на водных беспозвоночных // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1983. Вып. 196. С. 103—107.

185. Смирнова Н. Н., Сиренко Л. А. Цитофизиологический метод экспресс-оценки токсичности природных вод // Гидробиологический журнал. 1993. Т. 29, № 4. С. 95—101.
186. Спектрофотометрический метод определения растворенного белка в пресных водах // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 37—38.
187. Справочник по физико-химическим методам исследования объектов окружающей среды : справочное издание / сост. Аранович Г. И., Коршунов Ю. Н., Ляликов Ю. С. Ленинград : Судостроение, 1979. 648 с.
188. Стойка Ю. О., Кіпніс Л. С., Коновець І. М. Визначення цитогенотоксичності води та витяжок донних відкладів за допомогою риб // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 365—375.
189. Строганов Н. С. Экспресс-метод установления ПДК для рыбохозяйственных водоемов // Гидробиологический журнал. 1976. Т. 12, № 4. С. 100—102.
190. Удовиченко В. В., Набиванец Б. И., Сухан В. В. Ускоренный метод определения химического потребления кислорода в природных водах // Гидробиологический журнал. 1999. Т. 35, № 5. С. 106—112.
191. Флуоресцентный метод определения активности некоторых гидролаз [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 85—88.
192. Цыцугина В. Г., Поликарпов Г. Г. Методология изучения эквивалентности действия радиоактивного и химического загрязнения на природные популяции гидробионтов // Гидробиологический журнал. 2004. Т. 41, № 5. С. 78—89.
193. Чалова И. В., Крылов А. В. Оценка качества природных и сточных вод методами биотестирования с использованием ветвистоусых ракообразных (*Cladocera*, *Crustacea*) : научно-методическое издание. Рыбинск : Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина, 2007. 73 с.
194. Чистяков В. А., Сазыкина М. А., Войнова Н. В. Биолюминисцентный метод определения генотоксичности воды, экстрактов донных отложений и тканей гидробионтов // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 116—122.
195. Широков Л. В. К разработке методики составления экологических прогнозов // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1982. Вып. 180. С. 178—188.
196. Шитиков В. К., Зинченко Т. Д., Головатюк Л. В. Нейросетевые методы оценки качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2002. Т. 4, № 2. С. 280—289.
197. Шуляренко Л. В. Йод в природных водах и методы его определения // Гидробиологический журнал. 1996. Т. 32, № 1. С. 95—108.
198. Щербак В. І. Визначення біохімічного споживання кисню (БСК) в природних водах // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 258—260.
199. Щербак В. І. Оцінка якості води за структурно-функціональними характеристиками фітопланктону // Методи гідроекологічних

досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 302—304.

200. Якушин В. М. Оцінка якості води за мікробіологічними показниками // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 305—307.

REFERENCES

1. Aleksandrova, Z. V., Dolzhenko, L. S., & Romova, M. G. (2005). Metody gidrokhimicheskikh issledovaniy. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom bassejne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot*. Krasnodar: AzNIIRKh, 2005, 23-49.
2. Nollet, L. M. L., & De Gelder, L. S. P. (Eds.). (2013). *Analiz vody. Spravochnik*. Sankt-Peterburg: Professiya.
3. Nabivanets', B. Y., Osadchiy, V. I., Osadcha, N. M., & Nabivanets', Yu. B. (2007). *Analitichna khimiya poverkhnevikh vod*. Kyiv: Naukova dumka.
4. Andrushaytis, A. G., Avens, A. Kh., & Seysuma, Z. K. (1984). Metodika postanovki ekotoksikologicheskogo eksperimenta *in situ*. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 20, 1, 76-82.
5. Aristarkhova, E. O. (2017). Ekspres-otsinka potentsiynoi nebezpeki vodi metodom biotestuvannya na *Daphnia magna* S. *Visnyk agrarnoi nauki*, 2, 50-54.
6. Aristarkhova, E. O. (2017). Otsinyuvannya toksichnosti zabrudnenikh amoniakom vod na *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) metodom «Time sampling». *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 33-41.
7. Arsan, O. M., Sitnik, Yu. M., & Shapoval, T. M. (2006). Vyznachennya vmistu anionnikh poverkhnevo-aktivnikh rechovin (APAR) z metilenovim blakitnim u prirodnikh vodakh. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevyykh vod*. Kyiv: Logos, 286-289.
8. Arsan, O. M., Sitnik, Yu. M., & Shapoval, T. M. (2006). Vyznachennya vmistu naftoproduktiv u vodi. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevyykh vod*. Kyiv: Logos, 279-280.
9. Arsan, O. M., Sitnik, Yu. M., & Shapoval, T. M. (2006). Vyznachennya vmistu pestitsidiv u ribi. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevyykh vod*. Kyiv: Logos, 285-286.
10. Arsan, O. M., Sitnik, Yu. M., & Shapoval, T. M. (2006). Vyznachennya vmistu u vodi letkikh fenoliv. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevyykh vod*. Kyiv: Logos, 280-283.
11. Arsan, O. M., Sitnik, Yu. M., & Shapoval, T. M. (2006). Vyznachennya vmistu u vodi pestitsidiv. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevyykh vod*. Kyiv: Logos, 283-284.
12. Akhmedov, A. A., & Perevoznikov, M. A. (1979). Metodika opredeleniya ostatochnykh kolichestv kuprokhina (8-oksikhinolyat medi) i 3,4,5-tribromsalitsilanilida v vode. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 146, 87-93.
13. Barinova, S. S., Klochenko, P. D., & Belous, E. P. (2015). Vodorosli kak indikatory ekologicheskogo sostoyaniya vodnykh ob"ektov: metody i perspektivy. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 51, 4, 3-23.
14. Barsukova, M. M. (1986). Analiz toksicheskogo deystviya na ryb pyatiokisi vanadiya gistologicheskim metodom. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 250, 58-65.

15. Beletskiy, V. I. (1981). Metodika otsenki sravnitel'noy toksichnosti khimicheskikh agentov dlya gidrobiontov. *Biotestirovanie prirodnnykh i stochnykh vod: sbornik nauchnykh trudov*. Moskva: VNIRO, 75-77.
16. Boldiriev, D. A. (2013). Sanitarna otsinka vodi, donnikh vidkladen' i gidrobiontiv uzberezhzhya Krimu ta bioindikatsiya riboproduktsii test-ob'iekтом *Artemia salina* (L.). *Extended abstracts of candidate's thesis*. Kharkiv: Kharkivs'ka derzhavna zooveterinarna akademiya.
17. Braginskiy, L. P. (1993). Integral'naya toksichnost' vodnoy sredy i ee otsenka s pomoshch'yu metodov biotestirovaniya. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 29, 6, 66-73.
18. Braginskiy, L. P., & Davydov, O. N. (1996). *Ekologicheskaya ekspertiza prichin massovoy gibeli ryb*. Kiev: Institut zoologii NANU.
19. Braginskiy, L. P., & Linnik, P. N. (2003). K metodike toksikologicheskogo eksperimenta s tyazhelymi metallami na gidrobiontakh. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 40, 1, 92-104.
20. Burkovskiy, A. L., & Kul'kin, S. G. (1981). Metod odnovremennogo prigotovleniya mazkov krovi i otpechatkov pohek ryb dlya sravnitel'noy toksikologicheskoy diagnostiki. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 17, 6, 108-111.
21. Bykova, A. V. (1981). Metody opredeleniya predel'no dopustimyykh kontsentratsiy toksichnykh veshchestv v rybokhozyaystvennykh vodoemakh. *Rybokhozyaystvennoe ispol'zovanie vnutrennikh vodoemov: obzornaya informatsiya*. Iss. 1. Moskva: TsNIITEIRKh.
22. Volkov, I. V. (1969). Izuchenie intoksikatsii ryb metodom teplovogo gemoliza eritrotsitov. *Biologicheskije nauki*, 8, 159-160.
23. Volkova, I. V., Ershova, T. S., & Shipulin, S. V. (2009). Otsenka kachestva vody vodoemov rybokhozyaystvennogo naznacheniya s pomoshch'yu gidrobiontov: uchebnoe posobie. Moskva: Kolos.
24. Voskresenskiy, K. A., & Dmitrieva, N. G. (1977). Vyyavlenie subletal'nykh toksicheskikh zagryazneniy vodoemov metodom otsenki adaptatsionnykh reaktsiy test-organizmov. *Biologicheskije nauki*, 10, 132-136.
25. Vyatchanina, L. I., & Goncharenko, N. I. (1993). Opyt primeneniya ekspress-metoda otsenki toksichnosti vodnoy sredy po sostoyaniyu respiratornogo apparata ryb. *Problemy proizvodstva i pererabotki ryby i drugikh gidrobiontov: nauch.-prakt. konf.*, Kiev, 24-25 noyab 1993 g.: mater. Kiev, 69-70.
26. Gandzha, Kh. D., Ganzha, D. D., & Kantseva, I. M. (2008). Ekologichna indikatsiya stanu litoral'nikh ekosistem metodom otsinki fluktuuyuchoi asimetrii. *Sovremennye problemy gidrobiologii. Perspektivy, puti i metody resheniy-2: Mezhdunar. nauch. konf., Kherson, 26-29 avg. 2008 g.: mater.* Kherson, 102-105.
27. *Gidroekologichna toksikometriya ta bioindikatsiya zabrudnen'.* Teoriya, metodi, praktika vikoristannya. (1995). L'viv: Svit.
28. Glazacheva, I. V. (1997). Primenenie metoda agressivnoy okislyaemosti vody dlya kharakteristiki nekotorykh gidrokhimicheskikh pokazateley rybovodnykh prudov. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 13, 5, 128-131.
29. Golovin, A. N., Kirichenko, S. G., & Demina, L. L. (1975). Spektrograficheskii metod opredeleniya soderzhaniya kadmiya v myshechnoy tkani ryb. *Rybnoe khozyaystvo*, 8, 68-70.
30. Goncharenko, N. I. (2007). Ispol'zovanie cheshui ryb v diagnostike vodnoy sredy. *Metodi ikhtologichnykh doslidzhen': I Vseukr. shkola-seminar, 20-22 ver. 2007 r.: mater.* Melitopol', 2007, 5-8.

31. Dement'eva, M. A., & Shishina, V. P. (1997). Sravnitel'naya otsenka kachestva sredy obitaniya ryb metodami biotestirovaniya i morfofizyologicheskogo kontrolya pri ekstremal'nykh situatsiyakh na rybovodnykh khozyaystvakh. *Pervyy kongress ikhtologov Rossii, Astrakhan', sent. 1997 g.: tezisy dokl.* Moskva: VNIRO, 273.
32. Dobrynskiy, V. A., & Rogal', I. V. (1993). Primenenie metodov matematicheskogo modelirovaniya k izucheniyu krugovorota fosfora v presnovodnykh ekosistemakh. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 29, 5, 73-88.
33. Yakist' vodi. Vznachennya prolongovanoi toksichnosti rechovin na prysnovodnykh rybakh. Metodika otsynyuvannya dii rechovin na temp rostu rayduzhnoi foreli (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum (*Teleostei, Salmonidae*)). (2006). *DSTU ISO 10229:2005*. Kyiv: Derzhspozhivstandart Ukraini.
34. Dudkin, S. I. (2005). Biokhimicheskie metody bioindikatsii toksicheskogo vozdeystviya na gidrobionty. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom bassejne*. Krasnodar, 292-315.
35. Evtushenko, N. Yu. (1993). Metodologicheskie aspekty ikhtiotoksikologicheskikh issledovaniy na osnove biomonitoringa. *Razvitie gidrobiologicheskikh issledovaniy v Ukraine*. Kiev: Naukova dumka, 26-36.
36. Zaydiner, Yu. I. (1993). Metody otsenki ushcherba bioresursam vodoema antropogennoy deyatel'nost'yu. *Rybnoe khozyaystvo*, 3, 18-19.
37. Zvenigorodskiy, E. L. (1999). Ispol'zovanie metodov teorii nechetkikh mnozhestv dlya otsenki ekologicheskogo statusa vodokhranilishch. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 35, 6, 90-98.
38. Zvenigorodskiy, E. L. (1999). Metodika ekologicheskoy otsenki kachestva poverkhnostnykh vod na osnove nechetkoy logiki. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 35, 1, 102-109.
39. Zolotov, A. A. (2007). Klassifikatsiya metodov ochistki stochnykh vod. *Ribne gospodarstvo Ukraini*, 6, 39-42.
40. Zubenko, I. B., & Belokon' V. N. (1997). Istochniki i metody ustraneniya oshibok v atomno-absorbtsionnom opredelenii tyazhelykh metallov v ob'ektakh gidrosfery. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 33, 2, 108-112.
41. Inkina, G. A., & Dubko, N. V. (1980). Primenenie metoda Kneppa dlya otsenki protsessov samoochishcheniya v vodoemakh i vodotokakh. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 16, 3, 102-108.
42. Vlasenko, A. G., et al. (1983). Instrumental'nyy ekspress-metod otsenki toksichnosti stochnykh vod po reaktsii ukhoda ryb. *Teoreticheskie voprosy biotestirovaniya*. Volgograd, 100-104.
43. Tomilina, I. I., et al. (2007). Ispol'zovanie metodov biotestirovaniya i bioindikatsii dlya ekologo-toksikologicheskogo monitoringa presnovodnykh vodoemov, ispytyvayushchikh vozdeystvie atmosfernogo zagryazneniya. *Fiziologiya i toksikologiya presnovodnykh zhivotnykh*. Rybinsk, 205-230.
44. Kachmar, T. M. (1988). Bioelektricheskaya aktivnost' miokarda ryb kak test-metod razrabotki PDK nekotorykh pestitsidov v vodoemakh rybokhozyaystvennogo naznacheniya. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 288, 159-160.
45. Kirpenko, N. I. (2006). Test A-Z za Kn'opom dlya oriyentovnogo viznachennya toksichnosti vodi. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevnykh vod*. Kyiv: Logos, 327-331.
46. Klenus, V. G. (2006). Vznachennya vmistu spetsifichnykh rechovin radiatsiyanoi dii v gidrobiontakh rznogo trofichnogo rivnya. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevnykh vod*. Kyiv: Logos, 319-320.

47. Kozhova, O. M., Shastina, N. A., & Mel'nik, N. G. (1979). Statisticheskie metody otsenki sostoyaniya vodnykh ekosistem. *Gidrobiologicheskiiy zhurnal*, 15, 3, 3-13.
48. Kozlov, V. I. (2009). Metody ekologicheskogo monitoringa evolyutsii ekosistemy nizov'ev krupnykh rek. *Rybne gospodarstvo*, 67, 100-106.
49. Komarovskiy, F. Ya., Klisenko, M. A., & Pishcholka, Yu. K. (1978). Opredelenie soderzhaniya ostatkov pestitsidov v organakh i tkanyakh presnovodnykh ryb. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 3. Vil'nyus: Institut zoologii i parazitologii AN Litovskoy SSR, 36-49.
50. Romanenko, V. D., et al. (2000). *Kompleksna otsinka ekologichnogo stanu baseynu Dnipra*. Kyiv: Institut gidrobiologii NANU.
51. Konovets', I. M., & Kipnis, L. S. (2006). Biotestuvannya toksichnosti poverkhnevikh vod ta donnikh vidkladiv za dopomogoyu gillyastovusikh rakopodibnykh *Daphnia magna* Straus ta *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 340-364.
52. Mineev, V. G. (Ed.). (2004). *Kontrol' kachestva vody: spravochnik. Ch. 1: Metodiki analiticheskikh issledovaniy*. Moskva: Izdatel'stvo Murashkina.
53. Fomin, G. S. (2000). Kontrol' organolepticheskikh pokazateley i fiziko-khimicheskikh kharakteristik [vody]. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 128-191.
54. Fomin, G. S. (2000). Kontrol' toksichnosti po pogloshcheniyu kisloroda. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 604-612.
55. Fomin, G. S. (2000). Kontrol' toksichnosti po rostu mikroorganizmov aktivnogo ila. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 612-618.
56. Korpakova, I. G., & Tsybul'skiy, I. E. (2005). Metody biotestirovaniya kachestva prirodnoy sredy. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom bassejne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot*. Krasnodar: AzNIIRKh, 98-115.
57. *Kriteriy toksichnosti i printsipy metodik po vodnoy toksikologii sbornik nauchnykh trudov*. (1971). Moskva: Moskovskiy universitet.
58. Krylov, O. N. (1979). Metodika toksikologicheskikh opytov na rybach s tsel'yu ustanovleniya pogranichnykh kontsentratsiy vrednykh veshchestv. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 146, 100-116.
59. Lavrik, V. I., & Skuratovskaya, I. A. (2007). Issledovanie ustoychivosti kislorodnogo rezhima vodnykh ekosistem metodami matematicheskogo i imitatsionnogo modelirovaniya. *Gidrobiologicheskiiy zhurnal*, 44, 1, 111-117.
60. Lebedinskiy, N. A. (1978). Primenenie metoda emissionnogo spektral'nogo analiza pri izuchenii deystviya na ryb toksicheskikh veshchestv. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 3. Vil'nyus: Institut zoologii i parazitologii AN Litovskoy SSR, 61-67.
61. Levich, A. P., & Terekhin, A. T. (1997). Metod rascheta ekologicheskii dopustimyykh urovney vozdeystviya na presnovodnye ekosistemy. *Vodnye resursy*, 24, 3, 328-335.
62. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya dikhromatnoi okisnosti vodi. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 255-257.

63. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya zagal'noi mineralizatsii (sumi ioniv). *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 225-226.
64. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya kontsentratsii rozchinenogo u vodi kisnyu. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 248-252.
65. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya kontsentratsii u vodi amoniynogo azotu. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 240-242.
66. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya kontsentratsii u vodi gidrokarbonat-ioniv. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 232-233.
67. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya kontsentratsii u vodi zaliza (ferumu) zagal'nogo. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 272-275.
68. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya kontsentratsii u vodi ioniv Ca^{2+} . *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 233-235.
69. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya kontsentratsii u vodi ioniv Mg^{2+} . *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 235-237.
70. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya kontsentratsii u vodi margantsyu (manganu) khemilyuminestsentnim metodom. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 275-276.
71. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya kontsentratsii u vodi mish'yaku (arsenu). *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 270-272.
72. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya kontsentratsii u vodi nikelyu. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 268-270.
73. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya kontsentratsii u vodi nitratnogo azotu. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 244-246.
74. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya kontsentratsii u vodi nitritnogo azotu. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 242-244.
75. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya kontsentratsii u vodi rtuti (merkuriyu). *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 261-262.
76. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya kontsentratsii u vodi sul'fat-ioniv. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 229-231.
77. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya kontsentratsii u vodi fosforu fosfativ. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 246-248.
78. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya kontsentratsii u vodi fluorid-ioniv. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 276-278.
79. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya kontsentratsii u vodi khlorid-ioniv. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 226-229.
80. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya kontsentratsii u vodi khromu zagal'nogo. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 265-267.
81. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya kontsentratsii u vodi tsinku, kadmiyu, svintsyu (plyumbumu) ta midi (kuprumu) metodom anodnoi inversiynoi vol'tamperometrii. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 263-265.
82. Linnik, P. M. (2006). Vznachennya permanganatnoi okisnosti vodi. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 252-254.
83. Linnik, P. M. (2006). Vstanovlennya ionnogo skladu vodi. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 237-238.
84. Linnik, P. M. (2006). Vstanovlennya kontsentratsii vodnevikh ioniv (rN vodi). *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 239-240.

85. Linnik, P. M. (2006). Khemilyuminestsentniy metod viznachennya kontsentratsii u vodi khromu trivalentnogo Cr (III). *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevyykh vod*. Kyiv: Logos, 267-268.
86. Linnik, P. N. (1980). Metodika issledovaniy protsessov kompleksobrazovaniya ionov metallov v prirodnykh vodakh. *Gidrobiologicheskyy zhurnal*, 16, 6, 61-63.
87. Linnik, P. N., Linnik, R. P., & Zaporozhets, O. A. (2006). Metody issledovaniya sosushchestvuyushchikh form metallov v prirodnykh vodakh (obzor). *Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza*, 1, 1, 4-26.
88. Luk'yanenko, V. I. (1983). Biokhimicheskie testy v ikhtiotoksikologii. *Teoreticheskie voprosy biotestirovaniya*. Volgograd, 38-45.
89. Luk'yanenko, V. I., & Karpovich, T. A. (1989). *Biotestirovanie na rybakh (Metodicheskie rekomendatsii)*. Moskva.: AN SSSR.
90. Mal'tsev, V. I., Karpova, G. O., & Zub, L. M. (2011). Viznachennya yakosti vodi metodami bioindikatsii: naukovy-metodichniy posibnik. Kyiv: Naukoviy tsentr ekomonitoringu ta bioriznomanittya megapolisu NANU; Nederzhavna naukova ustanova Institut ekologii INEKO.
91. Malyarevskaya, A. Ya., Birger, T. I., & Komarovskiy, F. Ya. (1978). Opreделение nakopleniya toksinov sinezelenykh vodorosley v tkanyakh ryb. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 3. Vil'nyus: Institut zoologii i parazitologii AN Litovskoy SSR, 22-30.
92. Malyarevskaya, A. Ya., Birger, T. I., & Komarovskiy, F. Ya. (1978). Otsenka vliyaniya toksicheskikh veshchestv sinezelenykh vodorosley na organizm presnovodnykh ryb. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 3. Vil'nyus: Institut zoologii i parazitologii AN Litovskoy SSR, 31-35.
93. Martem'yanov, V. I. (2008). Metody otsenki deystviya neblagopriyatnykh faktorov na gidrobionty po pokazatelyam ionnogo obmena. Antropogennoe vliyanie na vodnye organizmy i ekosistemy: III Vseros. konf. po vodnoy toksikologii, posvyashch. pamyati B. A. Flerova: mater. Ch. 2. Borok, 87-91.
94. Litvinova, T. G., et al. (Comp.). (2010). *Metodi kontrolyu za abiotichnimi ta biotichnimi komponentami ekosistem*. Kyiv: Institut ribnogo gospodarstva NAAN Ukraini.
95. Romanenko, V. D., et al. (2001). *Metodika vstanovlennya i vikoristannya ekologichnykh normativiv yakosti poverkhnevyykh vod sushy ta estuariiv Ukraini: proekt*. Kyiv: VIPOL.
96. Romanenko, V. D., et al. (1998). *Metodika ekologichnoi otsinki yakosti poverkhnevyykh vod za vidpovidnimi kategoriyami*. Kyiv: Simvol-T.
97. Andronnikov, S. B., et al. (1987). Metodika opredeleniya toksichnosti vodnoy sredy po izmeneniyam zhabernogo apparata ryb. *Gidrobiologicheskyy zhurnal*, 23, 3, 92-95.
98. Afanas'ev, S. A., & Grodzinskiy, M. D. (2004). *Metodika otsenki ekologicheskikh riskov, vznikayushchikh pri vozdeystvii istochnikov zagryazneniya na vodnye ob"ekty*. Kiev: AyBi.
99. *Metodika podscheta ushcherba, nanesennogo rybnomu khozyaystvu v rezul'tate sbrosa v rybokhozyaystvennye vodoemy stochnykh vod i drugikh otkhodov*. (1967). Moskva.
100. Shcherban', E. P., et al. (1994). Metodika polucheniya vodnykh vytyazhek iz donnykh otlozheniy dlya ikh biotestirovaniya. *Gidrobiologicheskyy zhurnal*, 30, 4, 100-111.

101. *Metodiki biologicheskikh issledovaniy po vodnoy toksikologii.* (1971). Moskva: Nauka.
102. Fedorovskiy, A. D., et al. (2000). Metodicheskie aspekty deshifirovaniya kosmicheskikh izobrazheniy vodnykh rastitel'nykh landshaftov dlya otsenki ekologicheskogo sostoyaniya ust'evykh uchastkov rek. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 36, 2, 84-94.
103. *Metodicheskie ukazaniya po gematologicheskomu obsledovaniyu ryb v vodnoy toksikologii.* (1974). Leningrad: GosNIORKh.
104. Lesnikov, L. A., et al. (1989). *Metodicheskie ukazaniya po ustanovleniyu predel'no dopustimyykh kontsentratsiy vrednykh veshchestv dlya rybokhozyaystvennykh vodoemov i dopolnitel'nykh kharakteristik, nuzhnykh dlya rascheta PDK.* Leningrad: GosNIORKh.
105. Mel'nik, A. P., et al. (2015). *Metodichni rekomendatsii shchodo viznachennya stupenyu zabrudnennya khlororganichnimi pestitsidami vodoym kompleksnogo ta ribogospodars'kogo pryznachennya.* Kyiv: Institut ribnogo gospodarstva NAAN.
106. Ievtushenko, M. Yu., Shevchenko, P. G., & Khizhnyak, M. I. (Comp.). (2011). *Metodichni rekomendatsii shchodo otsinki ekologichnogo stanu vodoym ribogospodars'kogo pryznachennya z vikoristannyam sistemi biomonitoringu.* Kyiv: NUBiP Ukraini.
107. *Metody analiza prirodnnykh i stochnykh vod.* (1977). Moskva: Nauka.
108. *Metody bioindikatsii okruzhayushchey sredy v rayonakh AES: sbornik nauchnykh trudov.* (1988). Moskva: Nauka.
109. *Metody issledovaniy toksichnosti na rybakh.* (1985). Moskva: Agropromizdat.
110. *Metody ikhtiotoksikologicheskikh issledovaniy: I Vsesoyuznyy simpozium po metodam ikhtiotoksikologicheskikh issledovaniy, Leningrad, oktyabr' 1987 g.: tezisy dokl.* (1987). Leningrad.
111. Korpakova, I. G., et al. (2005). Metody opredeleniya zagryaznyayushchikh veshchestv. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom bassejne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot.* Krasnodar: AzNIIRKh, 79-97.
112. Mikhaylova, L. V. (2009). Issledovanie vliyaniya nefiti na ryb s pomoshch'yu metoda radioizotopnoy indikatsii. *X s'ezd Gidrobiologicheskogo obshchestva pri RAN, Vladivostok, 28 sent. – 2 okt. 2009 g.: tezisy dokl.* Vladivostok, 273-274.
113. Moroz, T. G. (1978). Sravnenie razlichnykh metodov otsenki kachestva vody po indikatornym donnym bespozvonochnym. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 14, 3, 115-118.
114. Morozov, N. P., & Petukhov, S. A. (1978). Opredelenie soderzhaniya mikroelementov grupy tyazhelykh i perekhodnykh metallov v rybakh. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov.* Ch. 3. Vil'nyus: Institut zoologii i parazitologii AN Litovskoy SSR, 50-60.
115. Nabivanets, B. I., Linnik, P. N., & Udovichenko, V. V. (2000). Metody opredeleniya khimicheskogo potrebleniya kisloroda v prirodnnykh vodakh. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 36, 4, 84-98.
116. Nikanorov, A. M. (2017). *Gidrokimiya i metody issledovaniya kachestva vod sushi.* Rostov-na-Donu.
117. Novikov, Yu. V., Lastochkina, K. O., & Boldina, Z. N. (1990). *Metody issledovaniya kachestva vody vodoemov.* Moskva: Meditsina.

118. Frumin, G. T., et al. (1993). Novyy ekspress-metod opredeleniya srednikh letal'nykh kontsentratsiy ksenobiotikov dlya gidrobiontov. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 335, 30-37.
119. Onishchenko, L. S., & Arshanitsa, N. M. (1990). Sravnitel'naya kharakteristika razlichnykh metodik otsenki kachestva stochnykh vod predpriyatiy tsellyulozno-bumazhnoy promyshlennosti i ikh vliyaniya na vodoemy. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 313, 78-121.
120. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie adsorbiruemykh galogenorganicheskikh soedineniy. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 441-446.
121. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie azot- i fosfororganicheskikh sredstv zashchity rasteniy. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 475-482.
122. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie azota. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 215-229.
123. Agatova, A. I. (Ed.). (2004). Opredelenie aktivnosti lipaz [v vodnoy srede]. *Rukovodstvo po sovremennym biokhimicheskim metodam issledovaniya vodnykh ekosistem, perspektivnykh dlya promysla i marikul'tury*. red. Moskva: VNIRO, 83-84.
124. Agatova, A. I. (Ed.). (2004). Opredelenie aktivnosti nukleaz [v vodnoy srede]. *Rukovodstvo po sovremennym biokhimicheskim metodam issledovaniya vodnykh ekosistem, perspektivnykh dlya promysla i marikul'tury*. Moskva: VNIRO, 81-83.
125. Agatova, A. I. (Ed.). (2004). Opredelenie aktivnosti okislitel'no-vosstanovitel'nykh fermentov [v vodnoy srede]. *Rukovodstvo po sovremennym biokhimicheskim metodam issledovaniya vodnykh ekosistem, perspektivnykh dlya promysla i marikul'tury*. Moskva: VNIRO, 68-73.
126. Agatova, A. I. (Ed.). (2004). Opredelenie aktivnosti proteoliticheskikh fermentov [v vodnoy srede]. *Rukovodstvo po sovremennym biokhimicheskim metodam issledovaniya vodnykh ekosistem, perspektivnykh dlya promysla i marikul'tury*. Moskva: VNIRO, 77-81.
127. Agatova, A. I. (Ed.). (2004). Opredelenie aktivnosti fosfatazy [v vodnoy srede]. *Rukovodstvo po sovremennym biokhimicheskim metodam issledovaniya vodnykh ekosistem, perspektivnykh dlya promysla i marikul'tury*. Moskva: VNIRO, 73-77.
128. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie alyuminiya. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 252-260.
129. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie ammoniya. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 229-252.
130. Agatova, A. I. (Ed.). (2004). Opredelenie belka v osadkakh po Louri. *Rukovodstvo po sovremennym biokhimicheskim metodam issledovaniya vodnykh ekosistem, perspektivnykh dlya promysla i marikul'tury*. Moskva: VNIRO, 40.
131. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie benzola. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 451-465.

132. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie borata. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 260-263.
133. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie zheleza. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 263-267.
134. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie kadmiya. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 268-272.
135. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie kadmiya, nikelya, kobal'ta, svintsa i tsinka. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 272-281.
136. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie kaliya. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 282-283.
137. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie kaliya i natriya. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 285-287.
138. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie kal'tsiya. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 288-290.
139. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie legkoletuchikh galogenirovannykh uglevodorodov. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 446-451.
140. Agatova, A. I. (Ed.). (2004). Opredelenie lipidov [v vodnoy srede]. *Rukovodstvo po sovremennym biokhimicheskim metodam issledovaniya vodnykh ekosistem, perspektivnykh dlya promysla i marikul'tury*. Moskva: VNIRO, 58-62.
141. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie margantsa. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 290-295.
142. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie mysh'yaka. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 295-301.
143. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie natriya. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 283-285.
144. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie neorganicheskikh anionov i kationov. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 301-335.
145. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie neftyanykh uglevodorodov. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 422-430.
146. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie nitratov. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 335-344.

147. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie nitratov i nitritov. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 347-350.
148. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie nitritov. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 344-347.
149. Agatova, A. I. (Ed.). (2004). Opredelenie nukleinovyykh kislot i azotistyykh osnovaniy [v vodnoy srede]. *Rukovodstvo po sovremennym biokhimicheskim metodam issledovaniya vodnykh ekosistem, perspektivnykh dlya promysla i marikul'tury*. Moskva: VNIRO, 46-52.
150. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie organicheskikh sredstv zashchity rasteniy. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 482-489.
151. Agatova, A. I. (Ed.). (2004). Opredelenie organicheskogo veshchestva [v vodnoy srede]. *Rukovodstvo po sovremennym biokhimicheskim metodam issledovaniya vodnykh ekosistem, perspektivnykh dlya promysla i marikul'tury*. Moskva: VNIRO, 14-30.
152. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie organicheskogo ugleroda. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 417-421.
153. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie poverkhnostno-aktivnykh veshchestv. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 430-440.
154. Agatova, A. I. (Ed.). (2004). Opredelenie rastvorennogo belka s Kumassi R-250. *Rukovodstvo po sovremennym biokhimicheskim metodam issledovaniya vodnykh ekosistem, perspektivnykh dlya promysla i marikul'tury*. Moskva: VNIRO, 32-37.
155. Agatova, A. I. (Ed.). (2004). Opredelenie rastvorennogo i vzveshennogo belka po Louri. *Rukovodstvo po sovremennym biokhimicheskim metodam issledovaniya vodnykh ekosistem, perspektivnykh dlya promysla i marikul'tury*. Moskva: VNIRO, 38-40.
156. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie rastvorennogo kisloroda. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 192-200.
157. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie rtuti. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 350-360.
158. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie svobodnogo i obshchego khloro. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 201-212.
159. Agatova, A. I. (Ed.). (2004). Opredelenie svobodnykh i svyazannykh aminokislot [v vodnoy srede]. *Rukovodstvo po sovremennym biokhimicheskim metodam issledovaniya vodnykh ekosistem, perspektivnykh dlya promysla i marikul'tury*. Moskva: VNIRO, 41-46.
160. Fomin, G. S. (2000). Opredelenie selena. *Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 360-363.

161. Fomin, G. S. (2000). *Opređenje sul'fatov. Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 363-365.
162. Fomin, G. S. (2000). *Opređenje sul'fidov. Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 366-371.
163. Agatova, A. I. (Ed.). (2004). *Opređenje uglevodov [v vodnoy srede]. Rukovodstvo po sovremennym biokhimicheskim metodam issledovaniya vodnykh ekosistem, perspektivnykh dlya promysla i marikul'tury*. Moskva: VNIRO, 52-57.
164. Fomin, G. S. (2000). *Opređenje fenoksialkanovykh gerbitsidov. Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 489-495.
165. Fomin, G. S. (2000). *Opređenje fenolov. Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 465-472.
166. Fomin, G. S. (2000). *Opređenje fosfora i fosfatov. Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 371-380.
167. Fomin, G. S. (2000). *Opređenje fluoridov. Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 380-385.
168. Plotnikov, G. K., et al. (Comp.). (2017). *Opređenje khimicheskikh pokazateley kachestva vody. Sbornik klassicheskikh metodov gidrobiologicheskikh issledovaniy dlya ispol'zovaniya v akvakul'ture*. Daugavpils: Saule, 129-180.
169. Fomin, G. S. (2000). *Opređenje khloridov. Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 385-387.
170. Fomin, G. S. (2000). *Opređenje khlororganicheskikh sredstv zashchity rasteniy. Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 472-475.
171. Fomin, G. S. (2000). *Opređenje khlorofilla a. Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 658-660.
172. Fomin, G. S. (2000). *Opređenje khroma. Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 387-394.
173. Fomin, G. S. (2000). *Opređenje tsianidov. Voda: kontrol' khimicheskoy, bakterial'noy i radiatsionnoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam: entsiklopedicheskiy spravochnik*. Moskva: Protektor, 394-412.
174. Karpova, G., et al. (2010). *Otsinka ekologichnogo stanu vodoym metodami bioindikatsii. Pershi kroki do otsinki yakosti vodi*. Berezhani.
175. Pashkevich, A. I. (1983). *Metody opredeleniya mineral'nogo fosfora v vode i ikh primeneniye v gidrobiologicheskikh issledovaniyakh (Obzor). Gidrobiologicheskii zhurnal*, 19, 5, 16-27.
176. Fedotov, V. P., et al. (2007). *Perspektivnye metody biomonitoringa vnutrennikh vodoemov. Ratsional'noe ispol'zovanie presnovodnykh ekosistem - perspektivnoe napravleniye realizatsii natsional'nogo proekta «Razvitiye APK»*. Mezhdunar.

- nauch.-prakt. konf., 17-19 dek. 2007 g.: mater. i dokl. Moskva: Rossel'khozakademiya, 83-85.*
177. Pilipenko, Yu. V., Klimenko, M. O., & Biedunkova, O. O. (2017). Metod integrovanoi diagnostiki stanu gidroekosistem za tsitogenetichnim gomeostazom aborigennikh vidiv rib. *Vodni bioresursi ta akvakul'tura*, 2, 83-93.
178. Pilipenko, Yu. V., & Plotkin, S. Ya. (2007). Ekologichna indikatsiya ekosistem malikh vodoskhoverishch geoinformatsiynimi metodami. *Tavriys'kiy naukoviy visnik*, 52, 360-365.
179. Predeina, L. M. (1995). Ekspres-metodika biotestirovaniya poverkhnostnykh vod sushi pri zagryaznenii tyazhelymi metallami. *Problemy ratsional'nogo ispol'zovaniya bioresursov vodokhranilishch: Mezhdunar. nauch. konf., Kiev, 6-8 sent. 1995 g.: mater. Kiev*, 173-174.
180. Priemy bioindikatsii i biotestirovaniya pri tekushchem nadzore za zagryaznennost'yu vodnykh ob'ektov i vyyavlenii prevysheniya ikh assimiliruyushchey sposobnosti: metodicheskie ukazaniya. (1992). Sankt-Peterburg.
181. Litvinchuk, G. S., et al. (1979). *Primenenie matematicheskikh metodov k prognozirovaniyu i upravleniyu kachestvom vody v rechnykh basseynakh*. Kiev: Naukova dumka.
182. Brodskiy, E. S., et al. (1992). Primenenie metoda khromato-mass-spektrometrii dlya opredeleniya polikhlorirovannykh difenilov v ikre dunayskoy ryby. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 28, 6, 104-107.
183. Sapozhnikov, V. V. (Ed.). (2003). *Rukovodstvo po khimicheskomu analizu morskikh i presnykh vod pri ekologicheskoy monitoringe rybokhozyaystvennykh vodoemov i perspektivnykh dlya rayonov Mirovogo okeana*. Moskva: VNIRO.
184. Salazkin, A. A. (1983). Metodika postanovki opyta po opredeleniyu vliyaniya razlichnykh yadokhimikatov na vodnykh bespozvonochnykh. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh, 196*, 103-107.
185. Smirnova, N. N., & Sirenko, L. A. (1993). Tsitofiziologicheskii metod ekspres-otsenki toksichnosti prirodnykh vod. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 29, 4, 95-101.
186. Agatova, A. I. (Ed.). (2004). Spektrofotometricheskii metod opredeleniya rastvorennogo belka v presnykh vodakh. *Rukovodstvo po sovremennym biokhimicheskim metodam issledovaniya vodnykh ekosistem, perspektivnykh dlya promysla i marikul'tury*. Moskva: VNIRO, 37-38.
187. Aranovich, G. I., Korshunov, Yu. N., & Lyalikov, Yu. S. (1979). *Spravochnik po fiziko-khimicheskim metodam issledovaniya ob'ektov okruzhayushchey sredy: spravochnoe izdanie*. Leningrad: Sudostroenie.
188. Stoyka, Yu. O., Kipnis, L. S., & Konovets', I. M. (2006). Viznachennya tsitogenotoksichnosti vodi ta vityazhok donnikh vidkladiv za dopomogoyu rib. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevyykh vod*. Kyiv: Logos, 365-375.
189. Stroganov, N. S. (1976). Ekspres-metod ustanovleniya PDK dlya rybokhozyaystvennykh vodoemov. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 12, 4, 100-102.
190. Udovichenko, V. V., Nabivanets, B. I., & Sukhan, V. V. (1999). Uskorennyy metod opredeleniya khimicheskogo potrebleniya kisloroda v prirodnykh vodakh. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 35, 5, 106-112.
191. Agatova, A. I. (Ed.). (2004). Fluorestsentnyy metod opredeleniya aktivnosti nekotorykh gidrolaz [v vodnoy srede]. *Rukovodstvo po sovremennym*

- biokhimicheskim metodam issledovaniya vodnykh ekosistem, perspektivnykh dlya promysla i marikul'tury*. Moskva: VNIRO, 85-88.
192. Tsytugina, V. G., & Polikarpov, G. G. (2004). Metodologiya izucheniya ekvivalentnosti deystviya radioaktivnogo i khimicheskogo zagryazneniya na prirodnye populyatsii gidrobiontov. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 41, 5, 78-89.
193. Chalova, I. V., & Krylov, A. V. (2007). Otsenka kachestva prirodnykh i stochnykh vod metodami biotestirovaniya s ispol'zovaniem vetvistousykh rakoobraznykh (*Cladocera, Crustacea*): nauchno-metodicheskoe izdanie. Rybinsk: Institut biologii vnutrennikh vod im. I. D. Papanina.
194. Chistyakov, V. A., Sazykina, M. A., & Voynova, N. V. (2005). Bioluministsentnyy metod opredeleniya genotoksichnosti vody, ekstraktov donnykh otlozheniy i tkaney gidrobiontov. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom basseyne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot*. Krasnodar: AzNIIRKh, 116-122.
195. Shirokov, L. V. (1982). K razrabotke metodiki sostavleniya ekologicheskikh prognozov. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 180, 178-188.
196. Shitikov, V. K., Zinchenko, T. D., & Golovatyuk, L. V. (2002). Neyrosetevye metody otsenki kachestva poverkhnostnykh vod po gidrobiologicheskim pokazatelyam. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk*, 4, 2, 280-289.
197. Shulyarenko, L. V. (1996). Yod v prirodnykh vodakh i metody ego opredeleniya. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 32, 1, 95-108.
198. Shcherbak, V. I. (2006). Vyznachennya biokhimichnogo spozhivannya kisnyu (BSK) v prirodnikh vodakh. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 258-260.
199. Shcherbak, V. I. (2006). Otsinka yakosti vodi za strukturno-funktsional'nimi kharakteristikami fitoplanktonu. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 302-304.
200. Yakushin, V. M. (2006). Otsinka yakosti vodi za mikrobiologichnimi pokaznikami. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod*. Kyiv: Logos, 305-307.

ПАМ'ЯТІ КОЛЕГИ І УЧИТЕЛЯ

*9 червня 2019 р. на 78-му році обірвалося життя відомого українського вченого в галузі екотоксикології, екологічної фізіології та екологічної біохімії риб, доктора біологічних наук, професора, провідного наукового співробітника відділу екології водяних рослин та токсикології Інституту гідробіології НАН України **Арсана Ореста Михайловича**.*

О. М. Арсан народився 19 червня 1941 р. у с. Ласківці Тербовлянського району Тернопільської області. У 1965 р. з відзнакою закінчив біологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича зі спеціальності «біохімія», у 1965 р. вступив до аспірантури при Інституті гідробіології НАН України.

У 1972 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «біохімія». У 1987 р. успішно захистив докторську дисертацію «Особенности функционирования основных механизмов энергообеспечения процессов адаптации рыб к абиотическим факторам водной среды» зі спеціальності «гідробіологія» у Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова. У 1995 р. отримав наукове звання професора.

О. М. Арсан все своє життя присвятив роботі в Інституті гідробіології НАН України, де працював понад 50 років. За цей час пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу. З 1988 по 2016 р. обіймав посаду завідувача відділу екотоксикології, а з 2016 р. — провідного наукового співробітника відділу екології водяних рослин та токсикології Інституту гідробіології НАН України. З 1997 по 2001 р. працював на посаді заступника директора Інституту з наукових питань.

О. М. Арсан започаткував та плідно розвивав актуальний науковий напрямок — дослідження фізіолого-біохімічних механізмів адаптації водяних тварин до змін екологічних чинників водного середовища. Він показав на тканинному, клітинному і субклітинному рівнях, що формування механізмів стійкості водяних тварин до вказаних чинників зумовлено змінами інтенсивності гліколізу, аеробного дихання та гормональних систем в їх організмі.

О. М. Арсан вперше сформулював, теоретично обґрунтував і експериментально показав, що енергетичний обмін є тим підґрунтям, на якому будуються адаптивні процеси у риб до чинників водного середовища.

Він зробив вагомий внесок в розробку прикладних основ екологічної фізіології, біохімії і екотоксикології. Ним у співавторстві розроблено і запатентовано метод спрямованої дії на біоенергетичні процеси для підвищення рибопродуктивності.

Під керівництвом О. М. Арсана захищено 2 докторських та 6 кандидатських дисертацій.

Результати наукової діяльності О. М. Арсана опубліковано в понад 230 наукових працях, зокрема в колективних монографіях «Влияние синезеленых водорослей на обмен веществ у рыб» (1973); «Кальций и фосфор в жизнедеятельности гидробионтов» (1981); «Механизмы температурной акклимации рыб» (1991); «Комплексна оцінка екологічного стану басейну Дніпра» (2000); «Екологічні проблеми Київських водойм і прилеглих територій» (2015).

Наукові праці О. М. Арсана отримали визнання як в Україні, так і за її межами, були з успіхом репрезентовані на міжнародних наукових форумах в Угорщині, колишній Югославії, Австрії, Швейцарії.

О. М. Арсан плідно і активно працював членом Президії Гідроекологічного товариства України, членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій при Інституті гідробіології НАН України, заступником голови екологічної комісії при Міністерстві екології та природних ресурсів України з реєстрації агрохімікатів та інших біологічно активних речовин.

Нагороджений Почесними грамотами Президії НАН України (1990 р.), Міністерства освіти і науки України (2009 р.) та медаллю НАН України «За підготовку наукової зміни» (2011 р.).

Співробітники та учні Ореста Михайловича, яким пощастило працювати і спілкуватися з цією прекрасною людиною, назавжди запам'ятають його доброту, щирість, оптимізм, вміння радіти життю і незмінне почуття гумору, якими він щедро ділився зі своїми друзями та колегами. Світла йому пам'ять!

Колектив співробітників Інституту гідробіології НАН України

TAPAS – міжнародний дослідницький проект

Пропонуємо ознайомитись та долучитись до **TAPAS (Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability)**, що діє в межах програми Horizont 2020 з 2016 року. Його мета — консолідація стабільності європейської аквакультури шляхом розробки спеціальних підходів та умов, на основі всебічного аналізу всіх форм та типів ведення аквакультури, включно з марикультурою. Ключовою сферою діяльності є виявлення нормативних потреб існуючих й новітніх практик аквакультури. Більше інформації можна отримати, відвідавши **сайт**: www.tapas-H2020.eu.

Координатор проекту: Trevor Telfer, University of Stirling.

ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ РИБ

В лабораторії біотехнологій в рибицтві проводять високоспецифічну та сучасну діагностику інфекційних захворювань риб. Для ідентифікації збудників хвороб використовуються молекулярно-біологічні методи, а саме — полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) та її різновиди. Перелік збудників інфекційних захворювань риб та відповідні діагностичні тест-системи в лабораторії біотехнологій у рибицтві ІПГ НААН представлено в таблиці.

№	Інфекційний агент	Вид риб	Метод
Вірусні захворювання			
1	Вірус інфекційного панкреатичного некрозу (IPNV)	Лососеві	ЗТ-ПЛР
2	Вірус геморагічної септицемії (VHSV)	Лососеві	ЗТ-ПЛР
3	Вірус інфекційного гематопоетичного некрозу (IHNV)	Лососеві	ЗТ-ПЛР
4	Альфавірус лососевих (SAV)	Лососеві	ЗТ-ПЛР
5	Вірус інфекційної анемії лососевих (ISAV)	Лососеві	ЗТ-ПЛР
6	Реовірус лососевих (PRV)	Лососеві	ЗТ-ПЛР
7	Вірус весняної віремії коропа (SVCV)	Коропові	ЗТ-ПЛР
8	Герпесвірус коропа (CyHV, KHV)	Коропові	ПЛР
9	Вірус віспи коропа (Carp Edema Virus, CEV)	Коропові	ПЛР
10	Герпесвірус осетра (AcHV)	Осетрові	ПЛР
11	Мімівірус (Іридовірус) осетра (AcIV)	Осетрові	ПЛР
12	Аденовірус осетра (AcAdV)	Осетрові	ПЛР
13	Герпесвірус канального сома (CCV)	Іctalурові	ПЛР
14	Рабдовірус щуки (PFRV)	Щукові	ЗТ-ПЛР
15	Вірус лімфосаркоми щуки та судака	Окуневі	ЗТ-ПЛР
Бактеріальні захворювання			
16	Бактеріальна хвороба нирок (BKD) <i>Renibacterium salmoninarum</i>	Лососеві	ПЛР
17	Фурункульоз — <i>Aeromonas salmonicida</i>	Лососеві	ПЛР
18	Єрсиніоз (Enteric redmouth disease) — <i>Yersinia ruckeri</i>	Лососеві	ПЛР
19	Бактеріальна геморагічна септицемія — <i>Aeromonas hydrophila</i>	Коропові	ПЛР
20	Стрептококова інфекція осетра та тиялії — <i>Streptococcus iniae</i>	Осетрові Цихлові	ПЛР
21	Флавобактеріоз (Bacterial cold water disease, BCWD) — <i>Flavobacterium psychrophila</i>	Лососеві	ПЛР
22	Колумнарна хвороба (Columnaris disease) — <i>Flavobacterium columnarum</i>	Лососеві	ПЛР
23	Бактеріальна септицемія сома — <i>Edwardsiella ictaluri</i>	Іctalурові	ПЛР
24	Вібриоз — <i>Vibrio anguillarum</i>	Іctalурові Лососеві	ПЛР
Паразити			
25	Проліферативна хвороба нирок — <i>Tetracapsuloides bryosalmonae</i>	Лососеві	ПЛР
26	Міксомомоз (Whirling disease) — <i>Myxobolus cerebralis</i>	Лососеві	ПЛР

Для одержання додаткової інформації можна звертатися за адресою:

Інститут рибного господарства НААН, вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164.

Лабораторія біотехнологій у рибицтві, зав. лаб., к.б.н., с.н.с. Рудь Юрій Петрович: (097) 953-80-80, rudziknew@ukr.net.

FISHERIES SCIENCE OF UKRAINE

"Fisheries Science of Ukraine" — a scientific journal, has been published in Ukraine since 2007. "Fisheries Science of Ukraine" included in the List of Specialized Publications of Ukraine, which can be used for publishing results of doctor's and candidate's thesis (biological and agricultural sciences), was approved in 08.07.2009, recertification of 06.11.2014 (Ministry of Education and Science of Ukraine №1279)

Founder and publisher of the journal — Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

State registration certificate KB № 20934-10734 PR of 18.08.2014

EDITOR-IN-CHIEF

Serhiy Tarasiuk, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences, UKRAINE

DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF

Ihor Hrytsyniak, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Academician of the NAAS of Ukraine, Director, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Natalia Kolesnyk, Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of International Scientific and Technical Cooperation and Intellectual Property, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

EDITORIAL BOARD

BIOLOGICAL SCIENCES

Boris Gomelsky, Doctor of Biological Sciences, Professor, Kentucky State University, UNITED STATES OF AMERICA

Daniel Patrick, Doctor of Biological Sciences, Head of Biology Department Laboratories of the Pyrenees and Landes, FRENCH REPUBLIC

Ihor Buzevych, Doctor of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Leonid Buchatskyi, Doctor of Biological Sciences, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Leading Research Scientist of the Laboratory of Biotechnologies in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Natalia Matvienko, Doctor of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Ichthyopathology, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Gautam V. Zodape, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Zoology of Shivaji University Kolhapur, REPUBLIC OF INDIA

Oleksandr Didenko, Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Department of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Vasyl Sondak, Doctor of Biological Sciences, Head of the Water Bioresources Department, National University of Water and Environmental Engineering, UKRAINE

Yuriy Rud', Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Bio-technology in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Oleksandr Potrokhov, Doctor of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Biology of reproduction of fish, Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, UKRAINE

Pavlo Kutishchev, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Aquatic Bioresources and Aquaculture, Kherson State Agricultural University, UKRAINE

Liudmyla Dragan, Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Ecological Studies Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Oleh Marenkov, Candidate of Biological Sciences, Assistant

professor in the Department of General Biology and Water Bioresources, Oles Honchar Dnipro National University, UKRAINE

AGRICULTURAL SCIENCES

XU Pao, Doctor, Professor, Director of Freshwater Fisheries Research Center, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Jedrzej Krupinski, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director, National Research Institute of Animal Production, POLAND

Oleksandr Tretiak, Doctor of Agricultural Sciences, Senior Research Scientist, Deputy Director in scientific works, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Vitaliy Bekh, Doctor of Agricultural Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Fish Selection, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Isaak Sherman, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Head of the Aquaculture Department, Kherson State Agrarian University, UKRAINE

Oleksandr Kostenko, Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Veterinary Medicine and Zootechnics Department, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, UKRAINE

Tetiana Sharamok, Candidate of Agricultural Sciences, Assistant professor in the Department of General Biology and Water Bioresources, Oles Honchar Dnipro National University, UKRAINE

Liudmyla Chepil, Candidate of Agricultural Sciences, Assistant professor in the Department of Animal Biology, National University of Life and Environmental Sciences, UKRAINE

Zsigmond Jeney, Doctor of Sciences, Honorary Professor of Pannon University, HUNGARY

Mykola Klymenko, Doctor of Agricultural Sciences, Head of the departments of ecology, technology of environmental protection and forestry, National University of Water and Environmental Engineering, UKRAINE

Denys Breus, Candidate of Agricultural Sciences, Assistant professor in the Department of Ecology and Sustainable Development named after Professor Yu.V. Pilipenko, Kherson State Agrarian University, UKRAINE

SCIENTIFIC EDITORS OF SECTIONS

are staff employees of the Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine: **Natalia Tushnytska**, Candidate of Veterinary Sciences, Senior Research Scientist, Scientific Secretary of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yaroslav Tuchapskyi**, Candidate of Agricultural Sciences, Head of the Carp Breeding Laboratory of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Zaloilo**, Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Molecular-Genetic Studies of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Zabytivskyi**, Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist of Section of Sturgeon of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Antonina Mruk**, Head of the Laboratory Salmonids Culture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Tetiana Hryhorenko**, Candidate of Agricultural Sciences, Head of the Laboratory of Hydrobiology and Technology of Invertebrates Cultivation of the Institute of Fisheries of the NAAS.

Editorial board of the Journal "Fisheries Science of Ukraine", Institute of Fisheries NAAS, 135, Obukhivska St, Kiev-164, Ukraine, 03164; tel.: +38 (044) 223-84-34; tel/fax: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Layout design: Natalia Kolesnik, Serhiy Shinkar, Yevheniy Arkhanhelskyi, Oleksandr Bezusyi; **Making-up:** Yevheniy Arkhanhelskyi, Maria Simon; **Literature editing:** Tetiana Shvets; **Corrector:** Hanna Kovalchuk

ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НААН
вул. Обухівська, 135 м. Київ-164, 03164, Україна
тел./факс: +38(044) 423-74-62, тел.: +38(044) 423-74-65

<http://fsu.ua>

info@fsu.ua