ISSN 2312-9581 (Online)

ISSN 2075-1508 (Print)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

4/2019

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські науки), переатестація від 06.11.2014 (наказ Міністерства освіти і науки України №1279)

Засновник та видавник — Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20934-10734 ПР від 18.08.2014

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Тарасюк Сергій Іванович, доктор с.-г. наук, професор, член-кор. НААН, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ГРИЦІНЯК Ігор Іванович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, директор Інституту рибного господарства НААН, УКРАЇНА

КОЛЕСНИК Наталія Леонідівна, кандидат с.-г. наук, с. н. с., зав. лаб. міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Гомельський Борис, доктор біол. наук, професор, Державний Університет Кентуккі, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Патрік Даніель, доктор біол. наук, голова департаменту біології Лабораторії Піренеїв, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА

Бузевич Ігор Юрійович, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, Україна

Бучацький Леонід Петрович, доктор біол. наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), провідний науковий співробітник лаб. біотехнологій в рибицтві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Матвієнко Наталія Миколаївна, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу іхтіопатології, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Зодапе Гаутам В., доктор біол. наук, професор, декан факультету зоології Державного Університету Шиваджі в Колхатурі, РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ

Діденко Олександр Володимирович, канд. біол. наук, с.н.с., відділ вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, зав. каф. водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА

Рудь Юрій Петрович, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії біотехнологій в рибицтві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Потрохов Олександр Спиридонович, доктор біол. наук, с.н.с., зав. лаб. біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, УКРАЇНА

Кутіщев Павло Сергійович, канд. біол. наук, зав. каф. водних біоресурсів та аквакультури, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

Драган Людмила Петрівна, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лаб. екологічних досліджень, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Маренков Олег Миколайович, канд. біол. наук, доцент

каф. загальної біології та водних біоресурсів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Ху Пао, доктор с.-г. наук, професор, директор Центру прісноводного рибного господарства, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

Крупінські Єджей, доктор с.-г. наук, професор, іноземний член Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут зоотехнії Польщі, ПОЛЬЩА

Третяк Олександр Михайлович, доктор с.-г. наук, с.н.с., заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН

Бех Віталій Валерійович, доктор с.-г. наук, професор, зав. відділу селекції риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Шерман Ісаак Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, зав. каф. рибицтва, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

Костенко Олександр Іванович, канд. с.-г. наук, с.н.с., зав. відділу ветеринарної медицини та зоотехнії, Національна академія аграрних наук України, УКРАЇНА

Шарамок Тетяна Сергіївна, канд. с.-г. наук, доцент каф. загальної біології та водних біоресурсів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, УКРАЇНА

Чепіль Людмила Василівна, канд. с.-г. наук, доцент каф. біології тварин, Національний університет біоресурсів і природокористування, Україна

Жигмонд Женей, доктор с.-г. наук, професор, Паннонський університет, УГОРЩИНА

Клименко Микола Олександрович, доктор с.-г. наук, професор, зав. каф. екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА

Бреус Денис Сергійович, канд. с.-г. наук, доцент каф. екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

є штатними працівниками Інституту рибного господарства НААН України: **Тушницька Наталія Йосифівна**, канд. вет. наук, с.н.с., вчений секретар ІРГ НААН; **Тучапський Ярослав Васильович**, канд. с.-г. наук, с. н. с. відділу селекції риб ІРГ НААН; **Залоїло Ольга Василівна**, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лаб. молекулярно-генетичних досліджень ІРГ НААН; **Забитівський Юрій Михайлович**, канд. біол. наук, с. н. с. сектору осетрівництва ІРГ НААН; **Мрук Антоніна Іванівна**, зав. лаб. лососівництва ІРГ НААН; **Григоренко Тетяна Володимирівна**, канд. с.-г. наук, зав. лаб. гідробіології та технологій культивування цінних безхребетних ІРГ НААН.

Редакція журналу «Рибогосподарська наука України», вул. Обухівська, 135, м. Київ-164, 03164

тел. город. +38(044) 227-01-86; тел. моб. +38(094) 827-01-86, +38(097) 700-77-25; <http://fsu.ua>; fsu.journal@gmail.com

Підписано до друку 17.12.2019 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 7,1. Наклад 500 прим.

Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту рибного господарства НААН (Протокол №7 від 17.12.2019 р)

Дизайн макету: Колесник Н. Л., Шинкар С. В., Архангельський Є. Ю., Безусий О. Л. **Верстка:** Архангельський Є. Ю., Симон М. Ю. **Літературне редагування:** Швець Т. М. **Коректор:** Ковальчук Г. В.

Друкарня ТОВ «ПРО ФОРМАТ», 02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 45 Б, оф.16, тел.: +38(044) 353-85-58

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

4/2019(50)

Заснований у 2007 р.
Виходить 4 рази на рік

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 1-136
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04>

З М І С Т

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 5-22
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.005>

- Й. В. Гриб, В. В. Сондак, О. В. Волкошовець, Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон*
Реабілітація іхтіофауни Прип'ятського гідроекологічного коридору
з позицій гідроекології..... 5

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 23-36
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.023>

- П. В. Шекк, Ю. О. Астафуров*
Репродуктивні характеристики інтродуцента — східної прісноводної
креветки (*Macrobrachium nipponense* de Haan, 1849) в пониззі
Дністра 23

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 37-57
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.037>

- О. М. Ключко, Л. П. Бучацький, Ю. П. Рудь, О. В. Мележик*
Створення баз даних риб для електронної інтерактивної карти:
таблиці та ключі 37

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 58-73
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.058>

- І. Ю. Бузевич, А. І. Мрук, А. І. Кучерук*
Штучне відтворення (зарибнення) європейського хариуса
(*Thymallus thymallus* Linnaeus, 1758) в ріках Карпатського регіону 58

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 74-86
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.074>

- О. М. Третьяк, М. М. Пашко, О. М. Колос*
Деякі морфологічні особливості стерляді (*Acipenser ruthenus*
Linnaeus, 1758) в умовах інтенсивного вирощування
у плавучих садкових системах..... 74

© Інститут рибного господарства НААН України, 2019

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 87-94

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.087>*В. В. Гурбик, Ю. М. Глушко, І. І. Грициняк, Н. Й. Тушиницька*Цитогенетичний профіль різновікових груп галицького коропа
в умовах промислового вирощування у ставах Прикарпаття ..... **87****КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ**

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 95-108

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.095>*О. П. Добрянська, О. В. Дерень, Т. В. Григоренко*Продуктивні показники дволіток коропа при застосуванні в годівлі
пребіотики в умовах вирощувальних ставів **95**

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 109-122

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.109>*М. З. Кориляк*Результати вирощування товарного коропа (*Cyprinus carpio* Linnaeus,
1758) при використанні в складі раціону розторопші плямистої
(*Silybum marianum* (L.) Gaertn) ..... **109****КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ**

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 123-134

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.123>*І. Й. Грициняк, Т. М. Швець*Методи іхтіопатологічних та іхтіопаразитологічних досліджень.
Тематична бібліографія..... **123**

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 5-22

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.005>

И. В. Гриб, В. В. Сондак, О. В. Волкошовец, Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон

Реабилитация ихтиофауны Припятского гидроэкологического коридора

с позиций гидроэкологии 5

БИОРЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ ВОДОЕМОВ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 23-36

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.023>

П. В. Шекк, Ю. О. Астафуров

Репродуктивные характеристики интродуцента — восточной пресноводной

креветки (*Macrobrachium nipponense* de Naan, 1849) в низовьях Днестра 23

ТЕХНОЛОГИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 37-57

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.037>

Е. М. Ключко, Л. П. Бучацкий, Ю. П. Рудь, О. В. Мележик

Создание баз данных рыб для электронной интерактивной карты: таблицы

и ключи 37

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 58-73

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.058>

И. Ю. Бузевич, А. И. Мрук, А. И. Кучерук

Искусственное воспроизводство (зарыбление) европейского хариуса (*Thymallus**thymallus* Linnaeus, 1758) в реках Карпатского региона 58

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 74-86

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.074>

А. М. Третьак, М. М. Пашко, Е. Н. Колос

Некоторые морфологические особенности стерляди (*Acipenser ruthenus* Linnaeus,

1758) в условиях интенсивного выращивания в плавучих садковых системах 74

СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 87-94

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.087>

В. В. Гурбик, Ю. Н. Глушко, И. И. Грициняк, Н. И. Тушиницкая

Цитогенетический профиль разновозрастных групп галицийского карпа в условиях

промышленного выращивания в прудах Прикарпатья 87

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 95-108

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.095>

О. П. Добрянская, О. В. Дерень, Т. В. Григоренко

Продуктивные показатели двухлетков карпа при использовании в кормлении

пребиотика в условиях выростных прудов 95

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 109-122

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.109>

М. З. Кориляк

Повышение эффективности товарного выращивания карпа (*Cyprinus carpio*

Linnaeus, 1758) при использовании в составе рациона расторопши пятнистой

(*Silybum marianum* (L.) Gaertn) 109

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 123-134

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.123>

Ир. И. Грициняк, Т. М. Швец

Методы ихтиопатологических и ихтиопаразитологических исследований.

Тематическая библиография 123

CONTENTS

ACTUAL PROBLEMS AND PROSPECTS

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 5-22

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.005>

Y. Gryb, V. Sondak, O. Volkoshovetz, N. Kolesnik, M. Simon

Rehabilitation of fish fauna in the Pripyat hydroecological corridor from hydroecology positions..... 5

BIORESOURCES AND ECOLOGY OF WATER BODIES

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 23-36

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.023>

P. Shekk, Yu. Astafurov

Reproductive characteristics of the introduced species — Eastern freshwater shrimps (*Macrobrachium nipponense* de Haan, 1849) in the lower Dnister river..... 23

TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 37-57

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.037>

O. Klyuchko, L. Buchatsky, Yu. Rud, O. Melezhyk

Creation of fish databases for electronic interactive map: tables and keys..... 37

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 58-73

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.058>

I. Buzevich, A. Mruk, A. Kucheruk

Artificial reproduction of the European grayling (*Thymallus thymallus* Linnaeus, 1758) in the rivers of the Carpathian region 58

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 74-86

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.074>

A. Tretiak, M. Pashko, Ye. Kolos

Some morphological peculiarities of the sterlet (*Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758) in the conditions of intensive rearing in floating cage systems..... 74

SELECTION, GENETICS AND BIOTECHNOLOGY

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 87-94

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.087>

V. Gurbik, Yu. Glushko, I. Hrytsyniak, N. Tushnitskaya

Cytogenetic profile of different groups of the Halych carp in conditions of industrial aquaculture in Subcarpathia ponds 87

FEEDS AND FEEDING

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 95-108

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.095>

O. Dobryanska, O. Deren, M. Korylyak, T. Hryhorenko

Productive indices of age-2 carp after application of a prebiotic in their feeding..... 95

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 109-122

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.109>

M. Korilyak

Increasing the efficiency of commercial rearing of the common carp (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) with the use of milk thistle (*Silybum marianum* (L.) Gaertn) in the ration composition 109

CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 123-134

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.123>

Ir. Hrytsynyak, T. Shvets

Methods of ichthyopathological and ichthyoparasitological research. Thematic bibliography..... 123

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИХТИОФАУНЫ ПРИПЯТСКОГО ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОРИДОРА С ПОЗИЦИЙ ГИДРОЭКОЛОГИИ

И. В. Гриб, kaf.vb@nuvm.edu.ua, Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно

В. В. Сондак, kaf.vb@nuvm.edu.ua, Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно

О. В. Волкошовец, kaf.vb@nuvm.edu.ua, Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно

Н. Л. Колесник, kolenataleo@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

Цель. Определить ихтиоэкологические критерии оценки состояния речных бассейнов Припятского ГЭК — разработать их матрицы, а также исследовать лимитирующие факторы влияния на функционирование экосистем, что необходимо для нахождения путей реабилитации ихтиофауны этого важного природного объекта всеукраинского значения.

Методика. Оценивали количественное и качественное состояние ихтиофауны Припятского ГЭК на основе камеральной обработки собранного экспедиционным путем материала, а также опросов рыболовов-аматоров. Изучали гидрологический режим Припятского ГЭК, используя ежегодники гидрометеослужбы Полесского региона с 1922 по 2005 гг.; обработку вышеуказанных данных осуществляли при помощи созданной нами математической программы в редакторе Delphi. Водную среду рассматривали как «черный ящик» с входящей и исходящей информацией, которую измеряли по 50 показателям, согласно комплексной экологической классификации качества воды.

Результаты. Доказано, что реабилитация Припятского ГЭК с позиций гидроэкологии остро необходима. Оценены изменения в экосистеме Припятского ГЭК с помощью пространственного биомаркера, отмечено резкое ухудшение среды обитания и условий воспроизводства рыб. Представлена формализованная схема функционирования Припятского ГЭК, из которой следует, что его освоение было крайне не рационально. Осуществлён сравнительный анализ состояния ихтиоценоза речных экосистем Стыр-Горынского рыбновосстановительного комплекса относительно не трансформированных бассейнов.

Научная новизна. Был разработан пространственный биомаркер состояния поверхностных вод и использован для оценки условий воспроизводства аборигенной ихтиофауны рек Стыр и Горынь в Припятском ГЭК. Введен комплексный индекс состояния экосистемы исследуемого бассейна ($B_{жк}$), который рассчитывали по соотношению его фактических показателей и их оптимальным характеристикам, согласно разработанной нами формуле.

© И. В. Гриб, В. В. Сондак, О. В. Волкошовец, Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон, 2019

Практическая ценность. Сформулированы основные направления реабилитации ихтиофауны Припятского ГЭК в Западном Полесье и представлена базовая схема ее проведения. Продемонстрирована эффективность использования пространственного биомаркера и бассейнового подхода.

Ключевые слова: река Припять, река Стыр, река Горынь, река Случ, ихтиофауна, экосистема, гидроэкология, Западное Полесье, гидроэкологический коридор, биомаркер.

REHABILITATION OF FISH FAUNA IN THE PRIPYAT HYDROECOLOGICAL CORRIDOR FROM HYDROECOLOGY POSITIONS

Y. Gryb, kaf.vb@nuvm.edu.ua, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

V. Sondak, kaf.vb@nuvm.edu.ua, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

O. Volkoshovetz, kaf.vb@nuvm.edu.ua, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

N. Kolesnik, kolenataleo@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

M. Simon, seemann.sm@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To define the ichthyecological criteria for assessing the status of river catchments of the Pripyat HEP — to develop their matrices, as well as to study the limiting factors of influence on ecosystem functioning that is necessary to find ways for the rehabilitation of fish fauna of this important natural object of national significance.

Methodology. The quantitative and qualitative status of fish fauna of the Pripyat HEP was assessed based on the cameral processing of the material collected in expeditions, as well as interviewing recreational fishermen. We studied the hydrological regime of the Pripyat HEP, using the yearbooks of the hydrometeorological services of the Polissya region from 1922 to 2005. Processing the abovementioned data was performed using a mathematical program created by us in Delphi. The aquatic environment was considered as a “black box” with incoming and outgoing information, which was measured by 50 parameters according to a comprehensive environmental classification of water quality.

Findings. It was proved that the rehabilitation of the Pripyat HEP is urgently needed from the standpoint of hydroecology. Changes in the ecosystem of the Pripyat HEP were assessed using a spatial biomarker, a sharp deterioration in the habitat and conditions of fish reproduction were noted. A formalized functioning scheme of the Pripyat HEP is presented, from which it follows that its development was extremely irrational. A comparative analysis of the state of the ichthyocenosis of river ecosystems in the Styr-Horyn fish-restoration complex relative to non-transformed catchments was carried out.

Originality. A spatial biomarker of the surface water state was developed and used to assess the conditions for the reproduction of native fish fauna in the Styr and Horyn rivers in the Pripyat hydroelectric station. A comprehensive index of the ecosystem state of the studied catchment (Vec.) was introduced and calculated by the ratio of its actual parameters to their optimal characteristics, according to our formula.

Practical value. The main trends of the rehabilitation of fish fauna in the Western Polissya area of Pripyat HEP are formulated and the basic scheme of its implementation is presented. The effectiveness of using a spatial biomarker and a catchment approach has been demonstrated.

Key words: Pripyat River, Styr River, Horyn River, Sluch River, ichthyofauna, ecosystem, hydroecology, Western Polissya, hydroecological corridor, biomarker.

РЕАБІЛІТАЦІЯ ІХТІОФАУНИ ПРИП'ЯТСЬКОГО ГІДРОЕКОЛОГІЧНОГО КОРИДОРУ З ПОЗИЦІЙ ГІДРОЕКОЛОГІЇ

Й. В. Грив, kaf.vb@nuvm.edu.ua, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

В. В. Сондак, kaf.vb@nuvm.edu.ua, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

О. В. Волкошовець, kaf.vb@nuvm.edu.ua, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Н. Л. Колесник, kolenataleo@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Мета. Визначити іхтіоекологічні критерії оцінки стану річкових басейнів Прип'ятського ГЕК — розробити їхні матриці, а також дослідити лімітувальні чинники впливу на функціонування екосистем. Вищезазначене необхідно для знаходження шляхів реабілітації іхтіофауни цього важливого природного об'єкта всеукраїнського значення.

Методика. Оцінювали кількісний і якісний стан іхтіофауни Прип'ятського ГЕК на основі камеральної обробки матеріалу, який був зібраний експедиційним шляхом, а також опитувань рибалок-аматорів. Вивчали гідрологічний режим Прип'ятського ГЕК, використовуючи щорічнік гідрометеослужби Поліського регіону з 1922 по 2005 рр. Обробку вищенаведених даних здійснювали за допомогою створеної нами математичної програми в редакторі Delphi. Водне середовище розглядали як «чорний ящик» з вхідною та вихідною інформацією, яку вимірювали за 50 показниками, згідно з комплексною екологічною класифікацією якості води.

Результати. Доведено, що реабілітація Прип'ятського ГЕК з позицій гідроекології гостро необхідна. Оцінено зміни в екосистемі Прип'ятського ГЕК за допомогою просторового біомаркера, відзначено різке погіршення середовища існування та умов відтворення риб. Представлено формалізовану схему функціонування Прип'ятського ГЕК, з якої випливає, що його освоєння було зроблено вкрай не раціонально. Здійснено порівняльний аналіз стану іхтіоценозу річкових екосистем Стир-Гориньського рибо-відновного комплексу відносно не трансформованих басейнів.

Наукова новизна. Був розроблений просторовий біомаркер стану поверхневих вод та використаний для оцінки умов відтворення аборигенної іхтіофауни річок Стир і Горинь в Прип'ятському ГЕК. Введено комплексний індекс стану екосистеми досліджуваного басейну ($B_{ЕК}$), який розраховували за співвідношенням його фактичних показників до їх оптимальних характеристик, згідно з розробленою нами формулою.

Практична цінність. Сформульовано основні напрямки реабілітації іхтіофауни Прип'ятського ГЕК в Західному Поліссі та представлена базова схема її проведення. Продемонстровано ефективність використання просторового біомаркера і басейнового підходу.

Ключові слова: річка Прип'ять, річка Стир, річка Горинь, річка Случ, іхтіофауна, екосистема, гідроекологія, Західне Полісся, гідроекологічний коридор, біомаркер.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Река Припять, соединяющая водные бассейны Балтийского и Черного морей — редкое послеледниковое водно-болотное образование с удивительным разнообразием редких видов флоры и фауны. Множественность ее водно-болотных угодий обуславливает соответствующее количество промежуточных экотонів. Эти

переходные зоны между биомами (биосистемами, содержащими несколько тесно связанных биоценозов) стабилизируют состав ихтиофауны и создают условия для устойчивого воспроизводства популяций гидробионтов [1, 2].

Соответственно, логично ожидать, что богатство водно-болотных угодий и значительная густота речной сети (до 0,3 км/км²) реки Припять, протекающей в Западном Полесье, должны были бы создавать и высокую рыбопродуктивность водной среды. Однако, вылов рыбы за последние 15 лет сократился на целый порядок, а в водоемах доминируют 8–10 фитофильных видов рыб. В целом, это свидетельствует о кризисной ситуации в водных экосистемах, которая вызвана ухудшением качества среды обитания рыб [3].

Анализ результатов многочисленных исследований позволяет утверждать, что проблемы, связанные с низкой продуктивностью и малым видовым биоразнообразием ихтиофауны, вызваны нарушением воспроизводства гидробионтов. Последнее, в свою очередь, обусловлено активной хозяйственной деятельностью в бассейнах малых рек — их зарегулированием, сбросом сточных вод, канализированием русел и т.д. Кроме того, существенно изменилась и структура ландшафтов — под пахотные земли отданы водосборные территории бассейнов рек, водоохранные зоны и прибрежные полосы не обустроены, происходит бесконтрольная вырубка лесов, проводится мелиорация [4–8].

Специфика этих изменений в связи с состоянием ихтиофауны реки Припять в регионе Западної Полесся широко освещена в работах В. Д. Романенко, И. В. Гриба, В. В. Сондак и др. Однако, в хозяйственной политике Украины представленные наработки на данный момент не нашли практического применения. В результате, в исследуемом регионе остро стоит вопрос о реабилитации нарушенных водных экосистем и восстановлении естественных условий воспроизводства аборигенных видов рыб, с целью повышения продуктивности водоёмов. Кроме того, усовершенствование использования естественных водных объектов позволяет развивать природные механизмы воспроизводства рыбных запасов, улучшая их видовое разнообразие и биологическую продуктивность [9–13].

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕРЕШЕННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучать экологическое состояние водного объекта только с позиций качества водной среды методически не совсем корректно, т.к. подобное исследование не даёт возможности провести оценку состояния этой экосистемы. Таким образом, невозможно выявить рычаги управления ситуацией в экосистеме в целом, особенно при совместном влиянии климатических и антропогенных воздействий [7, 14, 15].

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем, на основании и в развитие бассейнового принципа функционирования водных экосистем, концепцию соединяющих их гидроэкологических коридоров (ГЭКов) и биомаркеров [10, 14].

Гидроэкологический коридор — это территориальный элемент экологической сети, соединяющий водные объекты, которые являются миграционными каналами флоры, фауны, энергии и вещества. Так, основными водными объектами Припятского гидроэкологического коридора являются бассейны правобережных притоков реки Припять — реки Выжевка, Турья, Стоход, Стырь, Случ, Горынь [10, 11, 16].

Использование предложенных нами биомаркеров является нахождением физиологически подтвержденных характеристик «черного ящика» — состояния водной среды обитания рыб (рис. 1, 2).

Рис. 1. Локальные пойменно-русловые рыбовосстановительные территории в бассейне р. Горынь [8, 24, 30, 33]

Fig 1. Local floodplain-riverbed fish-restoring territories in the basin of the river Horyn [8, 24, 30, 33]

Рис. 2. Оценка качества водной среды, условий воспроизводства и биоразнообразия ихтиоценоза с бассейновых позиций

Fig. 2. Assessment of the aquatic environment quality, conditions of reproduction and biodiversity of ichthyocenosis from a basin position

Целью нашей работы было определение ихтиоэкологических критериев оценки состояния речных бассейнов Припятского ГЭК — разработка их матрицы, а также исследование лимитирующих факторов влияния на функционирование экосистем, что необходимо для нахождения путей реабилитации этого важного природного объекта всеукраинского значения [17–19].

Соответственно, объектом наших исследований выступал Припятский ГЭК (бассейны рек Выжевка, Турья, Стоход, Стырь, Случ, Горынь).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Состояние ихтиофауны (количественное и качественное) Припятского ГЭК исследовали согласно разрешением на специальное использование рыбы и других водных живых ресурсов, выданных Государственным Комитетом рыбного хозяйства Украины № 002, № 007. Перед становлением льда, в ноябре и декабре,

экспедиционным путем с использованием общепринятых методик изучали ихтиоценозы в зимовальных ямах Припятского ГЭК [20–23]. Кроме того, осуществляли опросы рыбаков-любителей. Суммарно было отобрано и камерально обработано 6582 экз. разных видов рыб.

Гидрологический режим Припятского ГЭК изучали, используя ежегодники гидрометеослужбы с 1922 по 2005 гг. Полесского региона, обработку которых осуществляли при помощи созданной нами математической программы в редакторе Delphi [4, 8, 10, 14].

Водную среду рассматривали как «черный ящик» с входящей и исходящей информацией, которую исследовали по 50 показателям, согласно комплексной экологической классификации качества воды, разработанной О. П. Оксиком, В. Н. Жукинским и др. в Академии наук Украины [24]. Однако, поскольку на состояние экосистемы оказывают влияние и другие факторы в большей (max) или меньшей (min) степени, мы различали 3 группы факторов:

- внешние — гидрологический режим, температуру воздуха, атмосферные осадки, число пограничных экотонов, влияние и состояние поверхности водосбора (поверхностный сток, биомасса органического вещества);

- внутренние — интенсивность водообмена, эвтрофикация, степень зарастания и старения водоемов;

- управления — очистка поверхностного стока, пойменные луга, биоплато, выкашивание и удаление высшей водной растительности, вселение рыб-биомелиораторов.

При входе в водный объект («черный ящик») у рыб регистрировали реакцию жаберного аппарата, кожных покровов, частоты дыхания, характера движения на его влияние. На выходе из него регистрировали результаты хронического воздействия — искривления позвоночника, задержку роста, ухудшение воспроизводства и т.д. Регистрировали длительность фиксации, начало влияния и определяли индексы (рис. 2).

Выявлено, что наиболее целостную картину ихтиофауны Припятского ГЭК даёт возможность создать пространственный биомаркер (рис. 3).

Как продемонстрировано на рисунок 3, пространственный биомаркер представляет собой прямоугольную матрицу, в которой каждая сторона отвечает исследуемому показателю состояния водной среды и поверхности водосбора бассейна реки или озера [8, 24]. Он включает в себя состояние поверхности водосбора, качество водной среды, а также реакцию индикаторов биотеста вместе с продуктивностью и числом промежуточных экотонов (безразмерных показателей состояния бассейна, о которых говорил В. И. Вернадский и которые описывают процесс перехода от гидробиологических к гидроэкологическим характеристикам). Впервые пространственный биомаркер состояния поверхностных вод был предложен нами для оценки условий воспроизводства аборигенной ихтиофауны для рек Стирь и Горынь в Припятском ГЭК [4, 14].

Рис. 3. Пространственный биомаркер оценки ихтиоэкологической ситуации рек Стирь и Горынь в Припятском ГЭК

Fig. 3. Spatial biomarker for assessing the ichthyological situation of the Styr and Goryn rivers in the Pripyat hydro-ecological corridor

Для создания пространственного биомаркера рек Стирь и Горынь в Припятском ГЭК мы исследовали (рис. 2):

- период затопления поймы (сутки, τ);
- число пограничных зон-экотонів (единиц, n) на исследуемом участке русла реки (км);
- состояние поверхности водосбора по экологическому индексу ($K_{эк.}$);
- качество воды по комплексному экологическому индексу ($I_{эк.}$);
- кормовую базу по биомассе зоопланктона (m_r , г/м³);
- состояние популяций аборигенных видов рыб относительно нетрансформированных бассейнов (M_r , %);
- количество рыбопродукции исследуемого бассейна (R , кг/га).

Учитывая, что исследуемые ($I_{эк.}$) и ($K_{эк.}$) показатели постоянны и классифицированы по 5-ти классам качества, переменными величинами, входящими в состав пространственного биомаркера, являются:

- период затопления поймы (τ);
- численность пограничных экотонов (n) исследуемого участка русла реки (км);
- состояние кормовой базы по биомассе зоопланктона (m_r);
- состояние популяций аборигенных видов рыб относительно нетрансформированных бассейнов (M_R);
- количество рыбопродукции (R).

Введенный нами комплексный индекс состояния экосистемы исследуемого бассейна ($B_{\text{эк.}}$) рассчитывали по соотношению его фактических показателей к их оптимальным характеристикам, согласно созданной нами формуле 1:

$$\sum B_{\text{эк.}} = \frac{\tau_{\text{факт.}}}{\tau_{\text{опт.}}} + \frac{n_{\text{факт.}}}{n_{\text{опт.}}} + \frac{m_{\text{рфакт.}}}{m_{\text{рionm.}}} + \frac{M_{\text{Рфакт.}}}{M_{\text{Рionm.}}} + \frac{R_{\text{факт.}}}{R_{\text{ionm.}}} \leq 5.0 \quad (1)$$

Таким образом, если взять отношение фактической величины каждого показателя к оптимуму, то получим по каждому показателю значение 1,0, а значит, суммарно $B_{\text{эк.}} \leq 5.0$. Однако, если принять $B_{\text{эк.}} \leq 5,0$ как оптимум — I класс качества воды, $B_{\text{эк.}} = 4,0$ — удовлетворительное состояние, или IV класс качества воды, $B_{\text{эк.}} = 3,0$ за переходную зону — III класс качества воды, $B_{\text{эк.}} = 2,0$ — как зону стагнации — II класс качества воды, то деградация экосистемы будет наблюдаться при значении $B_{\text{эк.}} < 1,0$. В то же время, полная деградация будет при $B_{\text{эк.}} \leq 0,1$, соответствующем V классу качества воды. Подобная ситуация означает значительную трансформацию поверхности водосбора, в котором превышение количества нарушенных территорий по отношению к естественным составляет около 85%, или 7,0–7,5 раз, а количество рыбопродукции не превышает 5–10 кг/га (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная оценка состояния поверхностных вод по разным методикам

Table 1. Comparative assessment of the surface water state by different methods

Индекс / Index	Классы качества, состояние / Quality classes, condition				
	I — очень чистая / very clean	II — чистая / clear	III — загрязнен- ная / polluted	IV — грязная / dirty	V — очень грязная / very dirty
Пространственный, $B_{\text{эк.}}$ / Spatial, V_{eco} .	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0
Ихтиологический, $I_{\text{ихт.}}$ (%) / Ichthyological, $I_{\text{cht.}}$ (%)	100,0	70,0	40,0–60,0	30,0	$\leq 10,0$
Вудивисса (сапробности зообентоса) $I_{\text{зб.}}$ / Woodiwissa (saprobity of zoobenthos) $I_{\text{zb.}}$.	10,0–9,0	8,0	7,0–5,0	4,0–3,0	2,0–1,0
Пантле и Букка (сапробности по фитопланктону) $I_{\text{фп.}}$ / Pantle -Buck (phytoplankton saprobity) $I_{\text{ph.}}$.	$\leq 1,0$	1,0 –1,5	1,6–3,0	3,1–3,5	$\geq 3,5$

Индекс / Index	Классы качества, состояние / Quality classes, condition				
	I — очень чистая / very clean	II — чистая / clear	III — загрязнен- ная / polluted	IV — грязная / dirty	V — очень грязная / very dirty
По уровню трофности, $I_{\text{троф.}}$ / According to trophic level, I_{troph}	1,0	2,0	3,0–5,0	6,0	7,0
По синтезу первичного органического вещества, $I_{\text{эк.}}$ / For the synthesis of primary organic substances, $I_{\text{eco.}}$	1,0	3,0	8,0	21,0	55,0

Соответственно, используя пространственный индекс ($B_{\text{эк.}}$) для исследования бассейна реки мы можем унифицировать оценку его состояния по 5 классам качества воды, соответственно 5-классной системе оценки:

- по синтезу первичного органического вещества ($I_{\text{эк.}}$);
- по индексу сапробности по фитопланктону ($I_{\text{фп.}}$);
- по индексу сапробности по зообентосу ($I_{\text{зб.}}$);
- по ихтиологическому индексу ($I_{\text{ихт.}}$);
- по индексу состояния поверхности водосбора ($K_{\text{эк.}}$) исследуемого бассейна.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Хозяйственная деятельность человека коренным образом изменила схему функционирования Припятского ГЭК, который вместе с Шацким поозерьем (природным водно-болотно-суходольным образованием) предстает собой связующее звено между Черноморским и Балтийским водными бассейнами, соединяя их в единую ихтиоэкологическую систему.

Функционирование экосистемы Припятского ГЭК базировалось на дрифте энергетических примесей от правобережных притоков расположенных в Малой Лесостепи (Вольно-Подольская возвышенность), в первую очередь — через реки Стирь и Горынь, с их дальнейшим депонированием на луговой пойме Полесской низменности. Данное депонирование достигалось за счет затопливания Полесской низменности на период до 2-х месяцев и более. Во время этого происходила очистка талых вод, развитие живых кормовых организмов и воспроизводство аборигенной ихтиофауны [5, 13, 14].

Оценивая изменения в экосистеме Припятского ГЭК с помощью пространственного биомаркера, мы отмечаем резкое ухудшение среды обитания и условий воспроизводства рыб (рис. 4).

Так, от эталонных характеристик по качеству воды (до сокращения периода затопления поймы, числа пограничных зон — экотонов) Припятский ГЭК был доведён до кризисных (превращения рек в одамбированный сбросной канал с полной деградацией экосистемы) условий.

Рис. 4. Динамика антропогенных изменений устьевой области р. Припять за последние 50 лет (заштрихованная часть — современное состояние)

Fig. 4. Dynamics of anthropogenic changes in the estuarine region of the river Pripyat over the past 50 years (the shaded part is the current state)

На рисунку 4 представлена формализованная схема функционирования Припятского ГЭК, из которой следует, что его освоение было крайне нерациональным. Так, распаханность территорий бассейна возросла с 12,0 до 40,0%, в то время как площадь пойменных нерестовых территорий, из-за освоения бассейнов малых рек, снизилась с 20,0 до 7,8%. Соответственно, уменьшилось число зимовальных ям с 80 до 30 единиц. При этом ухудшилось их состояние — произошло заиливание, а низкое качество воды в период зимней межени приводило к гибели маточного поголовья рыб.

В целом, общая численность учтенных пограничных зон — экотонов — снизилась на 40,0%. Следствием этих процессов стало уменьшение на порядок ихтиомассы уловов, а также трансформация видового состава аборигенной ихтиофауны региона.

Сравнительный анализ состояния ихтиоценоза речных экосистем Стырь-Горынского рыбновосстановительного комплекса относительно не трансформированных бассейнов показал, что полноценные для воспроизводства популяции, сформированность которых составляет 75–100%, характерны для 13 видов рыб (I–II класс). Из них 8 видов рыб являются промыслово-ценными — щука (*Esox lucius*), плотва (*Rutilus rutilus*), линь (*Tinca tinca*), густера (*Blicca bjoerkna*), лещ (*Abramis brama*), карась (*Carassius auratus gibelio*), окунь (*Perca fluviatilis*), красноперка (*Scardinius erythrophthalmus*). В то же время, 7 видов в обловах отсутствовали — минога украинская (*Lampetra mariae*), быстрянка (*Alburnoides bipunctatus*), чехоня (*Pelecus cultratus*), елец (*Leuciscus leuciscus*), голянь (*Phoxinus phoxinus*), усатый голец (*Nemacheilus barbatulus*), бычок-ленточник (*Gobius taenia*) (табл. 2).

Таблица 2. Уровень сформированности популяций аборигенных рыб в реках Стырь, Горынь, Случ относительно не трансформированных бассейнов

Table 2. The level of aboriginal fish populations formation in the rivers Styr, Goryn, and Sluch relatively non-transformed basins

Вид рыб / Fish species	Станции / Stations		Сформированность популяций рыб* / Well-formed populations of fish*
	среднее течение / midstream	устье / creek	
<i>Salmo trutta morpha lacustris</i>	–	–	<30%
<i>Rutilus rutilus</i>	+	+	100%
<i>Leuciscus cephalus</i>	–	+	<50%
<i>Leuciscus idus</i>	–	+	<50%
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	+	+	75%
<i>Aspius aspius</i>	–	+	<50%
<i>Leucaspicus delineatus</i>	+	+	75%
<i>Tinca tinca</i>	+	+	75%
<i>Chondrostoma nasus</i>	–	+	<30%
<i>Gobio gobio</i>	+	+	100%
<i>Barbus borysthenicus</i>	–	+	<30%
<i>Alburnus alburnus</i>	+	+	100%
<i>Blicca bjoerkna</i>	+	+	100%
<i>Abramis brama</i>	+	+	100%
<i>Abramis sapa</i>	–	+	<50%
<i>Vimba vimba</i>	–	+	<30%
<i>Rhodeus sericeus</i>	+	+	75%
<i>Carassius carassius</i>	–	+	<30%
<i>C. auratus gibelio</i>	+	+	75%
<i>Cyprinus carpio</i>	–	+	<30%
<i>Misgurnus fossilis</i>	+	+	<50%

Продолжение табл. 2
Continuation of the table. 2

Вид рыб / Fish species	Станции / Stations		Сформированность популяций рыб* / Well-formed populations of fish*
	среднее течение / midstream	устье / creek	
<i>Silurus glanis</i>	—	+	<50%
<i>Esox lucius</i>	+	+	100%
<i>Lota lota</i>	+	+	<30%
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	+	+	≥50%
<i>Stizostedion lucioperca</i>	—	+	<30%
<i>Perca fluviatilis</i>	+	+	100%
<i>Gymnocephalus cernuus</i>	+	+	75%
<i>Neogobius fluviatilis</i>	—	+	<50%
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	—	+	<30%
<i>Aristichthys nobilis</i>	—	+	<30%
<i>Ctenopharyngodon idella</i>	—	+	<30%
<i>Anguilla anguilla</i>	—	+	<30%
<i>Ameiurus nebulosus</i>	—	+	<30%
<i>Perccottus glenii</i>	+	+	75%

Примечание. * Авторские исследования 2007 и 2008 гг. сравнительно с данными К. Ф. Кесслера, И. Н. Фалеева (начало XX в.), В. С. Пенязя (1957 г.).

Note.* Author's research of 2007 and 2008 in comparison with the data of K. F. Kessler, I. N. Faleeva (of the beginning of the XX century), V. S. Penyaz (1957).

Изредка встречались одиночные экземпляры 6 видов-вселенцев: белого толстолобика (*Hypophthalmichthys molitrix*), пестрого толстолобика (*Aristichthys nobilis*), белого амура (*Ctenopharyngodon idella*), угря европейского (*Anguilla anguilla*), коричневого сомика (*Ameiurus nebulosus*), ротана-головешки (*Perccottus glenii*). Такими же редкими были 16 видов промышленно ценных видов рыб — в устьях рек, например, — марена днепровская (*Barbus boristhenicus*) из Красной книги Украины.

Обращает на себя внимание тот факт, что у 7-ми видов аборигенных рыб, ценных для промышленного рыбоводства, уровень сформированности популяций по сравнению с нетрансформированными речными бассейнами составляет менее 30% (V класс). Это мешает их успешному воспроизводству, формированию устойчивых популяций, промысловых стад, и, соответственно, — сдерживает восстановление потенциала речной сети региона по промысловой ихтиофауне. Не случайно эти виды — озерная форель (*Salmo trutta morpha lacustris*), подуст (*Chondrostoma nasus*), марена днепровская (*Barbus borysthenicus*), рыбец (*Vimba vimba*), карась (*Carassius carassius*), налим (*Lota lota*), судак (*Stizostedion lucioperca*) — встречаются как одиночные экземпляры только в устьях рек Стырь, Горынь, Случ.

Локальные улучшения существуют и будут иметь место в створах русла рек-озёр Нобель и Любязь, а также устьевых участках рек Стырь и Горынь. Однако, элементы деградации наблюдаются и в них — эвтрофикация и «цветение» воды, формирование заморных зон, нехватка нерестилищ. В то же время, проводится работа по выращиванию интродуцированных видов рыб, в частности — белого амура, на отдельных изолированных сегментах реки Стоход.

Таким образом, реабилитация Припятского ГЭК с позиций гидроэкологии остро необходима, а базовая схема её проведения предполагает следующее:

1. Мониторинг водной среды — гидрохимический, гидробиологический, токсикологический, гидрологический, ландшафтный, гидрографический, социальный;

2. Индикацию и комплексную оценку состояния бассейна реки — качество воды, состояние поверхности водосбора, русла и поймы, определение лимитирующих факторов влияния;

3. Экологическое картографирование и факторный анализ, статистическую обработку данных мониторинга и определение путей реабилитации;

4. Принятие компенсационных решений, экологическую экспертизу и гидроэкологическое сопровождение:

а) техническое (расчистка русел, зимовальных ям, нерестилищ; третичная доочистка хозяйственно-бытовых сточных вод и получение живого корма для ихтиофауны; установление русловых биофильтров на волокнистой насадке в особо нарушенных участках рек; обеспечение экологически обоснованных расходов воды в особо нарушенных створах);

б) биологическое (устройство биоплато, ветлендов; интродукция рыб-биомелиораторов; инокуляция хлореллы на отдельных участках рек с явлениями стагнации; устройство фантомных озёр, пойменных рыбовосстановительных комплексов у стареющих водных объектов; усовершенствование биологической очистки сточных вод и их вторичное использование);

в) пространственное (преобразование структуры ландшафтов до оптимальных пределов; восстановление триады воспроизводства ихтиофауны; открытость миграционных путей, оптимум нерестилищ и зимовальных ям, качество воды и кормовая база; реабилитация и охрана «природных локалитетов» в системе «русло–пойма»; создание заповедников — до 30% — в сохраненных бассейнах малых рек);

г) социальное (формирование общественного мнения; оздоровление, рекреация, регулирование демографической нагрузки; государственное регулирование природопользования, создание эталонных заповедных бассейнов; формирование региональной и глобальной сети охраняемых объектов).

Использование предложенного пространственного биомаркера для реабилитации ихтиофауны Припятского ГЭК подразумевает: пространственную оптимизацию подсистем бассейна до оптимальных характеристик, восстановление числа пограничных зон — экотонов — и повышение качества воды (рис. 5).

Рис. 5. Оптимизация структуры ландшафта бассейна Припятского ГЭК, как элемента управления состоянием мегаэкосистемы

Fig. 5. Optimization of the landscape structure of the basin of the Pripet Hydroecological corridor as an element of controlling the state of the megaecosystem

Основными направлениями реабилитации ихтиофауны Припятского ГЭК в Западном Полесье являются следующие:

- увеличение площади лесов;
- сокращение площади под отвалами, карьерами и другими деградированными землями;
- реабилитация болот на месте деградированных торфяников, возрождение малых рек, миграционных путей для аборигенной ихтиофауны, локальных рыбовосстановительных участков;
- увеличение площади пойменных лугов;
- сокращение площади пахотных земель.

В целом, бассейновый подход при изучении состояния водных экосистем, в частности — Припятского ГЭК, обеспечивает возможность управления состоянием поверхностных вод с позиций реабилитационной гидроэкологии.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Гидроэкология как биологическая наука, которая базируется на достижениях гидробиологии, обеспечивает общество знаниями для менее болезненного перехода водных экосистем в преобразованную хозяйственной деятельностью человека ноосферу, определив при этом пути реабилитации нарушенных экосистем и предложив средства для управления их состоянием.

Задачи гидроэкологии для реабилитации ихтиофауны Припятского ГЭК, пострадавшей от антропогенной трансформации бассейнов его рек, представлены двумя аспектами: исправление ошибок, допущенных при развитии народного хозяйства в сфере использования и охраны поверхностных вод, а также реабилитация нарушенных речных и озерных экосистем.

Для мониторинга состояния водных экосистем целесообразно использование пространственного биомаркера, включающего характеристики качества воды и биоразнообразия ихтиоценозов, состояние поверхности водосбора и наличие пограничных зон-экотонов, т. е. показателей оценки участков биотопов, что и

было продемонстрировано на примере рек Стыр и Горынь.

В первую очередь, для реабилитации ихтиофауны Припятского ГЭК необходимо упорядочить структуру пойменных лугов и прибрежных защитных полос. С этой целью имеет смысл высаживать леса на непродуктивных и деградированных землях.

На современном этапе развития экономики Украины необходим переход от истощающего ресурсно-олигархического направления природопользования до реабилитационного, с государственным контролем наиболее важных природных ресурсов, в частности — водоемов и водных живых биоресурсов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Войтишина Д. Й. Регіональні еколого-економічні особливості природокористування на території Західного Полісся // Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку. Березне, 2008. С. 22—23.
2. Відновна іхтіоекологія (реабілітація аборигенної іхтіофауни природних водойм України) / ред. Й. В. Гриб, В. В. Сондак. Рівне : Волинські обереги, 2007. 630 с.
3. Харченко Т. А., Ляшенко А. В., Жукинський В. Н. Экоиндексация и оценка состояния водных экосистем по характеристикам биоразнообразия и качества среды обитания гидробионтов // Гидробиологический журнал. 2009. Т. 45, № 1. С. 3—18.
4. Сондак В. В. Іхтіофауна природних водойм Стир-Горинського рибовідтворювального комплексу (стан та умови відтворення) : автореф. дис. на здобуття наук ступеня докт. біол. наук. Київ, 2010. 44 с.
5. Сондак В. В., Волкошовець О. В. Екологічні та іхтіологічні закономірності відродження аборигенної іхтіофауни у трансформованій річковій мережі Західного Полісся України // II Всеукр. з'їзд екологів з міжнародною участю : збірник наукових праць. 2009. С. 116—119.
6. Directive 2000/60 EC of the European Parliament and of the Commit of 23 October 2000 establishing a frame work for Community action in the field of water policy // Official journal of the European Communities. 22.12.2000. № 327. 72 p.
7. Романенко В. Д. Актуальні гідроекологічні проблеми в контексті європейської водної політики // Наукові записки НТПУ ім. В. Гнатюка. 2005. № 3(26). С. 378—382. (Серія : Біологія).
8. Гриб Й. В., Клименко М. О., Сондак В. В. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем. Рівне : Волинські обереги, 1999. 346 с.
9. Сондак В. В. Особливості формування стресових ситуацій та ризики виживання аборигенної іхтіофауни у поверхневих водах України // Доповіді НАН України. 2008. № 7. С. 191—199.
10. Романенко В. Д., Гриб И. В., Гродзинский М. Д. Концептуальные подходы при формировании гидроэкологических коридоров // Гидробиологический журнал. 2003. Т. 39, № 5. С. 3—20.
11. Гриб И. В. Анализ заморных явлений в малых реках Западного Полесья Украинской ССР // Гидробиологический журнал. 1972. Т. 11, № 2. С. 42—48.
12. Гриб Й. В., Сондак В. В., Волкошовець О. В. До питання токсичності стічних і природних вод // Вісник НУВГП. 2006. № 4(36). С. 294—304.
13. Оцінка локальних загроз і критеріїв збереження біорізноманіття водних

- екосистем / Гриб Й. В. та ін. // Водне господарство України. 2007. № 2. С. 25—31.
14. Сондак В. В. Відновна іхтіоекологія природних водойм Західного Полісся України. Рівне : Волинські обереги, 2008. 380 с.
  15. Романенко В. Д. Учение В. И. Вернадского о природных водах и его роль в развитии современной гидроэкологии // Гидробиологический журнал. 2003. Т. 39, № 3. С. 3—10.
  16. Романенко В. Д. Основи гідроекології. Київ : Обереги, 2001. 728 с.
  17. Протасов А. А. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная диверсикология. Киев, 2002. 105 с.
  18. Протасов А. А. О концепции емкости среды и экологической емкости // Гидробиологический журнал. 1994. Т. 30, № 4. С. 3—13.
  19. Реймерс Н. Ф. Надежды на выживание человечества. Концептуальная экология. Москва : Россия молодая, 1992. 367 с.
  20. Силаева А. А., Протасов А. А. Биоиндикация качества среды по составу и структуре биотических сообществ // Биоиндикация в экомониторинге пресноводных систем. Санкт-Петербург, 2007. С. 294—298.
  21. Оценка состояния водных объектов Украины по гидробиологическим показателям. Бентос, перифитон и зоопланктон / Окснюк О. П. и др. // Гидробиологический журнал. 1994. Т. 30, № 4. С. 31—35.
  22. Окснюк О. П., Давыдов О. А., Карпезо Ю. И. Оценка экологического состояния водных объектов по фитопланктону и фитобентосу (на примере украинского участка Дуная) // Гидробиологический журнал. 2009. Т. 45, № 2. С. 3—13.
  23. Романенко В. Д., Жукинський В. М., Окснюк О. П. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. Київ : Символ, 1998. 28 с.
  24. Романенко В. Д. Методика гідроекологічних досліджень. Київ : Обереги, 2008. 201 с.
  25. Афанасьев С. А. Развитие европейских подходов к биологической оценке состояния гидроекосистем в мониторинге рек Украины // Гидробиологический журнал. 2001. Т. 37, № 5. С. 3—18.

REFERENCES

1. Voityshyna, D. Y. (2008). Rehionalni ekoloho-ekonomichni osoblyvosti pryrodokorystuvannya na terytorii Zakhidnoho Polissia. *Pryrodno-resursnyi kompleks Zakhidnoho Polissia: istoriia, stan, perspektyvy rozvytku*. Berezne, 22-23.
2. Hryb, Y. V., & Sondak, V. V. (Eds.) (2007). *Vidnovna ikhtioekolohiia (reabilitatsiia aboryhennoi ikhtiofauny pryrodnykh vodoim Ukrainy)*. Rivne: Volynski oberehy.
3. Kharchenko, T. A., Lyashenko, A. V., & Zhukinskiy, V. N. (2009). Ekoindeksatsiya i otsenka sostoyaniya vodnykh ekosistem po kharakteristikam bioraznoobraziya i kachestva sredy obitaniya gidrobiontov. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 45, 3-18.
4. Sondak, V. V. (2010). Ikhtiofauna pryrodnykh vodoim Styr-Horynskoho rybovidtvtoriuvalnogo kompleksu (stan ta umovy vidtvorennia). Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv.
5. Sondak, V. V., & Volkoshevets, O. V. (2009). Ekologichni ta ikhtiolohichni zakonomirnosti vidrodzhennia aboryhennoi ikhtiofauny u transformovanii richkovii merezhi Zakhidnoho Polissia Ukrainy. *Zbirnyk naukovykh prats II Vseukrainskoho*

- zizdu ekologiv z mizhnarodnoiu uchastiu, 116-119.
6. Directive 2000/60 EC of the European Parliament and of the Commit of 23 October 2000 establishing a frame work for Community action in the field of water policy. (2000). Officinal journal of the European Communities, 327, 72.
  7. Romanenko, V. D. (2005). Aktualni hidroekologichni problemy v konteksti yevropeiskoi vodnoi polityky. Naukovi zapysky NTPU im. V. Hnatiuka. Serii: Biologhiia, 3(26), 378-382.
  8. Hryb, Y. V., Klymenko, M. O., & Sondak, V. V. (1999). Vidnovna hidroekologhiia porushenykh richkovykh ta ozernykh system. Rivne: Volynski oberehy.
  9. Sondak, V. V. (2008). Osoblyvosti formuvannia stresovykh sytuatsii ta ryzyky vyzyhvanntia aboryhennoi ikhtiofauny u poverkhnevyykh vodakh Ukrainy. Dopovidi NAN Ukrainy, 7, 191-199.
  10. Romanenko, V. D., Grib, I. V., & Grodzinskiy, M. D. (2003). Kontseptual'nye podkhody pri formirovanii gidroekologicheskikh koridorov. Gidrobiologicheskii zhurnal, 39(5), 3-20.
  11. Grib, I. V. (1972). Analiz zamornykh yavleniy v malikh rekakh Zapadnogo Poles'ya Ukrainskoy SSR. Gidrobiologicheskii zhurnal, 11, 42-48.
  12. Hryb, Y. V., Sondak, V. V., & Volkoshovets, O. V. (2006). Do pytannia toksychnosti stichnykh i pryrodnykh vod. Visnyk NUVHP, 4(36), 294-304.
  13. Hryb, Y. V., Kunchyk, T. N., & Sondak, V. V., et al. (2007). Otsinka lokalnykh zahroz i kryteriiv zberezhenntia bioriznomanittia vodnykh ekosystem. Vodne hospodarstvo Ukrainy, 2, 25-31.
  14. Sondak, V. V. (2008). Vidnovna ikhtioekologhiia pryrodnykh vodoim Zakhidnoho Polissia Ukrainy. Rivne: Volynski oberehy.
  15. Romanenko, V. D. (2003). Uchenie V. I. Vernadskogo o pryrodnykh vodakh i ego rol' v razvitiii sovremennoy gidroekologii. Gidrobiologicheskii zhurnal, 39, 3-10.
  16. Romanenko, V. D. (2001). Osnovy hidroekologhi. Kyiv: Oberehy.
  17. Protasov, A. A. (2002). *Bioraznoobrazie i ego otsenka. Kontseptual'naya diversikologiya*. Kiev.
  18. Protasov, A. A. (1994). O kontseptsii emkosti sredy i ekologicheskoy emkosti. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 30(4), 3-13.
  19. Reymers, N. F. (1992). *Nadezhdy na vyzhivanie chelovechestva. Kontseptual'naya ekologiya*. Moskva: Rossiya molodaya.
  20. Silaeva, A. A., & Protasov, A. A. (2007). Bioindikatsiya kachestva sredy po sostavu i strukture bioticheskikh soobshchestv. Bioindikatsiya v ekomonitoringe presnovodnykh sistem.
  21. Oksiyuk, O. P., et al. (1994). Otsenka sostoyaniya vodnykh ob"ektov Ukrainy po gidrobiologicheskim pokazatelyam. Bentos, perifitoni zooplankton. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 30(4), 31-35.
  22. Oksiyuk, O. P., Davydov, O. A., & Karpezo, Yu. I. (2009). Otsenka ekologicheskogo sostoyaniya vodnykh ob"ektov po fitoplanktonu i fitobentosu (na primere ukrainskogo uchastka Dunaya). *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 45(2), 3-13.
  23. Romanenko, V. D., Zhukynskiy, V. M., & Oksiyuk, O. P. (1998). Metodyka ekologichnoi otsinky yakosti poverkhnevyykh vod za vidpovidnymiy katehoriiamy. Kyiv: Symvol.
  24. Romanenko, V. D. (2008). Metodyka hidroekologichnykh doslidzhen. Kyiv: Oberehy.
  25. Afanas'ev, S. A. (2001). Razvitie evropeyskikh podkhodov k biologicheskoy otsenke sostoyaniya gidroekosistem v monitoringe rek Ukrainy. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 37, 3-18.

РЕПРОДУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНТРОДУЦЕНТА — СХІДНОЇ ПРІСНОВОДНОЇ КРЕВЕТКИ (*MACROBRACHIUM NIPPONENSE* DE HAAN, 1849) — В ПОНИЗЗІ ДНІСТРА

П. В. Шекк, shekk@ukr.net, Одеський державний екологічний університет,
м. Одеса

Ю. О. Астафуров, astafurov.yu@ukr.net, Одеський державний екологічний
університет, м. Одеса

Мета. Дослідити репродуктивні характеристики самиць прісноводної креветки *Macrobrachium nipponense* (дністровської популяції) в природних і штучних умовах.

Методика. Польові дослідження проводили з квітня по жовтень 2016–2019 рр. у Кучурганському і Дністровському лиманах, рибницьких ставах і озерах пониззя річок Дністер і Турунчук. Креветку ловили на прибережних ділянках сачками і спеціальними пастками на приманку (подрібнену атерину). Дослідження проводили в польових і лабораторних умовах. Для експериментальних робіт виловлену креветку транспортували в акваріальну кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету. Для вирощування і відтворення креветки використовували скляні акваріуми об'ємом 0,3 м³, об'єднані в експериментальну установку з замкненим циклом водообміну (УЗВ) загальним робочим об'ємом 1,2 м³. В період експерименту в УЗВ підтримували умови, близькі до таких в місцях вилову креветки.

При проведенні біологічного аналізу у креветок визначали стать, загальну довжину і масу тіла, стадію і тривалість ембріогенезу. Також реєстрували виживання *M. nipponense* за різних умов утримання. Для аналізу гідрохімічних параметрів середовища застосували сучасні прилади для експрес-аналізу: «ЕКОТЕСТ–2000 Т» (O₂; NO₂; NH₄; CO₂; фосфати, рН); термооксиметр «Аж-101М» (Т, °С; O₂); «РН-метр – 150 М»; рефрактометр «АТАГО – 100» (солоність і щільність води). Сольовий розчин у спеціальних експериментах отримували в лабораторних умовах шляхом розбавлення морської води.

Результати. Запліднені яйця креветок мали овальну форму, а їхні середні розміри варіювали в межах 0,58–0,66 мм (довжина) і 0,39–0,46 мм (ширина). Встановлено, що розміри запліднених яєць у *M. nipponense* дністровської популяції відрізнялися в різних природних акваторіях. Найбільші розміри (0,66 ± 0,035 і 0,46 ± 0,014 мм) та середній об'єм (0,073 мм³) мали яйця креветки з Кучурганського лиману. Вони достовірно (P ≥ 0,95) відрізнялися за цими показниками від таких у креветок з Дністровського лиману, які мали найменші розміри (0,58 ± 0,022 і 0,39 ± 0,011 мм) та середній об'єм (0,046 мм³). Креветки зі ставів і озер Дністра і Турунчука мали середні розміри і об'єм яєць, які за цими показниками достовірно не відрізнялися від таких у особин з Кучурганського і Дністровського лиманів.

Аналіз плодючості креветок дністровської популяції показав, що ПРП, як і КРП, зростає прямо пропорційно збільшенню розмірів і маси самиць, що закономірно для всіх пойкилотермних тварин. Встановлено, що в діапазоні лінійних розмірів самиць *M. nipponense* дністровської популяції 2,5–7,9 см і маси 2,2–7,3 г ПРП зростає від 3441 ± 942 до 10241 ± 1323 екз. яєць в одній кладці. Тривалість ембріогенезу і виживання ембріонів креветок

© П. В. Шекк, Ю. О. Астафуров, 2019

при зростанні температури води з 18 до 31°C скорочується з 42 до 20 діб. Оптимум припадає на температуру 27°C, яка забезпечує виживання 98% ембріонів. Креветка *M. nipponense* може відтворюватися при солоності від 0 до 9‰, але оптимальною є солоність 5‰, яка в зоні оптимальних температур забезпечує виживання 98% ембріонів за мінімальної тривалості ембріогенезу.

Наукова новизна. Вперше проведено дослідження репродуктивних характеристик самиць прісноводної креветки *M. nipponense* дністровської популяції. Показано, що запліднені яйця креветок дністровської популяції відрізняються за розміром у різних акваторіях пониззя Дністра. Встановлено залежність початкової (ПРП) та кінцевої (КРП) реалізованої плодючості від маси креветок. Досліджено тривалість ембріогенезу і відсоток виживання ембріонів у залежності від температури і солоності води. Встановлені оптимальні параметри температури і солоності для ембріогенезу креветки *M. nipponense* дністровської популяції.

Практична значимість. Результати досліджень дозволили дати об'єктивну характеристику та оцінку плодючості інтродуцента *M. nipponense* в умовах басейну нижнього Дністра і можуть бути використані при розробці технології штучного відтворення виду.

Ключові слова: креветка *M. nipponense*, дністровська популяція, розміри яєць, ембріогенез, солоність, температура, виживання.

REPRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF THE INTRODUCED SPECIES — EASTERN FRESHWATER SHRIMPS (*MACROBRACHIUM NIPPONENSE* DE HAAN, 1849) IN THE LOWER DNISTER RIVER

P. Shekk, shekk@ukr.net, Odesa State Environmental University, Odesa

Yu. Astafurov, astafurov.yu@ukr.net, Odesa State Environmental University, Odesa

Purpose. To study reproductive characteristics of female freshwater shrimp *M. nipponense* (Dniester population) in natural and artificial conditions.

Methodology. Field studies were carried out from April to October 2016-2019 in the Kuchurgan and Dniester lagoons, fish ponds and lakes of the lower Dniester and Turunchuk rivers. Shrimp were caught in coastal areas with net and special traps using a bait (ground silverside). The studies were conducted in the field and laboratory conditions. For experimental work, the caught shrimp was transported to the aquarium department of aquatic biological resources and aquaculture of Odessa State Ecological University. For the cultivation and reproduction of shrimp, 0.3 m³ glass aquariums were used, combined in an experimental setup with a recirculating aquaculture system (RAS) with a total working volume of 1.2 m³. During the experiment, the conditions were close to the environment, where shrimp were caught. During the biological analysis of the shrimp, following parameters were determined: sex, total length and body weight (stage and duration of embryogenesis). The survival of *M. nipponense* under various conditions was also recorded. Following modern instruments were used for the express analysis of hydrochemical parameters of the environment: ECOTEST-2000 T (O₂; NO₂; NO₃; NH₄; CO₂; phosphates, pH), Azha-101M thermooximeter (T, °C; O₂), pH meter-150 m); ATAGO-100 refractometer (salinity and water density). Saline solution, in special experiments, was produced in laboratory conditions by diluting seawater.

Findings. Fertilized shrimp eggs have an oval shape, and their average sizes varied within 0.58-0.66 mm (length) and 0.39-0.46 mm (width). It was found that the size of fertilized eggs in *M. nipponense* of the Dniester population differed in size in various natural waters. The largest sizes (0.66 ± 0.035 and 0.46 ± 0.014 mm) and an average volume of 0.073 mm³ were observed in shrimp eggs from the Kuchurgan estuary. These parameters significantly ($P \geq 0.95$) differed from shrimps from the Dniester estuary, which had the smallest sizes (0.58 ± 0.022 and 0.39 ± 0.011 mm) and average volume (0.046 mm³). Shrimp from ponds and lakes of the Dniester and Turunchuk had average size

and egg volume, which, according to these parameters, did not significantly differ from those of individuals from the Kuchurgan and Dniester estuaries. An analysis of shrimp fertility of the Dniester population showed that the IRF and FRF increase in direct proportion to the increase in the size and weight of females that is natural for all poikilothermic animals. IRF in the linear size range of female *M. nipponense* from the Dniester population of 2.5-7.9 cm and weight of 2.2-7.3 g increases from 3441 ± 942 to 10241 ± 1323 eggs in one clutch. The duration of embryogenesis and survival of shrimp embryos with an increase in water temperature from 18 to 31 °C is reduced from 42 to 20 days. The optimum is at a temperature of 27 °C, which ensures the survival of 98% of the embryos. Shrimp *M. nipponense* can reproduce at a salinity from 0 to 9‰, but the optimum salinity is 5‰ which in the range of optimal temperatures ensures the survival of 98% of embryos with a minimum duration of embryogenesis.

Originality. The reproductive characteristics of female *M. nipponense* from the Dniester population were studied for the first time. It was shown that the fertilized shrimp eggs of the Dniester population differ in size in different areas of the lower reaches. The dependence of the initial (IRF) and final (FRF) realized fertility on the mass of shrimp was found. The duration of embryogenesis and the survival rate of embryos were studied depending on the temperature and water salinity. The optimal temperature and salinity parameters for embryogenesis of *M. nipponense* of the Dniester population have been established.

Practical value. The research results made it possible to give an objective characterization and assessment of the fertility of the introduced species *M. nipponense* in the conditions of the Lower Dniester basin and can be used to develop technology for its artificial reproduction.

Keywords: shrimp *M. nipponense*, Dniester population, egg size, embryogenesis, salinity, temperature, survival.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТРОДУЦЕНТА — ВОСТОЧНОЙ ПРЕСНОВОДНОЙ КРЕВЕТКИ (*MACROBRACHIUM NIPPONENSE* DE HAAN, 1849) — В НИЗОВЬЯХ ДНЕСТРА

П. В. Шекк, shekk@ukr.net, Одесский государственный экологический университет, г. Одесса

Ю. О. Астафуров, astafurov.yu@ukr.net, Одесский государственный экологический университет, г. Одесса

Цель. Исследовать репродуктивные характеристики самок пресноводной креветки *M. nipponense* (днестровской популяции) в естественных и искусственных условиях.

Методика. Полевые исследования проводили с апреля по октябрь 2016–2019 гг. в Кучурганском и Днестровском лиманах, рыбоводных прудах и озерах низовья рек Днестр и Турунчук. Креветок ловили на прибрежных участках сачками и специальными ловушками на приманку (измельченную атерину). Исследования проводились в полевых и лабораторных условиях. Для экспериментальных работ выловленных креветок транспортировали в аквариальную кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Одесского государственного экологического университета. Для выращивания и воспроизводства креветок использовали стеклянные аквариумы объемом 0,3 м³, объединенные в экспериментальную установку с замкнутым циклом водообмена (УЗВ) общим рабочим объемом 1,2 м³. В период эксперимента в УЗВ поддерживали условия, близкие к таковым в местах вылова креветок.

При проведении биологического анализа у креветок определяли пол, общую длину и массу тела, стадию и продолжительность эмбриогенеза. Также регистрировали выживание *M. nipponense* при различных условиях содержания. Для анализа гидрохимических параметров среды применили современные приборы для экспресс-анализа: «ЭКТОТЕСТ-2000 Т» (O₂; NO₂; NO₃; NH₄; CO₂; фосфаты, pH) термооксиметр «Ажа-101М» (Т, °C; O₂) «РН-метр-150 м»; рефрактометр «АТАГО-100» (соленость и плотность воды). Солевой раствор в специальных экспериментах получали в лабораторных условиях путем разбавления морской воды.

Результати. Оплодотворенные яйца креветок имели овальную форму, а их средние размеры варьировали в пределах 0,58–0,66 мм (длина) и 0,39–0,46 мм (ширина). Установлено, что размеры оплодотворенных яиц у *M. nipponense* днестровской популяции отличались в различных природных акваториях. Наибольшие размеры ($0,66 \pm 0,035$ и $0,46 \pm 0,014$ мм) и средний объем ($0,073$ мм³) имели яйца креветок Кучурганского лимана. Они достоверно ($P \geq 0,95$) отличались по этим показателям от таковых креветок с Днестровского лимана, которая имела наименьшие размеры ($0,58 \pm 0,022$ и $0,39 \pm 0,011$ мм) и средний объем ($0,046$ мм³). Креветки из прудов и озер Днестра и Турунчука имели средние размеры и объем яиц, которые по этим показателям достоверно не отличались от таковых у особей из Кучурганского и Днестровского лиманов. Анализ плодовитости креветок днестровской популяции показал, что ПРП по КРП растет прямо пропорционально увеличению размеров и массы самок, что закономерно для всех пойкилотермных животных. Установлено, что в диапазоне линейных размеров самок креветки *M. nipponense* днестровской популяции 2,5–7,9 см и массы 2,2–7,3 г ПРП растет с 3441 ± 942 до 10241 ± 1323 шт. яиц в одной кладке. Продолжительность эмбриогенеза и выживания эмбрионов креветки при росте температуры воды с 18 до 31°C сокращается с 42 до 20 суток. Оптимум соответствует температуре 27°C, которая обеспечивает выживание 98% эмбрионов. Креветка *M. nipponense* способна к воспроизводству при солености с 0 до 9‰, но оптимальной является соленость 5‰, которая в зоне оптимальных температур обеспечивает выживание 98% эмбрионов при минимальной продолжительности эмбриогенеза.

Научная новизна. Впервые проведены исследования репродуктивных характеристик самок пресноводной креветки *M. nipponense* днестровской популяции. Показано, что оплодотворенные яйца креветок днестровской популяции отличаются по размеру в различных акваториях низовья Днестра. Установлена зависимость начальной (ПРП) и конечной (КРП) реализованной плодовитости от массы креветок. Исследована продолжительность эмбриогенеза и процент выживаемости эмбрионов в зависимости от температуры и солености воды. Установлены оптимальные параметры температуры и солености для эмбриогенеза креветки *M. nipponense* днестровской популяции.

Практическая значимость. Результаты исследований позволили дать объективную характеристику и оценку плодовитости интродуцента *M. nipponense* в условиях бассейна нижнего Днестра и могут быть использованы при разработке технологии искусственного воспроизводства вида.

Ключевые слова: креветка *M. nipponense*, днестровская популяция, размеры яиц, эмбриогенез, соленость, температура, выживание.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Східна річкова субтропічна креветка *M. nipponense* належить до родини *Palaemonidae*. Даний вид поширений в прісноводних і солонуватоводних водоймах південно-східної Азії [15] і є перспективним об'єктом промислу і аквакультури в субтропічних водах Японії, Китаю, В'єтнаму та інших країн південно-східної Азії. Завдяки високій толерантності *M. nipponense* добре адаптується до широкого діапазону умов навколишнього середовища. Відтворюється в прісноводних акваторіях, але для її вирощування однаково придатні як прісні, так і солонуватоводні екосистеми. *M. nipponense* має велике комерційне значення і є важливим об'єктом аквакультури і промислу в багатьох країнах світу [12–14, 16, 18, 19, 22, 24].

Технологія штучного відтворення і товарного вирощування *M. nipponense* була розроблена в Китаї приблизно 50 років тому, а потім цей досвід був поширений у багатьох країнах південно — східної Азії.

У 2008 р. світовий обсяг виробництва *M. nipponense* перевищив 200 тис. т, що складає більшу частину світового виробництва креветки.

Самиці *M. nipponense* досягають статеві зрілості у віці 3–5 місяців. Спаровування відбувається після завершення линьки, коли панцир креветки м'який. Через кілька годин після запліднення яйця відкладаються на плеоподи і самиці виношують їх до завершення ембріонального розвитку. Плодючість досить висока. В залежності від віку і розмірів самиць, кількість яєць в одній кладці може досягати 20–150 тис. екз. [5, 8, 19].

У Кучурганський лиман (водойма-охолоджувач Молдавської ГРЕС) креветка *M. nipponense* була інтродукована в 1986 р. з водойми-охолоджувача Березовської ГРЕС [3]. В результаті охолодження вод Кучурганського лиману, після зниження потужності Молдавської ГРЕС, у 2000-х р. креветка вийшла в р. Дністер і протягом наступних років широко розселилась у пониззі ріки, утворивши дністровську популяцію, чисельність якої зростає.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Однією з найважливіших ланок, що визначає чисельність і можливості подальшого розселення інтродуцента *M. nipponense* в басейні нижнього Дністра, є особливості відтворення виду в нових умовах. Ця складова біології вселенця практично не досліджувалась. Дослідження процесу відтворення креветки в природних умовах повинні слугувати основою для оптимізації вирощування та утримання плідників (ікроносних самиць), а також є важливою складовою при розробці технології масового культивування *M. nipponense* в умовах водойм півдня України.

Мета дослідження полягала у вивченні основних репродуктивних характеристик самиць прісноводної креветки *M. nipponense* (дністровської популяції) в природних і штучних умовах.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Польові дослідження проводили з квітня по жовтень 2016–2019 рр. у Кучурганському і Дністровському лиманах, рибницьких ставах і озерах пониззя річок Дністер і Турунчук. Креветок ловили на прибережних ділянках сачками (вічко 4–10 мм) і пастками — спеціальними раколовками на приманку (подрібнену атерину). Дослідження проводили в польових і лабораторних умовах. Для експериментальних робіт виловлені екземпляри креветок в бідонах об'ємом 20 л з примусовою аерацією води транспортували в акваріальну кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету. Для вирощування і відтворення креветок використовували скляні акваріуми об'ємом 0,3 м³, об'єднані в експериментальну установку з замкненим циклом водообміну (УЗВ) загальним робочим об'ємом 1,2 м³. В період експерименту в УЗВ підтримували умови, близькі до таких в місцях вилову креветок (табл. 1).

При проведенні біологічного аналізу у креветок визначали стать, загальну довжину і масу тіла, стадію і тривалість ембріогенезу. Також реєстрували виживання *M. nipponense* за різних умов утримання. Для аналізу гідрохімічних параметрів середовища застосовували сучасні прилади для експрес-аналізу:

«ЕКОТЕСТ-2000 Т» (O_2 ; NO_2^- ; NO_3^- ; NH_4^+ ; CO_2 ; фосфати, pH); термооксиметр «Ажа-101М» (Т, $^{\circ}C$; O_2); «РН-метр – 150 М); рефрактометр «АТАГО-100» (солоність і щільність води).

Сольовий розчин у спеціальних експериментах отримували в лабораторних умовах шляхом розбавлення морської води.

Таблиця 1. Фізико-хімічні показники середовища УЗВ і Кучурганського лиману в період вилову та утримання *M. nipponense*

Table 1. Physico-chemical indicators in the RAS and in the Kuchurgan estuary during the catch period of *M. nipponense*

Показник / Indicator	Природні водойми пониззя Дністра / Natural reservoirs of the lower Dnistro	УЗВ / RAS
Прозорість, см / water transparency, cm	28–70	75–80
t, $^{\circ}C$	22–29	28 $\pm$ 0,50
pH	7,10–8,15	7,00–7,50
Розчинений кисень, мг/дм ³ / Dissolved oxygen, mgO ₂ /dm ³	6,10–10,50	7,60–8,70
Солоність, ‰ / Salinity, ‰	0–11	0–9
SO ₄ ²⁻ , мг/дм ³ / mg/dm ³	22,70–54,10	14,56 $\pm$ 5,30
Ca ²⁺ , мг/дм ³ / mg/dm ³	–	8,87 $\pm$ 3,70
Mg ²⁺ , мг/дм ³ / mg/dm ³	44,50–46,80	19,60 $\pm$ 4,50
NH ₄ ⁺ , мгN/дм ³ / mgN/dm ³	0,250–0,285	0,075
NO ₂ ⁻ , мгN/дм ³ / mgN/dm ³	0,002–0,015	0,005
NO ₃ ⁻ , мгN/дм ³ / mgN/dm ³	0,092–0,852	0,085

Загальну довжину креветок вимірювали від кінця рострума до кінця тельсона за допомогою штангенциркуля з точністю до 1 мм. Індивідуальну масу визначали за допомогою електронних терезів (AXIS-500, точність до 0,01 г). Вимірювання яєць з кладки здійснювали за допомогою окуляр-мікрометра на бінокулярному мікроскопі МБС–10. Початкову реалізовану плодючість (ПРП) і кінцеву реалізовану плодючість (КРП) визначали ваговим методом [1, 4]. За ПРП вважали кількість щойно відкладених яєць на плеоподи самиць на початку інкубаційного періоду, за КРП — кількість ікринок, які розвивалися на плеоподах самиць в кінці інкубаційного періоду безпосередньо перед вилупленням личинок. Плодючість і розмірні параметри визначали у 85 самиць креветок *M. nipponense*. Статистичну обробку даних проводили за допомогою програми «Microsoft Excel».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Запліднені яйця креветок мали овальну форму, а їхні середні розміри варіювали в межах 0,58–0,66 мм (довжина) і 0,39–0,46 мм (ширина). Вони були цілком зіставні з розмірами яєць самиць, що утримувались в лабораторній УЗВ.

Аналогічні дані щодо розмірів і форми яєць *M. nipponense* наводять інші автори [7, 17, 20]. В ході ембріогенезу спостерігалось подвоєння, а іноді і потроєння початкової маси яєць [9].

Разом з тим, встановлено, що розміри запліднених яєць у *M. nipponense* дністровської популяції відрізнялися в різних природних акваторіях (табл. 2).

Таблиця 2. Розміри і об'єм запліднених яєць креветки *M. nipponense* з різних акваторій пониззя Дністра

Table 2. The size and volume of *M. nipponenses* fertilized eggs shrimp from different water areas of the lower Dnistro

Водойми пониззя Дністра / Reservoirs of the lower Dnistro	Довжина, мм / Length, mm		Ширина, мм / Width, mm		Об'єм, мм ³ / Volume, mm ³
	мін–макс / min-max	середня / average	мін–макс / min-max	середня / average	
Дністровський лиман / Dnistro Estuary	0,55–0,60	0,58±0,022	0,36–0,42	0,39±0,011	0,046
Водойми Дністра і Турунчука / Reservoirs of the Dnistro & Turunchuk	0,62–0,68	0,65±0,033	0,39–0,48	0,45±0,012	0,069
Кучурганський лиман / Kuchurgan estuary	0,60–0,70	0,66±0,035	0,38–0,50	0,46±0,014	0,073

Найбільші розміри (0,66±0,035 і 0,46±0,014 мм) та середній об'єм (0,073 мм³) мали яйця креветок з Кучурганського лиману. Вони достовірно ($P \geq 0,95$) відрізнялися за цими показниками від креветок з Дністровського лиману, які мали найменші розміри (0,58±0,022 і 0,39±0,011 мм) та середній об'єм (0,046 мм³). Креветки із ставів і озер Дністра і Турунчука мали середні розміри і об'єм яєць, які за цими показниками достовірно не відрізнялися від таких у особин з Кучурганського і Дністровського лиманів.

Збільшення розмірів яєць за зміни місця існування креветок від прибережних до внутрішніх вод (так звана «прісноводність») добре відоме з міжвидового порівняння креветок [16, 21, 23].

Дослідженнями [17, 20] встановлено середній об'єм яєць для різних популяцій *M. nipponense* з островів Хонсю, Шікоку і Кіушу. Відповідно до розмірів яєць, вони поділяються на гирлові популяції з маленькими яйцями (0,046–0,062 мм³), солонуватоводні (озерні) популяції, які мають яйця середнього об'єму (0,065–0,072 мм³), і прісноводні (озерні) популяції з яйцями максимального об'єму (0,094–0,111 мм³) [17].

Цілком ймовірно, що при розселенні креветки *M. nipponense* в пониззі Дністра і Турунчука ми теж маємо справу з локальними групами, приуроченими до різних місць існування, що відрізняються за об'ємом запліднених яєць та іншими показниками одна від одної.

Аналіз плодючості креветок дністровської популяції показав, що ПРП, як і КРП, зростає прямо пропорційно збільшенню розмірів і маси самиць, що закономірно для всіх пойкилотермних тварин [10].

Встановлено, що в діапазоні лінійних розмірів самиць креветки *M. nipponense* дністровської популяції 2,5–7,9 см і маси 2,2–7,3 г ПРП зростала від 3441±942 до 10241±1323 екз. яєць в одній кладці (рис. 1).

Залежність початкової реалізованої плодючості (ПРП) від маси креветки добре апроксимується ($R^2 = 0,967$) лінійним рівнянням:

$$\text{ПРП} = 1199,6 W + 1568,6, \quad (1)$$

де ПРП — початкова реалізована плодючість, шт. яєць;

W — сира маса креветки, г.

Кінцева реалізована плодючість (КРП) кількісно характеризує «робочу» плодючість. Фактично її можна використовувати для оцінки чисельності поповнення або динаміки змін чисельності поколінь на ранніх стадіях розвитку [4].

Рис. 1. Залежність початкової реалізованої плодючості (ПРП) від лінійних розмірів самиць прісноводної креветки *M. nipponense* пониззя Дністра

Fig. 1. Dependence of initial realized fecundity (IRF) on the linear sizes of females freshwater shrimp *M. nipponense* in the lower Dnistro

Результати досліджень показали, що в діапазоні лінійних розмірів самиць від 2,5 до 7,9 см і маси від 2,2 до 9,2 г КРП варіює від 359 ± 144 екз. до 1426 ± 338 екз. яєць в одній кладці (рис. 2).

Залежність кінцевої реалізованої плодючості (КРП) від маси креветки добре ($R^2 = 0,931$) передає лінійне рівняння:

$$\text{КРП} = 185,68 W + 51,143, \quad (2)$$

де КРП — кінцева реалізована плодючість, шт. яєць;

W — сира маса креветки, г.

Рис. 2. Залежність початкової реалізованої плодючості від маси самки прісноводної креветки *M. nipponense*

Fig. 2. Dependence of the initial realized fecundity on the mass of the female freshwater shrimp *M. nipponense*

Експериментально встановлено, що в процесі ембріогенезу з різних причин (захворювання, обростання епібіонтами, механічне пошкодження тощо) відбувається втрата частини яєць, при цьому виживання ембріонів залежить від розмірів самиць. Встановлено, що у міру зростання лінійних розмірів та маси самиць креветки зростає не тільки величина ПРП та КРП, а і відсоток виживання яєць, що розвиваються на плеоподах (табл. 3).

Таблиця 3. Виживання ембріонів у залежності від показників плодючості і лінійних розмірів самиць *M. nipponense*

Table 3. Embryo survival depending on fertility and linear sizes of *M. nipponense* females

Довжина, см / Length, mm	ПРП, екз. / IRF, specieens	КРП, екз. / FRF, specieens	Виживання, % / Survival, %
2,5	3441±942	359±144	15
2,9	3921±988	428±156	22
3,4	4410±1009	554±184	31
4,1	5910±1114	662±190	48
5,2	7852±1195	724±198	58
7,1	8795±1258	1320±254	72
7,9	10241±1323	1426±338	86

Це цілком відповідає спостереженням інших авторів, які відмічали, що втрата яєць у процесі ембріогенезу у самиць *M. nipponense* більшого розміру і маси у відсотковому відношенні набагато нижче, ніж у дрібних екземплярів [2, 5, 6, 11].

Експериментально встановлено, що як тривалість ембріогенезу *M. nipponense*, так і виживання ембріонів безпосередньо залежать від температури води. За температури води 18°C тривалість ембріогенезу була максимальною (42 доби), а виживання ембріонів — мінімальним — 86%. За вищих температур час розвитку ембріонів скорочувався, а виживання, навпаки, зростало (рис. 3). Мінімальна тривалість ембріогенезу відповідала температурі 31°C (20 діб), але максимальний вихід нормальних життєздатних ембріонів відмічався за температури 27°C. Представлені на рисунку 3 дані свідчать про те, що найвищий вихід ембріонів відповідав температурному діапазону 25–29°C, а максимальний відсоток виживання спостерігався при 27°C, яку ми і вважали за оптимальну для ембріогенезу креветки *M. nipponense*.

Рис. 3. Залежність виживання ембріонів та тривалість ембріогенезу креветки *M. nipponense* від температури води

Fig. 3. Dependence of embryo survival and duration of *M. nipponense* shrimp embryogenesis on water temperature

Креветка *M. nipponense* останніми роками освоює все нові території. Сьогодні вона в значній кількості зустрічається не тільки в прісноводному Кучурганському лимані, ставах і озерах пониззя Дністра, а і в солонуватоводному Дністровському лимані. У зв'язку з цим, цікавим є з'ясування можливості відтворення інтродуцента в акваторіях з різною солоністю. Експериментально було встановлено, що креветка *M. nipponense* дністровської популяції в зоні оптимальних температур (27–29°C) здатна досить успішно відтворюватися в діапазоні солоності від 0 до 9‰ (рис. 4).

Було встановлено, що при зростанні солоності від 0 до 5‰ тривалість ембріогенезу скорочується з 21 до 18 годин, а при подальшому зростанні солоності від 5 до 9‰ знов збільшується з 18 до 27 годин. Приблизно таку ж картину ми спостерігаємо при дослідженні виживання ембріонів.

Рис. 4 Залежність виживання і тривалості ембріогенезу прісноводної креветки *M. nipponense* від солоності при температурі води 27–29°C

Fig. 4. The dependence of the survival and duration of embryogenesis of freshwater shrimp *M. nipponense* depending on salinity at a water temperature of 27–29 °C

Вживання зростає при підвищенні солоності від 0 до 5‰ (з 95 до 98%) і знижується до 82% при подальшому рості солоності з 5 до 9‰. Таким чином, отримані експериментальні дані свідчать про те, що солоність 5‰ є оптимальною при відтворенні креветки *M. nipponense* дністровської популяції. За таких умов виживання ембріонів таке ж високе, як і в прісній воді, а тривалість ембріогенезу коротша.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Запліднені яйця у *M. nipponense* дністровської популяції відрізнялися за розмірами в різних природних акваторіях. Найбільші розміри ($0,66 \pm 0,035$ і $0,46 \pm 0,014$ мм) та середній об'єм ($0,073$ мм³) мали яйця креветок з Кучурганського лиману. Вони достовірно ($P \geq 0,95$) відрізнялися за цими показниками від креветок з Дністровського лиману, які мали найменші розміри ($0,58 \pm 0,022$ і $0,39 \pm 0,011$ мм) та середній об'єм ($0,046$ мм³).

В діапазоні лінійних розмірів самиць креветки *M. nipponense* дністровської популяції 2,5–7,9 см і маси 2,2–7,3 г початкова реалізована плодючість (ПРП) зростає від 3441 до 10241 яєць в одній кладці. Залежність ПРП від маси (W) креветки добре апроксимується ($R^2 = 0,967$) лінійним рівнянням: $ПРП = 1199,6 W + 1568,6$.

Кінцева реалізована плодючість (КРП) кількісно характеризує «робочу» плодючість. Її залежність від маси креветок добре передає ($R^2 = 0,931$) лінійне рівняння: $КРП = 185,68 W + 51,143$.

У міру зростання лінійних розмірів та маси самиць креветки *M. nipponense* зростає не тільки величина ПРП та КРП, а і відсоток виживання яєць, що розвиваються на плеоподах.

Тривалість ембріогенезу і виживання ембріонів креветки при зростанні температури води з 18 до 31°C скорочується з 42 до 20 діб. Оптимум припадає на температуру 27°C, яка забезпечує виживання 98% ембріонів.

Креветка *M. nipponense* може відтворюватися при солоності від 0 до 9‰, але

оптимальною є солоність 5‰, яка в зоні оптимальних температур забезпечує виживання 98% ембріонів за мінімальної тривалості ембріогенезу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Буруковский Р. Н. Методика биологического анализа некоторых тропических и субтропических креветок // Промысловые исследования морских беспозвоночных. Москва : ВНИРО, 1992. С. 77—84.
2. Кулеш В. Ф., Алехнович А. В. Выживаемость субтропической креветки *Macrobrachium nipponense* (De Haan) на ранних этапах онтогенеза // Проблемы рационального использования промысловых беспозвоночных : 3-я Всесоюз. конф. : тезисы докл. Калининград, 1982. С. 110—113.
3. Нартыш О. М. Молдавская ГРЭС: дела и люди (Исторический очерк). Днестровск: Типар, 1998. 120 с.
4. Пособие по изучению промысловых ракообразных дальневосточных морей России // Низяев С. А. и др. Южно-Сахалинск : СахНИРО, 2006. 114 с.
5. Статкевич С. В. Плодовитость гигантской креветки *Macrobrachium rosenbergii* в условиях аквакультуры // Рибне господарство України. 2009. № 5(64). С. 35—36.
6. Статкевич С. В., Шишова В. В. Влияние микробиологических параметров среды выращивания на продуктивность самок креветок *Macrobrachium rosenbergii* // Заповедники Крыма. Биоразнообразие и охрана природы в Азово-Черноморском регионе : VII Междунар. науч.-практ. конф., Симферополь, 24026 окт. 2013 г. : матер. Симферополь, 2013. С. 395—397.
7. Супрунович А. В., Макаров Ю. Н. Культивируемые беспозвоночные. Пищевые беспозвоночные: устрицы, гребешки, раки и креветки. Киев : Наукова думка, 1990. 261 с.
8. Туранов В. Ф. Разведение и выращивание пресноводной креветки *Macrobrachium rosenbergii* на Юге Украины // Рибне господарство України. 2003. № 3, 4 (26, 27). С. 47—48.
9. Хмелева Н. Н. Закономерности размножения ракообразных : монография. Минск : Наука и Техника, 1988. 208 с.
10. Экология пресноводных креветок : монография / Хмелева Н. Н. и др. Минск : Беларуская навука, 1997. 254 с.
11. Хмелева Н. Н., Гигиняк Ю. Г., Кулеш В. Ф. Пресноводные креветки. Москва, 1988. 128 с.
12. Cai Y., Shokita S. Report on a collection of freshwater shrimps (*Crustacea: Decapoda: Caridea*) from the Philippines, with descriptions of four new species // Raffles B Zool. 2006. Vol. 54. P. 245—270.
13. De Grave S., Ghane A. The establishment of the oriental river prawn, *Macrobrachium nipponense* (de Haan, 1849) in Anzali Lagoon, Iran // Aquat Invasions. 2006. Vol. 1. P. 204—208.
14. Feng J. B., Li J. L., Cheng X. Research progress on germplasm resource exploitation and protection of *Macrobrachium nipponense* // J Shanghai Fish Univ. 2008. Vol. 17. P. 371—376.
15. The complete mitochondrial genome of *Macrobrachium nipponense* / Ma K.Y. et al. // Gene. 2011. Vol. 487. P. 160—165.
16. Magalhães C., Walker I. Larval development and ecological distribution of Central Amazonian palaemonid shrimps (*Decapoda, Caridea*) // Crustaceana. 1988. Vol.

55. P. 279—292.
17. Mashiko K. Diversified egg and clutch sizes among local populations of the freshwater prawn *Macrobrachium nipponense* // Journal of Crustacean Biology. 1990. Vol. 10. P. 306—314.
18. Mirabdullaev I. M., Niyazov D. S. Alien decapods (*Crustacea*) in Uzbekistan // II International Symposium Invasion of alien species in Holarctic, Borok, Russia : book of abstracts. Borok, 2005. P. 113—114.
19. New M. B., Valenti W. C. Freshwater prawn culture: the farming of *Macrobrachium rosenbergii*. Oxford, England : Blackwell Science, 2000. 215 p.
20. Numachi K. Genetic analysis on the growth and survival of Pacific abalone. Tokyo, Japan : University of Tokyo, 1983. P. 1—47.
21. Rodriguez G. Fresh-water shrimps (*Crustacea, Decapoda, Natantia*) of the Orinoco Basin and the Venezuelan Guayana // Journal of Crustacean Biology. 1982. Vol. 2. P. 378—391.
22. The invasion of *Macrobrachium nipponense* (De Haan, 1849) (*Caridea: Palaemonidae*) into the Southern Iraqi marshes / Salman S. D. et al. // Aquat Invasions. 2006. Vol. 1. P. 109—115.
23. Shokita S. The distribution and speciation of the inland water shrimps and prawns from the Ryukyu Islands II // Bulletin of the College of Science, University of Ryukyus. 1979. Vol. 28. P. 193—278.
24. Yu H., Miyake S. Five species of the genus *Macrobrachium* (*Crustacea, Decapoda, Palaemonidae*) from Taiwan // Ohmu. 1972. Vol. 3. P. 45—55.

REFERENCES

1. Burukovskiy, R. N. (1992). Metodika biologicheskogo analiza nekotorykh tropicheskikh i subtropicheskikh krevetok. *Promyslovye issledovaniya morskikh bespozvonochnykh*. Moskva: VNIRO, 77-84.
2. Kulesh, V. F., & Alekhovich, A. V. (1982). Vyzhivaemost' subtropicheskoy krevetki *Macrobrachium nipponense* (De Haan) na rannikh etapakh ontogeneza. *Problemy ratsional'nogo ispol'zovaniya promyslovykh bespozvonochnykh: 3-a Vsesoyuz. konf.* Kaliningrad, 110-113.
3. Nartyshev, O. M. (1998). *Moldavskaya GRES: dela i lyudi (Istoricheskiy ocherk)*. Dnestrovsk: Tipar.
4. Nizyaev, S. A., Bukin, S. D., Klitin, A. K., Perveeva, E. R., Abramova, E. V., & Krutchenko, A. A. (2006). *Posobie po izucheniyu promyslovykh rakoobraznykh dal'nevostochnykh morey Rossii*. Yuzhno-Sakhalinsk: SakhNIRO.
5. Statkevich, S. V. (2009). Plodovitost' gigantskoy krevetki *Macrobrachium rosenbergii* v usloviyakh akvakul'tury. *Rybne hospodarstvo Ukrainy*, 5(64), 35-36.
6. Statkevich, S. V., & Shishova, V. V. (2013). Vliyanie mikrobiologicheskikh parametrov sredi vyrashchivaniya na produktivnost' samok krevetok *Macrobrachium rosenbergii*. *Zapovedniki Kryma. Bioraznoobrazie i okhrana prirody v Azovo-Chernomorskom regione: VII Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaya konferentsiya, Simferopol', 24-26 oktyabrya 2013 g.* Simferopol', 395-397.
7. Suprunovich, A. V., & Makarov, Yu. N. (1990). *Kultiviruemye bespozvonochnye. Pishchevye bespozvonochnye: ustritsy, grebeshki, raki i krevetki*. Kiev: Naukova dumka.

8. Turanov, V. F. (2003). Razvedenie i vyrashchivanie presnovodnoy krevetki *Macrobrachium rosenbergii* na Yuge Ukrainy. *Rybne hospodarstvo Ukrainy*, 3, 4 (26, 27), 47-48.
9. Khmeleva, N. N. (1998). *Zakonomernosti razmnzheniya rakoobraznykh*. Minsk: Nauka i Tekhnika.
10. Khmeleva, N. N., Kulesh, V. F., Alekhnovich, A. V., & Giginyak, Yu. G. (1997). *Ekologiya presnovodnykh krevetok*. Minsk: Belaruskaya navuka.
11. Khmeleva, N. N., Giginyak, Yu. G., & Kulesh, V. F. (1988). *Presnovodnye krevetki*. Moskva.
12. Cai, Y., & Shokita, S. (2006). Report on a collection of freshwater shrimps (*Crustacea: Decapoda: Caridea*) from the Philippines, with descriptions of four new species. *Raffles B Zool.*, 54, 245-270.
13. De Grave, S., & Ghane, A. (2006). The establishment of the oriental river prawn, *Macrobrachium nipponense* (de Haan, 1849) in Anzali Lagoon, Iran. *Aquat Invasions*, 1, 204-208.
14. Feng, J. B., Li, J. L., & Cheng, X. (2008). Research progress on germplasm resource exploitation and protection of *Macrobrachium nipponense*. *J Shanghai Fish Univ.*, 17, 371-376.
15. Ma, K. Y., Feng, J. B., Lin, J. Y., & Li, J. L. (2011). The complete mitochondrial genome of *Macrobrachium nipponense*. *Gene*, 487, 160-165.
16. Magalhães, C., & Walker, I. (1988). Larval development and ecological distribution of Central Amazonian palaemonid shrimps (*Decapoda, Caridea*). *Crustaceana*, 55, 279-292.
17. Mashiko, K. (1990). Diversified egg and clutch sizes among local populations of the freshwater prawn *Macrobrachium nipponense*. *Journal of Crustacean Biology*, 10, 306-314.
18. Mirabdullaev, I. M., & Niyazov, D. S. (2005). Alien decapods (*Crustacea*) in Uzbekistan. *Abstracts of the II International Symposium Invasion of alien species in Holarctic, Borok, Russia*. Borok, 113-114.
19. New, M. B., & Valenti, W. C. (2000). *Freshwater prawn culture: the farming of Macrobrachium rosenbergii*. Oxford, England: Blackwell Science.
20. Numachi, K. (1983). *Genetic analysis on the growth and survival of Pacific abalone*. Tokyo, Japan: University of Tokyo, 1-47.
21. Rodriguez, G. (1982). Fresh-water shrimps (*Crustacea, Decapoda, Natantia*) of the Orinoco Basin and the Venezuelan Guayana. *Journal of Crustacean Biology*, 2, 378-391.
22. Salman, S. D., Page, T. J., Naser, M. D., & Yasser, A. G. (2006). The invasion of *Macrobrachium nipponense* (De Haan, 1849) (*Caridea: Palaemonidae*) into the southern Iraqi marshes. *Aquat Invasions*, 1, 109-115.
23. Shokita, S. (1979). The distribution and speciation of the inland water shrimps and prawns from the Ryukyu Islands II. *Bulletin of the College of Science, University of Ryukyus*, 28, 193-278.
24. Yu, H., & Miyake, S. (1972). Five species of the genus *Macrobrachium* (*Crustacea, Decapoda, Palaemonidae*) from Taiwan. *Ohmu*, 3, 45-55.

CREATION OF FISH DATABASES FOR ELECTRONIC INTERACTIVE MAP: TABLES AND KEYS

O. Klyuchko, kelenaXX@ukr.net, Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
L. Buchatsky, irido1@bigmir.net, Institute of Fisheries NAAS of Ukraine, Kyiv
Yu. Rud, rudziknew@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS of Ukraine, Kyiv
O. Melezhyk, o_melezhyk@ukr.net, Open International University of Human Development "Ukraine", Kyiv

Purpose. Purpose of the work is to create fish databases using rainbow trout data and basing on new methods of theoretical analysis of fish data and their ordering in hierarchical structures with elements represented as relation tables linked through a system with primary keys with specific codes.

Methodology. The methods of object-oriented system analysis, ER-diagram design, and the methods of computer databases construction were used in process of present work.

Findings. Some well-known fish databases (seafood, aquaculture samples) were reviewed and some of their peculiarities are analyzed from the point of view of professional construction of relational databases within modern electronic information systems. The ways of the construction of such databases for domestic use in connection with the Internet were proposed. A number of algorithm stages for fish database design was described on the example of the information on rainbow trout and locations of its occurrence (catches) in Ukraine; ER-diagram, logical diagram of such database with its elements that can be presented in tables are suggested as well. Such tables should be unmistakably interconnected through the key system, and this procedure is described in detail in the article, as well as the creation of specific key codes, their formation and use to form links between the tables. The implementation of described works can be considered as one of the first stages in the development of interactive map with information of the fish species distribution (and locations of their catches) in Ukraine.

Originality. Such important modern project as an interactive map with the information on the distribution of fish species (and locations of their catches) based on modern information and computer technologies using biological databases has not been implemented yet in Ukraine. The work described in this article is the first step in creating of such a map that will facilitate further intensive introduction of modern information technologies and the development of domestic fishery industry.

Practical value. Rainbow trout is an important object for fishery industry of the country; and development of interactive electronic map with the information on the spread of the rainbow trout and other fish species (and places of their catches) in Ukraine is an important step for the transformation of fishery industry in our country to the contemporary level of the world technologies and for the provision of food safety. Using of contemporary computer technologies suggested in the this article, would make this branch more effective in Ukraine and in the whole world.

Keywords: fish, fishery economy, trout, databases, electronic information systems object-oriented system analysis, key, primary key.

СТВОРЕННЯ БАЗ ДАНИХ РИБ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ КАРТИ: ТАБЛИЦІ ТА КЛЮЧІ

О. М. Ключко, kelenaXX@ukr.net, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. М.В. Кавецького НАН України, м. Київ

Л. П. Бучацький, irido1@bigmir.net, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Ю. П. Рудь, rudziknew@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН України, Київ

О. В. Мележик, melezhyk@ukr.net, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

Мета. Виконати розробку баз даних риб, використовуючи дані про райдужну форель та базуючись на новітніх методах теоретичного аналізу даних про риб, а також їх упорядкуванні у ієрархічні структури, елементи яких можуть бути представлені у вигляді реляційних таблиць, які пов'язані через систему з первинними ключами зі специфічним кодуванням.

Методика. У процесі виконання робіт використано методи об'єктно-орієнтованого системного аналізу, проектування ER-діаграм, методи конструювання комп'ютерних баз даних.

Результати. Розглянуто деякі відомі у світі бази даних риб (зразків морепродуктів, об'єктів аквакультури) та проаналізовані окремі їх особливості з точки зору професійного конструювання реляційних баз даних у складі сучасних електронних інформаційних систем. Запропоновані шляхи конструювання таких баз даних для вітчизняного застосування у зв'язках із всесвітньою мережею Інтернет. Описано ряд етапів алгоритму конструювання баз даних про риб на прикладі інформації про райдужну форель та місця її існування (вилову) в Україні, наведено ER-діаграму та логічну схему такої бази даних, елементи якої можуть бути представлені у вигляді таблиць. Такі таблиці мають бути безпомилково пов'язані між собою через систему ключів і ця процедура детально розглянута у статті, як і створення специфічних кодів-ключів, їх формування і застосування для утворення зв'язків між таблицями. Виконання описаних робіт може розглядатись, як один з перших етапів при розробці інтерактивної мапи з інформацією про поширення видів риби (та локацій її вилову) в Україні.

Наукова новизна. В Україні ще не реалізовано такий сучасний важливий проект, як інтерактивна мапа з інформацією про поширення видів риби (та локацій її вилову) в країні на основі сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій із застосуванням біологічних баз даних. Виконувана розробка, описана у даній статті, є першим етапом створення такої мапи, що сприятиме подальшому інтенсивному впровадженню сучасних інформаційних технологій та розвитку вітчизняної рибної промисловості.

Практична значимість. Райдужна форель є цінним об'єктом для рибного господарства країни; розробка інтерактивної електронної мапи з інформацією про поширення вказаного та інших видів риби (і локацій її вилову) в Україні є важливим кроком для переведення рибного господарства нашої країни на сучасний рівень світових технологій та для забезпечення продовольчої безпеки. Застосування інформаційних комп'ютерних технологій, розглянутих у даній роботі, зробить рибну галузь в Україні та світі більш ефективною.

Ключові слова: риба, рибне господарство, форель, бази даних, електронно-інформаційні системи, об'єктно-орієнтований системний аналіз, ключі, первинний ключ.

СОЗДАНИЕ БАЗ ДАННЫХ РЫБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ: ТАБЛИЦЫ И КЛЮЧИ

Е. М. Ключко, kelenaXX@ukr.net, Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. М.В. Кавецкого НАН Украины, г. Киев

Л. П. Буцацкий, irido1@bigmir.net, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

Ю. П. Рудь, rudziknew@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

О. В. Мележик, o_melezhyk@ukr.net, Открытый международный университет развития человека «Украина», г. Киев

Цель. Выполнить разработку баз данных рыб, используя данные о радужной форели и базируясь на новейших методах теоретического анализа данных о рыбах, а также их упорядочении в иерархические структуры, элементы которых могут быть представлены в виде реляционных таблиц, которые связаны посредством системы с первичными ключами со специфическим кодированием.

Методика. В процессе выполнения работы использованы методы объектно-ориентированного системного анализа, проектирование ER-диаграмм, методы конструирования компьютерных баз данных.

Результаты. Рассмотрены некоторые известные в мире базы данных рыб (образцов морепродуктов, объектов аквакультуры) и проанализированы некоторые их особенности с точки зрения профессионального конструирования реляционных баз данных в составе современных электронных информационных систем. Предложены пути конструирования таких баз данных для отечественного использования в связях с всемирной сетью Интернет. Описаны некоторые этапы алгоритма конструирования баз данных о рыбах на примере информации о радужной форели и мест ее обитания (вылова) в Украине, приведены ER-диаграмма и логическая схема такой базы данных, элементы которой могут быть представлены в виде таблиц. Такие таблицы должны быть безошибочно связаны между собой посредством системы ключей, и эта процедура детально рассмотрена в статье, так же, как и создание специфических кодов-ключей, их формирование и использование для образования связей между таблицами. Выполнение описанных работ может рассматриваться как один из первых этапов при разработке интерактивной карты с информацией о распространении видов рыбы (и мест ее вылова) в Украине.

Научная новизна. В Украине еще не реализован такой важный современный проект, как интерактивная карта с информацией о распространении видов рыбы (и мест ее вылова) в стране на основе современных информационно-компьютерных технологий с использованием биологических баз данных. Исполняемая разработка, описанная в данной статье, является первым этапом создания такой карты, что будет способствовать дальнейшему интенсивному внедрению современных информационных технологий для развития отечественной рыбной промышленности.

Практическое значение. Радужная форель является ценным объектом для рыбного хозяйства страны; разработка интерактивной электронной карты с информацией о распространении радужной форели и других видов рыбы (и мест ее вылова) в Украине является важным шагом для перевода рыбного хозяйства нашей страны на современный уровень мировых технологий и для обеспечения продовольственной безопасности. Использование информационных компьютерных технологий, рассмотренных в данной работе, сделает рыбную отрасль в Украине и мире более эффективной.

Ключевые слова: рыба, рыбное хозяйство, форель, базы данных, электронно-информационные системы, объектно-ориентированный системный анализ, ключ, первичный ключ.

PROBLEM STATEMENT AND ANALYSIS OF THE LAST STUDIES AND PUBLICATIONS

During the last decades the people become to understand that the increasing number of population of the Earth needs more and more food products, including fish products [1]. The aquaculture is the most rapidly growing product sector of the World – today it supply approximately one half of all consumed fish, or 17 kg per one person [1]. The novel methods of biotechnology provide the great impulse to the development of aquaculture, as well as contemporary information computer technologies (ICT) [2, 3, 24]. At the same time, the last world experience in studying and controlling of the situation with biodiversity proves the necessity of intensive use of ICT in biological industries. Thus, at the beginning of the rapid expansion of network Internet technologies in biology, on June 2000, the First International Conference in programming was held, which was devoted to the problems of creation of information systems (IS) and databases (databases) in biology [24]. The conference was titled "Very Large DataBase 2000 Conference" (VLDB) and featured a wide range of top-level specialists: biologists, ICT engineers, administrative staff from leading countries around the world, and others. A number of topical issues of the development of IS from the database in biology were observed, a number of generalizations were done. The decisions were made that determined development of works in this field; they are relevant today still. Of the final important provisions adopted at this conference, let us list only two: i) computer science / information technology (CN / IT) professionals play a fundamental role in the creation of technological infrastructure, which should also include sciences about environment and its changes; ii) the next generation of CN / IT software must take into account complex, hierarchically organized processes in ecosystems and the environment to address environmental issues.

So, with ICT development appears the possibility of development of new tools, new methods of science-intensive fishery economy organization, its control, the account of biological organisms, and etc. In these frameworks the development of databases (DB) of fishes, other aquaculture organisms with further DB links to electronic information systems (ICs) become really necessary. In previous publications the authors have already written about the necessity of such ICs with DB creation in Ukraine [1, 24] for fishes [2, 3], other living organisms [4, 5, 24]. Few foreign IS with DB were observed in present publication [6-8] that may be taken as prototypes for DB creating by the authors. Materials about the development of IS with DB of living organisms (including fishes) were described before by different authors [2-24], and we suppose that biological DBs and ISs created by citizens of each country who knows local fauna and the most interested in such ISs have the greatest value [3, 24]. That is why for our work we used, first of all, the data of fish research of contemporary scientists in Ukraine [1-3, 25-41, 52]. Our previous publications demonstrate our experience in biological DBs construction [2-5, 42-51] as well as the achievements of other professionals in DBs development [55-60].

Foreign fish databases construction experience. Below we would like to suggest information about some fish databases created in different countries of the World that may be seen as prototypes to our developed DB.

1) *A Map and Database of Westslope Cutthroat Trout Hybridization Throughout Idaho and Montana Streams (USA).* The authors of this publication [6] had written that

among the many threats posed by invasions of nonnative species is introgressive hybridization, which can lead to the genomic extinction of native taxa. This phenomenon is regarded as common and perhaps inevitable among native cutthroat trout and introduced rainbow trout in western North America, despite that these taxa have naturally co-occurred for thousands of years in some locations. The scientists have conducted a synthetic analysis of 13,315 genotyped fish from 558 sites in Idaho and Montana by building logistic regression models using data from geospatial stream databases and from 12 published studies of hybridization to assess whether environmental covariates could explain levels of introgression between westslope cutthroat trout and rainbow trout. A consensus model performed well (AUC, 0.78–0.86; classification success, 72–82%; 10-fold cross validation, 70–82%) and predicted that rainbow trout introgression was positively associated with warmer water temperatures, larger streams, proximity to warmer habitats, to recent sources of rainbow trout propagates, and presence within the historical range of rainbow trout. The databases for the 558 sites, as well as user-friendly digital maps and ArcGIS shapefiles showing hybridization probabilities for three thresholds (1%, 10%, and 20%) associated with six climate change and rainbow trout invasion scenarios are available at the project website to assist managers in conservation planning [6].

2) *The CRCT GIS-based database (USA)*. In other publication [7] was written that Colorado River Cutthroat Trout (CRCT) conservation team identified a need to further develop a long-term approach to updating and maintaining the CRCT GIS-based database that was created using the Inland Cutthroat Trout Protocol (ICP). The University of Wyoming Geographic Information Science Center was contracted to develop a multi-state, web-based database and a web-based application for viewing and editing the data to aid in conservation activities. Previously, Colorado, Utah and Wyoming all used separate, desktop databases that could not be shared with partnering agencies nor updated for all users simultaneously. The database and application is for CRCT as well as other cutthroat species (Greenback cutthroat trout and Rio Grande cutthroat trout).

The developed web application is composed of a data viewer and a password protected editor. Base layers include: topographic raster, aerial images and NHD streams and water bodies. Cutthroat spatial data includes: historic distribution, barriers, current distribution, and conservation populations. The viewer includes a query tool to view database attributes associated with barriers, current distribution and conservation population. The editor has stream reach editing tools that allow addition, deletion and adjusting of stream reaches and barriers and an online form to add, delete and modify attributes. Any edits conducted through the web tool will not be permanent until reviewed and validated by the database manager and Geographical Management Unit leaders on an annual basis [7].

3) *The database “Fischdatenbank” (Austria, Germany)*. This fish database [8] has been created since the beginning of the “EU Water Framework Directive” on 2000. The information about the fish contained there was collected since 1980s. All fish data collected in this database under the monitoring rules required by EU-WRR1 have to be managed, estimated and evaluated. The original database ATFI-BASE was adapted to the changed requirements and developed further to the Fischdatenbank Austria (FDA). The term FDA now contains several specialized scientific databases and comprehensive software framework. Results from this database were subsequently available in the

Water Information System Austria (WISA), and they were incorporated in the National Water Management Plan (NGP). All data collected within the framework of the program “Fish on running waters” (GZÜV (Gewässerzustandsüberwachungsverordnung) for water status monitoring regulation, implementation of the Water Framework Directive) in Austria are stored and evaluated in the FDA also. The total number of the data (GZÜV data and projects) includes 6755 surveys at more than 5000 water objects throughout Germany until October 2017 [8].

DEFINING OF PARTS OF THE PROBLEM THAT WERE NOT SOLVED BEFORE. THE PURPOSE OF THE WORK

This publication is a continuation of previous ones about fish databases (DBs) construction [2, 3] with demonstration of the next steps of construction algorithm. In our previous works there were some first parts of this problem; there are the next ones that were not solved before/ So, there were not revealed some details about the tables formation from the objects on ER-diagrams, as well as some important details of keys formation and usage. So, there we would like to demonstrate some engineering and programming tools that provide through the keys one of the main principles of DBs construction: the principle of data integrity, that provides the reliability and prevents data losses during DB functioning. This principle is important indeed because it prevents losses of great volumes of information from different “sub-elements” of DB, or different DBs sectors. Sure, the method that will be demonstrated below is usable for the construction of DBs of living organisms (fishes) in Ukraine, and these DBs are network based and can be linked with ISs that visualized DB in the Internet. As our “distant goal” we would like to see further development of interactive electronic map with the information about the spreading of rainbow trout and/or other fish species (together with linked necessary information about the each fish specie) in Ukraine. Such electronic map has to be based on DBs, construction of which we would like to present in this article. Such works fulfillment we see as important step for the transformation of fishery industry in our country to the contemporary level of world technologies and for providing of food safety.

Purpose of this work was to create fish database using the data about rainbow trout, basing on the new methods of theoretical analysis of the data about fishes and their ordering in hierarchical structures with elements represented as relation tables linked through the system of codes-keys with primary keys with specific codes. Detailed information about such keys role, their formation and functioning will be given below.

MATERIALS AND METHODS

The methods of object-oriented system analysis for databases application, ER-diagram design, the methods of computer databases construction including the methods of keys formation and functioning were used in process of the work fulfillment.

RESULTS OF THE STUDIES AND THEIR DISCUSSION

Designing a relational database with fish information is based on the algorithm we described earlier for different species of living organisms [2-4, 24]. Let us describe briefly the first stages of this algorithm (since each task is impossible to do without its realization), and then let's move on to the extended presentation of the essence of this problem solution within this article. First, for the species of rainbow trout (Fig. 1), we

create the object model shown at Fig. 2. Logical model of DB for this task is demonstrated at Fig. 3.

Fig. 1. Hierarchic classification of *Oncorhynchus mykiss* (Walbaum, 1792) [3].

Fig. 2. Fragment of ER-diagram «Fishes and Basins of Their Inhabitation» on example of Rainbow Trout (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum, 1792): 2.a. Fragment of ER-diagram (explanations see in text), 2.b. Symbolic denotation of objects, relations and attributes at the scheme [2, 3].

Fig. 3. Logical model of DB with information about the fishes and locations of their inhabitation (catching).

The database we are currently developing is planning to be laid in base of creation of an interactive map of rainbow trout spread across Ukraine (and later for other fishes species). At the beginning two main objects logically have to be chosen: "Fishes' species" and "Basin" (explanations to this stage of algorithm see in [2, 3]). Some attributes to the object "Fishes' species" we left the same as we select them earlier in [3], but some important attributes we added later. For the second object "Basin", it would be logical to choose the following attributes (for natural reservoirs): "Name" (if any), "Dimentions", "Geographical latitude", "Geographical longitude", "Average salinity of water", and etc. (see below). Therefore, the objects in the proposed logical model are characterized by the attributes:

Object "Fish"

Attributes:

Primary key

The name of the fish (in Latin, Ukrainian and Russian).

Class

Subclass

Series

Family

Genus

Species

Area of inhabitation.

Biotopes of inhabitation.

Objects of nutrition.

Data of fishing.

Code of gene sequence (if it is known)

References to literary sources.

.....

Comments.

Other.

Object "Basin"

Attributes:

Primary key

The name of the Basin (in English and in languages of local population).

Dimentions

Geographical latitude

Geographical longitude

Average salinity of water

References to literary sources.

.....

Comments.

Other.

Fig. 4. Objects and relative tables

In process of further DB development the Object 1 “Fishes’ species” and Object 2 “Basin” are transformed in tables 1, 2. Attributes of these objects become the columns of these tables.

Using this database in working mode, a biological scientist can find out easily what species of fishes live in a particular basin. Using such databases, such specialist can easily perform all those operations with the data that were impossible for him previously: sorting, searching for a particular record, data filtering, data outputting in the desired format, and etc. These opportunities are very important in day-to-day professional work because the person who works in the field almost every day or adds to the previous material new information (data input into the table), or lists the species alphabetically (sorting of the data), or lists all species from one genus (filtration procedure), or perform other operations like these. ones.

ER-diagram analysis and brief description. ER-diagram is an abstraction that has to represent in whole all *objects* from the database with all their *relations* and with all characteristics of the objects that are called “*attributes*”. Those characteristics are important from the point of view of DB construction. For such DB are too important the data (attributes) as gene sequences, specie, family, genus and other similar. For the representation of these 3 main notions of *ER*-diagram the special symbols are used that we described in details before [2, 3]. Such diagram helps to analyze better all entities

that we would like to include into the database and to represent them in their entirety. Without such analysis the construction of DB of a high quality is not possible.

Development of the database with information about fishes' on the base of "ER-diagram". The scheme "ER-diagram" we need for further development of the database with information about fishes on its basis. Let's study the representation of such database in the form of tables 1, 2. It is easy to see that [3]:

1. Objects of "ER-diagram" were transformed into separate tables;
2. Attributes were transformed into the fields of these tables (in our case - in the columns);
3. The relations between the objects were transformed into the relations between separate tables.

At the same time, the power of relations reflects the number of tables that need to be linked with the object; and the developer decides what number have to be. If the power of relation is 1, then the link is formed with one table, if "M" – with "M" numbers of tables [2, 3].

Objects in our model can be characterized by the number of attributes (see above, also the Tables 1, 2).

"Keys" are the tools for the ensuring of the data integrity. In order not to lose the information that is ordered into the biological DB, the technique of "keys" is used [2].

"Keys" are necessary "tools" for the relations establishing between the objects [2]; they guarantee that the information from the database is accessible and it always may be obtained from there. Indeed, there is no sense to write thousands of data records into a structure if these data can not be used, if they are not accessible! Consequently, the "keys" are the elements of each table; they are related to each other through programmed links. By obtaining the information from one table, it is possible to obtain the information from another table associated with it through a link that unites their keys. Usually, as a "key" serves a certain code (numbers or other symbols), and the links between such codes from individual tables in many modern software environments, even a young developer can make by themselves [2].

As one could see from Fig. 5 the "keys" serve to make connections between fields of the tables that logically have to be linked. For example, the user would like to find from the database where he can find the fish specie *Oncorhynchus mykiss*. Programmer knows that it lives in trout farm «Stara Vaga». So, in program the key "181*" from the table "Fishes' species" have to be linked with the key "335" from the table "Basin". In other case, the user would like to find where he can catch the fish *Cyprinus carpio* L. In the same way, in program the key "344*" from the table "Fishes' species" have to be linked with the key "864" (river Sula) from the table "Basin". Keys on Fig. 5 may be coded also in other symbols, their number may differs also. Such key usage permits to realize the effect of "data integrity" in the database. In table field "Photo" we gave hyperlinks to the real photos of mentioned fish species in Internet, for *Oncorhynchus mykiss* the length of this hyperlink have been cut because of limited table dimensions.

Table "Fishes' species"

Primary key	Name of species (Latin)	Name of species (national)	Photo	Area of inhabitation	Biotopes of inhabitation	Objects of nutrition	Data of fishing	Comments	Others
181*	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Форель райдужна	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Truite_arc-en-ciel.jpg	Western Pacific: the Kamchatka Peninsula, and has been recorded from the Commander Islands East of Kamchatka, sporadically in the Sea of Okhotsk, as far south as the mouth of the Amur River, also in upper streams of rivers Prut, Cheremosh, Seret, Stryi, Dniester, its tributaries Svich, Limnitsa, in rivers Tisa, Teresva, Terebl, Ritz, in mountain rivers of Crimea	Coldwater specie. Optimal water temperature is 14–20 °C, the O ₂ content is 7–8 mg/l. Specie prefers clean, clear ponds and mountain rivers	Predator. Minnow, frogs, little birds, mollusks, larvae, insects, etc.	June-November		
263*	<i>Salmo trutta</i> L.	Лосось струмковий (форель струмкова)	https://ih1.redbubble.net/image.65006165.3846/flat,800x800,070,f.u2.jpg	in upper streams of rivers Prut, Cheremosh, Seret, Stryi, Dniester, its tributaries Svich, Limnitsa, in rivers Tisa, Teresva, Terebl, Ritz, in mountain rivers of Crimea	Mountainous parts of rivers, streams. Specie reaches altitudes 800-1000 m a. s.l. Prefers areas with flow 1–3 m/sec with water temperature not higher than 16 °, O ₂ saturation more than 10 mg/l. Does not like water contamination with substances that absorb O ₂ (oil, petroleum products, phenols, resins, dyes, alkalis, acids, municipal sewage, mineral fertilizers, poison chemicals)	Mostly insects that fly over water surfaces as well as leafhoppers, spiders, dragonflies, other insects that get into the water, mollusks, fish, frogs, etc.	June-November		

Continuation of the Table "Fishes' species"

Primary key	Name of species (Latin)	Name of species (national)	Photo	Area of inhabitation	Biotopes of inhabitation	Objects of nutrition	Data of fishing	Comments	Others
344*	<i>Cyprinus carpio</i> L.	Короп звичайний	http://www.2.dnr.cornell.edu/cek7/nyfish/Cyprinidae/common_carp.jpg	Specie-cosmopolitan that has been introduced to many regions of the world and has successfully naturalized in European basins	water pH=7-8. pH 5.5 and below inhibits its life, metabolic disorders are developed in fish organism. pH increasing over 9 is detrimental. Optimal water temperature is + 20-30° C, O ₂ content is not less than 4-5 mg/l (optimal O ₂ values are 6-8 mg/l). O ₂ concentration reduction to 2 mg/l and below is dangerous, and to 0,5 mg/l is detrimental	At early stages of development it feeds on zooplankton. At early days the fry consumed small forms (moins), later consumed <i>Daphne</i> , <i>Ceriodaph</i> , <i>Cyclops</i> , etc) Later at the first life year consumed zoobenthos, and at older age groups in the diet predominate larvae of chironomids, oligochaetes, mollusks). During food deficiency consumes larger aquatic organisms (large forms of zooplankton, macrophytes, and detritus). Specie is well adapted to eating compound feed and cereal grains			
...									

5, a

Table "Basin"

Primary key	The name of the Basin	Dimensions	Region of Ukraine	Geographical latitude	Geographical longitude	Average salinity of water	pH of Water	...	Comments	Others
341	Shipit river	Length 20 km, basin square 127 km ²	Sources of r.Shipit – several mountain streams that originate at the Northeastern regions of mountain massif Polonina Rivna and Southern slopes of Hostry Mountain. River flows mainly to the South and Southwest. It flows through the vil. Turia Polyana. From the village to the confluence of r.Uzh the river is called Turya	48°44'03" North latitude	22°29'49" East longitude	n/d	n/d			
864	River Sula	River length 363 km, basin square 19 600 km ² .	Sula source is on the Southwestern slopes of the Middle Russian Highlands, then flows through Dnieper lowland. It flows first to the West, then gradually turns to the Southwest and South. In the interval from the estuary of Lochwitz to the town Zavodskoye the river flows to the East, after which it turns sharply to the Southwest; in the lowest part it flows to the South. It flows into r. Dnieper (Kremenchuk reservoir)	River source: 50°50'49" North latitude, estuary: 49°33'19" North latitude	River source: 34°28'59" East longitude, estuary: 32°45'16" East longitude	Water mineralization changes throughout the year: spring flood - 659 mg/dm ³ ; summer-autumn limit - 812 mg/dm ³ ; winter limit - 871 mg/dm ³ .	Annual average value 7.51			
121	Fisheries of Kolochava	n/d	Transcarpathian region, Mizhhirsky district, vil. Kolochava, Voloshina str.	48°27'27.96" North latitude	23°43'11.68" East longitude	n/d	n/d			
335	Trout farm «Stara Vaga»	n/d	Transcarpathian region, Irshava district, vil. Bronka, tract "Bronnitska River"	48° 24' 21.04" North latitude	23° 19' 19.77" East longitude	n/d	n/d			
::										

5, b

Fig. 5. Tables of developed database with information about fishes [2]. (5, a), (5, b) - the attributes became the fields of the tables. "Primary keys" are the tools for the formation of the relationships between the tables. Cyrillic words are in tables for domestic use in Ukraine. n/d – means “no data” for today (but these data may be added in future)

In addition, it is easy to follow in the diagram whether all entities are linked together. In this case it makes possible to access all records, so, the information from the database becomes fully available for everybody (the condition of the data integrity ensuring). Alternatively, if this condition is violated, the user will not be able to obtain the information from those parts of the database that are not connected by such links. However, using the methods described above, the programmer can easily recover connections based on the ER-diagram and linking the objects using keys. In the application of the abovedescribed methods, there are no differences between biological and technical databases and anybody for such purpose can study this technique using appropriate manual.

CONCLUSIONS AND PROSPECTS OF FURTHER DEVELOPMENT

In present article according to the purpose of the work was demonstrated that the methods for relation electronic databases construction, that were developed earlier for physics, engineering, etc. can be applied in biological branches. The following set of methods was used to develop databases with biological content: the methods of object-oriented system analysis, ER-diagram design, and the methods of computer databases construction were used in process of present work fulfillment.

At the beginning of present article, a number of examples of electronic fish databases that were developed in different countries of the world were given. On the basis of theoretical generalizations an ER-diagram for two types of objects was developed: fish species (on the example of rainbow trout) and basin of its inhabitance. At the end of the publication it was shown how relational tables of biological databases were formed, and how they are interconnected with the “keys”.

Using above described approach of the biological DB construction it is possible to develop interactive map with fish species of Ukraine in future. The authors tried to demonstrate the first results of their works in this direction on the example of rainbow trout. This specie is an important object for fishery industry of the state; and development of interactive electronic map with the information about the spreading of rainbow trout and other fish species (and places of catching) in Ukraine is an important step for the transformation of fishery industry in our country to the contemporary level of the world technologies and for the providing of food safety. Using of contemporary computer technologies suggested in present article, would make this branch more effective in Ukraine and in the whole world.

ЛІТЕРАТУРА

1. Сучасні методи біотехнології в рибництві / Бучацький Л. П. та ін. Київ : ДІА, 2018. 121 с.
2. Klyuchko O. M., Buchatsky L. P., Melezhyk O. V. Biological databases construction using object-oriented system analysis // *Biotechnol. Acta*. 2019. Vol. 12, № 3. P. 5—22.
3. Klyuchko O. M., Buchatsky L. P., Melezhyk O. V. Fish information databases construction: data preparation and object-oriented system analysis. // *Fishery Science of Ukraine*. 2019. Vol. 49, № 3. P. 32—47.
4. Klyuchko O. M., Klyuchko Z. F. Electronic databases for Arthropods: methods and applications // *Biotechnol. Acta*. 2018. Vol. 11, № 4. P. 28—49. <https://doi.org/10.15407/biotech11.04.028>.

5. Klyuchko O. M., Klyuchko Z. F. Electronic information systems for monitoring of populations and migrations of insects. // *Biotechnol. Acta*. 2018. Vol. 11, №5. P. 5–25. <https://doi.org/10.15407/biotech11.05.005>
6. A Map and Database of Westslope Cutthroat Trout Hybridization Throughout Idaho and Montana Streams / Young M. et. al. URL : https://www.fs.fed.us/rm/boise/AWAE/projects/GIMP/downloads/17_HybridizationPoster_IDAFS.pdf (дата звернення: 06.10.19).
7. Inland Cutthroat Trout Protocol (ICP) Web-mapping Application: Native Cutthroat Trout Data Compilation and Internet Database Development. URL : <https://www.sciencebase.gov/catalog/item/56e9a0b0e4b0f59b85d819e3> (дата звернення: 06.10.19).
8. Fischdatenbank. URL : <http://www.baw.at/wasser-fische-IGF/Fischdatenbank.html> (дата звернення: 25.08.19).
9. Using eDNA to biomonitor the fish community in a tropical oligotrophic lake / Valdez-Moreno M. et al. // *PloS One*. 2019. Vol. 14, № 4. P. e0215505.
10. Differentiation and Authentication of Fishes at Species Level Through Analysis of Fish Skin by MALDI TOF MS / Bi H. et al. // *Rapid Commun. Mass. Spectrom.* 2019. Vol. 33, № 16. P. 1336—1343.
11. User Reference for Fisheries Improvement Projects Database (FIP-DB) and Query Viewer. URL : <https://ru.scribd.com/document/385739269/Readme-File-for-FIP-DB#download> (дата звернення: 06.10.19).
12. Froese R., Pauli D. FishBase 2000: Concepts, designs and data sources. Los Banos, Philippines : ICLARM, 2000. 344 p.
13. Moreau J., Costa-Pierce B. Introduction and present status of exotic carp in Africa // *Aquacult. Res.* 1997. Vol. 28. P. 717—732.
14. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to food security and nutrition for all. URL: <http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf> (дата звернення: 06.10.19).
15. Effects of Global Climate Change on Marine and Estuarine Fishes and Fisheries / Roessig J. M. et al. // *Fish Biology and Fisheries*. 2004. Vol. 14. P. 251—275.
16. A Global Information System on Fishes. URL : <https://www.fishbase.se/home.htm> (дата звернення: 06.10.19).
17. A database of fish biotransformation rates for organic chemicals / Arnot J. A. et al. // *Environmental Toxicology and Chemistry*. 2008. Vol. 27, № 11. P. 2263—2270. URL : <https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1897/08-058.1>. doi: 10.1897/08-058.1.
18. A global database on freshwater fish species occurrence in drainage basins / Tedesco P. A. et al. // *Sci. Data*. 2017. Vol. 4. P. 170141. doi: 10.1038/sdata.2017.141.
19. Van der Laan R., Eschmeyer W. N., Fricke R. Family-group names of Recent fishes // *Zootaxa Monograph*. 2014. Vol. 3882, № 1. P. 1—230. doi:10.11646/zootaxa.3882.1.1.
20. Fricke R., Eschmeyer W. N., R. van der Laan. Eschmeyer's catalog of fishes: genera, species, references. URL : <http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp> (дата звернення: 06.10.19).
21. Zeldis D., Prescott S. Fish disease diagnosis program – Problems and some solutions // *Aquacultural Engineering*. 2000. Vol. 23, № 1–3. P. 3—11.

22. Frimpong E. A., Paul L. Welcome to the FishTraits Database. URL : <http://www.fishtraits.info> (дата звернення: 06.10.19).
23. SalmonDB: a bioinformatics resource for *Salmo salar* and *Oncorhynchus mykiss* / Di Génova A. D. et al. // Database (Oxford). 2011. bar050. doi: 10.1093/database/bar050. URL : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3225076> (дата звернення: 06.10.19).
24. Ключко О. М. Інформаційно-комп'ютерні технології у біології та медицині Київ : НАУ-друк, 2008. 252 с.
25. Майстренко М. І., Рудь Ю. П., Бучацький Л. П. Накопичення IPNV на культурах клітин риб // Біологія тварин. 2014. Т. 16, № 4. С. 93—99.
26. Матвиєнко Н. Н., Бучацький Л. П. Застосування імуномодуючих препаратів у рибництві // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : VII Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф. : матер. Херсон, 2014. С. 33—35.
27. Нові хазяї вірусу герпеса коропа третього типу (CyHV-3) / Гаврилова І. П. та ін. // Наукові записки Тернопільського пед. університету. 2014. № 1 (58). С. 16—20. (Серія : біологія).
28. Майстренко М. І., Бучацький Л. П. Біологія герпесвірусів риб // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. 2014. Вип. 3 (123). С. 19—35.
29. Експериментальне інфікування довгопалого рака (*Pontastacus leptodactylus*) вірусом інфекційного панкреатичного некрозу / Рудь Ю. П. та ін. // Вісник проблем біології і медицини. 2014. Вип. 4, т. 1(113). С. 70—74.
30. Matvienko N., Rud Yu., Buchatsky L. Replication of Infectious Pancreatic Necrosis Virus in different cell lines and organism of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) fingerlings // Arch. Pol. Fish. 2014. Vol. 22. P. 127—133.
31. Матвиєнко Н. Н., Бучацький Л. П. Изучение репродукции вируса геморрагической септицемии форели // Вісник проблем біології і медицини. 2014. Вип. 2, т. 3. С. 118—121.
32. Матвиєнко Н. М., Бучацький Л. П., Дерябін О. М. Застосування зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції для виявлення та ідентифікації вірусу інфекційного панкреатичного некрозу райдужної форелі (*Oncorhynchus mykiss*) // Мікробіологія і біотехнологія. 2013. № 4 (24). С. 46—54.
33. Characteristics of spring viraemia of carp virus strains isolated in different regions of Ukraine / Matvienko N. et al. // Zoology and Ecology. 2013. Vol. 23, iss. 3. P. 198—202.
34. Matvienko N., Rud Yu., Buchatsky L. Replication of infectious pancreatic necrosis virus in different cell lines and organism of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) fingerlings // Archives of Polish Fisheries. 2014. Vol. 22. P. 127—133.
35. Рудь Ю. П., Майстренко М. І., Бучацький Л. П. Ампліфікація та аналіз нуклеотидної послідовності генів VP2 ТА NS IPNV, виділеного в Західній Україні // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. 2013. Вип. 4, № 118. С. 34—40.
36. Штам герпесвірусу кої ІМВ В-4 для отримання вакцини проти вірусу герпесу кої : пат. № 79945 Україна. Опубл. 13.05.2013, Бюл. № 8.
37. Rud Yu., Maistrenko M., Buchatsky L. Isolation of IPNV from wild-life rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) in Western Ukraine // Biology. 2013. Vol. 3, № 65. P. 63—65.

38. Ідентифікація вірусу CyHV-3 методами електронної мікроскопії та полімеразної ланцюгової реакції / Майстренко М. І. та ін. // Доповіді Національної академії наук України. 2013. № 4. С. 139—143.
39. Results of surveillance studies of infectious fish diseases in freshwater aquaculture of Ukraine / Matvienko N. M. et al. // Agricultural science and practice. 2015. Vol. 2, № 2. P. 32—38.
40. Rud Yu. P., Buchatsky L. P. Detection of infectious pancreatic necrosis virus in the western Ukraine // Virologica sinica. 2015. Vol. 30, № 2. P. 1—4.
41. Movchan Yu. V. Fishes of Ukraine (taxonomy, nomenclature, remarks) // Collection of works of Zoological Museum. 2009. Vol. 40. P. 47—87.
42. Duan Y., Fu Z., Li D. Toward Developing and Using Web-based Tele-Diagnosis in Aquaculture // Expert System ith Applications. 2003. Vol. 25, № 2. P. 247—254.
43. Спосіб проведення моніторингу впливу хімічних речовин на біоорганізми у кількох інтервалах часу : патент 134575 Україна. № u201812443 ; заявл. 14.12.2018 ; опубл. : 27.05.2019, Бюл. № 10.
44. Klyuchko O. M. Application of artificial neural networks method in biotechnology // Biotechnol. Acta. 2017. Vol. 10, № 4. P. 5—13. <https://doi.org/10.15407/biotech10.04.005>.
45. Klyuchko O. M. Cluster analysis in biotechnology // Biotechnol. Acta. 2017. Vol. 10, № 5. P. 5—18. <https://doi.org/10.15407/biotech10.05.005>.
46. Klyuchko O. M., Onopchuk Yu. M. Some trends in mathematical modeling for biotechnology // Biotechnol. Acta. 2018. Vol. 11, № 1. P. 39—57. <https://doi.org/10.15407/biotech11.01.039>.
47. Klyuchko O. M. Electronic information systems in biotechnology // Biotechnol. Acta. 2018. Vol. 11, № 2. P. 5—22. <https://doi.org/10.15407/biotech11.02.005>.
48. Klyuchko O. M. Information computer technologies for biotechnology: electronic medical information systems // Biotechnol. Acta. 2018. Vol. 11, № 3. P. 5—26. <https://doi.org/10.15407/biotech11.03.005>.
49. Klyuchko O. M. Expert systems for biology and medicine // Biotechnol. Acta. 2018. Vol. 11, № 6. P. 5—28. <https://doi.org/10.15407/biotech11.06.005>.
50. Klyuchko O. M. Biotechnical information systems for monitoring of chemicals in environment: biophysical approach // Biotechnol. Acta. 2019. Vol. 12, № 1. P. 5—28.
51. Klyuchko O. M. On the mathematical methods in biology and medicine // Biotechnol. Acta. 2017. Vol. 10, № 3. P. 31—40. <https://doi.org/10.15407/biotech10.03.031>.
52. Sachnyuk G. V., Melezhyk O. V. Current state of water resources protection against pollution // Youth: education, science, spirituality: XV Ukr. Sci. conf. : theses of reports. Kyiv : University “Ukraine”, 2017. P. 409—410.
53. Schnase J. L., Cushing J., Frame M. Information technology challenges of biodiversity and ecosystems informatics // Inform. syst. 2003. Vol. 28, № 4. P. 339—345.
54. Linne C. Fauna Suecica. Stocholmiac, 1761. 578 p.
55. Microsoft Academy: Methods and means of software engineering. URL : <https://www.intuit.ru/studies/courses/2190/237/lecture/6124> (дата звернення: 16.09.2019).
56. Хомоненко А. Д., Цыганков В. М., Мальцев М. Г. Базы данных : учебник для высших учебных заведений / ред. А. Д. Хомоненко. 6-е изд., доп. Санкт-Петербург : Корона-Век, 2009. 736 с.

57. Harrington Jan L. Object-oriented database design clearly explained. USA : Academic Press, 2005. 312 p.
58. FVD: The fish-associated virus database / Chen Y. et al. // Infect Genet. 2018. Vol. 58. P. 23—26. doi: 10.1016/j.meegid.2017.11.004.
59. Creation of Information retrieval systems on collections of marine animals (fishes and invertebrates) in the Zoological Institute of RAS / Smirnov I. S. et al. // RCDL'2004 : Sixth National Russian Research Conference : proceed. Moscow, 2004. P. 30—33.
60. Zhang Q., Gui J. F. Virus genomes and virus-host interactions in aquaculture animals // Sci. China Life Sci. 2015. Vol. 58, № 2. P. 156—169. doi: 10.1007/s11427-015-4802-y.

REFERENCES

1. Buchatsky, L. P., Zaloilo, O. V., Rud, Yu. P., & Zaloilo, I. A. (2018). Contemporary methods of biotechnology in fishery. Kyiv: DIA (In Ukrainian).
2. Klyuchko, O. M., Buchatsky, L. P., & Melezhyk, O. V. (2019). Biological databases construction using object-oriented system analysis. *Biotechnol. Acta*, 12 (3), 5-22.
3. Klyuchko, O. M., Buchatsky, L. P., & Melezhyk, O. V. (2019). Fish information databases construction: data preparation and object-oriented system analysis. *Fishery Science of Ukraine*, 49 (3), 32-47.
4. Klyuchko, O. M., & Klyuchko, Z. F. (2018). Electronic databases for Arthropods: methods and applications. *Biotechnol. Acta*, 11 (4), 28-49. <https://doi.org/10.15407/biotech11.04.028>.
5. Klyuchko, O. M., & Klyuchko, Z. F. (2018). Electronic information systems for monitoring of populations and migrations of insects. *Biotechnol. Acta*, 11 (5), 5-25. <https://doi.org/10.15407/biotech11.05.005>.
6. Young, M., Isaak, D., McKelvey, K., Wilcox, T., Pilgrim, K., Carim, K., Campbell, M., Corsi, M., Horan, D., Nagel, D., & Schwartz, M. A Map and Database of Westslope Cutthroat Trout Hybridization Throughout Idaho and Montana Streams. [fs.fed.us. Retrieved from https://www.fs.fed.us/rm/boise/AWAE/projects/GIMP/downloads/17_HybridizationPoster_IDAFS.pdf](https://www.fs.fed.us/rm/boise/AWAE/projects/GIMP/downloads/17_HybridizationPoster_IDAFS.pdf).
7. Inland Cutthroat Trout Protocol (ICP) Web-mapping Application: Native Cutthroat Trout Data Compilation and Internet Database Development. [sciencebase.gov. Retrieved from https://www.sciencebase.gov/catalog/item/56e9a0b0e4b0f59b85d819e3](https://www.sciencebase.gov/catalog/item/56e9a0b0e4b0f59b85d819e3)
8. Fischdatenbank. [baw.at. Retrieved from http://www.baw.at/wasser-fische-IGF/Fischdatenbank.html](http://www.baw.at/wasser-fische-IGF/Fischdatenbank.html).
9. Valdez-Moreno, M., Ivanova, V., Elías-Gutiérrez, M., Pedersen, L., Bessonov, K., & Hebert, N. (2019). Using eDNA to biomonitor the fish community in a tropical oligotrophic lake. *PloS One*, 14 (4), e0215505. doi: 10.1371/journal.pone.0215505.
10. Bi, H., Zhong, C., Shao, M., Wang, C., Yi, J., Qiao, L., & Zhang, J. (2019). Differentiation and Authentication of Fishes at Species Level Through Analysis of Fish Skin by MALDI TOF MS. *Rapid Commun. Mass. Spectrom.*, 33 (16), 1336-1343. doi: 10.1002/rcm.8474.

11. User Reference for Fisheries Improvement Projects Database (FIP-DB) and Query Viewer. ru.scribd.com. Retrieved from <https://ru.scribd.com/document/385739269/Readme-File-for-FIP-DB#download>.
12. Froese, R., & Pauli, D. (2000). *FishBase 2000: Concepts, designs and data sources*. Los Banos, Philippines: ICLARM.
13. Moreau, J., & Costa-Pierce, B. (1997). Introduction and present status of exotic carp in Africa. *Aquacult. Res.*, 28, 717-732.
14. FAO. (2016). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to food security and nutrition for all. Rome. [fao.org](http://www.fao.org). Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf>.
15. Roessig, J. M., Woodley, Ch. M., Cech, J. J., & Hansen L. J. (2004). Effects of Global Climate Change on Marine and Estuarine Fishes and Fisheries. *Fish Biology and Fisheries*, 14, 251-275.
16. A Global Information System on Fishes. [fishbase.se](http://www.fishbase.se). Retrieved from <https://www.fishbase.se/home.htm>.
17. Arnot, J. A., Mackay, D., Parkerton, T. F., & Bonnell, M. (2008). A database of fish biotransformation rates for organic chemicals. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 27 (11), 2263-2270. setac.onlinelibrary.wiley.com. Retrieved from <https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1897/08-058.1>. doi: 10.1897/08-058.1.
18. Tedesco, P. A., Beauchard, O., Bigorne, R., Blanchet, S., Buisson, L., Conti, L., Cornu, J.-F., Dias, M. S., Grenouillet, G., Hugueny, B., Jézéquel, C., Leprieur, F., Brosse, S., & Oberdorff, T. (2017). A global database on freshwater fish species occurrence in drainage basins. *Sci. Data*, 4, 170141. doi: 10.1038/sdata.2017.141.
19. Van der Laan, R., Eschmeyer, W. N., & Fricke, R. (2014). Family-group names of Recent fishes. *Zootaxa Monograph.*, 3882 (1), 1-230. doi:10.11646/zootaxa.3882.1.1.
20. Fricke, R., Eschmeyer, W. N., & R. van der Laan. Eschmeyer's catalog of fishes: genera, species. researcharchive.calacademy.org. Retrieved from <http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog>.
21. Zeldis, D., & Prescott, S. (2000). Fish disease diagnosis program – Problems and some solutions. *Aquacultural Engineering*, 23 (1–3), 3-11.
22. Frimpong, E. A., & Paul, L. Welcome to the FishTraits Database. [fishtraits.info](http://www.fishtraits.info). Retrieved from <http://www.fishtraits.info>.
23. Di Génova, A. D., Aravena, A., Zapata, L., González, M., Maass, A., & Iturra, L. (2011). SalmonDB: a bioinformatics resource for *Salmo salar* and *Oncorhynchus mykiss*. Database (Oxford). ncbi.nlm.nih.gov. doi: 10.1093/database/bar050. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3225076>.
24. Klyuchko, O. M. (2008). Information and computer technologies in biology and medicine. Kyiv: Nat. Acad. Scienc. Ukraine-druk. (In Ukrainian).
25. Maistrenko, M. I., Rud, Yu. P., & Buchatsky, L. P. (2014). Accumulation of IPNV on the culture of fish cells. *Animal Biology*, 16 (4), 93-99 (In Ukrainian).
26. Matvienko, N. M., & Buchatsky, L. P. (2014). The use of immunomodulating preparations in fish farming. *Modern problems of theoretical and practical ichthyology. Mizhnarodna nauk.-praktych. konf.* Kharkiv, 33-35 (In Ukrainian).
27. Gavrilova, I. P., Maistrenko, M. I., Rumar, V. I., Buchatsky, L. P., & Rud, Yu. P. (2014). New hosts of the third-type of carp herpes virus (CyHV-3). *Scientific notes of the Ternopil Ped. University. Series Biology*, 58 (1), 16-20 (In Ukrainian).

28. Maistrenko, M. I., & Buchatsky, L. P. (2014). Biology of Herpesvirus Fish. *Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology*, 3 (123), 19-35 (In Ukrainian).
29. Rud, Yu. P., Maistrenko, M. I., Bezusy, O. L., & Buchatsky, L. P. (2014). Experimental infection of long-winded cancer (*Pontastacus leptodactylus*) with virus of infectious pancreatic necrosis. *Bulletin of Biology and Medicine*, 4, 1 (113), 70-74 (In Ukrainian).
30. Matvienko, N., Rud, Yu., & Buchatsky, L. (2014). Replication of infectious pancreatic necrosis virus in different cell lines and organism of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) fingerlings. *Arch. Pol. Fish.*, 22, 127-133.
31. Matvienko, N. M., & Buchatsky, L. P. (2014). Study of reproduction of hemorrhagic septicemia trout virus. *Bulletin of Problems of Biology and Medicine*, 2 (3), 118-121 (In Russian).
32. Matvienko, N. M., Buchatsky, L. P., & Deriabin, O. M. (2013). Application of a reverse transcriptase polymerase chain reaction for the detection and identification of the virus of infectious pancreatic necrosis of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Microbiology and biotechnology*, 4 (24), 46-54 (In Ukrainian).
33. Matvienko, N., Kharkavlyuk, N., Buchatsky, L., & Didenko, A. (2013). Characteristics of spring viraemia of carp virus strains isolated in different regions of Ukraine. *Zoology and Ecology*, 23 (3), 198-202
34. Matvienko, N., Rud, Y., & Buchatsky, L. (2013). Replication of infectious pancreatic necrosis virus in different cell lines and organism of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) fingerlings. *Archives of Polish Fisheries*, 4, 127-133.
35. Rud, Yu. P., Maistrenko, M. I., & Buchatsky, L. P. (2013). Amplification and analysis of the nucleotide sequence of VP2 TA NS IPNV genes isolated in Western Ukraine. *Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology*, 4 (118), 34-40 (In Ukrainian).
36. Maistrenko, M. I., Buchatsky, L. P., & Matvienko, N. M. (2013). *Strain of herpesvirus IMB B-4 for the obtaining a vaccine against herpes virus koi*. Patent of Ukraine № 79945 (In Ukrainian).
37. Rud, Yu., Maistrenko, M., & Buchatsky, L. (2013). Isolation of IPNV from wild-life rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) in Western Ukraine. *Biology*, 3 (65), 63-65.
38. Maistrenko, M. I., Rud, Yu. P., Matvienko, N. M., Cholodna, L. S., & Buchatsky, L. P. (2013). Identification of virus SyNV-3 by the methods of electron microscopy and polymerase chain reaction. *Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine*, 4, 139-143 (In Ukrainian).
39. Matvienko, N. M., Vashchenko, A. V., Tsiganok, I. O., & Buchatsky, L. P. (2015). Results of surveillance studies of infectious fish diseases in freshwater aquaculture of Ukraine. *Agricultural science and practice*, 2 (2), 32-38.
40. Rud, Y. P., & Buchatsky, L. P. (2015). Detection of infectious pancreatic necrosis virus in the western Ukraine. *Virologica sinica*, 30 (2), 1-4.
41. Movchan, Yu. V. (2009). Fishes of Ukraine (taxonomy, nomenclature, remarks). *Collection of works of Zoological Museum*, 40, 47-87.
42. Duan, Y., Fu, Z., & Li, D. (2003). Toward Developing and Using Web-based Tele-Diagnosis in Aquaculture. *Expert System ith Applications*, 25 (2), 247-254.
43. Klyuchko, O. M. (2018). Method for monitoring of chemicals influence on bioorganisms in few time intervals. Patent of Ukraine. № 134575. (In Ukrainian).

44. Klyuchko, O. M. (2017). Application of artificial neural networks method in biotechnology. *Biotechnol. acta*, 10 (4), 5–13. <https://doi.org/10.15407/biotech10.04.005>.
45. Klyuchko, O. M. (2017). Cluster analysis in biotechnology. *Biotechnol. acta*, 10 (5), 5-18. <https://doi.org/10.15407/biotech10.05.005>.
46. Klyuchko, O. M., & Onopchuk, Yu. M. (2018). Some trends in mathematical modeling for biotechnology. *Biotechnol. acta*, 11 (1), 39-57. <https://doi.org/10.15407/biotech11.01.039>.
47. Klyuchko, O. M. (2018). Electronic information systems in biotechnology. *Biotechnol. acta*, 11 (2), 5-22. <https://doi.org/10.15407/biotech11.02.005>.
48. Klyuchko, O. M. (2018). Information computer technologies for biotechnology: electronic medical information systems. *Biotechnol. acta*, 11 (3), 5-26. <https://doi.org/10.15407/biotech11.03.005>.
49. Klyuchko, O. M. (2018). Expert systems for biology and medicine. *Biotechnol. acta*, 11 (6), 5-28. <https://doi.org/10.15407/biotech11.06.005>.
50. Klyuchko, O. M. (2019). Biotechnical information systems for monitoring of chemicals in environment: biophysical approach. *Biotechnol. acta*, 12 (1), 5-28.
51. Klyuchko, O. M. (2017). On the mathematical methods in biology and medicine. *Biotechnol. acta*, 10 (3), 31-40. <https://doi.org/10.15407/biotech10.03.031>.
52. Sachnyuk, G. V., & Melezhyk, O. V. (2017). Current state of water resources protection against pollution. *Youth: education, science, spirituality: theses of reports XV Ukr. Sci. conf.* Kyiv, 409-410.
53. Schnase, J. L., Cushing, J., & Frame, M. (2003). Information technology challenges of biodiversity and ecosystems informatics. *Inform. syst.*, 28 (4), 339-345.
54. Linne, C. (1761). *Fauna Suecica*. Stocholmiac.
55. Microsoft Academy: Methods and means of software engineering. *intuit.ru*. Retrieved from <https://www.intuit.ru/studies/courses/2190/237/lecture/6124>.
56. Chomonenko, A. D., Tzygankov, V. M., & Maltzev, M. G. (2009). *Databases*. 6-th edn. Moskow: Binom Press. (In Russian).
57. Harrington, Jan L. (2005). *Object-oriented database design clearly explained*. USA: Academic Press.
58. Chen, Y., Shi, M., Cheng, Y., Zhang, W., Tang, Q., & Xia Q. (2018). FVD: The fish-associated virus database. *Infect Genet.*, 58, 23-26. doi: 10.1016/j.meegid.2017.11.004.
59. Smirnov, I. S., Voronina, E. P., Lobanov, A. L., Golikov, A. A., & Neyelov, A. V. (2004). Creation of Information retrieval systems on collections of marine animals (fishes and invertebrates) in the Zoological Institute of RAS. *Proceedings of the Sixth National Russian Research Conference RCDL '2004*. Moscow, 30-33.
60. Zhang, Q., & Gui, J. F. (2015). Virus genomes and virus-host interactions in aquaculture animals. *Sci. China Life Sci.*, 58 (2), 156-169. doi: 10.1007/s11427-015-4802-y.

ШТУЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ (ЗАРИБНЕННЯ) ЄВРОПЕЙСЬКОГО ХАРІУСА (*THYMALLUS THYMALLUS* LINNAEUS, 1758) В РІКАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

І. Ю. Бузевич, busevitch@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН України,
м. Київ

А. І. Мрук, amruk@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

А. І. Кучерук, anna-kycheryk@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН
України, м. Київ

Мета. Розробити наукові основи відтворення популяцій європейського харіуса басейну Карпатських рік в штучних та природних умовах.

Методика. Обсяги зарибнення визначали на підставі показників розвитку природної кормової бази річкових систем, фактичних вагових приростів у молодших вікових групах та розрахованих коефіцієнтів загальної смертності. Коефіцієнти природної смертності розраховували за параметрами рівняння Берталанфі, які визначали на підставі фактичних розмірно-вікових показників харіуса. Виживання цьоголіток виявляли на підставі розрахованого коефіцієнта природної смертності на першому році життя та співвідношення виживання різних вікових груп, яке для личинок та цьоголіток масою 5 г склало 3,7.

Результати. Аналіз наявних даних показує принципову можливість вселення життєздатної молоді європейського харіуса для поповнення репродуктивного ядра природної популяції, що, в свою чергу, створить об'єктивні передумови для зростання чисельності та відкриває перспективи для перегляду природоохоронного статусу.

Параметри рівняння Берталанфі, розраховані за усередненими розмірно-віковими показниками харіуса річок Закарпаття, склали: K (рік⁻¹) — 0,297; L_{∞} (см) — 36,9; t_0 (рік) — 0,168. На підставі цього були визначені показники миттєвої природної смертності, диференційовані за віком, та, відповідно, показники річної смертності.

Потенційне накопичення іхтіомаси харіуса визначали на підставі величини загальної річної смертності та фактичних вагових показників за розмірними класами. У якості базового показника зарибнення можна використати середньовиважену (з урахуванням площ) величину для басейну р. Тиса, яка становить 418,6 екз./га цьоголіток.

Біопродукційний потенціал річок Карпатського регіону дозволяє збільшити рибопродуктивність за європейським харіусом у середньому на 8,6–21,2 кг/га. З цієї метою протягом чотирирічного періоду необхідно провести зарибнення басейну річки Тиса цьоголітками харіуса масою не менше 5 г загальною кількістю 620,5 тис. екз. на рік та басейну річки Прут — 122 тис. екз. на рік.

Наукова новизна. Обґрунтовані методичні підходи для визначення кількісних показників заходів із зарибнення річок харіусом.

Практична значимість. На підставі результатів досліджень розроблено біологічне обґрунтування, яке регламентує кількісні та якісні показники вселення цьоголіток харіуса в річкову мережу Карпатського регіону.

Ключові слова: виживання, цьоголітки, зарибнення, відтворення, європейський харіус (*Thymallus thymallus* L.).

ARTIFICIAL REPRODUCTION OF THE EUROPEAN GRAYLING (*THYMALLUS THYMALLUS* LINNAEUS, 1758) IN THE RIVERS OF THE CARPATHIAN REGION

I. Buzevich, busevitch@ukr.net, Institute of Fisheries of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

A. Mruk, amruk@ukr.net, Institute of Fisheries of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

A. Kucheruk, anna-kycheryk@ukr.net, Institute of Fisheries of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Purpose. To develop scientific bases for reproduction of European grayling populations by the Carpathian River basin in artificial and natural conditions.

Methodology. Fishery volumes were determined on the basis of indicators of development of the natural forage base of river systems. Actual weight gains in the younger age groups and estimated mortality rates. Natural mortality coefficients were calculated from the parameters of the Bertalanffy equation, which was determined on the basis of the actual size and age parameters of the grayling. Survival of seagrasses was determined on the basis of the calculated coefficient of natural mortality in the first year of life and the ratio of survival of different age groups, which for larvae and seagulls weighing 5 g was 3.7.

Findings. The analysis of the available data shows the fundamental possibility of introducing a viable European grayling youth to replenish the reproductive nucleus of the natural population, which in turn will create objective prerequisites for population growth and create prospects for viewing the conservation status.

The parameters of the Bertalanffy equation, calculated on the average size and age parameters of the grayling of the Transcarpathian rivers, were: K (year⁻¹) - 0.297; L_{∞} (cm) - 36.9; t_0 (year) - 0.168. natural mortality, differentiated by age, and, accordingly, annual mortality rates. On the basis of this, the indicators of instantaneous natural mortality, differentiated by age, and, accordingly, indicators of annual mortality were determined.

The potential accumulation of grayling ichthyomas can be determined on the basis of the total annual mortality and the actual weighting by size classes. The baseline stocking index can be used as a baseline weighted area (based on area). Yew, which is 418.6 copies. / ha of annuals.

The bioproductive potential of the rivers of the Carpathian region allows to increase fish productivity on the European grayling by an average of 8.6-21.2 kg / ha. For this purpose, during the four-year period, it is necessary to fish the Tisza River basin with a grayling of at least 5 g with a total amount of 620.5 thousand. Ex. per year. and the Prut River Basin - 122,000 copies. per year.

Originality. Methodical approaches for determining quantitative indicators of grayling activities are substantiated.

Practical value. The practical implementation of the obtained results will be carried out during the reproduction and cultivation of viable planting material, regulation of quantitative and qualitative indicators of fishing.

Keywords: survival, seagulls, fisheries, reproduction, European grayling (*Thymallus thymallus* L).

ИСКУССТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО (ЗАРЫБЛЕНИЕ) ЕВРОПЕЙСКОГО ХАРИУСА (*THYMALLUS THYMALLUS* LINNAEUS, 1758) В РЕКАХ КАРПАТСКОГО РЕГИОНА

И. Ю. Бузевич, busevitch@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

А. И. Мрук, amruk@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

А. И. Кучерук, anna-kycheryk@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН Украины, г. Киев

Цель. Разроботать научные основы воспроизводства популяций европейского хариуса бассейна карпатских рек в искусственных и естественных условиях.

Методика. Объемы зарыбления определяли на основании показателей развития естественной кормовой базы речных систем, фактических весовых приростов в младших возрастных группах и рассчитанных коэффициентов общей смертности. Коэффициенты естественной смертности рассчитывали по параметрам уравнения Берталанфи, которые определяли на основании фактических размерно-возрастных показателей хариуса. Выживание сеголетков определяли на основании рассчитанного коэффициента естественной смертности на первом году жизни и соотношения выживания различных возрастных групп, которое для личинок и сеголетков массой 5 г составило 3,7.

Результаты. Анализ имеющихся данных показывает принципиальную возможность вселения жизнеспособной молодежи европейского хариуса для пополнения репродуктивного ядра природной популяции, что, в свою очередь, создаст объективные предпосылки для роста численности и откроет перспективы для пересмотра природоохранного статуса.

Параметры уравнения Берталанфи, рассчитанные по усредненным размерно-возрастным показателям хариуса рек Закарпаття, составили: K (год⁻¹) — 0,297; L_{∞} (см) — 36,9; t_0 (год) — 0,168. На основании этого были определены показатели мгновенной естественной смертности, дифференцированные по возрасту, и, соответственно, показатели годовой смертности.

Потенциальное накопления ихтиомасы хариуса можно определить на основании величины общей годовой смертности и фактических весовых показателей по размерным классам. В качестве базового показателя зарыбления можно использовать средневзвешенную (с учетом площадей) величину для бассейна реки Тиса, которая составляет 418,6 экз./га сеголетков.

Биопродукционный потенциал рек Карпатского региона позволяет увеличить рыбопродуктивность по европейскому хариусу в среднем на 8,6—21,2 кг/га. С этой целью в течение четырехлетнего периода необходимо провести зарыбление бассейна реки Тиса сеголетками хариуса массой не менее 5 г общим количеством 620,5 тыс. экз. в год и бассейна реки Прут — 122 тыс. экз. в год.

Научная новизна. Обоснованы методические подходы для определения количественных показателей мероприятий по зарыблению рек хариусом.

Практическая значимость. Практическая реализация полученных результатов будет осуществляться во время воспроизводства и выращивания жизнеспособного посадочного материала, регламентации количественных и качественных показателей зарыбления.

Ключевые слова: выживание, сеголетки, зарыбление, воспроизводство, европейский хариус (*Thymallus thymallus* L.).

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Територія Українських Карпат в межах басейнів річок Дунаю та Дністра є найбільш водозабезпеченою в Україні, де сформований значний природний потенціал для відтворення та існування багатовидового іхтіокомплексу, який включає, в тому числі, низку видів з особливим природоохоронним статусом [2, 11, 12]. Одним з таких видів є європейський хариус (*Thymallus thymallus* L.) — представник родини хариусових, який в українських водоймах має статус «вразливий» [20].

На теперішній час як видовий склад, так і чисельність іхтіофауни річок Закарпаття зазнали суттєвих змін в результаті господарської діяльності людини. Це призводить до скорочення чисельності цінних лососевих риб (дунайський лосось і європейський хариус вже занесені до Червоної книги України; струмкова

форель на сьогодні також знаходиться в критичному стані) та можливості природного відтворення їх місцевих популяцій. На жаль, екологічна ситуація на водних об'єктах регіону характеризується суттєвою нестабільністю із загальною тенденцією до погіршення [8]. Разом з тим, деякі дослідники вважають, що гірські та перехідні ділянки р. Тиси поза зонами антропогенного впливу мають, переважно, другий клас якості, що відповідає доброму екологічному стану і, відповідно, статусу екологічно благополучних річок.

З 1941 по 1948 рр. запаси лососевих риб у Карпатському регіоні катастрофічно зменшилися, внаслідок хижацького вилову без дотримання елементарних правил і охорони рибних запасів. Особливо це стосується європейського харіуса [2]. На сьогодні стан його популяції в гірських річках погіршується, що підтверджується результатами іхтіологічних досліджень, які були виконані Інститутом рибного господарства НААН у 2009 р. [13]. Так, відносна чисельність харіуса в р. Тересва, у порівнянні з даними попередніх досліджень [2, 16], знизилась у 2,4 раза. Проте, слід відзначити, що для деяких річок (зокрема, Тур'я, Лютянка, Лужанка) відмічені досить високі показники відносної чисельності харіуса (до 12,1...25,2% від загальної кількості риб в уловах) [13].

За даними останніх досліджень, харіус європейський входить до складу іхтіокомплексів р. Тиса та її основних приток — річок Тересви, Ріки, Лужанки, верхів'я Чорної. Крім того, цей вид стабільно фіксується також у верхів'ї р. Тересби та її верхніх притоках; Пруті та окремих річках басейну Дністра — Лімниці, Солотвинській, Бистриці Надвірнянській [13].

Незважаючи на відсутність промислу даного виду, ці водні об'єкти зазнають інтенсивної антропогенної дії, яка призводить до значного погіршення екологічного стану, в першу чергу, умов відтворення іхтіофауни. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність проведення компенсаційних заходів, зокрема зарибнення річок життєздатним посадковим матеріалом. У цьому аспекті найбільший інтерес являють лососеві риби як стенобіонтні види, що є цінними об'єктами вилову з особливо високим ступенем експлуатації. Проблема відновлення якісних і кількісних показників популяцій лососевих риб більш ніж актуальна, а поповнення їх в межах природного ареалу сьогодні можливо виключно за рахунок штучного відтворення.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Погіршення стану природного відтворення аборигенної іхтіофауни в умовах стабільно високої інтенсивності антропогенного впливу поставило на сьогодні нагальне питання щодо перегляду стратегії здійснення заходів зі штучного відтворення промислового запасу та підтримання біорізноманіття іхтіофауни річкової мережі Карпатського регіону. Крім збільшення валової рибопродукції, велику увагу слід приділяти підтриманню популяцій аборигенних видів риб, відтворення яких не дозволяє компенсувати зменшення чисельності та іхтіомаси внаслідок різних форм елімінації. Це забезпечить формування збалансованої структури рибного населення, яка є неодмінною умовою для сталого рибогосподарського використання та стабільного стану водних екосистем.

Основними лімітуючими чинниками негативного впливу на стан відтворення харіуса в річках регіону є гідробудівництво та пов'язане з цим порушення міграційних шляхів, руйнування біоценозів нагулу та відтворення; певну роль відіграє також неконтрольований вилов [11]. Відповідно, в умовах посиленого антропогенного тиску набуває актуальності питання щодо проведення компенсаційних заходів, спрямованих на поповнення рідкісних та зникаючих видів з перспективою формування досить численних самовідтворювальних популяцій. Як зазначалось, специфіка річкової мережі Карпатського регіону зумовлює пріоритет природоохоронної складової заходів зы штучного відтворення у порівнянні з рибогосподарською; для харіуса цей пріоритет є абсолютним. Разом з тим, розвиток організованого любительського рибальства на окремих ділянках річок може забезпечити достатній господарський ефект, і в цьому аспекті збільшення видового різноманіття та чисельності окремих видів за рахунок штучного відтворення може розглядатися як рибницько-меліоративний захід, спрямований на покращення умов господарського використання водних біоресурсів. Європейський харіус — цінний об'єкт аматорського та спортивного рибальства. В теперішній час його вилов дозволений в ряді країн Європейського Союзу. Зокрема, в Польщі та Словаччині здійснюється спрямоване формування його запасів для забезпечення бази для рибалок-аматорів [23–26]. Європейський харіус повністю відповідає вимогам, які ставляться до видів, штучне відтворення яких має як природоохоронне, так і рибогосподарське значення.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Оптимальні обсяги зарибнення визначали на підставі показників розвитку кормової бази, фактичних вагових приростів у молодших вікових групах та розрахованих коефіцієнтів природної смертності (яка, за відсутністю промислу, дорівнює загальній смертності). Коефіцієнти природної смертності розраховували за параметрами рівняння Берталанфі [21], які визначали на підставі фактичних розмірно-вікових показників харіуса [19]. Виживання цьоголіток виявляли на підставі розрахованого коефіцієнта природної смертності на першому році життя та співвідношення виживання різних вікових груп, яке для личинок і цьоголіток наважкою 5 г склало 3,7 [3].

Виходячи із загальноприйнятих уявлень щодо формування популяції за рахунок штучного відтворення, можна запропонувати наступну формулу розрахунку обсягів зарибнення:

$$N = \frac{R \cdot S}{\sum_{i=1}^n (\Delta m_i \cdot q_i)}, \quad (1)$$

де N — кількість посадкового матеріалу, екз.;

Δm_i — середній річний ваговий приріст в i -ої вікової групи, кг;

q_i — коефіцієнт річного виживання i -ої вікової групи;

R — потенційний приріст рибопродукції, кг/га;

S — загальна площа ділянок, придатних для мешкання харіуса;

n — кількість вікових класів.

Потенційний приріст рибопродукції може бути визначений за наступною формулою [3].

$$R = \frac{B \cdot P / B \cdot k \cdot 10}{K}, \quad (2)$$

де В — біомаса кормових організмів, г/м²;

Р/В — продукційно-біомасовий коефіцієнт;

К — допустима частка споживання кормових організмів;

К — кормовий коефіцієнт.

Середньовиважена кратність нересту (p) визначалась як сума значень коефіцієнтів річного виживання плідників в період від першого нересту до граничного віку:

$$p = 1 + q_i + q_{i+1} + \dots + q_n, \quad (3)$$

де q_i — виживання першого статевозрілого вікового класу.

Враховуючи перспективне зарибнення річок струмковою фореллю та можливість природного нересту хариуса, показник максимально можливого використання кормової бази прийнятий як 25%. У якості термінальної вікової групи були визначені п'ятирічки, оскільки особини більш старших вікових груп в природних популяціях не зафіксовані.

Показники розвитку кормової бази прийняті як середньовиважені фактичні (з урахуванням придаткової системи та довжини хариусових ділянок), отримані в результаті попередніх досліджень ІРГ НААН [9, 23]. Для визначення площ використані дані, наведені в таблиці 1 [4, 5].

Таблиця 1. Характеристика річок Карпатського регіону як водних об'єктів для вселення європейського хариуса

Table 1. Characteristics of the rivers in the Carpathian region as aquatic habitats for *Thymallus thymallus*

Водний об'єкт* / Aquatic object*	Біомаса зообентосу, г/м ² / Zoobenthos biomass, g/m ²	Параметри ділянок для європейського хариуса / Parameters for <i>Thymallus thymallus</i> sites	
		Довжина, км / Length, km	Площа, га / Area, ha
Тиса / Tysa	16,4	45,0	225,0
Шопурка / Shopurka	15,1	40,0	40,0
Чорна Тиса / Chorna Tysa	9,3	75,0	60,0
Ріка / Rika	17,6	75,0	187,5
Боржава / Borzhava	13,0	90,0	165,0
Біла Тиса / Bila Tysa	10,3	50,0	50,0
Тересва / Teresva	9,5	95,5	184,0
Теребля / Tereblia	10,1	47,5	103,8
Латориця / Latorytsia	21,4	72,0	163,4
Уж / Uzh	20,8	115,0	310,3

Примітка. * — враховуючи придаткову систему.

Note. * — considering the supplementary system.

Визначення чисельності харіуса в р. Тересва проводилось розрахунковим методом на підставі даних контрольних ловів плавними сітками. У якості первинних матеріалів були використані результати контрольних ловів, проведених іхтіологічною службою Закарпатрибоохорони (дозвіл Держкомрибгоспу України № 012 від 30.03.2009 р.). У загальному випадку чисельність об'єкта лову в зоні впливу знаряддя лову можна оцінити із співвідношення [17]:

$$N = Y_n / q, \quad (4)$$

де Y_n — кількість риб в улові;

q — коефіцієнт уловистості.

Коефіцієнт уловистості визначався методом співвідношення уловів активних та пасивних знарядь лову, приведених на одиницю зони облову [17, 18].

У розрахунках використовувались дані щодо уловів двох типів знарядь лову: нерухомих відносно води (плавні сітки) та рухомих (сітки-драги та підхвяти-павуки). Сітки-драги, які за своїм функціональним призначенням належать до пасток, в річкових умовах виконували роль обернено-конічних сіток, тобто знарядь лову для оцінки кількості молоді риб [10]. У відповідності до існуючих нормативів [18], зона облову плавної сітки визначається за формулою:

$$V_c = h \cdot l \cdot a, \quad (5)$$

де h та l — відповідно висота та довжина сітки, м;

a — відстань дрифту, м.

Для сітки—драги зона облову може бути визначена за формулою:

$$V_d = S \cdot v \cdot t, \quad (6)$$

де S — площа вхідного отвору, m^2 ;

v — швидкість течії в місці лову, m/c ;

t — експозиція, с.

Коефіцієнт уловистості плавної сітки може бути визначений за формулою:

$$q_c = (Y_{nc} \cdot V_d) / (Y_{nd} \cdot V_c) \quad (7)$$

Розрахунки коефіцієнта уловистості для плавних сіток проводились окремо для порівняльних станцій і надалі усереднювались.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Вживання посадкового матеріалу — інтегральна характеристика, яка визначається як загальною резистентністю організму в умовах конкретного водного об'єкта, так і впливом тиску хижаків. Основними хижими видами риб басейну р. Тиса є білізна, судак, щука та окунь. Незважаючи на те, що їхня частка в загальній іхтіомасі характеризується досить високими показниками, у річках утворені значні запаси масових короткоциклових та дрібночастикових видів, які є їхніми традиційними кормовими об'єктами [6]. Це дозволяє якісно оцінити вплив хижаків на посадковий матеріал харіуса як невисокий.

За даними досліджень 2007–2011 рр., основу розмірного ряду харіуса в річках регіону формували особини довжиною 19–25 см, судака — 35–42 см, окуня — 14–18 см, щуки — 30–38 см. Згідно з аналізом результатів досліджень залежності

довжини тіла жертви і хижака [15, 19, 22, 23], модальний розмір жертв (аналогічних харіусу за екстер'єрними показниками) складає відповідно 3,2; 5,4; 4,1 та 6,2 см, що дозволяє оцінити середню довжину молоді харіуса наважкою 5 г як 5,1 см. Відповідно, зазначена молодь харіуса значною мірою вийде з-під трофічного тиску найбільш численних представників хижої річкової фауни. Слід також зазначити, що на типових харіусових біотопах крупночастикові хижаки малочисельні та представлені переважно особинами довжиною до 30 см, що підтверджує висновок про потенційно невисокий вплив хижаків на виживання харіуса.

Параметри рівняння Берталанфі, розраховані за усередненими розмірними показниками харіуса річок регіону, склали: K (рік⁻¹) — 0,297; L_{∞} (см) — 36,9; t_0 (рік) — 0,168. На підставі цього були визначені показники миттєвої природної смертності, диференційовані за віком та, відповідно, показники річної смертності. Результати зведені в таблиці 2.

Таблиця 2. Вихідні показники для розрахунку обсягів вселення цьоголіток харіуса

Table 2. Initial indicators for calculating the introduction of *Thymallus thymallus* fingerlings

Показник / Indicator	Вікові групи, років / Age groups, years			
	0–1*	1–2	2–3	3–4
Річна смертність, % / Annual mortality, %	60,0	50,7	40,7	35,4
Приріст маси, г / Mass growth, g	9,0	22,7	42,3	116,0

Примітка. * — цьоголітки (масою не менше 5 г) — однорічки.

Note. * — fingerlings (weighing at least 5 g) — one year old.

Аналіз даних таблиці 1 показує, що очікуване виживання цьоголітної молоді харіуса після перших двох років перебування у природному середовищі (тобто періоду, який ми вважаємо найбільш вразливим для посадкового матеріалу) складає 20%, що є цілком прийнятним показником. При цьому прогнозне накопичення іхтіомаси за віковими класами харіуса характеризується достатньо швидким наростанням з піком, який припадає на чотирирічок–п'ятиліток (рис. 1).

При цьому обмеженість фактичних даних щодо середніх та старших вікових груп цього виду не дозволяє добудувати праве крило кривої питомої іхтіомаси. Разом з тим, отримані дані дозволяють оцінити середньовиважену прогнозу кратність нересту вселених генерацій, яка для граничного віку 5 років склала 2,2. Таким чином, природне відтворення буде базуватися переважно на чотири–п'ятирічних особинах, частка яких у формуванні загальної популяційної плодючості буде досягати 60%.

Результати розрахунку обсягів зарибнення річкової мережі регіону цьоголітками європейського харіуса представлені в таблиці 3.

Рис. 1. Питоме накопичення маси хариуса за віковими групами (% від загальної розрахункової)

Fig. 1. Specific of *Thymallus thymallus* mass accumulation by age groups (% of the total estimated)

Таблиця 3. Кількісні показники зарибнення річок басейну р. Тиса цьоголітками європейського хариуса

Table 3. Quantitative indicators for stocking *Thymallus thymallus* fingerlings in the Tysa river basin

Річка* / River*	Потенційний приріст рибопродукції, кг/га / Potential growth of fish production, kg/ha	Обсяги зарибнення / Stocking volumes	
		екз./га / specimen /ha	всього, тис. екз. / total, thousand specimen
Тиса / Tysa	12,3	431,1	97,0
Шопурка / Shopurka	11,3	397,7	15,9
Чорна Тиса / Chorna Tysa	7,0	244,7	14,7
Ріка / Rika	13,2	463,7	86,9
Боржава / Borzhava	9,8	343,1	56,6
Біла Тиса / Bila Tysa	7,7	271,8	13,6
Тересва / Teresva	7,1	249,9	46,0
Теребля / Tereblia	7,6	266,8	27,7
Латориця / Latorytsia	16,0	563,6	92,1
Уж / Uzh	15,6	547,8	170,0
Разом / Total			620,5

Примітка. * — враховуючи додаткову систему.

Note. * — considering the supplementary system.

Потенційне накопичення іхтіомаси харіуса визначалось на підставі величини загальної річної смертності та фактичних масових показників за розмірними класами. У якості базового показника зарибнення можна використати середньовиважену (з урахуванням площ) величину для басейну р. Тиса, яка, у відповідності до даних таблиць 1 та 3, становить 418,6 екз./га цього літоку. Встановлено, що одна генерація, яка випущена у зазначеній кількості, через 5 років забезпечить збільшення рибопродукції за харіусом на 7,7 кг/га (рис. 2); відповідно, зарибнення протягом чотирьох суміжних років забезпечить збільшення рибопродукції за харіусом на 25–30 кг/га.

Рис. 2. Зростання рибопродуктивності при зарибненні однією умовною генерацією європейського харіуса

Fig. 2. The increase in fish productivity with the stocking of one conditional generation of *Thymallus thymallus*

Якщо розглядати потенційну рибопродукцію за окремими річками, то найвищим питомим показником — 10,4 кг/га — характеризувалась р. Латориця, найнижчим — 4,5 кг/га — р. Чорна Тиса (табл. 4). Проте в абсолютних показниках накопичення рибопродукції провідне місце посідають річки Тиса та Уж, в яких сформовані найбільші за площею біотопи існування європейського харіуса.

Таким чином, повномасштабне зарибнення протягом чотирьох років забезпечить збільшення іхтіомаси харіуса на рівні 13,7–31,6 кг/га, що дозволить повністю стабілізувати структурно-функціональні показники даного виду в річках регіону.

Показник частки, яку вселені генерації будуть формувати у загальному природному відтворенні популяції, оцінювався для р. Тересва, в притоці якої — річці Мокрянк — було відмічене найчисленніше стадо харіуса.

За даними контрольних відловів, проведених Закарпатрибоохороною, середній вилов харіуса на зусилля плавних сіток склав 0,015 екз. (коливання 0,004...0,030 екз); вилов на зусилля активних знарядь лову — 0,243 екз. (коливання 0,000...0,62 екз.), що дозволяє визначити коефіцієнт уловистості пальної сітки за харіусом як 0,062.

Таблиця 4. Розрахункова рибопродуктивність річок регіону за європейським харіусом при повномасштабному здійсненні заходів зі штучного зарибнення, кг/га

Table 4. Estimated fish productivity of the rivers in the region according to *Thymallus thymallus* with full-scale implementation of measures for artificial stocking, kg / ha

Річка / River	При зарибненні: / When stocking:	
	однієї генерації / one generation	чотирьох генерацій / four generations
Тиса / Tysa	8,0	24,2
Шопурка / Shopurka	7,4	22,3
Чорна Тиса / Chorna Tysa	4,5	13,7
Ріка / Rika	8,6	26,0
Боржава / Borzhava	6,4	19,2
Біла Тиса / Bila Tysa	5,0	15,2
Тересва / Teresva	4,6	14,0
Теребля / Tereblia	4,9	15,0
Латориця / Latorytsia	10,4	31,6
Уж / Uzh	10,1	30,7

В середньому по р. Тересва, улов харіуса ставними сітками (у перерахунку на тоню довжиною 1 км) склав 5,45 екз. (коливання 0,00...13,33 екз.), що дозволяє оцінити його чисельність як 87,7 екз./1 км річки, або 22,4 тис. екз. у перерахунку на всю довжину р. Тересва та її основних притоків. Слід враховувати, що переважаючою розмірною групою харіуса європейського в уловах були особини довжиною 24–28 см; тобто зазначений показник може бути використаний для характеристики чисельності репродуктивного ядра популяції цього виду в р. Тересва.

Середня індивідуальна робоча плодючість харіуса в річках регіону може бути визначена як 2,7 тис. ікринок [10]; відповідно загальна популяційна плодючість за природним відтворенням може бути оцінена на рівні 60,5 млн ікринок. Для вселених генерацій репродуктивне ядро приймалось за сумарною чисельністю особин у трирічному віці та старше; кількість вікових груп в ядрі відповідає кількості років зарибнень: так, при одноразовому зарибненні репродуктивне ядро буде складатися з однієї вікової групи.

Результати розрахунків представлені на рисинку 3. З нього видно, що для помітного ефекту в частині поповнення репродуктивного ядра середньочисельної природної популяції харіуса, необхідно провести принаймні два повномасштабних зарибнення.

Рис. 3. Прогнозне питоме поповнення репродуктивного ядра популяції хариуса р. Тересва за рахунок штучного відтворення

Fig. 3. Predicted specific replenishment of the reproductive core of the grayling population of Teresva river due to artificial reproduction

Топологічна та трофічна структура водних екосистем більшості річок регіону вказує на можливість досягнення задовільних показників виживання та росту посадкового матеріалу хариуса, що зумовлює доцільність здійснення заходів зі штучного відтворення цього виду.

Випуск його молоді буде сприяти підтриманню біологічного різноманіття, покращенню якісних та кількісних характеристик річкових іхтіоценозів басейну р. Тиса, тобто є природоохоронним заходом.

Як зазначалось вище, природний ареал європейського хариуса в Україні включає річкову мережу Прикарпаття, зокрема річки басейну Дунаю та Дністра. Основним водотоком, який формує типові біотопи існування хариуса в даному регіоні, є річка Прут. Виходячи з базової природоохоронної парадигми, головною метою заходів з штучного відтворення іхтіофауни басейн р. Прут є підтримання її оптимальних кількісних та якісних показників, тобто видовий склад об'єктів вселення повинен відповідати структурним показникам нативного іхтіоценозу. За схемою, яка була описана вище для річок Закарпаття, були обраховані оптимальні показники вселення хариуса в річкову мережу басейну р. Прут. Розрахунок проводився на підставі даних ІРГ НААН з розвитку природної кормової бази, середніх фактичних приростів модальних вікових груп хариуса у річках Карпатського регіону, з урахуванням того, що максимальне споживання кормових організмів припадає на три–чотирирічок. Результати розрахунків зведені в таблиці 5.

Повномасштабне здійснення заходів зі штучного відтворення європейського хариуса в басейні р. Прут дозволить збільшити рибопродукцію за даним видом на 2,1–15,6 кг/га, що, як зазначалося для річок регіону, створить об'єктивні передумови для перегляду природоохоронного статусу цього виду в Карпатському регіоні.

Таблиця 5. Кількісні показники зарибнення річок басейну р. Прут цьоголітками харіуса європейського

Table 5. Quantitative indicators for stocking *Thymallus thymallus* fingerlings in the Prut river basin

Річка* / River*	Потенційний приріст рибопродукції, кг/га / Potential growth of fish production, kg/ha	Обсяги зарибнення / Stocking volumes	
		екз./га / specimen /ha	всього, тис. екз. / total, thousand specimen
Прут / Prut	5,6	195,7	35,2
Черемош* / Cheremosh*	7,7	270,1	21,6
Чорний Черемош* / Chornyi Cheremosh*	1,1	37,6	2,9
Білий Черемош* / Bilyi Cheremosh*	1,6	55,2	5,8
Сірет* / Siret*	7,9	278,0	32,3
Пістинка* / Pistynka*	5,1	179,6	22,1
Рибниця* / Rybnysia *	1,1	39,3	2,4
Разом / Total			122,2

Примітка. * — враховуючи основні притоки 1-го порядку.

Note. * — taking into account the main tributaries of the 1st order.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Як показали дослідження та аналіз отриманих даних, чисельність харіуса є незначною: він зустрічався в поодиноких екземплярах в нижніх та середніх частинах деяких річок регіону. На основі сучасного стану даних можна констатувати існування нагальної потреби поповнення його популяції за рахунок зарибнення.

Биопродукційний потенціал річок Карпатського регіону дозволяє збільшити рибопродуктивність за європейським харіусом у середньому на 8,6–21,2 кг/га. З цією метою протягом чотирирічного періоду необхідно провести зарибнення басейну р. Тиса цьоголітками харіуса масою не менше 5 г загальною кількістю 742,5 тис. екз. на рік та басейну р. Прут — 122 тис. екз. на рік.

Враховуючи недостатній досвід штучного відтворення харіуса в річках Карпатського регіону, перспективним напрямком досліджень буде повноцінне зарибнення модельної річки (зокрема, р. Красна) з наступним моніторингом виживання, темпів росту та міграцій вселеної молоді.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бузевич И. Ю., Захарченко И. Л. Экономические аспекты эффективности искусственного воспроизводства промысловых видов рыб больших водохранилищ // Состояние и перспективы развития пресноводной аквакультуры : Междунар. науч. -практ. конф. : матер. Москва : ВНИИР, 2013. С. 84—85.

2. Владыков В. Д. Рыбы Подкарпатской Руси и их главнейшие способы лова Ужгород, 1926. 147 с.
3. Временная методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате строительства, реконструкции и расширения предприятий, и других объектов и проведения различных видов работ на рыбохозяйственных водоемах. Москва : Госкомприроды СССР, 1990. 61 с.
4. Географічна енциклопедія України / ред. Маринич О. М. Київ, 1989. Т. 1. 414 с.
5. Географічна енциклопедія України / ред. Маринич О. М. Київ, 1990. 480 с.
6. Геревич О. Іхтіофауна р. Тиса // Природа. 2003. С. 5—7.
7. Діденко О. В., Великопольський І. Й., Устич В. І. Ефективність використання деяких знарядь лову для проведення іхтіологічної зйомки в річках Закарпаття // Рибогосподарська наука України. 2010. № 2. С. 40—46.
8. Дубіс Л. Ф. Методика та основні результати екологічних досліджень річкових басейнів території Закарпатської області // Вісник Львів. ун-ту. 1994. Вип. 19. С. 70—79. (Серія географічна).
9. Кормова база та шляхи відтворення природних популяцій форелі струмкової в річках Прикарпаття / Кружиліна С. В. та ін. // Гидробиологический журнал. 2010. Т. 46, № 3. С. 38—49.
10. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / ред. Романенко В. Д. Київ : Логос, 2006. 408 с.
11. Мрук А. І. Штучне відтворення європейського харіуса // Сбалансированное природопользование современный взгляд, тенденции и перспективы : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Херсон, 2010. С. 57—58.
12. Мрук А. І., Великопольський І. Й., Устич В. І. Європейський харіус басейна р. Тересія та аспекти його штучного відтворення // Рибогосподарська наука України. 2012. № 1. С. 53—60.
13. Наукові дослідження особливостей поширення дунайського лосося, струмкової форелі, харіуса в річкових системах карпатського регіону та рибницько-біологічне обґрунтування щодо ефективного відтворення їх популяцій : звіт з НДР (заклучний 2009 р.) / ІРГ УААН. Київ, 2009. 71 с.
14. Особливості вирощування цьоголіток харіуса європейського (*Thymallus thymallus* L.) / Кучерук А. І. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2015. № 2. С. 31—40.
15. Основные направления работ по искусственному воспроизводству ценных видов рыб во внутренних водоемах Украины / Яковлева Т. В. и др. // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2014. Вып. 30. С. 289—300.
16. Турапин І. І. Риби Карпатських водоем. Ужгород : Карпати, 1982. 144 с.
17. Трещев А. И. Методика определения параметров рыболовства. Москва : ВНИРО, 1972. 25 с.
18. Трещев А. И. Интенсивность рыболовства. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1983. 266 с.
19. Хандоївська А. І. Розмірно-вагові показники харіуса європейського (*Thymallus thymallus* L.) в річках Закарпаття // Рибогосподарська наука України. 2013. № 3. С. 89—96.
20. Червона книга України. Тваринний світ / ред. Щербак М. М. Київ : Українська енциклопедія, 1994. 456 с.
21. Chen S., Watanabe S. Age dependence of natural mortality coefficient in fish population dynamics // Nippon Suisan Gakkaishi. 1989. Vol. 55. P. 205—208.

22. Didenko A. V., Gurbyk A. B. Spring diet and trophic relationships between piscivorous fishes in the Kaniv Reservoir (Ukraine) // *Folia Zoologica*. 2016. № 65(1). P. 15—26.
23. Didenko A., Mruk A., Kruzhylina S. Challenges to restoration of salmonids in streams of the Ukrainian part of the Carpathians // *International Workshop on the Restoration of Fish Populations*, September 1-4, 2009 : proceed. Düsseldorf, Germany, 2009. P. 25.
24. Koščo J., Balázs P., Ivanec O. et al. Príspevok k poznaniu rýb tokov Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. *Acta facultatis studiorum Humanitatis et naturae universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy XL*. Prešov, 2004. P. 138—152.
25. Ocvirk J., Vork J. The role of live zooplankton in the artificial rearing of the grayling (*Thymallus thymallus*) // *Ichthyos*. 1986. Vol. 3. P. 8—12.
26. Witkowski A., Kotusz J., Przybylski M. The degree of threat to the freshwater ichthyofauna of Poland: Red list of fishes and lampreys — situation in 2009 // *Chrońmy Przyrodę Ojczystą*. 2009. Vol. 65. P. 33—52 (in Polish).

REFERENCES

1. Buzevych, Y. Yu., & Zakharchenko, Y. L. (2013). *Ekonomicheskiye aspekty effektivnosti yskusstvennogo vosproyzoovodstva promyslovyykh vydiv ryb bolshykh vodokhranylyshch. Sostoianye y perspektivy razvitiya presnovodnoi akvakultury: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater.* Moskva: VNIYR, 84-85.
2. Vladykov, V. D. (1926). *Ryby Podkarpatskoj Rusi i ih glavnejshie sposoby lova*. Uzhgorod.
3. *Vremennaja metodika ocenki ushherba, nanosimogo rybnym zapasam v rezul'tate stroitel'stva, rekonstrukcii i rasshirenija predpriyatij, i drugih ob#ektov i provedenija razlichnykh vidov rabot na rybohozjajstvennykh vodojmah*. (1990). Moskva: Goskomprirody SSSR.
4. Marynych, O. M. (1989). *Heohrafichna entsyklopediia Ukrainy*. (Vol. 1-3). Vol. 1. Kyiv.
5. Marynych, O. M. (1990). *Heohrafichna entsyklopediia Ukrainy*. (Vol. 1-3). Vol. 2. Kyiv.
6. Herevych, O. (2003). Ikhtiofauna r. Tysa. *Pryroda*, 5-7.
7. Didenko, O. V., Velykopolskyi, I. Y., & Ustych, V. I. (2010). Efektyvnist vykorystannia deiakyykh znariad lovu dlja provedennia ikhtiolohichnoi ziomky v richkakh Zakarpattia. *Rybohoospodarska nauka Ukrainy*, 2, 40-46.
8. Dubis, L. F. (1994). Metodyka ta osnovni rezultaty ekolohichnykh doslidzen richkovykh basiniv terytorii Zakarpatskoj oblasti. *Visnyk Lviv. Un-tu. Seriia heohrafichna*, 19, 70-79.
9. Kruzhylina, S. V., Mruk, A. I., Buzevych, Y. Yu., & Didenko, O. V. (2010). Kormova baza ta shliakhy vidtvorennia pryrodnykh populiatsii foreli strumkovoi v richkakh Prykarpattia. *Hydrobyolohycheskyi zhurnal*, 3, 38-49.
10. Romanenko, V. D. (Ed.). (2006). *Metody hidroekolohichnykh doslidzen poverkhnevyykh vod*. Kyiv: Lohos.
11. Mruk, A. I. (2010). Shtuchne vidtvorennia yevropeiskoho khariusa. *Sbalansyrovannoe pryrodopolzovanye sovremennyi vzgliad, tendentsyy y perspektivy: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater.* Kherson, 57-58.

12. Mruk, A. I., Velykopolskyi, I. Y., & Ustych, V. I. (2012). Yevropeiskyi kharius baseina r. Tereblia ta aspekty yoho shtuchnoho vidtvorennia. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 53-60.
13. IRH UAAN. (2009). *Naukovi doslidzhennia osoblyvostei poshyrennia dunaiskoho lososia, strumkovoï foreli, khariusa v richkovykh systemakh karpatskoho rehionu ta rybnytsko-biologichne obgruntuvannia shchodo efektyvnoho vidtvorennia yikh populiatsii: zvit po NDR (zakliuchnyi 2009 r.)*. Kyiv.
14. Kucheruk, A. I., Hrytsyniak, I. I., Mruk, A. I., & Velykopolsky, I. V. (2015). Osoblyvosti vyroshchuvannia tsoholitok khariusa yevropeiskoho (*Thymallus thymallus* L.). *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 31-40.
15. Jakovleva, T. V., Handozhivskaja, A. I., Mruk, A. I., & Buzevich, I. Ju. (2014). Osnovnye napravlenija rabot po iskusstvennomu vosproizvodstvu cennyh vidov ryb vo vnutrennih vodoemah Ukrainy. *Voprosy rybnogo hozjajstva Belarusi*, 30, 289-300.
16. Turianyn, I. I. (1982). *Ryby Karpatskykh vodoim. Uzhhorod*: Karpaty,
17. Treshhev, A. I. (1972). *Metodika opredelenija parametrov rybolovstva*. Moskva: VNIRO.
18. Treshhev, A. I. (1983). *Intensivnost' rybolovstva*. Moskva: Legkaja i pishhevaja promyshlennost'.
19. Khandozhivska, A. I. (2013). Rozmirno-vahovi pokaznyky khariusa yevropeiskoho (*Thymallus thymallus* L.) v richkakh Zakarpattia. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 3, 89-96.
20. Shcherbak, M. M. (Ed.). (1994). *Chervona knyha Ukrainy. Tvarynni svit*. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia.
21. Chen, S., & Watanabe, S. (1989). Age dependence of natural mortality coefficient in fish population dynamics. *Nippon Suisan Gakkaishi*, 55, 205-208.
22. Didenko, A. V., & Gurbyk, A. B. (2016). Spring diet and trophic relationships between piscivorous fishes in the Kaniv Reservoir (Ukraine). *Folia Zoologica*, 65(1), 15-26.
23. Didenko, A., Mruk, A., & Kruzhylina, S. (2009). Challenges to restoration of salmonids in streams of the Ukrainian part of the Carpathians. *International Workshop on the Restoration of Fish Populations, September 1-4, : proceed.* Düsseldorf, Germany, 25.
24. Koščo, J., Balázs, P., & Ivanec, O. et al. (2004). Príspevok k poznaniu rýb tokov Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. *Acta facultatis studiorum Humanitatis et naturae universitatis Prešovensis. Prírodné vedy*, XL, 138-152.
25. Ocvirk, J., & Vork, J. (1986). The role of live zooplankton in the artificial rearing of the grayling (*Thymallus thymallus*). *Ichthyos*, 3, 8-12.
26. Witkowski, A., Kotusz, J., & Przybylski, M. (2009). The degree of threat to the freshwater ichthyofauna of Poland: Red list of fishes and lampreys — situation in 2009. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą*, 65, 33-52 (in Polish).

ДЕЯКІ МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТЕРЛЯДІ (*ACIPENSER RUTHENUS* LINNAEUS, 1758) В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО ВИРОЩУВАННЯ У ПЛАВУЧИХ САДКОВИХ СИСТЕМАХ

О. М. Третяк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. М. Пашко, marina-fish@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Колос, kolos-en@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити морфологічні особливості стерляді в процесі інтенсивного вирощування її ремонтно-маточних груп у плавучих садках, установлених у водоймах з природним температурним режимом.

Методика. Матеріалом для досліджень послужили особини стерляді на четвертому та на шостому-сьомому роках життя, вирощені на базі господарства індустріального типу ТОВ-СРП «Осетр» Київської області, розташованого у лісостеповій фізико-географічній зоні України. Для вирощування досліджуваних груп осетрових риб використовували садкові камери площею 24 м² (4 x 6 м), занурені у воду на 2,5–3,0 м. Прижиттєве вимірювання риб здійснювали у різні сезони 2019 р. із використанням схем, рекомендованих для промірів осетрових риб. Досліджували 12 пластичних ознак стерляді, визначали масу особин та вираховували індекси будови тіла риб. Коефіцієнт угодованості стерляді розраховували за Фультоном із використанням показників малої довжини тіла (I) та зоологічної довжини всієї риби (L). Дослідження фізико-хімічних параметрів водного середовища проводили, користуючись загальноприйнятими в рибицтві та гідрохімії методиками.

Результати. Виявлено окремі закономірності в екстер'єрних характеристиках стерляді різного віку із переважанням самок за середніми значеннями абсолютних та відносних показників висоти, товщини та обхвату тіла риб. Помічено, що достатньою стабільністю у риб різного віку характеризувались середні значення відносної відстані від початку анального плавця до кінця середніх променів хвостового плавця. Відмічено, що для порівняльного аналізу морфобіологічних показників самок і самців стерляді слід враховувати стадію зрілості гонад, виконуючи дослідження всередині однієї генерації риб в однакові періоди року. Для раннього прижиттєвого визначення статі осетрових риб в аквакультурі рекомендовано застосовувати комплекс способів за поєднання морфологічних досліджень із методами ультразвукової діагностики гонад та іншими сучасними засобами.

Наукова новизна. Досліджено деякі морфологічні особливості племінних груп стерляді, вирощування кількох генерацій якої відбувалось в умовах інтенсивної аквакультури в обмеженому просторі рибницьких садків.

Практична значимість. Результати досліджень являють інтерес для розвитку селекційно-племінної роботи в осетрівництві та сприятимуть розробленню методів раннього прижиттєвого визначення статі осетрових риб.

Ключові слова: стерлядь, індустріальне рибицтво, морфометричні показники, селекційно-племінна робота.

SOME MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE STERLET (*ACIPENSER RUTHENUS* LINNAEUS, 1758) IN THE CONDITIONS OF INTENSIVE REARING IN FLOATING CAGE SYSTEMS

A. Tretiak, info@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

© О. М. Третяк, М. М. Пашко, О. М. Колос, 2019

M. Pashko, marina-fish@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Ye. Kolos, kolos-en@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To study peculiarities of the sterlet in the process of intensive rearing of their replacement and brood groups in floating cages installed in water bodies with natural temperature regime.

Methodology. The material for the study were age-3+ and age-5+6+ sterlet reared at the industrial type fish farm "Oseter" LLC of Kyiv region located in the forest-steppe physical-geographical zone of Ukraine. The experimental groups of fish were reared in 24 m² (4x6 m) cage chambers submerged in water by 2.5-3.0 m. Measurements of alive fish were performed in different seasons of 2019 using schemes recommended for measuring sturgeons. Twelve plastic features of the sterlet were studied, weights of individual fish and indexes of body built were determined. Fulton's conditions indexes were calculated with the use of standard lengths (l) and total lengths (L). Studies of physicochemical parameters of water medium were performed using generally accepted fisheries and hydrochemical methods.

Findings. Individual patterns in exterior features of the sterlet of different ages were detected, where females exceeded males by mean values of absolute and relative fish body depths, thickness and girth. It was found that the mean values of the relative distance from the anal fin to the end of middle rays of the caudal fin were characterized by sufficient stability. It was noted that the gonad maturation stage should be taken into account for a comparative analysis of morphobiological parameters of sterlet females and males when performing studies within one fish generation in the same periods of the year. A complex of methods combined with morphological studies with ultrasonography and other modern techniques is recommended for early vital sex determination in sturgeons.

Originality. Some morphological peculiarities of brood groups of the sterlet, rearing of several generation of which was performed in the conditions of intensive aquaculture in a limited space of cages, were studied.

Practical value. The results of the studies can be interesting for the development of selective breeding work in sturgeon aquaculture and contribute to the development of methods for early vital determination of the sex in sturgeons.

Key words: sterlet, industrial aquaculture, morphometric parameters, selective breeding works.

НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТЕРЛЯДИ (*ACIPENSER RUTHENUS* LINNAEUS, 1758) В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ В ПЛАВУЧИХ САДКОВЫХ СИСТЕМАХ

А. М. Третьак, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

М. М. Пашко, marina-fish@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Е. Н. Колос, kolos-en@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Исследовать морфологические особенности стерляди в процессе интенсивного выращивания ее ремонтно-маточных групп в плавучих садках, установленных в водоемах с естественным температурным режимом.

Методика. Материалом для исследований служили особи стерляди на четвертом и на шестом–седьмом годах жизни, выращенные на базе хозяйства индустриального типа ООО-СРП «Осетр» Киевской области, расположенном в лесостепной физико-географической зоне Украины. Для выращивания исследуемых групп осетровых рыб использовали садковые камеры площадью 24 м² (4 × 6 м), погруженные в воду на 2,5–3,0 м. Прижизненные измерения рыб осуществляли в различные сезоны 2019 г. с использованием схем, рекомендуемых для промеров осетровых рыб. Исследовали 12 пластических признаков стерляди, определяли массу особей и рассчитывали индексы телосложения рыб. Коэффициент упитанности рассчитывали по Фультону с использованием показателей малой длины тела (l) и

зоологической длины всей рыбы (L). Исследования физико-химических параметров водной среды проводили, пользуясь общепринятыми в рыбоводстве и гидрохимии методиками.

Результаты. Выявлены отдельные закономерности в экстерьерных характеристиках стерляди разного возраста с превосходством самок по средним значениям абсолютных и относительных показателей высоты, толщины и обхвата тела рыб. Замечено, что достаточной стабильностью у рыб разного возраста характеризовались средние значения относительного расстояния от начала анального плавника до конца средних лучей хвостового плавника. Отмечено, что для сравнительного анализа морфобиологических показателей самок и самцов стерляди следует учитывать стадию зрелости гонад, выполняя исследования внутри одной генерации рыб в одинаковые периоды года. Для раннего прижизненного определения пола осетровых рыб в аквакультуре рекомендовано применять комплекс способов в сочетании морфологических исследований с методами ультрасонографии гонад и другими современными средствами.

Научная новизна. Исследованы некоторые морфологические особенности племенных групп стерляди, выращивание нескольких генераций которой проходило в условиях интенсивной аквакультуры в ограниченном пространстве рыбоводных садков.

Практическая значимость. Результаты исследований представляют интерес для развития селекционно-племенной работы в осетроводстве и способствуют разработке методов раннего прижизненного определения пола осетровых рыб.

Ключевые слова: стерлядь, индустриальное рыбоводство, морфометрические показатели, селекционно-племенная работа.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Існування осетрових риб останнім часом починає все більше залежати від удосконалення методів штучного відтворення, вирощування життєстійкої молоді та формування маточних стад цих найцінніших представників світової іхтіофауни у контрольованих умовах [1].

Одним із видів родини осетрових, який характеризується особливою привабливістю для рибиництва, є стерлядь. Відомо також, що до найактуальніших завдань сучасного осетрівництва належить збільшення обсягів вирощування плідників [1–8].

У процесі визначення стану племінних груп культивованих видів риб важливе значення має оцінка об'єктів риборозведення за морфофізіологічними показниками, кількісні та якісні зміни яких значною мірою відбуваються в залежності від умов утримання, що дає змогу вивчати не лише загальні процеси росту і розвитку, але й адаптивні зміни, пов'язані з умовами навколишнього середовища. Важливе практичне значення належить також дослідженням морфологічних показників об'єктів осетрівництва у зв'язку з відпрацюванням ефективних методів прижиттєвого визначення статі риб на різних етапах онтогенезу [9–12].

Зазначені обставини є передумовою для проведення досліджень морфометричних показників стерляді в процесі інтенсивного вирощування маточних стад в умовах господарств індустріального типу.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Поки що залишаються не повною мірою відпрацьованими сучасні засади

селекційно-племінної роботи з представниками риб ряду осетроподібних, спрямовані на формування високопродуктивних маточних стад як колекційно-генофондного, так і користувального (для потреб товарного осетрівництва) призначення. Це спонукає до постійного наукового супроводу в процесі розв'язання даної проблеми, зокрема з виконанням спеціальних досліджень морфологічних особливостей об'єктів осетрівництва [11–13].

На сучасному етапі ведення товарного осетрівництва в Україні однією з перспективних технологічних схем є комбінування індустріальних методів рибництва в процесі формування та експлуатації маточних стад, характерним складовим елементом якої є вирощування плідників в умовах обмеженого простору рибницьких камер плавучих садків [12–16]. Проте, недостатня увага приділялась питанням вивчення морфологічних особливостей стерляді, вирощеної у таких умовах.

Отже метою досліджень було визначення морфологічних особливостей ремонтно-маточних груп стерляді в умовах інтенсивного вирощування у плавучих садках, установлених у водоймах з природним температурним режимом.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Матеріалом для досліджень слугували особини стерляді на четвертому, шостому та сьомому роках життя, вирощені у плавучих садках у водоймі з природним температурним режимом на базі господарства індустріального типу ТОВ-СРП «Осетр» Київської області, розташованого у північній частині лісостепової фізико-географічної зони України. Досліджувані групи стерляді є нащадками плідників, вирощування кількох генерацій яких відбувалося в умовах плавучих садкових систем з площею садкових камер 24 м² (4 x 6 м), занурених у воду на 2,5–3,0 м. Годівлю риб на різних етапах вирощування здійснювали спеціалізованими комбікормами з умістом сирого протеїну 45–64% та сирого жиру 12–15%.

Прижиттєве вимірювання риб проводили у різні сезони 2019 р.: у квітні (статевозрілих шестирічних самок після періоду зимівлі) та у вересні (чотириліток обох статей та семилітніх самців) із використанням у процесі морфометричного аналізу загальновідомих схем промірів осетрових риб на основі методик, описаних І. Ф. Правдіним [18], пізніше уточнених та доповнених іншими дослідниками [13,17]. Реєстрували такі пластичні ознаки стерляді (см): L — загальна (зоологічна) довжина; l — мала довжина; С — довжина голови; R — довжина риля; ВС — найбільша ширина голови; В — найбільша ширина (товщина) тіла; Н — найбільша висота тіла; VА — вентроанальна відстань (між основою V та А); рl₁ — довжина хвостового стебла; рl₂ — довжина основи хвостового стебла; рl₃ — відстань від початку анального плавця до кінця середніх промірів хвостового плавця; О_{max} — обхват тіла максимальний. Схему вимірювань відображено на рисунку 1. Під час виконання промірів визначали масу тіла риб (W, кг). Коефіцієнт угодованості стерляді розраховували за Фультоном із використанням показників малої довжини тіла (l) та зоологічної довжини всієї риби (L). Виразовували індекси тілобудови риб.

Дослідження фізико-хімічних параметрів водного середовища на ділянці

розміщення рибницьких садків здійснювали, користуючись загальноприйнятими в рибництві та гідрохімії методами [19, 20].

Одержані цифрові результати оцінювали статистично за допомогою стандартних програм [21].

Рис. 1. Схема промірів пластичних ознак тіла стерляді: а — вигляд збоку, б — вигляд зверху, с — вигляд знизу

Fig. 1. Scheme of the measurements of morphometric characters in *Acipenser ruthenus*: а — lateral view, б — dorsal view, с — ventral view

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

У район розміщення понтонної системи із рибницькими садками господарства «Осетр» вода надходить безпосередньо з Канівського водосховища дніпровського каскаду, що значною мірою визначає температурний та гідрохімічний режими середовища. Середньомісячна температура води зимових місяців зазвичай змінювалась у межах 1–5°C. Влітку середньомісячна температура води на досліджуваних ділянках водойми переважно наближалась до 21–26°C. Температурні максимуми у поверхневих горизонтах товщі води сягали 27–28°C. Тривалість періоду із достатньою для активної життєдіяльності стерляді температурою води в межах 10–25°C складала у різні роки до 120–140 діб.

Середньосезонні величини вмісту розчиненого у воді кисню у районі розміщення садків упродовж щорічного 7-8-місячного періоду вирощування різновікових груп стерляді з годівлею штучними кормами наближались до 6 мгО₂/дм³ за істотних середньодобових коливань значень показника, що змінювались у межах 2,4–11,6 мгО₂/дм³. У дні з мінімальною концентрацією кисню у воді застосовувалась штучна аерація водного середовища поблизу садків з ремонтно-маточним матеріалом осетрових риб.

За гідрохімічним режимом досліджувана водойма була типовою для регіону та за специфікою розташування (нижче центральної частини правобережної ділянки Канівського водосховища) перебувала під певним впливом урбанізованих територій. Проте, основні гідрохімічні показники вказують на відносну

благополучність проаналізованих умов середовища для життєдіяльності гідробіонтів. Значення водневого показника (рН) води перебували на рівні рибницьких норм — у межах 7,1–8,1. Незначним перевищенням гранично допустимих концентрацій в окремі періоди спостережень характеризувався вміст у воді сполук азоту і фосфору. Водночас не було виявлено надмірного забруднення водного середовища органічними речовинами за показників перманганатної окиснюваності води в межах 6,8–16,0 мгО/дм³. За йонним складом досліджувана вода у районі розміщення осетрового господарства належала до гідрокарбонатного класу групи кальцію з рівнем мінералізації до 300–380 мг/дм³. Випадків масової загибелі риби впродовж багаторічних спостережень не було зареєстровано.

Понтони садкової лінії з осетровими рибами розташовували на ділянці водойми з глибинами 5–9 м за постійного водообміну зі швидкістю течії 0,05–0,20 м/с. Швидкість течії часто змінювалась протягом доби.

Вирощування стерляді в залежності від віку риб проводили із густотою посадки, що здебільшого забезпечувала одержання рибопродукції в межах 5–12 кг/м² садкових площ. Витрати кормів на одиницю приросту (один кілограм) маси тіла зростали з віком риб в середньому з 1,29 кг у цьоголіток до 1,98–2,06 кг у риб старших вікових груп.

Представлені результати досліджень морфологічних ознак самок і самців стерляді різного віку є першою спробою аналізу відповідних даних, зібраних за специфічних умов утримання осетрових риб у плавучих садках господарства «Осетер». Обрана схема вимірювання риб зумовлена потребою відпрацювання окремих елементів селекційно-племінної роботи в індустріальному осетрівництві України. Зважаючи на це, серед морфобіологічних критеріїв оцінки екстер'єрних показників риб, крім найпоширеніших ознак тілобудови, індивідуальної маси та вгодованості, проаналізовано додаткові морфометричні параметри тіла стерляді у ділянці хвостового стебла, рекомендовані деякими дослідниками для використання у відборі племінного матеріалу осетрових риб [13]. За існуючими методичними рекомендаціями, відносні показники тілобудови стерляді, як представника родини осетрових, розраховувались за співвідношенням до загальної довжини тіла (L), а відносні морфометричні показники голови риб — за їх співвідношенням до повної довжини голови обстежених особин [17].

Після зимового періоду утримання 2018–2019 рр. морфометрично досліджено самок стерляді 6-річного віку масою 1,60–2,19 кг (у середньому $1,88 \pm 0,04$ кг) за середньої загальної довжини тіла $69,15 \pm 0,70$ см. Під час морфометричних промірів усі плідники мали зрілі статеві продукти та у першій половині квітня були використані у експериментальних роботах зі штучного отримання овульованої ікри у ранні нерестові строки. Результати проведених експериментів указують на задовільний фізіологічний стан досліджуваних риб після періоду зимівлі. Показники маси відібраної від них овульованої ікри змінювались у межах 0,183–0,351 кг (у середньому $0,247 \pm 0,009$ кг) за коефіцієнта зрілості риб від 9,95 до 19,72%.

У вересні 2019 р. проаналізовано екстер'єрні показники 7-літніх самців (риби одного віку із самками, обстеженими у весняний період) та 4-літніх самок і самців стерляді. Маса плідників у віці 6+ становила 1,20–1,45 кг (у середньому $1,32 \pm$

0,02 кг) за середнього показника загальної довжини тіла $63,43 \pm 0,54$ см. Маса тіла самок стерляді вікової групи 3+ становила від 0,62 до 1,16 кг (у середньому $0,90 \pm 0,03$ кг). У одновікових з ними самців цей показник змінювався в межах 0,56–1,05 кг (за середнього значення $0,83 \pm 0,03$ кг). Загальна довжина тіла самок і самців стерляді чотирилітнього віку становила $57,52 \pm 0,61$ та $56,76 \pm 0,66$ см відповідно. Статеву належність ремонтного молодняку стерляді визначали на підставі візуального виявлення ознак статевого дозрівання самців, а також із застосуванням методів біопсії та ультразвукографії гонад.

Середні значення та коефіцієнти варіації екстер'єрних показників стерляді різного віку наведені у таблиці 1.

Таблиця 1. Екстер'єрні показники риб у племінних групах стерляді

Table 1. Exterior indicators of fishes in the breeding groups of *Acipenser ruthenus*

Показник / Indicators	Група риб / Group of fishes							
	самки у віці 3+ (n = 25), вересень / females aged 3+ (n = 25), September		самці у віці 3+ (n = 25), вересень / males aged 3+ (n = 25), September		самки у віці 6 (n = 20), квітень / females aged 6 (n = 20), April		самці у віці 6+ (n = 20), вересень / males, age 6+ (n = 20), September	
	M $\pm$ m	Cv, %	M $\pm$ m	Cv, %	M $\pm$ m	Cv, %	M $\pm$ m	Cv, %
W, кг / kg	0,90 $\pm$ 0,03	15,51	0,83 $\pm$ 0,03	16,86	1,88 $\pm$ 0,04	9,69	1,32 $\pm$ 0,02	6,26
L, см / cm	57,52 $\pm$ 0,61	5,27	56,76 $\pm$ 0,66	5,78	69,15 $\pm$ 0,70	4,56	63,43 $\pm$ 0,54	3,82
l, см / cm	51,30 $\pm$ 0,53	5,12	50,64 $\pm$ 0,60	5,90	61,85 $\pm$ 0,59	4,27	56,78 $\pm$ 0,42	3,29
C, см / cm	9,37 $\pm$ 0,12	6,35	9,23 $\pm$ 0,17	9,07	10,67 $\pm$ 0,13	5,33	10,21 $\pm$ 0,12	5,08
R, см / cm	3,54 $\pm$ 0,08	10,83	3,42 $\pm$ 0,07	10,23	не визначали / not determined		3,91 $\pm$ 0,09	10,02
BC, см / cm	6,52 $\pm$ 0,09	6,52	6,37 $\pm$ 0,08	6,34	7,04 $\pm$ 0,11	6,90	6,91 $\pm$ 0,07	4,38
B, см / B, см	7,21 $\pm$ 0,08	5,52	6,79 $\pm$ 0,11	8,07	8,70 $\pm$ 0,11	5,61	7,90 $\pm$ 0,09	5,21
H, см / H, см	7,63 $\pm$ 0,08	5,35	7,38 $\pm$ 0,10	6,59	10,27 $\pm$ 0,12	5,12	9,34 $\pm$ 0,06	2,79
O _{max} , см / cm	22,9 $\pm$ 0,25	5,37	22,12 $\pm$ 0,29	6,51	30,19 $\pm$ 0,30	4,51	27,55 $\pm$ 0,20	3,17
VA, см / cm	8,84 $\pm$ 0,14	7,93	8,67 $\pm$ 0,19	11,23	не визначали / not determined		10,08 $\pm$ 0,10	4,31
pl ₁ , см / cm	7,42 $\pm$ 0,11	7,19	6,96 $\pm$ 0,13	9,33	9,00 $\pm$ 0,19	9,35	7,99 $\pm$ 0,10	5,64
pl ₂ , см / cm	10,30 $\pm$ 0,12	5,78	9,96 $\pm$ 0,14	6,99	11,91 $\pm$ 0,14	5,41	10,90 $\pm$ 0,10	4,30
pl ₃ , см / cm	12,38 $\pm$ 0,12	4,98	12,24 $\pm$ 0,17	7,05	14,96 $\pm$ 0,21	6,22	13,71 $\pm$ 0,10	3,26

Примітка. W — маса тіла; L — загальна довжина тіла; l — мала довжина тіла; C — довжина голови; R — довжина риля; BC — ширина голови; B — товщина тіла; H — висота тіла; O_{max} — обхват тіла; VA — вентроанальна відстань; pl₁ — довжина хвостового стебла; pl₂ — довжина основи хвостового стебла; pl₃ — відстань від початку анального плавця до кінця середніх променів хвостового плавця.

Notes. W - body mass; L - total body length; l - short body length; C - head length; R - snout length; BC - width of head; B - body thickness; H - body height; O_{max} - body girth; VA - ventroanal distance; pl₁ - caudal stem length; pl₂ - caudal peduncle length of the base; pl₃ - distance from the beginning of the anal fin to the end of the middle rays of the caudal fin.

За даними таблиці видно, що в обох вікових групах риб самки лідирують за проаналізованими морфометричними показниками. Значною мірою це зумовлено певними перевагами розмірів самок, що стає помітним вже у чотирирічному віці. Водночас, вищі показники висоти, товщини та обхвату тіла самок стерляді певною мірою можна пов'язати зі збільшенням маси статевих залоз, насамперед, із досягненням статевої зрілості. Варіабельність абсолютних значень більшості екстер'єрних показників має тенденцію до зменшення зі збільшенням віку риб.

Схожу закономірність щодо характеру відмінностей морфометричних показників, зареєстровано за середніми значеннями коефіцієнта вгодованості самок і самців різного віку. Разом з тим, коефіцієнт варіації цього показника у самок старшої вікової групи був помітно нижчим, ніж у самців (табл. 2).

Таблиця 2. Коефіцієнт вгодованості риб за Фультоном

Table 2. Fulton's condition factor

Варіант показника / Indicator option	Група риб / Group of fishes							
	самки у віці 3+ (n = 25), вересень / females aged 3+ (n = 25), September		самці у віці 3+ (n = 25), вересень / males aged 3+ (n = 25), September		самки у віці 6 (n = 20), квітень / females aged 6 (n = 20), April		самці у віці 6+ (n = 20), вересень / males, age 6+ (n = 20), September	
	M ± m	Cv, %	M ± m	Cv, %	M ± m	Cv, %	M ± m	Cv, %
За малою довжиною тіла (l) / By short body length (l)	0,664 ± 0,013	9,70	0,636 ± 0,011	8,27	0,790 ± 0,012	6,70	0,725 ± 0,016	9,95
За загальною довжиною тіла (L) / By the total length of the body (L)	0,472 ± 0,010	10,69	0,452 ± 0,008	9,31	0,568 ± 0,010	7,75	0,521 ± 0,013	11,29

За даними літературних джерел відомо, що різні дослідники застосовували у розрахунках вгодованості осетрових риб як довжину тіла від кінця риля до кінця середніх промінів хвостового плавця (l), так і загальну, або зоологічну довжину всієї риби (L) [17]. Іноді обчислювались обидва варіанти показника, що зроблено і в наших розрахунках. Проте, незважаючи на застосований варіант розрахунків, отримані значення можуть використовуватись у вигляді орієнтиру для опосередкованої оцінки фізіологічного стану певної вікової групи стерляді у процесі інтенсивного вирощування та зимового утримання в умовах плавучих садків у водоймах з природним температурним режимом.

Висловлене у літературі припущення щодо доцільності переважного відбору в осетрові племінні стада риб з мінімальними відносними значеннями довжини окремих ділянок хвостового стебла спонукало до проведення аналізу відповідних даних [13]. В результаті встановлено, що серед обстежених на четвертому та шостому–сьомому роках життя особин стерляді до цієї «елітної» за вказаними екстер'єрними показниками групи ремонтно-маточного поголів'я, імовірно, можна віднести близько 20–25% самок та до 40% самців.

Середні значення відносних показників будови тіла стерляді в обстежених ремонтно-маточних групах риб представлені у таблиці 3. Наведені у ній дані щодо індексів тілобудови загалом узгоджуються із закономірностями, виявленими за абсолютними значеннями висоти, товщини та обхвату тіла у самок стерляді обох вікових груп. З цим, відповідно, пов'язані дещо нижчі у самок, ніж у самців, індекси прогонистості. Водночас, привертають увагу майже не залежні від віку риб досить стабільні середні значення відносної відстані від початку анального плавця до кінця середніх променів хвостового плавця, які перебувають у межах $21,56 \pm 0,17$ — $21,63 \pm 0,18\%$. Варіабельність значень індексів тілобудови обстежених риб загалом характеризувалась невисокими величинами.

Таблиця 3. Індекси будови тіла риб у племінних групах стерляді

Table 3. Body structure indices of fish in breeding groups of *Acipenser ruthenus*

Показник (індекс) / Indicator (index)	Група риб / Group of fishes							
	самки у віці 3+ (n = 25), вересень / females aged 3+ (n = 25), September		самці у віці 3+ (n = 25), вересень / males aged 3+ (n = 25), September		самки у віці 6 (n = 20), квітень / females aged 6 (n = 20), April		самці у віці 6+ (n = 20), вересень / males, age 6+ (n = 20), September	
	M ± m	Cv, %	M ± m	Cv, %	M ± m	Cv, %	M ± m	Cv, %
Прогонистості / Fusiform	7,54± 0,06	4,04	7,70± 0,06	4,19	6,74± 0,06	3,96	6,79± 0,05	3,19
Висоти тіла, % / Body height, %	13,28± 0,11	4,02	13,00± 0,11	4,19	14,86± 0,13	4,03	14,74± 0,11	3,24
Товщини тіла (%) / Body thickness (%)	12,54± 0,11	4,48	11,97± 0,15	6,13	12,63± 0,14	5,10	12,47± 0,17	5,98
Обхвату тіла (максимальний), % / Body girth (max), %	39,99± 0,32	3,96	38,99± 0,33	4,29	43,68± 0,37	3,81	43,46± 0,27	2,80
Голови, % / Head, %	16,29± 0,16	4,98	16,27± 0,25	7,56	15,43± 0,13	3,68	16,12± 0,15	4,21
Ширини голови, % / Width of head, %	69,49± 0,51	3,69	69,33± 1,03	7,44	65,98± 0,68	4,60	67,79± 0,79	5,23
Довжини рила, % / Snout length, %	37,54± 0,59	7,90	37,15± 0,46	6,20	не визначали / not determined		38,28± 0,71	8,28
Вентроанальної відстані, % / Ventroanal distance, %	15,36± 0,16	5,19	15,24± 0,22	7,21	не визначали / not determined		15,91± 0,16	4,48
Хвостового стебла, % / Caudal stem length, %	12,92± 0,21	7,99	12,26± 0,17	6,75	12,95± 0,19	6,59	12,60± 0,15	5,45
Основи хвостового стебла, % / Caudal peduncle length of the base, %	17,94± 0,24	6,67	17,55± 0,13	3,73	17,37± 0,19	4,77	17,20± 0,17	4,42

Показник (індекс) / Indicator (index)	Група риб / Group of fishes							
	самки у віці 3+ (n = 25), вересень / females aged 3+ (n = 25), September		самці у віці 3+ (n = 25), вересень / males aged 3+ (n = 25), September		самки у віці 6 (n = 20), квітень / females aged 6 (n = 20), April		самці у віці 6+ (n = 20), вересень / males, age 6+ (n = 20), September	
	M ± m	Cv, %	M ± m	Cv, %	M ± m	Cv, %	M ± m	Cv, %
Відстані від початку анального плавця до кінця середніх променів хвостового плавця, % / distance from the beginning of the anal fin to the end of the middle rays of the caudal fin, %	21,58 ± 0,16	3,78	21,56 ± 0,17	3,92	21,62 ± 0,18	3,71	21,63 ± 0,18	3,63

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

За результатами проведених досліджень на базі садкового господарства індустріального типу виявлено певні морфологічні відмінності особин стерляді різної статі у віці старшоремонтного молодняку та плідників. За низкою екстер'єрних показників в межах однієї генерації самки стерляді помітно перевершують самців. Водночас, досить стабільними у самок і самців стерляді різних вікових груп залишаються середні значення відносної відстані від початку анального плавця до кінця середніх променів хвостового плавця.

Проведені дослідження слід вважати попередніми. Для отримання більш достовірних результатів доцільно продовжити аналогічні дослідження стерляді та інших видів осетрових риб, вирощених в умовах господарств індустріального типу зі збільшенням загальної кількості обстежених риб та переліку проаналізованих морфометричних ознак. Вимірювання особин у межах однієї вікової групи необхідно здійснювати в однакові періоди року, враховуючи під час оцінки отриманих даних можливий вплив на деякі екстер'єрні показники стадії зрілості гонад та ступеня вгодованості риб у процесі високоінтенсивного вирощування.

З метою раннього прижиттєвого визначення статі осетрових риб в умовах аквакультури доцільно застосовувати різноманітні методи досліджень за використання ендоскопії та ультразвукографії гонад, порівняльного аналізу гормональних показників і морфологічних характеристик різновікових особин у племінних стадах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кольман Р. Искусственное размножение осетровых рыб // Проблемы производства посадочного материала исчезающих популяций осетровых рыб. Олыштын : MIR DRUK, 2012. С. 31—43.

2. Козлов В. И., Козлов А. В. Осетроводство. Москва : МГУТУ, 2011. 336 с.
3. Кончиц В. В., Мамедов Р. А. Состояние и перспективы восстановления численности стерляди в водоемах Беларуси // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. Київ : ДІА, 2011. С. 48—58.
4. Подушка С. Б. Ремонтно-маточные стада в осетроводстве // Проблемы современного товарного осетроводства : Перв. науч.-практ. конф. : тез. док. Астрахань, 2000. С. 78—83.
5. Подушка С. Б., Чебанов М. С. Икорно-товарное осетроводство в Китае // Научно-технический бюллетень лаборатории ихтиологии ИНЭНКО. 2007. № 13. С. 5—15.
6. Подушка С. Б., Армянинов И. В. Опыт формирования и эксплуатации икорно-товарного стада стерляди в Кармановском рыбхозе // Осетровое хозяйство. 2008. № 1. С. 2—5.
7. Подушка С. Б. Длительное сохранение остаточной овулированной икры в полости тела стерляди // Рыбное хозяйство. 2009. № 1. С. 60—61.
8. Шерман І. М., Корнієнко В. О., Шевченко В. Ю. Актуальність та передумови domestикації представників родини осетрових в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2006. Вип. 44. С. 145—154.
9. Йаздани М. А., Власов В. А. Рост и морфологическая характеристика ленского осетра (*Acipenser baerii* Brand) в зависимости от массы тела // Известия ТСХА. Москва. 2006. Вып. 4. С. 94—99.
10. Кончиц В. В., Мамедов Р. А., Савончик А. Л. Морфометрические показатели как критерий сортировки по полу ремонтно-маточного стада ленского осетра внутри одной генерации // Рибогосподарська наука України. 2011. № 4. С. 80—87.
11. Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні / Третяк О. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2010. № 4. С. 4—22.
12. До питання розвитку осетрівництва в Україні у сучасних умовах // Третяк О. М. та ін. // Основні завдання щодо науково-технічного забезпечення розвитку рибного господарства України : наук.-практ. семінар : матер. Київ : Політехніка, 2019. С. 20—31.
13. Васильева Л. М. Биологические и технологические особенности товарной аквакультуры осетровых в условиях Нижнего Поволжья. Астрахань : Биос, 2000. С. 139—148.
14. Пашко М. М., Третяк О. М., Колос О. М. Результати експериментів зі штучного отримання овульованої ікри від плідників стерляді *Acipenser ruthenus* Linnaeus у нетрадиційні строки // Рибогосподарська наука України. 2018. № 2. С. 81—88.
15. Пашко М. М., Третяк О. М. Економічна ефективність штучного отримання овульованої ікри стерляді (*Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758) з комбінованим використанням індустріальних технологій // Рибогосподарська наука України. 2018. № 4. С. 68—78.
16. Пашко М. М., Третяк О. М., Колос О. М. До питання вирощування плідників стерляді (*Acipenser ruthenus* Linnaeus) у плавучих садках за природної температури води Лісостепу України // Рибогосподарська наука України. 2019. № 1. С. 48—59.
17. Крылова В. Д., Соколов Л. И. Морфологические исследования осетровых рыб и их гибридов (Методические рекомендации). Москва : ВНИРО, 1981. 49 с.

18. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищ. промышленность. 1966. 375 с.
19. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеиздат, 1973. 270 с.
20. СОУ – 05.01.37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 7 с.
21. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва : Колос, 1969. 256 с.

REFERENCES

1. Kol'man, R. (2012). Iskusstvennoe razmnozhenie osetrovyykh ryb. *Problemy proizvodstva posadochnogo materiala ischezayushchikh populyatsiy osetrovyykh ryb*. Ol'shtyn: MIR DRUK, 31-43.
2. Kozlov, V. I., & Kozlov, A. V. (2011). *Osetrovodstvo*. Moskva: MGUTU.
3. Konchits, V. V., & Mamedov, R. A. (2011). Sostoyanie i perspektivy vosstanovleniya chislennosti sterlyadi v vodoemakh Belarusi. *Zberezheniya genofondu ta vidnovlennya populyatsiy tsinnikh vidiv rib: Mizhnar. nauk. konf.: mater.* Kyiv: DIA, 48-58.
4. Podushka, S. B. (2000). Remontno-matochnye stada v osetrovodstve. *Problemy sovremennogo tovarnogo osetrovodstva: Perv. nauch.-prakt. konf.: tez. dokl. Astrakhan'*, 78-83.
5. Podushka, S. B., & Chebanov, M. S. (2007). Ikorno-tovarnoe osetrovodstvo v Kitae. *Nauchno-tekhnicheskii byulleten' laboratorii ikhtiologii INENKO*, 13, 5-15.
6. Podushka, S. B., & Armanyanov, I. V. (2008). Opyt formirovaniya i ekspluatatsii ikorno-tovarnogo stada sterlyadi v Karmanovskom rybkhoe. *Osetrovoe khozyaystvo*, 1, 2-5.
7. Podushka, S. B. (2009). Dlitel'noe sokhranenie ostatochnoy ovulirovannoy ikry v polosti tela sterlyadi. *Rybnoe khozyaystvo*, 1, 60-61.
8. Sherman, I. M., Korniienko, V. O., & Shevchenko, V. Yu. (2006). Aktualnist ta peredumovy domestykatsii predstavnykiv rodyny osetrovyykh v umovakh pivdnia Ukrainy. *Tavriiskiyi naukoviyi visnyk*, 44, 145-154.
9. Yazdani, M. A., & Vlasov, V. A. (2006). Rost i morfologicheskaya kharakteristika lenskogo osetra (*Acipenser baerii* Brand) v zavisimosti ot massy tela. *Izvestiya TSKhA*, 4, 94-99.
10. Konchits, V. V., Mamedov, R. A., & Savonchik, A. L. (2011). Morfometricheskie pokazateli kak kriteriy sortirovki po polu remontno-matochnogo stada lenskogo osetra vnutri odnoy generatsii. *Rybohospodars'ka nauka Ukrainy*, 4, 80-87.
11. Tretiak, O. M., et al. (2010). Stan zapasiv osetrovyykh ryb ta rozvytok osetrovoi akvakultury v Ukraini. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 4-22.
12. Tretiak, O. M., et al. (2019). Do pytannia rozvytku osetrivnytstva v Ukraini u suchasnykh umovakh. Osnovni zavdannia shchodo naukovykh tekhnichnoho zabezpechennia rozvytku rybnogo hospodarstva Ukrainy: nauk.-prakt. seminar: mater. Kyiv: Politehnika, 20-31.
13. Vasil'eva, L. M. (2000). *Biologicheskie i tekhnologicheskie osobennosti tovarnoy akvakul'tury osetrovyykh v usloviyakh Nizhnego Povolzh'ya*. Astrakhan': Bios, 139-148.

14. Pashko, M. M., Tretiak, O. M., & Kolos, O. M. (2018). Rezultaty eksperimentiv zi shtuchnoho otrymannia ovulovanoi ikry vid plidnykiv sterliadi *Acipenser ruthenus* Linnaeus u netradytsiini stroky. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 81-88.
15. Pashko, M. M., & Tretiak, O. M. (2018). Ekonomichna efektyvnist shtuchnoho otrymannia ovulovanoi ikry sterliadi (*Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758) z kombinovanim vykorystanniam industrialnykh tekhnolohii. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 68-78.
16. Pashko, M. M., Tretiak, O. M., & Kolos, O. M. (2019). Do pytannia vyroshchuvannia plidnykiv sterliadi (*Acipenser ruthenus* Linnaeus) u plavuchykh sadkakh za pryrodnoi temperatury vody Lisostepu Ukrainy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 48-59.
17. Krylova, V. D., & Sokolov, L. I. (1981). Morfologicheskie issledovaniya osetrovyykh ryb i ikh gibridov (Metodicheskie rekomendatsii). Moskva: VNIRO.
18. Pravdin, I. F. (1966). *Rukovodstvo po izucheniyu ryb*. Moskva: Pishch. promyshlennost'.
19. Alekin, O. A., Semenov, A. D., & Skopintsev, B. A. (1973). *Rukovodstvo po khimicheskomu analizu vod sushi*. Leningrad: Gidrometeoizdat.
20. Voda rybohospodarskykh pidpriemstv. Zahalni vymohy ta normy. (2006). *SOU – 05.01.37-385:2006*. Kyiv: Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy.
21. Plokhinskiy, N. A. (1969). *Rukovodstvo po biometrii dlya zootekhnikov*. Moskva: Kolos.

ЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ РІЗНОВІКОВИХ ГРУП ГАЛИЦЬКОГО КОРОПА В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОЩУВАННЯ У СТАВАХ ПРИКАРПАТТЯ

В. В. Гурбик, viktoriaduka@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Ю. М. Глушко, niko-yulia@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І. Грициняк, info.iforgua@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ
Н. Й. Тушницька, n-tushnitska@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

Мета. Проаналізувати вікову та сезонну динаміку цитогенетичних показників у різновікових груп галицького коропа в умовах промислового вирощування.

Методика. Відбір крові для приготування мазка проводили з хвостової вени. Мазки фіксували метиловим спиртом і фарбували за методом Романовського розчином Гімза. Подальший аналіз проводили під мікроскопом «Primo Star Zeiss» зі збільшенням у 1000 разів. У мазках підраховували частоту еритроцитів з мікроядрами (ЕМЯ), однопіддерних лімфоцитів з мікроядрами (ЛМЯ), двоядерних лімфоцитів (ДЛ) і апоптозів (АП). Отримані дані вимірювали в промілі (‰).

Результати. Еритроцити з мікроядрами у різновікових груп галицького коропа знаходились в межах від $2,7\% \pm 0,4$ — $4,0\% \pm 0,7$. Кількість лімфоцитів з мікроядрами зафіксовано на рівні $2,0\% \pm 0,4$ — $2,4\% \pm 0,2$. Двоядерні лімфоцити у галицького коропа набувають значень в межах від $2,0\% \pm 0,2$ до $2,7\% \pm 0,3$. У результаті цитогенетичного аналізу встановлено зниження рівня клітин з апоптозом на 11% у тріліток галицького коропа в порівнянні з цюголітками.

Після зимового утримання еритроцити з мікроядрами у однорічок та дворічок зафіксовано в межах $2,7\% \pm 0,5$ — $3,1\% \pm 0,6$. Частота лімфоцитів з мікроядрами у галицького коропа зменшується: так, у дворічок цей показник зазнавав свого зменшення на 8% і становив $2,4\% \pm 0,2$.

Двоядерні лімфоцити у галицького коропа після зимового утримання набували значень від $2,9\% \pm 0,1$ до $3,3\% \pm 0,2$. В результаті порівняльного аналізу цитогенетичних показників однорічок та дволіток встановлено достовірну різницю в кількості лімфоцитів з двоядрами ($P \leq 0,01$; $t_s = 3,57$). Отримані результати досліджень засвідчують, що підвищення показника спровоковано швидким зростанням рибопосадкового матеріалу в ставових умовах.

Наукова новизна. Вперше проаналізовано мінливість цитогенетичного апарату різновікових груп галицького коропа на різних етапах технологічного процесу при промисловому вирощуванні.

Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для подальшої селекційної роботи з галицьким коропом в умовах регіону.

Ключові слова: галицький короп, різновікові групи, апоптоз, двоядерні лімфоцити, еритроцити з мікроядрами.

© В. В. Гурбик, Ю. М. Глушко, І. І. Грициняк, Н. Й. Тушницька, 2019

CYTOGENETIC PROFILE OF DIFFERENT GROUPS OF THE HALYCH CARP IN CONDITIONS OF INDUSTRIAL AQUACULTURE IN SUBCARPATHIA PONDS

V. Gurbik, viktoriaduka@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Yu. Glushko, niko-yulia@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

I. Hrytsyniak, info.iforgua@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

N. Tushnitskaya, n-tushnitska@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To analyze age and seasonal dynamics of the cytogenetic parameters in different age groups of Halych carp under conditions of industrial cultivation.

Methodology. Blood sampling for smear preparation was performed from the caudal vein. The smears were preserved in methyl alcohol and stained using the Romanowsky-Giemsa solution. Further analysis was performed under a Primo Star Zeiss microscope at 1000x magnification. The erythrocyte frequency from the micronucleus, single-nucleus lymphocytes from the micronucleus, dual-nucleus lymphocytes, and apoptosis were counted in the smears. The data obtained was measured in ppm (%).

Findings. Erythrocytes with micronuclei in different age groups of the Halych carp ranged from up to $2.7\% \pm 0.4$ - $4.0\% \pm 0.7$. The number of lymphocytes with micronuclei was $2.0\% \pm 0.4$ - $2.4\% \pm 0.2$. Dual-nucleus lymphocytes in the Halych carp ranged from $2.0\% \pm 0.2$ to $2.7\% \pm 0.3$. As a result of cytogenetic analysis, a 11% decrease in the level of cells with apoptosis in age-3 Halych carp compared to young-of-the-year was detected.

After wintering, erythrocytes with micronuclei in age-1 and age-2 carp were recorded to be within $2.7\% \pm 0.5$ - $3.1\% \pm 0.6$. The incidence of lymphocytes with micronuclei in the Halych carp decreases, while this parameter in age-2 fish decreased by 8% and amounted to $2.4\% \pm 0.2$.

Dual-nucleus lymphocytes in the Halych carp after wintering ranged from $2.9\% \pm 0.1$ to $3.3\% \pm 0.2$. As a result of a comparative analysis of cytogenetic parameters of age-1 and age-2 carp, a significant difference in the number of lymphocytes with dual nuclei was found ($P < 0.01$; $t_s = 3.57$). The results of the studies show that an increase in this parameter was triggered by rapid growth of fish seeds in pond conditions.

Originality. For the first time, the variability of the cytogenetic apparatus of different age groups of the Halych carp at different stages of the technological process in industrial cultivation was analyzed.

Practical value. The results obtained can be used for further breeding work with the Halych carp in the region.

Keywords: Galician carp, different age groups, apoptosis, lymphocytes with nuclei, double nucleus lymphocytes, erythrocytes with micronuclei.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ГАЛИЦИЙСКОГО КАРПА В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ В ПРУДАХ ПРИКАРПАТЬЯ

В. В. Гурбик, viktoriaduka@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Ю. Н. Глушко, niko-yulia@ukr.net, Институт рыбного хозяйства УААН, г. Киев

И. И. Грициняк, info.iforgua@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Н. И. Тушницкая, n-tushnitska@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Проанализировать возрастную и сезонную динамику цитогенетических показателей у разновозрастных групп галицийского карпа в условиях промышленного выращивания.

Методика. Отбор крови для приготовления мазка проводили с хвостовой вены. Мазки фиксировали метиловым спиртом и окрашивали по методу Романовского раствором Гимза.

Дальнейший анализ проводили под микроскопом «Primo Star Zeiss» с увеличением в 1000 раз. В мазках подсчитывали частоту эритроцитов с микроядрами (ЭМЯ), одноядерных лимфоцитов с микроядрами (ЛМЯ), двухъядерных лимфоцитов (ДЛ) и апоптозов (АП). Полученные данные измеряли в промилле (‰).

Результаты. Эритроциты с микроядрами у разновозрастных групп галицийского карпа находились в пределах от $2,7\% \pm 0,4$ — $4,0\% \pm 0,7$. Количество лимфоцитов с микроядрами зафиксировано на уровне $2,0\% \pm 0,4$ — $2,4\% \pm 0,2$. Двухъядерные лимфоциты в галицийского карпа находились в пределах от $2,0\% \pm 0,2$ до $2,7\% \pm 0,3$. В результате цитогенетического анализа установлено снижение уровня клеток с апоптозом на 11% в трехлетков галицийского карпа по сравнению с сеголетками.

После зимнего содержания эритроциты с микроядрами у годовиков и двухлетков зафиксированы в пределах $2,7\% \pm 0,5$ — $3,1\% \pm 0,6$. Частота лимфоцитов с микроядрами у галицийского карпа уменьшается: так, у двухлетков этот показатель показал свое уменьшение на 8%, составив $2,4\% \pm 0,2$.

Двухъядерные лимфоциты у галицийского карпа после зимнего содержания достигали уровня от $2,9\% \pm 0,1$ до $3,3\% \pm 0,2$. В результате сравнительного анализа цитогенетических показателей годовиков и двухлетков установлена достоверная разница в количестве лимфоцитов с двумя ядрами ($P < 0,01$; $t_s = 3,57$). Полученные результаты исследований показывают, что повышение показателя спровоцировано быстрым ростом рыбопосадочного материала в прудовых условиях.

Научная новизна. Впервые проанализирована изменчивость цитогенетического аппарата разновозрастных групп галицийского карпа на разных этапах технологического процесса при промышленном выращивании.

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшей селекционной работы с галицийским карпом в условиях региона.

Ключевые слова: галицийский карп, разновозрастные группы, апоптоз, двухъядерные лимфоциты, эритроциты с микроядрами.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Хромосомні мутації відіграють важливу еволюційну роль. Однак, делеції ділянок у хромосомному наборі риб спостерігаються частіше, ніж дуплікації, що призводить до виникнення нежиттєздатних фенотипів [1].

За допомогою цитогенетичного контролю існує можливість оцінити вплив чинників навколишнього середовища на генетичну структуру риб. Кумуляція мутацій в геномі може в подальшому призводити до збільшення генетичної мінливості [2].

Як було зазначено, оцінка дестабілізації хромосомного апарату здійснюється за допомогою цитогенетичного контролю. Ця методика надає можливість встановити різновид геномних мутацій у риб прижиттєвим способом та швидко виявити рівень геномної мінливості. Провести аналіз рівня геномних мутацій можливо за допомогою мікроядерного тесту [3–5].

Утворення мікроядер спостерігається в клітинах, які мають здатність до поділу в усіх системах організму і саме мікроядерний тест є одним із надійних методів визначення частоти утворення мікроядер у тканинах організму під впливом факторів навколишнього середовища [6, 7]. Цей метод розроблений на основі підрахунку «мікроядер», які утворились внаслідок пошкодження цитогенетичного апарату, розривів або злиття деяких ділянок хромосом [4, 8].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Мікроядерний тест є однією з характеристик, за допомогою якої можливо виявити вплив на організм риб умов вирощування. Тому є актуальним вивчення чутливості хромосомного апарату риб, як однієї з адаптивних можливостей, до конкретних умов вирощування, що буде основним в оптимізації господарської діяльності.

В умовах ставового вирощування на гомеостаз риб впливає комплекс абіотичних та біотичних чинників середовища. Оцінка фізіологічного стану об'єктів аквакультури у визначених умовах вирощування можлива за допомогою цитогенетичного контролю. Оцінка стабільності генотипу різновікових груп галицького коропа в умовах промислового вирощування дозволяє проаналізувати можливість подальшої селекційної роботи в умовах регіону.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Репрезентативну вибірку ($n = 15$) відбирали на базі ФГ «Короп» смт Рава-Руська Львівської області у 2016 р. Відбір здійснювали у різновікових груп галицького коропа під час проведення весняної інвентаризації і осіннього бонітування риб. Для приготування мазків використовували предметні скельця, на які спочатку наносили дві краплі фізіологічного розчину з $pH = 6,5$. У досліджуваних риб з хвостової вени стерильними шприцами відбирали периферичну кров і наносили кілька крапель на предметні скельця, після чого робили препарати. Мазки фіксували метиловим спиртом і фарбували за методом Романовського з використанням розчину Гімза. Подальший аналіз проводили під мікроскопом «Primo Star Zeiss» зі збільшенням у 1000 разів. Отримані дані виражали в проміле (‰) [9].

Статистичну вірогідність відмінностей частот зустрічальності цитогенетичних аномалій між групами оцінювали за критерієм Стюдента (t_s).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Цитогенетичний профіль галицького коропа формується в результаті сезонної і вікової стабільності генетичного апарату протягом зростання. Спостерігається дестабілізація генетичного апарату і тенденція до накопичення мутацій з віком у різновікових особин.

Частота зустрічання еритроцитів з мікроядрами на першому році життя галицького коропа знаходилася на рівні $4,0\% \pm 0,7$. На другому році життя значення даного показника перебували на рівні $3,9\% \pm 0,6$. У тріліток спостерігалось зменшення рівня еритроцитів з мікроядрами до $3,7\% \pm 0,6$.

Кількість лімфоцитів з мікроядрами у цьоголіток галицького коропа зафіксовано на рівні $2,4\% \pm 0,2$. У дворічок вона зазнала свого незначного зниження і становила $2,3\% \pm 0,4$. Трілітки галицького коропа характеризували нижчим рівнем лімфоцитів з мікроядрами — на 16%, — які перебували на рівні $2,0\% \pm 0,4$.

Частота зустрічання двоядерних лімфоцитів у галицького коропа на першому році життя становила $2,7\% \pm 0,3$. У дволіток кількість лімфоцитів з двома ядрами

знаходилась на рівні $2,1\% \pm 0,3$, що на 20% менше, ніж у цьогоріток. Трилітки характеризувалися найнижчим рівнем аналогічного показника — $2,0\% \pm 0,2$ (рис. 1).

Рис. 1. Цитогенетичний профіль різновікових груп галицького коропа в кінці вегетаційного сезону в умовах промислового вирощування

Fig. 1. Cytogenetic profile of different age groups of Galician carp at the end of the growing season in the conditions of industrial cultivation.

Порівняльний аналіз трьох вікових груп галицького коропа показав, що його трилітки за частотою клітин з апоптозом в порівнянні з цьогорітками характеризуються на 11% нижчим значенням. На першому році життя у рибопосадкового матеріалу цей показник знаходився на рівні $4,4\% \pm 0,3$. На другому році життя кількість клітин з апоптозом перебувала на рівні $4,1\% \pm 0,4$. Трилітки галицького коропа характеризувалися найменшим показником зустрічання клітин з апоптозом, а саме $3,9\% \pm 0,3$.

Статистично достовірної різниці між різновіковими групами галицького коропа в період промислового вирощування у ставах Прикарпаття не встановлено, проте чітко простежується тенденція до зниження рівня клітин з цитогенетичними порушеннями у триліток порівняно з молодшими віковими групами.

Частота еритроцитів з мікроядрами після зимового утримання на першому році життя галицького коропа знаходилась на рівні $3,1\% \pm 0,6$. У дворічок даний показник був нижчим на 13%, складаючи $2,7\% \pm 0,5$.

Частота зустрічання лімфоцитів з мікроядрами у дворічок галицького коропа була нижчою на 8%, порівняно з однорічками (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка цитогенетичної мінливості однорічок та дворічок галицького коропа в ставових умовах Прикарпаття

Fig. 2. Dynamics of the cytogenetic variability of yearlings and two-year-old Galician carp in pond conditions in the Carpathian region

За кількістю двоядерних лімфоцитів у рибопосадкового матеріалу галицького коропа на другому році життя після зимового утримання також спостерігали нижчі значення. У однорічок кількість лімфоцитів з двома ядрами знаходилася на рівні $3,2\% \pm 0,2$, що на 14% менше, ніж у попередніх.

У однорічок спостерігали на 11% вищі значення клітин з апоптозом у порівнянні з дворічками. На другому році життя кількість клітин з апоптозом знаходилася на рівні $3,6\% \pm 0,3$. Статистично достовірної різниці між двома групами галицького коропа після зимівлі не встановлено.

В умовах промислового вирощування галицького коропа на другому році життя спостерігали сезонну динаміку цитогенетичних показників. Виявлено зростання кількості ЕМЯ у осінній період. Рівень лімфоцитів з мікроядрами протягом третього року життя зріс на 16% у порівнянні з аналогічним показником, зареєстрованим у дворічок. В той час як на другому році життя кількість лімфоцитів знизилася на 17% (рис. 3).

Упродовж вегетаційного сезону спостерігалось незначне збільшення кількості клітин з апоптозом у дволіток та тріліток. В осінній період спостерігали зниження рівня ЛМЯ та ДЛ як у однорічок, так і дворічок, та незначне зростання рівня апоптозів.

Кількість двоядерних лімфоцитів у особин галицького коропа на другому році життя після зимового утримання зазнала свого зменшення на 1,2%. У тріліток кількість лімфоцитів з двома ядрами знаходилася на рівні $3,9\% \pm 0,3$, що на 30% менше, ніж у попередньої вікової категорії.

Рис. 3. Динаміка цитогенетичної мінливості галицького коропа впродовж вегетаційного сезону в умовах промислового вирощування

Fig. 3. Dynamics of the cytogenetic variability of the Galician carp during the growing season in the conditions of industrial cultivation

В результаті порівняльного аналізу цитогенетичних показників однорічок та дволіток встановлено достовірну різницю в кількості лімфоцитів з двома ядрами ($P < 0,01$; $t_s = 3,57$). Отримані результати досліджень засвідчують, що підвищення показника спровоковано швидким ростом рибопосадкового матеріалу в ставових умовах.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

В результаті цитогенетичного аналізу встановлено, що частота еритроцитів з мікроядрами у різновікових груп галицького коропа зростає в осінній період. Порівняльний аналіз різновікових груп коропа за частотою цитогенетичних порушень (ЕМЯ, ДЛ, ЛМЯ) та апоптозу показує, що трілітки характеризуються найвищою цитогенетичною стабільністю в порівнянні з іншими віковими групами. Впродовж вегетаційного сезону зафіксовано збільшення частоти двоядерних лімфоцитів у дволіток галицького коропа, що на нашу думку, пов'язано з високим темпом росту та масонакопиченням рибопосадковим матеріалом.

Отримані результати будуть використані для подальшої селекційної роботи з галицьким коропом як рідкісним і малопоширеним в межах України.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кирпичников В. С. Генетика и селекция рыб. Ленинград : Наука, 1987. 520 с.

2. Шельов А. В. Цитогенетична оцінка племінних ресурсів сільськогосподарських тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец 03.00.15 «Генетика». Чубинське, 2008. 17 с.
3. Архипчук В. В., Гончарук В. В. Биотестирование качества воды на клеточном уровне // Химия и технология воды. 2001. № 5. С. 32—38.
4. Захидов С. Т., Карпюк М. И., Галиченков В. А. Цитогенетический мониторинг волжского бассейна. Уровни хромосомных мутаций в половых и соматических клетках самцов стерляди // Известия РАН. 1993. № 1. С. 102—106.
5. Урываева И. В. Перспективы разработки и применения в экологических исследованиях цитогенетического метода анализа микроядер в гепатоцитах // Известия РАН. 1993. № 1. С. 88—94.
6. Дробышевский В. Ф. Мутации на различных уровнях наследственного аппарата гидробионтов при воздействии генотоксичных загрязнителей водной среды : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.18 «Гидробиология». Москва, 2005. 21 с.
7. Schmidt W. The micronucleus test // Mutation Res. 1975. Vol. 31. P. 5—9.
8. Micronuclei as an index of cytogenetic damage: past, present, and future / Heddle J. A. et al. // Environmental and Molecular Mutagenesis. 1991. Vol. 18, iss. 4. P. 277—291.
9. Heddle J. A. Micronuclei *in vivo* // Prog. Clin. Biol. Res. 1990. Vol. 340. P. 185—194.
10. Ильинских Н. Н., Новицкий В. В., Ванчугова Н. Н. Микроядерный анализ и цитогенетическая нестабильность. Томск : ТомГУ, 1992. 272 с.

REFERENCES

1. Kirpichnikov, V. S. (1987). *Genetika i selekcija ryb*. Leningrad: Nauka.
2. Shelov, A. V. (2008). Tsytohenetychna otsinka plemynnykh resursiv silskohospodarskykh tvaryn. *Extended abstract of candidate's thesis*. Chubynske.
3. Arhipchuk, V. V., & Goncharuk, V. V. (2001). Biotestirovanie kachestva vody na kletochnom urovne. *Himija i tehnologija vody*, 5, 32-38.
4. Zahidov, S. T., Karpjuk, M. I., & Galichenkov, V. A. (1993). Citogeneticheskij monitoring volzhskogo bassejna. Urovni hromosomnyh mutacij v polovyh i somaticheskikh kletkah samcov sterljadi. *Izvestija RAN*, 1, 102-106.
5. Uryvaeva, I. V. (1993). Perspektivy razrabotki i primenenija v jekologicheskikh issledovanijah citogeneticheskogo metoda analiza mikrojader v gepatocitah. *Izvestija RAN*, 1, 88-94.
6. Drobyshevskij, V. F. (2005). Mutacii na razlichnyh urovnjah nasledstvennogo apparata gidrobiontov pri vozdejstvii genotoksichnyh zagrjaznitelej vodnoj sredy. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moskva.
7. Schmidt, W. (1975). The micronucleus test. *Mutation Res.*, 31, 5-9.
8. Heddle, J. A., Cimino, M. C., & Hayashi, M. et al. (1991). Micronuclei as an index of cytogenetic damage: past, present, and future. *Environmental and Molecular Mutagenesis*, 18(4), 277-291.
9. Heddle, J. A. (1990). Micronuclei *in vivo*. *Prog. Clin. Biol. Res.*, 340, 185-194.
10. Ilinskih, N. N., Novickij, V. V., & Vanchugova, N. N. (1992). *Mikrojadernyj analiz i citogeneticheskaja nestabil'nost'*. Tomsk: TomGU.

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 95-108
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.095>
УДК [639.3.043.13:636.087.8] : 639.371.52

Received 10.08.19
Received in revised form 15.09.19
Accepted 22.10.19

ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДВОЛІТОК КОРОПА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ В ГОДІВЛІ ПРЕБІОТИКА В УМОВАХ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ

О. П. Добрянська, olya_dobryanska@ukr.net, Львівська дослідна станція ІРГ НААН,
сmt Великий Любін

О. В. Дерень, derenj@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Т. В. Григоренко, grygorenko-@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

Мета. Дослідити ефективність додаткового введення пребіотичного препарату «Актиген» до складу основного раціону дволіток коропа при вирощуванні в умовах ставів. Забезпечити контроль умов водного середовища, визначити вплив досліджуваної добавки на рибопродуктивність дослідних ставів та витрати кормів на вирощування.

Методика. Експериментальні дослідження проводилися на базі рибного господарства ТзОВ «Карпатський водограй» Пустомитівського району Львівської області в умовах ставів-аналогів з одним джерелом водопостачання. Стави зарибнили однорічками лускатого коропа середньою масою 55–58 г, із розрахунку 1000 екз./га. Контрольній групі риб згодовували збалансований комбікорм, а трьом дослідним групам додатково до основного раціону методом гранулювання вводили «Актиген» в кількості 0,025% (Дослід 1); 0,050% (Дослід 2) та 0,075% (Дослід 3). Тривалість дослідження становила 60 діб. Упродовж вегетаційного періоду здійснювали контроль гідрохімічного, гідробіологічного та кисневого режимів водного середовища.

Гідрохімічні та гідробіологічні дослідження проводилися за методиками, описаними О. О. Альокіним, В. І. Жадіним та С. А. Кражан.

Результати. Впродовж вегетаційного періоду забезпечено задовільні умови для вирощування коропа. Основні показники хімічного складу ставової води відповідали рибницьким нормативам; не відмічено особливостей зміни даних показників у залежності від складу раціону риб. Концентрація розчиненого у воді кисню коливалась у межах від 3,8 до 8,8 мг/дм³. Кількісний розвиток зоопланктону впродовж вегетаційного періоду характеризувався середніми показниками. Так, загальна чисельність зоопланктону в ставах знаходилася в межах від 26,0 до 426,0 тис. екз./м³, а біомаса — від 2,20 до 11,19 г/м³.

Встановлено, що використання в годівлі дволіток коропа пребіотика «Актиген» з розрахунку 0,025; 0,050 і 0,075% позитивно вплинуло на рибопродуктивність ставів: середня маса риб перевищувала показники контрольної групи відповідно на 6,3; 21,3 та 1,3%, рибопродуктивність збільшилась на 10,0; 31,0 та 1,2%. При цьому витрати кормів на вирощування коропа зменшились в 1,1 раза (0,025% пребіотика) та 1,3 раза (0,050% добавк) відносно контролю.

Наукова новизна. Вперше досліджено вплив препарату пребіотичної дії «Актиген» при введенні його до складу основного раціону дволіток коропа на продуктивні показники риб та витрати корму.

© О. П. Добрянська, О. В. Дерень, Т. В. Григоренко, 2019

Практична значимість. Отримані результати свідчать про доцільність використання пребіотику «Актиген» в рибництві та перспективу подальшого вивчення його впливу на фізіолого-біохімічні показники організму коропа.

Ключові слова: пребіотик, «Актиген», короп, рибопродуктивність, витрати корму, гідрохімічний режим, гідробіологічний режим.

PRODUCTIVE INDICES OF AGE-2 CARP AFTER APPLICATION OF A PREBIOTIC IN THEIR FEEDING

O. Dobryanska, olya_dobryanska@ukr.net, Lviv Research Station of the Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Velykyj Lubin

O. Deren, deren@if.org.ua, Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv

T. Hryhorenko, grygorenko-ukr.net, Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv

Purpose. To investigate the efficiency of the supplementation of the basic diet of age-3 carp with the prebiotic "Actigen" in pond conditions. To provide control over the aquatic environment conditions, to determine the effect of the tested supplement on the fish productivity of the experimental ponds and feed costs for fish cultivation.

Methodology. Experimental studies were conducted at the fish farm "Karpatskiy Vodograi" LLC of the Pustomyty district of Lviv region under the conditions of similar ponds with one source of water supply. Ponds were stocked with scaly carp yearlings with an average weight of 55 - 58 g, at a stocking density of 1000 fish/ha. The control group of fish was fed with a balanced compound feed, while three experimental groups were supplemented with 0.025% "Actigen" by granulation using the granulation method (Experiment 1); 0.05% (Experiment 2) and 0.075% (Experiment 3). The duration of the study was 60 days. Hydrochemical, hydrobiological and oxygen regimes of the aquatic environment were monitored during the growing season. Hydrochemical and hydrobiological studies were conducted according to the methods described by Alyokin O. A, Zhadin V. I. and Krazhan S. A.

Findings. Satisfactory conditions for carp cultivation were ensured during the growing season. The main parameters of the chemical composition of pond water were in accordance with the fishery standards, there were no peculiarities of changes in these parameters depending on the composition of fish diet. The dissolved oxygen concentration in water ranged from 3.8 to 8.8 mg/dm³. Quantitative development of zooplankton during the growing season was characterized by average parameters. The total number of zooplankton in the ponds ranged from 26.0 to 426.0 thousand ind./m³, and the biomass - from 2.20 to 11.19 g/m³.

It was found that the use of the prebiotic Aktiben prebiotic for feeding age-2 carp at the rate of 0.05%, 0.025% and 0.075% had a positive effect on the fish productivity in the experimental ponds: the average fish weight exceeded the values of the control group by 6.3%, 21.3% and 1.3%, respectively. fish productivity increased by 10.0%, 31.0% and 1.2%. In the same time, the feed costs for carp cultivation decreased by 1.1 (0.025% of the supplement) and 1.3 times (0.05% of the supplement) relative to control.

Originality. For the first time, the effect of the prebiotic action of "Actigen" was investigated, when it was introduced into the basic diet of age-2 carp on productive indices and feed costs.

Practical value. The obtained results indicate the feasibility of using Actigen in aquaculture and the prospect of further studies of its effect on the physiological and biochemical parameters of fish body.

Key word: prebiotic, Aktigen, carp, fish productivity, feed costs, hydrochemical regime, hydrobiological regime.

**ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДВУХЛЕТКОВ КАРПА
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОРМЛЕНИИ ПРЕБИОТИКА
В УСЛОВИЯХ ВЫРАСТНЫХ ПРУДОВ**

О. П. Добрянская, olya_dobryanska@ukr.net, Львовская опытная станция ИРХ НААН, пгт Великий Любень

О. В. Дерень, derenj@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Т. В. Григоренко, grygorenko-@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Исследовать эффективность дополнительного введения пребиотического препарата «Актиген» в состав основного рациона двухлетков карпа при выращивании в условиях прудов. Обеспечить контроль условий водной среды, определить влияние исследуемой добавки на рыбопродуктивность опытных прудов и затраты кормов на выращивание.

Методика. Экспериментальные исследования проведены на базе рыбного хозяйства ООО «Карпатский водограй» Пустомытовского района Львовской области в условиях прудов-аналогов с одним источником водоснабжения. Пруды зарыбили годовиками чешуйчатого карпа средней массой 55-58 г, из расчета 1000 экз./га. Контрольной группе рыб скормили сбалансированный комбикорм, а трем опытным группам дополнительно к основному рациону методом гранулирования вводили «Актиген» в количестве 0,025% (Опыт 1); 0,050% (Опыт 2) и 0,075% (Опыт 3). Продолжительность исследования составила 60 суток. В течение вегетационного периода осуществляли контроль гидрохимического, гидробиологического и кислородного режимов водной среды.

Гидрохимические и гидробиологические исследования проводили согласно методикам, описанным А. А. Альошиным, В. И. Жадиным и С. А. Кражан

Результаты. В течение вегетационного периода обеспечены удовлетворительные условия для выращивания карпа. Основные показатели химического состава прудовой воды соответствовали рыбоводным нормам; не было отмечено особенностей изменения данных показателей в зависимости от состава рациона рыб. Концентрация растворенного в воде кислорода колебалась в пределах от 3,8 до 8,8 мг/дм³. Количественное развитие зоопланктона в течение вегетационного периода характеризовалось средними показателями. Так, общая численность зоопланктона в прудах находилась в пределах от 26,0 до 426,0 тыс. экз./м³, а биомасса — от 2,20 до 11,19 г/м³.

Установлено, что использование в кормлении двухлетков карпа пребиотика «Актиген» из расчета 0,050; 0,025 и 0,075% положительно влияет на рыбопродуктивность прудов: средняя масса рыб превышала показатели контрольной группы соответственно на 6,3; 21,3 и 1,3%, рыбопродуктивность увеличилась на 10,0; 31,0 и 1,2%. При этом затраты кормов на выращивание карпа уменьшились в 1,1 (0,025% пребиотика) и 1,3 раза (0,050% добавки) относительно контроля.

Научная новизна. Впервые исследовано влияние препарата пребиотического действия «Актиген» при введении его в состав основного рациона двухлетков карпа на продуктивные показатели рыб и затраты корма.

Практическая значимость. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности использования «Актигена» в рыбоводстве и перспективе дальнейшего изучения его влияния на физиолого-биохимические показатели организма карпа.

Ключевые слова: пребиотик, «Актиген», карп, рыбопродуктивность, затраты корма, гидрохимический режим, гидробиологический режим.

**ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ**

Рациональне ведення рыбного господарства зумовлене забезпеченням фізіологічних потреб рыб, зокрема у поживних речовинах. Нормування та

балансування раціону є одним з основних чинників досягнення високих продуктивних показників у процесі вирощування риб [1–3]. Продуктивні та якісні характеристики рибної продукції насамперед залежать від фізіологічного стану організму риб. В даному аспекті показовим на певних етапах онтогенезу є функціональний стан травної системи загалом, а також склад мікрофлори кишечника [2, 3].

Важливим чинником, що впливає на раціональне використання кормів у рибництві, є введення до їхнього складу препаратів та добавок, які чинять позитивний вплив на перетравність поживних речовин та сприяють нормалізації мікрофлори кишечника риб. У даному контексті перспективними є препарати пребіотичної дії, які вибірково стимулюють ріст і/або активність захисної мікрофлори кишечника [2, 4, 5].

До пребіотиків відносяться органічні сполуки невеликої молекулярної маси — моно-, оліго- і полісахариди та органічні кислоти, які сприяють розвитку корисних мікробів та пригнічують дію шкідливих мікроорганізмів [2, 5, 6]. У тваринництві детально вивчено вплив та встановлено ефективність застосування окремих препаратів пребіотичної дії з метою покращення фізіолого-біохімічних показників організму різних видів тварин, а також конверсії корму [2–16]. В аквакультурі ж пребіотики почали використовувати лише нещодавно. Отримано позитивні результати їх введення до складу кормів для сибірського осетра та сома в якості альтернативи застосуванню антибіотиків та з метою підвищення резистентності організму і продуктивних показників [17–18].

Одним з таких препаратів є пребіотик «Актиген» (виробництва «Alltech», Inc) — це активний концентрат мананових олігосахаридів (МОС), який отримано із зовнішніх стінок клітин дріжджів *Saccharomyces cerevisiae*. Основна перевага цих складних вуглеводів полягає в їх здатності адсорбувати бактерії певних штамів, які мають фімбрії типу I (розпізнають манозу). Таким чином, включення до раціону МОС може запобігти колонізації кишечника певними патогенними мікроорганізмами. Використання препарату приводить до покращення цілісності шлунково-кишкового тракту, ефективної підтримки імунної системи і підвищення продуктивності [2, 3, 7].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Інтенсивність живлення риби оцінюють за ступенем перетравності корму, що відображає можливий обсяг засвоєння кормових компонентів, які всмоктуються в процесі переміщення по травному тракту. Він залежить від особливостей системи травлення риб, якості споживаного корму, сумісного впливу зовнішніх і внутрішніх чинників [19].

До нових кормових добавок, які налагоджують систему травлення і покращують перетравність поживних речовин корму відносяться пребіотики [20]. У зв'язку з цим, було проведено дослідження в лабораторних умовах і встановлено оптимальні дози введення пребіотика з метою оцінки його впливу на фізіологічний стан риби.

Метою досліджень було вивчення ефективності введення пребіотика «Актиген» до складу основного раціону дволіток коропа впродовж вегетаційного періоду в умовах вирощувальних ставів, з огляду на рибопродуктивні показники.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження з вивчення впливу пребіотика «Актиген» на продуктивність дволіток коропа проводилися на базі рибного господарства ТзОВ «Карпатський водограй» Пустомитівського району Львівської області в умовах ставів-аналогів з одним джерелом водопостачання. Для цього було використано чотири стави (три дослідних і один контрольний). Дослідні стави було зарибнено однорічками лускатого коропа середньою масою 55–58 г, із розрахунку 1000 екз./га. Годівлю проводили комбікормом, до складу якого входили, %: 50 — зерно пшениці, 9 — ячмінні висівки, 30 — соняшниковий шрот, 10 — м'ясо-кісткове борошно, 1 — крейда. Впродовж вегетаційного періоду коропам дослідних груп методом гранулювання додатково до основного раціону вводили «Актиген» у кількості 0,025% (Дослід 1), 0,050% (Дослід 2) та 0,075% (Дослід 3). Експериментальна годівля тривала 60 діб.

Перед зарибненням ставів, з метою дезінфекції, здійснювали їх вапнування. Впродовж вегетаційного періоду раз на місяць проводили контрольні лови та їхтіопатологічне обстеження риби, а також гідробіологічні та гідрохімічні дослідження.

Гідрохімічні та гідробіологічні дослідження здійснювали за методиками, описаними О. О. Альокінім [21], В. І. Жадінім [22] та С. А. Кражан [23].

Добову потребу корму визначали за комплексною оцінкою маси риби, розвитку природної кормової бази, температури води та вмісту розчиненого кисню у воді. Закладання і проведення дослідів відбувалося за загальноприйнятими в рибистві методиками [24].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Окрім забезпечення нормованої та повноцінної збалансованої годівлі коропа впродовж всього періоду вирощування важливим чинником є контроль фізичних та хімічних показників водного середовища. Тому, протягом вегетаційного періоду здійснювалося систематичне спостереження за кисневим, температурним, а також за гідрохімічним та гідробіологічним режимами експериментальних ставів.

Проведені дослідження хімічного складу води, динаміки вмісту біогенних елементів, розвитку природної кормової бази в дослідних та контрольному ставах надали можливість оцінити вплив згодовування пребіотика «Актиген» у складі основного раціону коропа на основні рибицькі показники.

Температура води експериментальних ставів коливалась у межах від 17 до 25°C. Різке підвищення температури води спостерігалось в середині червня (від 18 до 24°C). Решту періоду значення даного показника перебували в межах оптимальних величин, що сприяло раціональному засвоєнню корму та росту коропа.

Встановлено, що хімічний склад води досліджуваних ставів майже не відрізнявся, тому що в основному залежав від гідрохімічного стану єдиного для них джерела водопостачання (р. Ставчанка). Значення гідрохімічних показників середовища вирощування ілюструє таблиця 1. Слід відмітити, що водневий

показник був оптимальним для перебігу всіх біохімічних процесів у водоймі і коливався від 7,1–7,3 (навесні) до 8,1–8,3 (влітку).

Коливання показника перманганатної окиснюваності як на початку сезону, так і влітку було незначним і утримувалося в межах нормативних значень, середні значення змінювалися від 7,0 до 13,9 мгО₂/дм³ із максимальним показником в кінці сезону в ставу Дослід 2–13,9 мгО₂/дм³. Це вплинуло і на вміст розчиненого у воді кисню. Загалом, в усіх ставах його концентрація коливалась від 3,3 до 8,8 мгО₂/дм³. Навіть влітку, за високих температур, коли розчинність кисню знижується, його кількість не була нижчою, ніж 3,3 мгО₂/дм³. Це свідчить про задовільні умови вирощування риби в усіх експериментальних ставах.

Концентрація біогенних речовин у ставовій воді була незначною, але саме ці елементи визначають рівень біопродуктивності водних об'єктів і, таким чином, зумовлюють якість води [25]. Нітриту впродовж періоду вирощування риби були або відсутні, або присутні в мінімальних кількостях (0,001–0,010 мгN/дм³). Нітратний азот до середини сезону був відсутній і тільки в серпні, із сповільненням біохімічних процесів у водоймі, був зафіксований в невеликій кількості із максимальним показником у контрольному ставу — 0,30 мгN/дм³. В інших ставах концентрація його поступово знижувалась від 0,20 мгN/дм³ до повної відсутності.

Таблиця 1. Хімічний склад води дослідних ставів, min–max/сер.

Table 1. The chemical composition of the water in the test ponds, min–max/average

Показники / Indicator	Дослід 1 / Experiment 1	Дослід 2 / Experiment 2	Дослід 3 / Experiment 3	Контроль / Control	Нормативне значення [26] / Statutory value [26]
pH	<u>7,2–8,0</u> 7,5	<u>7,3–8,1</u> 7,6	<u>7,1–8,1</u> 7,5	<u>7,2–8,2</u> 7,6	6,5–8,5
Перманганатна окиснюваність, мгО ₂ /дм ³ / Permanganate oxygen consumed, mgO ₂ /dm ³	<u>7,0–11,2</u> 8,9	<u>8,6–13,9</u> 12,0	<u>8,4–10,3</u> 9,1	<u>9,9–12,5</u> 11,2	15,0
Лужність, мг-екв./дм ³ / Alkaline hardness, mg- equiv./dm ³	<u>2,8–4,7</u> 4,0	<u>2,7–4,8</u> 4,1	<u>2,6–4,7</u> 3,9	<u>2,7–4,9</u> 4,0	3,0–6,0
HCO ₃ ⁻ , мг/дм ³ / mgN/dm ³	<u>170,8– 286,7</u> 244,2	<u>164,7– 292,8</u> 250,1	<u>158,6–286,7</u> 242,1	<u>164,7–298,9</u> 246,2	200–400
NO ₂ ⁻ , мгN/дм ³ / mgN/dm ³	<u>0,0–0,01</u> 0,003	<u>0,0–0,03</u> 0,010	<u>0,0–0,01</u> 0,006	<u>0,0–0,002</u> 0,001	0,100
NH ₄ ⁺ , мгN/дм ³ / mgN/dm ³	<u>0,09–0,23</u> 0,15	<u>0,12–0,25</u> 0,19	<u>0,10–0,23</u> 0,16	<u>0,06–0,30</u> 0,16	1,0
NO ₃ ⁻ , мгN/дм ³ / mgN/dm ³	<u>0,0–0,10</u> 0,04	<u>0,0–0,09</u> 0,04	<u>0,0–0,20</u> 0,07	<u>0,0–0,30</u> 0,11	до 2,0

Продовження табл. 1
Continuation of the table 1

Показники / Indicator	Дослід 1 / Experiment 1	Дослід 2 / Experiment 2	Дослід 3 / Experiment 3	Контроль / Control	Нормативне значення [26] / Statutory value [26]
PO_4^{3-} , мгР/дм ³ , mgP/dm ³	<u>0,08–0,18</u> 0,14	<u>0,18–0,22</u> 0,20	<u>0,11–0,22</u> 0,15	<u>0,09–0,27</u> 0,21	0,50
Fe^{2+3+} , мкг/дм ³ /mkg/dm ³	<u>0,35–0,43</u> 0,39	<u>0,30–0,39</u> 0,36	<u>0,32–0,45</u> 0,39	<u>0,38–0,49</u> 0,42	1,80
Твердість загальна, мг- екв./дм ³ / Total hardness, mg-equiv/dm ³	<u>3,5–4,7</u> 4,2	<u>3,4–4,5</u> 4,1	<u>3,5–4,6</u> 4,1	<u>3,4–4,6</u> 4,2	3,0–7,0
Ca^{2+} , мг/дм ³ /mg/dm ³	<u>54,0–81,0</u> 71,0	<u>52,0–82,0</u> 71,3	<u>54,0–82,0</u> 71,3	<u>50,0–82,0</u> 70,0	40,0–60,0
Mg^{2+} , мг/дм ³ /mg/dm ³	<u>4,9–9,7</u> 7,7	<u>4,9–9,7</u> 6,5	<u>4,9–9,7</u> 6,9	<u>3,6–10,9</u> 6,7	до 30,0
Cl^- мг/дм ³ / mg/dm ³	<u>20,8–22,6</u> 21,5	<u>20,1–22,4</u> 21,4	<u>20,5–22,0</u> 21,3	<u>20,6–22,3</u> 21,6	50,0–70,0
Сульфати/Sulfates, мг/дм ³ /mg/dm ³	<u>110,0–</u> <u>120,0</u> 115,0	<u>112,0–</u> <u>121,0</u> 117,6	<u>114,0–121,0</u> 117,6	<u>112,0–122,0</u> 118,0	50,0–70,0
$\Sigma \text{K}^+, \text{Na}^+$, мг/дм ³ / ΣK^+ , Na^+ , mg/dm ³	<u>54,8–85,0</u> 71,1	<u>54,3–88,3</u> 75,9	<u>52,0–88,0</u> 72,3	<u>54,5–85,3</u> 74,3	до 120
Мінералізація/Mineraliza- -tion, мг/дм ³ /mg/dm ³	<u>420,0–</u> <u>591,0</u> 530,5	<u>413,0–</u> <u>609,6</u> 543,2	<u>409,0–600,0</u> 531,7	<u>413,0–614,0</u> 537,0	300,0–1000,0
Розчинений кисень / Dissolved oxygen, мгO ₂ /дм ³ /mgO ₂ /dm ³	<u>3,8–8,2</u> 6,3	<u>3,3–6,5</u> 4,9	<u>4,2–5,8</u> 5,4	<u>4,1–8,8</u> 6,2	≥5,0

Концентрація амонійного азоту в усіх ставах впродовж вегетаційного періоду перебувала в межах нормативних значень (0,09–0,30 мгN/дм³), дещо знижуючись до осені. Мінеральний фосфор, як один із важливих біогенних елементів, в усіх ставах зафіксовано в достатній кількості для розвитку природної кормової бази. Кількість його зростала від весни до осені вдвічі (0,09–0,27 мгР/дм³ в контрольному ставу та 0,08–0,22 мгР/дм³ в дослідних ставах) (табл. 1).

Вміст заліза у воді поступово зростав від весни до осені (0,30–0,49 мг/дм³), проте не перевищував нормативних значень.

Твердість води усіх ставів була помірною. Серед катіонів у ставовій воді переважав кальцій, високі показники якого (52,0–82,0 мг/дм³) зумовлювали і величину загальної твердості: 3,4–4,6 мг-екв/дм³ в контрольному та 3,4–4,7 мг-екв/дм³ в дослідних ставах. А серед аніонів переважали гідрокарбонати (HCO_3^-), значення яких були невисокими за весь період годівлі риби, коливаючись від 158,6 до 298,9 мг/дм³.

Вміст хлоридів був незначним і майже однаковим в усіх ставах за весь період досліджень (20,1–22,4 мг/дм³).

Слід зауважити високий вміст сульфатів у досліджуваній воді, що є закономірним для ставів даного господарства і пов'язано з якістю води джерела водопостачання. Проте, це не чинило шкідливого впливу на рибу.

Отже, впродовж усього періоду проведення досліджень хімічний склад води дещо змінювався, проте суттєвої різниці у величинах контрольного та дослідних ставів не зафіксовано. В загальному, основні показники якості ставової води відповідали рибиницьким нормам і середовище було придатним для вирощування риби.

Зоопланктон експериментальних ставів впродовж вегетаційного періоду був представлений організмами, які відносяться до трьох основних груп: *Rotifera*, *Copepoda*, *Cladocera*. Видове різноманіття зоопланктону було незначним — всього було виявлено 16 таксонів організмів. Ключове положення в таксономічному спектрі (співвідношенні основних таксономічних груп за кількістю видів) посідали гіллястовусі ракоподібні, складаючи 50,0%. Коловертки становили 31,2% від усіх виявлених видів. Частка веслоногих ракоподібних не перевищувала 18,8% і була представлена видами родин *Cyclopidae* та *Diaptomidae*. Таким чином, видовий спектр зоопланктону мав кладоцерно-ротаторний характер.

Група інших організмів у зоопланктонних пробах була представлена планктонними формами личинок хірономід (*Chironomidae larvae*), веснянок (*Plecoptera larvae*), одноденок (*Ephemeroptera larvae*), черепашковими рачками (*Ostracoda* sp.) та ефіпіумами ракоподібних.

Серед основних видів коловерток, що зустрічалися в усіх ставах були: *Asplanchna priodonta*, *Brachionus calyciflorus*; із гіллястовусих ракоподібних — *Daphnia longispina*, *Moina rectirostris*, *Scapholeberis mucronata*, *Ceriodaphnia affinis*, *Chydorus sphaericus*; із веслоногих рачків — *Cyclops* sp., їх наупліальні та копеподитні стадії розвитку.

Кількісний розвиток зоопланктону впродовж літнього періоду в експериментальних ставах характеризувався середніми показниками. Так, загальна чисельність зоопланктону в ставах знаходилася в межах від 26,0 до 426,0 тис. екз./м³, а біомаса — від 2,20 до 11,19 г/м³.

Максимальні показники біомаси зоопланктону (5,26–11,19 г/м³) в ставах спостерігалися в червні та липні, переважно за рахунок розвитку *Moina rectirostris*, *Daphnia longispina*, *Chydorus sphaericus*, *Scapholeberis mucronata*. Найнижчі показники розвитку зоопланктону в усіх ставах були в серпні, коли значення біомаси знаходилися в межах 2,20–3,28 г/м³.

Середні за літній період показники розвитку зоопланктону в експериментальних ставах перебували на рівні 76,0–197,7 тис. екз./м³ за чисельністю та 3,83–8,00 г/м³ за біомасою. При цьому, найвища біомаса була характерна для ставу Дослід 3, а найнижча — ставу Дослід 1 (табл. 2).

Основу як чисельності (55,5–83,3%), так і біомаси (70,5–93,7%) зоопланктону в усіх ставах формували цінні в кормовому значенні гіллястовусі ракоподібні,

проте їхня частка в ставу Досліді 3 та контрольному була вищою, і становила відповідно 80,6–83,3 та 91,8–93,7%.

Слід також зазначити, що для ставів Досліді 3 та контролю впродовж усього періоду було характерним домінування в розвитку зоопланктону крупних форм гіллястовусих ракоподібних (*Moina rectirostris*, *Daphnia longispina*), тоді як в ставах Досліді 1 та Досліді 2 впродовж усього періоду в більшості домінували дрібніші форми (*Scapholeberis mucronata*, *Chydorus sphaericus*, *Ceriodaphnia affinis*).

Отже, загальна біомаса зоопланктону була практично однаковою як в дослідних, так і в контрольному ставах, і не чинила суттєвого впливу на результати вирощування об'єкта дослідження.

Зообентос в усіх експериментальних ставах був представлений, в основному, личинками хірономід. Середні біомаси донної фауни за період вирощування риби знаходилися в межах 1,2–2,0 г/м².

Таблиця 2. Середні показники розвитку зоопланктону за період вирощування дволіток коропа в експериментальних ставах ТзОВ «Карпатський водограй»

Table 2. Average indices of zooplankton development for the period of two-year carp cultivation in experimental ponds of Ltd. "Karpatskyi vodohrai"

Основні групи організмів / The main groups of organisms	Контроль / Control		Дослід 1 / Experiment 1		Дослід 2 / Experiment 2		Дослід 3 / Experiment 3	
	тис.екз./м ³		тис.екз./м ³		тис.екз./м ³		тис.екз./м ³	
	г/м ³		г/м ³		г/м ³		г/м ³	
	thous.un./m ³	%	thous.un./m ³	%	thous.un./m ³	%	thous.un./m ³	%
	g/m ³		g/m ³		g/m ³		g/m ³	
<i>Rotifera</i>	<u>1,0</u>	<u>1,3</u>	<u>1,7</u>	<u>2,2</u>	<u>2,0</u>	<u>1,0</u>	<u>0,7</u>	<u>0,8</u>
	0,007	0,1	0,01	0,3	0,01	0,2	0,003	0,04
<i>Copepoda</i>	<u>9,7</u>	<u>12,8</u>	<u>29,6</u>	<u>38,4</u>	<u>57,7</u>	<u>29,2</u>	<u>13,0</u>	<u>15,1</u>
	0,290	5,0	0,50	13,0	1,56	26,2	0,250	3,10
<i>Cladocera</i>	<u>63,3</u>	<u>83,3</u>	<u>42,7</u>	<u>55,5</u>	<u>130,7</u>	<u>66,1</u>	<u>69,3</u>	<u>80,6</u>
	5,440	93,7	3,13	81,7	4,20	70,5	7,350	91,80
Інші / Others	<u>2,0</u>	<u>2,6</u>	<u>3,0</u>	<u>3,9</u>	<u>7,3</u>	<u>3,7</u>	<u>3,0</u>	<u>3,5</u>
	0,070	1,2	0,19	5,0	0,19	3,1	0,400	5,00
Всього / Total	<u>76,0</u>	<u>100</u>	<u>77,0</u>	<u>100</u>	<u>197,7</u>	<u>100</u>	<u>86,0</u>	<u>100</u>
	5,807	100	3,83	100	5,96	100	8,003	100

Результати вирощування дволіток коропа при додаванні до основного раціону пребіотичного препарату ілюструє таблиця 3.

В результаті додавання до корму пребіотика «Актиген», середня маса дволіток коропа дослідних груп перевищувала показники контрольної, відповідно на 6,3 (Дослід 1); 21,3 (Дослід 2) та 1,3% (Дослід 3).

Оскільки при цьому рівень виживання риб був практично однаковим, то рибопродуктивність дослідних ставів відповідно збільшилась відносно контролю

на 10,0 (Дослід 1); 31,0 (Дослід 2) та 1,2% (Досліді 3).

Окрім цього, отримано економію витрат кормів на вирощування дволіток коропа: в Досліді 1 — на 6,7% і в Досліді 2 — на 20%. В Досліді 3 витрати кормів були практично такими ж, як і в контрольній групі. Кормовий коефіцієнт в Досліді 1 (0,025% добавки) та Досліді 2 (0,050% пребіотика) був у 1,1 та 1,3 раза менший, ніж такий Контролю.

Таблиця 3. Результати вирощування дволіток коропа з додаванням до основного раціону препарату «Актиген»

Table 3. The results of growing two-year carp with the addition to the main diet of the drug "Actigen"

Група риб / Group of fish	Площа ставу, га / Pond area, ha	Посаджено на вирощування / Stock up			Виловлено / Catch				Рибо- прод-ть, кг/га / Fish product- ivity kg/ha	Витрати корму / Feed consump- tion	
		всього, екз. / total, speci- men	заг. маса, кг / total weight, kg	сер. маса, г / avera- ge wight, g	всього, екз. / total, speci- men	заг. маса, кг / total weight, kg	сер. маса, г / avera- ge wight, g	вихід, % / yield, %		кг / kg	од. / units
Дослід 1 / Experiment 1	0,15	150	8,3	55	129	76	590	86	451	213	2,8
Дослід 2 / Experiment 2	0,15	150	8,4	56	132	89	673	88	537	213	2,4
Дослід 3 / Experiment 3	0,15	150	8,7	58	127	71	562	85	415	213	3,0
Контроль / Control	0,20	200	11,0	55	168	93	555	84	410	280	3,0

Отримані продуктивні показники свідчать про більш виражену ефективність використання «Актигену» в складі раціону дволіток коропа в кількості 0,025 та 0,05%.

Є позитивні напрацювання використання даної пребіотичної добавки в тваринництві та рибництві. Результати досліджень американських вчених підтверджують ефективність використання пребіотика «Актиген» для покращення ефективності росту свиней та стійкості імунної системи [8]. Доведено, що при згодовуванні 0,08% «Актигену» до щоденного корму сибірського осетра спостерігалось зростання темпів росту, коефіцієнта перетравності корму та виживання риб в порівнянні з контрольною групою [17]. А додавання даного пребіотика в кількості 0,08 або 0,12% до раціону сома збільшувало приріст його маси та позитивно впливало на активність ферментів [18]. З огляду на наведене вище та спираючись на отримані позитивні рибницькі дані при додаванні пребіотика «Актиген» до раціону

дволіток коропа, перспективним та доцільним є подальші вивчення та комплексна оцінка впливу даного препарату на фізіолого-біохімічні показники організму риб.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Основні показники хімічного складу ставової води відповідали рибиницьким нормам; не відмічено зміни даних показників в залежності від складу раціону риб.

Кількісний розвиток зоопланктону впродовж вегетаційного періоду в експериментальних ставах був задовільним і характеризувався середніми показниками. Зокрема, загальна чисельність зоопланктону в ставах знаходилася в межах від 26,0 до 426,0 тис. екз./м³, а біомаса — від 2,20 до 11,19 г/м³. Загальна біомаса зоопланктону була практично однаковою як в дослідних, так і в контрольному ставах, і не чинила суттєвого впливу на результати вирощування дволіток коропа. Середні значення біомаси донної фауни за період вирощування знаходилися в межах 1,2–2,0 г/м².

За введення до складу раціону дволіток коропа «Актигену» з розрахунку 0,025; 0,05 і 0,075% середня маса риб перевищувала показники контрольної групи відповідно на 6,3; 21,3 та 1,3%, рибопродуктивність збільшилась на 10,0; 31,0 та 1,2%. Витрати кормів на вирощування зменшились за введення «Актигену» з розрахунку 0,025 і 0,050% відповідно в 1,1 та 1,3 раза відносно Контролю.

Отримані результати свідчать про ефективність використання пребіотичного препарату «Актиген» в кількості 0,025 та 0,050% у складі раціону дволіток коропа та доцільність подальшої комплексної оцінки впливу даної добавки на фізіолого-біохімічні показники організму риб.

ЛІТЕРАТУРА

1. Фермерське рибиництво / Грициняк І. І. та ін. Київ : Герб, 2008. 560 с.
2. Чернікова Г. Ю., Пономаренко Н. П. Використання пребіотиків на основі мананових олігосахаридів у годівлі курчат-бройлерів // Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2016. Вип. 2, ч. 2. С. 155—159.
3. Chernikova G., Procopenko N. Slaughter quality of broiler-chickens by prebiotic Actigen using // Agrobiodiversity. 2017. P. 50—53.
4. Aquaculture nutrition. Gut health, probiotics and prebiotics / ed. Merrifield D., Ringo E. Chichester : Wiley-Blackwell Publishing, 2014. 465[29] p.
5. Тарасенко Н. А., Филиппова Е. В. Кратко о пребиотиках: история, классификация, получение, применение // Фундаментальные исследования. 2014. №6—1. URL : <http://cyberleninka.ru/article/n/kratko-o-prebiotikah-istoriya-klassifikatsiya-poluchenieprimenenie>.
6. Спринг П. Маннанные олигосахариды – влияние на кишечную микрофлору и здоровье животных // Сб. науч. публикаций «Alltech». 2004. С. 10—15.
7. Yaroshenko F., Dvorska J., Surai P. Mycotoxins in poultry production; problems and solutions // Poultry International. 2003. № 3. P. 12—16.
8. Actigen improves growth efficiency and immune responses in pigs experimentally infected with PRRS virus / Che T. M. et al. // Science and Technology in the Feed Industry: Alltech's 27th International symposium, May 22-25, 2011 : conclusion of posters presented. Lexington, KY, USA, 2011.

9. Effects of mannanoligosaccharide in broiler chicken diets on growth performance, energy utilisation, nutrient digestibility, and intestinal microflora / Yang Y. et al. // British Poultry Science. 2008. Vol. 49. P. 186—194.
10. Вовченко Б. О., Пентилук С. І., Сморочинський О. М. Вплив біопрепаратів на продуктивність баранців // Таврійський науковий вісник. 2012. Вип. 81. С. 240—245.
11. Дворская Ю. Маннанолигосахариды — альтернатива ростостимулирующим антибиотикам для свиней // Тваринництво сьогодні. 2013. № 5. С. 38—42.
12. «Актиген» підвищує вміст імуноглобулінів у молозиві свиноматок / Толстих Р. та ін. // Передова технологія. 2011. № 5–6(09–10). С. 50—51.
13. Мельник М. О. Вплив нового пребіотичного препарату на продуктивність свиноматок // Аграрна наука та харчові технології. 2017. Вип. 3 (97). С. 268—274.
14. Лихач В. Я. Обґрунтування, розробка та впровадження інтенсивно-технологічних рішень у свинарстві : дис. ... доктора с.-г. наук. Миколаїв : Національний аграрний університет, 2015. 479 с.
15. Прудченко Д. В. Показники продуктивності свиней при застосуванні різних препаратів // Біологічні, технологічні і екологічні аспекти виробництва та переробки продукції тваринництва : II Міжнар. студ. наук. конф., Кам'янець-Подільський, 14-16 березня 2012 р. : матер. Кам'янець-Подільський, 2012. С. 54—56.
16. Тухбатов И. А. Повышение продуктивных качеств цыплят-бройлеров при использовании в рационе минеральных и органических кормовых добавок : дисс. ... доктора с.-х. наук. Троицк : Оренбургский государственный аграрный университет, 2017. 339 с.
17. Sverinciuc C., Bențea M. I., Sara A. The effects of some fodder additives on growth performance of Siberian sturgeon (*Acipenser baeri*) // Agriculture - Science and Practice. 2017. № 1–2. P. 101—102).
18. Le Thanh Hung. Building new aquafeeds: Feeding for health and performance in Tra catfish (*Pangasiaodon hypophthalmus*) // Science and Technology in the Feed Industry: Alltech's 28th Annual International symposium, May 20-23, 2012 : conclusion of posters presented. Lexington, KY, USA, 2012.
19. Інтенсивні технології в аквакультурі / Кононенко Р. та ін. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 410 с.
20. Кондратюк В. М., Кривенок М. Я., Ільчук І. І. Конспект лекцій з дисципліни «Годівля риб». Київ, 2016. 46 с.
21. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеиздат, 1970. 412 с.
22. Жадин В. И. Изучение водной фауны водоёмов. Москва : АН СССР. 1950. 30 с.
23. Кражан С. А. Природна кормова база вирощувальних та нагульних ставів і шляхи її покращення (методичні рекомендації). Київ, 1997. С. 14—16.
24. Желтов Ю. А. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб // Рибне господарство, 2003. Вип. 62. С. 23—28.
25. Аналітична хімія поверхневих вод / Набиванець Б. Й. та ін. Київ : Наукова думка, 2007. 456 с.
26. СОУ – 05.01. – 37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Мін-во аграрної політики України, 2006. 22 с. (Стандарт Мінагрополітики України).

REFERENCES

1. Hritsyniak, I. I., Grinzhevsky, M. V., Tretyak, O. M., Kiva, M. S., & Mruk A. I. (2008). *Farmer Fish Farming*. Kyiv.
2. Chernikova, G. Yu., & Ponomarenko, N. P. (2016). Use of prebiotics based on mannan oligosaccharides in feeding broiler chickens. *Bulletin of the Agrarian Science of the Black Sea*, 2, 2, 155-159.
3. Chernikova, Ganna, & Procopenko, Nataliia. (2017). Slaughter quality of broiler-chickens by prebiotic Actigen using. *Agrobiodiversity*, 50-53.
4. Merrifield, D., & Ringo, E. (Eds.). (2014). *Aquaculture nutrition. Gut health, probiotics and prebiotics*. Chichester: Wiley-Blackwell Publishing.
5. Tarasenko, N. A., & Filippova, E. V. (2014). Briefly on prebiotics: history, classification, preparation, application. Basic research, 6-1. *cyberleninka.ru*. Retrieved from [http:// cyberleninka.ru/article/n/kratko-o-prebiotikah-istoriya-klassifikatsiyapoluchenieprimene-nie](http://cyberleninka.ru/article/n/kratko-o-prebiotikah-istoriya-klassifikatsiyapoluchenieprimene-nie).
6. Spring, P. (2004). Mannan oligosaccharides - effect on the intestinal microflora and animal health. *Sat. scientific Alltech publications*, 10-15.
7. Yaroshenko, F., Dvorska, J., & Surai, P. (2003). Mycotoxins in poultry production; problems and solutions. *Poultry International*, 3, 12-16.
8. Che, T. M., Song, M., Johnson, R. W., Kelley, K. W., & Van Alstine, W. G. (2011). Actigen improves growth efficiency and immune responses in pigs experimentally infected with PRRS virus. *Science and Technology in the Feed Industry: Alltech's 27th International symposium, May 22-25, 2011 (conclusion of posters presented)*. Lexington, KY, USA.
9. Yang, Y., Iji, P. A., Kocher, A., Thomson, E., Mikkelsen, L. L., & Choct, M. (2008). Effects of mannanoligosaccharide in broiler chicken diets on growth performance, energy utilisation, nutrient digestibility, and intestinal microflora. *British Poultry Science*, 49, 186-194.
10. Vovchenko, B. A., Pentylyuk, S. I., & Smorochinsky, O. M. (2012). Influence of biologicals on the productivity of sheep. *Tavriysky Nauchnyk Visnyk*, 81, 240-245.
11. Dvorskaya, Yu. (2013). Mannoligosaccharides - an alternative to growth-stimulating antibiotics for pigs. *Livestock Today*, 5, 38-42.
12. Tolstoy, Ruslan, Baglaj, Andrew, Tkachik, Vladimir, & Dvorska, Yulia. (2011). "Aktigen" increases the content of immunoglobulins in sow colostrum. *Advanced technology*, 5-6 (09-10), 50-51.
13. Melnyk, M. O. (2017). Influence of new prebiotic preparation on sows productivity. *Agrarian science and food technologies*, 3 (97), 268-274.
14. Likhach, V. Ya. (2015). Rationale, development and implementation of intensive technological solutions in pig production: dissertation. *Doctor's thesis*. Mykolaiv: National Agrarian University.
15. Prudchenko, D. V. (2012). Performance indicators of pigs in the use of different drugs. *Proceedings of the II International Student Scientific Conference: Biological, technological and environmental aspects of production and processing of livestock products, March 14-16, 2012*. Kamyanets-Podilsky, 54-56.
16. Tukhbatov, I. A. (2017). Improving the productive qualities of broiler chickens when used in the diet of mineral and organic feed additives. *Doctor's thesis*. Troitsk: FSBEI HE Orenburg State Agrarian University.

17. Sverinciuc, C., Bențea, M. I., & Sara, A. (2017). The effects of some fodder additives on growth performance of Siberian sturgeon (*Acipenser baeri*). *Agriculture Science and Practice*, 1-2, 101-102.
18. Le Thanh Hung. (2012). Building new aquafeeds: Feeding for health and performance in Tra catfish (*Pangasiasodon hypophthalmus*). *Science and Technology in the Feed Industry: Alltech's 28th Annual International symposium, May 20-23, (conclusion of posters presented)*. Lexington, KY, USA.
19. Kononenko, R., Shevchenko, P., Kondratyuk, V., & Kononenko, I. (2019). *Intensive technologies in aquaculture*. Kyiv: Center for Educational Literature.
20. Kondratyuk, V. M., Kryvenok, M. Ya., & Ilchuk, I. I. (2016). *Summary of lectures on the discipline "Feeding of fishes"*. Kyiv.
21. Alekin, O. A. (1970). *Fundamentals of hydrochemistry*. Moscow: Gidrometeoizdat.
22. Zhadin, V. I. (1950). *The study of the aquatic fauna of reservoirs*. Moscow: Publishing house of the USSR Academy of Sciences.
23. Krazhan, S. A. (1997). *Natural forage base of growing and feeding joints and ways of its improvement (methodical recommendations)*. Kyiv, 14-16.
24. Zheltov, Yu. A. (2003). Methodical instructions for conducting experiments on feeding fish. *Fisheries*, 62, 23-28.
25. Nabivaniets, B. I., Osadchy, V. I., Osadcha, N. M., & Nabivaniets, Yu. B. (2007). *Analytical chemistry of surface waters*. Kyiv: Naukova dumka.
26. Water of fishery enterprises. General requirements and norms. (2006). *SOU-05.01.-37-385:2006*. Kyiv: Ministry of Agrarian Policy of Ukraine.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОЩУВАННЯ ТОВАРНОГО КОРОПА (*CYPRINUS CARPIO* LINNAEUS, 1758) ПРИ ВИКОРИСТАННІ В СКЛАДІ РАЦІОНУ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ (*SILYBUM MARIANUM* (L.) GAERTN)

М. З. Коріляк, stasiv8@gmail.com, Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт Великий Любін

Мета. Метою роботи було дослідження доцільності та ефективності застосування розторопші плямистої (*Silybum marianum* L.) в процесі товарного вирощування коропа з огляду на продуктивні та економічні показники.

Методика. Дослідження проведено у двох дослідних та контрольному ставах, які зарибнено однорічками коропа із розрахунку 1000 екз./га. Коропам першої дослідної групи впродовж вегетаційного періоду до складу раціону додатково введено 1% розторопші плямистої, другої дослідної групи — 5%. У ході роботи забезпечено оптимальні умови утримання коропа, при цьому здійснено контроль кисневого, температурного, гідрохімічного та гідробіологічного режимів водного середовища та аналіз ефективності вирощування в кінці вегетаційного періоду за загальноприйнятими у рибництві методиками.

Результати. Загалом умови вирощування риби в дослідних і контрольному ставах були задовільними. Не відмічено залежності між гідрохімічним режимом експериментальних ставів і складом раціону. Середньосезонні показники біомаси кормових організмів зоопланктону та зообентосу впродовж вегетаційного періоду відповідно складала 4,22–5,11 г/м³ та 1,37–1,62 г/м² і однаково сприяли процесу вирощування коропів як у дослідних варіантах, так і у контрольному.

Було встановлено, що середня маса коропів, яким до складу раціону введено 1 і 5% розмеленого насіння розторопші плямистої, була вищою відповідно на 7,3 і 5,6%, рибопродуктивність — на 9,8 і 7,2%. При цьому витрати корму на кілограм вирощеної продукції знизились на 5,9 і 8,8% відносно контролю.

Вартість додатково отриманої рибної продукції при введенні до раціону насіння розторопші в кількості 1% складала 11849 грн./га, 5% — 10217 грн./га. Умовний прибуток, враховуючи витрати на корми і посадковий матеріал, із застосуванням 1% розторопші був на 13,1% більшим, ніж у контролі, 5% — на 0,7% більшим у контрольній групі.

Наукова новизна. Відповідно до широкого спектру біологічно активних властивостей розторопші плямистої, вперше вивчено вплив даної добавки на продуктивні та економічні показники в процесі вирощування дволіток коропа. Впровадження поставленого завдання забезпечило можливість підвищення рибопродуктивності ставів за рахунок згодовування штучних кормів покращеного складу.

Практична значимість. Зниження собівартості та отримання додаткових приростів при вирощуванні рибної продукції забезпечено удосконаленням якісних характеристик корму та, відповідно, фізіологічних показників організму дволіток коропа.

Ключові слова: короп, розторопша плямиста, біологічно активна добавка, гідрохімічні та гідробіологічні показники, розмірно-вагові показники, витрати кормів, ефективність вирощування.

INCREASING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL REARING OF THE COMMON CARP (*CYPRINUS CARPIO* LINNAEUS, 1758) WITH THE USE OF MILK THISTLE (*SILYBUM MARIANUM* (L.) GAERTN) IN THE RATION COMPOSITION

M. Korilyak, stasiv8@gmail.com, Lviv Experimental Station of the Institute of Fisheries NAAS, Velykyi Lyubin

Purpose. The purpose of the study was to investigate the feasibility and efficiency of the use of milk thistle in the process of commercial cultivation of the common carp in terms of productive and economic indicators.

Methodology. The study was conducted in two experimental and control ponds, which were stocked with carp yearlings at a density of 1000 ind./ha. The carp of the first experimental group during the growing season were additionally fed with a diet containing 1% of milk thistle, while the second experimental group – 5%. During the work, optimal conditions of carp cultivation were maintained. The dissolved oxygen, temperature hydro-chemical and hydro-biological regimes of the aquatic environment were monitored and the efficiency of cultivation at the end of the growing season was analyzed by conventional methods.

Findings. In general, the conditions of fish cultivation in the experimental and control ponds were satisfactory. No relationship was observed between the hydro-chemical regime of the experimental ponds and the diet composition. The average seasonal biomass of feed organisms of zooplankton and zoobenthos during the growing season were 4.22 – 5.11 g/m³ and 1.37 – 1.62 g/m² respectively, and equally contributed to the process of carp cultivation both in experimental variants and in the control.

It was found that the average weight of carps fed with diets contained 1% and 5% of ground milk thistle was higher by 7.3% and 5.6%, respectively, fish productivity – by 9.8% and 7.2%. At the same time feed costs per kilogram of production decreased by 5.9% and 8.8% compared to the control.

The cost of additionally obtained fishery products when supplementing the diet with 1% of milk thistle amounted to 11849 UAH/ha, 5% – 10217 UAH/ha. The attributable profit, including costs of feed and fish seeds, when using 1% of milk thistle was 13.1% higher than in the control, 5% – 0.7% higher in the control group.

Scientific novelty. According to a wide range of biologically active properties of milk thistle, the effect of this additive on the productive and economic indicators in the process of age-2 carp has been studied for the first time. The implementation of this practice provided an opportunity to increase fish productivity by feeding fish with artificial feeds of improved composition.

Practical value. Reducing the cost and obtaining additional weight gains during the cultivation of aquaculture products can be ensured by improving the quality characteristics of fish feeds, and, accordingly, the physiological parameters of age-2 carp organism.

Keywords: carp, milk thistle, biologically active supplement, hydro-chemical and hydro-biological characteristics, size and weight indexes, feed costs, cultivation efficiency.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ КАРПА (*CYPRINUS CARPIO* LINNAEUS, 1758) ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В СОСТАВЕ РАЦИОНА РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ (*SILYBUM MARIANUM* (L.) GAERTN)

М. З. Кориляк, stasiv8@gmail.com, Львовская опытная станция Института рыбного хозяйства НААН, пгт Великий Любень

Цель. Целью работы было исследование целесообразности и эффективности применения расторопши пятнистой (*Silybum marianum* L.) в процессе товарного выращивания карпа, с учетом продуктивных и экономических показателей.

Методика. Исследование проведено в двух опытных и контрольном прудах, зарыбленных годовиками карпа из расчета 1000 экз./га. Карпам первой опытной группы в течение вегетационного периода в состав рациона дополнительно вводили 1% расторопши пятнистой, второй опытной группы — 5%. В ходе работы обеспечили оптимальные условия содержания карпа, при этом осуществляли контроль кислородного, температурного, гидрохимического и гидробиологического режимов водной среды и анализ эффективности выращивания в конце вегетационного периода по общепринятым в рыбоводстве методикам.

Результаты. В целом условия выращивания рыбы в опытных и контрольном прудах были удовлетворительными. Не было отмечено зависимости между гидрохимическим режимом экспериментальных прудов и составом рациона. Среднесезонные показатели биомассы кормовых организмов зоопланктона и зообентоса в течение вегетационного периода соответственно составляли 4,22–5,11 г/м³ и 1,37–1,62 г/м², в одинаковой степени способствуя процессу выращивания карпов, как в опытных вариантах, так и в контрольном.

Было установлено, что средняя масса карпов, которым в состав рациона вводили 1 и 5% размолотых семян расторопши пятнистой была выше соответственно на 7,3 и 5,6%, рыбопродуктивность — на 9,8 и 7,2%. При этом затраты корма на килограмм выращенной продукции снизились на 5,9 и 8,8% относительно контроля.

Стоимость дополнительно полученной рыбной продукции при введении в рацион семян расторопши в количестве 1% составила 11849 грн./га, 5% — 10217 грн./га. Условная прибыль, учитывая затраты на корма и посадочный материал, с применением 1% расторопши была на 13,1% больше, чем в контроле, 5% — на 0,7% больше в контрольной группе.

Научная новизна. Исходя из широкого спектра биологически активных свойств расторопши пятнистой, впервые изучено влияние данной добавки на продуктивные и экономические показатели в процессе выращивания двухлетков карпа. Внедрение поставленной задачи обеспечило возможность повышения рыбопродуктивности прудов за счет скармливания искусственных кормов улучшенного состава.

Практическая значимость. Снижение себестоимости и получение дополнительных приростов при выращивании рыбной продукции обеспечено совершенствованием качественных характеристик корма и, соответственно, физиологических показателей организма двухлетков карпа.

Ключевые слова: карп, расторопша пятнистая, биологически активная добавка, гидрохимические и гидробиологические показатели, размерно-весовые показатели, затраты кормов, эффективность выращивания.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

У структурі виробничих витрат при вирощуванні риби за інтенсивних технологій основну частину складають витрати на придбання штучних кормів.

У сучасних економічних умовах виробники рибної продукції часто використовують у годівлі незбалансовані кормосуміші, що призводить до погіршення функціонального стану організму риб. Тому актуальним завданням є зниження собівартості вирощеної рибної продукції за рахунок здешевлення рецептів рибних комбикормів зі збереженням їхніх якісних характеристик. У даному контексті перспективним є введення до складу основного раціону коропа добавок рослинного походження з біологічно активними властивостями.

Добавкам рослинного походження з біологічно активними властивостями характерний повільний біологічний ефект, який не супроводжується різкими

змінami гомеостазу та побічними ефектами, характерними для більшості фармакологічних препаратів [1].

Предметом проведених досліджень була розторопша плямиста (*Silybum marianum* L.), яка широко застосовується в тваринництві в якості кормової добавки з біологічно активними властивостями. Насіння розторопші містить близько 200 різних за дією компонентів, основними властивостями яких є гепатопротекторні, деінтоксичні, протизапальні, імуномодуючі та антиоксидантні [2]. Тому розторопша є ефективним профілактичним та лікувальним засобом, що забезпечує нормалізацію функції печінки, жовчогінних шляхів, селезінки та інших органів, особливо при патологічних станах організму [3].

В розторопші плямистій міститься силімарин — біологічно активна речовина, яка проявляє протизапальну, протифіброзну дію, стимулює біосинтез білків та регенерацію печінки, підсилює лактацію та чинить імуномодуючу дію [4, 5].

Крім того, додавання розторопші плямистої до складу раціону тварин сприяє підвищенню приростів, продуктивності та рівня виживання [6].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Встановлено, що додавання екстракту силімарину до складу рибних комбікормів стимулює синтез білка в тканинах печінки. Силімарин також модулює діяльність ферментів плазми крові, активізує антиоксидантні ферменти і захищає печінку від гістопатологічних пошкоджень [7]. Механізм його дії на організм риб до кінця не вивчено. Найімовірніше, ефект досягається в результаті всмоктування кишечником флавоноїдів розторопші.

Нами отримано позитивні напрацювання з використання розторопші плямистої в годівлі коропа з метою покращення фізіолого-біохімічних показників організму [8–11].

Відповідно до широкого спектру фармакологічних властивостей розторопші плямистої, а також одержаних результатів досліджень, метою роботи було дослідження доцільності та ефективності застосування даної добавки з огляду на продуктивні та економічні показники в процесі товарного вирощування головного об'єкта аквакультури України — коропа (*Cyprinus carpio* L.).

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проведено на базі Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН (ЛДС ІРГ НААН), смт Великий Любінь Городоцького району Львівської області.

Проведено серію модельних випробувань в умовах ставів, дотримуючись загальноприйнятих у рибництві правил постановки та повторностей з визначення ефективності введення до складу раціону коропа розторопші плямистої. При цьому проаналізовано вплив даної добавки на ріст риби і рибопродуктивність ставів, здійснено порівняльну характеристику витрат кормів на отримання відповідних приростів коропа та визначено економічну ефективність згодовування розторопші плямистої коропу в умовах промислового вирощування.

Експериментальні роботи проведено у двох дослідних ставах (Дослід 1 та Дослід 2) площею 0,15 та 0,19 га, та контрольному (Контроль) площею 0,14 га. Стави зарибнювали однорічками коропа середньою масою відповідно 73,7, 73,3 і 78,6 г із розрахунку 1000 екз./га. Коропи першої дослідної групи риб отримували 1% розторопші, другої — 5%. Контрольній групі риб згодовували основний раціон без добавок. Подрібнене насіння розторопші плямистої вводили до складу корму методом гранулювання. Годівлю проводили впродовж 60 діб.

При проведенні досліджень забезпечено оптимальні умови утримання коропа, у відповідності до мети експерименту. При цьому здійснювали контроль кисневого, температурного та гідрохімічного режимів водного середовища.

Відбір проб для хімічного аналізу води та їхню обробку в лабораторії проводили за загальноприйнятими методиками [12]. Якість води оцінювали згідно із загальними вимогами та нормами у рибництві — СОУ 05.01–37–385:2006 [13].

Відбір та обробку гідробіологічних проб проводили за загальноприйнятими методиками [14]. Якісний склад зоопланктону встановлювали з допомогою визначників [15], біомасу зообентосу визначали за таблицями індивідуальних мас організмів [16].

Контрольні зважування і огляд зовнішнього покриву та внутрішніх органів здійснювали перед початком годівлі через кожні 14 діб упродовж вегетаційного періоду та в кінці досліду. Після облову ставів визначали показники виживання дволіток коропа, їхню загальну і середню масу, рибопродуктивність водойм та витрати кормів на вирощування [17].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Оскільки експериментальні стави мали одне джерело водопостачання, хімічний склад води в усіх варіантах був подібним (табл. 1).

Водне середовище було слаболужним на початку сезону і лужним впродовж літа, утримуючись у межах рН 7,1–8,4, що відповідає оптимальним значенням. Лужність води повільно зростала від весни до осені. Відповідно, і вміст гідрокарбонатів у ставах мав таку ж динаміку. Відмінності вмісту біогенних елементів у ставах за період вирощування риби не зафіксовано.

Амонійний азот та мінеральний фосфор були присутні в обох ставах з однаковою динамікою змін — відповідно 0,05–0,43 мгN/дм³ та 0,11–0,30 мгP/дм³. Нітратний азот був відсутній в обох ставах упродовж всього періоду досліджень.

Вміст заліза впродовж сезону вегетації змінювався, коливаючись від 0,15 до 0,31 мг/дм³.

Забруднення хлоридами було не суттєвим. Кількість сульфатів була високою, змінюючись за сезон від 51,2 до 102,0 мг/дм³, що залежало виключно від джерела водопостачання. Вода дослідних ставів була середньої твердості. Кількість легкоокиснюваних органічних сполук упродовж періоду вирощування коливалась у межах 8,8–16,0 мгO/дм³.

В середньому за сезон вміст кисню був невисоким і утримувався в межах 3,82–4,54 мгO₂/дм³. У певні періоди сезону, при підвищенні температури води,

розчинність кисню знижувала і його вміст у воді набував критичних значень (1,17–1,02 мгО₂/дм³), проте явищ задухи при цьому не спостерігалось.

Не відмічено залежності між гідрохімічним режимом і складом раціону. Загалом, умови вирощування риби в дослідних і контрольному ставах були задовільними.

Таблиця 1. Результати хімічних досліджень води експериментальних ставів, min-max / сеп

Table 1. The results of chemical studies of water in experimental ponds, min-max / average

Показники / Indicator	Контроль / Control	Дослід 1 / Experiment 1	Дослід 2 / Experiment 2	Нормативне значення / Statutory value
pH	<u>6,95–7,42</u> 7,13	<u>6,98–7,41</u> 7,29	<u>6,95–7,41</u> 7,18	6,50–8,50
Перманганатна окиснюваність, мгО/дм ³ / Permanganate oxygen consumed, mgO ₂ /dm ³	<u>8,8–14,4</u> 12,4	<u>12,5–16,0</u> 13,8	<u>11,8–16,2</u> 14,2	15,0
Лужність, мг-екв./дм ³ / Alkaline hardness, mg-equiv/dm ³	<u>3,53–3,80</u> 3,64	<u>3,65–4,06</u> 3,82	<u>3,55–4,00</u> 3,82	3,00–6,00
НСО ₃ ⁻ , мг/дм ³ / mg/dm ³	<u>215,3–231,6</u> 222,2	<u>222,7–248,4</u> 232,8	<u>216,6–244,0</u> 232,9	200,0–400,0
NO ₂ ⁻ , мг/дм ³ / mgN/dm ³	<u>0,008–0,020</u> 0,014	<u>0,004–0,014</u> 0,010	<u>0,007–0,018</u> 0,012	0,100
NH ₄ ⁺ , мг/дм ³ / mgN/dm ³	<u>0,05–0,40</u> 0,18	<u>0,05–0,43</u> 0,19	<u>0,05–0,42</u> 0,20	1,00
NO ₃ ⁻ , мг/дм ³ / mgN/dm ³	<u>0,00–0,00</u> 0,00	<u>0,0–0,00</u> 0,00	<u>0,0–0,00</u> 0,00	до 2,00
PO ₄ ³⁻ , мг/дм ³ / mgP/dm ³	<u>0,11–0,30</u> 0,21	<u>0,19–0,28</u> 0,24	<u>0,12–0,28</u> 0,20	0,50
Fe, мг/дм ³ / mg/dm ³	<u>0,15–0,26</u> 0,21	<u>0,17–0,31</u> 0,24	<u>0,14–0,30</u> 0,22	1,80
Твердість загальна, мг-екв./дм ³ / Total hardness, mg-equiv/dm ³	<u>4,3–4,8</u> 4,6	<u>4,5–5,0</u> 4,7	<u>4,4–4,9</u> 4,7	3,0–7,0
Ca ²⁺ , мг/дм ³ / mg/dm ³	<u>79,3–84,6</u> 81,6	<u>82,8–84,8</u> 84,0	<u>79,2–84,6</u> 82,5	40,0–60,0
Mg ²⁺ , мг/дм ³ / mg/dm ³	<u>4,9–7,3</u> 6,5	<u>2,4–9,7</u> 5,7	<u>3,3–9,0</u> 6,8	до 30,0
Cl ⁻ , мг/ дм ³ / mg/dm ³	<u>12,3–17,4</u> 14,5	<u>13,8–17,4</u> 15,8	<u>12,8–17,3</u> 14,6	50,0–70,0
SO ₄ ²⁻ , мг/дм ³ / mg/dm ³	<u>51,2–90,0</u> 68,2	<u>61,6–102,0</u> 76,1	<u>52,0–98,3</u> 74,9	50,0–70,0
K ⁺ , Na ⁺ , мг/дм ³ / mg/dm ³	<u>4,0–25,5</u> 18,3	<u>22,8–39,3</u> 28,6	<u>15,3–40,5</u> 28,1	до 120,0

Показники / Indicator	Контроль / Control	Дослід 1 / Experiment 1	Дослід 2 / Experiment 2	Нормативне значення / Statutory value
Мінералізація, мг/дм ³ / Mineralization, mg/dm ³	<u>374,3–424,6</u> 402,6	<u>414,3–468,4</u> 444,1	<u>382,8–478,6</u> 439,4	300,0–1000,0
Розчинений кисень, мгО ₂ /дм ³ / Dissolved oxygen, mgO ₂ /dm ³	<u>1,17–7,60</u> 4,54	<u>1,02–6,6</u> 3,82	<u>1,05–7,00</u> 3,98	≥5,00

Угрупування ставового зоопланктону були представлені організмами трьох систематичних груп: типу нижчі черви *Rotifera*, ракоподібними підряду *Cladocera* та ряду *Copepoda*. Впродовж сезону вирощування розвивалися коловертки родів *Brachionus*, *Asplanchna*, *Keratella*, *Euchlanis*, *Filinia*, *Harringia*, *Lecane*, *Platytas*, *Polyartra*. Гіллявтує ракоподібні були представлені родами *Ceriodaphnia*, *Diaphanosoma*, *Chydorus*, *Bosmina*, *Polyphemus*. Зустрічались веслоногі ракоподібні родів *Cyclops*, *Acanthocyclops*, *Megacyclops*, *Diaptomus*.

Упродовж вегетаційного сезону в Контролі чисельність зоопланктону коливалась у межах 384,80 – 702,24 тис. екз./м³, біомаса — 1,62–7,12 г/м³, у Досліді 1 чисельність зоопланктону перебувала в діапазоні 396,00–632,96 тис. екз./м³, біомаса — 2,53–8,33 г/м³, у Досліді 2 чисельність зоопланктону знаходилась у межах 262,40–593,17 тис. екз./ м³, біомаса — 3,37–7,50 г/м³ (табл. 2).

Таблиця 2. Динаміка розвитку зоопланктону у вирощувальних ставах (тис. екз./м³ / г/м³)

Table 2. Dynamics of development of zooplankton in flow-out ponds (thousand specimen / m³ / g / m³)

Групи організмів / Groups of organisms	Веретаційний період, місяць / Vegetation period, month			Середні значення / Average values		
	VI	VII	VIII	M	± m	%
Контроль / Control						
<i>Rotifera</i>	<u>25,45</u> 0,12	<u>59,36</u> 0,14	<u>72,80</u> 0,08	<u>52,54</u> 0,11	<u>14,09</u> 0,02	<u>9,54</u> 2,68
<i>Cladocera</i>	<u>221,33</u> 3,86	<u>262,08</u> 1,38	<u>59,28</u> 0,37	<u>180,90</u> 1,87	<u>61,94</u> 1,04	<u>32,84</u> 44,29
<i>Copepoda</i>	<u>314,29</u> 3,03	<u>380,80</u> 2,40	<u>252,72</u> 1,17	<u>315,94</u> 2,20	<u>36,98</u> 0,55	<u>57,35</u> 52,15
Інше / Others	<u>4,43</u> 0,11	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>1,48</u> 0,04	<u>2,56</u> 0,06	<u>0,27</u> 0,87
Всього (N) / Total (B) /	<u>565,51</u> 7,12	<u>702,24</u> 3,92	<u>384,80</u> 1,62	<u>550,85</u> 4,22	<u>91,93</u> 1,60	<u>100</u> 100

Продовження табл. 2
Continuation of the table 2

Групи організмів / Groups of organisms	Вегетаційний період, місяць / Vegetation period, month			Середні значення / Average values		
	VI	VII	VIII	M	± m	%
Дослід 1 / Experiment 1						
<i>Rotifera</i>	<u>19,17</u> 0,09	<u>39,20</u> 0,04	<u>109,17</u> 0,34	<u>55,85</u> 0,16	<u>27,28</u> 0,09	<u>10,49</u> 3,09
<i>Cladocera</i>	<u>296,70</u> 5,69	<u>171,20</u> 2,69	<u>159,47</u> 0,87	<u>209,12</u> 3,08	<u>43,92</u> 1,41	<u>39,28</u> 60,36
<i>Сopepoda</i>	<u>249,93</u> 2,51	<u>182,40</u> 0,77	<u>364,32</u> 1,32	<u>265,55</u> 1,53	<u>53,09</u> 0,52	<u>49,88</u> 30,02
Інше / Others	<u>2,30</u> 0,02	<u>3,20</u> 0,98	<u>0,00</u> 0,00	<u>1,83</u> 0,33	<u>1,17</u> 0,39	<u>0,34</u> 6,53
<u>Всього (N) /</u> Total (B)	<u>568,10</u> 8,33	<u>396,00</u> 4,48	<u>632,96</u> 2,53	<u>532,35</u> 5,11	<u>70,70</u> 1,70	<u>100</u> 100
Дослід 2 / Experiment 2						
<i>Rotifera</i>	<u>13,40</u> 0,08	<u>39,20</u> 0,10	<u>16,12</u> 0,02	<u>22,91</u> 0,07	<u>8,18</u> 0,02	<u>5,76</u> 1,32
<i>Cladocera</i>	<u>169,73</u> 4,79	<u>128,80</u> 0,63	<u>43,40</u> 0,24	<u>113,98</u> 1,89	<u>37,21</u> 1,46	<u>28,67</u> 37,47
<i>Сopepoda</i>	<u>405,57</u> 2,56	<u>84,80</u> 0,93	<u>277,76</u> 3,11	<u>256,04</u> 2,20	<u>93,23</u> 0,65	<u>64,39</u> 43,71
Інше / Others	<u>4,47</u> 0,07	<u>9,60</u> 2,57	<u>0,00</u> 0,00	<u>4,69</u> 0,88	<u>3,40</u> 1,03	<u>1,18</u> 17,50
<u>Всього (N)</u> Total (B) /	<u>593,17</u> 7,50	<u>262,40</u> 4,23	<u>337,28</u> 3,37	<u>397,62</u> 5,03	<u>100,14</u> 1,26	<u>100</u> 100

У червні показники біомаси були максимальними і поступово знижувались до кінця періоду вирощування дволіток коропа, що пов'язано із збільшенням інтенсивності виїдання організмів природної кормової бази коропами у міру їх росту.

Середньосезонні показники у Контролі склали $550,85 \pm 91,93$ тис. екз./м³ за чисельністю та $4,22 \pm 1,60$ г/м³ за біомасою, у Досліді 1 — $532,35 \pm 70,70$ тис. екз./м³ за чисельністю та $5,11 \pm 1,70$ г/м³ за біомасою, у Досліді 2 — $397,62 \pm 100,14$ тис. екз./м³ за чисельністю та $5,03 \pm 1,26$ г/м³ за біомасою.

Угрупування ставового зообентосу були представлені групами організмів: личинками комах ряду *Diptera*, малоцетинковими червами класу *Oligochaeta*, меншою мірою — водними кліщами ряду *Hydrachnellae*, личинками одноденок ряду *Ephemeroptera* та черепашковими раками Підкласу *Ostracoda*.

Упродовж вегетаційного сезону в Контролі чисельність зообентосу коливалась у межах 93,33–373,33 екз./м², біомаса — 0,21–2,88 г/м², у Досліді 1 чисельність зообентосу перебувала в діапазоні 133,33–440,00 екз./м², біомаса — 0,92–2,64 г/м², у Досліді 2 — відповідно 120,00–320,00 екз./м² — 0,22–2,89 г/м² (табл. 3).

Таблиця 3. Динаміка розвитку зообентосних організмів у вирощувальних ставках (екз./м² / г/м²)Table 3. Dynamics of development of zoobenthos in flow-out ponds (specimen / m² / g/m²)

Групи організмів / Groups of organisms	Вегетаційний період, місяць / Vegetation period, month			Середні значення / Average values		
	VI	VII	VIII	M	± m	%
Контроль / Control						
<i>Chironomidae</i>	<u>146,67</u> 2,56	<u>186,67</u> 0,71	<u>13,33</u> 0,09	<u>115,56</u> 1,12	<u>52,40</u> 0,74	<u>45,61</u> 81,90
<i>Oligochaeta</i>	<u>53,33</u> 0,29	<u>106,67</u> 0,29	<u>53,33</u> 0,11	<u>71,11</u> 0,23	<u>17,78</u> 0,06	<u>28,07</u> 16,90
Інше / Others	<u>93,33</u> 0,03	<u>80,00</u> 0,02	<u>26,67</u> 0,01	<u>66,67</u> 0,02	<u>20,37</u> 0,01	<u>26,32</u> 1,20
Всього (N) / Total (B)	<u>293,33</u> 2,88	<u>373,33</u> 1,02	<u>93,33</u> 0,21	<u>253,33</u> 1,37	<u>83,27</u> 0,79	<u>100</u> 100
Дослід 1 / Experiment 1						
<i>Chironomidae</i>	<u>200,00</u> 2,05	<u>160,00</u> 0,68	<u>53,33</u> 0,29	<u>137,78</u> 1,01	<u>43,77</u> 0,53	<u>42,47</u> 62,36
<i>Oligochaeta</i>	<u>66,67</u> 0,25	<u>200,00</u> 0,27	<u>13,33</u> 0,16	<u>93,33</u> 0,23	<u>55,51</u> 0,03	<u>28,77</u> 14,01
Інше / Others	<u>133,33</u> 0,33	<u>80,00</u> 0,35	<u>66,67</u> 0,47	<u>93,33</u> 0,38	<u>20,37</u> 0,04	<u>28,77</u> 23,63
Всього (N) Total (B)	<u>400,00</u> 2,64	<u>440,00</u> 1,29	<u>133,33</u> 0,92	<u>324,44</u> 1,62	<u>96,25</u> 0,52	<u>100</u> 100
Дослід 2 / Experiment 2						
<i>Chironomidae</i>	<u>146,67</u> 2,32	<u>160,00</u> 0,32	<u>26,67</u> 0,12	<u>111,11</u> 0,92	<u>42,40</u> 0,70	<u>46,30</u> 65,69
<i>Oligochaeta</i>	<u>40,00</u> 0,11	<u>93,33</u> 0,19	<u>40,00</u> 0,09	<u>57,78</u> 0,13	<u>17,78</u> 0,03	<u>24,07</u> 9,20
Інше / Others	<u>93,33</u> 0,47	<u>66,67</u> 0,58	<u>53,33</u> 0,01	<u>71,11</u> 0,35	<u>11,76</u> 0,17	<u>29,63</u> 25,11
Всього (N) Total (B)	<u>280,00</u> 2,89	<u>320,00</u> 1,08	<u>120,00</u> 0,22	<u>240,00</u> 1,40	<u>61,10</u> 0,79	<u>100</u> 100

Показники біомаси м'якого зообентосу змінювались від максимальних значень у червні до мінімальних у серпні завдяки високій пошуковій активності дволіток коропа.

Середньосезонні показники розвитку зообентосу у Контролі були нарівні 253,33±83,27 екз./м² за чисельністю та за біомасою — 1,37±0,79 г/м²; у Досліді 1 — відповідно 324,44±96,25 екз./м² та 1,62±0,52 г/м²; у Досліді 2 — 240,00±61,10 екз./м² та 1,40±0,79 г/м².

Основу біомаси макрозообентосу всіх ставів формували личинки комарів родини *Chironomidae* — 62,4–81,9% (табл. 3).

Загалом, не виявлено впливу досліджуваної добавки з біологічно активними властивостями на розвиток організмів природної кормової бази експериментальних ставів. Не відмічено достовірної різниці середньосезонних показників біомаси кормових організмів зоопланктону та зообентосу вирощувальних ставів, а динаміка їхнього розвитку сприяла процесу вирощування, як у дослідних варіантах, так і у контрольному.

Після обловів ставів проведено аналіз показників вирощування, в результаті якого встановлено, що рибопродуктивність у Досліді 1, при введенні до складу корму 1% насіння розторопші, була на 9,8% вищою відносно Контролю, та на 7,3% вищою відносно Досліді 2 за введення 5% розторопші до складу корму (табл. 4).

Середня маса коропів дослідних груп перевищила показники контрольної на 7,3 і 5,6%, і склала відповідно 550 і 540 г. Показники рівня виживання риб в усіх ставах практично не відрізнялися. Відповідно до цього, витрати кормів на вирощування були на 5,9 та 8,8% нижчими, ніж у Контролі.

Таблиця 4. Результати вирощування дволіток коропа з додаванням до основного раціону розторопші плямистої

Table 4. The results of growing two-year-old carp with the addition of *Silybum marianum* in the main diet

Показники / Indices		Контроль / Control	Дослід 1 / Experiment 1	Дослід 2 / Experiment 2
Площа ставу, га / Pond area, ha		0,14	0,19	0,15
Посаджено на вирощування / Stocking for cultivation	всього, екз. / total, specimens	140	190	150
	сер. маса, г / average weight, g	78,6	73,7	73,3
	заг. маса, кг / total weight, kg	11	14	11
Виловлено / Fish out	вихід, % / вихід, %	78	80	80
	всього, екз. / total, specimens	109	152	120
	сер. маса, г / average weight, g	510	550	540
	заг. маса, кг / total weight, kg	55,6	83,6	64,3
	рибопрод, кг/га / fish productivity, kg/ha	397	440	428
Згодовано корму / Fed feed	кг / kg	194	270	203
	од. / units	3,4	3,2	3,1

Існує низка чинників підвищення економічної ефективності вирощування товарної риби. Основним, безумовно, є рибопродуктивність, яка, у свою чергу залежить від багатьох природних і технологічних чинників, а саме від якісних характеристик посадкового матеріалу, щільності посадки риб, продуктивності ставу, а також від поживності згодовуваних кормів.

Встановлено, що використання розмелених плодів розторопші плямистої в годівлі дає змогу одержати кращі рибицькі показники і зменшення витрат кормів на вирощування (табл. 5).

Таблиця 5. Економічна ефективність вирощування дволітків коропа за додавання до основного раціону розторопші плямистої

Table 5. Cost-effectiveness of growing two-year-old carp with the addition of *Silybum marianum* to the main diet

Показники / Indices		Контроль / Control	Дослід 1 / Experiment 1	Дослід 2 / Experiment 2
Площа ставу, га / Pond area, ha		0,14	0,19	0,15
Вирощено коропа, кг / Grown carp, kg		55,6	83,6	64,2
Витрати на корм, грн* / The cost of feed, UAH*	комбікорм / compound feed	443	617	514
	розторопша плямиста / <i>Silybum marianum</i>		81	303
	всього / total	510,5	784,9	813,4
Витрати корму на вирощування, грн/кг / The cost of feed for carp growing, UAH/kg		9,18	9,39	12,42
Витрати на посадковий матеріал, грн.* / The cost of carp stocking material, 40 UAH*		440	560	440
Ринкова вартість, грн / Market price, UAH	1 кг риби /1 kg of fish	43	43	43
	вирощеної продукції / grown products	2391	3595	2786
Вартість додатково отриманої продукції, грн./га / Cost of additional products received, UAH / ha			1849	1333
Умовний прибуток (враховуючи витрати на корми і посадковий матеріал), грн/га / Contingent profit (taking into account the cost of feed and carp stocking material), UAH/kg		10289	11843	10217
Умовний прибуток (враховуючи витрати на корми і посадковий матеріал), % / Contingent profit, %			+13,1%	– 0,7

Примітка: * — вартість розторопші плямистої — 30 грн./кг, посадкового матеріалу коропа — 40 грн/кг.

Note: * — the price of *Silybum marianum* is 30 UAH. / kg, carp stocking material — 40 UAH. / kg.

Вартість корму, витраченого на 1 кг приросту риби, у контрольній групі виявилася нижчою на 2,2%, ніж при згодовуванні корму з розторопшею в кількості 1%, і на 26,1% — ніж при згодовуванні корму з розторопшею в кількості 5%. Проте вартість додатково отриманої продукції при застосуванні насіння розторопші плямистої в кількості 1% на 1 га ставів, склала 1849 грн, в кількості 5% — 1333 грн (табл. 5).

Враховуючи вартість розторопші плямистої та вартість посадкового матеріалу і витрачених на вирощування кормів, отримуємо прибуток від вирощування коропа при згодовуванні розторопші в кількості 1% на рівні 11843 грн/га, що на 13,1% більше ніж у Контролі.

При згодовуванні комбікорму, до складу якого введено 5% насіння

розторопші, додаткового прибутку не отримуємо, проте виражений позитивний вплив у даному випадку можна отримати з профілактичною та лікувальною метою, відповідно до біологічно активних властивостей досліджуваної добавки.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

При аналізі отриманих результатів встановлено, що середня маса коропів, яким до складу корму введено 1% розмеленого насіння розторопші плямистої, була вищою на 7,3% у порівнянні з масою коропів контрольної групи. Відповідно, рибопродуктивність в дослідному ставу зросла на 9,8%. При цьому витрати корму на кілограм вирощеної продукції знизились на 5,9%. Отриманий прибуток, враховуючи витрати на корми і посадковий матеріал, при вирощуванні коропа із застосуванням розторопші, був на 13,1% більшим відносно Контролю.

Отримані результати свідчать про ефективність використання насіння розторопші плямистої в кількості 1% у складі раціону дволіток коропа впродовж вегетаційного періоду та доцільність подальшої комплексної оцінки впливу даної добавки на фізіолого-біохімічні показники організму риб.

Розробка і впровадження поставленого завдання забезпечить можливість підвищення рибопродуктивності ставів за рахунок згодовування штучних кормів покращеного складу. Це дозволить знизити витрати штучних кормів та отримати вищі прирости при вирощуванні, покращити фізіологічні показники організму коропа.

ЛІТЕРАТУРА

1. Доклиническое изучение безопасности фитопрепаратов, обладающих гепатопротекторными свойствами / Л. В. Крепова и др. // Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения : 8 Междунар. съезд «Фитофарм 2004», 21-23 июня 2004 г. : матер. Санкт-Петербург, 2004. С. 111—114.
2. Лушпа В. І. Розторопша плямиста в офіційній та народній медицині // Фітотерапія в Україні. 2001. № 4. С. 38.
3. Особливості хімічного складу розторопші плямистої / Колесник М. Д. та ін. // Вісник Полтавської державної академії. 2007. № 1. С. 93—95.
4. Pradhan S. C., Girish C. Hepatoprotective herbal drug, silymarin from experimental pharmacology to clinical medicine // Indian. J. Med. Res. 2006. Vol. 124 (5). P. 491—504.
5. Масла из семян и плодов расторопши пятнистой как перспективные источники витаминов – антиоксидантов / Н. М. Сторож и др. // Фармакология в XXI веке: инновации и традиции. 2000. С. 206—207.
6. Курило В., Кондратюк С. Розторопша плямиста у гуманній і ветеринарній медицині // Тваринництво України. 2016. № 1/2. С. 38—40.
7. Опалинский Ю. А., Віщур О. І. Ефективність застосування розторопші плямистої (*Silybum marianum*) для коректування інтенсивності окисних процесів у коропа за умов навантаження свинцем // Рибогосподарська наука України. 2016. № 3. С. 99—110.
8. Кориляк М. З., Качай Г. В., Фріштак О. М. Вплив розторопші плямистої на рибопродуктивність та деякі фізіолого-біохімічні показники дволіток коропа // Біологія тварин. 2014. Т.16, № 4. С. 192.

9. Кориляк М. З. Морфологічна характеристика кишківника та гепатопанкреасу дволіток коропа при застосуванні розмелених плодів розторопші плямистої // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. 2015. Т.17, № 3 (63). С. 218—223.
10. Перебіг окисних процесів в гепатопанкреасі дволіток коропа за введення до складу кормів розторопші плямистої (*Silybum marianum* L.) / Кориляк М. З. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2017. № 1. С. 73—83.
11. Кориляк М. З., Віщур О. І., Грициняк І. І. Вплив розторопші плямистої (*Silybum marianum*) на стан Т- і В-клітинного імунітету та природну резистентність дволіток коропа // Рибогосподарська наука України. 2019. № 3(49). С. 89—100.
12. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеиздат, 1970. 412 с.
13. СОУ 05.01–37–385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України. 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
14. Жадин В. И. Изучение водной фауны водоёмов. Москва : АН СССР, 1950. 30 с.
15. Кутикова Л. А., Старобогатов Я. И. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон и бентос). Ленинград : Гидрометеиздат, 1977. 513 с.
16. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция. Санкт-Петербург : ГосНИОРХ, 1984. 52 с.
17. Желтов Ю. О. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб // Рибне господарство. 2003. Вип. 62. С. 23—28.

REFERENCES

1. Krepova, L. V., Bortnikova, V. V., & Shkarenko, A. A. (2004). Doklinicheskoe izuchenie bezopasnosti fitopreparatov, obladayushchikh gepatoprotekturnymi svoystvami. *Aktual'nye problemy sozdaniya novykh lekarstvennykh preparatov prirodnogo proiskhozhdeniya: Materialy 8 Mezhdunar. S"ezda "Fitofarm 2004"*. Sankt-Peterburg, 111-114.
2. Lushpa, V. I. (2001). Roztoropsha plyamista v ofitsiyniy ta narodniy meditsini. *Fitoterapiya v Ukraini*, 4, 38.
3. Kolesnyk, M. D., Semenov, S. O., Bankovska, I. B., & Trotskyi, M. Ia. (2007). Osoblyvosti khimichnoho skladu roztoropshi pliamystoi. *Visnyk Poltavskoi derzhavnoi akademii*, 1, 93-95.
4. Pradhan, S. C., & Girish, C. (2006). Hepatoprotective herbal drug, silymarin from experimental pharmacology to clinical medicine. *Indian. J. Med. Res*, 124 (5), 491-504.
5. Storozh, N. M., Tsimbal, I. N., & Lobanova, A. A. (2000). Masla iz semyan i plodov rastoropshi pyatnistoy kak perspektivne istochniki vitaminov – antioksidantov. *Farmakologiya v XXI veke: innovatsii i traditsii*, 206-207.
6. Kurylo, V., & Kondratiuk, S. (2016). Roztoropsha pliamysta u humannii i veterynarnii medytsyni. *Tvarynnytstvo Ukrainy*, 1/2, 38-40.
7. Opalynskiy, Yu. A., & Vishchur, O. I. (2016). Efektyvnist zastosuvannya roztoropshi pliamystoi (*Silybum marianum*) dlia korektuvannya intensyvnosti

- okysnykh protsesiv u koropa za umov navantazhennia svyntsem. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 3, 99-110.
8. Koryliak, M. Z., Kachai, H. V., & Frishtak, O. M. (2014). Vplyv roztoropshi plyamystoi na ryboproduktyvnist ta deiaki fiziolohe-biokhimichni pokaznyky dvolitok koropa. *Biologiya tvaryn*, 16, 4, 192.
  9. Korilyak, M. Z. (2015). Morfologichna kharakteristika kishkivnika ta hepatopankreasu dvolitok koropa pri zastosuvanni rozmelenikh plodiv roztoropshi plyamystoi. *Naukoviy visnik LNUVMBT imeni S. Z. Hzhys'ts'kogo*, 17, 3(63), 218-223.
  10. Korilyak, M. Z., Deren', O. V., Gritsynyak, I. I., & Dobryans'ka, O. P. (2017). Perebig okisnykh protsesiv v hepatopankreasi dvolitok koropa za vvedennya do skladu kormiv roztoropshi plyamystoi (*Silybum marianum* L.). *Ribogospodars'ka nauka Ukrainy*, 1, 73-83.
  11. Korilyak, M. Z., Vishchur, O. I., & Hrytsynyak, I. I. (2019). Vplyv roztoropshi plyamystoi (*Silybum marianum*) na stan T- i V-klitinnoho imunitetu ta prirodnu rezistentnist' dvolitok koropa. *Ribogospodars'ka nauka Ukrainy*, 3(49), 89-100.
  12. Alekin, O. A. (1970). *Osnovy gidrokhimii*. Leningrad: Gidrometeoizdat.
  13. Voda rybohospodarskykh pidpriemstv. Zahalni vymohy ta normy (2006). *SOU 05.01-37-385:2006. Standart Minahropolityky Ukrainy*. Kyiv: Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy.
  14. Zhadin, V. I. (1950). *Investigation of water fauna of water reservoirs*. Moscow: Publishing Academy of the USSR.
  15. Kutikova, L. A., & Starobogatov, Ja. I. (1977). *Opredelitel' presnovodnykh bespozvonochnykh Evropejskoj chasti SSSR (plankton i bentos)*. Leningrad: Gidrometeoizdat.
  16. *Metodicheskie rekomendacii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskikh issledovaniyakh na presnovodnykh vodoemakh. Zoobentos i ego produkcija*. (1984). Leningrad: GosNIORH.
  17. Zheltov, Yu. O. (2003). Metodychni vkazivky z provedennia doslidiv po hodivli ryb. *Rybne hospodarstvo*, 62, 23-28.

МЕТОДИ ІХТІОПАТОЛОГІЧНИХ ТА ІХТІОПАЗИТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ТЕМАТИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

І. Й. Грициняк, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Формування довідкового переліку україно- та російськомовних публікацій з питань розробки та застосування класичних і сучасних методів досліджень у іхтіопатології та іхтіопаразитології.

Методика. Під час системного пошуку у процесі підготовки тематичного переліку було застосовано як цілісний, так і вибіркового методи. Бібліографічне ядро складало виключно україно- та російськомовні наукові видання, присутні у фонді наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 86 джерел, що охоплюють часовий інтервал з 1950 по 2016 рр., та присвячені методам діагностики, профілактики та лікування захворювань риб різної етіології. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Підготовлений список публікацій може бути використаний науковцями, практиками, студентами, до сфери інтересів яких належать питання іхтіопатології, паразитології, рибництва.

Ключові слова: паразитози риб, інфекційні захворювання риб, діагностика патологій риб, токсикози, вірусні захворювання риб.

METHODS OF ICHTHYOPATHOLOGICAL AND ICHTHYOPARASITOLOGICAL RESEARCH. THEMATIC BIBLIOGRAPHY

Іr. Hrytsyniak, library@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
T. Shvets, library@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Forming a thematic bibliographic list of publications on the development and application of classical and modern research methods in ichthyopathology and ichthyoparasitology.

Methodology. Complete and selective methods were applied in the process of the systematic search. The bibliographic core has been formed with exclusively in Ukrainian and Russian language scientific publications from the fund of scientific library of the Institute of Fisheries NAAS of Ukraine.

Findings. A thematic list of publications with a total quantity of 86 sources covering a time interval from 1950 to 2016 and concerning the methods of diagnostics, prevention and treatment of fish diseases of various etiologies has been formed. The literary sources are arranged in alphabetical order by author or title, and described according to DSTU 8302:2015 "Information and

© І. Й. Грициняк, Т. М. Швець, 2019

documentation. Bibliographic reference. General principles and rules of composition”, with the amendments (code UKND 01.140.40), as well as in accordance with the requirements of APA style — international standard of references.

Practical value. The list may be useful for scientists, practitioners, students, whose area of interests covers the questions of ichthyopathology, parasitology, and fish farming.

Keywords: fish parasites, infectious diseases of fish, diagnostics of fish pathologies, toxicosis, viral diseases of fish.

МЕТОДЫ ИХТИОПАТОЛОГИЧЕСКИХ И ИХТИОПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ТЕМАТИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Ир. И. Грициняк, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, г. Киев

Т. М. Швець, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, г. Киев

Цель. Формирование справочного перечня украино- и русскоязычных публикаций по вопросам разработки и применения классических и современных методов исследований в ихтиопатологии и ихтиопаразитологии.

Методика. В ходе системного поиска в процессе подготовки тематического перечня были применены как целостный, так и выборочный методы. Библиографическое ядро составляли исключительно украино- и русскоязычные научные издания, имеющиеся в фонде научной библиотеки Института рыбного хозяйства НААН Украины.

Результаты. Сформирован тематический библиографический перечень публикаций из 86 источников, охватывающих временной интервал с 1950 по 2016 гг. и посвященных методам диагностики, профилактики и лечения заболеваний рыб различной этиологии. Литературные источники размещены в алфавитном порядке по автору или названию, описаны согласно ДСТУ 8302:2015 «Информация и документация. Библиографическая ссылка. Общие положения и правила составления», с учетом поправок (код УКНД 01.140.40), а также в соответствии с требованиями к оформлению списка литературы по международному стандарту APA style.

Практическая значимость. Подготовленный список публикаций может быть использован учеными, практиками, студентами, сфера интересов которых касается вопросов ихтиопатологии, паразитологии, а также рыбоводства.

Ключевые слова: паразитозы рыб, инфекционные заболевания рыб, диагностика патологий рыб, токсикозы, вирусные заболевания рыб.

---

1. Аршаница Н. М. Вопросы эпизоотологии, диагностики и профилактики болезни плавательного пузыря карпа : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Ленинград, 1970. 20 с.
2. Аршаница Н. М. Эпизоотология и методы диагностики болезни плавательного пузыря карпов // Известия ГосНИОРХ. 1969. Т. 65. С. 245—252.
3. Аршаница Н. М., Ляшенко О. А. Патологоанатомический метод исследования токсикозов рыб // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : Междунар. науч.-практ. конф., 17-19 дек. 2007 г. : матер. и докл. Москва : Россельхозакадемия, 2007. С. 112—115.
4. Асадчая Р. Л. Экспресс-диагностика и способы профилактики бактериальных инфекций растительноядных рыб // Рыбне господарство. 2004. Вип. 63. С. 7—9.
5. Бауер О. Н., Лопухина А. М. Методика изучения влияния паразитов на

- продуктивность рыб в пределах ареала // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 1. Вильнюс : Минтис, 1974. С. 132—141.
6. Болезни рыб в аквакультуре России: практическое руководство / Воронин В. Н. и др. Санкт-Петербург : ГосНИОРХ, 2011. 264 с.
  7. Борисова М. Н., Скачков Д. П., Скворцова Ф. К. Филометроидоз карпов: эпизоотология, диагностика, методы лечения и профилактика // Рыбное хозяйство. 2009. № 1. С. 89—91.
  8. Борьба с апиозомозом и эпистилозом рыб при искусственном выращивании : методические указания / сост. Банина Н. Н. Ленинград : ГосНИОРХ, 1979. 9 с.
  9. Бреев К. А. Применение математических методов в паразитологии // Известия ГосНИОРХ. 1976. Т. 105. С. 109—126.
  10. Ващенко А. В., Мокрієва Н. Б. Полімеразна ланцюгова реакція — перспективний метод діагностики інфекційних хвороб об'єктів аквакультури // Проблеми аквакультури і функціонування водних екосистем : Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, 25-28 февр. 2002 г. : матер. Киев : Институт рыбного хозяйства УААН ; Национальный аграрный университет, 2002. С. 145—146.
  11. Ващенко А. В., Харкавлук Н. Є. Методи виділення фагів *Pseudomonas* від риб різних регіонів України // Рибогосподарська наука України. 2008. № 4. С. 110—113.
  12. Владимиров В. Л. Метод длительной задержки антибиотиков в организме рыб // Известия ГосНИОРХ. 1969. Т. 69. С. 76—82.
  13. Временная инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней прудовых рыб. Кишинев : Министерство сельского хозяйства МССР, 1958. 48 с.
  14. Временные рекомендации по профилактике протозойных болезней рыб / сост. Панасенко В. В., Афанасьев В. И., Сулейманян В. С. Краснодар : Краснодарский филиал ВНИИПРХ, 1980. 10 с.
  15. Гайдей О. С. Епізоотологічний моніторинг вірусної геморагічної септицемії форелі та розробка засобів діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук. Харків : Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини, 2011. 20 с.
  16. Головин П. П. Временная методика определения экономической эффективности лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий в рыбоводных хозяйствах. Москва : ВНИИПРХ., 1986. 12 с.
  17. Головина Н. А., Головин П. П., Ванятинский В. Ф. К вопросу о диагностике дактилогироза карпа // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1987. Вып. 50. С. 47—56.
  18. Гончаров Г. Д. Лабораторная диагностика болезней рыб. Москва : Колос, 1973. 120 с.
  19. Грициняк І. І., Тушницька Н. Й., Матвієнко Н. М. Діагностика, лікування та заходи профілактики асоційованої форми краснухи коропа : методичні рекомендації. Київ, 2011. 18 с.
  20. Давыдов О. Н. К методике содержания в искусственных средах паразитических червей рыб // Гидробиологический журнал. 1970. Т. 6, № 3. С. 122—125.
  21. Давыдов О. Н. Метод оценки действия различных веществ в модельной системе гельминт — кишечник // Гидробиологический журнал. 1976. Т. 12,

- № 6. С. 100—102.
22. Давыдов О. Н., Абрамов А. В., Темниханов Ю. Д. Ветеринарно-санитарный контроль пищевых гидробионтов. Черкассы : АНТ, 2007. 457 с.
23. Екологічно безпечні методи боротьби з псевдомонозами прісноводних риб / Матвієнко Н. М. та ін. // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ ім. С. З. Гжицького. 2007. Т. 9, № 4(35), ч. 1. С. 109—111.
24. Енгашев В. Г. Прижизненный метод диагностики болезней рыб // Рыбоводство и рыболовство. 1975. № 2. С. 48—49.
25. Заботкина Е. А. Использование гистологических биомаркеров для диагностики патоморфологических изменений в иммунокомпетентных органах // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию Московской рыбоводно-мелиоративной опытной станции и 25-летию ее реорганизации в ГНУ ВНИИР, Москва, 11-13 апр. 2005 г. : матер. Т. 3. Москва, 2005. С. 161—164.
26. Застосування полімеразної ланцюгової реакції для діагностики лімфосаркоматозу щук Київського та Канівського водосховищ / Бучацький Л. П. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 60—64.
27. Збірник нормативно-технологічної документації по діагностиці хвороб харчових гідробіонтів / упоряд. Дроник В. С. та ін. Київ : ІНКОС, 2013. 342 с.
28. Здоровая рыба. Профилактика, диагностика и лечение болезней / Рахконен Р. и др. Хельсинки : НИИ охотничьего и рыбного хозяйства, 2000. 161 с.
29. Иванова Н. Т. Метод морфологического анализа крови в ихтиопатологических исследованиях // Известия ГосНИОРХ. 1976. Т. 105. С. 105—108.
30. Инвазионные болезни рыб : методические рекомендации по вопросам диагностики. Белая Церковь, 1986. 16 с.
31. Инструкции о мероприятиях по борьбе с бранхиомикозом, ихтиофтириозом, кавиозом, кариофиллезом и ботриоцефалезом рыб. Москва : Колос, 1965. 15 с.
32. Инструкция о мероприятиях по борьбе с кистиозом, хилодонеллезом, гиродактилезом и дактилогирозом рыб в прудовых хозяйствах. Москва : Колос, 1966. 19 с.
33. Инструкция по биологическому методу борьбы с постодиплостомозом и диплостомозом пресноводных рыб. Краснодар : Краснодарский филиал ВНИИПРХ, 1985. 10 с.
34. Кальниболоцкий А. А. Основы методики определения ущерба, причиняемого рыбному хозяйству болезнями рыб // Известия ГосНИОРХ. 1976. Т. 105. С. 127—129.
35. Канаев А. Методы диагностических исследований в ихтиопатологии // Рыбоводство и рыболовство. 1986. № 6. С. 18—19.
36. Каріофіліоз коропа та заходи боротьби з ним. Львів : Львівське обл. управління сільського господарства, 1961. 8 с.
37. Козій М. С. Використання новітніх гістологічних методик для діагностики гельмінтних захворювань риб // Таврійський науковий вісник. 2008. Вип. 59. С. 113—116.
38. Лабораторний практикум в біології, патології та ветсанекспертизи прісноводних риб : уч. посібник. Біла Церква : Білоцерківський с/г ін-т ; Інститут рибного господарства УААН, 1994. 120 с.
39. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині : довідник / ред. Влізло В. В. Львів : СПОЛОМ, 2012. 764 с.

40. Литвиненко В. В. Метод получения негативных колоний, образуемых рабдовирусом карпа // Рыбное хозяйство. 1982. Вып. 35. С. 63—65.
41. Лосев А. А., Овчаренко Н. А. Методические основы изучения кровяных паразитов рыб // Гидробиологический журнал. 2003. Т. 40, № 6. С. 105—114.
42. Маркевич А. П. Методика и техника паразитологического обследования рыб. Киев : КГУ, 1950. 23 с.
43. Метод полиэтилглицоловой преципитации связанного конгютина для определения иммунных комплексов / Корниенко Г. Г. и др. // Физиолого-биохимические и генетические исследования ихтиофауны Азово-Черноморского бассейна. Методическое руководство. Ростов-на-Дону : Эверест, 2005. С. 17—18.
44. Методика постановки биологической пробы в ихтиопатологии. Методы диагностики отравлений рыб в водоемах. Москва : Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, 1971. 34 с.
45. Методические рекомендации по борьбе с болезнями рыб в бассейнах и садках на теплых водах / сост. Осадчая Е. Ф., Просяная В. В. Киев : УкрНИИРХ, 1981. 15 с.
46. Методические рекомендации по патоморфологической и гистохимической диагностике краснухи карпов / Руденко А. П., Яцышин А. И. Киев, 1982. 8 с.
47. Методические указания по бактериологическому исследованию воды и гидробионтов при заболеваниях рыб, вызываемых вибрионами. Методические указания по приготовлению культуры клеток гонад карпа (серебряного карася) и ее применению при вирусологических болезнях рыб. Москва : Колос, 1976. 17 с.
48. Методические указания по борьбе с дактилогирозом карпа в прудовых хозяйствах / сост. Бауэр О. Н. Ленинград : ГосНИОРХ, 1959. 15 с.
49. Методические указания по определению антигенов эритроцитов рыб с помощью изоиммунных антител / Сахаров Р. С. и др. // Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре. Москва : ВНИРО, 2001. С. 165—176.
50. Методичні вказівки щодо лабораторної діагностики вірусних хвороб риб / Буцацький Л. П. та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2009. 15 с.
51. Методичні рекомендації щодо молекулярно-біологічної діагностики вірусу інфекційного панкреатичного некротичного некрозу форелі / Матвієнко Н. М., Рудь Ю. П., Буцацький Л. П. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2015. 22 с.
52. Микробиологические и вирусологические методы исследований в ветеринарной медицине : справочное пособие / Головкин А. Н. и др. Харьков : НТМТ, 2007. 512 с.
53. Молекулярно-генетичні методи діагностики у ветеринарній медицині та біотехнології / Герілович А. П. та ін. Київ : СТ-друк, 2014. 286 с.
54. Наконечная М. Г. Методика получения сыворотки крови от эмбрионов крупного рогатого скота для вирусологических исследований в ихтиопатологии // Рыбное хозяйство. 1978. Вып. 26. С. 76—78.
55. Низова Г. А. Методы паразитологического исследования рыб и других гидробионтов // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 316—329.

56. Нормативно-правові акти з питань поліпшення роботи по профілактиці, діагностиці та боротьбі з хворобами риб. Київ : Державний департамент ветеринарної медицини, 2003. 50 с.
57. Овчаренко Н. А. Новые и модифицированные методы исследования микроспоридий водных животных (обзор) // Гидробиологический журнал. 2002. Т. 39, № 1. С. 62—72.
58. Ожередова Н. А. Цитробактериоз у карповых рыб: распространение, клинико-морфологические изменения, диагностика // Рыбное хозяйство. 2006. № 2. С. 77—78.
59. Осадчая Е. Ф. Изыскание путей получения однослойных клеточных культур из тканей карпа и возможностей их применения для диагностики некоторых болезней рыб : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Киев, 1965. 20 с.
60. Осадчая Е. Ф., Наконечная М. Г., Литвиненко В. В. Консервирование вирусов, выделенных от рыб, методом лиофилизации // Рыбное хозяйство. 1980. Вып. 30. С. 87—89.
61. Паразитологическое исследование рыб : методическое пособие / Чернышева Н. Б. и др. Санкт-Петербург : ГосНИОРХ, 2009. 20 с.
62. Посібник по діагностиці хвороб риб / ред. Вербицький П. І. Київ : Арт Ек, 2005. 160 с.
63. Пронина Г. И. Использование цитохимических методов для определения фагоцитарной активности клеток крови и гемолимфы разных видов гидробионтов для оценки состояния их здоровья // Известия Оренбургского государственного университета. 2008. Т. 4, № 20-1. С. 160—162.
64. Рауцкис Э. Ю. Методические рекомендации по эколого-фаунистическому исследованию зараженности паразитами рыбца и других видов проходных рыб на протяжении их ареалов // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 3. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1978. С. 83—85.
65. Рекомендации по диагностике и профилактике филометроидоза карпа : методический материал / Секретарюк К. В., Пирус Р. И. Львов : Львовское отделение Украинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства ; Львовский Ордена Трудового красного знамени зооветеринарный институт, 1984. 16 с.
66. Рекомендації з профілактики кормових токсикозів та захворювань каналного сома поліетіологічної природи при індустріальному вирощуванні в тепловодних рибних господарствах / Вовк Н. І., Просяна В. В., Сидоров М. А. Київ : Інститут рибного господарства УААН, 1996. 3 с.
67. Рудь Ю. П. Ідентифікація грамнегативних бактерій у риб методом ПЛР-ПДРФ гену 16S рРНК // Рибогосподарська наука України. 2013. № 1. С. 80—86.
68. Рудь Ю. П., Бучацький Л. П. Ампліфікація гену тимідинкінази як зручний метод діагностики ДНК-вірусів риб // Рибне господарство. 2009. Вип. 67. С. 175—178.
69. Рудь Ю. П., Жук Л. В., Владимирський І. Б. Використання мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції в експрес-діагностиці інфекційних захворювань риб // Рибогосподарська наука України. 2012. № 3/4. С. 59—62.
70. Рудь Ю. П., Циганок І. О. Молекулярна діагностика *Yersinia ruckeri* // Рибогосподарська наука України. 2014. № 2. С. 69—78.

71. Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре в Беларуси за период с 2006 по 2018 годы. Минск : Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси, 2018. 374 с.
72. Сборник нормативных документов по профилактике и борьбе с инфекционными и инвазионными болезнями прудовых рыб / Сулейманян В. С., Панасенко В. В., Денисов А. И. Краснодар : Краснодарский филиал ВНИИПРХ, 1983. 40 с.
73. Сборник правил, инструкций и наставлений по борьбе с болезнями рыб. Рыбное : ВНИИПРХ, 1972. 214 с.
74. Седов В. А., Зимин Н. Л., Сапожников Г. И. Организация диагностики болезней рыб: состояние и перспективы // Проблемы охраны здоровья рыб в аквакультуре : науч.-практ. конф. : тезисы докл. Москва : Россельхозакадемия, 2000. С. 19—20.
75. Секретарюк К. В. Лабораторна діагностика інвазійних хвороб риб. Москва : Универсум Паблішинг, 2001. 204 с.
76. Секретарюк К. В., Тафійчук Р. І. Цитогенетичний (метафазний) метод дослідження соматичних клітин коропа // Проблеми аквакультури та функціонування водних екосистем : Міжнарод. науч.-практ. конф. молодих учених, 25-28 февр. 2002 г. : матер. Київ : Інститут рибного господарства УААН ; Національний аграрний університет, 2002. С. 123—124.
77. Сучасні методи молекулярної діагностики захворювань риб (огляд) / Залюїло О. В., Рудь Ю. П., Залюїло І. А., Грициняк І. І. // Рибогосподарська наука України. 2016. № 2. С. 48—64.
78. Тимчасові рекомендації по профілактиці і боротьбі з ботріоцефаліозом і каріофіліозом коропів та їх диференціальна діагностика. Київ : Міністерство сільськогосподарства УРСР, 1960. 6 с.
79. Физиологические экспресс-методы диагностики болезней рыб / Давыдов О. Н. и др. // Гидробиологический журнал. 2000. Т. 36, № 4. С. 99—110.
80. Шергин Ю. К., Егосин И. С., Бричук П. Ф. Дерматофибросаркома у судаков и ее диагностика // Ветеринария. 1972. № 5. С. 78—79.
81. Щелкунов И. С. Генно-инженерные вакцины рыб: итоги первых двенадцати лет исследований по созданию противорабдовирусных вакцин // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 2001. Вып. 329. С. 54—66.
82. Щелкунов И. С. Разработка методики очистки иридовируса карпа // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1984. Вып. 40. С. 3—12.
83. Ёун А. И., Лулла А. В. Диагностика и лечение вибриоза рыб // Ветеринария. 1983. № 7. С. 43—44.
84. Экспресс-диагностика болезней рыб / Давыдов О. Н. и др. Киев : Институт зоологии НАНУ, 2001. 168 с.
85. Юришинець В. І. Методи іхтіопаразитологічних досліджень // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 143—148.
86. Ящук В. Д. О диагностике ботриоцефалеза рыб // Ветеринария. 1974. № 10. С. 88—89.

REFERENCES

1. Arshanitsa, N. M. (1970). Voprosy epizootologii, diagnostiki i profilaktiki bolezni plavatel'nogo puzyrya karpa. *Extended abstracts of candidate's thesis*. Leningrad.

2. Arshanitsa, N. M. (1969). Epizootologiya i metody diagnostiki bolezni plavatel'nogo puzyrya karpov. *Izvestiya GosNIORKh*, 65, 245-252.
3. Arshanitsa, N. M., & Lyashenko, O. A. (2007). Patologoanatomicheskii metod issledovaniya toksikozov ryb. *Ratsional'noe ispol'zovanie presnovodnykh ekosistem - perspektivnoe napravlenie realizatsii natsional'nogo proekta "Razvitie APK": Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 17-19 dek. 2007 g.: mater. i dokl.* Moskva: Rossel'khozakademiya, 112-115.
4. Asadchaya, R. L. (2004). Ekspres-diagnostika i sposoby profilaktiki bakterial'nykh infektsiy rastitel'noyadnykh ryb. *Rybne gospodarstvo*, 63, 7-9.
5. Bauer, O. N., & Lopukhina, A. M. (1974). Metodika izucheniya vliyaniya parazitov na produktivnost' ryb v predelakh areala. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 1. Vil'nyus: Mintis, 132-141.
6. Voronin, V. N., et al. (2011). *Bolezni ryb v akvakul'ture Rossii: prakticheskoe rukovodstvo*. Sankt-Peterburg: GosNIORKh.
7. Borisova, M. N., Skachkov, D. P., & Skvortsova, F. K. (2009). Filometroidoz karpov: epizootologiya, diagnostika, metody lecheniya i profilaktika. *Rybnoe khozyaystvo*, 1, 89-91.
8. Banina, N. N. (Comp.). (1979). *Bor'ba s apiozomozom i epistilozom ryb pri iskusstvennom vyrashchivanii: metodicheskie ukazaniya*. Leningrad: GosNIORKh.
9. Breev, K. A. (1976). Primenenie matematicheskikh metodov v parazitologii. *Izvestiya GosNIORKh*, 105, 109-126.
10. Vashchenko, A. V., & Mokrieva, N. B. (2002). Polimerazna lantsyugova reaktsiya - perspektivnyi metod diagnostiky infektsiynykh khvorob obektiv akvakul'tury. *Problemy akvakul'tury i funktsionirovaniya vodnykh ekosistem: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. molodykh uchenykh, 25-28 fevr. 2002 g.: mater.* Kiev: Institut rybnogo khozyaystva UAAN; Natsional'nyy agrarnyy universitet, 145-146.
11. Vashchenko, A. V., & Kharkavlyuk, N. Ie. (2008). Metody vidilennya fagiv *Pseudomonas* vid ryb riznykh regioniv Ukrainy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 110-113.
12. Vladimirov, V. L. (1969). Metod dlitel'noy zaderzhki antibiotikov v organizme ryb. *Izvestiya GosNIORKh*, 69, 76-82.
13. *Vremennaya instruktsiya o meropriyatiyakh po preduprezhdeniyu i likvidatsii bolezney prudovykh ryb.* (1958). Kishinev: Ministerstvo sel'skogo khozyaystva MSSR.
14. Panasenko, V. V., Afanas'ev, V. I., & Suleymanyan, V. S. (Comp.). (1980). *Vremennyye rekomendatsii po profilaktike protozoynykh bolezney ryb*. Krasnodar: Krasnodarskiy filial VNIIPRKh.
15. Gaydey, O. S. (2011). Epizootologichniy monitoring virusnoi gemoragichnoi septitsemii foreli ta rozrobka zasobiv diagnostiki. *Extended abstracts of candidate's thesis*. Kharkiv: Institut eksperimental'noi i klinichnoi veterinarnoi meditsini.
16. Golovin, P. P. (1986). *Vremennaya metodika opredeleniya ekonomicheskoy effektivnosti lechebno-profilakticheskikh i ozdorovitel'nykh meropriyatiy v rybovodnykh khozyaystvakh*. Moskva: VNIIPRKh.
17. Golovina, N. A., Golovin, P. P., & Vanyatinskiy, V. F. (1987). K voprosu o diagnostike daktilogiroza karpa. *Sbornik nauchnykh trudov VNIIPRKh*, 50, 47-56.
18. Goncharov, G. D. (1973). *Laboratornaya diagnostika bolezney ryb*. Moskva: Kolos.

19. Hrytsyniak, I. I., Tushnits'ka, N. Y., & Matvienko, N. M. (2011). *Diagnostika, likuvannya ta zakhodi profilaktiki asotsiyovanoii formi krasnukhi koropa: metodichni rekomendatsii*. Kyiv.
20. Davydov, O. N. (1970). K metodike sodержaniya v iskusstvennykh sredakh paraziticheskikh chervey ryb. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 6, 3, 122-125.
21. Davydov, O. N. (1976). Metod otsenki deystviya razlichnykh veshchestv v model'noy sisteme gel'mint - kishchnik. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 12, 6, 100-102.
22. Davydov, O. N., Abramov, A. V., & Temnikhanov, Yu. D. (2007). *Veterinarno-sanitarnyy kontrol' pishchevykh gidrobiontov*. Cherkassy: ANT.
23. Matvienko, N. M., et al. (2007). Ekologichno bezpechni metodi borot'bi z psevdomonozami prysnovodnykh ryb. *Naukovyi visnyk LNUVM ta BT im. S. Z. Gzhytskogo*, 9, 4(35), 1, 109-111.
24. Engashev, V. G. (1975). Prizhiznennyi metod diagnostiki bolezney ryb. *Rybovodstvo i rybolovstvo*, 2, 48-49.
25. Zabotkina, E. A. (2005). Ispol'zovanie gistologicheskikh biomarkerov dlya diagnostiki patomorfologicheskikh izmeneniy v immunokompetentnykh organakh. *Akvakul'tura i integrirovannyye tekhnologii: problemy i vozmozhnosti: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posvyashch. 60-letiyu Moskovskoy rybovodno-meliorativnoy opyt'noy stantsii i 25-letiyu ee reorganizatsii v GNU VNIIR, Moskva, 11-13 apr. 2005 g.: mater.* (Vol. 3). Moskva, 161-164.
26. Buchats'kiy, L. P., et al. (2007). Zastosuvannya polimeraznoii lantsyugovoi reaktsii dlya diagnostiki limfosarkomatozu shchuk Kyivs'kogo ta Kanivs'kogo vodoshkovichch. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 60-64.
27. Dronik, V. S., et al. (2013). *Zbirnyk normativno-tekhnologichnoii dokumentatsii po diagnostitsi khvorob kharchovikh gidrobiontiv*. Kyiv: INKOS.
28. Rakhkonen, R., et al. (2000). *Zdorovaya ryba. Profilaktika, diagnostika i lechenie bolezney*. Khel'sinki: NII okhotnich'ego i rybnogo khozyaystva.
29. Ivanova, N. T. (1976). Metod morfologicheskogo analiza krovi v ikhtopatologicheskikh issledovaniyakh. *Izvestiya GosNIORKh*, 105, 105-108.
30. *Invazionnye bolezni ryb: metodicheskie rekomendatsii po voprosam diagnostiki*. (1986). Belaya Tserkov'.
31. *Instruktsii o meropriyatiyakh po bor'be s brankhiomikozom, ikhtioftiriozom, kariofil'ezom, kariofil'lezom i botriotsefalezom ryb*. (1965). Moskva: Kolos.
32. *Instruktsiya o meropriyatiyakh po bor'be s kostiozom, khilodonellezom, girodaktilezom i daktilogirozom ryb v prudovykh khozyaystvakh*. (1966). Moskva: Kolos.
33. *Instruktsiya po biologicheskomu metodu bor'by s postodiplostomozom i diplostomozom presnovodnykh ryb*. (1985). Krasnodar: Krasnodarskiy filial VNIIPRKH.
34. Kal'nibolotskiy, A. A. (1976). Osnovy metodiki opredeleniya ushcherba, prichynaemogo rybnomu khozyaystvu boleznyami ryb. *Izvestiya GosNIORKh*, 105, 127-129.
35. Kanaev, A. (1986). Metody diagnosticheskikh issledovaniy v ikhtopatologii. *Rybovodstvo i rybolovstvo*, 6, 18-19.
36. *Kariofil'oz koropa ta zakhodi borot'bi z nim*. (1961). L'viv: L'vivs'ke obl. upravlinnya sil's'kogo hospodarstva.
37. Koziy, M. S. (2008). Viktorystannya novitnykh gistologichnykh metodik dlya diagnostiki gel'mintnykh zakhvoryuvan' ryb. *Tavriys'kiy naukoviy visnyk*, 59, 113-116.
38. *Laboratorniy praktikum v biologiii, patologiii ta vetsanekspertizi prysnovodnykh*

- rib: uch. posibnik.* (1994). Bila Tserkva: Bilotserkivs'kiy s/g in-t; Institut ribnogo gospodarstva UAAN.
39. *Laboratorni metody doslidzhen' u biologii, tvarynnitstvi ta veterinarniy medytsyni: dovidnik.* (2012). L'viv: SPOLOM.
40. Litvinenko, V. V. (1982). Metod polucheniya negativnykh koloniy, obrazuemykh rabdovirusom karpa. *Rybnoe khozyaystvo*, 35, 63-65.
41. Losev, A. A., & Ovcharenko, N. A. (2003). Metodicheskie osnovy izucheniya krovyanykh parazitov ryb. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 40, 6, 105-114.
42. Markevich, A. P. (1950). *Metodika i tekhnika parazitologicheskogo obsledovaniya ryb.* Kiev: KGU.
43. Kornienko, G. G., et al. (2005). Metod polietilglikolevoy pretsipitatsii svyazannogo kongyutina dlya opredeleniya immunnykh kompleksov. *Fiziologo-biokhimicheskie i geneticheskie issledovaniya ikhtiofauny Azovo-Chernomorskogo basseyne. Metodicheskoe rukovodstvo.* Rostov-na-Donu: Everest, 17-18.
44. *Metodika postanovki biologicheskoy proby v ikhtiopatologii. Metody diagnostiki otravleniy ryb v vodoemakh.* (1971). Moskva: Vsesoyuznaya Ordena Lenina akademiya sel'skokhozyaystvennykh nauk imeni V. I. Lenina.
45. Osadchaya, E. F., & Prosyanyaya, V. V. (Comp.). (1981). *Metodicheskie rekomendatsii po bor'be s boleznyami ryb v basseynakh i sadkakh na teplykh vodakh.* Kiev: UkrNIIRKh.
46. Rudenko, A. P., & Yatsyshin, A. I. (1982). *Metodicheskie rekomendatsii po patomorfologicheskoy i gistokhimicheskoy diagnostike krasnukhi karpov.* Kiev.
47. *Metodicheskie ukazaniya po bakteriologicheskomu issledovaniyu vody i gidrobiontov pri zabolevaniyakh ryb, vyzyvaemykh vibrionami. Metodicheskie ukazaniya po prigotovleniyu kul'tury kletok gonad karpa (serebryanogo karasya) i ee primeneniyu pri virusologicheskikh boleznyakh ryb.* (1976). Moskva: Kolos.
48. Bauer, O. N. (Comp.). (1959). *Metodicheskie ukazaniya po bor'be s daktilogirozom karpa v prudovykh khozyaystvakh.* Leningrad: GosNIORKh.
49. Sakharov, R. S., et al. (2001). Metodicheskie ukazaniya po opredeleniyu antigenov eritrotsitov ryb s pomoshch'yu izoimmunnykh antitel. *Sbornik nauchno-tekhnologicheskoy i metodicheskoy dokumentatsii po akvakul'ture.* Moskva: VNIRO, 165-176.
50. Buchats'kiy, L. P., et al. (2009). *Metodychni vkazivki shchodo laboratornoi diagnostyky virusnykh khvorob ryb.* Kyiv: Institut ribnogo gospodarstva NAAN.
51. Matvienko, N. M., Rud', Yu. P., & Buchats'kiy, L. P. (2015). *Metodychni rekomendatsii shchodo molekulyarno-biologichnoyi diagnostiki virusu infektsiynogo pankreatichnogo nekrotichnogo nekrozu foreli.* Kyiv: Instytut rybnogo gospodarstva NAAN.
52. Golovko, A. N., et al. (2007). *Mikrobiologicheskije i virusologicheskije metody issledovaniy v veterinarnoy meditsine: spravocnoe posobie.* Khar'kov: NTMT.
53. Gerilovych, A. P., et al. (2014). *Molekulyarno-genetichni metody diagnostyky u veterinarniy meditsini ta biotekhnologii.* Kyiv: ST-druk.
54. Nakonechnaya, M. G. (1978). Metodika polucheniya syvorotki krovi ot embrionov krupnogo rogatogo skota dlya virusologicheskikh issledovaniy v ikhtiopatologii. *Rybnoe khozyaystvo*, 26, 76-78.
55. Nizova, G. A. (2005). Metody parazitologicheskogo issledovaniya ryb i drugikh gidrobiontov. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom bassejne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot.* Krasnodar: AzNIIRKh, 316-329.

56. *Normatyvno-pravovi akty z pytan' polipshennya roboty po profilaktitsi, diagnostitsi ta borot'bi z khvorobamy ryb.* (2003). Kyiv: Derzhavniy departament veterinarnoi meditsyny.
57. Ovcharenko, N. A. (2002). Novye i modifitsirovannyye metody issledovaniya mikrosporidiy vodnykh zhivotnykh (obzor). *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 39, 1, 62-72.
58. Ozheredova, N. A. (2006). Tsitrobakterioz u karpovykh ryb: rasprostraneniye, kliniko-morfologicheskyye izmeneniya, diagnostika. *Rybnoye khozyaystvo*, 2, 77-78.
59. Osadchaya, E. F. (1965). Izyskanie putey polucheniya odnosloynnykh kletochnykh kul'tur iz tkaney karpa i vozmozhnostey ikh primeneniya dlya diagnostiki nekotorykh bolezney ryb. *Extended abstracts of candidate's thesis*. Kiev.
60. Osadchaya, E. F., Nakonechnaya, M. G., & Litvinenko, V. V. (1980). Konservirovaniye virusov, vydelennykh ot ryb, metodom liofilizatsii. *Rybnoye khozyaystvo*, 30, 87-89.
61. Chernysheva, N. B., et al. (2009). *Parazitologicheskoe issledovanie ryb: metodicheskoe posobie*. Sankt-Peterburg: GosNIORKh.
62. Verbits'kiy, P. I. (Ed.). (2005). *Posibnyk po diagnostytsi khvorob ryb*. Kyiv: Art Ek.
63. Pronina, G. I. (2008). Ispol'zovaniye tsitokhimicheskikh metodov dlya opredeleniya fagotsitarnoy aktivnosti kletok krovi i gemolimfy raznykh vidov gidrobiontov dlya otsenki sostoyaniya ikh zdorov'ya. *Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta*, 4, 20-1, 160-162.
64. Rautskis, E. Yu. (1978). Metodicheskie rekomendatsii po ekologo-faunisticheskomu issledovaniyu zarazhennosti parazitami rybtsa i drugikh vidov prokhodnykh ryb na protyazhenii ikh arealov. *Tipovyye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 3. Vil'nyus: Institut zoologii i parazitologii AN Litovskoy SSR, 83-85.
65. Sekretaryuk, K. V., & Pirus, R. I. (1984). *Rekomendatsii po diagnostike i profilaktike filometroidoza karpa: metodicheskii material*. L'vov.
66. Vovk, N. I., Prosyana, V. V., & Sidorov, M. A. (1996). *Rekomendatsii z profilaktiki kormovykh toksikoziv ta zakhvoryuvan' kanal'nogo soma polietiologichnoyi prirodi pri industrial'nomu viroshchuvanni v teplovodnikh ribnikh gospodarstvakh*. Kyiv: Institut ribnogo gospodarstva UAAN.
67. Rud', Yu. P. (2013). Identifikatsiya gramnegativnykh bakteriy u rib metodom PLR-PDRF genu 16S rRNK. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 80-86.
68. Rud', Yu. P., & Buchats'kiy, L. P. (2009). Amplifikatsiya genu timidinkinazi yak zruchniy metod diagnostiki DNK-virusiv rib. *Rybne gospodarstvo*, 67, 175-178.
69. Rud', Yu. P., Zhuk, L. V., & Vladimirs'kiy, I. B. (2012). Vykoristannya mul'tipleksnoyi polimeraznoyi lantsyugovoii reaktsii v ekspres-diagnostitsi infektsiynykh zakhvoryuvan' ryb. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 3/4, 59-62.
70. Rud', Yu. P., & Tsiganok, I. O. (2014). Molekulyarna diagnostika *Yersinia ruckeri*. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 69-78.
71. *Sbornik nauchno-tekhnologicheskoy i metodicheskoy dokumentatsii po akvakul'ture v Belarusi za period s 2006 po 2018 gody.* (2018). Minsk: Instytut rybnogo khoziaystva NAN Belarusi.
72. Suleymanyan, V. S., Panasenkov, V. V., & Denisov, A. I. (1983). *Sbornik normativnykh dokumentov po profilaktike i bor'be s infektsionnymi i invazionnymi boleznyami prudovykh ryb*. Krasnodar: Krasnodarskiy filial VNIIPRKh.
73. *Sbornik pravil, instruktsiy i nastavleniy po bor'be s boleznyami ryb.* (1972). Rybnoe: VNIIPRKh.

74. Sedov, V. A., Zimin, N. L., & Sapozhnikov, G. I. (2000). Organizatsiya diagnostiki bolezney ryb: sostoyanie i perspektivy. *Problemy okhrany zdorov'ya ryb v akvakul'ture: nauch.-prakt. konf.: tezisy dokl.* Moskva: Rossel'khozakademiya, 19-20.
75. Sekretaryuk, K. V. (2001). *Laboratorna diagnostika invaziyivnykh khvorob ryb.* Moskva: Universum Publishing.
76. Sekretaryuk, K. V., & Tafiychuk, R. I. (2002). Tsitogenetichniy (metafazniy) metod doslidzhennya somatichnikh klitin koropa. *Problemy akvakul'tury i funktsionirovaniya vodnykh ekosistem: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. molodykh uchenykh, 25-28 fevr. 2002 g.: mater.* Kiev: Institut rybnogo khozyaystva UAAN; Natsional'nyy agrarnyy universitet, 123-124.
77. Zaloilo, O. V., Rud', Yu. P., Zaloilo, I. A., & Hrytsyniak, I. I. (2016). Suchasni metodi molekulyarnoi diagnostiki zakhvoryuvan' rib (oglyad). *Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2*, 48-64.
78. Timchasovi rekomendatsii po profilaktitsi i borot'bi z botriotsefal'ozom i kariofil'ozom koropiv ta iikh diferentsial'na diagnostika. (1960). Kyiv: Ministerstvo sil's'kogo gospodarstva URSR.
79. Davydov, O. N., et al. (2000). Fiziologicheskie ekspres-metody diagnostiki bolezney ryb. *Gidrobiologicheskii zhurnal, 36, 4*, 99-110.
80. Shergin, Yu. K., Egoshin, I. S., & Brichuk, P. F. (1972). Dermatofibrosarkoma u sudakov i ee diagnostika. *Veterinariya, 5*, 78-79.
81. Shchelkunov, I. S. (2001). Genno-inzhenernye vaksiny ryb: itogi pervykh dvenadtsati let issledovaniy po sozdaniyu protivorabdovirusnykh vaksyn. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh, 329*, 54-66.
82. Shchelkunov, I. S. (1984). Razrabotka metodiki ochistki iridovirusa karpa. *Sbornik nauchnykh trudov VNIIPRKh, 40*, 3-12.
83. Yun, A. I., & Lullu, A. V. (1983). Diagnostika i lechenie vibrioza ryb. *Veterinariya, 7*, 43-44.
84. Davydov, O. N., et al. (2001). *Ekspres-diagnostika bolezney ryb.* Kiev: Institut zoologii NANU.
85. Yurishinets', V. I. (2006). Metody ikhtioparazitologichnikh doslidzhen'. *Metody gidroekologichnykh doslidzhen' poverkhnevnykh vod.* Kyiv: Logos, 143-148.
86. Yashchuk, V. D. (1974). O diagnostike botriotsefaleza ryb. *Veterinariya, 10*, 88-89.

TAPAS – міжнародний дослідницький проект

Пропонуємо ознайомитись та долучитись до **TAPAS (Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability)**, що діє в межах програми Horizont 2020 з 2016 року. Його мета — консолідація стабільності європейської аквакультури шляхом розробки спеціальних підходів та умов, на основі всебічного аналізу всіх форм та типів ведення аквакультури, включно з марикультурою. Ключовою сферою діяльності є виявлення нормативних потреб існуючих й новітніх практик аквакультури. Більше інформації можна отримати, відвідавши **сайт: www.tapas-H2020.eu**.

Координатор проекту: Trevor Telfer, University of Stirling.

З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ !

*Дай Боже Вам любові та тепла,
Добра в сім'ї і затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
І цілий рік був щедрим та веселим!*

*Нехай приносить радість рік Щура,
Та Інститут наш лише процвітає,
Хай здійснюються мрії на ура!
Колеги, зі святом щиро Вас вітаєм!*

Головний редактор,
доктор сільськогосподарських наук, професор,
член-кореспондент НААН
Тарасюк Сергій Іванович

Заступник головного редактора,
директор Інституту рибного господарства НААН,
доктор сільськогосподарських наук, професор,
академік НААН,
Грициняк Ігор Іванович

ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ РИБ

В лабораторії біотехнологій в рибицтві проводять високоспецифічну та сучасну діагностику інфекційних захворювань риб. Для ідентифікації збудників хвороб використовуються молекулярно-біологічні методи, а саме — полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) та її різновиди. Перелік збудників інфекційних захворювань риб та відповідні діагностичні тест-системи в лабораторії біотехнологій у рибицтві ІПГ НААН представлено в таблиці.

№	Інфекційний агент	Вид риб	Метод
Вірусні захворювання			
1	Вірус інфекційного панкреатичного некрозу (IPNV)	Лососеві	ЗТ-ПЛР
2	Вірус геморагічної септицемії (VHSV)	Лососеві	ЗТ-ПЛР
3	Вірус інфекційного гематопоетичного некрозу (IHNV)	Лососеві	ЗТ-ПЛР
4	Альфавірус лососевих (SAV)	Лососеві	ЗТ-ПЛР
5	Вірус інфекційної анемії лососевих (ISAV)	Лососеві	ЗТ-ПЛР
6	Реовірус лососевих (PRV)	Лососеві	ЗТ-ПЛР
7	Вірус весняної віремії коропа (SVCV)	Коропові	ЗТ-ПЛР
8	Герпесвірус коропа (CyHV, KHV)	Коропові	ПЛР
9	Вірус віспи коропа (Carp Edema Virus, CEV)	Коропові	ПЛР
10	Герпесвірус осетра (AcHV)	Осетрові	ПЛР
11	Мімівірус (Іридовірус) осетра (AcIV)	Осетрові	ПЛР
12	Аденовірус осетра (AcAdV)	Осетрові	ПЛР
13	Герпесвірус канального сома (CCV)	Іctalурові	ПЛР
14	Рабдовірус щуки (PFRV)	Щукові	ЗТ-ПЛР
15	Вірус лімфосаркоми щуки та судака	Окуневі	ЗТ-ПЛР
Бактеріальні захворювання			
16	Бактеріальна хвороба нирок (BKD) <i>Renibacterium salmoninarum</i>	Лососеві	ПЛР
17	Фурункульоз — <i>Aeromonas salmonicida</i>	Лососеві	ПЛР
18	Єрсиніоз (Enteric redmouth disease) — <i>Yersinia ruckeri</i>	Лососеві	ПЛР
19	Бактеріальна геморагічна септицемія — <i>Aeromonas hydrophila</i>	Коропові	ПЛР
20	Стрептококова інфекція осетра та тиялії — <i>Streptococcus iniae</i>	Осетрові Цихлові	ПЛР
21	Флавобактеріоз (Bacterial cold water disease, BCWD) — <i>Flavobacterium psychrophila</i>	Лососеві	ПЛР
22	Колумнарна хвороба (Columnaris disease) — <i>Flavobacterium columnarum</i>	Лососеві	ПЛР
23	Бактеріальна септицемія сома — <i>Edwardsiella ictaluri</i>	Іctalурові	ПЛР
24	Вібриоз — <i>Vibrio anguillarum</i>	Іctalурові Лососеві	ПЛР
Паразити			
25	Проліферативна хвороба нирок — <i>Tetracapsuloides bryosalmonae</i>	Лососеві	ПЛР
26	Міксомомоз (Whirling disease) — <i>Myxobolus cerebralis</i>	Лососеві	ПЛР

Для одержання додаткової інформації можна звертатися за адресою:

Інститут рибного господарства НААН, вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164.

Лабораторія біотехнологій у рибицтві, зав. лаб., к.б.н., с.н.с. Рудь Юрій Петрович: (097) 953-80-80, rudziknew@ukr.net.

FISHERIES SCIENCE OF UKRAINE

"Fisheries Science of Ukraine" — a scientific journal, has been published in Ukraine since 2007. "Fisheries Science of Ukraine" included in the List of Specialized Publications of Ukraine, which can be used for publishing results of doctor's and candidate's thesis (biological and agricultural sciences), was approved in 08.07.2009, recertification of 06.11.2014 (Ministry of Education and Science of Ukraine №1279)

Founder and publisher of the journal — Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

State registration certificate KB № 20934-10734 PR of 18.08.2014

EDITOR-IN-CHIEF

Serhiy Tarasiuk, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences, UKRAINE

DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF

Ihor Hrytsyniak, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Academician of the NAAS of Ukraine, Director, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Natalia Kolesnyk, Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of International Scientific and Technical Cooperation and Intellectual Property, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

EDITORIAL BOARD

BIOLOGICAL SCIENCES

Boris Gomelsky, Doctor of Biological Sciences, Professor, Kentucky State University, UNITED STATES OF AMERICA

Daniel Patrick, Doctor of Biological Sciences, Head of Biology Department Laboratories of the Pyrenees and Landes, FRENCH REPUBLIC

Ihor Buzevych, Doctor of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Leonid Buchatskyi, Doctor of Biological Sciences, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Leading Research Scientist of the Laboratory of Biotechnologies in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Natalia Matvienko, Doctor of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Ichthyopathology, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Gautam V. Zodape, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Zoology of Shivaji University Kolhapur, REPUBLIC OF INDIA

Oleksandr Didenko, Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Department of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Vasyl Sondak, Doctor of Biological Sciences, Head of the Water Bioresources Department, National University of Water and Environmental Engineering, UKRAINE

Yuriy Rud', Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Bio-technology in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Oleksandr Potrokhov, Doctor of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Biology of reproduction of fish, Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, UKRAINE

Pavlo Kutishchev, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Aquatic Bioresources and Aquaculture, Kherson State Agricultural University, UKRAINE

Liudmyla Dragan, Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Ecological Studies Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Oleh Marenkov, Candidate of Biological Sciences, Assistant

professor in the Department of General Biology and Water Bioresources, Oles Honchar Dnipro National University, UKRAINE

AGRICULTURAL SCIENCES

XU Pao, Doctor, Professor, Director of Freshwater Fisheries Research Center, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Jedrzej Krupinski, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director, National Research Institute of Animal Production, POLAND

Oleksandr Tretiak, Doctor of Agricultural Sciences, Senior Research Scientist, Deputy Director in scientific works, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Vitaliy Bekh, Doctor of Agricultural Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Fish Selection, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Isaak Sherman, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Head of the Aquaculture Department, Kherson State Agrarian University, UKRAINE

Oleksandr Kostenko, Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Veterinary Medicine and Zootechnics Department, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, UKRAINE

Tetiana Sharamok, Candidate of Agricultural Sciences, Assistant professor in the Department of General Biology and Water Bioresources, Oles Honchar Dnipro National University, UKRAINE

Liudmyla Chepil, Candidate of Agricultural Sciences, Assistant professor in the Department of Animal Biology, National University of Life and Environmental Sciences, UKRAINE

Zsigmond Jeney, Doctor of Sciences, Honorary Professor of Pannon University, HUNGARY

Mykola Klymenko, Doctor of Agricultural Sciences, Head of the departments of ecology, technology of environmental protection and forestry, National University of Water and Environmental Engineering, UKRAINE

Denys Breus, Candidate of Agricultural Sciences, Assistant professor in the Department of Ecology and Sustainable Development named after Professor Yu.V. Pilipenko, Kherson State Agrarian University, UKRAINE

SCIENTIFIC EDITORS OF SECTIONS

are staff employees of the Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine: **Natalia Tushnytska**, Candidate of Veterinary Sciences, Senior Research Scientist, Scientific Secretary of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yaroslav Tuchapskyi**, Candidate of Agricultural Sciences, Head of the Carp Breeding Laboratory of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Olha Zaloilo**, Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Molecular-Genetic Studies of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Zabytivskyi**, Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist of Section of Sturgeon of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Antonina Mruk**, Head of the Laboratory Salmonids Culture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Tetiana Hryhorenko**, Candidate of Agricultural Sciences, Head of the Laboratory of Hydrobiology and Technology of Invertebrates Cultivation of the Institute of Fisheries of the NAAS.

Editorial board of the Journal "Fisheries Science of Ukraine", Institute of Fisheries NAAS, 135, Obukhivska St, Kiev-164, Ukraine, 03164; tel.: +38 (044) 223-84-34; tel/fax: +38 (044) 423-74-62 <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Layout design: Natalia Kolesnik, Serhiy Shinkar, Yevheniy Arkhanhelskyi, Oleksandr Bezusyi; **Making-up:** Yevheniy Arkhanhelskyi, Maria Simon; **Literature editing:** Tetiana Shvets; **Corrector:** Hanna Kovalchuk

ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НААН
вул. Обухівська, 135 м. Київ-164, 03164, Україна
тел./факс: +38(044) 423-74-62, тел.: +38(044) 423-74-65

<http://fsu.ua>

info@fsu.ua