ISSN 2312-9581 (Online)

ISSN 2075-1508 (Print)

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu>

F S U

FISHERIES SCIENCE OF UKRAINE

Institute of Fisheries
of the National Academy
of Agrarian Sciences
of Ukraine

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

3

Інститут рибного господарства
Національної академії аграрних наук України

2020

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські спеціальності — 091, 207), категорія «Б», переатестація від 17.03.2020 (наказ Міністерства освіти і науки України № 409)

Засновник та видавник — Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію KB № 20934-10734 ПР від 18.08.2014

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Матвієнко Наталія Миколаївна, доктор біол. наук, с. н. с., зав. відділу іхтіопатології, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ГРИЦІНЯК Ігор Іванович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, директор Інституту рибного господарства НААН, УКРАЇНА

КОЛЕСНИК Наталія Леонідівна, кандидат с.-г. наук, с. н. с., зав. лаб. міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

БІОЛОГІЯ

Патрік Даніель, доктор біол. наук, голова департаменту біології Лабораторії Піренеїв, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА

Бұзевіч Ігор Юрійович, доктор біол. наук, с. н. с., зав. відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Бучацький Леонід Петрович, доктор біол. наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), провідний науковий співробітник лаб. біотехнологій в рибництві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Діденко Олександр Володимирович, канд. біол. наук, с. н. с., відділ вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, зав. каф. водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА

Рудь Юрій Петрович, канд. біол. наук, с. н. с., зав. лабораторії біотехнологій в рибництві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Потрохов Олександр Спиридонович, доктор біол. наук, с. н. с., зав. лаб. біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, УКРАЇНА

Кутіщев Павло Сергійович, канд. біол. наук, зав. каф. водних біоресурсів та аквакультури, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

Драган Людмила Петрівна, канд. біол. наук, с. н. с., зав. лаб. екологічних досліджень, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Кружиліна Світлана Володимирівна, канд. біол. наук, с. н. с., зав. сектору відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Маренков Олег Сергійович, канд. біол. наук, доцент каф. загальної біології та водних біоресурсів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, УКРАЇНА

ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА

Гомельський Борис, доктор біол. наук, професор, Державний Університет Кентуккі, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Ху Пао, доктор с.-г. наук, професор, директор Центру прісноводного рибного господарства, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

Крупінські Єджей, доктор с.-г. наук, професор, іноземний член Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут зоотехнії Польщі, ПОЛЬЩА

Зодапе Гаутам В., доктор біол. наук, професор, декан факультету зоології Державного Університету Шиваджи в Колхатурі, РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ

Третяк Олександр Михайлович, доктор с.-г. наук, с. н. с., заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Тарасюк Сергій Іванович, доктор с.-г. наук, професор, член-кор. НААН, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Бех Віталій Валерійович, доктор с.-г. наук, професор, каф. аквакультури, Національний університет біоресурсів і природокористування, УКРАЇНА

Костенко Олександр Іванович, канд. с.-г. наук, с. н. с., зав. відділу ветеринарної медицини та зоотехнії, Національна академія аграрних наук України, УКРАЇНА

Шарамок Тетяна Сергіївна, канд. с.-г. наук, доцент каф. загальної біології та водних біоресурсів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, УКРАЇНА

Чепіль Людмила Василівна, канд. с.-г. наук, доцент каф. біології тварин, Національний університет біоресурсів і природокористування, УКРАЇНА

Жигмонд Женей, доктор с.-г. наук, професор, Паннонський університет, УГОРЩИНА

Бреус Денис Сергійович, канд. с.-г. наук, доцент каф. екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

є штатними працівниками Інституту рибного господарства НААН України: **Тушницька Наталія Йосифівна**, канд. вет. наук, с. н. с., вчений секретар ІРГ НААН; **Тучапський Ярослав Васильович**, канд. с.-г. наук, с. н. с. відділу селекції риб ІРГ НААН; **Забитівський Юрій Михайлович**, канд. біол. наук, с. н. с., заступник директора Львівської дослідної станції ІРГ НААН; **Мрук Антоніна Іванівна**, зав. лаб. лососівництва ІРГ НААН; **Григоренко Тетяна Володимирівна**, канд. с.-г. наук, зав. лаб. гідробіології та технологій культивування цінних безхребетних ІРГ НААН; **Куріненко Ганна Анатоліївна**, канд. с.-г. наук, зав. відділу селекції риб ІРГ НААН.

Редакція журналу «Рибогосподарська наука України»: вул. Обухівська, 135, м. Київ-164, 03164
тел.: +38(097) 700-77-25; <http://fsu.ua>; Емайл: fsu.journal@gmail.com

Підписано до друку 25.05.2020 р. Формат 70×108/16. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 8,0. Наклад 500 прим.
Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту рибного господарства НААН (Протокол №4 від 14.09.2020 р.)
Дизайн макету: Колесник Н. Л., Шинкар С. В., Архангельський Є. Ю., Безусий О. Л.

Верстка: Архангельський Є. Ю., Симон М. Ю. **Літературне редагування:** Швець Т. М. **Коректор:** Ковальчук Г. В.
Друкарня ТОВ «ПРО ФОРМАТ», 02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 45 Б, оф. 16, тел.: +38(044) 353-85-58

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

3/2020(53)

Заснований у 2007 р.
Виходить 4 рази на рік

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 1-156
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03>

З М І С Т

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 5-18
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.005>

І. Ю. Бузевич, А. В. Макаренко

Хижий іхтіокомплекс Великобурлуцького водосховища як чинник
впливу на виживання посадкового матеріалу рослиноїдних риб 5

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 19-32
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.019>

Т. В. Григоренко, С. О. Мушит, А. М. Базаєва

Продуктивність вирощувальних ставів за комплексного впливу
на їх екосистему 19

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 33-46
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.033>

Б. О. Ганкевич, О. М. Третьак, О. М. Колос

Деякі особливості вирощування товарної продукції веслоноса (*Polyodon*
spathula Walbaum, 1792) у ставах Лісостепу та Полісся України..... 33

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 47-56
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.047>

У. С. Куць, І. І. Грициняк, Г. А. Куріненко, Я. В. Тучапський

Характеристика екстер'єрних показників самців амурського
сазана (*Cyprinus carpio haematopterus*) різного генезису 47

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 57-68
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.057>

Б. О. Грішин, І. А. Особа, І. І. Грициняк

Аналіз жирнокислотного складу ліпідів гепатопанкреасу
та скелетних м'язів помісних коропів першого покоління 57

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 69-79 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.069	
<i>А. Ю. Пуговкін, К. Б. Міксон</i> Проникність мембран сперматозоїдів карася (<i>Carassius auratus</i> Linnaeus, 1758) до молекул води та кріопротекторів.....	69
ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ	
Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 80-91 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.080	
<i>Ю. О. Коваленко, О. С. Потрохов, М. В. Причена, Л. О. Горбатюк</i> Застосування маркерних показників плітки (<i>Rutilus rutilus</i> Linnaeus, 1758) для діагностики екологічного стану водойм в умовах надмірного антропогенного забруднення.....	80
Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 92-108 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.092	
<i>О. М. Козій</i> Біомоніторинг постстресових адаптивних змін органів травлення стерляді в умовах замкненого водозабезпечення	92
Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 109-124 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.109	
<i>К. А. Машкова, Т. С. Шарамок</i> Деякі цитометричні та біохімічні показники крові карася сріблястого (<i>Carassius gibelio</i> Bloch, 1782) р. Самара Дніпропетровської області	109
КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ	
Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 125-152 DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.125	
<i>І. Й. Грициняк, Т. М. Швець</i> Методи досліджень в іхтіології. Тематична бібліографія	125
ХРОНІКА	
Пам'яті Озінковської Світлани Петрівни.....	153
Пам'яті Олексієнка Олександра Олександровича.....	155

СОДЕРЖАНИЕ

БИОРЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ ВОДОЕМОВ

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 5-18

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.005>*И. Ю. Бузевич, А. В. Макаренко*

Хищный ихтиокомплекс Великобурлуцкого водохранилища как фактор влияния на выживание посадочного материала растительноядных рыб 5

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 19-32

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.019>*Т. В. Григоренко, С. А. Мушкет, А. Н. Базаева*

Продуктивность выростных прудов при комплексном воздействии на их экосистему 19

ТЕХНОЛОГИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 33-46

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.033>*Б. А. Ганкевич, А. М. Третьяк, Е. Н. Колос*Некоторые особенности выращивания товарной продукции веслоноса (*Polyodon spathula* Walbaum, 1792) в прудах Лесостепи и Полесья Украины 33**СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ**

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 47-56

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.047>*У. С. Куць, И. И. Грициняк, А. А. Куриненко, Я. В. Тучапський*Характеристика экстерьерных показателей самцов амурского сазана (*Cyprinus carpio haematopterus*) разного генезиса 47

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 57-68

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.057>*Б. О. Гришин, И. А. Особа, И. И. Грициняк*

Анализ жирнокислотного состава липидов гепатопанкреаса и скелетных мышц помесных карпов первого поколения 57

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 69-79

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.069>*А. Ю. Пуговкин, К. Б. Миксон*Проницаемость мембран сперматозоидов карася (*Carassius auratus* Linnaeus, 1758) для молекул воды и криопротекторов 69**ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ**

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 80-91

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.080>*Ю. О. Коваленко, А. С. Потрохов, Н. В. Причеп, Л. О. Горбатюк*Использование маркерных показателей плотвы (*Rutilus rutilus* Linnaeus, 1758) для диагностики экологического состояния водоемов в условиях антропогенного загрязнения... 80

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 92-108

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.092>*А. М. Козий*

Биомониторинг постстрессовой адаптации органов пищеварения стерляди в условиях замкнутого водообеспечения 92

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 109-124

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.109>*К. А. Машкова, Т. С. Шарамок*Некоторые цитометрические и биохимические показатели крови карася серебряного (*Carassius gibelio* Bloch, 1782) р. Самара Днепропетровской области 109**КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ**

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 125-152

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.125>*Ир. И. Грициняк, Т. М. Швец*

Методы исследований в ихтиологии. Тематическая библиография 125

ХРОНИКА

Памяти Озинковской Светланы Петровны 153

Памяти Алексеенко Александра Александровича 155

C O N T E N T S

BIORESOURCES AND ECOLOGY OF WATER BODIES

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 5-18
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.005>

I. Buzevych, A. Makarenko

Piscivorous ichthyocomplex of the Velykoburluts'ke reservoir as a factor affecting the survivability of fish seeds of Chinese carps 5

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 19-32
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.019>

T. Hryhorenko, S. Mushyt, A. Bazaieva

Productivity of nursery ponds under the complex exposure to their ecosystem 19

TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 33-46
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.033>

B. Gankevich, A. Tretyak, E. Kolos

Some peculiarities of cultivation of table paddlefish (*Polyodon spathula* Walbaum, 1792) in ponds of the Forest-Steppe and Polissiya of Ukraine 33

SELECTION, GENETICS AND BIOTECHNOLOGY

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 47-56
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.047>

U. Kuts', I. Hrytsyniak, H. Kurinenko, Y. Tuchapsky

Characteristic of exterior indicators of male of Amur wild carp (*Cyprinus carpio* haematopterus) of different genesis 47

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 57-68
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.057>

B. Grishyn, I. Osoba, I. Hrytsyniak

Analysis of lipid metabolism in the organism of mixed-bred carp of first generation from crossing the antonino-zozulentynsky and lyubinsky intrabreed types of Ukrainian framed breed 57

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 69-79
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.069>

A. Puhovkin, K. Mikson

Membrane permeability of Prussian carp (*Carassius auratus* Linnaeus, 1758) spermatozoa for water and cryoprotectants molecules 69

PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 80-91
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.080>

Yu. Kovalenko, A. Potrokhov, M. Prychepa, L. Gorbatyuk

Application of marker parameters of roach (*Rutilus rutilus* Linnaeus, 1758) for diagnosis of ecological condition of water bodies in conditions of excessive anthropogenic pollution 80

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 92-108
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.092>

A. Koziv

Biomonitoring of post-stress adaptive changes in the digestive organs of sterlet in conditions of a recirculating aquaculture system 92

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 109-124
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.109>

K. Mashkova, T. Sharamok

Some cytometric and biochemical parameters of the blood of Prussian carp (*Carassius gibelio* Bloch, 1782) of the Samara river, Dnepropetrovsk region 109

CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 125-152
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.125>

Ir. Hrytsynyak, T. Shvets

Research methods in ichthyology. Thematic bibliography 125

CHRONICLE

In memory of Ozinkovs'ka Svitlana Petrivna 153

In memory of Oleksiyenko Oleksandr Oleksandrovych 155

ХИЖИЙ ІХТІОКОМПЛЕКС ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ВИЖИВАННЯ ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ РОСЛИНОЇДНИХ РИБ

І. Ю. Бузевич, busevitch@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. В. Макаренко, almakarenko912@gmail.com, Національний університет
біоресурсів і природокористування, м. Київ

Мета. Визначити та проаналізувати структурні та кількісні показники хижих представників іхтіофауни Великобуллуцького водосховища з оцінкою трофічного навантаження на різновікову молодь білого і строкатого товстолобів та їх гібрида.

Методика. У якості первинних матеріалів використані дані аналізу промислових уловів, які проводилися посезонно протягом 2017–2019 рр. Іхтіологічний матеріал відбирався з уловів ставних сіток з кроком вічка $a = 30\text{--}100$ мм; для біологічного аналізу відібрано 265 екз. риб різних видів. Масу рибних кормових об'єктів реконструювали з використанням емпіричних рівнянь залежності «довжина — маса». Збір і обробку матеріалів здійснювали за загальноприйнятими методиками. Запас розраховувався на підставі коефіцієнтів смертності. У роботі були використані дані офіційної промислової статистики.

Результати. Найбільш чисельними представниками сучасної хижої іхтіофауни Великобуллуцького водосховища є судак (розрахунковий запас на 2019 р. — 26,5 кг/га), щука (11,7 кг/га) та окунь. Модальний ряд щуки та судака в уловах формувався за рахунок молодших та середніх вікових груп, середня довжина судака склала 35,1 см, маса — 0,71 кг; щуки — відповідно 43,6 см та 0,91 кг. Основу живлення судака довжиною до 50 см складали верховодка (40,7% за частотою зустрічання та 20,6% — за масою харчової грудки), окунь (відповідно 29,6 і 28,7%) та плітка (18,5 і 29,0%); у судака довжиною понад 50 см — плітка (57,1 і 36,9%) та окунь (42,9 і 17,3%). У спектрі живлення щуки довжиною до 50 см домінувала плітка (29,7% за частотою зустрічання і 22,9 за масою харчової грудки), карась сріблястий (відповідно 24,3 і 20,5%) та окунь (16,2 і 12,5%); у щуки довжиною 50 см і більше — сріблястий карась (45,5 і 22,6%) та лящ (36,4 і 31,6%). Основним кормовим об'єктом окуня довжиною до 20 см були бичок-піщаник (42,9% за частотою зустрічання та 47,6% за масою харчової грудки) та окуня (відповідно 21,4 і 25,8%); окуня довжиною 20 см і більше — бичок-піщаник (58,3 і 25,8%) та власна молодь (33,3 і 20,2%).

Молодь (0+ — 1+) білого, строкатого товстолобів та їх гібрида в спектрі живлення хижаків відмічалась лише у судака довжиною понад 50 см та щуки; її усереднена вагова частка склала відповідно 8,1 та 0,7%.

За показниками чисельності хижих видів станом на 2019 р., розрахункове споживання посадкового матеріалу товстолобів наважкою 20 г становило 17,6 тис. екз., що складало 51,6% від планових обсягів зариблення Великобуллуцького водосховища.

Наукова новизна. Отримані оригінальні дані щодо живлення хижих видів риб в умовах спеціального товарного рибного господарства на середньому водосховищі. Кількісно оцінений вплив хижаків на посадковий матеріал товстолобів з наважками, меншими, ніж традиційні.

© І. Ю. Бузевич, А. В. Макаренко, 2020

Практична значущість. Отримані дані можуть бути використані для визначення нормативів промислового повернення від цьоголіток-однорічок при здійсненні випасної аквакультури.

Ключові слова: водосховище, хижий іхтіокомплекс, живлення, посадковий матеріал, виживання.

PISCIVOROUS ICHTHYOCOMPLEX OF THE VELKOBURLUTS'KE RESERVOIR AS A FACTOR AFFECTING THE SURVIVABILITY OF FISH SEEDS OF CHINESE CARPS

I. Buzevych, busevitch@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

A. Makarenko, almakarenko912@gmail.com, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Purpose. To determine and analyze structural and quantitative parameters of piscivorous fishes of the Velykoburluts'ke reservoir with the assessment of trophic load on multiple-age juveniles of the silver and bighead carps and their hybrids.

Methodology. Data of the analysis of commercial catches, which were done seasonally during 2017-19, were used as primary materials. The ichthyological material was collected from gill nets catches (mesh size $a=30-100$ mm). In total, 265 fishes of different species were collected for the biological analysis. The weight of fish preys in stomachs was reconstructed using the empirical equations of the length-weight relationships. Sampling and processing of the materials were carried out according to generally accepted methods. Fish stocks were calculated on the basis of fish mortality rates. The data of official commercial statistics were used in the work.

Findings. The most abundant species of the current piscivorous ichthyofauna in the Velykoburluts'ke Reservoir are pikeperch (estimated stock for 2019 — 26.5 kg/ha), pike (11.7 kg/ha) and perch (kg/ha). The modal range of the pike and pikeperch in the catches was formed by younger and middle age groups, the average length of pikeperch was 35.1 cm, weight - 0.71 kg; pike - 43.6 cm and 0.91 kg, respectively. The most important prey objects of the pikeperch of up to 50 cm in length were bleak (40.7% by the frequency of occurrence and 20.6% by weight of the stomach content), perch (29.6% and 28.7%, respectively) and roach (18.5% and 29.0%); pikeperch longer than 50 cm preyed on roach (57.1% and 36.9%) and perch (42.9% and 17.3%). The food spectrum of pike of up to 50 cm in length was dominated by roach (29.7% by the frequency of occurrence and 22.9% by weight of the stomach content), Prussian carp (respectively 24.3% and 20.5) and perch (16.2% and 12, 5%); that of the pike with a length of 50 cm and more — Prussian carp (45.5% and 22.6%) and bream (36.4% and 31.6%). The main prey objects of perch of up to 20 cm in length were monkey goby (42.9% by the frequency of occurrence and 47.6% by weight of the stomach content) and perch (21.4% and 25.8%, respectively); perch with a length of 20 cm and more — monkey goby (58.3% and 25.8%) and their own juveniles (33.3% and 20.2%).

Juveniles (0+-1+) of the silver, bighead carps and their hybrids were recorded in the stomach contents of piscivorous fishes only in pikeperch with a length of more than 50 cm and pike, their averaged weight share was 8.1 and 0.7%, respectively.

Based on the abundance of piscivorous fishes in 2019, the calculated consumption of 20 g Chinese carps seeds is 17600 ind. that is 51.6% from planned amounts of stocking of the Velykoburluts'ke reservoir.

Originality. Original data on feeding of piscivorous fishes in the conditions of special table fish farm on the middle reservoir have been obtained. The effect of piscivorous fishes on Chinese carps seeds with weights lower than the traditional ones has been assessed quantitatively.

Practical value. The obtained data can be used for the determination of targets of stocking efficiency of the young-of-the-year and yearlings in the case of fish ranching.

Key word: reservoir, piscivorous ichthyocomplex, feeding, fish seeds, survivability.

ХИЩНЫЙ ИХТИОКОМПЛЕКС ВЕЛИКОБУРЛУЦКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ВЫЖИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА РАСТИТЕЛЬНЮДНЫХ РЫБ

І. Ю. Бузевич, busevitch@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, г. Київ
А. В. Макаренко, almakarenko912@gmail.com, Національний університет
біоресурсів і природопольовання, г. Київ

Цель. *Определить и проанализировать структурные и количественные показатели хищных представителей ихтиофауны Великобурлуцкого водохранилища с оценкой трофической нагрузки на разновозрастную молодь белого и пестрого толстолобиков и их гибрида.*

Методика. *В качестве первичных материалов использованы данные анализа промысловых уловов, проведенных посезонно в течение 2017–2019 гг. Ихтиологический материал отбирали из уловов ставных сетей с шагом ячеи $a = 30\text{--}100$ мм, для биологического анализа взято 265 экз. рыб разных видов. Массу рыбных кормовых объектов реконструировали с использованием эмпирических уравнений зависимости «длина — масса». Сбор и обработку материалов осуществляли по общепринятым методикам. Запас рассчитывался на основании коэффициентов смертности. В работе были использованы данные официальной промысловой статистики.*

Результаты. *Наиболее многочисленными представителями современной хищной ихтиофауны Великобурлуцкого водохранилища является судак (расчетный запас на 2019 г. — 26,5 кг/га), щука (11,7 кг/га) и окунь. Модальный ряд щуки и судака в уловах формировался за счет младших и средних возрастных групп, средняя длина судака составила 35,1 см, масса — 0,71 кг; щуки — соответственно 43,6 см и 0,91 кг. Основу питания судака длиной до 50 см составляли верховодка (40,7% по встречаемости и 20,6% по массе пищевого комка), окунь (соответственно 29,6 и 28,7%) и плотва (18,5 и 29,0%); у судака длиной больше 50 см — плотва (57,1 и 36,9%) и окунь (42,9 и 17,3%). В спектре питания щуки длиной до 50 см доминировала плотва (29,7% по встречаемости и 22,9% по массе пищевого комка), карась серебряный (соответственно 24,3 и 20,5%) и окунь (16,2 и 12,5%); у щуки длиной 50 см и более — серебряный карась (45,5 и 22,6%) и лещ (36,4 и 31,6%). Основным кормовым объектом окуня длиной до 20 см были бычок-песочник (42,9% по встречаемости и 47,6% по массе пищевого комка) и окунь (соответственно 21,4 и 25,8%); окуня длиной 20 см и более — бычок-песочник (58,3 и 25,8%) и собственная молодь (33,3 и 20,2%).*

Молодь (0+ — 1+) белого, пестрого толстолобиков и их гибрида в спектре питания хищников отмечалась лишь у судака длиной более 50 см и щуки; ее усредненная весовая доля составила соответственно 8,1 и 0,7%.

Согласно показателям численности хищных видов по состоянию на 2019 г., расчетное потребление посадочного материала толстолобиков навеской 20 г составляло 17,6 экз., или 51,6% от плановых объемов зарыбления Великобурлуцкого водохранилища.

Научная новизна. *Получены оригинальные данные относительно питания хищных видов рыб в условиях специального товарного рыбного хозяйства на среднем водохранилище. Количественно оценено влияние хищников на посадочный материал толстолобиков с навесками менее традиционных.*

Практическая значимость. *Полученные данные могут быть использованы для определения нормативов промыслового возврата от сеголетков-годовиков при осуществлении пастбищной аквакультуры.*

Ключевые слова. *водохранилище, хищный ихтиокомплекс, питание рыб, посадочный материал, выживание.*

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Рибогосподарське використання внутрішніх водних об'єктів загальнодержавного значення в Україні на теперішній час здійснюється за двома основними схемами — промисловий лов на підставі встановлених лімітів і прогнозів (з обмеженням комплексом рибовідтворювальних заходів) та спеціальне товарне рибне господарство. Останній вид діяльності по суті є випасною аквакультурою, при цьому частка об'єктів штучного відтворення в уловах перевищує 80%; для дніпровських водосховищ — основних внутрішніх рибопромислових водних об'єктів — цей показник для періоду 2015–2019 рр. становив 5,2%. Здійснення випасної аквакультури на сьогодні є важливим чинником збільшення ефективності використання кормових ресурсів — за рахунок збільшення сегменту високопродуктивних консументів першого та другого порядків рибопродуктивність водосховищ збільшувалася на порядок [1]. Зокрема, для Великобурулцького водосховища показана можливість збільшення рибопродуктивності з 9,5 до 92 кг/га за рахунок зариблення цінними у господарському сенсі видами [2]. При цьому основними об'єктами штучного відтворення є представники далекосхідного комплексу — білий товстолоб (*Hypophthalmichthys molitrix* (Valens.)) та строкатий товстолоб (*Aristichthys nobilis* (Rich.)), які здатні утворювати гібридну форму. Ці види, а також білий амур, в рибогосподарській практиці в Україні традиційно об'єднуються в категорію «рослиноїдні риби» (РІР).

В цілому, рибогосподарський потенціал малих та середніх водосховищ України може бути оцінений як дуже високий — їхня загальна площа складає близько 250 тис. га [3]. При цьому умови відтворення та нагулу найбільш цінних у промисловому сенсі аборигенних видів в них, як правило, недостатньо розвинена для формування високих показників рибопродуктивності [4, 5], тому єдиним напрямком її збільшення є штучне формування іхтіофауни. Відповідно, дослідження результатів здійснення випасної аквакультури в малих та середніх водосховищах є актуальним науково-практичним завданням, результати якого можуть бути використані для удосконалення основних технологічних складових даного виду рибогосподарської діяльності, зокрема в частині визначення оптимальної наванжки посадкового матеріалу.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Основною проблемою, пов'язаною з нормативно-методологічними аспектами здійснення зариблення, є визначення оптимальної наванжки посадкового матеріалу, яка може бути визначена на підставі двох основних критеріїв — біологічного та рибогосподарського [6]. Біологічний критерій включає очікувані показники смертності, віку досягнення кульмінації іхтіомаси; його інтегральною характеристикою є промислове повернення. Рибогосподарський критерій визначається економічними аспектами здійснення заходів зі штучного відтворення; кількісно він може бути охарактеризованим питомим прибутком (за рахунок вилову товарної риби, з урахуванням специфіки водойми, де здійснюється аквакультура) на одиницю посадкового матеріалу [7].

При цьому прогнозна ефективність зариблення за біологічним критерієм буде прямо пов'язана із зростанням наважки посадкового матеріалу (вища загальна резистентність та швидкий вихід з-під пресу хижаків); якщо розглядати рибогосподарський критерій, то позитивну роль буде відігравати і зменшення (до певних меж) наважки, що забезпечить скорочення витрат на отримання посадкового матеріалу, логістику тощо. Баланс між цими складовими частинами і буде визначати оптимальну наважку посадкового матеріалу.

Одним з основних чинників, які визначають виживання посадкового матеріалу, особливо протягом адаптаційного періоду після інтродукції, є вплив хижаків. У загальному випадку можна виділити наступні основні складові, які визначають вплив хижаків на ефективність випасної аквакультури: видовий, розмірний склад та чисельність хижаків; забезпеченість їх традиційними кормовими об'єктами; часові та просторові особливості нагульного періоду хижаків та розмірно-вагові характеристики посадкового матеріалу. Останній чинник багатьма дослідниками обґрунтовано вважається найвпливовішим [8–10], тому потребує більш детального вивчення. Відповідно, метою даної роботи було встановлення особливостей живлення представників хижої іхтіофауни Великобурлуцького водосховища та оцінка їх можливого впливу на виживання посадкового матеріалу рослиноїдних риб в умовах здійснення випасної аквакультури.

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ

В основу роботи покладені результати польових досліджень, які здійснювались на Великобурлуцькому водосховищі протягом 2017–2019 рр. Матеріал для характеристики структурних показників іхтіофауни відбирали з уловів промислових ставних сіток з кроком вічка $a = 30\text{--}100$ мм. Всього за зазначений період було проаналізовано 215 сіткодів промислових сіток, з яких відібрано для біологічного аналізу 265 екз. риб. Живлення хижих видів досліджувалось шляхом обробки вмісту шлунків на місці. Кормові об'єкти визначалися до виду, харчову грудку зважували за допомогою електронних терезів з точністю до 1 г. Для визначення вагової структури харчової грудки здійснювалась реконструкція маси рибних кормових організмів. Для реконструкції маси використовували емпіричні рівняння відношення між довжиною і масою риб Великобурлуцького водосховища. У тому випадку, коли деякі рибні харчові об'єкти були значно перетравлені і не піддавалися визначенню, їх класифікували як «неідентифіковані залишки риб». Всього було проаналізовано вміст шлунків 108 екз. шуки, судака та окуня. Вік риб визначали за лускою. Збір і обробку матеріалів здійснювали за загальноприйнятими методиками [11–13].

Величина запасу хижаків розраховувалась за річною промисловою смертністю. Коефіцієнт миттєвої загальної смертності (Z) визначали графічним методом з використанням натуральних логарифмів чисельності вікових груп в контрольних уловах, як тангенс кута нахилу лінії регресії; природна смертність визначалась для середніх вікових груп за методикою П. В. Тюріна [14, 15].

Оцінка потенційного споживання посадкового матеріалу рослиноїдних риб (N' , тис. екз.) здійснювалась за формулою:

$$N' = \frac{N \cdot \Delta m \cdot K \cdot q}{m'} \quad (1)$$

де N — чисельність промислових контингентів хижого виду, тис. екз.;
 Δm — середній ваговий приріст в модальних групах, г;
 m' — середня маса жертви, г;
 q — середня вагова частка рослиноїдних риб у харчовій грудці хижака;
 K — кормовий коефіцієнт (3,5 для судака та 4,0 для щуки [16, 17]).
 Обсяги зариблення та вилову визначали за даними офіційної статистики.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Великобурлуцьке водосховище розташоване у Великобурлуцькому районі Харківської області і створене шляхом зарегулювання стоку р. Великий Бурлук — притоки першого порядку р. Сіверський Донець. Довжина водосховища — 7,0 км, середня ширина — 0,6 км, середня глибина — 3,5 м, площа водного дзеркала при НІР — 410 га. Рибогосподарська діяльність на даному водосховищі здійснюється в режимі спеціального товарного рибного господарства (СТРГ), яким передбачене щорічне зариблення дволітками рослиноїдних риб та коропа наважкою не менше 100 г у загальній кількості 43,4 тис. екз., в тому числі товстолобів (білого, строкатого та гібрида) — 37,9 тис. екз. Фактичні обсяги зариблення протягом 2016–2019 рр. відповідали плановим, що і забезпечило фактичну рибопродуктивність у 2017–2019 рр. на рівні 110–115 кг/га, в тому числі 80–85 кг/га за рахунок товстолобів. У 2016 р. було проведено зариблення посадковим матеріалом рослиноїдних риб з середньою наважкою 20 г, що розширює аналітичну базу в контексті основного завдання роботи.

Динаміка промислових уловів у Великобурлуцькому водосховищі в останні 10 років характеризується певною стабільністю (за виключенням різкого зменшення вилову у 2017 р., яке було пов'язане з організаційними причинами) із загальною тенденцією до збільшення, в основному за рахунок інтродуцентів, насамперед товстолобів (рис. 1). У порівнянні з періодом 2006–2010 рр., вилов збільшився в 2,4 раза, тобто ефективність випасної аквакультури на даній водоймі не викликає сумніву.

Рис. 1. Динаміка промислових уловів у Великобурлуцькому водосховищі
 Fig. 1. Dynamics of commercial catches in the Velykoburlutske reservoir

За даними досліджень 2017–2019 рр., до складу іхтіофауни Великобурлуцького водосховища входить 17 видів риб, які відносяться до 5 родин. Найвищі показники промислового запасу серед представників аборигенної іхтіофауни у 2010 р. були відмічені для ляща (*Abramis brama* (L.)) та судака (*Sander lucioperca* (L.)) [2]; в останні роки до видів-домінантів промислового іхтіокомплексу увійшов сріблястий (китайський) карась (*Carassius auratus* (L.)). Основними хижими видами риб Великобурлуцького водосховища є судак, щука (*Esox lucius* (L.)) та окунь (*Perca fluviatilis* (L.)) (табл. 1).

Таблиця 1. Вагова структура уловів у Великобурлуцькому водосховищі (у перерахунку на зусилля порядку сіток, без урахування інтродуцентів),%

Table 1. Weight structure of catches in the Velykoburlutske reservoir (in terms of efforts in the order of nets, excluding introduced species),%

Крок вічка, мм / Bar, mm	Види риб / Fish species								
	Лящ / Bream	Судак / Zander	Плітка / Rutilus	Карась срібл. / Crucian carp	Щука / Pike	Окунь / Pike perch	Лин / Tench	Сом / Catfish	Інші / Others
30–40	11,4	2,3	12,4	26,8	1,6	17,5	5,6	0,0	22,5
50–60	40,8	21,0	0,0	10,3	21,8	1,2	4,3	0,4	0,0
70–100	47,5	27,8	0,0	15,1	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Судак в уловах контрольного порядку сіток був представлений особинами у віці від 1 до 7 років, основу чисельності складали три- та чотирилітні особини довжиною 28–37 см (табл. 2). Таким чином, протягом всього періоду досліджень у стадії судака переважали особини середніх та молодших вікових груп, для яких характерні невисокі модальні лінійні розміри жертв [18]. Показники вилову судака на зусилля контрольного порядку сіток в міжрічному аспекті характеризуються певною стабільністю: 1,27 екз. (0,78 кг) у 2017 р., 1,19 екз. (0,99 кг) у 2017 р. та 1,24 екз. (0,85 кг) у 2019 р., і свідчать про досить високу чисельність його промислового стада у даному водосховищі.

Основним кормовим об'єктом судака довжиною до 50 см у Великобурлуцькому водосховищі була верховодка (*Alburnus alburnus* (L.)), частота зустрічання якої в середньому складала 40,7%; у судака довжиною понад 50 см цей вид зафіксовано у 14,3% проаналізованих особин, тоді як основним об'єктом живлення цієї розмірної групи (57,1%) була плітка (*Rutilus rutilus* (L.)), при цьому в розмірній групі судака до 50 см частота зустрічання цього виду складала 18,5%.

Крім того, в харчовій грудці всіх розмірних груп судака стабільно фіксувався окунь (29,6 та 42,9%); багаточисельний у даному водосховищі сріблястий карась фіксувався лише в шлунках особин судака довжиною понад 50 см. Гібрид товстолобів (однорічки з середньою довжиною 10,7 см і масою 26,2 г) також був зафіксований лише у судака довжиною понад 50 см, частота зустрічання складала 28,6%.

Таблиця 2. Варіаційний ряд хижих видів в уловах на Великобурлуцькому водосховищі (усереднений за 2017–2019 рр.)

Table 2. Variational series of predators species in catches at the Velykoburlutske reservoir (averaged over 2017-19)

Розмірні групи, см / Size groups, cm	Судак / Zander	Щука / Pike	Окунь / Pike perch
14–15	0,0	0,0	11,6
16–17	0,0	0,0	24,9
18–19	0,0	0,0	30,4
20–21	0,0	0,0	19,5
22–23	0,0	0,0	10,5
24–25	2,2	0,0	2,0
26–27	6,9	0,0	1,0
28–29	9,3	0,0	0,1
30–31	9,4	0,1	0,0
32–33	9,9	3,9	0,0
34–35	19,8	2,8	0,0
36–37	19,1	2,2	0,0
38–39	8,9	6,1	0,0
40–41	2,9	14,0	0,0
42–43	2,0	16,9	0,0
44–45	1,9	22,7	0,0
46–47	1,5	16,1	0,0
48–49	1,1	7,0	0,0
50–51	1,0	4,7	0,0
52–53	1,3	1,2	0,0
54–55	0,6	1,0	0,0
56–57	1,5	0,7	0,0
58–59	0,6	0,6	0,0
$\bar{l}_{\text{середня}}, \text{ см} / \bar{l}_{\text{average}}, \text{ cm}$	35,1±6,5	43,6±7,0	18,5±3,7
$\bar{m}_{\text{середня}}, \text{ г} / \bar{m}_{\text{average}}, \text{ g}$	718±126	975±191	173±35,5
$n, \text{ екз.} / n, \text{ pcs.}$	94	112	59

Щодо головного чинника, що визначає розмірний, а певною мірою і видовий склад кормових об'єктів судака, в літературі зустрічаються різні думки. Одні автори вважають, що глотковий апарат не дозволяє судакові заковтувати велику або високотілу здобич, і це є основним чинником, що визначає довжину жертви; інші тримаються точки зору, що на цей показник значною мірою впливає той факт, що судак нагулюється на ділянках, де концентрується молодь риб [11, 19, 20]. Враховуючи наведені нижче дані щодо спектру живлення щуки, можна зробити висновок, що для Великобурлуцького водосховища екстер'єрні

показники жертв мають суттєвий вплив на їх представленість в раціоні судака.

Щука Великобурлуцького водосховища в уловах 2017–2019 рр. була представлена особинами у віці від двох до шести років, модальний ряд формувалася за рахунок чотири–п'ятиліток довжиною 40–47 см. Виллов щуки на зусилля контрольного порядку сіток коливався в межах від 0,68 екз. (0,56 кг) до 0,94 екз. (0,90 кг), що відповідає середній чисельності даного виду у Великобурлуцькому водосховищі. Старші вікові групи щуки в уловах практично не фіксувалися, тобто, враховуючи розмірну доступність жертв, можна також прогнозувати незначне трофічне навантаження цього виду на посадковий матеріал РІР та коропа після досягнення дволітнього віку.

Так, у спектрі живлення щуки довжиною до 50 см найчастіше відмічались плітка (з 29,7% зустрічальністю), карась сріблястий (24,3%) та окунь (16,2%); у щуки довжиною 50 см і більше спектр живлення суттєво змінився — домінуючим видом (відмічений у 45,5% проаналізованих особин) став сріблястий карась, висока частота зустрічання була відмічена для ляща (36,4%), тоді як для плітки цей показник знизився до 9,1%.

Білий, строкатий товстолоби та їх гібриди відмічались в обох розмірних групах щуки — із частотою зустрічання відповідно 5,4 та 27,3%. Середні лінійні розміри спожитих товстолобів складали: для щуки довжиною менше 50 см — 12,4 см, для щуки довжиною 50 см і більше — 16,1 см; маса відповідно — 41,0 та 83,0 г.

Окунь в уловах на Великобурлуцькому водосховищі був представлений особинами у віці від 3 до 9 років; основу чисельності складали п'яти–шестилітки довжиною 16–21 см. На відміну від інших хижаків, праве крило варіаційного ряду окуня формувалось за рахунок старших вікових груп, що може бути пов'язаним із високим для даного виду мінімальним розміром вічка в контрольних знаряддях. Проте, враховуючи, що окунь молодших вікових груп значною мірою є бентофагом [21], в контексті основного завдання роботи — оцінки впливу на посадковий матеріал — це не впливає на якість отриманих результатів щодо живлення цього виду.

У спектрі живлення окуня довжиною до 20 см у Великобурлуцькому водосховищі ідентифіковано всього 3 види риб; основним кормовим об'єктом був бичок-підкаменник (*Neogobius fluviatilis* Pallas), відмічений у 42,9% проаналізованих особин; менша зустрічальність була відзначена для окуня (21,4%) та верховодки (14,3%). У харчових грудках особин окуня довжиною 20 см і більше також переважали бичок-підкаменник (із зустрічальністю 58,3%), окунь (33,3%) та верховодка (25,0%).

Рослиноїдні риби серед ідентифікованих компонентів живлення окуня не зафіксовані, що насамперед пов'язане з їх досить великими розмірами — модальний розмір жертв для окуня довжиною 19 см складає 4,2 см, довжиною 20–29 см — 6,4 см [21], тоді як середня довжина посадкового матеріалу РІР наважкою 20 г становить 9,8 см. Крім того, товстолоби є малочисельними на основних біотопах нагулу окуня Великобурлуцького водосховища — придонних ділянках субліторалі.

Розподіл вагових характеристик живлення хижих видів в основному

відповідає закономірностям, відміченим для зустрічальності. Основу харчових грудок щуки складали сріблястий карась, плітка та лящ; судака — плітка, окунь та верховодка; окуня — бички та власна молодь (табл. 3).

Таблиця 3. Ваговий склад харчових грудок хижих видів риб (за реконструйованою масою жертви),%

Table 3. Weight composition of predatory fish species food bolus (according to the reconstructed weight of prey),%

Кормові об'єкти / Food item	Щука / Pike		Судак / Zander		Окунь / Pike perch	
Розмірні групи хижаків, см / Predators size groups, cm	<50	≥50	<50	≥50	<20	≥20
<i>Abramis brama</i>	6,8	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Rutilus rutilus</i>	22,9	11,2	20,9	36,9	0,0	18,5
<i>Blicca bjoerkna</i>	10,0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	8,8	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0
<i>Alburnus alburnus</i>	3,6	0,0	20,6	4,5	9,2	15,3
<i>Perca fluviatilis</i>	12,5	0,0	28,7	17,3	25,8	20,2
<i>Hypophthalmichthys+</i> <i>Aristichthys</i>	6,6	24,0	0,0	14,5	0,0	0,0
<i>Cyprinus carpio</i>	2,8	0,0	3,6	0,0	11,4	0,0
<i>Tinca tinca</i>	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Carassius auratus</i>	20,5	22,6	5,0	11,2	0,0	12,9
<i>Neogobius fluviatilis</i>	0,0	0,0	4,1	0,0	47,6	25,8
Неідентифікована риба / Non-identified fish species	5,6	0,0	3,7	3,1	5,9	7,3
Кількість, екз. / Number of individuals	37	11	27	7	14	12

З урахуванням питомої чисельності розмірних класів у популяції, середньовиважена частка молоді товстолобів в раціоні щуки складає 7,1% за масою, судака — 0,7%.

За відсутності даних щодо прямого обліку, оцінка чисельності хижих видів здійснювалась розрахунковим методом — з використанням показників уловів та коефіцієнта промислової смертності, який, в свою чергу, визначався як різниця між річною загальною та природною смертністю. Розрахунок проводився лише для судака та щуки, оскільки споживання окунем посадкового матеріалу рослинних риб є випадковим і не може впливати на його загальне виживання.

Крива улову судака у 2017–2019 рр. має вигляд гостровершинної параболи з достатньо великим кутом нахилу її правого крила до осі абсцис (рис. 2), який насамперед зумовлений коротким віковим рядом. Крива улову щуки має аналогічний вигляд, скорочення граничного віку у порівнянні з судаком призвело до ще більшої редукції її правого крила.

Рис. 2. Криві улову основних хижих видів риби Великобурлуцького водосховища

Fig. 2. Catch curves of the main predatory fish species from the Velykoburlutske reservoir

Аналіз кривої улову дозволяє визначити величину річної загальної смертності судака: $\varphi_Z = 0,64$, щуки: $\varphi_Z = 0,67$; річна природна смертність, оцінена за граничним віком популяції в уловах, складає відповідно для судака $\varphi_M = 0,43$; для щуки — $\varphi_M = 0,51$. Враховуючи дані промислової статистики, загальні запаси судака та щуки станом на 2019 р. можуть бути оцінені відповідно як 10,9 та 4,8 т, чисельність промислових контингентів — 15,1 та 5,0 тис. екз.

Вихідні дані для розрахунків за формулою (1) представлені в таблиці 4.

Таблиця 4. Розрахунок потенційного споживання посадкового матеріалу РІР хижаками Великобурлуцького водосховища

Table 4. Potential consumption calculation of herbivorous fish planting material by predators in the Velykoburlutske reservoir

Вид хижаків / Predators species	N	Δm	m'	q	N', тис. екз. / N', ths. individuals
Щука / Pike	5,0	0,39	0,081	0,044	14,2
Судак / Pike persh	15,1	0,36	0,007	0,026	5,4

Таким чином, розрахункове річне споживання рослиноїдних риб при зарибленні Великобурлуцького водосховища посадковим матеріалом з наважками 20–25 г складає 17,6 тис. екз. Враховуючи, що рекомендоване зариблення дволітками наважкою не менше 100 г (які практично повністю виходять з-під трофічного тиску хижаків у даному водосховищі) складає 37,9 тис. екз., підвищене виїдання цьоголіток у порівнянні з дволітками збільшує кількість посадкового матеріалу на 52%.

Слід відзначити, що у якості величини чисельності стада хижаків (N) нами був використаний статичний показник (на початок року). Тобто, нами не враховувалась динаміка чисельності та іхтіомаси, зокрема за рахунок смертності та вагового росту. Разом з тим, стабільність вилову на зусилля контрольного порядку та висока частка молодших вікових груп свідчить про достатнє поповнення, яке повністю компенсує зменшення чисельності промислового ядра

внаслідок смертності. Крім того, розрахунок спрямований на прогностичні оцінки, тобто його здійснення за найбільш жорсткою схемою можна вважати виправданим.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Основними хижими видами риб Великобурлуцького водосховища є судак, щука та окунь. Модальний ряд щуки та судака в уловах формувався за рахунок молодших та середніх вікових груп; середня довжина судака склала 35,1 см, маса — 0,71 кг; щуки — відповідно 43,6 см та 0,91 кг. Основу живлення хижаків складали масові представники аборигенної іхтіофауни (плітка, окунь, сріблястий карась).

Рослиноїдні риби зафіксовані у складі раціону судака довжиною 50 см і більше (28,6% за зустрічальністю та 14,5% за масою харчової грудки); щуки довжиною до 50 см (відповідно 5,4 та 6,6%), щуки довжиною 50 см і більше (27,3 та 27,0%). Середньовиважена частка молоді товстолобів в раціоні щуки складала 7,1% за масою, судака — 0,7%.

Прогнозне річне споживання рослиноїдних риб при зарибленні Великобурлуцького водосховища посадковим матеріалом з наважками 20–25 г становить 17,6 тис. екз. Коефіцієнт перерахунку кількості цьоголіток (в частині підвищеного їх виїдання хижакими) у порівнянні з дволітками для Великобурлуцького водосховища складає 1,52.

Отримані результати можуть бути використані для розробки уніфікованої методики розрахунку виживання посадкового матеріалу з наважками, меншими, ніж традиційні, в залежності від щільності хижаків та питомих (у перерахунку на 1 га) обсягів зариблення рослиноїдними рибами.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бузевич І. Ю., Захарченко І. Л. Водохранилища України: перспективи рыбохозяйственного использования // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2013. Вып. 3. С. 35—41.
2. Захарченко І. Л. Сучасний стан аборигенної промислової іхтіофауни Великобурлуцького водосховища // Рибогосподарська наука України. 2011. № 2. С. 25—30.
3. Водний фонд України: штучні водойми — водосховища і ставки : довідник / Гребін В. В. та ін. Київ : Інтер-прес ЛТД, 2014. 164 с.
4. Кожаева Д. К. Рациональное использование биоресурсного потенциала искусственных водоем Кабардино-Балкарской Республики : дисс. ... докт. биол. наук : 03.02.14 «Водные биоресурсы». Москва, 2017. 385 с.
5. Грициняк І. І., Христенко Д. С., Котовська Г. О. Науково-методичні аспекти розробки науково-біологічних обґрунтувань та режимів спеціальних товарних рибних господарств (СТРГ) // Агросвіт України. 2012. № 1. С. 29—30.
6. Седова Н. А. Особенности пастбищной рыбохозяйственной эксплуатации малых водохранилищ центральных регионов России: на примере Жестылевского водохранилища : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : 03.00.10 «Ихтиология». Москва, 2000. 16 с.
7. Яковлева Т. В. Штучне відтворення іхтіофауни дніпровських водосховищ: сучасний стан, проблеми і перспективи // Рибогосподарська наука України. 2013. № 1. С. 5—11.

8. Захарченко І. Л. Живлення судака у Каховському водосховищі // Рибне господарство. 2005. Вип. 64. С. 108—111.
9. Кудерский Л. А. Акклиматизация рыб в водоемах России: состояние и пути развития // Вопросы рыболовства. 2001. Т. 2, № 1 (5). С. 6—85.
10. Озинковская С. П., Полторацкая В. И. Эффективность зарыбления днепровских водохранилищ растительноядными рыбами в зависимости от количества и качества рыбопосадочного материала // Рыбное хозяйство. 1981. Вип. 41. С. 48—51.
11. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України. Київ : ІРГ УААН, 1998. 47 с.
12. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. 408 с.
13. Боруцкий Е. В. Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях. Москва : Наука, 1974. 254 с.
14. Юдович Ю. Б., Доценко Б. Н., Антонюк А. В. Методика прогнозирования вылова рыбы в озерах, реках и водохранилищах. Москва : ВНИИПРХ, 1982. 46 с.
15. Тюрин П. В. Фактор естественной смертности рыб и его значение при регулировании рыболовства // Вопросы ихтиологии. 1962. Т. 2, вып. 3 (24). С. 184—192.
16. Полтавчук М. А. Биология и разведение днепровского судака в замкнутых водоемах. Киев : Наукова думка, 1965. 259 с.
17. Стеффенс В. Индустриальные методы выращивания рыбы. Москва : Агропромиздат, 1985. 383 с.
18. Корочкин Е. Ф. О размерной доступности растительноядных рыб хищникам // Рыбное хозяйство. 1982. Вип. 8. С. 41—42.
19. Питание и пищевые взаимоотношения хищных рыб в дельте Волги. Москва : Наука, 1973. 297 с.
20. Білий М. Д. Розмноження та розведення судака. Київ : АН УРСР, 1959. 78 с.
21. Диденко А. В., Гурбик О. Б. Питание окуня (*Perca fluviatilis* L.) Каневского водохранилища в весенний период // Рыбогосподарська наука України. 2011. № 2. С. 18—24.

REFERENCES

1. Buzevich, I. Yu., & Zakharchenko, I. L. (2013). Vodokhranilishcha Ukrainy: perspektivy rybokhozyaystvennogo ispol'zovaniya. *Rybovodstvo i rybnoe khozyaystvo*, 3, 35-41.
2. Zakharchenko, I. L. (2011). Suchasnyi stan aboryhennoi promyslovoi ikhtiofauny Velykoburlutskoho vodoshkovyshcha. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 25-30.
3. Hrebin, V. V., et al. (2014). *Vodnyi fond Ukrainy: shtuchni vodoimy - vodoshkovyshcha i stavky: dovidnyk*. Kyiv: Inter-pres LTD.
4. Kozhaeva, D. K. (2017). Ratsional'noe ispol'zovanie bioresursnogo potentsiala iskusstvennykh vodoem Kabardino-Balkarskoy Respubliki. *Doctor's thesis*. Moskva, 2017. 385 s.
5. Hrytsyniak, I. I., Khrystenko, D. S., & Kotovska, H. O. (2012). Naukovo-metodychni aspekty rozrobky naukovo-biolohichnykh obgruntuvan ta rezhymiv spetsialnykh tovarnykh rybnykh hospodarstv (STRH). *Ahrosvit Ukrainy*, 1, 29-30.

6. Sedova, N. A. (2000). Osobennosti pastbishchnoy rybokhozyaystvennoy ekspluatatsii mal'kikh vodokhranilishch tsentral'nykh regionov Rossii: na primere Zhestylevskogo vodokhranilishcha. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moskva.
7. Yakovlieva, T. V. (2013). Shtuchne vidtvorennia ikhtiofauny dniproviskykh vodoshkovyishch: suchasnyi stan, problemy i perspektyvy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 5-11.
8. Zakharchenko, I. L. (2005). Zhyvlennia sudaka u Kakhovskomu vodoshkovyishchi. *Rybne hospodarstvo*, 64, 108-111.
9. Kuderskiy, L. A. (2001). Akklimatizatsiya ryb v vodoemakh Rossii: sostoyanie i puti razvitiya. *Voprosy rybolovstva*, 2, 1 (5), 6-85.
10. Ozinkovskaya, S. P., & Poltoratskaya, V. I. (1981). Effektivnost' zarybleniya dneprovskikh vodokhranilishch rastitel'noyadnymi rybami v zavisimosti ot kolichestva i kachestva ryboposadochnogo materiala. *Rybnoe khozyaystvo*, 41, 48-51.
11. *Metodyka zboru i obrobky ikhtiolohichnykh i hidrobiolohichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoshkovyishch i lymaniv Ukrainy*. (1998). Kyiv: IRH UAAN.
12. Arsan, O. M., et al. (2006). *Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevyykh vod*. Kyiv: Lohos.
13. Boruckij, E. V. (1974). *Metodicheskoe posobie po izucheniju pitaniya i pishhevyyh odnoshenij ryb v estestvennykh usloviyakh*. Moskva: Nauka.
14. Judovich, Ju. B., Docenko, B. N., & Antonjuk, A. V. (1982). Metodika prognozirovaniya vylova ryby v ozerah, rekah i vodokhranilishhah. Moskva: VNIIPRH, 1982. 46 s.
15. Tjurin, P. V. (1962). Faktor estestvennoj smertnosti ryb i ego znachenie pri regulirovanii rybolovstva. *Voprosy ihtologii*, 2, 3 (24), 184-192.
16. Poltavchuk, M. A. (1965). *Biologiya i razvedenie dneprovskogo sudaka v zamknutykh vodoemah*. Kiev: Naukova dumka.
17. Steffens, V. (1985). *Industrial'nye metody vyrashhivaniya ryby*. Moskva: Agropromizdat.
18. Korochkin, E. F. (1982). O razmernoj dostupnosti rastitel'nojadykh ryb hishhnikam. *Rybnoe hozjajstvo*, 8, 41-42.
19. *Pitanie i pishhevye vzaimootnosheniya hishhnykh ryb v del'te Volgi*. (1973). Moskva: Nauka.
20. Bilyi, M. D. (1959). *Rozmnozheniia ta rozvedenniia sudaka*. Kyiv: AN URSR.
21. Didenko, A. V., & Gurbik, O. B. (2011). Pitanie okunja (*Perca fluviatilis* L.) Kanevskogo vodokhranilishha v vesennij period. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 18-24.

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 19-32
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.019>
УДК 639.311:574.55

Received 22.07.20
Received in revised form 19.08.20
Accepted 23.09.20

ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ ЗА КОМПЛЕКСНОГО ВПЛИВУ НА ЇХ ЕКОСИСТЕМУ

Т. В. Григоренко, grygorenko-@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. О. Мушит, mushyt@vsau.vin.ua, Вінницький національний аграрний
університет, м. Вінниця

А. М. Базаєва, a_bazaeva@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити особливості формування гідрохімічного, гідробіологічного режимів та визначити рибопродуктивність вирощувальних ставів за комплексного впливу на їх екосистему.

Методика. При проведенні досліджень були використані загальноприйняті в гідрохімії, гідробіології та рибництві методики.

Результати досліджень. В статті представлено результати досліджень щодо продуктивності вирощувальних ставів при застосуванні комплексу інтенсифікаційних заходів (удобрення традиційними добривами, застосування пасти зеленої водорості хлорели, полікультура, годівля риб). Встановлено, що основні гідрохімічні показники при вирощуванні цьоголіток корокових видів риб у полікультурі знаходилися в межах нормативних значень і були сприятливими для розвитку кормових організмів та вирощування рибопосадкового матеріалу. Отримано позитивні тенденції щодо застосування пасти хлорели при вирощуванні цьоголіток корокових риб у полікультурі за різного співвідношення коропа та рослиноїдних риб. У дослідних ставах, при застосуванні пасти хлорели в комплексі з іншими інтенсифікаційними заходами, створювалися сприятливі умови для розвитку природної кормової бази, росту та виживання цьоголіток корокових риб. При цьому отримана загальна рибопродуктивність у дослідних ставах була на 22,0–28,0% вищою, а витрати корму — в 1,1–1,3 раза меншими, порівняно з контрольними.

Наукова новизна. Досліджено особливості формування гідрохімічного та гідробіологічного режимів та визначено рибопродуктивність вирощувальних ставів за умов застосування перезною ВРХ та внесення пасти зеленої водорості хлорели при вирощуванні цьоголіток коропа в полікультурі з гібридом товстолоба.

Практична значимість. Отримані дані можуть бути використані для розробки практичних рекомендацій щодо оптимізації умов вирощування рибопосадкового матеріалу корокових риб у полікультурі при застосуванні пасти хлорели, підвищення ефективності управління станом водних екосистем та їхньої біопродуктивності.

Ключові слова: вирощувальні стави, природна кормова база, інтенсифікаційні заходи, гідрохімічний режим, фітопланктон, зоопланктон, зообентос, полікультура, цьоголітки, рибопродуктивність.

PRODUCTIVITY OF NURSERY PONDS UNDER THE COMPLEX EXPOSURE TO THEIR ECOSYSTEM

T. Hryhorenko, grygorenko-@ukr.net, Institute of Fisheries of the NAAS, Kyiv
S. Mushyt, mushyt@vsau.vin.ua, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia
A. Bazaieva, a_bazaeva@ukr.net, Institute of Fisheries of the NAAS, Kyiv

© Т. В. Григоренко, С. О. Мушит, А. М. Базаєва, 2020

Purpose. To investigate the peculiarities of the formation of hydrochemical, hydrobiological regimes and to determine the fish productivity of nursery ponds under a complex exposure to their ecosystem.

Methodology. The work was conducted according to generally accepted hydrochemical, hydrobiological and aquaculture methods.

Findings. The article presents the results of the study on the productivity of nursery ponds when using a complex of intensification measures (fertilization with traditional fertilizers, application of chlorella paste, polyculture, and fish feeding). It was found that the main hydrochemical parameters during the rearing of cyprinid fingerlings were within the standard normal values and were favorable for the development of prey organisms and the cultivation of fish seeds. Positive trends were obtained after the use of chlorella paste when growing juveniles of cyprinids in polyculture with different ratios of common carp and Chinese carps. The use of the chlorella paste in combination with other intensification measures in the experimental ponds created favorable conditions for the development of natural food supplies, growth and survival of cyprinid fingerlings. At the same time, the total fish productivity in the experimental ponds was 22.0-28.0% higher, and the feed costs were 1.1-1.3 times lower than in the control ponds.

Originality. The peculiarities of the formation of hydrochemical and hydrobiological regimes have been investigated and the fish productivity of nursery ponds has been determined using cattle humus and chlorella pasta when growing young-of-the-year carp in polyculture with silver and bighead carp hybrids.

Practical value. The obtained data can be used for developing practical recommendations regarding the optimization of the conditions for growing cyprinid seeds in polyculture using the chlorella pasta, increasing the efficiency of managing the state of aquatic ecosystems and their biological productivity.

Key words: nursery ponds, natural food base, intensification measures, hydrochemical regime, phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, polyculture, young-of-the-year, fish productivity.

ПРОДУКТИВНОСТЬ ВЫРОСТНЫХ ПРУДОВ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ИХ ЭКОСИСТЕМУ

Т. В. Григоренко, grygorenko@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

С. А. Мушит, mushyt@vsau.vin.ua, Винницкий национальный аграрный университет, г. Винница

А. Н. Базаева, a_bazaeva@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Исследовать особенности формирования гидрохимического, гидробиологического режимов и определить рыбопродуктивность выростных прудов при комплексном воздействии на их экосистему.

Методика. При проведении исследований были использованы общепринятые в гидрохимии, гидробиологии и рыбоводстве методики.

Результаты исследований. В статье представлены результаты исследований по продуктивности выростных прудов при применении комплекса интенсификационных мероприятий (удобрение традиционными удобрениями, применение пасты зеленой водоросли хлореллы, поликультура, кормление рыб). Установлено, что основные гидрохимические показатели при выращивании сеголеток карповых видов рыб в поликультуре находились в пределах нормативных значений и были благоприятными для развития кормовых организмов и выращивания рыбопосадочного материала. Получены положительные тенденции по использованию пасты хлореллы при выращивании сеголеток карповых рыб в поликультуре при разном соотношении карпа и растительноядных рыб. В опытных прудах, при использовании пасты хлореллы в комплексе с другими интенсификационными мероприятиями, создавались благоприятные условия для развития естественной кормовой базы, роста и выживания сеголеток карповых рыб. При этом

полученная общая рыбопродуктивность в опытных прудах была на 22,0–28,0% выше, а затраты кормов — в 1,1–1,3 раза меньше, в сравнении с контрольными.

Научная новизна. Исследованы особенности формирования гидрохимического, гидробиологического режимов и определена рыбопродуктивность выростных прудов при использовании перегной КРС и внесения пасты зеленой водоросли хлореллы при выращивании сеголеток карпа в поликультуре с гибридом толстолобика.

Практическая значимость. Полученные данные могут быть использованы для разработки практических рекомендаций по оптимизации условий выращивания рыбосадовочного материала карповых рыб в поликультуре при применении пасты хлореллы, повышения эффективности управления состоянием водных экосистем и их биопродуктивности.

Ключевые слова: выростные пруды, естественная кормовая база, интенсификационные мероприятия, гидрохимический режим, фитопланктон, зоопланктон, зообентос, поликультура, сеголетки, рыбопродуктивность.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасних умовах розвитку ставової аквакультури особлива увага приділяється екологічно доцільним технологіям вирощування риби, які базуються на підвищенні біопродуктивності водойм та раціональному використанні їх біологічних ресурсів.

Біологічна продуктивність є основною характеристикою рибогосподарських водойм, що складається з природної кормової бази та рыбопродуктивності. Відомо, що певний рівень рыбопродуктивності ставів визначається сукупною дією цілої низки тісно пов'язаних абіотичних та біотичних чинників середовища, продуктивністю угруповань гідробіонтів в екосистемах і досягається комплексною інтенсифікацією рибництва [1–5].

Однією із найважливіших умов інтенсифікації рибництва є стимулювання розвитку природної кормової бази, що забезпечує не лише економію штучних кормів, а й кращу ефективність використання останніх, оскільки збільшення частки природного корму в раціоні риб сприяє повнішому засвоєнню штучних кормів, прискорює темп росту та впливає на стійкість ставової риби до різних захворювань [5].

Дослідження останніх років показали перспективність застосування для підвищення продуктивності ставових екосистем як самостійно, так і в поєднанні з традиційними органічними добривами, нових екологічно безпечних видів добрив, а також інтродукції кормових гідробіонтів, альголізації тощо [6–7, 10–12]. Тому необхідною умовою сучасного рибництва є подальша інтенсифікація процесів виробництва рибної продукції шляхом уточнення існуючих та розроблення нових, більш дієвих методів підвищення біологічної продуктивності ставів, які даватимуть змогу підвищити інтенсивність розвитку природної кормової бази риб із поліпшенням екологічного стану рибницьких ставів [8, 9, 12, 13].

Раціональне використання біологічних ресурсів водойм базується на вирощуванні риб із різним спектром живлення для максимального використання наявних кормових ресурсів. Отже, не менш важливим чинником інтенсифікації рибництва є також застосування полікультури риб. Вирощування риби в полікультурі дозволяє більш повно і ефективно використати кормові ресурси водойм і за рахунок цього значно підвищити їх рыбопродуктивність.

Рибогосподарська ефективність застосування полікультури залежить, перш за все, від кількісного співвідношення об'єктів полікультури та загальної густоти посадки риби, оскільки кожний з них має характерний спектр живлення [1, 3, 4].

На даний час існує масив даних щодо впливу окремих заходів інтенсифікації на підвищення біологічної продуктивності ставів, в тому числі і рибопродуктивності, проте досить обмеженими є дані щодо вивчення впливу комплексу заходів інтенсифікації на екосистему ставів.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

В умовах сьогодення актуальним залишається пошук ефективних методів підвищення біопродуктивності рибницьких ставів, які полягають у розробці комплексу заходів впливу на екосистему ставів з метою інтенсифікації розвитку природної кормової бази, створення оптимальних умов для росту риби та отримання якісної продукції.

З огляду на це, метою даної роботи було дослідження особливостей формування гідрохімічного, гідробіологічного режимів та визначення рибопродуктивності вирощувальних ставів за комплексного впливу на їх екосистему (удобрення, внесення пасти зеленої водорості хлорели, полікультура, годівля риб тощо).

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проводилися в 2017 р. у 4-ох вирощувальних ставах площею 0,7–4,1 га та середньою глибиною 1,2–1,5 м, на базі господарства ТОВ «Магнолія» Вінницької області.

Для інтенсифікації розвитку природної кормової бази навесні в усі 4 експериментальні стави вносили перегній ВРХ із розрахунку 2,0 т/га. У дослідні стави за три доби до зарибнення гібридом товстолоба вносили пасту хлорели із розрахунку 1,0 кг/га; наступне внесення пасти хлорели, як правило, проводили в липні з розрахунку 0,5 кг/га. Вирощувальні стави зарибнювали непідросленими личинками гібрида товстолоба та підрощеною (до 0,4 г) молоддю коропа. Співвідношення коропа і рослиноїдних риб у полікультурі становило 37,5 : 62,5 та 23,0 : 77,0. В другій половині вегетаційного періоду рибу підгодовували штучними кормами (табл. 1).

Упродовж періоду вирощування риби сліdkували за температурним, гідрохімічним режимами, розвитком природної кормової бази експериментальних ставів. Температуру води вимірювали раз на добу. Відбір проб води для хімічного аналізу та їх опрацювання проводили раз на місяць згідно з відповідною методикою [14]. Отримані значення порівнювали з чинними рибницькими нормативами [15].

Гідробіологічні (фіто-, зоопланктон, зообентос) проби відбирали впродовж вегетаційного сезону 1–2 рази на місяць. Відбір, фіксацію та камеральне опрацювання проб фітопланктону, зоопланктону і зообентосу проводили за загальноприйнятими в гідробіології методиками [16]. Для визначення якісного складу планктонних водоростей та безхребетних тварин використовували визначники [17–20]. Продукцію фітопланктону, зоопланктону та зообентосу розраховували за відомими із літератури Р/В-коефіцієнтами [21].

Таблиця 1. Схема проведення досліджень у ТОВ «Магнолія»

Table 1. Scheme of research in LLC "Magnoliya"

Варіанти дослідів / Experimental options	Площа ставу, га / Pond area, ha	Середня глибина ставу, м / Average depth of the pond, m	Густота посадки личинок, тис. екз./га / Planting density of larvae, thousand individuals / ha		Інтенсифікаційні заходи / Intensification measures
			короп / carp	гібрид товстолаба / chinese carps hybrids	
Контроль 1 / Control1	0,8	1,2	30,0*	50,0	Перегній ВРХ + підгодівля штучним кормом / Mould cattle + chum by formulated feed
Дослід 1 / Experiment 1	0,7	1,2	30,0*	50,0	Перегній ВРХ + паста хлорели + підгодівля штучним кормом / Mould cattle + paste of chlorella + chum by formulated feed
Контроль 2 / Control 2	4,1	1,5	30,0*	100,0	Перегній + підгодівля штучним кормом / Mould cattle + chum by formulated feed
Дослід 2 / Experiment 2	4,0	1,5	30,0*	100,0	Перегній ВРХ + паста хлорели + підгодівля штучним кормом / Mould cattle + paste of chlorella + chum by formulated feed

Примітка. * — молодь, підрощена до 0,4 г.

Notes: * - growing juveniles up to 0,4 g

Восени при облові ставів відбирали по 25 екз. цьоголіток корокових риб, які піддавалися морфометричному аналізу згідно з методикою [22]. Індивідуальну масу цьоголіток визначали за допомогою електронних терезів «KERN – 440-45 N» з точністю до 0,1 г.

Результати вирощування цьоголіток корокових риб у полікультурі оцінювали за отриманими рибницькими показниками: рибопродуктивністю ставів (кг/га), відсотком виходу цьоголіток від посаджених на вирощування личинок (%), середньою індивідуальною масою риб (г) [23].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

За період досліджень температурний та гідрохімічний режими експериментальних вирощувальних ставів ТОВ «Магнолія» були задовільними і цілком сприятливими для розвитку природної кормової бази та вирощування рибопосадкового матеріалу корокових риб. Так, температура води в експериментальних ставах упродовж вегетаційного сезону перебувала в межах 18,0–26,4°C, з найвищими показниками в липні–серпні.

Вміст розчиненого у воді кисню в середньому знаходився в межах 5,40–6,37 мг O₂/дм³.

Величина водневого показника (рН) перебувала в межах 7,6–8,2, тобто середовище було слабколужним. Вміст органічної речовини, що визначається за показниками перманганатної окиснюваності, в експериментальних ставках в середньому перебував на рівні 12,5–14,9 мг О/дм³ та відповідав нормативним значенням.

Біогенні елементи у воді були присутні впродовж усього вегетаційного сезону. Вміст амонійного азоту в середньому знаходився на рівні 0,69–0,91 мг N/дм³, нітритного — 0,04–0,07 мг N/дм³, нітратного — 0,24–0,43 мг N/дм³, мінерального фосфору — 0,24–0,38 мг P/дм³ та загального заліза — 0,66–0,81 мг Fe/дм³ (табл. 2).

Таблиця 2. Хімічні показники води вирощувальних ставів ТОВ «Магнолія» (усереднені дані)

Table 2. Chemical indices of water in the growing ponds of LLC "Magnoliya" (averaged data)

№	Показники / Indices	Дослід 1 / Experiment 1	Контроль 1 / Control 1	Дослід 2 / Experiment 2	Контроль 2 / Control 2	Нормативні значення для ставової води / Guideline values for pond water
1	рН	7,6	8,0	7,9	8,2	6,5–8,5
2	Вільний аміак NH ₃ , мг N/дм ³ / Uncombined ammonia NH ₃ , mgN/dm ³	0,04	0,05	0,03	0,01	до 0,05
3	Перманганатна окиснюваність, мг О/дм ³ / Permanganate index, mgO/dm ³	14,8	12,5	14,9	14,3	до 15,0
5	Амонійний азот, NH ₄ ⁺ , мг N/дм ³ / Ammonium nitrogen, NH ₄ ⁺ , mgN/dm ³	0,76	0,91	0,69	0,75	до 2,00
6	Нітрити, NO ₂ ⁻ , мг N/дм ³ / Nitrites, NO ₂ ⁻ , mgN/dm ³	0,06	0,04	0,07	0,05	до 0,10
7	Нітрати, NO ₃ ⁻ , мг N/дм ³ / Nitrates, NO ₃ ⁻ , mgN/dm ³	0,32	0,29	0,43	0,24	до 2,00
8	Мінеральний фосфор, PO ₄ ³⁻ , мг P/дм ³ / Inorganic phosphorus, PO ₄ ³⁻ , mgP/dm ³	0,24	0,36	0,33	0,38	до 0,50
9	Загальне залізо, Fe ²⁺ + Fe ³⁺ , мг Fe/дм ³ / Total iron, Fe ²⁺ + Fe ³⁺ , mg Fe/dm ³	0,80	0,73	0,81	0,66	до 1,00
10	Вміст розчиненого у воді кисню, мг О ₂ /дм ³ / Dissolved oxygen, mg O ₂ /dm ³	6,37	5,40	6,2	5,70	≥ 5,00

Дослідження розвитку природної кормової бази показали, що альгофлора експериментальних вирощувальних ставів була представлена 6 систематичними

відділами водоростей: *Cyanophyta*, *Euglenophyta*, *Dinophyta*, *Chryzophyta*, *Bacillariophyta* та *Chlorophyta*. При цьому провідна роль у формуванні флористичного спектру фітопланктону в ставах належала зеленим водоростям, частка яких становила від 49,0 до 62,5% загальної кількості виявлених видів. Субдомінантами, як правило, виступали представники евгленових, синьо-зелених та діатомових водоростей.

Істотних відмінностей у видовому різноманітті між дослідними та контрольними ставами не спостерігалось.

Найбільш сприятливими для розвитку фітопланктону виявилися умови в дослідних ставах (із застосуванням пасти хлорели).

На початку вегетаційного сезону показники біомаси фітопланктону в дослідних і контрольних ставах були практично на однаковому рівні і формувалися за рахунок вегетації зелених водоростей (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка біомаси фітопланктону впродовж вегетаційного сезону в експериментальних ставах ТОВ «Магнолія»

Fig. 1. Dynamics of phytoplankton biomass during the growing season in the experimental ponds of LLC "Magnoliya"

Далі спостерігалось підвищення в розвитку рослинного планктону дослідних ставів, біомаса якого досягнула 26,3–29,3 мг/дм³ у липні та серпні. У контрольних ставах максимум в розвитку спостерігався в цей же час, але із значно меншими значеннями біомаси — 21,34–15,07 мг/дм³. Упродовж вегетаційного сезону в дослідних ставах переважання в розвитку за біомасою мали зелені водорості, переважно за рахунок розвитку *Scenedesmus quadricauda*, *Scenedesmus acuminatus*, *Chlorella vulgaris*, хоча чисельно переважали представники синьо-зелених водоростей — *Aphanizomenon flos-aquae*, *Anabaena scheremetievi*.

Середньосезонні показники біомаси фітопланктону в дослідних ставах становили 21,03–20,00 мг/дм³ і були в 1,2–1,3 раза вищими, ніж у контрольних. Основу біомаси на 36,8–46,6% формували зелені водорості (табл. 3).

Таблиця 3. Середні за вегетаційний сезон показники біомаси фітопланктону в експериментальних ставах

Table 3. Average indices of phytoplankton biomass for the growing season in experimental ponds

Систематичні відділи водоростей / Systematic divisions of algae	Контроль 1 / Control 1		Дослід 1 / Experiment 1		Контроль 2 / Control 2		Дослід 2 / Experiment 2	
	мг/дм ³ / mg / dm ³	%	мг/дм ³ / mg / dm ³	%	мг/дм ³ / mg / dm ³	%	мг/дм ³ / mg / dm ³	%
Cyanophyta	6,15	37,1	5,35	26,8	2,37	15,2	6,32	30,1
Euglenophyta	2,70	16,3	3,89	19,4	2,81	18,0	1,47	7,0
Dinophyta	0,69	4,2	2,03	10,1	0,68	4,4	0,62	2,9
Chrysophyta	0,12	0,7	0,22	1,1	0,10	0,6	0,11	0,5
Bacillariophyta	0,91	5,5	1,16	5,8	2,01	12,9	2,72	12,9
Chlorophyta	6,00	36,2	7,35	36,8	7,62	48,9	9,79	46,6
Всього / Total	16,57	100,0	20,00	100,0	15,59	100,0	21,03	100,0

Зоопланктон в усіх експериментальних ставах був представлений широко розповсюдженими видами та формами, які належать до трьох основних груп — *Rotifera*, *Cladocera*, *Copepoda*. Серед масових форм коловороток у ставах зустрічалися види родів *Asplanchna*, *Brachionus*, *Keratella*, *Trichocerca*, *Polyarthra*, *Filinia*. Гіллястовусі ракоподібні були представлені переважно видами родів: *Daphnia*, *Moina*, *Alona*, *Chydorus*, *Bosmina*, *Ceriodaphnia*, *Diaphanosoma*, *Leptodora*. Веслоногі ракоподібні були представлені родинami *Cyclopidae* та *Diaptomidae*.

Із групи інших організмів у зоопланктонних пробах зустрічалися планктонні форми личинок хірономід, веснянок, статобласти моховаток тощо.

Розвиток тваринного планктону в експериментальних ставах був помірним. Так, у дослідних ставах біомаса зоопланктону впродовж вегетаційного сезону не перевищувала 17,21–21,48 г/м³, а у контрольних — 10,78–13,29 г/м³ (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка біомаси зоопланктону впродовж вегетаційного сезону в експериментальних ставах ТОВ «Магнолія»

Fig. 2. Dynamics of zooplankton biomass during the growing season in the experimental ponds of LLC "Magnoliya"

Максимальні показники біомаси зоопланктону в усіх експериментальних ставках було зафіксовано в липні (рис. 2). Проте, в дослідних ставках розвиток зоопланктонних організмів найкращим був впродовж липня–серпня в період внесення у стави пасти хлорели. При цьому в ставках домінували представники гіллястовусих ракоподібних — *Daphnia longispina*, *Chydorus sphaericus*, *Scaphaleberis mucronata* тощо.

Середньосезонні значення біомаси в дослідних ставках були на рівні 12,42–13,25 г/м³ і формувалися за рахунок розвитку гіллястовусих ракоподібних (50,9–67,8%); у контрольних — 8,58–9,42 г/м³, переважно за рахунок веслоногих ракоподібних (52,8–54,5%). Найнижчий рівень розвитку зоопланктону був характерний для контрольного ставу з вищою щільністю посадки риби (табл. 4).

Таблиця 4. Середні за вегетаційний сезон показники біомаси зоопланктону в експериментальних ставках

Table 4. Average indices of zooplankton biomass for the growing season in experimental ponds

Основні групи організмів / Main systematic groups of organism	Контроль 1 / Control 1		Дослід 1 / Experiment 1		Контроль 2 / Control 2		Дослід 2 / Experiment 2	
	г/м ³ / g/m ³	%	г/м ³ / g/m ³	%	г/м ³ / g/m ³	%	г/м ³ / g/m ³	%
<i>Rotifera</i>	0,02	0,2	0,02	0,2	0,03	0,3	0,01	0,1
<i>Cladocera</i>	4,37	46,4	6,32	50,9	3,82	44,5	8,98	67,8
<i>Copepoda</i>	4,97	52,8	5,99	48,2	4,68	54,5	4,24	32,0
Інші / Others	0,06	0,6	0,09	0,7	0,05	0,6	0,02	0,1
Всього / Total	9,42	100,0	12,42	100,0	8,58	100,0	13,25	100,0

Макрозообентос експериментальних ставів був представлений личинками комарів-дзвінців з родини *Chironomidae* та малощетинковими червами (*Oligochaeta*).

Кількісні показники розвитку зообентосу у вирощувальних ставках були вищими в першій половині вегетаційного сезону, коли показники біомаси в дослідних ставках були на рівні 2,93–9,50 г/м², у контрольних — 6,17–9,63 г/м² (рис. 3). У другій половині вегетаційного сезону кількісний розвиток донної фауни був значно нижчим, за рахунок активного виїдання її молоддю коропа. Так, у дослідних ставках біомаса зообентосу в цей період не перевищувала 1,87 г/м², у контрольних — 1,13 г/м² (рис. 3).

Середні за вегетаційний сезон значення біомаси зообентосу в дослідних ставках були на рівні 1,34–3,84 г/м², у контрольних — 2,55–2,81 г/м² (табл. 5).

Основу біомаси зообентосу на 97,5–100% в усіх експериментальних ставках формували цінні в кормовому значенні личинки хірономід (табл. 5).

Рис. 3. Динаміка біомаси зообентосу впродовж вегетаційного сезону в експериментальних ставах ТОВ «Магнолія»

Fig. 3. Dynamics of zoobenthos biomass during the growing season in the experimental ponds of LLC "Magnoliya"

Таблиця 5. Середні за вегетаційний сезон біомаси зообентосу в експериментальних ставах

Table 5. Average indices of zoobenthos biomass for the growing season in experimental ponds

Групи організмів / Main systematic groups of organism	Контроль 1 / Control 1		Дослід 1 / Experiment 1		Контроль 2 / Control 2		Дослід 2 / Experiment 2	
	г/м²	%	г/м²	%	г/м²	%	г/м²	%
<i>Chironomidae larvae</i>	2,74	97,5	1,34	100,0	2,55	100,0	3,84	100,0
<i>Oligochaeta</i>	0,07	2,5	—	—	—	—	—	—
Всього / Total	2,81	100,0	1,34	100,0	2,55	100,0	3,84	100,0

Розрахунок продукційних можливостей основних компонентів природної кормової бази вирощувальних ставів показав, що в дослідних ставах при застосуванні різного комплексу інтенсифікаційних заходів створювалося від 14625,0 до 47317,5 кг/га валової продукції фітопланктону, від 1110,0 до 4446,0 кг/га — зоопланктону та від 85,8 до 354,0 кг/га — зообентосу; у контрольних — відповідно від 3750,0 до 44175,0 кг/га, від 1592,0 до 3148,0 кг/га та від 42,6 до 328,2 кг/га (табл. 6).

Результативною оцінкою ефективності застосованих інтенсифікаційних заходів при вирощуванні рибопосадкового матеріалу корокових риб є величина отриманої рибопродуктивності. Відомо, що рибопродуктивність визначається такими складовими, як середня маса вирощеної риби та рівень виживання. Так, восени при облові ставів середня маса вирощених цьоголіток коропа в дослідних ставах перебувала на рівні $62,0 \pm 1,0$ – $70,0 \pm 1,4$ г, гібрида товстолобика — $18,0 \pm 0,8$ – $26,0 \pm 0,8$ г; вихід — відповідно 58–65% та 31–68%. У контрольних ставах середня маса цьоголіток коропа становила $64,0 \pm 0,6$ – $66,0 \pm 1,2$ г, гібрида товстолобика — $14,0 \pm 1,2$ – $21,0 \pm 1,0$ г, а вихід — відповідно 52–56% та 26–64% (табл. 7).

Таблиця 6. Продукційні характеристики основних компонентів природної кормової бази експериментальних вирощувальних ставів ТОВ «Магнолія»**Table 6. Production indices of the natural fodder base main components in the experimental growing ponds of LLC "Magnoliya"**

Стави / Ponds	Фітопланктон / Phytoplankton		Зоопланктон / Zooplankton		Зообентос / Zoobenthos	
	В, мг/дм ³ / B, mg/dm ³	Р, кг/га / P, kg/ha	В, г/м ³ / B, g/m ³	Р, кг/га / P, kg/ha	В, г/м ² / B, g/m ²	Р, кг/га / P, kg/ha
Контроль 1 / Control 1	16,57	29826,0	9,42	2260,8	2,81	168,6
Дослід 1 / Experiment 1	20,00	36000,0	12,42	2980,8	1,34	80,4
Контроль 2 / Control 2	15,59	35077,5	8,58	2574,0	2,55	153,6
Дослід 2 / Experiment 2	21,03	47317,5	13,25	3975,0	3,84	230,4

Примітка. В – біомаса, Р – продукція.

Notes. B – biomass, P – production.

Таблиця 7. Результати вирощування цьоголіток корокових риб**Table 7. The results of growing underyearling carps**

Варіанти дослідів / Experi- mental options	Вид риб / Fish species	Посадже- но личи- нок, тис. екз./га / Stoking larvae, thousand individuals / ha	Виловлено цьоголіток / Catch of yearlings			Рибопродуктив- ність кг/га / Fishproductivity, kg/ha		Витра- ти корму, кг/кг / Forage spend, kg/kg
			тис. екз./га / thousand indi- viduals / ha	середня маса, г / average mass/ g	вихід, % / yield, %	за ви- дами / by species	загаль- на / total	
Контроль 1 / Con- trol 1	короп / carp	30,0*	16,8	66,0±1,2	56	1102,0	1375,0	3,6
	ГТ / chinese carps hybrids	50,0	13,0	21,0±1,0	26	273,0		
Дослід 1 / Experi- ment 1	короп / carp	30,0*	19,5	70,0±1,4	65	1357,0	1760,0	2,9
	ГТ / chinese carps hybrids	50,0	15,5	26,0±0,8	31	403,0		
Контроль 2 / Con- trol 2	короп / carp	30,0*	15,6	64,0±0,6	52	992,0	1888,0	4,0
	ГТ / chinese carps hybrids	100,0	64,0	14,0±1,2	64	896,0		
Дослід 2 / Experi- ment 2	короп / carp	30,0*	17,4	62,0±1,0	58	1072,0	2296,0	3,7
	ГТ / chinese carps hybrids	100,0	68,0	18,0±0,8	68	1224,0		

Примітка. ГТ — гібрид товстолоба, * — молодь, підрощена до 0,4 г.

Notes: * – growing juveniles up to 0,4 g

Слід відмітити, що у дослідних ставах (із застосуванням пасти хлорели) за різного співвідношення полікультури риб показники виживання як за коропом, так і гібридом товстолоба були значно вищими, порівняно з контрольними. Проте в експериментальних ставах з вищою густотою посадки середня маса цьогоріток гібрида товстолоба не досягла нормативних величин (20 г) (табл. 7). Тому найбільш оптимальним варіантом, на нашу думку, є вирощування цьогоріток коропових риб у полікультурі за загальної густоти посадки 80,0 тис. екз./га та співвідношення коропа і гібрида товстолоба 37,5 : 62,5.

Рибопродуктивність за коропом в дослідних ставах становила 1072,0–1357,0 кг/га, за товстолобом — 403,0–1224,0 кг/га. Загальна рибопродуктивність у дослідних ставах була на рівні 1760,0–2296,0 кг/га, що на 22–28% вище, ніж у контрольних (1375,0–1888,0 кг/га). При цьому, витрати корму в досліді були в 1,1–1,3 раза нижчими і становили 2,9–3,7 кг/кг (табл. 7).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Досліджено вплив застосування комплексу інтенсифікаційних заходів (удобрення, внесення пасти хлорели, полікультура, годівля риб тощо) на гідрохімічний режим, стан природної кормової бази та рибницькі показники вирощування цьогоріток коропових риб. Встановлено, що гідрохімічний режим експериментальних ставів при застосуванні різного комплексу інтенсифікаційних заходів був задовільним.

Застосування пасти хлорели в комплексі з іншими інтенсифікаційними заходами позитивно відобразилося на продуктивності вирощувальних ставів. Середньосезонні значення біомаси кормових гідробіонтів у дослідних варіантах перебували в межах: за фітопланктоном — 20,0–21,03 мг/дм³; зоопланктоном — 12,42–13,25 г/м³; зообентосом — 1,34–3,84 г/м². Основу біомаси фітопланктону формували цінні в кормовому значенні зелені водорості (36,8–46,6%), зоопланктону – гіллястовусі ракоподібні (50,9–67,8%), а зообентосу – личинки хірономід (100%).

Інтенсивність розвитку кормових гідробіонтів вплинула на показники середньої маси та рівень виживання риби. Зокрема, середня маса цьогоріток коропа в дослідних варіантах знаходилася в межах 62,0–70,0 г, за виходу з вирощування 58,0–65,0%; гібрида товстолоба — відповідно 18,0–26,0 г та 31,0–68,0%. Отримана загальна рибопродуктивність у дослідних ставах була на 22,0–28,0% вищою, а витрати корму — в 1,1–1,3 раза меншими, порівняно з контрольними.

ЛІТЕРАТУРА

1. Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / Андрющенко А. І. та ін.; ред. Гринжевський М. В. Київ, 1998. 124 с.
2. Головкин Г. В. Биологическая продуктивность временных рыбоводных прудов // Вопросы рыболовства. 2008. Т. 9, № 4(36). С. 754–763.
3. Фермерське рибництво / Грициняк І. І. та ін. Київ : Герб, 2008. 560 с.
4. Кузьмин И. А. Повышение продуктивности выростных прудов путем комплексного воздействия на их экосистему : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология». Москва, 2007. 20 с.
5. Харитонов Н. Н. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства. Киев : Наукова думка, 1984. 173 с.

6. Особливості формування природної кормової бази вирощувальних ставів при застосуванні різних добрив / Григоренко Т. В. та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. 2015. № 3–4(64). С. 133—137. (Серія : Біологія).
7. Хижняк М. І. Біологічна продуктивність вирощувальних ставів при використанні нетрадиційних органічних добрив // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : Х Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. Херсон : Грінь Д.С., 2017. С. 349—352.
8. Головки Г. В. Оптимизация способов формирования планктона в прудах Нижнего Дона : автореф. дисс. на соиск. уч. ступени канд. биол. наук : спец. 03.00.18 «Гидробиология». Астрахань, 2007. 20 с.
9. Богданов Н. И. Биологическая реабилитация водоёмов. Пенза : РИО ПГСХА, 2008. 126 с.
10. Опыт выращивания молоди пеляди *Coregonus peled* при добавлении суспензии хлореллы / Трофимчук О. А. и др. // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2020. № 5. С. 62—69.
11. Продуктивність вирощувальних ставів при застосуванні різного комплексу інтенсифікаційних заходів / Григоренко Т. В. та ін. // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : І Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-17 трав. 2018 р. : тези. Київ : ПРО ФОРМАТ, 2018. С. 97—99.
12. Онищенко О. М., Дворецкий А. І. Мікрководорості як відновлюваний біологічний ресурс для потреб сільського господарства // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2013. № 2 (32). С. 48—50.
13. Особенности влияния штамма *Chlorella vulgaris* ИФР №С-111 на качество воды в прудовом рыбоводстве / Фролова М. В. и др. // Орошаемое земледелие. 2019. № 3. С. 46—49.
14. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеиздат, 1973. 262 с.
15. СОУ-05.01.-37-385:2006. Вода рыбогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми : Київ: Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
16. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. ; ред. В. Д. Романенка. Київ : Логос, 2006. 408 с.
17. Водоросли. Справочник / Вассер С. П. и др. Киев : Наукова думка, 1989. 608 с.
18. Топачевский А. В., Масюк Н. П. Пресноводные водоросли Украинской ССР. Киев : Вища школа, 1984. 336 с.
19. Кутикова Л. А. Коловратки фауны СССР. Ленинград : Наука, 1970. 744 с.
20. Мануйлова Е. Ф. Ветвистоусые рачки (*Cladocera*) фауны СССР. Москва ; Ленинград : Наука, 1964. 328 с.
21. Шерман І. М. Ставові рибництво. Київ : Урожай, 1994. 336 с.
22. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая пром-ть, 1966. 376 с.
23. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. Москва : Агропромиздат, 1986. Т. 1. 259 с.

REFERENCES

1. Andriushchenko, A. I., Baltadzhi, R. A., Vovk, N. I., Hrynzhovskyi, M. V., Hudyma, B. I., & Demchenko, I. T., et al. (1998). *Metody pidvyshchennia*

- pryrodnoi ryboproduktyvnosti staviv*. Hrynzhevskiy, M. V. (Ed.). Kyiv.
2. Golovko, G. V. (2008). Biologicheskaya produktivnost' vremennykh rybovodnykh prudov. *Voprosy rybolovstva*, 9, 4(36), 754-763.
 3. Hrytsyniak, I. I., et al. (2008). *Fermerske rybnytstvo*. Kyiv: Herb.
 4. Kuz'min, I. A. (2007). Povyshenie produktivnosti vyrostnykh prudov putem kompleksnogo vozdeystviya na ikh ekosistemu. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moskva.
 5. Kharitonova, N. N. (1984). Biologicheskie osnovy intensifikatsii prudovogo rybovodstva. Kiev: Naukova dumka.
 6. Hryhorenko, T. V., et al. (2015). Osoblyvosti formuvannia pryrodnoi kormovoi bazy vyroshchuvalnykh staviv pry zastosuvanni riznykh dobryv. *Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Biologiya*, 3-4(64), 133-137.
 7. Khyzhniak, M. I. (2017). Biologichna produktyvnist vyroshchuvalnykh staviv pry vykorystanni netradytsiinykh orhanichnykh dobryv. *Suchasni problemy teoretychnoi ta praktychnoi ikhtiologii: X mizh nar. nauk.-prakt. konf.: tezy dop.* Kherson: FOP Hrin D.S., 349-352.
 8. Golovko, G. V. (2007). Optimizatsiya sposobov formirovaniya planktona v prudakh Nizhnego Dona. *Extended abstract of candidate's thesis*. Astrakhan'.
 9. Bogdanov, N. I. (2008). Biologicheskaya reabilitatsiya vodoemov. Penza: RIO PGSKhA.
 10. Trofimchuk, O. A., et al. (2020). Opyt vyrashchivaniya molodi pelyadi *Coregonus peled* pri dobavlenii suspenzii khlorely. *Rybovodstvo i rybnoe khozyaystvo*, 5, 62-69.
 11. Hryhorenko, T. V., et al. (2018). Produktyvnist vyroshchuvalnykh staviv pry zastosuvanni riznoho kompleksu intensyfykatsiinykh zakhodiv. Suchasni problemy ratsionalnoho vykorystannia vodnykh bioresursiv: tezy I mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii (Kyiv, 15-17 travnia 2018 r.). Kyiv: PRO FORMAT, 97-99.
 12. Onyshchenko, & O. M., Dvoretzkyi, A. I. (2013). Mikrovodorosti yak vidnovliuvanyi biologichnyi resurs dlia potreb silskoho hospodarstva. *Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnogo ahrarnoho universytetu*, 2 (32), 48-50.
 13. Frolova, M. V., et al. (2019). Osobennosti vliyaniya shtamna *Chlorella vulgaris* IFR №S-111 na kachestvo vody v prudovom rybovodstve. *Oroschaemoe zemledelie*, 3, 46-49.
 14. Alekin, O. A., Semenov, A. F., & Skopintsev, V. A. (1973). *Rukovodstvo po khimicheskomu analizu vod sushi*. Leningrad: Gidrometizdat.
 15. Voda rybohospodarskykh pidpriemstv. Zahalni vymohy ta normy (2006). *SOU-05.01.-37-385:2006*. Kyiv: Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy.
 16. Arsan, O. M., Davydov, O. A., & Diachenko, T. M. et al. (2008). *Metody hidroekologichnykh doslidzhen poverkhnevyykh vod*. Kyiv: Lohos.
 17. Vasser, S. P., Kondrat'eva, N. V., & Masyuk, N. P. et al. (1989). *Vodorosli. Spravochnik*. Kyiv: Naukova dumka.
 18. Topachevskiy, A. V., & Masyuk, N. P. (1984). *Presnovodnye vodorosli Ukrainskoy SSR*. Kyiv: Vishcha shkola. Golovnoe izd-vo.
 19. Kutikova, L. A. (1970). *Kolovratki fauny SSSR*. Leningrad: Nauka.
 20. Manuylova, E. F. (1964). *Vetvistousye rachki (Cladocera) fauny SSSR*. Moskva; Leningrad: Nauka.
 21. Sherman, I. M. (1994). *Stavove rybnytstvo*. Kyiv.
 22. Pravdin I. F. (1966) *Rukovodstvo po izucheniyu ryb*. Moskva: Pishchevaya prom-t.
 23. *Sbornik normativno-tekhnologicheskoy dokumentatsii po tovarnomu rybovodstvu* (1986). Moskva: Agropromizdat. (Vol. 1).

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВЕСЛОНОСА (*POLYODON SPATHULA WALBAUM, 1792*) У СТАВАХ ЛІСОСТЕПУ ТА ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Б. О. Ганкевич, veslonos-ua@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Третяк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Колос, kolos-en@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити особливості росту та визначити продуктивність веслоноса, вирощеного до товарної маси у ставах Лісостепу та Полісся України.

Методика. Вирощування північноамериканського зоопланктофага, представника осетроподібних риб — веслоноса — проводили у полікультурі з коропами у ставах площею від 0,2 до 74,0 га за напівінтенсивної та екстенсивної технологій. Густина посадки веслоноса 1–2-річного віку середньою масою від 86,5 до 1017,0 г змінювалась у межах 59–150 екз./га за загальної густоти посадки за всіма об'єктами полікультури 515–2402 екз./га. Серед інтенсифікаційних заходів застосовували внесення у стави традиційних органічних добрив і в окремих ставах — обмежену годівлю коропа кормосумішами на основі відходів від переробки сільськогосподарської сировини рослинного походження. Дослідження інтенсивності розвитку природної кормової бази ставів та фізико-хімічних показників водного середовища здійснювали за загальноприйнятими в гідробіології та гідрохімії методами. Особливості росту риб досліджували із застосуванням поширених в іхтіології методик за динамікою приростів маси тіла в абсолютних та відносних величинах.

Результати. Умови середовища ставів упродовж більшої частини періоду вирощування відповідали біологічним вимогам досліджуваних об'єктів аквакультури. Відмічали періодичне зниження концентрації кисню у воді до 1,5–2,2 мг O_2 /дм³, що могло справляти негативний вплив на прирости риб. Середньосезонна біомаса зоопланктону ставів перебувала в межах 3,8–5,8 г/м³ із переважанням за кількісними показниками *Cladocera* та *Sopropoda*. В результаті рибопродукція за веслоносом становила 48,8–256,4 кг/га у загальній рибопродукції ставів у межах від 502,3 до 1249,0 кг/га. Середньосезонні прирости веслоноса в залежності від умов вирощування становили 0,84–1,49 кг. Максимальні добові прирости інтродуцента відмічено протягом першої половини періоду вирощування за температури води 18–25°C, коли біомаса зоопланктону ставів змінювалась у межах 3,7–17,4 г/м³.

Наукова новизна. Отримано нові дані щодо особливостей росту веслоноса в умовах ставів Лісостепу та Полісся України.

Практична значимість. Результати досліджень є складовою частиною бази даних для розроблення удосконалених технологій осетрівництва в Україні.

Ключові слова: веслоніс, ставове рибництво, полікультура риб, рибопродукція, прирости маси риб.

**SOME PECULARITIES OF CULTIVATION OF TABLE PADDLEFISH
(*POLYODON SPATHULA WALBAUM*, 1792) IN PONDS
OF THE FOREST-STEPPE AND POLISSIYA OF UKRAINE**

B. Gankevich, veslonos-ua@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kiev

A. Tretyak, info@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kiev

E. Kolos, kolos-en@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kiev

Purpose. To investigate the growth characteristics and determine the productivity of paddlefish grown to marketable weight in ponds of the Forest-steppe and Polesia of Ukraine.

Methodology. The cultivation of the North American zooplanktophage, a representative of sturgeons, the paddlefish, was carried out in polyculture with cyprinids in ponds with areas ranging from 0.2 to 74.0 ha with the use of semi-intensive and extensive technologies. The stocking density of age-1-2 paddlefish with an average weight of 86.5 to 1017.0 g varied within 59-150 ind./ha with a total stocking density for all polyculture objects of 515-2402 ind./ha. Intensification measures included application of traditional organic fertilizers into ponds and feeding of carp with feed mixtures based on wastes from the processing of agricultural raw materials of vegetable origin in some ponds. Studies of the intensity of development of the natural food supply of ponds and physicochemical parameters of the aquatic environment were carried out according to the methods generally accepted in hydrobiology and hydrochemistry. The peculiarities of fish growth were studied with the use of common ichthyological methods for the dynamics of body weight gains in absolute and relative values.

Findings. The environmental conditions in ponds during most of the growing period met the biological requirements of the studied aquaculture objects. A periodic decrease in the oxygen concentration in water to 1.5-2.2 mg O₂/dm³ was noted, which could have a negative effect on fish growth. The average seasonal biomass of zooplankton in ponds was in the range of 3.8-5.8 g/m³ with predominance of Cladocera and Copepoda. As a result, paddlefish production was 48.8-256.4 kg/ha in total fish production in ponds ranging from 502.3 to 1249.0 kg/ha. Average seasonal weight gain of paddlefish, depending on growing conditions, was 0.84-1.49 kg. The maximum daily increments of this species were observed during the first half of the growing period at a water temperature of 18-25°C, when zooplankton biomass in ponds varied within 3.7-17.4 g/m³.

Originality. New data have been obtained on the peculiarities of paddlefish growth in the conditions of ponds of the Forest-steppe and Polesia of Ukraine.

Practical value. The study results are an integral part of the database for the development of improved sturgeon breeding technologies in Ukraine.

Key words: paddlefish, pond fish farming, fish polyculture, fish productivity, fish weight gains.

**НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
ВЕСЛОНОСА (*POLYODON SPATHULA WALBAUM*, 1792)
В ПРУДАХ ЛЕСОСТЕПИ И ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ**

Б. А. Ганкевич, veslonos-ua@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

А. М. Третьяк, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Е. Н. Колос, kolos-en@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Исследовать особенности роста и определить продуктивность веслоноса, выращенного до товарной массы в прудах Лесостепи и Полесья Украины.

Методика. Выращивание североамериканского зоопланктофага, представителя осетрообразных рыб — веслоноса — проводили в поликультуре с карповыми рыбами в

прудах площею від 0,2 до 74,0 га з використанням поліінтенсивної та екстенсивної технологій. Щільність посадки веслоноса 1–2-річного віку середньої масою від 86,5 до 1017,0 г змінювалася в межах 59–150 экз./га при загальній щільності посадки по всіх об'єктах полікультури 515–2402 экз./га. Серед інтенсифікаційних заходів застосовували внесення в пруди традиційних органічних добрив та в окремих прудах — підкормку карпа кормовими сумішми на основі відходів від переробки сільськогосподарського сировини рослинного походження. Дослідження інтенсивності розвитку природної кормової бази прудів та фізико-хімічних показників водної середовища здійснювали за загальноприйнятими в гідробіології та гідрохімії методами. Особливості росту риб вивчали за застосуванням поширених в іхтіології методик по динаміці приросту маси тіла в абсолютних та відносних величинах.

Результати. Умови середовища прудів на протязі більшої частини періоду вирощування відповідали біологічним вимогам досліджуваних об'єктів аквакультури. Відзначали періодичне зниження концентрації кисню в воді до 1,5–2,2 мг О₂/дм³, що могло мати негативний вплив на прирости риб. Середньосезонна біомаса зоопланктону прудів знаходилася в межах 3,8–5,8 г/м³, з перевагою по кількісним показателям *Cladocera* та *Copepoda*. В результаті виловлювали по веслоносу 48,8–256,4 кг/га в загальній вилові прудів від 502,3 до 1249,0 кг/га. Середньосезонні прирости веслоноса, залежні від умов вирощування, становили 0,84–1,49 кг. Максимальні добові прирости інтродуцента відзначені в першій половині періоду вирощування при температурі води 18–25°C, коли біомаса зоопланктону прудів змінювалася в межах 3,7–17,4 г/м³.

Наукова новизна. Отримані нові дані про особливості росту веслоноса в умовах прудів Лесостепі та Полісся України.

Практична значимість. Результати досліджень є складовою частиною бази даних для розробки удосконалених технологій осетроводства в Україні.

Ключові слова: веслонос, прудове рибівництво, полікультура риб, виловлювання, прирости маси риб.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Одним із важливих резервів поліпшення якості та урізноманітнення продукції прісноводної аквакультури, що сприяє підвищенню ефективності ставкового рибництва, є розширення видового складу полікультури риб за рахунок найцінніших об'єктів культивування з різним характером живлення. Серед таких об'єктів ставової аквакультури особливий інтерес являє завезений в Україну північноамериканський представник ряду осетроподібних, вид з фільтраційним типом живлення — веслонос (*Polyodon spathula* (Walbaum)) [1–5].

У експериментах, проведених у виробничих умовах рибогосподарських підприємств східноєвропейських країн, веслоноса здебільшого використовували як додатковий вид до традиційної полікультури короповіх риб [1, 6–8]. Крім полікультури з коропом і рослиноїдними рибами далекого східного комплексу, застосовувались різні варіанти сумісного вирощування веслоноса з іншими північноамериканськими інтродуцентами (*Catostomidae*, *Ictaluridae*) та осетровими рибами [1, 9]. Іноді, з біомеліоративною метою, до окремих із вищезазначених комбінацій ставової полікультури додатково вводили типових хижих видів риб [10–12].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Пріоритетне значення належить оцінці особливостей вирощування веслоноса у ставах Полісся та Лісостепу, де зосереджена значна частина ставового фонду України, яка в умовах потепління клімату може мати певні переваги для ставового культивування осетроподібних. Актуальність аналізу результатів цих експериментальних робіт зростає на сучасному етапі розвитку національної аквакультури за відсутності належного рівня меліорації значної частини ставових угідь, що тривалий час експлуатується за модифікованими технологічними схемами напівінтенсивного та екстенсивного рибництва. При цьому у попередніх дослідженнях недостатня увага приділялась оцінці основних рибницько-біологічних показників веслоноса, вирощеного до товарної маси у ставах з різними функціональними характеристиками, зокрема у пристосованих для товарного рибництва ставах інших категорій. Тому основною метою проведених досліджень є визначення продуктивності та особливостей росту веслоноса, вирощеного до товарної маси за напівінтенсивної та випасної технології у ставах різної площі, розташованих у північному та центральному регіонах України.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проводили в період 2008–2012 рр. в умовах повносистемних ставових підприємств Лісостепу (господарство «Гірський Тікич» ПАТ «Черкасирибгосп») та Полісся (дослідне господарство «Нивка» Інституту рибного господарства НААН). Для виконання експериментальних робіт використовували як типові для коропівництва України нагульні стави площею 72–74 га (господарство «Гірський Тікич»), так і пристосовані для товарного рибництва зимувальні та літні ремонтно-маточні коропові стави площею 0,2–1,0 га (господарство «Нивка»). Середня глибина використаних у дослідках зимівників і нагульних ставів становила 1,5–1,8 м, маточних ставів — відповідно, до 1,3–1,4 м.

Вирощування веслоноса здійснювали у полікультурі з коропом і рослиноїдними рибами на природній кормовій базі та за напівінтенсивною технологією з обмеженою підгодівлею коропа кормосумішами на основі відходів від переробки сільськогосподарської сировини рослинного походження. Застосовувались поширені методи впливу на інтенсивність розвитку кормових гідробіонтів шляхом внесення у стави традиційних органічних добрив (перепрілий гній великої рогатої худоби) із розрахунку не більше 1,0–1,5 т/га [13, 14].

Визначення якісного складу кормових організмів та підрахунок їх біомаси здійснювали із використанням загальноприйнятих інструкцій та визначників [15].

У процесі вирощування риби досліджували основні фізико-хімічні показники якості води ставів за загальноприйнятими в рибництві та гідрохімії методиками [16, 17].

Особливості росту риб досліджували із застосуванням поширених в іхтіології методик за динамікою приростів маси тіла в абсолютних та відносних величинах [18].

Статистичну оцінку отриманих даних здійснювали у відповідності до існуючих методик [19].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

При виконанні експериментів за напівінтенсивної технології ставового рибництва в умовах господарства «Гірський Тікич» у лісостеповій фізико-географічній зоні для зариблення нагульних ставів площею 72–74 га використовували посадковий матеріал веслоноса одnorічного віку з мінімальною для даного виду осетроподібних середньою масою менше 100 г. У господарстві «Нивка», розташованому у південній частині Полісся, за випасної технології рибництва зариблення пристосованих для товарного вирощування ставів площею 0,2–1,0 га здійснювали одно- та дворічками веслоноса, середня маса яких наближалась відповідно до 140 та 1000 г. Зариблення ставів відносно невеликими одnorічками середньою масою менше 150 г спрямовувалось на визначення потенційних можливостей росту веслоноса та на встановлення доцільності використання такого посадкового матеріалу інтродукта для товарного вирощування у пристосованих ставах упродовж одного вегетаційного сезону. З'ясування цих питань сприятиме розширенню перспектив рибогосподарського освоєння веслоноса в аквакультури України. Застосування в окремих ставах комбінованої посадки риб різного віку (одно–дворічок) насамперед переслідувало господарську мету — одержання більшої товарної риби, яка користується вищим попитом у споживачів. Водночас, це дало змогу докладніше дослідити особливості росту веслоноса із використанням для зариблення ставів посадкового матеріалу різного віку із нестандартними розмірно-масовими кондиціями.

Дослідження основних фізико-хімічних параметрів водного середовища засвідчили, що показники температурного режиму ставів обох обстежених господарств упродовж 176–193-добових періодів вирощування риби характеризувались подібною динамікою. Середньодобова температура води коливалась від 9,6–21,2°C у квітні–травні та вересні–жовтні до 20,5–27,0°C у червні–серпні. Середньомісячні значення температури води влітку становили 21,3–24,6°C. В усіх варіантах експериментів до 100 діб утримання супроводжувалось найбільш сприятливими для росту веслоноса значеннями температури води в межах 20–26°C. Середньосезонні величини вмісту розчиненого у воді кисню становили 4,1–4,6 мг $O_2/дм^3$ із переважанням середньодобових значень у межах 3,7–7,0 мг $O_2/дм^3$. Спостерігалось нетривале зниження цього показника в окремі дні до 1,5–2,2 мг $O_2/дм^3$. Істотних відмінностей за вмістом розчиненого у воді кисню в окремих ставах не виявлено. Періодичне зниження концентрації кисню у воді імовірно справляло негативний вплив на процеси життєдіяльності та прирости досліджуваних об'єктів ставового рибництва. Водневий показник (pH) води змінювався у межах 7,1–8,2. Концентрація амонійного азоту зазвичай коливалась від 0,35 до 0,99 мг $N/дм^3$ (як виняток — до 1,75 мг $N/дм^3$). Рівень вмісту у воді нітритного та нітратного азоту становив відповідно 0,01–0,06 мг $N/дм^3$ та 0,05–0,36 мг $N/дм^3$. Мінеральний фосфор та загальне залізо виявлені у кількості відповідно 0,10–1,04 мг $P/дм^3$ та 0,05–0,94 мг $Fe/дм^3$. Перманганатна окиснюваність води здебільшого не перевищувала нормативних значень. Проте в окремі періоди зареєстроване зростання цього показника до 20–29 мг $O/дм^3$, що може вказувати на періодичне надходження у воду ставів надмірної кількості легкорозчинних органічних речовин. Загальна твердість води перебувала в межах 3,9–7,6 мг-екв./ $дм^3$. Вода ставів характеризувалася середнім ступенем мінералізації із сумою йонів 377,1–649,8 мг/ $дм^3$, і за класифікацією О. О. Алюкіна належала до гідрокарбонатного

класу групи кальцію. Загалом, можна констатувати, що за хімічним складом вода ставів господарств «Гірський Тікич» і «Нивка» була типовою для переважної частини ставових угідь Лісостепу та Полісся України. Явищ масової загибелі риби протягом періоду виконання досліджень не спостерігали.

Вважається, що для успішного вирощування веслоноса, якого зараховують до типових зоопланктерів, біомаса зоопланктону ставів має перебувати на рівні не менше 3–5 г/м³ [1, 6].

У проведених дослідженнях встановлено, що зоопланктон ставів формувався переважно за рахунок трьох основних груп організмів: гіллястовусих і веслоногих ракоподібних та коловерток. В окремих пробах виявлено планктонних личинок хірономід. За кількісними показниками у складі зоопланктону переважали найдоступніші для веслоноса гіллястовусі рачки, частка яких у середньосезонній біомасі зоопланктерів становила до 57%. Важливу роль у формуванні зоопланктонних компонентів кормової бази ставів відігравали веслоногі ракоподібні із часткою у біомасі понад 31%. Якісний склад нижчих ракоподібних характеризувався бідним видовим складом із домінуванням *Daphnia longispina*, *Daphnia magna*, *Bosmina longirostris* та *Cyclops* sp. Середньосезонна біомаса зоопланктону у ставах господарства «Гірський Тікич» становила від 3,9 (став № 4) до 5,8 г/м³ (став № 3). У дослідному господарстві «Нивка» середньосезонні величини біомаси зоопланктерів змінювались від 3,8 (став зимувальний) до 4,9 г/м³ (став № 17), тобто істотно не відрізнялись від показників ставів лісостепової зони. Найвищі кількісні показники розвитку зоопланктону ставів обох господарств у межах 5,7–17,4 г/м³ зареєстровано в окремі періоди з другої декади травня до першої декади липня, тобто впродовж відносно нетривалого часу протягом першої половини вегетаційного сезону. Отже, за кількісними показниками рівень розвитку зоопланктону ставів може бути оцінений як задовільний, в окремі періоди із помітним зниженням для задоволення потреб живлення споживачів зоопланктону у другій половині сезону вирощування риби. Певні переваги щодо забезпеченості улюбленою поживою мали дволітки веслоноса, яких вирощували із найвищою середньосезонною біомасою зоопланктерів на рівні 5,8 г/м³ (став № 3 господарства «Гірський Тікич»).

Під час вирощування риби у ставах лісостепової зони густота посадки однорічок веслоноса становила 59–63 екз./га (табл. 1). За цих умов веслоніс у полікультурі мав підпорядковане значення за кількістю особин використаних видів риб. У загальній кількості особин споживачів планктону, разом із білим і строкатим товстолобами, частка веслоноса становила 6,0–7,1%. Водночас, незважаючи на відносно невисокі показники середньої маси та виходу дволіток веслоноса, його частка в одержаній рибопродукції усіх споживачів планктонних організмів становила в середньому до 9,7 %.

Аналізуючи інші показники, за результатами вирощування риби у ставах лісостепової зони із використанням посадкового матеріалу веслоноса найменшої маси, слід відмітити, що серед вирощених дволіток масу, більшу, ніж 1,5 кг, у середньому мали близько 50% риб. Водночас, цей показник індивідуальної маси, який за використання дрібного посадкового матеріалу доцільно вважати достатнім для реалізації товарної продукції веслоноса, був значно вищим (до 70%) серед риб, вирощених з більшою середньосезонною біомасою зоопланктону (став № 3).

Таблиця 1. Результати вирощування дволіток веслоноса у полікультурі за напівінтенсивної технології ставового рибництва в умовах Лісостепу

Table 1. Results of growing two-year-old paddlefish in polyculture with using semi-intensive technology of pond fish farming in the forest-steppe conditions

Види риб / Fish species	Вік посадкового матеріалу, рік / Age of stoking material, year	Середня маса посадкового матеріалу, г / Average mass of stoking material, g	Густота посадки, екз./га / Fish-holding density individuals /ha	Кінцева середня маса риб, г / Final average mass of fishes, g	Вихід, % / Yield, %	Рибопродукція, кг/га / Fish productivity, kg/ha
Став № 3 (74 га) / Pond № 3 (74 ha)						
Короп / Carp	1	23,0	1300	403	80,3	420,6
Білий товстолоб / Silver carp	1–2	79,2	697	753	79,2	415,9
Строкатий товстолоб / Bigheaded carp	1–2	112,8	123	1068	84,1	110,7
Білий амур / Grass carp	1	49,2	125	464	81,6	47,3
Веслоніс, $M \pm m$ (n = 30) / Paddlefish, $M \pm m$ (n=30)	1	86,50±6,12*	63	1577,50±88,65	73,1	72,6
Cv, %		38,78		30,78		
Всього / Total	1–2	-	2308	-	-	1067,1
Став № 4 (72 га) / Pond № 4 (72 ha)						
Короп / Carp	1	27,3	1277	553	76,4	539,7
Білий товстолоб / Silver carp	1	46,8	789	762	80,5	483,9
Строкатий товстолоб / Bigheaded carp	1–2	182,4	138	1083	89,9	134,3
Білий амур / Grass carp	1	54,6	139	535	56,8	42,3
Веслоніс, $M \pm m$ (n = 30) / Paddlefish, $M \pm m$ (n=30)	1	86,50±6,12*	59	1318,28±91,23	62,9	48,8
Cv, %		38,78		33,05		
Всього / Total	1–2	-	2402	-	-	1249,0

Примітка. *Зариблення ставів здійснено однорічними веслоносами з однаковою середньою масою, вилученими з одного зимувального ставу.

Note. *Stocking of ponds was carried out by one-year-old paddlefish with the same average weight, caught from one wintering pond.

Досить високі рибиницькі показники зареєстровано за результатами вирощування інших об'єктів культивування, зокрема за середньою масою і виживанням строкатого товстолоба, конкуренція якого із веслоносом у споживанні зоопланктонних організмів може бути найвищою. Частка коропа у загальній рибопродукції 1067,1–1249,0 кг/га становила 39,4–43,2% (420,6–539,7 кг/га) (див. табл.1).

За відсутності у складі полікультури хижих видів риб-біомеліораторів в обох ставах лісостепової зони відмічений досить інтенсивний розвиток сторонньої іхтіофауни — переважно дрібного карася сріблястого (понад 24,3 кг/га), що могло негативно позначитись на ефективності вирощування об'єктів аквакультури.

У розрахунку на приріст біомаси видів, схильних до активного споживання штучних кормів (короп, карась, білий амур), витрати використаних кормосумішей за весь період напівінтенсивного вирощування риби становили в середньому до 2,18 кг/кг приросту.

У процесі випасного вирощування риби в полікультурі у ставах дослідного господарства «Нивка» застосовувалась однакова густота посадки однорічок та дворічок веслоноса — 150 екз./га, що насамперед пояснюється дефіцитом необхідних ставів. Для зариблення використовували обмежену кількість відсортованого за розміром посадкового матеріалу, середня маса якого становила 143 г у однорічок та 1017 г у дворічок веслоноса (табл. 2). При цьому внаслідок сортування індивідуальна маса найбільших однорічок не перевищувала 193–197 г, відповідно у найбільших дворічок веслоноса — 1400–1510 г.

Для експериментів використовували добре підготовлені невеликі стави (0,2–1,0 га) із незначним розвитком макрофітів (заростання не більше 1–2% ставових площ). Дослідження особливостей нагулу різновікових груп веслоноса у зазначених умовах пристосованих ставів слід віднести до найменш вивчених аспектів загальної проблеми вирощування товарної продукції цього північноамериканського інтродуцента у ставах різних регіонів України.

Обговорюючи дані за результатами вирощування риби у ставах Полісся, слід зазначити, що частка різновікових особин веслоноса від загальної кількості усіх видів риб у полікультурі перебувала в середньому на рівні близько 29%. При цьому частка веслоноса в отриманій рибопродукції в середньому становила до 35%. У загальній кількості вирощених дволіток веслоноса індивідуальна маса найбільших особин сягала 1325 г. Частка риб із масою тіла понад 1 кг наближалася до 50%. Отже, у цьому разі риб дволітнього віку доцільно було залишити на наступний рік вирощування з метою досягнення оптимальних товарних кондицій. Серед триліток веслоноса понад 85% особин мали масу у межах 1540–2678 г. Мінімальна індивідуальна маса веслоноса трилітнього віку становила 1021 г.

За даними таблиць 1 та 2 видно, що, незважаючи на найменшу середню масу посадкового матеріалу (86,5 г), максимальний середньосезонний приріст на рівні 1,36 кг мали дволітки інтродуцента за мінімальної густоти посадки (59–63 екз./га) у великих нагульних ставах. При цьому за найвищої інтенсивності розвитку зоопланктону (став № 3) був зареєстрований максимальний середньосезонний приріст риб — 1,49 кг.

Таблиця 2. Результати вирощування дволіток та триліток веслоноса у полікультурі за випасної технології ставового рибиництва в умовах Полісся

Table 2. Results of growing two- and three year-old paddlefish in polyculture with using pasturable technology of pond fish farming in the Polissiya conditions

Види риб / Fish species	Вік посадкового матеріалу, років / Age of stoking material, year	Середня маса посадкового матеріалу, г / Average mass of stoking material, g	Густота посадки, екз./га / Fish-holding density individual s/ha	Кінцева середня маса риб, г / Final average mass of fishes, g	Вихід, % / Yield, %	Рибпродукція, кг/га / Fish productivity, kg/ha
Став № 17 (1,0 га) / Pond № 17 (1,0 ha)						
Короп / Carp	2	315,0	200	995,7	93,5	186,2
Гібрид товстолобів / Chinese carps hybrids	2	410,8	150	1270,2	92,7	176,6
Білий амур / Grass carp	2	512,7	20	1007,4	95,0	19,1
Веслоніс М ± m (n = 30) / Paddlefish, M±m (n=30)	1	143,00±6,74	150	979,00±51,73	82,0	120,4
Cv, %		23,56		26,42		
Всього / Total	1-2	-	520	-	-	502,3
Став зимувальний (0,2 га) / Wintering pond (0,2 ha)						
Короп / Carp	2	290,0	200	889,2	80,0	142,3
Гібрид товстолобів / Chinese carps hybrids	2	395,5	150	1070,3	86,7	139,1
Білий амур / Grass carp	2	327,2	15	890,5	100,0	13,4
Веслоніс М ± m (n = 30) / Paddlefish, M±m (n=30)	2	1017,00±46,37	150	1899,30±79,26	90,0	256,4
Cv, %	-	24,97	-	21,68	-	-
Всього / Total	2	-	515	-	-	551,2

У невеликих пристосованих ставах господарства «Нивка» за густоти посадки 150 екз./га дволітки та трилітки веслоноса характеризувались значно нижчими величинами приростів, що перебували на близькому рівні у межах 0,84–0,88 кг за сезон. Водночас, слід відмітити, що в усіх проаналізованих варіантах вирощування риби в господарствах «Гірський Тікич» та «Нивка» веслоніс за абсолютними середньосезонними приростами маси переважав інші види риб у полікультурі.

Певними відмінностями характеризувались абсолютні та відносні добові прирости досліджуваних вікових груп веслоноса на різних етапах вирощування. Для дволіток веслоноса в умовах нагульних ставів господарства «Гірський Тікич» відмічене поступове зростання абсолютних добових приростів з 0,89–1,00 г до 14,52–16,89 г протягом першої половини періоду вирощування (до останньої декади липня). Після цього відбувалось зниження цього показника з 9,84–11,81 до 1,90–3,65 г. За весь досліджуваний період 191–193 діб абсолютний добовий приріст риб становив у середньому 6,38–7,81 г. Подібною динамікою характеризувались і відносні величини росту риб. Максимальні відносні добові прирости дволіток веслоноса на рівні 3,64–4,95% припадали на період з другої декади травня до останньої декади червня (табл. 3).

Таблиця 3. Показники приросту маси дволіток веслоноса, вирощених за напівінтенсивної технології ставового рибництва в умовах Лісостепу

Table 3. Indices of two-year-old paddlefish growth gain from ponds with semi-intensive technology in the Forest-steppe conditions

Дата контролю / Control date	Проміжок часу, доба / Time span, day	Середня маса риб ($M \pm m$), г / Average mass of fish ($M \pm m$), g	Абсолютний добовий приріст, г / Absolute growth gain, g	Відносний добовий приріст, % / Relatively growth gain, %
Став № 3 / Pond № 3				
10.04	-	86,50±6,12	-	-
10.05	30	116,52±9,45	1,00	1,16
26.05	16	208,88±14,84	5,77	4,95
26.06	31	519,16±36,04	10,01	4,79
26.07	30	1025,90±69,76	16,89	3,25
25.08	30	1380,28±91,23	11,81	1,15
18.10	54	1577,50±88,65	3,65	0,26
За весь період вирощування / For the entire growing period	191	1577,50±88,65	7,81	9,02
Став № 4 / Pond № 4				
10.04	-	86,50±6,12	-	-
10.05	30	113,15±10,02	0,89	1,03
25.05	15	174,88±13,66	4,12	3,64
10.06	16	292,28±26,75	7,34	4,37
25.06	15	478,96±34,08	12,45	4,25
25.07	30	914,70±61,18	14,52	3,03
24.08	30	1209,80±95,60	9,84	1,08
20.10	57	1318,23±70,57	1,90	0,16
За весь період вирощування / For the entire growing period	193	1318,23±70,57	6,38	7,38

В умовах лісостепової зони максимальні прирости дволіток веслоноса зареєстровано за температури води 18–25°C у період із найвищою забезпеченістю риб зоопланктонними кормовими організмами, біомаса яких коливалась у межах 3,7–15,3 г/м³.

Дещо іншою динамікою та інтенсивністю приростів маси відрізнялись дослідні групи веслоноса у процесі вирощування у невеликих пристосованих ставах господарства «Нивка» (табл. 4).

Таблиця 4. Показники приросту маси дволіток та триліток веслоноса, вирощених за випасної технології ставового рибництва в умовах Полісся

Table 4. Indices of two- and three year-old paddlefish growth gain from ponds with pasturable technology in the Polissiya conditions

Дата контролю / Control date	Проміжок часу, доба / Time span, day	Середня маса риб ($M \pm m$), г / Average fish mass ($M \pm m$), g	Абсолютний добовий приріст, г / Absolute growth gain, g	Відносний добовий приріст, % / Relatively growth gain, %
дволітки веслоноса (став № 17) / two-year old paddlefish (pond № 17)				
24.04	-	143,00±6,74	-	-
23.05	29	253,68±14,01	3,82	2,67
23.06	31	501,88±27,14	8,01	3,16
23.07	30	680,80±38,07	5,96	1,19
21.08	29	800,28±40,86	4,12	0,61
18.10	58	979,00±51,73	3,08	0,38
За весь період вирощування / For the entire growing period	177	979,00±51,73	4,72	3,30
трилітки веслоноса (став зимувальний) / three-year old paddlefish (wintering pond)				
17.04	-	1017,00±46,37	-	-
15.05	28	1134,04±54,86	4,18	0,41
12.06	28	1495,56±74,08	12,91	1,41
10.07	28	1688,76±80,26	6,90	0,46
11.08	32	1809,84±82,31	3,78	0,22
10.10	60	1899,30±79,26	1,49	0,08
За весь період вирощування / For the entire growing period	176	1899,30±79,26	5,01	0,49

Як видно з таблиці 4, абсолютні добові прирости дво- та трилітніх риб максимальних величин на рівні 8,01 та 12,91 г досягли відповідно в період до початку третьої і другої декад червня. Після цього спостерігалось істотне уповільнення накопичення маси рибами із закономірним зменшенням приростів до кінця періоду вирощування. За весь проаналізований період 176–177 діб абсолютний добовий приріст риб становив у середньому 4,72–5,01 г, що в

середньому на 30,8% нижче, ніж у дволіток, вирощених із меншою густотою посадки у ставах великої площі. Найвищі відносні добові прирости веслоноса обох вікових груп зареєстровано у червні за температури води 20–23°C, коли біомаса зоопланктону ставів змінювалась у межах 7,6–17,4 г/м³. Загалом, необхідно відзначити нижчі відносні величини добових приростів тріліток веслоноса у порівнянні з дволітками.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

За результатами експериментальних робіт з вирощування товарної продукції веслоноса в полікультурі з короповими рибами за напівінтенсивної та випасної технологій в господарствах Лісостепу та Полісся України, в одержаній загальній рибопродукції ставів 502,3–1249,0 кг/га частка веслоноса становила від 3,9 до 46,5% (48,8–256,4 кг/га).

Максимальні прирости веслоноса дво–трілітнього віку відмічені за температури води 18–25°C у першій половині вегетаційного сезону, коли біомаса зоопланктону ставів змінювалась у межах 3,7–17,4 г/м³. Значно вищими приростами маси на початку сезону вирощування характеризувались дволітки веслоноса в умовах великих нагульних ставів лісостепової зони за густоти посадки 59–63 екз./га.

До кінця періоду вирощування веслоніс дволітнього віку досягав середньої маси 979,0–1577,5 г за показників виживання 62,9–82,0%. Мінімальний рівень виходу зареєстровано у ставах з найменшою середньою масою посадкового матеріалу інтродуцента (86,5 г).

В умовах пристосованих для товарного рибиництва невеликих ставів певна частина тріліток веслоноса, вирощених із густотою посадки 150 екз./га, не досягла необхідної товарної маси та відсортовувалась для подальшого вирощування до оптимальних показників (не менше 1,5 кг). Необхідність сортування продукції веслоноса зростала в результаті зариблення пристосованих ставів невеликим посадковим матеріалом однорічок із середньою масою 143 г.

При виконанні подальших експериментів додаткову увагу необхідно зосередити на вирішенні завдань щодо прискореного вирощування товарної продукції веслоноса з поліпшеними розмірно-масовими кондиціями, із середньою масою не менше 2 кг, у полікультурі з короповими рибами у невеликих, добре підготовлених ставах зі спрямованим формуванням природної кормової бази та з підгодовлює спеціальними кормами поліпшених рецептур.

ЛІТЕРАТУРА

1. Виноградов В. К., Ерохина Л. В., Мельченков Е. А. Биологические основы разведения и выращивания веслоноса (*Polyodon spathula* (Walbaum)). Москва : Росинформагротех, 2003. 344 с.
2. Кончиц В. В. Первоочередные задачи развития осетроводства в республике Беларусь // Рибогосподарська наука України. 2008. № 3. С. 68–72.
3. Третяк О. М. Система науково обґрунтованого розвитку аквакультури веслоноса в Україні // Рибогосподарська наука України. 2010. № 2. С. 3–25.
4. Шерман І. М., Шевченко В. Ю., Корнієнко В. О. Досвід культивування веслоноса на Півдні України // Рибне господарство України. 2002. № 5. С. 23–24.

5. Культивирование осетрообразных на Юге Украины / Шерман И. М. и др. // Стратегия развития аквакультуры в условиях XXI века : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Минск : Тонпик, 2004. С. 143—145.
6. Виноградов В. К., Мельченков Е. А., Архангельский В. В. Веслонос (*Polyodon spathula*) в России // Аквакультура осетровых рыб : достижения и перспективы развития : II Междунар. науч.-практ. конф. : матер. докл. Астрахань, 2001. С. 89—92.
7. Головащенко В. М., Алхімов Є. М., Шевченко В. Ю. Результати вирощування ремонту цьоголіток та дволіток веслоноса в ставах у полікультурі на Півдні України // Рациональне використання природних ресурсів акваторій на території степової зони України : Регіональна наук.-практ. конф. : матер. Херсон : Гринь Д. С., 2016. С. 14—18.
8. Третяк О. М., Колос О. М., Ганкевич Б. О. З історії рибогосподарського використання американського веслоноса // Рибогосподарська наука України. 2009. Вип. 67. С. 3—14.
9. Васильева Л. М. Биологические и технологические особенности товарной аквакультуры осетровых в условиях Нижнего Поволжья. Астрахань : Биос, 2000. С. 139—148.
10. Організаційно-технологічні аспекти становлення та розвитку тепловодного ставового рибництва в Україні / Колос О. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2011. № 2. С. 70—87.
11. Гринжевський М. В., Янінович Й. Є., Швець Т. М. Полікультура з шістьох видів риб // Рибогосподарська наука України. 2009. № 1. С. 38—42.
12. Янінович Й. Є. Інтенсифікація ставового рибництва шляхом впровадження полікультури // Рибогосподарська наука України. 2010. № 1. С. 79—82.
13. Кражан С. А., Литвинова Т. Г. Природна кормова база вирощувальних та нагульних ставів і шляхи її покращення : методичні рекомендації. Київ, 1996. 50 с.
14. Харитонов Н. Н. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства. Київ : Наукова думка, 1984. 193 с.
15. Кражан С. А. Естественная кормовая база водоемов и методы ее определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства. Львов. 1991. 101 с.
16. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеиздат, 1973. 270 с.
17. СОУ – 05.01.37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
18. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва : Пищевая промышленность. 1966. 376 с.
19. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва : Колос, 1970. 256 с.

REFERENCES

1. Vinogradov, V. K., Erohina, L. V., & Mel'chenkov, E. A. (2003). *Biologicheskoe osnovy razvedeniya i vyrashhivaniya veslonosa (Polyodon spathula (Walbaum))*. Moskva: Rosinformagroteh.

2. Konchic, V. V. (2008). Pervoocherednye zadachi razvitija osetrovodstva v respublike Belarus'. *Ribogospodars'ka nauka Ukrainy*, 3, 68-72.
3. Tretiak, O. M. (2010). Systema naukovo obgruntovanoho rozvytku akvakultury veslonosa v Ukraini. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 3-25.
4. Sherman, I. M., Shevchenko, V. Yu., & Korniienko, V. O. (2002). Dosvid kultyvuvannia veslonosa na Pivdni Ukrainy. *Rybne hospodarstvo Ukrainy*, 5, 23-24.
5. Sherman, I. M., et al. (2004). Kul'tivirovanie osetroobraznyh na Juge Ukrainy. *Strategija razvitija akvakul'tury v uslovijah XXI veka: Mezhdunar. nauk.-prakt. konf.: mater.* Minsk: Tonpik, 143-145.
6. Vinogradov, V. K., Mel'chenkov, E. A., & Arhangel'skij, V. V. (2001). Veslonos (*Polyodon spathula*) v Rossii. *Akvakul'tura osetrovyyh ryb: dostizhenija i perspektivy razvitija: II Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater. dokl.* Astrahan', 89-92.
7. Holovashchenko, V. M., Alkhimov, Ye. M., & Shevchenko, V. Yu. (2016). Rezultaty vyroshchuvannia remontu tsoholitok ta dvolitok veslonosa v stavakh u polikulturi na Pivdni Ukrainy. Ratsionalne vykorystannia pryrodnykh resursiv akvatorii na terytorii stepovoi zony Ukrainy: Rehionalna nauk.-prakt.konf.: mater. Kherson: Hryn D.S., 14-18.
8. Tretiak, O. M., Kolos, O. M., & Hankevych, B. O. (2009). Z istorii rybohospodarskoho vykorystannia amerykanskooho veslonosa. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 67, 3-14.
9. Vasil'eva, L. M. (2000). *Biologicheskie i tehnologicheskie osobennosti tovarnoj akvakul'tury osetrovyyh v uslovijah Nizhnego Povolzh'ja*. Astrahan': Bios, 139-148.
10. Kolos, O. M., et al. (2011). Orhanizatsiino-tekhnologichni aspekty stanovlennia ta rozvytku teplovodnoho stavovoho rybnystva v Ukraini. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 70-87.
11. Hrynzhevskiy, M. V., Yaninovykh, Y. Ye., & Shvets, T. M. (2009). Polikultura z shistokh vydiv ryb. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 38-42.
12. Yaninovykh, Y. Ye. (2010). Intensyfikatsiia stavovoho rybnystva shliakhom vprovadzhennia polikultury. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 79-82.
13. Krazhan, S. A., & Lytvynova, T. H. (1996). *Pryrodna kormova baza vyroshchuvalnykh ta nahuynykh staviv i shliakhy yii pokrashchennia: metodychni rekomendatsii*. Kyiv.
14. Haritonova, N. N. (1984). *Biologicheskie osnovy intensivifikacii prudovogo rybovodstva*. Kyiv: Naukova dumka.
15. Krazhan, S. A. (1991). *Estestvennaja kormovaja baza vodoemov i metody ee opredelenija pri intensivnom vedenii rybnogo hozjajstva*. L'vov.
16. Alekin, O. A., Semenov, A. D., & Skopincev, B. A. (1973). *Rukovodstvo po himicheskomu analizu vod sushi*. Leningrad: Gidrometeoizdat.
17. Voda rybohospodarskykh pidpriemstv. Zahalni vymohy ta normy (2006). *SOU – 05.01.37-385:2006*. Kyiv: Ministerstvo ahrarynoi polityky Ukrainy.
18. Pravdin, I. F. (1966). *Rukovodstvo po izucheniju ryb (preimushhestvenno presnovodnyh)*. Moskva: Pishhevaja promyshlennost'.
19. Plohinskij, N. A. (1970). *Rukovodstvo po biometrii dlja zootehnikov*. Moskva: Kolos.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСТЕР'ЄРНИХ ПОКАЗНИКІВ САМЦІВ АМУРСЬКОГО САЗАНА (*CYPRINUS CARPIO HAEMATOPTERUS*) РІЗНОГО ГЕНЕЗИСУ

У. С. Куць, ulja.kuts840@gmail.com, ДП ДГ «Львівська дослідна станція» Інституту
рибного господарства НААН, смт Великий Любінь
І. І. Грициняк, info.iforgua@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Г. А. Куріненко, annazakharenko@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Я. В. Тучапський, yartuchapsky@ukr.net, ДП ДГ «Львівська дослідна станція»
Інституту рибного господарства НААН, смт Великий Любінь

Мета. Проаналізувати результати вирощування та надати комплексну оцінку
статевозрілих самців амурського сазана різного генезису за екстер'єрними показниками.

Методика. Вирощування проводили в ставових умовах Львівської дослідної станції
Інституту рибного господарства НААН. Матеріалом для досліджень слугували самці
амурського сазана у віці 8-ми та 9-ти років, отримані заводським методом від місцевих
самиць, ікру яких запліднювали спермою місцевих самців (місцеві) та дефростованою
спермою від самців далекосхідного походження з річки Амур (крію). Густота посадки плідників
сазана у літній період становила 96–105 екз./га, у зимовий — 1,0 тис. екз./га. Утримання
плідників та проведення нересту проводили згідно із загальноприйнятими інструкціями.
Статистичну обробку матеріалу проводили в «Microsoft Office Excel» (2016). Критеріями
аналізу показників були їх середня величина та похибка середньої арифметичної ($M \pm m$),
показник мінливості (C_v). Годівлю риб проводили спеціалізованим кормом фірми «Aller Aqua» і
пророщеною пшеницею.

Результати. Згідно з проведеними селекційно-племінними роботами з формування
маточних стад амурського сазана, виявлено, що плідники, отримані від дефростованої
сперми, характеризувалися помірним темпом росту та переважали за основними
екстер'єрними ознаками самців місцевого походження такого ж віку. Середній показник маси
тіла кріосамців у віці 8–9-ти років складав $2416,5 \pm 295,59$ та $2698,0 \pm 284,05$ г відповідно, у
місцевих самців цього ж віку — $2015,0 \pm 244,53$ та $2277,5 \pm 373,09$ г відповідно. За рештою
екстер'єрних показників також була зафіксована перевага самців, отриманих із
застосуванням кріотехнологій.

Наукова новизна. Вперше в умовах України проведено порівняльний аналіз основних
екстер'єрних показників статевозрілих самців амурського сазана різного генезису.

Практична значимість. Результати проведеної роботи дозволять провести
порівняльний аналіз комплексу екстер'єрних показників статевозрілих самців амурського
сазана різного походження та обґрунтувати доцільність використання їх в селекційних
роботах при подальшому відтворенні у племінних господарствах та з метою отримання
промислових гібридів.

Ключові слова: амурський сазан, генезис, маса тіла, довжина тіла, екстер'єрні
показники, вгодованість.

© У. С. Куць, І. І. Грициняк, Г. А. Куріненко, Я. В. Тучапський, 2020

CHARACTERISTIC OF EXTERIOR INDICATORS OF MALE OF AMUR WILD CARP (*CYPRINUS CARPIO HAEMATOPTERUS*) OF DIFFERENT GENESIS

U. Kuts', ulja.kuts840@gmail.com, Lviv Experimental Station of the Institute of Fisheries of the NAASU, Velykyi Lyubin

I. Hrytsyniak, info.iforgua@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

H. Kurinenko, annazakharenko@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Y. Tuchapsky, yartuchapsky@ukr.net, Lviv Experimental Station of the Institute of Fisheries of the NAAS, Velykyi Lyubin

Purpose. Analyze the results of rearing and provide a comprehensive assessment of the productive indicators of male Amur carp of various genesis.

Methodology. The cultivation was carried out in the pond conditions of the Lviv Experimental Station of the Institute of Fisheries of the UAAS. The material for the research was 8- and 9-year-old Amur carp males obtained by the factory method from local females, whose eggs were fertilized with the sperm of local males (local) and defrost sperm of Far Eastern males from the Amur River (cryo). The stocking density of carp breeders in summer was 96-105 ind./ha in winter - 1.0 thousand ind./ha. The maintenance of the producers and the spawning were carried out according to generally accepted instructions. The material was statistically processed in Microsoft Office Excel (2016). The analysis of values is carried out in the system of absolute values. The criteria for analyzing the indicators were their mean value and mean deviation ($M \pm m$), the indicator of variability (C_v). The fish were fed with the specialized food of the firm "Aller Aqua" and sprouted wheat.

Findings. According to the selection and breeding work on the formation of the Amur carp broodstock, it was revealed that the producers raised from the obtained defrosted sperm were characterized by a moderate growth rate and exceeded in terms of the main exterior characteristics of males of the same age of local origin. The average body mass of cryomales aged 8-9 years was 2416.5 ± 295.59 and 2698.0 ± 284.05 g, respectively. In males of local origin of the same age: 2015.0 ± 244.53 and 2277.5 ± 373.09 g, respectively. For the rest of the exterior indicators, the advantage of males obtained using cryotechnology was also recorded.

Originality. A comparative analysis of productive parameters of sexually mature males of Amur wild carp of different geneses was performed for the first time in Ukraine

Practical value. The results of this work will make it possible to carry out a comparative analysis of the complex of productive indicators of sexually mature males of the Amur carp obtained from defrosted and native sperm and to substantiate the expediency of using them in breeding work in order to obtain industrial hybrids.

Key words: Amur wild carp, genesis, body weight, body length, exterior features, condition factor.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСТЕРЬЕРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМЦОВ АМУРСКОГО САЗАНА (*CYPRINUS CARPIO HAEMATOPTERUS*) РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗИСА

У. С. Куць, ulja.kuts840@gmail.com, ГП ОХ «Львовская опытная станция» Института рыбного хозяйства НААН, пгт Великий Любень

И. И. Грициняк, info.iforgua@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

А. А. Куриненко, annazakharenko@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Я. В. Тучапський, yartuchapsky@ukr.net ГП ОХ «Львовская опытная станция» Института рыбного хозяйства НААН, пгт Великий Любень

Цель. Проанализировать результаты выращивания и представить комплексную оценку продуктивных показателей половозрелых самцов амурского сазана различного генезиса.

Методика. Вирощивання проводили в прудових умовах Львівської опытної станції Інститута рибного господарства НААН. Матеріалом для досліджень послужили самці амурського сазана в віці 8-ми і 9-ти років, отримані заводським методом від місцевих самок, ікру яких оплодотворяли спермою місцевих самців (місцеві) і дефростированної спермою самців дальневосточного походження з ріки Амур (крио). Щільність посадки виробників сазана в літній період складала 96–105 екз./га, в зимний — 1,0 тис. екз./га. Зміщення виробників і проведення нересту здійснювали згідно загальноприйнятих інструкцій. Статистичну обробку матеріалу проводили в «Microsoft Office Excel» (2016). Аналіз величин виконано в системі абсолютних значень. Критеріями аналізу показників були їх середня величина і середнє відхилення ($M \pm m$), показник змінливості (C_v). Кормлення риб проводили спеціалізованим кормом фірми «Aller Aqua» і пророщеної пшеницею.

Результати. Згідно проведеним селекційно-племенним роботам по формуванню маточних стад амурського сазана, виявлено, що виробники, отримані від дефростированної сперми, характеризувалися помірного темпу росту і перевищали по основним екстер'єрним ознакам самців місцевого походження такого ж віку. Середній показник маси тіла криосамців в віці 8–9-ти років становив $2416,5 \pm 295,59$ і $2698,0 \pm 284,05$ г відповідно, у самців місцевого походження цього ж віку — $2015,0 \pm 244,53$ і $2277,5 \pm 373,09$ г відповідно. По інших екстер'єрних показниках також було зафіксовано перевагу самців, отриманих з використанням криотехнологій.

Наукова новизна. Вперше в умовах України проведено порівняльний аналіз продуктивних показників половозрілих самців амурського сазана різного походження.

Практична значимість. Результати проведеної роботи дозвлять провести порівняльний аналіз комплексу продуктивних показників половозрілих самців амурського сазана, отриманих від дефростированної і нативної сперми, і обґрунтувати цілеспрямованість використання їх в селекційних роботах з метою отримання промислових гібридів.

Ключові слова: амурський сазан, походження, маса тіла, довжина тіла, екстер'єрні показники, годувальність.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Ефективність ведення будь-якого рибницького господарства, в цілому, залежить від якості плідників. Плідники з високими показниками продуктивних та репродуктивних ознак гарантують отримання життєстійкого садкового матеріалу. В селекційно-племенних господарствах плідників оцінюють за комплексом показників, одним з яких є екстер'єр, який залежить від генотипу, віку й умов нагулу. Однак, для оцінки племенних риб важливі не лише абсолютні величини показників екстер'єру, а й їхні значення в порівнянні з попереднім роком, адже зниження коефіцієнта годувальності може призводити до погіршення результатів майбутнього нересту [1].

Упродовж багатьох років для промислової гібридизації у ставовому рибництві використовується амурський сазан [2], що зумовлено економічною ефективністю вирощування короново-сазанових гібридів у порівнянні з чистопорідними коропами. Завдяки ефекту гетерозису останні характеризуються вищим темпом росту, ступенем резистентності до найпоширеніших захворювань риб, а їх використання сприяє зростанню продуктивності ставів в межах 19–22%. Особливо цінною властивістю коропо-сазанових гібридів є їхня висока

зимостійкість [3-5]. Проте, в умовах сьогодення працівники рибного господарства все частіше стикаються з проблемою відсутності достатньої кількості чистопорідних форм амурського сазана [6-7].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Продуктивність об'єкта вирощування визначається взаємодією процесів росту. Інтенсивність даного процесу можна визначити, використовуючи набір кількісних біологічних показників, таких як темп лінійного росту, швидкість масонакопичення, коефіцієнт вгодованості тощо. Зміни величин біологічних показників та темп їх формування розглядається як сезонна динаміка [1]. Оскільки раніше були проведені роботи з відтворення амурського сазана з використанням кріоконсервованої сперми далекосхідного походження та дана їхня характеристика в ранньому віці [8], то актуальним є питання більш детального вивчення біологічних особливостей, зокрема екстер'єрних показників, у репродуктивний період та перспектив їх використання у якості плідників для отримання гібридного потомства.

Отже, основною метою роботи є порівняння результатів комплексної оцінки статевозрілих самців амурського сазана різного генезису за екстер'єрними показниками.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Дослідження з метою визначення екстер'єрних показників амурського сазана проводилися в 2019–2020 рр. у ставових умовах Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН. ДП ДГ «Львівська дослідна станція» знаходиться у смт Великий Любінь Городоцького р-ну Львівської обл. Господарство розташоване у Лісостеповій зоні, а джерелом водопостачання є поверхневі води з атмосферних опадів і води р. Верещиця. Проточність води на 1 га ставів коливається у межах 1,2–16,0 л/с. Ґрунти опідзолені чорноземи на лісових глинах, клімат помірний, кількість атмосферних опадів 700–800 мм на рік, відносна вологість повітря — 76–82%, середньорічна температура повітря — 9–11°C [9]. Середня глибина ставів складає 1,5 м, площа — 0,17–1,77 га. Жорстка надводна рослинність у дослідних ставах відсутня. Термічний режим в господарстві стабільний: влітку вода в ставах прогрівається до 26°C, взимку — знижується до 2°C.

Об'єктом досліджень слугували самці амурського сазана у віці 8-ми та 9-ти років різного походження. Самці місцевого походження є потомками плідників амурського сазана, які були завезені у стави дослідного господарства Львівської дослідної станції ІРГ із Далекого Сходу — р. Амур та оз. Ханка — у 70–80-х рр. минулого століття та пройшли 8 поколінь відтворення. Кріосамці були відтворені у заводських умовах ДП «ДГ Нивка» у 2011 р. від місцевих самиць та дефростованої сперми [10]. Дану сперму було отримано від самців материнської водойми басейну річки Амур та кріоконсервовано 21–23 червня 1987 р. на базі тепловодного рибного господарства при Лучегірській ГЕС Хабаровського краю [11]. До відтворення кріоконсервована сперма зберігалась в колекції кріобанку ІПКіК НАН України [8, 10].

Літній нагул та зимівля самців відбувалася в маточних ставах, площа яких

відповідно становила 1,77 та 0,17 га. Утримання маточного поголів'я проводили згідно із загальноприйнятими інструкціями в селекції коропових риб [5, 12].

Бонітування та відбір плідників для відтворення проводили в березні. Оцінку плідників здійснювали на основі фенотипових ознак, що передбачає використання для відтворення тільки здорових повноцінних особин без ушкоджень, вад розвитку та добре вгодованих.

Екстер'єрну оцінку плідників проводили за основними селекційними параметрами: масою та довжиною тіла, висотою тіла, обхватом тіла [5, 12]. Проміри проводили сантиметровою стрічкою з точністю до 1 мм. Індивідуальне зважування здійснювали на електронних товарних терезах з точністю до 1 г. За результатами вимірювань аналізували та визначали основні екстер'єрні індекси — індекс обхвату, індекс високоспинності, індекс голови.

Годівлю риб у переднерестовий період проводили спеціалізованим кормом фірми «Aller Aqua», у літній період — пророщеною пшеницею. Коефіцієнт вгодованості розраховували за Фультоном [13].

Статистичну обробку морфометричних показників проводили в «Microsoft Office Excel» (2016). Аналіз величин виконано в системі абсолютних значень. Критеріями аналізу показників були їх середня величина та середнє відхилення ($M \pm m$), показник мінливості (C_v) [14].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

У ДП «ДГ Львівської дослідної станції» утримується маточне стадо амурського сазана, яке нараховує 170 особин, з них 50 самиць та 120 самців. Плідники сазана мають різне генетичне походження — місцеві та отримані з дефростованої сперми. Для нересту були відібрані самці, які відповідали класу «еліта». З метою промислової гібридизації даних самців було висаджено на нерест за наступною схемою: 2019 р.: нерестовий став № 5 — 5 ♀ галицьких рамчастих $\times$ 10 ♂ амурських сазанів, отриманих від дефростованої сперми (кріосамці); нерестовий став № 31 — 4 ♀ галицьких рамчастих $\times$ 8 ♂ амурських сазанів місцевого походження (місцеві); у 2020 р.: нерестовий став № 1 — 4 ♀ любінських рамчастих $\times$ 8 ♂ амурських сазанів місцевого походження (місцеві); нерестовий став № 2 — 5 ♀ любінських рамчастих $\times$ 10 ♂ амурських сазанів, отриманих від дефростованої сперми (кріосамці).

За середнім показником маси тіла переважання — 401,5 г — мали самці, отримані від дефростованої сперми. При цьому коефіцієнт варіації за даним показником був дещо вищим — 12% у особин обох дослідних груп. За середнім показником довжини тіла також переважали кріосамці — 50,7 см, проти 46,8 см відповідно. Незважаючи на незначну перевагу — 0,36 см — середнього показника висоти тіла у кріосамців, більш мінливими були значення серед показників самців місцевого походження — 4,42 та 6,12% відповідно. За середнім індексом обхвату тіла дослідні особини мали близькі значення, проте за коефіцієнтом варіації даного показника переважали кріосамці — 5,06 проти 13,2% відповідно. Середні показники довжини голови становили 11,13 та 11,85 см відповідно до дослідних груп (табл. 1).

Таблиця 1. Екстер'єрні показники 8-річних самців амурського сазана різного генезису (чисельник — $M \pm m$, знаменник — коефіцієнт варіації)

Table 1. Exterior indicators of 8-year-old male various genesis Amur wild carp (numerator - $M \pm m$, denominator - coefficient of variation)

Показники / Indices	Генетичне походження / Genetic origin	
	Місцеві (n = 8) / native (n = 8)	Кріо (n = 10) / cryo (n = 10)
Маса тіла, г / Body mass, g	<u>2015,0±86,46</u> 12,14	<u>2416,5±93,47**</u> 12,23
Довжина тіла, см / Body length, cm	<u>46,8±0,58</u> 3,52	<u>50,7±0,61**</u> 3,78
Довжина голови, см / Head length, cm	<u>11,13±0,18</u> 4,65	<u>11,85±0,13**</u> 3,47
Висота тіла, см / Body height, cm	<u>12,09±0,26</u> 6,12	<u>12,45±0,17*</u> 4,42
Обхват тіла, см / Body circumference, cm	<u>31,69±0,57</u> 5,06	<u>31,4±1,31</u> 13,2

Примітка. * — $p < 0,05$; ** — $p < 0,01$; *** — $p < 0,001$

Notes. * — $p < 0,05$; ** — $p < 0,01$; *** — $p < 0,001$

Згідно з результатами досліджень, отриманих серед 9-ти річних самців амурського сазана різного генезису, перевагу за всіма екстер'єрними показниками, окрім обхвату тіла, мали кріосамці. Так, за масою тіла перевага становила 18,5%, довжиною тіла — 7,72%, довжиною голови — 5,75%, висотою тіла — 1,09% (табл. 2).

Таблиця 2. Екстер'єрні показники 9-річних самців амурського сазана (чисельник — $M \pm m$, знаменник — коефіцієнт варіації)

Table 2. Exterior indices of 9-year-old male various genesis Amur wild carp (numerator — $M \pm m$, denominator — coefficient of variation)

Показники / Indices	Генетичне походження / Genetic origin	
	Місцеві (n = 8) / native (n = 8)	Кріо (n = 10) / cryo (n = 10)
Маса тіла, г / Body mass, g	<u>2277,5±131,91*</u> 16,38	<u>2698,00±89,82*</u> 10,53
Довжина тіла, см / Body length, cm	<u>51,8±2,13</u> 11,64	<u>55,80±0,36*</u> 2,03
Довжина голови, см / Head length, cm	<u>11,3±0,19</u> 4,69	<u>11,95±0,29*</u> 7,75
Висота тіла, см / Body height, cm	<u>13,7±0,46</u> 9,55	<u>13,85±0,21</u> 4,83
Обхват тіла, см / Body circumference, cm	<u>32,2±0,63</u> 5,57	<u>31,60±0,96</u> 9,60

Примітка. * — $p < 0,05$; ** — $p < 0,01$; *** — $p < 0,001$

Notes. * — $p < 0,05$; ** — $p < 0,01$; *** — $p < 0,001$

Аналізуючи показники абсолютного приросту (TGR) досліджуваних параметрів тілобудови самців різного генезису варто зазначити, що кріосамці переважали особин місцевого походження за масою на 7,2%, за довжиною тіла — на 4,3%, проте поступалися за довжиною голови, висотою та обхватом тіла. За показником відносного приросту (SGR) переважали самці місцевого походження (табл. 3).

Таблиця 3. Показники абсолютного та відносного приростів самців амурського сазана різного генезису віком 8-ми та 9-ти років

Table 3. Total and relatively growth rate indices of 8- and 9-year-old male various genesis Amur wild carp (numerator — $M \pm m$, denominator — coefficient of variation)

Показник / Indices	Місцеві (n = 8) / native (n = 8)		Кріо (n = 10) / cryo (n = 10)	
	TGR, cm	SGR, %	TGR, cm	SGR, %
Маса тіла, г / Body mass, g	262,50	13,03	281,50	11,65
Довжина тіла, см / Body length, cm	4,94	10,55	5,15	10,17
Довжина голови, см / Head length, cm	0,19	1,69	0,10	0,84
Висота тіла, см / Body height, cm	1,65	13,65	1,40	11,24
Обхват тіла, см / Body circumference, cm	0,50	1,58	0,25	0,80

Згідно з аналізом показників основних індексів тілобудови, було встановлено, що самці місцевого походження мали вищі значення за індексом висоти тіла як на 8-му, так і на 9-му році життя, однак з віком даний показник незначно знижувався відповідно на 2,92 та 0,25%. За індексом голови впродовж двох років були близькі значення, проте в 9-річному віці дані показники були нижчими на 11,44 та 9,44% та мали більш мінливі значення в особин обох генерацій. Аналогічна динаміка була зафіксована за коефіцієнтом варіації серед показників індексу обхвату тіла. Проте, показник з віком мав тенденцію до збільшення на 20,95 та 7,10% відповідно (табл. 4).

Таблиця 4. Основні індекси тілобудови самців амурського сазана різного генезису у віці 8 та 9 років

Table 4. Main body constitution indexes of various genesis Amur carp males at the age of 8 and 9 years

Індекс тілобудови / Body constitution indexes	8-річні / 8-year-old		9-річні / 9-year-old	
	Місцеві (n = 8) / native (n = 8)	Кріо (n = 10) / cryo (n = 10)	Місцеві (n = 8) / native (n = 8)	Кріо (n = 10) / cryo (n = 10)
I/H	<u>3,88±0,07</u> 5,14	<u>4,07±0,04</u> 2,81	<u>3,77±0,10</u> 7,78	<u>4,06±0,06</u> 4,82
I/O	<u>1,48±0,02</u> 4,30	<u>1,55±0,01</u> 1,49	<u>1,6±0,08</u> 13,32	<u>1,79±0,05</u> 9,41
C/I	<u>23,76±0,20</u> 2,33	<u>23,42±0,36</u> 4,83	<u>21,4±0,80</u> 10,50	<u>21,32±0,55</u> 8,16

В переднерестові періоди, протягом квітня–травня, плідників годували спеціалізованим кормом фірми «Aller Aqua», у період літнього нагулу — пророщеною пшеницею. При цьому витрати кормів на приріст маси самців становили в середньому 7,6 од.

Коефіцієнт вгодованості у восьмирічному віці був дещо вищим у самців місцевого походження — 1,96 од., у кріосамців він становив 1,85 од. відповідно. У дев'ятирічному віці даний показник відповідно склав 1,72 та 1,55 од. (рис. 1).

Рис. 1. Показники коефіцієнта вгодованості самців амурського сазана різного генезису у віці 8-ми та 9-ти років

Fig 1. Index of various genesis Amur carp males condition factors at the age of 8 and 9 years

Отже, результати порівняльного аналізу комплексу екстер'єрних показників статевозрілих самців амурського сазана різного походження доводять, що вони не поступаються за екстер'єром існуючим сформованим маточним стадам, а, отже, можуть бути використаними у племінних господарствах та з метою отримання промислових гібридів.

ВИСНОВКИ

В результаті проведених досліджень було встановлено, що самці, отримані з дефростованої сперми, переважали таких місцевого походження за масою та довжиною тіла як у віці 8-ми, так і 9-ти років. Проте за показником відносного приросту переважали самці місцевого походження, за масою тіла — на 1,38%, за довжиною тіла — на 0,38%, за довжиною голови — на 0,85%, за висотою тіла — на 2,4%, за обхватом тіла — на 0,78%. Отримані результати досліджень дозволяють зробити позитивні висновки щодо використання самців, отриманих із застосуванням кріотехнологій, в селекційних роботах при подальшому відтворенні у племінних господарствах та з метою отримання промислових гібридів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Біологічні основи рибного господарства : методичні вказівки. Київ : НУБіП України, 2016. С. 41.
2. Томиленко В. Г., Савич М. В. Амурський сазан и перспективы его использования в рыбных хозяйствах Украины // *Технология производства рыбы*. Москва, 1974. С. 115—123.
3. Гетерозис у рибництві / Олексієнко О. О. та ін. // *Рибне господарство України*. 2012. № 4. С. 13—23.
4. Карпенко І. М. Сазано-коропові гібриди. Львів : Каменяр, 1966. 84 с.
5. Олексієнко О. О., Томиленко В. Г., Кучеренко А. П. Інструкція з організації та ведення промислової гібридизації в коропівництві // *Інтенсивне рибництво*. Київ : Аграрна наука, 1995. С. 74—83.
6. Грициняк І. І., Третяк О. М. Пріоритетні напрямки наукового забезпечення рибного господарства України // *Рибогосподарська наука України*. 2014. № 1. С. 5—20.
7. Бех В. В. Проблеми в селекційно-племінній роботі в рибництві // *Рибогосподарська наука України*. 2008. № 1. С. 27—29.
8. Колісник Н. П., Особа І. А., Грициняк І. І. Аналіз окремих біологічних особливостей амурського сазана, відтвореного із використанням кріоконсервованої сперми // *Рибогосподарська наука України*. 2014. № 4. С. 70—77.
9. Грициняк І. І. Природно-економічні умови для розвитку рибного господарства Львівської області // *Рибне господарство*. Київ. 2001. Вип. 59—60. С. 6—11.
10. Вивчення впливу кріоконсервування та довгострокового зберігання сперми амурського сазана на життєстійкість личинок / Безусий О. Л. та ін. // *Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : IV Міжнар. іхтіологічн. наук.-практ. конф. : тези*. Одеса : Фенікс, 2011. С. 30—32.
11. Качество криоконсервированной спермы сазанов после 25 лет хранения / Копейка Е. Ф. и др. // *Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : IV Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф. : тези*. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011. С. 136—138.
12. Томиленко В. Г., Олексієнко О. О., Кучеренко А. П. Інструкція з організації племінної роботи в коропівництві України // *Інтенсивне рибництво*. Київ : Аграрна наука, 1995. 152 с.
13. Котляр О. А. Методы рыбохозяйственных исследований (ихтиология). Рыбное, 2004. 180 с.
14. Євтушенко М. Ю. Методика досліджень у рибництві (Методичний посібник). Київ, 2013. 130 с.

REFERENCES

1. Biologichni osnovy rybnogo hospodarstva: Methodychni vказivky (2016). Kyiv: NUBiP Ukrainy.
2. Tomylenko, V. H., & Savych, M. V. (1974) Amurskyi sazan y perspektivy eho yspolzovanyia v rybnykh khoziaistvakh Ukrainy. *Tekhnolohyia proyzvodstva ryby*. Moskva, 115-123.
3. Oleksiienko, O. O. (2012). Heterozys u rybnytstvi. *Rybne hospodarstvo Ukrainy*, 4, 13-23.

4. Karpenko, I. M. (1966). *Sazano-koropovi hibrydy*. Lviv: Kameniar.
5. Oleksiienko, O. O., Tomilenko, V. H., & Kucherenko, A. P. (1995) Instrukttsiia z orhanizatsii ta vedennia promyslovoi hibrydyzatsii v koropivnytstvi. *Intensyvne rybnytstvo*. Kyiv: Ahrarna nauka.
6. Hrytsyniak, I. I., & Tretiak, O. M. (2014). Priorytetni napriamky naukovooho zabezpechennia rybnoho hospodarstva Ukrainy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 5-20.
7. Bekh, V. V. (2008). Problemy v selektsiino-pleminnoi roboty v rybnytstvi. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 27-29.
8. Kolisnyk, N. P., Osoba, I. A., & Hrytsyniak, I. I. (2014). Analiz okremykh biolohichnykh osoblyvosti amurskoho sazana, vidtvorenoho iz vykorystanniam kriokonservovanoi spermy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 70-77.
9. Hrytsyniak, I. I. (2001). Pryrodno-ekonomichni umovy dlia rozvytku rybnoho hospodarstva Lvivskoi oblasti. *Rybne hospodarstvo*, 59-60, 6-11.
10. Bezusyi, O. L. (2011). Vyvchennia vplyvu kriokonservuvannia ta dovhostrokovoho zberihannia spermy amurskoho sazana na zhyttiistiikist lychynok. *Suchasni problemy teoretychnoi i praktychnoi ikhtiologii : tezy IV Mizhnar. ikhtiologichn. nauk.-praktych. konf.* Odesa: Feniks, 30-32.
11. Kopeyka, E. F. & Bibenko, O. V. (2011). Kachestvo kriokonservirovannoy spermy sazanov posle 25 let khraneniya. *Suchasni problemi teoretichnoi ta praktichnoi ikhtiologii: IV Mizhnar. ikhtiologichna nauk.-prakt. konf.: tezi*. Odesa: Odes'kiy natsional'niy universitet imeni I.I. Mechnikova, 136-138.
12. Tomilenko, V. H., Oleksiienko, O. O., & Kucherenko, A. P. (1995). Instrukttsiia z orhanizatsii plemninnoi roboty v koropivnytstvi Ukrainy. *Intensyvne rybnytstvo*. Kyiv: Ahrarna nauka, 3-33.
13. Kotlyar, O. A. (2004). *Metody rybokhozyaystvennykh issledovaney (ikhtiologiya)*. Rybnoe.
14. Yevtushenko, M. Yu. (2013). *Metodyka doslidzhen u rynytstvi (Metodychnyi posibnyk)*. Kyiv.

АНАЛІЗ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ЛІПІДІВ ГЕПАТОПАНКРЕАСУ ТА СКЕЛЕТНИХ М'ЯЗІВ ПОМІСНИХ КОРОПІВ ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ

Б. О. Грішин, Grishnbo@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

І. А. Особа, iryna_osoba@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

І. І. Грициняк, info@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати особливості ліпідного обміну помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи за допомогою визначення жирнокислотного складу скелетних м'язів та гепатопанкреасу.

Методика. Проведено дослід з визначення вмісту жирних кислот у тканинах скелетних м'язів та гепатопанкреасу чотирьох груп риб: двох груп помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи та двох вихідних батьківських форм коропа.

Результати. Встановлено, що основна кількість жирних кислот, які є цінним енергетичним і пластичним матеріалом для організму риб, забезпечується за рахунок споживання природної кормової бази. Дослідження жирнокислотного складу скелетних м'язів дволіток коропів різного генезу показали, що існує певна специфічність стосовно накопичення різних класів насичених і ненасичених жирних кислот. Так, в досліджуваних групах коропів найнижчим був вміст пентадеканової (C15:0) та лауринової (C12:0) жирних кислот. Найвищої концентрації у всіх групах досягав вміст олеїнової жирної кислоти.

Серед усіх груп жирних кислот загальних ліпідів скелетних м'язів найнижчою кількістю відзначилася пальмітоолеїнова кислота (C16:1) родини $n = 7$, що становило 0,06–0,07 г/кг натуральної маси. Аналіз жирнокислотного складу гепатопанкреасу дослідних та контрольних груп показав, що існує тканинна специфічність накопичення жирних кислот. Так, порівняно із тканиною скелетних м'язів, спостерігається вірогідне зростання вмісту ЖК у гепатопанкреасі практично удвічі.

Індекс насиченості ліпідів у тканині скелетних м'язів досліджуваних груп коропа знаходився в межах 0,136–0,140, що не становило вірогідних міжгрупових різниць.

Загальна кількість насичених ЖК у скелетних м'язах усіх груп коропа знаходилася практично на однаковому рівні. Концентрація жирних кислот помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи була дещо вищою, порівняно з вихідними батьківськими формами.

Наукова новизна. Вперше проведено дослідження особливостей ліпідного обміну у помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи за допомогою визначення жирнокислотного складу скелетних м'язів та гепатопанкреасу.

Практична значимість. Вивчення фізіолого-біохімічних особливостей отриманих помісей коропа необхідне для підтвердження доцільності виведення останніх.

Ключові слова: ліпіди, ліпідний обмін, жирні кислоти, помісі коропа.

© Б. О. Грішин, І. А. Особа, І. І. Грициняк, 2020

**ANALYSIS OF LIPID METABOLISM IN THE ORGANISM OF MIXED-BRED
CARP OF FIRST GENERATION FROM CROSSING THE ANTONINO-ZOZULENTINSKY
AND LYUBINSKY INTRABREED TYPES OF UKRAINIAN FRAMED BREED**

B. Grishyn, Grishnbo@gmail.com, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

I. Osoba, iryna_osoba@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

I. Hrytsyniak, info@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To analyze the peculiarities of lipid metabolism of mixed-bred carp of the first generation from crossing the Antonino-Zozulentinsky and Lyubinsky intra-breed types of Ukrainian frame breed by determining the fatty acid composition of skeletal muscles and hepatopancreas.

Methodology. Experiments were performed to determine the content of fatty acids in skeletal muscle and hepatopancreatic tissues of four groups of fish: two groups of mixed-bred carp of the first generation from crossing Antonino-Zozulentinsky and Lyubinsky intrabreed types of Ukrainian frame breed and two original parental forms of carp.

Findings. It was found that the major amount of fatty acids, which are a valuable energy and plastic material for fish body, was provided by the consumption of natural feeds. Studies of the fatty acid composition of the skeletal muscles of age-1+ carp of different genesis showed that there was some specificity in the accumulation of different classes of saturated and unsaturated fatty acids. Thus, the lowest content in the studied groups of carp had pentadecanoic (C15:0) and lauric (C12:0) fatty acids. The highest concentration in all groups was the content of oleic fatty acid.

Among all groups of fatty acids of total skeletal muscle lipids, palmitoleic acid (C16:1) of the family $n=7$ was in the lowest amount, which was 0.06 - 0.07 g/kg of body weight. Analysis of the fatty acid composition of the hepatopancreas of the experimental and control groups showed that there was tissue specificity of fatty acid accumulation. Thus, compared to skeletal muscle tissue, there was a significant 2-fold increase in the content of fatty acids in the hepatopancreas.

The lipid saturation index in the skeletal muscle tissue of the studied groups of carp was in the range of 0.136-0.140, which was not a possible inter-group difference.

The total amount of saturated fatty acids in the skeletal muscles of all groups of carp was almost the same. The concentration of fatty acids of local carp of the first generation from crossing the Antonino-Zozulentinsky and Lyubinsky intrabreed types of Ukrainian frame breed was slightly higher compared to the original parental forms.

Originality. For the first time, a study of the peculiarities of lipid metabolism in mixed-bred carp of the first generation from crossing the Antonino-Zozulentinsky and Lyubinsky intra-breed types of Ukrainian frame breed by determining the fatty acid composition of skeletal muscle and hepatopancreas.

Practical value. The study of physiological and biochemical peculiarities of the obtained carp mixes is necessary to confirm the feasibility of their reproduction.

Key words: lipids, lipid metabolism, fatty acids, carp crossing.

**АНАЛИЗ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ЛИПИДОВ ГЕПАТОПАНКРЕАСА
И СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ ПОМЕСНЫХ КАРПОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ**

Б. О. Гришин, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

И. А. Особа, iryna_osoba@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

И. И. Грициняк, info@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Проанализировать особенности липидного обмена помесных карпов первого поколения от скрещивания антонино-зозуленецкого и любеньского внутривидовых типов украинской рамчатой породы с помощью определения жирнокислотного состава скелетных мышц и гепатопанкреаса.

Методика. Проведені опыти по определению содержания жирных кислот в тканях скелетных мышц и гепатопанкреаса четырех групп рыб: двух групп помесных карпов первого поколения от скрещивания антонино-зозуленецкого и любеньского внутривидовых типов украинской рамчатой породы и двух исходных родительских форм карпа.

Результаты. Установлено, что основное количество жирных кислот, являющихся ценным энергетическим и пластическим материалом для организма рыб, обеспечивается за счет потребления естественной кормовой базы. Исследование жирнокислотного состава скелетных мышц двухлеток карпов различного генеза показали, что существует определенная специфика в отношении накопления различных классов насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Так, в исследуемых группах карпов низким было содержание пентадекановой (C15:0) и лауриновой (C12:0) жирных кислот. Самой высокой концентрации во всех группах достигало содержание олеиновой жирной кислоты.

Среди всех групп жирных кислот общих липидов скелетных мышц низким количеством характеризовалась пальмитоолеиновая кислота (C16:1) семейства $n = 7$, что составляло 0,06–0,07 г/кг натуральной массы. Анализ жирнокислотного состава гепатопанкреаса исследованных и контрольных групп показал, что существует тканевая специфичность накопления жирных кислот. Так, по сравнению с тканью скелетных мышц, наблюдалось достоверное возрастание содержания жирных кислот в гепатопанкреасе практически вдвое.

Индекс насыщенности липидов в ткани скелетных мышц исследуемых групп карпа находился в пределах 0,136–0,140, что не составляло возможных межгрупповых различий.

Общее количество насыщенных жирных кислот в скелетных мышцах всех групп карпа находилось практически на одинаковом уровне. Концентрация жирных кислот помесных карпов первого поколения от скрещивания антонино-зозуленецкого и любеньского внутривидовых типов украинской рамчатой породы, была несколько выше по сравнению с исходными родительскими формами.

Научная новизна. Впервые проведено исследование особенностей липидного обмена у помесных карпов первого поколения от скрещивания антонино-зозуленецкого и любеньского внутривидовых типов украинской рамчатой породы с помощью определения жирнокислотного состава скелетных мышц и гепатопанкреаса.

Практическая значимость. Изучение физиолого-биохимических особенностей полученных помесей карпа необходимо для подтверждения целесообразности воспроизводства последних.

Ключевые слова: липиды, липидный обмен, жирные кислоты, помеси карпа.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

В умовах постійної інтенсифікації рибництва, а також внаслідок дії антропогенного навантаження погіршується як гідрохімічний, так і гідробіологічний стан вирощувальних ставів що, у свою чергу, призводить до зниження їх продуктивності. Одночасно, потреба регулярного наповнення ринку вимагає пришвидшених темпів вирощування риби [1]. Тому застосування прогресивних підходів та інтенсифікація рибогосподарської діяльності є важливими чинниками забезпечення зростання виробництва якісної рибної продукції. Реалізація цього безпосередньо залежить від високого рівня селекційних робіт, а також від використання на виробництві промислової гібридизації.

Важлива роль у забезпеченні нормального функціонування організму риб належить обміну ліпідів [2]. Потреба риб у ліпідах забезпечується шляхом синтезу їх в організмі, а також за рахунок ліпідів, які входять до складу природної

та штучної кормової бази [3–7]. Основні фізико-хімічні та біологічні властивості ліпідів визначає їх жирнокислотний склад [2–5].

Жирні кислоти характеризуються широким спектром біологічної дії, який визначається їх можливістю виступати вторинними месенджерами або модуляторами активності функціонально важливих білків [2]. Крім того, жирні кислоти виступають важливими біорегуляторами в організмі, а зміна їх профілю в ліпідах мембран може спричинити зміни в активності мембранозв'язаних ферментів, експресію рецепторів, мембранну проникність, порушити транспортні властивості біомембран та багато інших процесів [8]. Крім того, жирні кислоти виступають енергетичними субстратами, що важливо в забезпеченні нерестових міграцій і тривалого зимового голодування риб [2, 9]. В організмі риб основна маса жирних кислот перебуває в зв'язаному стані, тобто в етерифікованій формі, або у вигляді жирнокислотних радикалів [2, 10].

Синтез та розпад ліпідів в організмі генетично детерміновані. У риб синтез та депонування ліпідів відбувається в печінці [2–5]. Вміст ліпідів у скелетних м'язах коропа збільшується в процесі онтогенезу [2–5]. Якраз за рахунок збільшення чи зниження ступеня насиченості жирнокислотних радикалів відбувається адаптація риб до зміни температури навколишнього середовища, яка і визначає їх існування в межах ареалу виду [9].

Таким чином, кількісне співвідношення жирних кислот, особливо ненасичених, у тканинах риб в процесі онтогенезу та протягом різних періодів річного циклу, змінюється і залежить від виду, віку, статі, ступеня статевої зрілості, температури води, якості кормової бази, погодних умов та інших чинників ендогенного та екзогенного походження.

Дисбаланс чи нестача окремих жирних кислот в кормах або наявність в них токсичних продуктів, які утворюються при їх окисненні, здатні спричинити зниження рівня виживання та появу патологічних змін в організмі риб [10]. Крім того, жирнокислотний склад ліпідів у тканинах риб визначає харчові та біологічні якості їх м'яса [2–5].

Аналіз літературних та власних експериментальних даних наочно розкриває необхідність дослідження показників ліпідного обміну з метою оцінки та контролю механізмів функціонування та фізіологічних особливостей у вирощуваної риби.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

В організмі тварин постійно відбуваються процеси окиснення енергетичних субстратів, в результаті яких утворюються активні форми кисню. Основними енергетичними субстратами виступають жирні кислоти. Продукти перекисного окиснення поліненасичених жирних кислот часто слугують біомаркерами ушкодження тканин. Аналіз жирнокислотного складу тканин риб також відображає якість м'яса та характеризує якість природної кормової бази ставів, за рахунок якої і відбувається накопичення вищих жирних кислот тканинами організму риб [2–5, 7].

Широкий спектр дослідження рибогосподарських та фізіолого-біохімічних

особливостей об'єктів риборозведення створює можливості для обґрунтованого використання існуючих порід, що, в свою чергу, визначає актуальність створення їх помісей з покращеними характеристиками. Нами вперше виведено помісі коропів від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи, тому метою даної роботи був аналіз особливостей їхнього ліпідного обміну шляхом визначення жирнокислотного складу скелетних м'язів та гепатопанкреасу.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

У зразках скелетних м'язів та печінки риб визначали концентрацію загальних ліпідів, вищих жирних кислот загальних ліпідів і неетерифікованих жирних кислот. Концентрацію вищих жирних кислот загальних ліпідів у тканинах виявляли після додавання до них кислоти внутрішнього стандарту, екстракції ліпідів хлороформ-метанольною сумішшю (2 : 1), вивільнення ліпідів від хлороформу, гравіметричного визначення маси загальних ліпідів, омилення загальних ліпідів і метилювання отриманих ЖК метанолом за наявності каталізатора [11–13]. Вміст неетерифікованих ЖК визначали шляхом додавання до зразків кислоти внутрішнього стандарту, екстракції ліпідів хлороформ-метанольною сумішшю (2 : 1), звільнення ліпідів від хлороформу, розчинення їх у гексані, осадження вільних ЖК метилатом натрію, переведення натрієвих солей ЖК у вільний стан і метилювання їх метанолом за наявності ацетилхлориду [11–14]. Розділення метилових ефірів вищих жирних кислот загальних ліпідів і неетерифікованих жирних кислот виконували, використовуючи газорідинний хроматограф.

Одержані цифрові результати опрацьовували статистично за допомогою стандартного пакету статистичних програм «Microsoft EXCEL».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Вивчення жирнокислотного складу тканин помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопородного типів української рамчастої породи виконано вперше.

Дослідження жирнокислотного складу скелетних м'язів дволіток коропів різного генезу показали, що існує певна специфічність стосовно накопичення різних класів насичених і ненасичених жирних кислот. Так, в досліджуваних групах коропів найнижчим був вміст пентадеканової (C15:0) та лауринової (C12:0) жирних кислот. Найвищої концентрації у всіх групах досягав вміст олеїнової жирної кислоти, що відображено у нижченаведеній таблиці (табл. 1).

Концентрація жирних кислот помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи була дещо вищою, порівняно з вихідними батьківськими формами (див. табл. 1). Загальна кількість насичених ЖК у скелетних м'язах коропів любінського і антонінсько-зозуленецького внутрішньопородних типів української рамчастої породи знаходилася в межах 1,65 г/кг у ЛРК 1,63 г/кг у АЗРК, що практично співпадало з такою у помісних груп рамчастих коропів першого покоління (табл. 2).

Таблиця 1. Жирнокислотний склад загальних ліпідів скелетних м'язів дволіток помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи, г/кг натуральної маси ($M \pm m$; $n = 6$)

Table 1. The fatty acid composition of total lipids skeletal muscle of biennial carps from crossing of the antonino-zozulentinsky and lyubinsky intrinsic types of Ukrainian framed breed ($M \pm m$; $n = 6$)

Код ЖК* / Cod of FA*	ЛРК / LFC	АЗРК / AZFC	♂ЛРК×♀АЗРК / ♂LFC×♀AZFC	♂АЗРК×♀ЛРК / ♂AZFC×♀LFC
C _{12:0}	0,03±0,003	0,03±0,003	0,03±0,003	0,03±0,003
C _{14:0}	0,06±0,003	0,05±0,003	0,08±0,003	0,07±0,003
C _{15:0}	0,01±0,003	0,01±0,003	0,01±0,003	0,01±0,003
C _{16:0}	0,98±0,015	0,97±0,018	0,99±0,013	0,99±0,013
C _{16:1}	0,07±0,003	0,06±0,003	0,08±0,003	0,08±0,003
C _{18:0}	0,22±0,015	0,23±0,017	0,25±0,015	0,24±0,015
C _{18:1}	5,32±0,104	5,29±0,101	5,36±0,104	5,38±0,104
C _{18:2}	1,19±0,046	1,20±0,044	1,22±0,043	1,21±0,043
C _{18:3}	0,68±0,023	0,67±0,024	0,72±0,025	0,70±0,025
C _{20:0}	0,35±0,015	0,34±0,021	0,37±0,012	0,37±0,012
C _{20:1}	0,98±0,032	0,99±0,038	1,02±0,038	1,01±0,038
C _{20:2}	0,52±0,015	0,50±0,018	0,53±0,015	0,53±0,015
C _{20:3}	0,38±0,020	0,36±0,021	0,40±0,015	0,40±0,015
C _{20:4}	0,45±0,038	0,43±0,032	0,48±0,032	0,48±0,032
C _{20:5}	0,59±0,029	0,57±0,029	0,62±0,032	0,61±0,032
C _{22:2}	0,12±0,012	0,12±0,009	0,12±0,009	0,12±0,009
C _{22:3}	0,17±0,012	0,16±0,012	0,19±0,015	0,19±0,015
C _{22:4}	0,28±0,022	0,26±0,022	0,30±0,017	0,30±0,017
C _{22:5}	0,54±0,010	0,52±0,009	0,56±0,009	0,56±0,009
C _{22:6}	0,87±0,026	0,84±0,026	0,90±0,020	0,90±0,020

Примітка. * — ЖК — жирні кислоти; ЛРК — любінський рамчастий короп; АЗРК — антонінсько-зозуленецький рамчастий короп; ♂ЛРК×♀АЗРК та ♂АЗРК×♀ЛРК — помісі ЛРК та АЗРК.

Notes. * — FA — fatty acids; LFC — lyubinsky framed carp; AZFC — antonino-zozulentinsky framed carp; ♂LFC×♀AZFC and ♂AZFC×♀LFC — hybrids of LFC and AZFC.

Загальна кількість насичених вищих ЖК загальних ліпідів скелетних м'язів з парною кількістю вуглецевих атомів в ланцюгу знаходилася практично на одному рівні в усіх досліджуваних групах риб, і домінувала над загальною концентрацією вищих ЖК з непарною кількістю вуглецевих атомів в ланцюгу у співвідношенні приблизно 99,4% : 0,6% (див. табл. 1 і табл. 2).

Таблиця 2. Концентрація жирних кислот загальних ліпідів скелетних м'язів дволіток помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи, г/кг натуральної маси ($M \pm m$; $n = 6$)

Table 2. The concentration of fatty acid composition of total lipids skeletal muscle of biennial carps from crossing of the antonino-zozulentinsky and lyubinsky intrinsic types of Ukrainian framed breed ($M \pm m$; $n = 6$)

Показник / Indices	ЛРК / LFC	АЗРК / AZFC	♂ЛРК×♀АЗРК / ♂LFC×♀AZFC	♂АЗРК×♀ЛРК / ♂AZFC×♀LFC
Загальна кількість насичених жирних кислот / The total amount of saturated fatty acids (FA)	1,65	1,63	1,68	1,67
Загальна кількість ЖК з парною кількістю вуглецевих атомів в ланцюгу / The total number of FA with an even number of carbon atoms in the chain	1,64	1,62	1,66	1,65
Загальна кількість ЖК з непарною кількістю вуглецевих атомів в ланцюгу / The total number of FA with an odd number of carbon atoms in the chain	0,01	0,01	0,01	0,01
Загальна кількість ненасичених ЖК / The total number of unsaturated FA	12,09	11,94	12,30	12,28
Загальна кількість мононенасичених ЖК / The total number of monounsaturated FA	6,40	6,34	6,42	6,42
Загальна кількість поліненасичених ЖК / The total number of polyunsaturated FA	5,69	5,60	5,80	5,78
Загальна кількість ЖК родини $n = 7$ / The total number of FA family $n = 7$	0,07	0,06	0,07	0,07
Загальна кількість ЖК родини $n = 9$ / The total number of FA family $n = 9$	6,85	6,78	6,87	6,87
Загальна кількість ЖК родини $n = 6$ / The total number of FA family $n = 6$	2,04	2,01	2,07	2,07
Загальна кількість ЖК родини $n = 3$ / The total number of FA family $n = 3$	3,13	3,09	3,22	3,22
ІНЛ / LSI	0,136	0,137	0,140	0,139
Загальна кількість ЖК (насичені + ненасичені) / Total LCD (saturated + unsaturated)	13,74	13,57	13,89	13,88

Загальна кількість ненасичених ЖК загальних ліпідів скелетних м'язів знаходилася в діапазоні 11,94–12,30 г/кг натуральної маси та зростала у наступній послідовності досліджуваних груп: АЗРК → ЛРК → ♂АЗРК×♀ЛРК → ♂ЛРК×♀АЗРК. Концентрація мононенасичених ЖК загальних ліпідів скелетних м'язів домінувала над концентрацією поліненасичених ЖК приблизно у співвідношенні 52% : 48%.

Серед усіх груп жирних кислот загальних ліпідів скелетних м'язів найнижчою кількістю відзначилася пальмітоолеїнова кислота (С16:1) родини n = 7, що становило 0,06–0,07 г/кг натуральної маси (табл. 2).

Загальна кількість ЖК загальних ліпідів скелетних м'язів родини n = 9 знаходилася в межах 6,78–6,87 г/кг натуральної маси і характеризувалася приблизно однаковою концентрацією як у вихідних батьківських форм коропа, так і у помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи.

Загальна кількість ЖК родини n = 6 становила 2,04 г/кг у ЛРК; 2,01 г/кг — у АЗРК та 2,07 г/кг — у помісних групах, що не становило вірогідних міжгрупових різниць. Кількість ЖК родини n = 3 варіювала у діапазоні 3,09–3,22 г/кг натуральної маси і була дещо вищою у помісних коропів, порівняно з вихідними групами коропів (див. табл. 2). Найвищим вміст ЖК загальних ліпідів скелетних м'язів родини n = 3 був у групах ♂ЛРК×♀АЗРК та ♂АЗРК×♀ЛРК, що може бути зумовленим впливом промислової гібридизації на формування їх фізіолого-біохімічних особливостей (див. табл. 2).

Індекс насиченості ліпідів у тканині скелетних м'язів досліджуваних груп коропа знаходився в межах 0,136–0,140, що не становило вірогідних міжгрупових різниць (див. табл. 2).

Загальна кількість вищих жирних кислот була дещо вищою у помісних групах коропів, порівняно з вихідними формами, що може бути зумовленим чинниками ендогенного та екзогенного характеру та її генетичною детермінованістю.

З наведених даних видно, що міжгрупові різниці в загальній кількості насичених, мононенасичених та поліненасичених жирних кислот у загальних ліпідах скелетних м'язів риб різного генезу не становлять вірогідних відмінностей, що, на нашу думку, зумовлено максимально наближеними гідрохімічними та гідробіологічними умовами вирощування та однаковим жирнокислотним складом раціону риб.

Аналіз жирнокислотного складу гепатопанкреасу дослідних та контрольних груп показав, що існує тканинна специфічність накопичення жирних кислот. Так, порівняно із тканиною скелетних м'язів, спостерігалось вірогідне зростання вмісту ЖК у гепатопанкреасі (табл. 3).

Загальна кількість насичених жирних кислот у гепатопанкреасі коропів досліджуваних груп риб знаходилася в межах 3,66–3,69 г/кг натуральної маси, і практично удвічі перевищувала таку у скелетних м'язах. У печінці дослідних і контрольних груп риб за вмістом насичених ЖК загальних ліпідів вірогідні різниці відсутні (див. табл. 3, табл. 4).

Таблиця 3. Жирнокислотний склад загальних ліпідів гепатопанкреасу дволіток помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи, г/кг натуральної маси ($M \pm m$; $n = 6$)

Table 3. The fatty acid composition of total lipids of hepatopancreatic tissues of biennial carps from crossing of the antonino-zozulentinsky and lyubinsky intrinsic types of Ukrainian framed breed ($M \pm m$; $n = 6$)

Код ЖК* / Cod of FA*	ЛРК / LFC	АЗРК / AZFC	♂ЛРК×♀АЗРК / ♂LFC×♀AZFC	♂АЗРК×♀ЛРК / ♂AZFC×♀LFC
C _{12:0}	0,03±0,003	0,03±0,003	0,03±0,003	0,03±0,003
C _{14:0}	0,12±0,003	0,12±0,006	0,13±0,003	0,13±0,003
C _{15:0}	0,03±0,003	0,03±0,003	0,03±0,003	0,03±0,003
C _{16:0}	2,30±0,024	2,30±0,018	2,31±0,024	2,31±0,024
C _{16:1}	0,24±0,017	0,24±0,021	0,24±0,013	0,24±0,013
C _{18:0}	0,79±0,015	0,80±0,015	0,78±0,015	0,78±0,015
C _{18:1}	12,56±0,066	12,58±0,072	12,55±0,067	12,55±0,067
C _{18:2}	2,78±0,069	2,80±0,069	2,77±0,070	2,77±0,070
C _{18:3}	2,37±0,044	2,39±0,046	2,35±0,044	2,35±0,044
C _{20:0}	0,39±0,030	0,41±0,024	0,38±0,030	0,38±0,030
C _{20:1}	1,16±0,062	1,15±0,057	1,15±0,051	1,15±0,051
C _{20:2}	1,08±0,058	1,08±0,071	1,06±0,078	1,06±0,078
C _{20:3}	0,83±0,027	0,81±0,026	0,86±0,026	0,86±0,026
C _{20:4}	2,79±0,061	2,76±0,055	2,82±0,064	2,82±0,064
C _{20:5}	2,75±0,046	2,73±0,049	2,78±0,044	2,78±0,044
C _{22:2}	0,37±0,022	0,39±0,020	0,39±0,023	0,39±0,023
C _{22:3}	0,62±0,036	0,60±0,034	0,63±0,035	0,63±0,035
C _{22:4}	2,03±0,041	2,01±0,035	2,06±0,041	2,06±0,041
C _{22:5}	4,19±0,061	4,15±0,058	4,22±0,058	4,22±0,058
C _{22:6}	6,22±0,062	6,17±0,053	6,26±0,059	6,26±0,059

Примітка. * — ЖК — жирні кислоти; ЛРК — любінський рамчастий короп; АЗРК — антонінсько-зозуленецький рамчастий короп; ♂ЛРК×♀АЗРК та ♂АЗРК×♀ЛРК — помісі ЛРК та АЗРК.

Notes. * — FA — fatty acids; LFC — lyubinsky framed carp; AZFC — antonino-zozulentinsky framed carp; ♂LFC×♀AZFC and ♂AZFC×♀LFC — hybrids of LFC and AZFC.

Вміст пальмітоолеїнової кислоти (родини $n = 7$) у гепатопанкреасі був найнижчим відносно інших класів ЖК у всіх досліджуваних груп риб.

Загальна кількість ЖК родини $n = 9$ у гепатопанкреасі знаходилася в межах 14,76–14,87 г/кг і характеризувалася приблизно однаковою концентрацією в усіх групах риб, перевищуючи таку у м'язах удвічі (див. табл. 4). Загальна кількість жирних кислот родини $n = 6$ знаходилася в межах 6,37–6,47 г/кг і не становила вірогідних міжгрупових різниць, проте спостерігалася зростання їх концентрації порівняно з такою у м'язах у три рази (див. табл. 4).

Загальна кількість жирних кислот родини $n = 3$ у тканині гепатопанкреасу варіювала у діапазоні 18,05–18,30 г/кг і була дещо вищою у помісних коропів, порівняно з вихідними групами антонінсько-зозуленецьких і любінських коропів. Найвищим її вміст спостерігався у помісній групі ♂АЗРК×♀ЛРК.

Таблиця.4. Концентрація жирних кислот загальних ліпідів у гепатопанкреасі дволіток коропа, г/кг натуральної маси ($M \pm m$; $n = 6$)

Table 4. The concentration of fatty acid composition of total lipids of hepatopancreatic tissues of biennial carps from crossing of the antonino-zozulentinsky and lyubinsky intrinsic types of Ukrainian framed breed ($M \pm m$; $n = 6$)

Показник / Indices	ЛРК / LFC	АЗРК / AZFC	♂ЛРК×♀АЗРК / ♂LFC×♀AZFC	♂АЗРК×♀ЛРК / ♂AZFC×♀LFC
Загальна кількість насичених жирних кислот / The total amount of saturated fatty acids (FA)	3,66	3,69	3,66	3,67
Загальна кількість ЖК з парною кількістю вуглецевих атомів в ланцюгу / The total number of FA with an even number of carbon atoms in the chain	3,63	3,64	3,65	3,65
Загальна кількість ЖК з непарною кількістю вуглецевих атомів в ланцюгу / The total number of FA with an odd number of carbon atoms in the chain	0,03	0,03	0,03	0,03
Загальна кількість ненасичених ЖК / The total number of unsaturated FA	39,59	39,57	39,71	39,70
Загальна кількість мононенасичених ЖК / The total number of monounsaturated FA	13,96	13,97	13,99	13,98
Загальна кількість поліненасичених ЖК / The total number of polyunsaturated FA	19,44	19,43	19,58	19,55
Загальна кількість ЖК родини $n = 7$ / The total number of FA family $n = 7$	0,24	0,24	0,25	0,24
Загальна кількість ЖК родини $n = 9$ / The total number of FA family $n = 9$	14,78	14,76	14,87	14,86
Загальна кількість ЖК родини $n = 6$ / The total number of FA family $n = 6$	6,40	6,37	6,45	6,47
Загальна кількість ЖК родини $n = 3$ / The total number of FA family $n = 3$	18,18	18,05	18,28	18,30
ІНЛ / LSI	0,092	0,093	0,092	0,092
Загальна кількість ЖК (насичені + ненасичені) / Total LCD (saturated + unsaturated)	43,25	43,16	44,42	43,44

Сумарна кількість насичених і ненасичених вищих ЖК в гепатопанкреасі помісних коропів та вихідних коропів перебувала в межах 43,16–44,42 г/кг і перевищувала таку у тканині скелетних м'язів утричі.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Аналіз жирнокислотного складу гепатопанкреасу дослідних та контрольних груп відобразив тканинну специфічність накопичення жирних кислот у коропів. Так, порівняно із тканиною скелетних м'язів, спостерігалось вірогідне зростання вмісту ЖК у гепатопанкреасі, що, насамперед, зумовлено його метаболічною активністю. Однак, міжгрупові відмінності за вмістом жирних кислот у тканинах скелетних м'язів та гепатопанкреасу досліджуваних груп коропа не були вірогідними, що пояснюється максимально наближеними умовами вирощування та однаковим забезпеченням природною та штучною кормовою базою.

Індекс насиченості ліпідів у тканині скелетних м'язів досліджуваних груп коропа знаходився в межах 0,136–0,140, що не становило вірогідних міжгрупових різниць.

ЛІТЕРАТУРА

1. Організація селекційно-плеємної роботи в рибористві / Гринжевський М. В. та ін. Київ : Рибка моя, 2006. 352 с.
2. Сидоров В. С. Экологическая биохимия рыб. Липиды. Ленинград : Наука, 1983. 240 с.
3. Cowey C. B., Sargent Y. R. Lipid nutrition in fish // *Biochem. Physiol.* 1977. Vol. 57. P. 269—273.
4. Metabolism of fatty acids in fish. Biosynthesis of fatty acids in relation to diet in the carp, *Cyprinus carpio* Linnaeus 1758 / Farkas T. et al. // *Aquaculture*. 1978. Vol. 14, № 1. P. 57—65.
5. Янович В. Г., Лагодюк П. З. Обмен липидов у животных в онтогенезе. Москва : Агропромиздат, 1991. 316 с.
6. Блага О. М., Рівіс Й. Ф. Сезонна динаміка концентрації неестерифікованих жирних кислот (НЕЖК) в зообентосі ставів західного регіону України // *Біологія тварин*. 2006. Т. 8, № 1–2. С. 168—171.
7. Farkas T. The dynamics of fatty acids i the aquatic food chain, phytoplankton, zooplankton, fish // *Ann. Biol. Tihany*. 1970. Vol. 37, № 1. P. 165—176.
8. Когтева Г. С., Безуглов В. В. Ненасыщенные жирные кислоты как эндогенные биорегуляторы // *Биохимия*. 1998. Т. 63, вып. 1. С. 6—15.
9. Попова Е. М., Кошій І. В. Ліпіди як компонент адаптації риб до екологічного стресу // *Рибогосподарська наука України*. 2007. № 1. С. 49—56.
10. Winston G. W. Oxidant and antioxidant in aquatic animals // *Comp. Biochem. Physiol. C*. 1991. Vol. 100, №1–2. P. 173—176.
11. Ривис И. Ф., Скороход И. В. Количественный метод определения некоторых высокомолекулярных жирных кислот в растениях, тканях и биологических жидкостях организма сельскохозяйственных животных // *Докл. ВАСХНИЛ*. 1981. № 8. С. 32—35.
12. Газохроматографічне визначення високомолекулярних неестерифікованих жирних кислот в біологічному матеріалі / Рівіс Й. Ф. та ін. // *Укр. біохім. журн*. 1997. Т. 69, № 1. С. 110—115.
13. Одночасне газохроматографічне визначення окремих естерифікованих і неестерифікованих високомолекулярних жирних кислот в біологічному матеріалі / Рівіс Й. Ф. та ін. // *Укр. біохім. журн*. 1997. Т. 69, № 2. С. 107—112.
14. Визначення органічних кислот у біологічному матеріалі методом газохроматографічного аналізу : методичні рекомендації / Немировський В. І. та ін. Львів, 1984. 40 с.

REFERENCES

1. Hrynzhovskyi, M. V., et al. (2006). *Orhanizatsiia selektsiino-pleminnoi roboty v rybnytstvi*. Kyiv: Rybka moia.
2. Sidorov, V. S. (1983). *Jekologicheskaja biohimija ryb*. Lipidy. Leningrad: Nauka.
3. Cowey, C. B., & Sargent, Y. R. (1977). Lipid nutrition in fish. *Biochem. Physiol.*, 57, 269-273.
4. Farkas, T., et al. (1978). Metabolism of fatty acids in fish. Biosynthesis of fatty acids in relation to diet in the carp, *Cyprinus carpio* Linnaeus 1758. *Aquaculture*, 14, 1, 57-65.
5. Janovich, V. G., & Lagodjuk, P. Z. (1991). *Obmen lipidov u zhyvotnyh v ontogeneze*. Moskva: Agropromizdat.
6. Blaha, O. M., & Ravis, Y. F. (2006). Sezonna dynamika kontsentratsii neeteryfikovanykh zhyrnykh kyslot (NEZhK) v zoobentosi staviv zakhidnoho rehionu Ukrainy. *Biologhiia tvaryn*, 8, 1-2, 168-171.
7. Farkas, T. (1970). The dynamics of fatty acids i the aquatic food chain, phytoplankton, zooplankton, fish. *Ann. Biol. Tihany*, 37, 1, 165-176.
8. Kogteva, G. S., & Bezuglov, V. V. (1998). Nenasyszhennye zhirne kisloty kak jendogennye bioregulatory. *Biohimija*, 63, 1, 6-15.
9. Popova, E. M., & Koshchii, I. V. (2007). Lipidy yak komponent adaptatsii ryb do ekolohichnoho stresu. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 49-56.
10. Winston, G. W. (1991). Oxidant and antioxidant in aquatic animals. *Comp. Biochem. Physiol. C.*, 100, 1-2, 173-176.
11. Ravis, I. F., & Skorohid, I. V. (1981). Kolichestvennyj metod opredelenija nekotoryh vysokomolekuljarnykh zhyrnykh kyslot v rastenijah, tkanjah i biologicheskikh zhidkostjah organizma sel's'kohozjajstvennykh zhyvotnykh. *Dokl. VASHNIL*, 8, 32-35.
12. Ravis, Y. F., Skorokhid, I. V., Danylyk, B. B., & Protsyk, Ya. M. (1997). Hazokhromatohrafichne vyznachennia vysokomolekuliarnykh neeteryfikovanykh zhyrnykh kyslot v biologichnomu materiali. *Ukr. biokhim. zhurn.*, 69, 1, 110-115.
13. Ravis, Y. F., Skorokhid, I. V., Danylyk, B. B., & Protsyk, Ya. M. (1997). Odnoczasne hazokhromatohrafichne vyznachennia okremykh eteryfikovanykh i neeteryfikovanykh vysokomolekuliarnykh zhyrnykh kyslot v biologichnomu materiali. *Ukr. biokhim. zhurn.*, 69, 2, 107-112.
14. Nemyrovskyi, V. I., Tereshchuk, O. M., & Hnativ, V. I. (1984). *Vyznachennia orhanichnykh kyslot u biologichnomu materialu metodom hazokhromatohrafichnoho analizu: metodychni rekomendatsii*. Lviv.

MEMBRANE PERMEABILITY OF PRUSSIAN CARP (CARASSIUS AURATUS LINNAEUS, 1758) SPERMATOZOA FOR WATER AND CRYOPROTECTANTS MOLECULES

A. Puhovkin, antonpuhovkin@gmail.com, Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the NAS of Ukraine, Kharkiv

K. Mikson, kmikson@ukr.net, Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the NAS of Ukraine, Kharkiv

Purpose. Determination of permeability parameters of Prussian carp (*Carassius auratus* Linnaeus, 1758) spermatozoa membranes for water and cryoprotectants molecules as an important stage in the development of a protocol for their cryopreservation by vitrification.

Methodology. Osmotic response of Prussian carp spermatozoa was studied using photoelectric colorimeter KF-77 (Poland) equipped with a magnetic mixer and thermostated cuvette compartment according to our technique. To determine the permeability of plasma membranes of fish spermatozoa to cryoprotectant molecules, they were incubated in the solutions of ethyleneglycol (EG), 1,2-propanediol (1,2-PD), methanol (Met) of different concentrations, or a mixture of these cryoprotectants prepared with isotonic 0.12 M NaCl aqueous solution. Permeability coefficients of spermatozoa plasma membranes for either water (L_p) or cryoprotectant (K_p) molecules were determined by fitting the experimental dependences of relative cell volumes on time and solving theoretical model equations. The activation energy (E_a) of substance transfer through cell membranes was calculated from $\ln L_p(1/T)$ or $\ln K_p(1/T)$, the slope of which was equal E_a/R according to the Arrhenius equation, where R was the universal gas constant.

Findings. It was found that the permeability of Prussian carp spermatozoa membranes to water molecules at 20°C was $3,53 \pm 0,18 \times 10^{-14} \text{ m}^3/\text{N}\cdot\text{s}$, and a decrease in membrane permeability of Prussian carp spermatozoa within the range of 30–18°C was characterized by the activation energy of $48 \pm 4 \text{ kJ/mol}$. A decrease in membrane permeability of Prussian carp spermatozoa for cryoprotectants within the range of 30–18°C was characterized by the activation energy of $82 \pm 5 \text{ kJ/mol}$ for ethyleneglycole, 99 ± 7 for 1,2-propanediol and 84 ± 6 for the mixture. This fact indicates that the molecules of the studied substances penetrate into the spermatozoon via passive diffusion through the lipid bilayer. The data obtained can be used to determine the optimal regime of spermatozoa cryopreservation for cyprinids.

Originality. For the first time, the coefficients of the membranes permeability of Prussian carp spermatozoa to water molecules and cryoprotectants (ethyleneglycol, methanol, 1,2-propanediol) and the activation energy of the these molecules transfer through the membranes were determined.

Practical value. The results of the study are used in the development of media and regimes of cryopreservation of freshwater fish spermatozoa.

Key words: spermatozoa, Prussian carp (*Carassius auratus* Linnaeus, 1758), membrane permeability, cryoprotectants, activation energy.

ПРОНИКНІСТЬ МЕМБРАН СПЕРМАТОЗОЇДІВ КАРАСЯ (*CARASSIUS AURATUS* LINNAEUS, 1758) ДО МОЛЕКУЛ ВОДИ ТА КРІОПРОТЕКТОРІВ

А. Ю. Пуговкін, antonpuhovkin@gmail.com, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

К. Б. Міксон, kmikson@ukr.net, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

Мета. Визначення параметрів проникності клітинних мембран сперматозоїдів карася *Carassius auratus* (L., 1758) до молекул води та кріопротекторів як важливий етап розробки протоколу їх кріоконсервування методом вітрифікації.

Методика. Осмотичні реакції сперматозоїдів досліджували за допомогою фотоелектроколориметра KF-77 (Польща), обладнаного магнітним перемішувачем і термостатованим кюветним відділенням за розробленою нами методикою. Для визначення коефіцієнта проникності плазматичних мембран сперматозоїдів до молекул кріопротекторів сперматозоїди інкубували в розчинах етиленгліколю, 1,2-пропандіолу, метанолу різних концентрацій або суміші вказаних кріопротекторів, виготовлених на ізотонічному до спермальної плазми 0,12 М водному розчині NaCl. Коефіцієнт проникності плазматичних мембран сперматозоїдів для молекул води (L_p) та кріопротекторів (K_p) визначали, апроксимуючи експериментальні залежності відносних об'ємів клітин від часу з рішеннями рівнянь теоретичної моделі. Енергію активації (E_a) процесу перенесення речовин через мембрани клітин розраховували із залежностей $\ln L_p(1/T)$ або $\ln K_p(1/T)$, нахил яких згідно з рівнянням Ареніуса дорівнює E_a/R , де R — універсальна газова постійна.

Результати. Встановлено, що за температури 20°C коефіцієнт проникності мембран сперматозоїдів карася до молекул води становить $3,53 \pm 0,18 \times 10^{-14}$ м³/Н·с, а його зниження в діапазоні температур 30–18°C характеризується енергією активації 48 ± 4 кДж/моль. Зниження коефіцієнтів проникності мембран до молекул кріопротекторів в діапазоні температур 30–18°C характеризується енергією активації 82 ± 5 кДж/моль для етиленгліколю, 99 ± 7 кДж/моль для 1,2-пропандіолу та 84 ± 6 кДж/моль для досліджуваної суміші кріопротекторів. Цей факт свідчить про те, що молекули досліджених речовин проникають у сперматозоїд шляхом пасивної дифузії через ліпідний бішар. Отримані дані можуть бути використані для визначення оптимального режиму кріоконсервування сперматозоїдів королевих риб.

Наукова новизна. Вперше визначені коефіцієнти проникності мембран сперматозоїдів карася до молекул води та кріопротекторів етиленгліколю, метанолу, 1,2-пропандіолу та енергії активації переносу молекул цих речовин через мембрани.

Практична значимість. Результати роботи використовуються при розробці середовищ і режимів кріоконсервування сперматозоїдів прісноводних риб.

Ключові слова: сперматозоїди, карась *Carassius auratus* (L., 1758) проникність мембран, кріопротектори, енергія активації.

ПРОНИЦАЕМОСТЬ МЕМБРАН СПЕРМАТОЗОИДОВ КАРАСЯ (*CARASSIUS AURATUS* LINNAEUS, 1758) ДЛЯ МОЛЕКУЛ ВОДЫ И КРИОПРОТЕКТОРОВ

А. Ю. Пуговкин, antonpuhovkin@gmail.com, Институт проблем кріобіології и кріомедицины НАН Украины, г. Харьков

К. Б. Миксон, kmikson@ukr.net, Институт проблем кріобіології и кріомедицины НАН Украины, г. Харьков

Цель. Определение параметров проницаемости клеточных мембран сперматозоидов карася *Carassius auratus* (L., 1758) для молекул воды и криопротекторов как важный этап разработки протокола их криоконсервирования методом витрификации.

Методика. Осмотические реакции сперматозоидов исследовали с помощью фотоэлектроколориметра KF-77 (Польша), оборудованного магнитной мешалкой и термостатированным кюветным отделением по разработанной нами методике. Для определения коэффициента проницаемости плазматических мембран сперматозоидов для молекул криопротекторов сперматозоиды инкубировали в растворах этиленгликоля, 1,2-пропандиола, метанола различных концентраций или смеси указанных криопротекторов, изготовленных на изотоническом к спермальной плазме 0,12 М водном растворе NaCl. Коэффициент проницаемости плазматических мембран сперматозоидов для молекул воды (L_p) и криопротекторов (K_p) определяли, аппроксимируя экспериментальные зависимости относительных объемов клеток от времени с решениями уравнений теоретической модели. Энергию активации (E_a) процесса переноса веществ через мембраны клеток рассчитывали с зависимостей $\ln L_p(1/T)$ или $\ln K_p(1/T)$, наклон которых, согласно уравнению Аррениуса, равен E_a/R , где R — универсальная газовая постоянная.

Результаты. Установлено, что при температуре 20°C коэффициент проницаемости мембран сперматозоидов карася для молекул воды составляет $3,53 \pm 0,18 \times 10^{-14}$ м³/Н·с, а его снижение в диапазоне температур 30–18°C характеризуется энергией активации 48 ± 4 кДж/моль. Снижение коэффициентов проницаемости мембран для молекул криопротекторов в диапазоне температур 30–18°C характеризуется энергией активации 82 ± 5 кДж/моль для этиленгликоля, 99 ± 7 кДж/моль для 1,2-пропандиола и 84 ± 6 кДж/моль для исследуемой смеси криопротекторов. Этот факт свидетельствует о том, что молекулы исследованных веществ проникают в сперматозоид путем пассивной диффузии через липидный бислой. Полученные данные могут быть использованы для определения оптимального режима криоконсервирования сперматозоидов карповых рыб.

Научная новизна. Впервые определены коэффициенты проницаемости мембран сперматозоидов карася для молекул воды и криопротекторов этиленгликоля, метанола, 1,2-пропандиола и энергии активации переноса молекул этих веществ через мембраны.

Практическая значимость. Результаты работы используются при разработке сред и режимов криоконсервирования сперматозоидов пресноводных рыб.

Ключевые слова: сперматозоиды, карась *Carassius auratus* (L., 1758), проницаемость мембран, криопротекторы, энергия активации.

PROBLEM STATEMENT AND ANALYSIS OF LAST ACHIEVEMENTS AND PUBLICATIONS

Recently, more and more attention has been paid to the problem of preserving the biodiversity of the animal world. One of the ways to solve this problem is to use the genomes cryopreservation technology for rare and endangered species. The protocols for cryopreservation of sperm are characterized by a high species-specificity: in fact, a unique method of their low-temperature storage must be created for each animal species [1,2].

Methods of slow cooling cryopreservation have been developed for sperm of many fish species; however, they are often insufficiently effective, since they do not provide high cell viability after thawing. In addition, due to the high variability of fish sperm quality, the abovementioned cryopreservation method may be ineffective for the sperm of fish from a different population [3]. An alternative to slow cooling cryopreservation is the vitrification method, one of the advantages of which is the cryopreservation procedure simplification [4-7]. Although, the method of cryopreservation method of

sperm from Prussian carp (*Carassius auratus* Linnaeus, 1758) continues to be improved [8-11], there are no data about vitrification method for sperm of this fish species.

Also, it should be noted that the methods of sperm thawing are improved mainly empirically, that is, by selecting the composition of cryoprotective media and thawing modes. Accordingly, a theoretically grounded approach to cryopreservation of spermatozoa is almost not developed today. Rendering to this approach, it is necessary to determine the reasons for intra- and interspecies differences in cryoresistance of spermatozoa and properties associated with its resistance to cryopreservation factors. This situation has arisen due to the incompleteness of information on the characteristics of fish spermatozoa resistance to the factors of cryopreservation.

Note, that keeping spermatozoa in hypertonic solutions of cryoprotectants, even without freezing, can cause significant fluctuations in cell volume [12]. This, in turn, can damage spermatozoa or effect on their sensitivity to cryopreservation factors. Also, a significant problem in the development of vitrification methods is the need to expose cells in high concentration cryoprotectant solutions.

Thus, the study of the osmotic sensitivity of fish spermatozoa and its changes under the influence of cryopreservation factors is relevant. Actually, the permeability of plasma membranes to water molecules and cryoprotectants is an important parameter for determining the cooling rates in the process of fish genetic material cryopreservation — sperm, first of all [13].

HIGHLIGHT OF THE EARLIER UNRESOLVED PARTS OF THE GENERAL PROBLEM. AIM OF THE STUDY

To select the modes and media for cryopreservation, it is necessary to take into account the parameters of spermatozoa, which characterize osmotic resistance - the property of cells to maintain viability as a result of changes in the osmotic pressure of the external environment.

To date, only a few studies results of fish spermatozoa membranes permeability to water and cryoprotectants are known [14-19]. This can be explained both by the species specificity of fish spermatozoa and by the lack of convenient methods that would make it possible to determine the osmotic characteristics of spermatozoa immediately before cryopreservation and to conduct experiments in the field [20].

The aim of this work is to determine the permeability parameters of the Prussian carp (*Carassius auratus* Linnaeus, 1758) spermatozoa cell membranes to water and cryoprotectants molecules as an important stage in the development of a protocol for their cryopreservation by vitrification method.

MATERIALS AND METHODS

In our research, the spermatozoa of Prussian carp (*Carassius auratus* Linnaeus, 1758) was examined. Experiments on animals were carried out in accordance with the "General Principles of Experiments on Animals" (Kyiv, 2001) and the "European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes" (Strasbourg, 1986).

The experiment was carried out on 12 males aged 20 months, the average weight of which was 170-200 g. Before obtaining sperm, abovementioned males were kept at a

temperature of 20-22°C in fish breeding pools, for at least 7 days. Sperm was obtained using the pituitary injections method accepted in fish farming practice at the rate of 1 mg/kg body weight once. The sperm was collected in dry and clean containers by expression.

The osmolality of the activating solutions and sperm plasma was determined using an automatic cryoscopic osmometer OSMOMAT 030 (Gonotec GmbH, Germany).

Osmotic reactions of spermatozoa were studied using a KF-77 colour density (Poland) equipped with a magnetic stirring device and a thermostat cuvette compartment in accordance with our methodology [21].

To determine the permeability coefficient of the spermatozoa plasma membranes to cryoprotectant molecules, they were incubated in solutions of ethylene glycol, 1,2-propanediol, methanol of various concentrations, or a mixture of these cryoprotectants made on 0.12 M aqueous NaCl solution (isotonic to the plasma of sperm).

The coefficient of spermatozoa plasma membranes permeability for water molecules (L_p) and cryoprotectants (K_p) was determined by approximating the experimental relationships and relative cell volumes with time and solutions of the equations of the theoretical model [22]. The activation energy (E_a) of the substances transfer through the cell membranes was calculated from the $\ln L_p$ ($1/T$) dependences, the slope of which, according to the Arrhenius equation, is equal to E_a/R , where R is the universal gas constant.

The results were statistically processed using next software: Origin 8.5 (OriginLab Corporation, USA) and Microsoft Office Excel (USA). Data are presented as mean $\pm$ standard deviation. Differences were considered statistically significant at $p < 0.05$.

STUDY RESULTS AND THEIR DISCUSSION

A characteristic feature of fish spermatozoa is that a change in the osmolality of the extracellular environment is quite natural for them. So, during spawning, sperm are released into the water, which leads to the activation of their movement and, as a result, the ability to fertilize eggs. Therefore, unlike many other cells of the organism, for which hypoosmotic tests are mainly purely artificial, and osmotic shock is an extreme factor, incubation of fish spermatozoa under hypoosmotic conditions allows the study of a specific osmotic reaction, which can be of important functional importance (for example, attracting it to the mechanisms of activating the movement of spermatozoa, limiting the time of motility, etc.).

From the point of cryobiology view, the osmotic reaction of a cell can be associated with its cryoresistance, since the transmembrane movement of water is one of the main processes that affect the resistance of cells to cryopreservation factors. However, the data available in the literature are not yet sufficient to analyze the correlation of fish spermatozoa osmotic response with their cryoresistance. At the same time, there is a tendency to the fact that a greater permeability of membranes to water is characteristic of cells more resistant to cryopreservation factors.

Cryopreservation of fish spermatozoa, as a rule, involves the use of a multicomponent composition of a cryoprotective medium. Considering the species-specificity of spermatozoa, in order to achieve their high viability after thawing, for cryopreservation each fish species must have its own composition of the cryoprotective

medium. In cases where different cryoprotective media are used for different fish species, comparison of the spermatozoa cryostability can be subjective and speculative.

On the other hand, the optimization of the technology for cryopreservation of sperm is aimed at increasing the survival of cells after thawing, including by modifying the composition of the cryoprotective medium. An alternative to the empirical approach is a theoretically substantiated approach to spermatozoa cryopreservation, which consists in determining the causes of intra- and interspecies differences in cryoresistance of spermatozoa and properties associated with their resistance to cryopreservation factors. At the same time, the modification of cryoprotective environment composition is based on the output morphological and functional characteristics of spermatozoa [23].

Among such characteristics in our research we singled out the osmotic reaction of cells.

An important indicator is the rate of cryoprotectant penetration at the stage of equilibration with it to freezing. The use of the modified physical and mathematical model of Kedem - Kachalsky makes it possible to calculate the coefficient of permeability of spermatozoa membranes. If the kinetics of the relative cell volume is known, then the morphometric characteristics of cells must be taken into account to calculate the permeability parameter. Assuming the shape of the spermatozoon head is spherical and assuming an average radius of 1.6 μm , the surface-volume ratio γ of the cell is 1.88 μm^{-1} [24]. The permeability of Prussian carp spermatozoa membranes to water molecules calculated according to this model for 20 °C is $3.53 \pm 0.18 \times 10^{-14} \text{ m}^3 / \text{N} \times \text{s}$.

As you know, the membrane permeability coefficient depends on the temperature of the medium. By varying the temperature of the incubation medium of spermatozoa at a fixed osmolarity, we obtained the temperature dependence of the membranes permeability of crucian carp spermatozoa for water molecules.

An array of data on the coefficients of permeability of sperm membranes for each of the studied cryoprotectants in the temperature range of 30-18 °C was depicted as points in the Arrhenius coordinates [$\ln K = F (1 / T)$].

A decrease in membrane permeability coefficients in the temperature range of 30-18 °C is characterized by an activation energy of $48 \pm 4 \text{ kJ / mol}$ (Fig. 1).

The activation energy for the transfer of water molecules across the cell membrane is an energy barrier that water molecules overcome during the reaction. The activation energy value of $48 \pm 4 \text{ kJ / mol}$ indicates the mechanism of water molecules transfer by passive diffusion through the lipid bilayer.

At the second stage of the work, we determined the penetration rates of some cryoprotectants through the membranes of Prussian carp spermatozoa. Since cryoprotectants in a relatively high concentration must be used for cryopreservation by vitrification, one of the options for reducing their toxic effect is to use a mixture. We investigated the processes of equilibration of Prussian carp spermatozoa with methanol (final concentration 5%), ethylene glycol (final concentration 10%), 1,2-propanediol (final concentration 20%), as well as their mixture in the above concentrations.

Fig. 1. A typical Arrhenius curve for calculating the activation energy of the water molecules transfer through the crucian carp spermatozoa membranes.

In fig. 2 shows the unit-normalized kinetic dependences of the penetration of substances into spermatozoa.

Fig. 2. Kinetic curves of crucian carp spermatozoa equilibrium with cryoprotectant solutions.

Methanol has the highest rate of penetration into cells. Molecules of 1,2-propanediol and ethylene glycol are characterized by significantly lower rates. The mixture of the aforementioned cryoprotectants is expected to have an average penetration rate. At the same time, a decrease in the coefficients of membrane permeability to cryoprotectant molecules in the temperature range of 30-18 °C is characterized by the activation energy 82 ± 5 kJ / mol for ethylene glycol, 99 ± 7 kJ / mol for 1,2-propanediol, and 84 ± 6 kJ / mol for the test mixture of cryoprotectants. Note, that in connection with a high rate of methanol penetration through cell membranes, measurements of the activation energy of this process have a significant error, therefore, these results are not presented.

CONCLUSION AND PERSPECTIVES OF FURTHER DEVELOPMENT

Thus, in this work, for the first time, the coefficients of permeability of Prussian carp spermatozoa membranes to water molecules and cryoprotectants of ethylene glycol, methanol, 1,2-propanediol and the activation energy of the molecules transfer of these substances through the membranes were determined. The results obtained regarding the biophysical characteristics of the Prussian carp (*Carassius auratus*, Linnaeus 1758) spermatozoa membranes can be used to substantiate the composition of cryoprotective media for cryopreservation by vitrification method.

LITERATURE

1. Cryopreservation of fish sperm: applications and perspectives / E. Cabrita et al. // J. Appl. Ichthyol. 2010. Vol. 26. P. 623—635.
2. Kopeika E., Kopeika J., Zhang T. Cryopreservation of fish sperm // Cryopreservation and freeze-drying protocols / ed. Day J. G., Stacey G. N. Totowa, New Jersey : Humana Press, 2007. P. 203—217.
3. Bobe J., Labbé C. Egg and sperm quality in fish // General and Comparative Endocrinology. 2010. Vol. 165. P. 535—548.
4. Progress and challenges of fish sperm vitrification: A mini review / Xin M. et al. // Theriogenology. 2017. Vol. 98. P. 16—22.
5. Development of sperm vitrification protocols for two endangered salmonid species: the Adriatic grayling, *Thymallus thymallus*, and the marble trout, *Salmo marmoratus* / Kása E. et al. // Fish Physiology and Biochemistry. 2018. Vol. 44. P. 1499—1507.
6. Development of sperm vitrification protocols for freshwater fish (Eurasian perch, *Perca fluviatilis*) and marine fish (European eel, *Anguilla anguilla*) / Kása E. et al. // General and Comparative Endocrinology. 2017. Vol. 245. P. 102—107.
7. Vitrification as an Alternative Approach for Sperm Cryopreservation in Marine Fishes / Cuevas-Urbe R. et al. // North American journal of aquaculture. 2017. Vol. 79(2). P. 187—196.
8. Kutluyer F., Ögretmen F., İnanan B. E. Cryopreservation of Goldfish (*Carassius Auratus*) Spermatozoa: Effects of Extender Supplemented with Taurine on Sperm Motility and DNA Damage // CryoLetters. 2016. Vol. 37 (1). P. 41—46.
9. Kutluyer F., Ögretmen F., İnanan B. E. Effects of Semen Extender Supplemented with Lmethionine and Packaging Methods (Straws and Pellets) on Post-Thaw Goldfish (*Carassius Auratus*) Sperm Quality and DNA Damage // CryoLetters. 2015. Vol. 36 (5). P. 336—343.
10. Taghizadeh V., Imanpoor M.R., Sadeghi A. Effect of Extenders and Different Concentrations of Methanol on Motility Parameters of Goldfish (*Carassius auratus gibelio*) Spermatozoa after Short-Term Storage // World Journal of Fish and Marine Sciences. 2013. Vol. 5(5). P. 492—496.
11. A brief exposure to low pH prior to refrigerated storage reduces the motility and viability of goldsh sperm (*Carassius auratus*, Linnaeus, 1758) / Chantzarpoulos A. et al. // Journal of Applied Ichthyology. 2015. Vol. 31(S1). P. 89—93.
12. The hypoosmotic swelling test performed with coulter counter: a method to assay functional integrity of sperm membrane in rainbow trout / E. Cabrita et al. // Animal Reproduction Science. 1999. Vol. 55. P. 279—287.
13. Petrunkina A. M. Fundamental aspects of gamete cryobiology // Journal of Reproductive Medicine and Endocrinology. 2007. Vol. 4. P. 78—91.

14. Subzero water permeability parameters and optimal freezing rates for sperm cells of the southern platyfish, *Xiphophorus maculatus* / Pinisetty D. et al. // Cryobiology. 2005. Vol. 50. P. 250—263.
15. Biophysics of zebrafish (*Danio rerio*) sperm / Hagedorn M. et al. // Cryobiology. 2009. Vol. 58. P. 12—19.
16. Исследование проницаемости мембран сперматозоидов карпа для молекул воды / Пуговкин А. Ю. и др. // Биофизика. 2014. Т. 59, № 3. С. 481—487.
17. Проникність мембран сперматозоїдів стерляді (*Acipenser ruthenus*, L., 1758) для молекул води / Пуговкін А. Ю. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2016. № 1 (35). С. 70—77.
18. Дослідження осмотичної чутливості сперматозоїдів щуки (*Esox lucius*, L., 1758) для оптимізації їх кріоконсервування / Пуговкін А. Ю. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2016. № 4. С. 103—112.
19. Puhovkin A. Y., Kopeika E. F. Investigation of water and cryoprotectants molecules transfer through common carp (*Cyprinus carpio*, L.) spermatozoa membranes (CRYO conference of the Society for Cryobiology, Ostrava, Czech Republic, 2015) // Cryobiology. 2015. Vol. 71, № 3. P. 567.
20. Fauvel C., Suquet M., Cosson J. Evaluation of fish sperm quality // Appl. Ichthyol. 2010. Vol. 26. P. 636—643.
21. Спосіб визначення проникності мембран сперматозоїдів коропа до молекул води : пат. 104809 Україна. № u 201215035; заявл. 27.12.2012; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.
22. Пуговкін А. Ю., Копейка Є. Ф. Проникність плазматичних мембран сперматозоїдів коропа (*Cyprinus carpio*, L., 1758) для молекул води та кріопротекторів на різних етапах кріоконсервування // Проблеми криобіології и криомедицини. 2016. Т. 26, № 4. С. 340—348.
23. Оптимізація умов кріоконсервування сперми стерляді (*Acipenser ruthenus*, L. 1758) для запліднення ікри в умовах рибних господарств / Кононенко І. С. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2017. № 3(41). С. 83—97.
24. Fürböck S., Lahnsteiner F., Patzner R. A. A fine structural review on the spermatozoa of *Cyprinidae* with attention to their phylogenetic implications // Histol Histopathol. 2009. Vol. 24(10). P. 1233—1244.

REFERENCES

1. Cabrita, E., Sarasquete, C., Martínez-Páramo, S., Robles, V., Beirão, J., Pérez-Cerezales, S., & Herráez, M. P. (2010). Cryopreservation of fish sperm: applications and perspectives. *J. Appl. Ichthyol.*, 26, 623-635.
2. Kopeika, E., Kopeika, J., & Zhang, T. (2007). Cryopreservation of fish sperm. *Cryopreservation and freeze-drying protocols*. Totowa, New Jersey: Humana Press, 203-217.
3. Bobe, J., & Labbé, C. (2010). Egg and sperm quality in fish. *General and Comparative Endocrinology*, 165, 535-548.
4. Xin, M., Siddique, M. A. M., Dzyuba, B., Cuevas-Urbe, R., Shaliutina-Kolešová, A., & Linhart, O. (2017). Progress and challenges of fish sperm vitrification: A mini review. *Theriogenology*, 98, 16-22.
5. Kása, E., Lujic, J., Marinović, Z., Kollár, T., Bernáth, G., Bokor, Z., Urbányi, B., Lefler, K.K., Jesenšek, D., & Horváth, Á. (2018). Development of sperm vitrification protocols for two endangered salmonid species: the Adriatic grayling,

- Thymallus thymallus*, and the marble trout, *Salmo marmoratus*. *Fish Physiology and Biochemistry*, 44, 1499-1507.
6. Kása, E., Bernáth, G., Kollár, T., Zarski, D., Lujić, J., Marinović, Z., & Horváth, A. (2017). Development of sperm vitrification protocols for freshwater fish (Eurasian perch, *Perca fluviatilis*) and marine fish (European eel, *Anguilla anguilla*). *General and Comparative Endocrinology*, 245, 102-107.
 7. Cuevas-Urbe, R., Hu., E., Daniels, H., Gill, A.O., & Tiersch, T.R. (2017). Vitrification as an Alternative Approach for Sperm Cryopreservation in Marine Fishes. *North American journal of aquaculture*, 79(2), 187-196.
 8. Kutluyer, F., Öğretmen, F., & İnanan, B.E. (2016). Cryopreservation of Goldfish (*Carassius Auratus*) Spermatozoa: Effects of Extender Supplemented with Taurine on Sperm Motility and DNA Damage. *CryoLetters*, 37(1), 41-46.
 9. Kutluyer, F., Öğretmen, F., & İnanan, B.E. (2015). Effects of Semen Extender Supplemented with Lmethionine and Packaging Methods (Straws and Pellets) on Post-Thaw Goldfish (*Carassius Auratus*) Sperm Quality and DNA Damage. *CryoLetters*, 36(5), 336-343.
 10. Taghizadeh, V., Imanpoor, M.R., & Sadeghi, A. (2013). Effect of Extenders and Different Concentrations of Methanol on Motility Parameters of Goldfish (*Carassius auratus gibelio*) Spermatozoa after Short-Term Storage. *World Journal of Fish and Marine Sciences*, 5(5), 492-496.
 11. Chantzaropoulos, A., Nathanaïlides, C., Kokokiris, L., Barbouti, A., & Zhang, T. (2015). A brief exposure to low pH prior to refrigerated storage reduces the motility and viability of goldsh sperm (*Carassius auratus*, Linnaeus, 1758). *Journal of Applied Ichthyology*, 31(S1), 89-93.
 12. Cabrita, E., Alvarez, R., Anel, E., & Herraез, M. P. (1999). The hypoosmotic swelling test performed with coulter counter: a method to assay functional integrity of sperm membrane in rainbow trout. *Animal Reproduction Science*, 55, 279-287.
 13. Petrunkina, A. M. (2007). Fundamental aspects of gamete cryobiology. *Journal of Reproductive Medicine and Endocrinology*, 4, 78-91.
 14. Pinisetty, D., Huang, C., & Dong, Q., et al. (2005). Subzero water permeability parameters and optimal freezing rates for sperm cells of the southern platyfish, *Xiphophorus maculatus*. *Cryobiology*, 50, 250-263.
 15. Hagedorn, M., Ricker, J., McCarthy, M., et al. (2009). Biophysics of zebrafish (*Danio rerio*) sperm. *Cryobiology*, 58, 12-19.
 16. Puhovkin, A. Y., Kopeika, E. F., Nardid, O. A., & Cherkashina, Y. O. (2014). Investigation of membrane permeability of carp spermatozoa for water molecules. *Biofizika*, 59(3), 481-487.
 17. Puhovkin, A. Y., Kononenko, I. S., Cherepnin, V. O., Hrytsyniak, I. I., & Kopeika, E. F. (2016). Permeability of sterlet sperm membranes (*Acipenser ruthenus* L., 1758) for water molecules. *Fisheries Science of Ukraine*, 1, 70-77.
 18. Puhovkin, A. Y., Kopeika, E. F., Mikson, K. B., Cherepnin, V. O., & Hrytsyniak, I. I. (2016). A study of the osmotic sensitivity of pike (*Esox lucius*, L., 1758) spermatozoa for the optimization of their cryopreservation. *Fisheries Science of Ukraine*, 4, 103-112.
 19. Puhovkin, A. Y., & Kopeika, E. F. (2015). Investigation of water and cryoprotectants molecules transfer through common carp (*Cyprinus carpio*, L.) spermatozoa membranes (CRYO conference of the Society for Cryobiology, Ostrava, Czech Republic, 2015). *Cryobiology*, 71(3), 567.

20. Fauvel, C., Suquet, M., & Cosson, J. (2010). Evaluation of fish sperm quality. *Appl. Ichthyol*, 26, 636-643.
21. Puhovkin, A. Y., Kopeika, E. F., Hordiienko, Y. O., & Nardid, O. A. (2014). *Sposib vyznachennia pronyknosti membran spermatozoidiv koropa do molekul vody*. Patent of Ukraine. №104809.
22. Puhovkin, A. Y., & Kopeika, E. F. (2016). Plasma Membrane Permeability of Carp (*Cyprinus carpio*, L., 1758) Spermatozoa for Water and Cryoprotectants Molecules at Different Stages of Cryopreservation. *Problems of Cryobiology and Cryomedicine*, 26(4), 340-348.
23. Kononenko, I. S., Puhovkin, A. Y., Kononenko, R. V. Cherepnin, V. O., Butskyi, K. I., & Kopeika, E. F. (2017). Optimization of the conditions of starlet (*Acipenser ruthenus*, L., 1758) sperm cryopreservation for egg fertilization in fish farm conditions. *Fisheries Science of Ukraine*, 3(41), 83-97.
24. Fűrböck, S., Lahnsteiner, F., & Patzner, R. A. (2009). A fine structural review on the spermatozoa of *Cyprinidae* with attention to their phylogenetic implications. *Histol. Histopathol.*, 24(10), 1233-1244.

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕРНИХ ПОКАЗНИКІВ ПЛІТКИ (*RUTILUS RUTILUS* LINNAEUS, 1758) ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДОЙМ В УМОВАХ НАДМІРНОГО АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ

Ю. О. Коваленко, kovalenkoyuliia888@gmail.com, Інститут гідробіології НАН
України, м. Київ

О. С. Потрохов, alport@bigmir.net, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

М. В. Причеп, prichepa1987@ukr.net, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Л. О. Горбатюк, Horbatiuk@nas.gov.ua, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Мета. Дослідити зміни біохімічних показників плітки як реакцію виду на вплив антропогенного забруднення, що необхідно для подальшого біомаркування водного середовища.

Методика. Відлов риби здійснювали з використанням гачкових знарядь лову. В роботі були визначені біохімічні показники плітки, зокрема: вміст глікогену та загальних ліпідів, активність лактатдегідрогенази, сукцинатдегідрогенази, АТФ-ази і лужної фосфатази.

Результати. Розглянуто зміну окремих біохімічних показників у плітки за дії антропогенного впливу. Встановлено нижчий вміст глікогену та ліпідів (на 68,65 і 16,12%) у риби із забрудненої водойми (оз. Кирилівське) порівняно з рибами із умовного контролю (оз. Бабинь). Активне використання запасних ліпідів та глікогену вказує на загальне погіршення екологічних умов в озері Кирилівське.

Встановлено вищу активність СДГ у тканинах печінки та зябер (на 25 та 48%) відносно контролю. На противагу цьому, показано нижчу активність ЛДГ (на 11 та 16%) у всіх досліджуваних тканинах (м'язів, печінки та зябер) плітки із забрудненої водойми. За умов забруднення водойми токсикантами різної хімічної природи у плітки посилюються аеробні окисно-відновні процеси, як результат протидії потенційному токсичному середовищу. На користь цього свідчить вища активність СДГ у тканинах печінки та зябер. За результатами досліджень, також встановлено вищу активність лужної фосфатази у риби із оз. Кирилівське (на 39,9 та 24,6%) відносно умовного контролю. Це вказує на посилення фосфорилляції у цих тканинах, процес якої спрямований на знешкодження та виведення токсичних сполук з організму після їх детоксикації.

Відмінності між досліджуваними угрупованнями риби за біохімічними показниками доводить, що вони перебувають у суттєво відрізняючих екологічних та токсикологічних умовах.

Наукова новизна. Вперше представлені результати зміни біохімічних маркерних показників активності ферментів плітки із деяких водойм м. Києва, які відрізняються за рівнем антропогенного навантаження.

Практична значимість. Отримані результати фізіологічного стану плітки можуть бути використані у якості критерію для оцінки екологічного стану окремих вододілів, зокрема тих, які географічно розташовані на урбанізованих територіях.

Ключові слова: плітка, антропогенне забруднення, активність ферментів, екологічний стан.

APPLICATION OF MARKER PARAMETERS OF ROACH (*RUTILUS RUTILUS* LINNAEUS, 1758) FOR DIAGNOSIS OF ECOLOGICAL CONDITION OF WATER BODIES IN CONDITIONS OF EXCESSIVE ANTHROPOGENIC POLLUTION

Yu. Kovalenko, kovalenkoyuliia888@gmail.com, Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv

A. Potrokhov, alport@bigmir.net, Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv

M. Prychepa, prichepa1987@ukr.net, Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv

L. Gorbatiuk, Horbatiuk@nas.gov.ua, Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv

Purpose. To investigate changes in the biochemical parameters of roach as a species response to the effects of anthropogenic pollution, which is necessary for further biomarking of the aquatic environment.

Methodology. Fish were caught using hook and line fishing gears. Following biochemical parameters of roach were determined: glycogen and lipid contents, activities of lactate dehydrogenase, succinate dehydrogenase, ATPase and alkaline phosphatase.

Findings. Changes in some biochemical parameters of roach under the effect of anthropogenic pollution have been found. A lower content of glycogen and lipids (by 68.65 and 16.12%) was detected in fish from a polluted water body (Lake Kyrylivske) compared to fish from the conditional control (Lake Babyne). The active use of reserved lipids and glycogen emphasizes the general deterioration of ecological conditions in the Lake Kyrylivske.

A higher LDH activity in liver and gill tissues (by 25 and 48%) relative to control was found. In contrast, a lower LDH activity (by 11 and 16%) in all studied tissues (muscles, liver and gills) of roach from the polluted water body was detected. Under conditions of pollution of the water body with toxicants of various chemical nature, aerobic redox processes in roach body are intensified as a result of counteracting a potentially aggressive environment. This is confirmed by a higher LDH activity in liver and gill tissues. According to the results of study, a higher alkaline phosphatase activity was also detected in fish from the Lake Kyrylivske (by 39.9 and 24.6%) compared to the control. This indicates an increase in phosphorylation in these tissues, the process of which is aimed at neutralization and excretion of toxic compounds from the body after their detoxification.

The differences between the studied groups of fish in biochemical parameters prove that they live in significantly different ecological and toxicological conditions.

Originality. For the first time, the results of changes in biochemical markers of roach enzyme activity from some water body of Kyiv, which differ in the level of anthropogenic pollution, are presented.

Practical value. The obtained results of the physiological state of roach can be used as a criterion for assessing the ecological status of individual waterbodies, in particular those that are located in urban areas.

Key words: roach, anthropogenic pollution, enzyme activity, ecological condition.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОТВЫ (*Rutilus rutilus* LINNAEUS, 1758) ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Ю. О. Коваленко, kovalenkoyuliiia888@gmail.com, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

А. С. Потрохов, alport@bigmir.net, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

Н. В. Причепа, prichepa1987@ukr.net, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

Л. О. Горбатюк, Horbatiuk@nas.gov.ua, Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев

Цель. Изучить изменения биохимических показателей плотвы как реакцию вида на влияние антропогенного загрязнения, что необходимо для последующего биомаркирования водной среды.

Методика. Отлов рыб осуществляли с использованием крючковых орудий лова. В работе были определены биохимические показатели плотвы, а именно: содержание гликогена, липидов, активность лактатдегидрогеназы, сукцинатдегидрогеназы, АТФ-азы и щелочной фосфатазы.

Результаты. Рассмотрены изменения некоторых биохимических показателей плотвы в условиях антропогенного влияния. Установлено, что у рыб из загрязненного водоема (оз. Кирилловское) содержится меньше гликогена и липидов (на 68,65 и 16,12%) по сравнению с рыбами из условного контроля (оз. Бабино). Активное использование запасных липидов и гликогена указывает на общее ухудшение экологических условий в озере Кирилловское.

Установлено более высокую активность СДГ в тканях печени и жабр (на 25 и 48%) относительно контроля. При этом, показано меньшую активность ЛДГ (на 11 и 16%) во всех исследуемых тканях (мышцы, печень и жабры) плотвы из загрязненного водоема. В условиях загрязнения водоема токсикантами различной химической природы у плотвы ускорялись аэробные окислительно-восстановительные процессы — как результат противодействия потенциально токсической среде. В пользу этого свидетельствует более высокая активность СДГ в тканях печени и жабр. В результате исследований также установлено более высокую активность щелочной фосфатазы у рыб из оз. Кирилловское (на 39,9 и 24,6%) относительно условного контроля. Это указывает на усиление фосфорилирования в этих тканях, направленного на ликвидацию и выведение токсических соединений из организма рыб после их детоксикации.

Отличия по биохимическим показателям между изученными группами рыб доказывают, что последние пребывают в различных экологических и токсикологических условиях.

Научная новизна. Впервые представлены результаты изменения биохимических маркерных показателей активности ферментов плотвы из некоторых водоемов г. Киева, отличающихся по уровню антропогенной нагрузки.

Практическая значимость. Полученные результаты физиологического состояния плотвы могут быть использованы в качестве критерия для оценки экологической ситуации некоторых водоемов, в частности тех, которые географически расположены на урбанизированных территориях.

Ключевые слова: плотва, антропогенное загрязнение, активность ферментов, экологическое состояние.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Внаслідок збільшення урбанізованих ландшафтів через зростання площі міст щоразу нові внутрішні водойми опиняються в межах їх території [1, 2]. Це призводить до трансформації не лише водного, але й довколаводного середовища,

зокрема одамбовування берегової лінії, знищення прибережної рослинності та заплавлених лісів, що істотно порушує самоочисну здатність озерних систем [3] при потраплянні до водойми токсичних сполук або надмірної кількості біогенних речовин, що істотно погіршує якість довкілля [4]. Це, зокрема, впливає на наявність певних видів водних тварин та їхню чисельність. Внаслідок неоднакових резистентних можливостей і різної здатності долати стресовий стан, відбуваються істотні зміни у структурі іхтіоценозів із домінуванням у озерах більш стійких видів та їх угруповань [5]. Види, що виживають за змінених умов існування, перебувають у пригніченому фізіологічному стані, що відображають зміни їхніх фізіологічних та біохімічних показників [6, 7]. Саме це робить зазначену проблему актуальною у контексті вирішення питання збереження біологічного розмаїття іхтіофауни риб середньої течії Дніпра в умовах багатфакторного забруднення.

Одним із вирішальних підходів у проведенні біомоніторингу є вибір видів-індикаторів. Плітка як один із типових представників іхтіофауни водойм Києва є чудовим модельним видом для проведення досліджень. Враховуючи особливості живлення (бентофаг) та екологічну нішу, яку займає плітка, цей вид здатен відображати екологічні умови, у яких він існує. У контексті проблеми забруднення донних відкладів та води важкими металами і нафтопродуктами плітка може бути ключовим об'єктом у екотоксикологічній оцінці водного середовища. Тому зазначена публікація є своєрідним доповненням до вже існуючих, присвячених вивченню гідроекологічного стану озер м. Києва та їх іхтіофауни. Саме розв'язанню проблеми адаптації видів риб до несприятливих умов, викликаних надмірним антропогенним навантаженням на географічно урбанізованих територіях, буде присвячена зазначена робота.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Зміни умов існування, викликані трансформацією водних екосистем, ініціюють перебудову структури іхтіоценозів, що відображається на кількісних та якісних показниках іхтіофауни. Однією із важливих умов у раціональному використанні рибних ресурсів є проведення періодичного моніторингу екологічного стану водойм, які експлуатуються людиною. Загалом, значну увагу приділено вивченню гідрохімічних (вміст біогенних сполук) та гідробіологічних показників (фітопланктон, зоопланктон, макрозообентос, паразитоценози), що характеризують якість середовища [1]. У зв'язку з цим, пошук і застосування індикаторів для екотоксикологічної оцінки є перспективним напрямком, який дозволить не лише доповнити подібні існуючі, але й отримати інформацію про екологічний стан середовища. Одними із таких методів є використання біохімічних індикаторів фонових представників іхтіофауни, зокрема активності ферментів, а закономірності змін цих показників можуть відображати умови існування представників іхтіофауни в умовах періодичного чи постійного забруднення водних екосистем у межах міст. Це у подальшому дасть змогу запобігти негативним наслідкам, спричиненим інтенсивним забрудненням водного середовища, та попередити вимирання видів і зменшення їхньої чисельності.

Метою роботи було дослідження зміни біохімічних показників плітки як реакції виду на вплив антропогенного забруднення, що необхідно для подальшого біомаркування водного середовища.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Відбір біологічного матеріалу проводили протягом липня 2018 р. у водоймах м. Києва (оз. Кирилівське, Бабіне). Відлов риби здійснювали гачковими знаряддями лову. Об'єктом досліджень була плітка *Rutilus rutilus* (L.). Для біохімічних досліджень обрано особин віком 2 роки. Плітка з оз. Бабіне була довжиною та масою $14,8 \pm 0,2$ см та $29,7 \pm 0,6$ г, з оз. Кирилівське — $16,2 \pm 0,21$ см та $42,4 \pm 0,56$ г. Відбір проб води для гідрохімічних досліджень здійснювали у ранкові години. Вміст розчиненого кисню визначали за методом Вінклера, водневий показник (pH) — за допомогою pH-метра PH-009 [1], загальну мінералізацію води — TDS-метра IDS-2. Вміст глікогену (мг/г) виявляли антроновим методом [8]. Вміст загальних ліпідів (мг/г) досліджували з використанням фосфорнованілінового реагенту із застосуванням комерційних наборів «Загальні ліпіди» («Філісіт Діагностика», Україна). Зазначені визначення проводили фотоколориметрично із використанням приладу «КФК-2 МП». Концентрацію нафтопродуктів оцінювали методом, описаним С. Є. Севериним [9]. Активність лужної фосфатази оцінювали спектрофотометрично з використанням комерційних наборів «Лужна фосфатаза» («Філісіт Діагностика», Україна); активність лактатдегідрогенази (ЛДГ) (КФ 1.1.1.27) — за методом Секвела Товарека з використанням комерційних наборів «Гранум» (Дніпро). (Україна). Активність сукцинатдегідрогенази (СДГ) (КФ 1.3.5.1) визначали за методом Векса, що ґрунтується на окисненні сукцинтау до фумарату [10]. Активність Na^+/K^+ -аденозинтрифосфатази (КФ 3.6.1.4) визначали за наростанням неорганічного фосфору в дослідній пробі (метод Фіске-Субароу) [11]. Активність ферментів перераховували на 1 мг білка в пробі за методом Лоурі [12].

Отримані цифрові дані були статистично оброблені за загальноприйнятими методами варіаційної статистики [13]. Статистичну обробку матеріалу проводили за допомогою програм «Excel» із пакету «Microsoft Office» та «Statistica 5.5». Ймовірність відмінностей між значеннями оцінювали за допомогою критерію Стюдента за рівнем ймовірності $p < 0,05$.

Характеристика районів дослідження. Оз. Кирилівське — знаходиться в південно-західній частині масиву Оболонь. Його довжина становить 760 м, найбільша ширина — 380 м, площа водного дзеркала — 19 га, об'єм — 2,28 млн м^3 , середня глибина — 12 м, а найбільша — 15 м. Наявна підвищена мінералізація води, значна концентрація хлоридів та сульфатів свідчать про значний антропогенний вплив на водойму. Крім того, згідно з результатами досліджень [2–4], наявне забруднення водойми важкими металами, зокрема свинцем, міддю, цинком та манганом. Джерелами забруднення озера є поверхневий стік, у тому числі й від розташованих поряд автострад та промислових об'єктів, а також р. Сирець, що приймає стічні води низки промислових підприємств. Забруднення також надходять із ґрунтовими та зливовими водами із житлових масивів Мінський, Оболонь, Сирець, Куренівка. Вміст розчиненого у воді кисню складав $9,6 \text{ мг О/дм}^3$, pH — 7,9, загальна мінералізація — 635 мг/дм^3 . Вміст нафтопродуктів у воді становив $0,117 \text{ мг/дм}^3$ (власні дані). Вміст токсичних сполук у донних відкладах: свинець — 89, 5 мг/г, мідь — 29,4 мг/кг, кадмій — 1,4 мг/кг, цинк — 52,4 мг/кг, нафтопродукти — 63,3 мг/кг [14].

Оз. Бабіне — природна заплавна водойма, стариця видовженої форми, що знаходиться на території Труханового острова. Через побудову греблі

Київської ГЕС, озеро має гідрологічний зв'язок із річкою лише в період великих паводків. Водойма має площу 9,5 га, довжину — 1,7 км, ширину — 35–80 м; середню глибину — 2 м, максимальну — 5 м [1]. Через ізолюваність і острівне розміщення озеро не зазнає суттєвого антропогенного впливу, за виключенням рибальства та рекреації. У зв'язку з цим, його було обрано як контрольну водойму. Вміст розчиненого у воді кисню становив $9,5 \text{ мг/дм}^3$, pH — 8,0, загальна мінералізація — 270 мг/дм^3 . Вміст нафтопродуктів у воді — $0,024 \text{ мг/дм}^3$ (власні дані). За даними М. Т. Гончарової [14], вміст токсичних сполук у донних відкладах становив: свинець — 8,2 мг/кг, мідь — 3,1 мг/кг, кадмій — 0,1 мг/кг, цинк — 1,6 мг/кг, нафтопродукти — 11,6 мг/кг.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

За результатами досліджень було встановлено істотні відмінності за вмістом енергомістких/енергоємних сполук у тканинах печінки плітки з різних угруповань. У плітки із оз. Кирилівське було встановлено менший вміст глікогену та ліпідів — на 16,6 та 68,65% відповідно, ніж у плітки з оз. Бабіне (рис. 1). Це може вказувати на те, що риби із оз. Кирилівського (на період проведення досліджень) фізіологічно перебували у пригніченому стані.

Рис. 1. Вміст глікогену (А) та ліпідів (В) у печінці плітки із оз. Бабіне та Кирилівське ($M \pm m$, $n = 6-8$)

Fig. 1. Content of glycogen (A) and lipids (B) in the liver of the roach from lakes Babyne and Kyrylivske ($M \pm m$, $n = 6-8$)

Активне використання запасних ліпідів може вказувати на загальне погіршення екологічних умов в озері Кирилівське, адже плітка використовує енергомісткі сполуки у процесах знешкодження потенційно токсичних речовин, що зазвичай супроводжуються посиленням процесів катаболізму цих сполук [15, 16]. Відомо, що у літній період у більшості риб відбувається процес активного росту, який неможливий без залучення енергоємних речовин. Крім того, риби, які існують в умовах антропогенного навантаження, зазнають і токсичного впливу, тому ліпіди використовуються й для протидії токсикозу.

Через надходження до оз. Кирилівського значної кількості комунально-побутових стоків, відбувається насичення водойми біогенними, органічними та токсичними сполуками [2, 4, 17]. Це викликає порушення кисневого режиму та призводить до виникнення гіпоксичних зон, особливо у придонних шарах води [18].

В умовах антропогенного забруднення водойм у риби відбуваються суттєві зміни у активності ферментів, які відображають перебіг біохімічних реакцій, спрямованих на посилення або послаблення процесів, пов'язаних із енергетичним забезпеченням клітин внутрішніх органів та тканин. Одним із таких показників є зміни у активності ферментів енергетичного (сукцинатдегідрогеназа (СДГ), лактатдегідрогеназа (ЛДГ) та $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-АТФ-аза}$) та фосфорного обміну (лужна фосфатаза). Результати проведених досліджень із активності цих ферментів вказують, що їх можна використовувати як біохімічні індикатори для екологічного моніторингу водойм, які підлягають антропогенному забрудненню. Тому саме активність цих ферментів було нами обрано для вивчення пристосувальних можливостей одного з представників коропових видів риби у водоймах м. Київ.

Встановлено, що активність СДГ у тканинах печінки та зябер була вищою на 25 та 48% відповідно, а у м'язовій тканині активність фермента була нижче на 31%, ніж у контролі (рис. 2 А).

Відомо, що зміна активності ферментів енергетичного обміну (СДГ та ЛДГ) впливає на баланс між аеробною та анаеробною гілками метаболізму. Коливання активності одного із цих ферментів свідчить про прискорення або послаблення циклу Кребса (СДГ) або гліколізу (ЛДГ) [19].

Нами було проаналізовано зміни активності ЛДГ у тканинах риби за дії забруднення водного середовища. Відомо, що цей фермент бере участь у регуляції процесів перетворення пірувату в лактат, а лактату — в піруват [20].

Встановлено, що у плітки із оз. Кирилівського спостерігалась менша активність ЛДГ у всіх досліджуваних тканинах. Так, її активність в тканинах м'язів, печінки та зябрових пелюсток була відповідно на 11,5; 11,0 та 16,0% нижчою відносно такої у риби з оз. Бабиного (рис. 2 Б).

Можна припустити, що за умов забруднення водойми токсикантами різної хімічної природи у плітки посилюються аеробні окисно-відновні процеси, що відбувається як наслідок протидії потенційному агресивному середовищу. На користь цього свідчить вища активність СДГ у тканинах печінки та зябрових тканин — як органів, які найбільшою мірою залучені у процесах протидії надходженню токсичних сполук до організму.

Далі нами було розглянуто зміну активності $\text{Na}^+\text{/K}^+\text{-АТФ-ази}$. Зазначений фермент відіграє важливу роль у підтриманні йонної рівноваги між зовнішнім та внутрішнім середовищем клітини. Також йому належить важлива роль у процесах обміну метаболітів, зокрема глюкози та амінокислот, що підтримує різницю осмотичного градієнту між зовнішнім і внутрішнім середовищем, яка важлива для забезпечення нормального функціонування клітин [21].

Рис. 2. Активність сукцинатдегідрогенази (А) та лактатдегідрогенази (Б) у м'язах (1), печінці (2) та зябрах (3) плітки з оз. Бабіне, Кирилівське, $M \pm m$, $n = 6-8$

Fig. 2. The activity of succinate dehydrogenase (A) and lactate dehydrogenase (B) in the muscle (1), liver (2) and gills (3) of the roach from lakes Babyne, Kyrylivske, $M \pm m$, $n = 6-8$

Встановлено, що у плітки активність Na^+/K^+ -АТФ-ази у зябровій тканині була незначно більшою на 4,5% відносно риб з оз. Бабіне (рис. 3), що може бути пов'язаним зі змінами у процесах регуляції йонного обміну за впливу антропогенного забруднення.

Рис. 3. Активність Na^+/K^+ -АТФ-ази у зябрах плітки з оз. Бабіне, Кирилівське, $M \pm m$, $n = 6-8$

Fig. 3. The activity of $Na^+ / K^+ -ATP$ -ase in the gills of the roach from the lakes Babyne, Kyrylivske, $M \pm m$, $n = 6-8$

У подальшому було розглянуто зміну активності лужної фосфатази (ЛФ).

Зазначений фермент бере участь у процесах гідролізу фосфорних ефірів та у транспорті фосфорних груп, а також має стосунок до енергозабезпечення організму [22, 23]. Встановлено, що у плітки з оз. Кирилівського активність ЛФ у м'язовій тканині була на 53,3% нижчою, ніж у плітки з оз. Бабиного. Це може бути пов'язаним із накопиченням токсичних речовин у тканинах риб, зокрема

важких металів, вміст яких вищий порівняно з референтними значеннями [14], особливо, враховуючи особливості живлення та поведінки плітки як виду, що мешкає у придонному шарі води, — саме там, де накопичується значна кількість розчинних фракцій нафтопродуктів та окремих важких металів.

У тканинах зябер та печінки активність ЛФ була вищою у риб із оз. Кирилівського на 39,9 та 24,6% відповідно, ніж у плітки із оз. Бабиного (рис. 4). Висока активність цього ферменту в тканинах дослідних риб свідчить про посилення процесів фосфорилування, які спрямовані на знешкодження та виведення токсиканта з організму шляхом детоксикації.

Високий вміст нафтопродуктів у донних відкладах у оз. Кирилівське (63,3 проти 11,6 мг/кг в оз. Бабині) [14, 24] наголошує на несприятливості екологічних умов для донної фауни озера, зокрема молюсків та інших безхребетних, які є трофічно-потенційними об'єктами для живлення плітки. Саме це може суттєво впливати на зміну низки досліджуваних показників, у т. ч. і на активність ферментів.

Рис. 4. Активність лужної фосфатази у м'язах (1), печінці (2) та зябрах (3) плітки з оз. Бабиного та Кирилівського, $M \pm m$, $n = 6-8$

Fig. 4. Activity of alkaline phosphatase in muscle (1), liver (2) and gills (3) of the roach from lake Babyne and Kyrylivske, $M \pm m$, $n = 6-8$

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Нами було встановлено істотні зміни біохімічних показників у плітки, що існує у забрудненій водоймі, зокрема вмісту глікогену та ліпідів, активності СДГ, ЛДГ, ЛФ.

Сила антропогенного забруднення та специфіка найпоширеніших токсичних речовин у водоймі сприяли домінуванню аеробних процесів енергозабезпечення над анаеробними, зокрема у тканинах печінки та зябер дослідних риб з оз. Кирилівського, на що вказує підвищення активності СДГ на 25 та 48% і зниження активності ЛДГ на 11 та 16% відповідно.

Також встановлено високу активність лужної фосфатази у тканинах зябер та печінки — на 39,9 та 24,6% відповідно. Це вказує на посилення процесів фосфорилування у досліджуваних тканинах як наслідок протидії несприятливим умовам існування.

Таким чином, отримані результати стосовно біохімічних показників підтверджують дані токсикологічних показників оз. Кирилівського, що вказує на наявність несприятливих умов існування риб через коливання гідроекологічного стану водойми під час періодичного надходження з прилеглої території до акваторії забруднювальних речовин різної хімічної природи.

Отже, зазначені показники зміни вмісту енергемістких сполук та активності ферментів можна використовувати для проведення маркування екологічного стану водойм, які географічно розташовані у межах міста. Це необхідно для полегшення виявлення негативних змін, що відбуваються в озерах, які зазнають антропогенного впливу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Якість води у міських водоймах та характер освоєння водоохоронних зон (на прикладі озер системи «Опечень», м. Київ) / Панасюк І. В. та ін. // Екологічна безпека та природокористування. 2015. Вип. 4 (20). С. 63—69.
2. Екологічні проблеми Київських водойм і прилеглих територій / Романенко О. В. та ін. Київ : Наукова думка, 2015. 189 с.
3. Упорядкування водоохоронних зон міських водойм на основі екологічної оцінки якості вод / Панасюк І. В. та ін. // Київ : Медінформ, 2016. 94 с.
4. Жежеря В. А., Линник П. М., Зубенко І. Б. Уміст та форми знаходження металів у озерах системи Опечень (м. Київ) // Наукові праці УкрНДГМІ. 2016. Вип. 269. С. 70—86.
5. Израэль Ю. А. Научные аспекты экологических проблем России. Т. 1. Проблемы антропогенной экологии. Москва : Наука, 2009. 221 с.
6. Крот Ю. Г., Медовник Д. В. Особливості фізіологічної адаптації риб малих річок урбанізованих територій // Гідробіологічний журнал. 2018. Т. 54, № 5. С. 53—62.
7. Коваленко Ю. О. Зміна вмісту малонового діальдегіду та активності лужної фосфатази у тканинах карася сріблястого (*Carassius auratus* (Bloch, 1782)) за дії токсичного забруднення водойми // Конференція молодих дослідників-зоологів : тези доп. Київ, 2019. С. 13. (Зоологічний кур'єр ; № 13).
8. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. 408 с.
9. Северин С. Е., Соловьева Г. А. Практикум по биохимии. Москва : МГУ, 1989. 510 с.
10. Методы биохимических исследований (липидный и энергетический обмен). Ленинград : Ленинградский ун-т, 1982. 272 с.
11. Fiske С. Н., Subbarow Y. J. The colorimetric estimation of phosphorous // J. Biol. Chem., 1925. Vol. 66. P. 375.
12. Protein measurement with the Folin phenol reagent / Lowry O. H. et. al. // J. Biol. Chem. 1951. Vol. 193 (1.) P. 265—275.
13. Лакин Г. Ф. Биометрия. Москва : Наука, 1990. 296 с.
14. Оцінка якості води та донних відкладів каскаду озер Опечень (м. Київ) на основі токсикологічних та гідрохімічних досліджень / Гончарова М. Т. та ін. // VIII З'їзд гідроекологічного товариства України, присвячений 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції. Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів, 6-8 лист. 2019 р. : тези доп. Київ, 2019. С. 249—252.

15. Арсан В. О. Енергозабезпечення організму коропа при адаптації до змін концентрації іонів важких металів у водному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук. : спец. 03.00.10 «Іхтіологія». Київ, 2004. 20 с.
16. Попова Е. М., Кошій І. В. Ліпіди як компонент адаптації риб до екологічного стресу // Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 49—56.
17. Гідрохімічний режим озер системи Опечень (м. Київ) / Линник П. М. та ін. // Наук. праці Укр. наук.-дослідного гідромет. ін-ту. 2016. Вип. 269. С. 59—69.
18. Численность бактерий и протеолитическая активность в воде озера, расположенного в городской черте / Якушин В. М. та ін. // Гидробиологический журнал. 2015. Т. 51, № 1. С. 83—92.
19. Regulation of fish gill Na⁺-K⁺-ATPase by selective sulfatide-enriched raft partitioning during seawater adaptation / Lingwood D. et. al. // Journal of Biological Chemistry. 2005. Vol. 280 (44). P. 36545—36550.
20. Rajamanickam V., Muthuswamy N. Effect of metals induced toxicity on metabolic biomarkers in common carp (*Cyprinus carpio* L) // Intern. J. Sci. Tech. 2008. Vol. 2 (1). P. 192—200.
21. Varadarajan R. Biochemical effects of different phenolic compounds on *Oreochromis mosambicus* (Peters) : candidate's thesis of Doctor of philosophy in biochemistry. Cochin-682016 India, 2010. 250 p.
22. A physiological disturbances in fish living in coastal water polluted with bleached Kraft pulp mill effluents / Anderson T. et. al. // J. Fish Aquat Sci. 2002. Vol. 45. P. 1525—1536.
23. Немова Н. Н., Высоцкая Р. В. Биохимическая индикация состояния рыб. Москва : Наука, 2004. 225 с.
24. Вплив екологічних умов окремих озер м. Києва на стан іхтіофауни / Худіяш Ю. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2020. № 1. С. 28—43.

REFERENCES

1. Panasiuk, I. V., Tomiltseva, A. I., Zub L. M., & Pohorielova, Yu. V. (2015). Yakist vody u miskyykh vodoimakh ta kharakter osvoiennia vodookhoronnykh zon (na prykladi ozer systemy «Opechen», m. Kyiv). *Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannia*, 4 (20), 63-69.
2. Romanenko, O. V., Arsan, O. M., Kipnis, L. S., & Sytnyk, Yu. M. (2015). *Ekolohichni problemy Kyivskykh vodoim i prylehlykh terytorii*. Kyiv: Naukova dumka.
3. Zub, L. M., Panasiuk, I. V., Tomiltseva, A. I., Barshchevska, N. M., Prokopuk, M. S., Pohorielova Yu. V., Samchyshyna L. P., Skidan O. V., Skidan V. V., & Mykhailik O. V. (2016). *Uporiadkuvannia vodookhoronnykh zon miskyykh vodoim na osnovi ekolohichnoi otsinky yakosti vod*. Kyiv: Medinform.
4. Zhezheria, V. A., Lynnyk, P. M., & Zubenko, I. B. (2016). Umist ta formy znakhodzhenia metaliv u ozerakh systemy Opechen (m. Kyiv). *Naukovi pratsi UkrNDHMI*, 269, 70-86.
5. Izrajel', Ju. A. (2009). *Problemy antropogennoj jekologii. Nauchnye aspekty jekologicheskikh problem Rossii*. Vol. 1. Moskva: Nauka.
6. Krot, Yu. H., & Medovnyk, D. V. (2018). Osoblyvosti fiziologichnoi adaptatsii ryb malykh richok urbanizovanykh terytorii. *Hidrobiolohichniy zhurnal*, 54 (5), 53-62.
7. Kovalenko, Yu. O. (2019). Zmina vmistu malonovoho dialdehydu ta aktyvnosti luzhnoi fosfatazy u tkanyakh karasia sribliastoho (*Carassius auratus* (Bloch,

- 1782)) за dii toksychnoho zabrudnennia vodoimy. *Konferentsiia molodykh doslidnykiv-zoolohiv. 13-14 lystopada 2019, Zoolohichnyi kurier №13: Tezy dopovidei*. Kyiv: Instytut zoolohii NAN Ukrainy, 13.
8. Arsan, O. M., Davydov, O. Ia. & Diachenko, T. M., et al. (2006). *Metody hidroekolohichnykh doslidzen poverkhnevyykh vod*. Kyiv, Lohos, 408.
 9. Severin, S. E., & Solov'eva, G. A. (1989). *Praktikum po biohimii*. Moskva: MGU.
 10. *Metody biohimicheskikh issledovanij (lipidnyj i jenergeticheskij obmen)* (1982). Leningrad: Leningradskiy universitet.
 11. Fiske, C. H., & Subbarow, Y. J. (1925). The colorimetric estimation of phosphorous. *Biol. Chem.*, 66, 375.
 12. Lowry, O. H., Rosebrough, N. J., Farr, A. L., & Randall, R. J. (1951). Protein measurement with the Folin phenol reagent. *J. Biol. Chem.*, 193 (1), 265-275.
 13. Lakin, G. F. (1951). *Biometrija*. Moskva: Nauka.
 14. Honcharova, M. T., Kipnis, L. S., Konovets, I. M., Nezberytska, I. M., & Yarovy, M. M. (2019). Otsinka yakosti vody ta donnykh vidkladiv kaskadu ozer Opechen (m. Kyiv) na osnovi toksykolohichnykh ta hidrokhimichnykh doslidzen. *VIII Zizd hidroekolohichnoho tovarystva Ukrainy, prysviachenyi 110-richchiu zasnuvannia Dniprovskoi biolohichnoi stantsii. Perspektyvy hidroekolohichnykh doslidzen v konteksti problem dovkillia ta sotsialnykh vyklykiv, 6-8 lystopada 2019 r.: mater.* Kyiv, 249-252.
 15. Arsan, V. O. (2004). Enerhozabezpechennia orhanizmu koropa pry adaptatsii do zmin kontsentratsii ioniv vazhkykh metaliv u vodnomu seredovyshchi. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv. 20.
 16. Popova, E. M., & Koshchii, I. V. (2013). Lipidy yak komponent adaptatsii ryb do ekolohichnoho stresu. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1 (1), 49-56.
 17. Lynnyk, P. M., Zhezheria, V. A., Zhezheria, T. P., Ivanechko, Ya. S., & Ihnatenko, I. I. (2016). Hidrokhimichniy rezhym ozer systemy Opechen (m. Kyiv). *Nauk. pratsi Ukr. nauk.-doslidnoho hidromet. in-tu*, 269, 59-69.
 18. Yakushyn, V. M., Potrokhov, A. S., Zynkovskiy, O. H., Romanyshyn, H. M., Kalenychenko, K. P., & Lynchuk, M. Y. (2015). Chyslennost bakteriy y proteolytycheskaia aktyvnost v vode ozera, raspolozhennoho v horodskoi cherte. *Hydrobiolohicheskyy zhurnal*, 51 (1), 83-92.
 19. Lingwood, D., Harauz, G., & Ballantyne, J. S. (2005). Regulation of fish gill Na^+ - K^+ -ATPase by selective sulfatide-enriched raft partitioning during seawater adaptation. *Journal of Biological Chemistry*, 280 (44), 36545-36550.
 20. Rajamanickam, V., & Muthuswamy, N. (2008). Effect of metals induced toxicity on metabolic biomarkers in common carp (*Cyprinus carpio* L). *Intern. J. Sci. Tech.*, 2 (1). 192-200.
 21. Varadarajan, R. (2010). Biochemical effects of different phenolic compounds on *Oreochromis mosambicus* (Peters). *Doctor's thesis*. Cochin, India, 250.
 22. Anderson, T., Forlin, L., Hardig, J., & Larson, A. C. (2002). A physiological disturbances in fish living in coastal water polluted with bleached Kraft pulp mill effluents. *J. Fish Aquat Sc.*, 45, 1525-1536.
 23. Nemova, N. N., & Vysockaja, R. V. (2004). *Biohimicheskaja indikacija sostojanija ryb*. Moskva: Nauka.
 24. Khudiiash, Yu. M., Prychepa, M. V., Potrokhov, O. S., Zinkovskiy, O. H., Horbatiuk, L. O., Kovalenko, Yu. O., & Medovnyk, D. V. (2020). Vplyv ekolohichnykh umov okremykh ozer m. Kyieva na stan ikhtiofauny. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 28-43.

БИОМОНИТОРИНГ ПОСТСТРЕССОВОЙ АДАПТАЦИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ СТЕРЛЯДИ В УСЛОВИЯХ ЗАМКНУТОГО ВОДОБЕСПЕЧЕНИЯ

А. М. Козий, kozij67@gmail.com, Херсонский государственный аграрный университет, г. Херсон

Цель. Проанализировать особенности постстрессовых адаптивных изменений органов пищеварительной системы стерляди на микроуровне в условиях замкнутого обеспечения. Исследовать динамику изменений клеточного состава печени, тонкого кишечника и поджелудочной железы в протяжении периода адаптации. Определить перспективу использования данных гистологического мониторинга в рыбоводной практике с целью оценки морфофункционального статуса рыб.

Методика. Первичные материалы получены в условиях экспериментального частного предприятия «Оазис Бисан». Камеральная обработка ихтиологических образцов выполнена в соответствии с общепризнанными методиками и руководствами. Гистологические исследования осуществлены с использованием авторского оборудования и оригинальных методик, специально предназначенных для диагностики тканей рыб. Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики с использованием пакета соответствующих прикладных программ «Microsoft Excel» с акцентированием внимания на ошибки средних величин.

Результаты. Микроанатомические исследования позволили установить, что адаптация стерляди к условиям УЗВ после транспортировки составила 12 суток. По результатам мониторинга, наиболее контрастные приспособительные изменения к новым условиям содержания отмечены в маргинальной зоне печени, тонком отделе кишечника и поджелудочной железе.

При потенциальном воздействии стрессового фактора в печени рыб отмечается смещение функции клеток в виде сдвигов цитологических характеристик. Увеличение значения линейных размеров гепатоцитов в 1,54 раза адекватно приводит к увеличению значения параметров ядер в 1,44 раза. Это является показателем изменения характера внутриклеточного метаболизма. Низкие значения количества внутриклеточных полостей в начале адаптации являются прямым доказательством затухания липостатической функции гепатоцитов. Низкие значения отношения диаметра «ядрышко/ядро» (0,40 и 0,41) свидетельствует о смене клеточной функции в виде активизации синтеза гликогена.

В период действия стрессового фактора всасывание компонентов химуса в тонком кишечнике происходит с меньшей интенсивностью. Локальная аккумуляция поглощенных частиц в цитоплазме указывает на замедление пищеварительных процессов. Спустя 8 суток, при адекватных условиях кормления и содержания в слизистой оболочке тонкого кишечника можно наблюдать появление бокаловидных glanduloцитов. Данный факт свидетельствует о нормализации функционирования кишечника.

Начальный период адаптации практически совпадает с пиком максимума стрессового состояния. В этот момент у рыб отмечено затухание секреторной активности поджелудочной железы. Существенное снижение интенсивности биосинтеза зимогена приводит к преобладанию в объеме гомогенного полюса ациноцитов над зимогенным полюсом. В процессе адаптации рыб к новым условиям кормления и содержания ациноциты

приобретают специфический вид. Протеиназы и липазы в конце секреторного цикла клеток существуют преимущественно в активной форме и выявляются светооптическими методами в виде массы зимогенных гранул.

Научная новизна. Представлены новые, а также существенно обновленные существующие данные адаптации органов и тканей стерляди в условиях стрессового воздействия и постстрессовой адаптации. Впервые проведен гистологический анализ структуры маргинальной зоны печени, тонкого кишечника и поджелудочной железы двухлетних особей стерляди. Уточнена и дополнена информация о таксономических особенностях адаптационных изменений тканевых составляющих органов системы пищеварения в условиях замкнутого водообеспечения.

Практическая значимость. Полученная информация представляет ценность в морфофизиологических исследованиях, а также в рыбоводной практике в связи с существующей современной проблемой понижения жизненного статуса маточных стад осетровых рыб в акваториях различного происхождения и целевого назначения. Использование полученных данных позволяет качественно произвести отбор рыб с целью достижения в условиях замкнутого водообеспечения нормального репродуктивного потенциала.

Ключевые слова: стерлядь, стресс, адаптация, печень, поджелудочная железа, кишечник, клеточная функция, условия замкнутого водообеспечения.

BIOMONITORING OF POST-STRESS ADAPTIVE CHANGES IN THE DIGESTIVE ORGANS OF STERLET IN CONDITIONS OF A RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM

A. Kozij, kozij67@gmail.com, Kherson State Agrarian University, Kherson

Purpose. To analyze the peculiarities of post-stress adaptive changes in the digestive system of sterlet at the micro level in conditions of a recirculating aquaculture system. To investigate the dynamics of changes in the cellular composition of the liver, small intestine and pancreas during the adaptation period. To determine the prospect of using the data of histological monitoring in fish breeding practice in order to assess the morphological and functional status of fish.

Methodology. Primary materials were obtained in the conditions of an experimental private enterprise "Oasis Bisan". Cameral processing of ichthyological samples was carried out in accordance with generally recognized methods and guidelines. Histological studies were carried out using in-house equipment and original techniques specially designed for the diagnosis of fish tissue. The obtained results were processed by the methods of variation statistics using MS Excel with an emphasis on standard errors.

Findings. Microanatomical studies showed that the adaptation of sterlet to the conditions of a recirculating aquaculture system after transportation was 12 days. According to the monitoring results, the most contrasting adaptive changes to new conditions of captivity were noted in the marginal zone of the liver, the small intestine and the pancreas. Under the potential effect of a stress factor, a shift in cell function was noted in the form of shifts in cytological characteristics in the liver. An increase in the linear dimensions of hepatocytes by 1.54 times adequately leads to an increase in the values of the parameters of nuclei by 1.44 times. This is an indicator of a change in the character of intracellular metabolism. Low values of the number of intracellular cavities at the beginning of adaptation are a direct evidence of attenuation of the lipostatic function of hepatocytes. Low values of the "nucleolus/nucleus" diameter ratio (0.40 and 0.41) indicate a change in cellular function in the form of increased glycogen synthesis. During the period of action of the stress factor, the absorption of the components of the chyme in the small intestine occurs with less intensity. Local accumulation of absorbed particles in the cytoplasm indicates a slowdown in digestive processes. After 8 days, under adequate conditions of feeding and maintenance in the mucous membrane of the small intestine, the appearance of goblet glandulocytes can be observed. This fact indicates the

normalization of intestinal functioning. The initial period of adaptation practically coincides with the peak of the maximum stress state. At this moment, attenuation of the secretory activity of the pancreas was observed. A significant decrease in the intensity of zymogen biosynthesis leads to the predominance of acinocytes in the volume of the homogeneous pole over the zymogen pole. In the process of adaptation of fish to new conditions of feeding and keeping, acinocytes acquire a specific form. Proteinases and lipases at the end of the secretory cycle of cells exist mainly in an active form and are detected by light-optical methods in the form of a mass of zymogenic granules.

Originality. The paper presents new and significantly updated existing data on the adaptation of sterlet organs and tissues under stress and post-stress adaptation. For the first time, a comparative histological analysis of the structure of the marginal zone of the liver, small intestine and pancreas of age-1+ sterlet individuals was carried out. The information on the taxonomic peculiarities of adaptive changes in the tissue components of the digestive system organs in conditions of a recirculating aquaculture system has been clarified and supplemented.

Practical value. The information obtained is valuable in morphophysiological studies, as well as in fish-breeding practice in connection with the existing modern problem of lowering the vital status of sturgeon broodstock in waters of various origins and purposes. The use of the obtained data makes it possible to qualitatively select fish in order to achieve normal reproductive potential under conditions of a recirculating aquaculture system.

Key words: sterlet, stress, adaptation, liver, pancreas, intestines, cellular function, conditions of a recirculating aquaculture system.

БИОМОНІТОРИНГ ПОСТСТРЕСОВИХ АДАПТИВНИХ ЗМІН ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ СТЕРЛЯДІ В УМОВАХ ЗАМКНЕНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. М. Козій, kozij67@gmail.com, Херсонський державний аграрний університет,
м. Херсон

Мета. Проаналізувати особливості постстресових адаптивних змін органів травлення стерляді на мікрорівні в умовах замкнутого водозабезпечення. Дослідити динаміку змін клітинного складу печінки, тонкого кишечника та підшлункової залози протягом періоду адаптації. Визначити перспективу використання даних гістологічного моніторингу в рибецькій практиці з метою оцінки морфофункціонального статусу риб.

Методика. Первинні матеріали отримані в умовах експериментального приватного підприємства «Оазис Бісан». Камеральна обробка іхтіологічних зразків виконана відповідно до загальноновизнаних методик і посібників. Гістологічні дослідження здійснені з використанням авторського обладнання та оригінальних методик, спеціально призначених для діагностики тканин риб. Отримані результати обробляли методами варіаційної статистики з використанням пакету відповідних прикладних програм «Microsoft Excel», з акцентуванням уваги на похибки середніх величин.

Результати. Мікроанатомічні дослідження дозволили встановити, що адаптація стерляді до умов УЗВ після транспортування склала 12 діб. За результатами моніторингу, найбільш контрастні пристосувальні зміни до нових умов утримання відзначені в маргінальній зоні печінки, тонкому відділі кишечника, підшлунковій залозі.

При потенційному впливі стресового чинника, в печінці риб відзначається зміщення функції клітин у вигляді зрушень цитологічних характеристик. Зростання значень лінійних розмірів гепатоцитів в 1,54 раза адекватно призводить до збільшення значень параметрів ядер в 1,44 раза. Це є показником зміни характеру внутрішньоклітинного метаболізму. Низькі значення кількості внутрішньоклітинних порожнин на початку адаптації є прямим доказом згасання ліпостатичної функції гепатоцитів. Низькі значення відношення діаметра «ядерце/ядро» (0,40 і 0,41) свідчать про зміну клітинної функції у вигляді активізації синтезу глікогену.

В період дії стресового чинника всмоктування компонентів хімусу в тонкому кишечнику

відбувається з меншою інтенсивністю. Локальна акумуляція поглинених часточок в цитоплазмі вказує на уповільнення процесів травлення. Через 8 діб, за адекватних умов годівлі та утримання, в слизовій оболонці тонкого кишечника можна спостерігати появу келихоподібних гландулоцитів. Даний факт свідчить про нормалізацію функціонування кишечника.

Початковий період адаптації практично збігається з піком максимуму стресового стану. У цей момент у риб відмічено згасання секреторної активності підшлункової залози. Істотне зниження інтенсивності біосинтезу зимогену призводить до переважання в об'ємі гомогенного полюсу ациноцитів над зимогенним полюсом. У процесі адаптації риб до нових умов годівлі та утримання ациноцити набувають специфічного вигляду. Протеїнази і ліпази в кінці секреторного циклу клітин існують переважно в активній формі, що виявляється світлооптичними методами у вигляді скупчення зимогенових гранул.

Наукова новизна. Представлені нові, а також істотно оновлені існуючі дані щодо адаптації органів і тканин стерляді в умовах стресової дії і постстресових адаптації. Вперше проведено гістологічний аналіз структури маргінальної зони печінки, тонкого кишечника та підшлункової залози дворічних особин стерляді. Уточнено і доповнено інформацію про таксономічні особливості адаптаційних змін тканинних складових органів системи травлення в умовах замкнутого водозабезпечення.

Практична значимість. Отримана інформація становить цінність в морфологічних дослідженнях, а також для рибницької практики в зв'язку з існуючою сучасною проблемою зниження життєвого статусу маточних стад осетрових риб в акваторіях різного походження та цільового призначення. Використання отриманих даних дозволяє якісно провести відбір риб з метою досягнення в умовах замкнутого водозабезпечення нормального репродуктивного потенціалу.

Ключові слова: стерлядь, стрес, адаптація, печінка, підшлункова залоза, кишечник, клітинна функція, умови замкнутого водозабезпечення.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

В настоящее время развитие осетроводства и искусственного воспроизводства фактически невозможно без формирования собственных ремонтно-маточных стад. Чаще всего в заводских условиях этот процесс осуществляется посредством выращивания рыб «от икры» до продуктивного состояния [16, 19]. Гораздо реже, по причине малочисленности естественных популяций осетровых рыб пользуются методом domestikации «диких» производителей [1, 3, 6]. В свое время, существовало ошибочное мнение относительно длительности сроков адаптации осетровых рыб после транспортировки с целью дальнейшего их содержания в промышленных условиях [18]. Сравнительно недавно, проблема формирования ремонтно-маточных стад при смене условий кормления и содержания осетровых рыб в пределах разных рыбоводных предприятий была достаточно дискуссионной [12, 23]. Полагалось, что в основе адаптации рыб после транспортировки лежит сложный процесс, который как с биологической, так и с экономической точки зрения неоправдан [22].

Анализ литературных данных в отношении изучаемого вопроса позволяет заключить, что в целях оценки физиологического состояния маточных стад в экстремальных условиях используется широкий спектр методов [2, 9, 24]. Применяемые в рыбоводстве биохимические исследования ориентированы на выявление аминокислотного и минерального состава мяса и икры рыб,

гематологические — на выявление динамичности форменных элементов и химического состава и плазмы крови в период критических нагрузок на организм [8, 13, 15, 20]. Рядом проведенных в данном направлении экспериментов было убедительно доказано, что в условиях заводского кормления и содержания нормальное протекание адаптации у рыб находится в зависимости от функционального состояния желудочно-кишечного тракта, что, в свою очередь, имеет связь с определенными морфологическими изменениями на уровне крови [17].

Общеизвестно, что выявление механизмов адаптации рыб к факторам различного происхождения является одним из ключевых моментов в решении проблемы взаимодействия организма и среды обитания. В рыбоводных исследованиях наиболее востребованными являются морфологические и гистологические показатели [10, 11]. Наряду с известными маркерами, органы пищеварительного тракта являются важными индикаторами состояния организма. В условиях стрессовых нагрузок на функциональные системы, для кишечника и пищеварительных желез рыб характерна определенная реактивность, что, в свою очередь, согласуется с резервами функциональной способности. Как правило, последняя активизируется в виде разноплановых морфологических перестроек слизистой кишечника и паренхимы желез [4]. В ихтиологических исследованиях данная составляющая имеет теоретическую значимость, что дает возможность использовать ее при оценке функционального статуса рыб.

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕРЕШЕННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Как показывает сложившаяся практика, при учете большого количества накопленного фактического материала применение в промышленных условиях к осетровым рыбам микроанатомического мониторинга в настоящее время осуществляется далеко не в полной мере [5]. В частности, исследования зачастую фрагментарны, ограничиваются рамками обзора, что порождает дефицит информации относительно целостности картины происходящих изменений [21]. В результате нерегулярной периодичности проводимого мониторинга констатируется лишь конечный результат [7].

Становится очевидным, что в целях компенсации информационного пробела, в отношении изучаемого вопроса необходим комплексный подход с расширением диапазона исследований. Обоснованность данного подхода состоит в том, что функциональная лабильность организма наиболее ощутимо проявляется в раннем постнатальном онтогенезе, преимущественно в виде адаптивных перестроек тканевых составляющих. Скорость приспособительных реакций особей к новым условиям содержания в определенный критический период значительно варьирует, что происходит на фоне подавления темпа клеточной дифференциации. В свою очередь, это влечет за собой резкое ухудшение состояния здоровья, что отражается на качественных характеристиках маточного стада. Микроанатомическое изучение ряда органов и тканей как своеобразных индикаторов стресса позволяет в пределах функциональных систем максимально детализировать картину направленности адаптационных процессов и связанных с ними структурных изменений в организме рыб. Оперирование подобного рода данными позволяет своевременно избежать больших производственных затрат.

Таким образом, учитывая вышесказанное, установления критериев нормы морфофункционального состояния стерляди в промышленных условиях в совокупности с микроанатомическими исследованиями пищеварительной системы имеет большое теоретическое и научно-прикладное значение. Озвученные выше концепции сформулировали основную цель и задачи исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа выполнялась в рамках плана Научно-исследовательских программ ГВУЗ-а «Херсонский аграрный университет» по теме «Микроанатомическая характеристика ихтиофауны внутренних водоемов разного происхождения и целевого назначения» (№ госрегистрации 0117U002809).

В основу работы легли результаты исследований, проведенных в осенний период 2018 г. С целью оценки уровневых изменений тканевых и клеточных составляющих органов пищеварительной системы, произошедших на фоне стресса (вылов и транспортировка из производственно-экспериментального Днепровского осетрового рыбозавода), мы исследовали 10 двухлетних самок стерляди с максимально приближенными линейными размерами.

Сбор материалов осуществлялся в условиях экспериментального ЧП «Оазис Бисан» (УЗВ) при температуре воды в бассейнах 24-26°C, а обработка — в лаборатории ихтиологии Херсонского ГАУ. Видовую принадлежность, возраст исследуемых особей устанавливали по современным определителям [9], которые являются общепризнанными в практике ихтиологических исследований. Принадлежность к полу при этом не учитывалась.

За основу микроанатомической оценки полученного материала была взята структура печеночной паренхимы и поджелудочной железы. Поскольку объекты исследования относятся к желудочным рыбам, гистологическому анализу были подвергнуты также участки тонкого отдела кишечника, как наиболее показательного в отношении реакции на присутствие химуса во время стресса. Камеральную обработку материала проводили в условиях лаборатории гистологии цитологии и эмбриологии Черноморского национального университета имени Петра Могилы. Использовано оборудование и методики, специально предназначенные для гистологической диагностики тканей гидробионтов животного происхождения [10], с привлечением оптической аппаратуры «E. Leitz «Diaplan» Wetzlar», галогенного осветителя «Linvaltec-2» (США) номинальной мощностью 10–240 Вт.

Контрастирование гистологических препаратов выполняли с помощью корректирующих фильтров «ЖЗМ 2,5^x», «MONOCHROM 2,5^x» (Белоруссия). Микрофотографирование гистологических срезов выполняли цифровой камерой «Nikon D-60» (Австрия), с применением стандартной тринокулярной насадки 1,6^x и встроенного цифрового определителя экспозиции съемки «Minolta-EK» (Япония).

Общие морфометрические исследования тканевых структур выполнены при помощи встроенного окуляр-микрометра.

Получение достоверной информации в определении направленности и

специфики тканевых перестроек достигались с применением метода пластической реконструкции. Сущность метода заключается в выполнении тонких (3,0 мкм), пространственно ориентированных гистологических срезов с последующим синтезом объемного изображения («MICAM» (Бельгия)).

Корректирующая обработка микроснимков проведена с помощью компьютерных программ «Microsoft Office Picture Manager» и «FS Viewer». Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики с использованием пакета прикладных программ «Microsoft Excel» с акцентированием внимания на ошибки средних величин [14].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты микроанатомических исследований позволили установить, что адаптация двухлетних особей стерляди к условиям УЗВ составила 12 суток. На протяжении указанного периода наиболее контрастные приспособительные изменения к новым условиям содержания были отмечены в маргинальной зоне печени. В частности, специфические изменения гепатоцитов обнаруживались в виде неравномерности, либо же в полном отсутствии вакуолизации цитоплазмы, что отличается от нормы (рис. 1).

Рис. 1. Структура маргинальной зоны паренхимы печени двухлетней особи стерляди в начальном периоде адаптации. Гепатоциты в стадии профаза (телофаза)

Fig. 1. The structure of the marginal zone of the liver parenchyma of a two-year-old sterlet in the initial period of adaptation. Hepatocytes in the prophase (telophase)

Согласно содержанию рисунка 1, гепатоциты приобрели форму, близкую к кубической. Ядра клеток умеренно гиперхроматичные по отношению к основному красителю. Примечательной особенностью данной микрокартины

является умеренное расширение синусоидов. Отдельные гепатоциты пребывают в стадии профазы (или средней телофазы).

При потенциальном воздействии стрессового фактора на организм рыб отмечается смещение функции клеток, что сопровождается сдвигами цитологических характеристик. В период адаптации показатели цитоструктуры нормализуются (табл. 2).

Таблица 2. Динамика изменения цитоструктуры маргинальной зоны печени двухлетних особей стерляди при адаптации в условиях УЗВ. $M \pm m$, $n = 10$

Table 2. Dynamics of changes in the cytostructure of the marginal zone of the liver of two-year-old sterlet individuals during adaptation in the conditions of CWS. $M \pm m$, $n = 10$

Период адаптации / Adaptation period	Показатели / Indicators				
	Размер клеток, мкм / Cell size, μm	Размер ядра, мкм / Nucleus size, μm	Отношение диаметра «ядро/клетка» / The ratio of the diameter of the "nucleus/cell"	Отношение диаметра «ядрышко/ядро» / The ratio of the diameter of the "nucleolus /nucleus"	Количество внутриклет. полостей, % / Number of intracellular cavities, %
1 сутки / 1 day	7,93 $\pm$ 3,54	4,01 $\pm$ 0,29	0,39 $\pm$ 0,41	0,40 $\pm$ 0,26	2,46 $\pm$ 0,71
4 сутки / 4 day	8,13 $\pm$ 2,26	4,04 $\pm$ 0,07	0,45 $\pm$ 0,32*	0,41 $\pm$ 0,12	3,52 $\pm$ 0,95
8 сутки / 8 day	10,45 $\pm$ 2,14*	4,69 $\pm$ 0,81	0,47 $\pm$ 0,23*	0,42 $\pm$ 0,29	9,27 $\pm$ 5,12***
12 сутки / 12 day	12,24 $\pm$ 3,12**	5,78 $\pm$ 0,77*	0,51 $\pm$ 0,29**	0,43 $\pm$ 0,21*	10,47 $\pm$ 4,13***

Примечание.* — $P < 0,1$; ** — $P < 0,01$; *** — $P < 0,001$.

Note. * — $P < 0,1$; ** — $P < 0,01$; *** — $P < 0,001$.

Анализ данных представленной таблицы позволяет заключить, что увеличение значения линейных размеров клеток в 1,54 раза (что статистически достоверно) адекватно приводит к увеличению значения параметров ядер (в 1,44 раза, соответственно), что является показателем изменения характера внутриклеточного метаболизма. Низкие значения (2,46 и 3,52%) количества внутриклеточных полостей, наблюдаемые в первые 4 суток от начала адаптации, являются прямым доказательством затухания липостатической функции гепатоцитов. Аналогичным образом, довольно низкие значения отношения диаметра «ядрышко/ядро» (0,40 и 0,41) свидетельствуют о смене клеточной функции в виде активизации синтеза гликогена. Указанный факт подтверждается также исчезновением в клетках типичной монохромазии. Усиление синтетической функции визуально определяется появлением специфической зернистости и «насыщенности» цитоплазмы.

В конце периода адаптации (10 сутки) печень рыб приобретает общие для *Teleostei* микроструктурные признаки (рис. 2).

Рис. 2. Структура паренхимы печени (маргинальная зона) двухлетней особи стерляди. Норма. Конечная фаза адаптации: 1 — гепатоцит; 2 — синусоид; 3 — венула

Fig. 2. The structure of the liver parenchyma (marginal zone) of a two-year-old sterlet. Norm. The final phase of adaptation: 1 — hepatocyte; 2 — sinusoids; 3 — venule

Из представленного рисунка 2 видно, что паренхима маргинальной зоны органа образована узкими балками, сформированными отходящими от центральной вены радиальными тяжами гепатоцитов. Показано также, что в норме цитоплазма печеночных клеток, как правило, умеренно ацидофильная. Цитоплазма содержит множество мелких вакуолей. Ядра гепатоцитов округлые (реже — эллиптические), с отчетливо различимыми глыбками хроматина и ориентированные преимущественно центрально. Печеночные балки тесно перевиваются с синусоидными капиллярами, имеющими вид узких щелей между тяжами гепатоцитов. Ядра эндотелия синусоидов вытянутые, иногда палочковидные, местами выступают в просвет сосуда.

Гепатоциты обращены одной стороной к синусоидам, другой — к желчным капиллярам, что полностью соответствует общему плану гистологического строения печени представителей *Chordata*. Использование эффективного метода пластической реконструкции позволило установить, что гистологическая структура печени стерляди неоднородна, однако без каких-либо резких границ условно поделена на три зоны. Клетки маргинальной зоны содержат в том или ином количестве липидные вакуоли, медиальной зоны — преимущественно синтезируют гликоген, каудальной зоны — интенсивно синтезируют и секретируют желчь. Исследование серийных гистосрезов позволило установить, что, что в норме аккумуляция липидов, синтез гликогена и секреция желчи у стерляди происходят с различной интенсивностью, отчего фактически существует смещение определенной функции, приводящее к узкой клеточной специализации в пределах отдельно взятой зоны.

Внешний вид гепатоцитов соответствует их функциональному назначению, что в целом свойственно рыбам. В норме, клетки маргинальной зоны преимущественно полигональной формы. Их цитоплазма чаще всего содержит определенное количество включений, что отвечает различным фазам липидной аккумуляции.

Наблюдения показывают, что в самом начале периода адаптации рыбы неохотно поедали корма. В данной связи, реакция составляющих кишечной трубки рыб в начальный период адаптации носит достаточно специфический характер (рис. 3).

Рис. 3. Измененная структура тонкого отдела кишечника двухлетней особи стерляди в начальном периоде адаптации: 1 — щеточная кайма; 2 — энтероциты; 3 — скопления пищеварительных вакуолей; 4 — собственная пластинка слизистой оболочки

Fig. 3. Changed structure of the small intestine of a two-year old sterlet in the initial period of adaptation: 1 — brush border; 2 — enterocytes; 3 — accumulations of digestive vacuoles; 4 — own plate of the mucous membrane

Судя по содержанию рисунка 3, в период действия стрессового фактора рыб всасывание и клеточное переваривание компонентов химуса происходят с гораздо меньшей интенсивностью, что само по себе физиологически оправдано. Свидетельством тому является локальная аккумуляция крупных пищеварительных вакуолей в цитоплазме, что дополнительно указывает на замедление пищеварительных процессов. Высота клеточного пласта слизистой уменьшилась, ядра приобрели скорее базальную ориентацию, щеточная кайма прерывиста.

Установлено, что на 8 сутки адаптации, при адекватных условиях кормления и содержания, микроанатомическая картина тонкого кишечника стерляди претерпела определенные изменения (рис. 4).

Рис. 4. Структура тонкого отдела кишечника двухлетней особи стерляди в норме. Вторая половина периода адаптации: 1 — щеточная кайма; 2 — энтероциты; 3 — бокаловидные glandулоциты; 4 — собственная пластинка слизистой оболочки

Fig. 4. The structure of the small intestine of a two-year-old sterlet is normal. Second half of the adaptation period: 1 — brush border; 2 — enterocytes; 3 — goblet glandulocytes; 4 — own plate of the mucous membrane

Согласуясь с данными рисунка 4, можно заключить, что энтероциты слизистой оболочки кишечной складки сравнительно высокие, с отчетливо выраженной непрерывающейся щеточной каймой. Ядра клеток ориентированы преимущественно центрально, что является свидетельством адекватного всасывания и переваривания эпителиоцитами химуса. В правой части указанного рисунка можно видеть ряд бокаловидных glandулоцитов на стадии накопления мукоидного секрета, который по мере высвобождения обеспечивает продвижение химусовых масс вдоль пищеварительного канала.

В начальный период адаптации (что практически совпадает с пиком максимума стрессового состояния), у рыб в системе органов пищеварения отмечено затухание секреторной активности желез. В рассматриваемом случае, это показательно проявляется на примере структуры поджелудочной железы (рис. 5).

Анализ содержания рисунка 5 показывает, что клетки (ациноциты), образующие концевые отделы экзокринной части органа, высокие, конусовидные. Ядра их округлые, с ясными глыбками хроматина, ориентированы к базальной части клеток. Апикальные концы клеток оксифильные, базальные концы приобретают тон основного красителя. Концевой отдел и дольки железы окружены прослойками рыхлой соединительной ткани. Отмечено, что в период воздействия стрессового фактора интенсивность биосинтеза зимогена существенно снижена, вследствие чего гомогенный полюс ациноцитов преобладает в объеме над зимогенным.

Рис. 5. Измененная структура поджелудочной железы двухлетней особи стерляди в начальном периоде адаптации: 1 — капилляр; 2 — однородный полюс ациноцита; 3 — зимогенный полюс ациноцита

Fig. 5. Altered structure of the pancreas of a two-year old sterlet in the initial period of adaptation: 1 — capillary; 2 — homogeneous pole of acinocyte; 3 — zymogenic pole of acinocyte

К числу характерных признаков нормализации функционального состояния ациноцитов относится наблюдаемая в апикальной части клеток обширная «пенистость» цитоплазмы (рис. 6).

Рис. 6. Структура поджелудочной железы двухлетней особи стерляди в конечном периоде адаптации: 1 — капилляр; 2 — зимогенный полюс ациноцита; 3 — однородный полюс ациноцита.

Fig. 6. The structure of the pancreas of a two-year-old sterlet in the final period of adaptation: 1 — capillary; 2 — zymogenic pole of acinocyte; 3 — homogeneous acinocyte pole

Согласно полученной информации, специфический вид ациноцитов обусловлен тем, что в процессе адаптации рыб к новым условиям кормления и содержания протеиназы и липазы модифицируются и в конце секреторного цикла существуют преимущественно в активной форме. Светооптическими методами они выявляются в виде массы зимогенных гранул (см. рис. 6).

Анализ полученного фактического материала показывает, что морфофункциональное состояние органов и тканей позволяет судить о способности объектов аквакультуры адекватно реагировать на воздействие стрессовых факторов. Наблюдения показывают, что наиболее ощутимые трансформации тканевых составляющих выявляются у рыб, находящихся под влиянием смены параметров среды обитания. Полученные нами данные определенно схожи с таковыми проведенных ранее экспериментов [7, 17], однако при этом показывают специфичность реакции в заводских условиях, что у стерляди из естественных акваторий практически нивелировано.

Поэтапное изучение серий гистологических препаратов позволило выявить в отношении рыб как общие, так и специфические черты реакции клеток и тканей. При нахождении стерляди в условиях УЗВ, на фоне стабильных гидрологических (гидрохимических) показателей и адекватной кормовой базы, в маргинальной зоне печени были выявлены совпадения значений константы Гертвига (ядерно-цитоплазматического отношения) гликогенсодержащих и липосодержащих гепатоцитов, что исключает наличие признаков клеточной патологии. В то же время, изменение значения линейных размеров клеток при адекватном изменении значения параметров ядер прямо указывает на изменение характера внутриклеточного метаболизма. Снижение количества внутриклеточных полостей является доказательством нивелирования и последующего затухания липостатической функции и активизации синтеза гликогена, что естественно востребовано ввиду его дефицита в условиях стресса. На клеточном уровне это подтверждается исчезновением типичной монохроматии и появлением специфической зернистости цитоплазмы, что также является свидетельством переориентации механизмов тканевого метаболизма [4].

Следовало ожидать, что нормализация функционального состояния органов пищеварения у стерляди произойдет синхронно. В действительности, секреторная активность панкреатических структур проявилась после инициации и становления нормальной клеточной активности слизистой оболочки тонкого кишечника. Подобного характера физиологическая картина не свойственна для безжелудочных рыб [17], что, на наш взгляд, необходимо учитывать при выборе схемы кормления, особенно в периоды адаптации и подготовки к нересту.

С нашей точки зрения, представляет интерес пребывание отдельных гепатоцитов на стадии профазы (или же средней телофазы). Представляется очевидным, что их нахождение в условиях колебаний цитоструктуры печени указывает, с одной стороны, на стабилизацию процесса смещения клеточной функции и, с другой стороны, — отображает видоспецифическую вариабельность адаптационных потенциалов организма. В данном направлении наши результаты обнаруживают отдельные несоответствия с таковыми у стерляди из естественных акваторий [24].

Сопоставляя собственные и имеющиеся в доступной литературе данные [16],

можно заключить, что в биологическом мониторинге изучением стрессовой реактивности и адаптации органов на тканевом и клеточном уровнях пренебрегать нельзя. Поскольку организм гидробионтов животного происхождения особенно чувствителен к изменению параметров среды обитания, качественные изменения клеточного состава провоцируют расширение диапазона индивидуальной реакции тканей, а вместе с тем адекватный ответ составляющих жизненно важных систем на воздействие стрессового фактора. В данной связи, у стерляди (УЗВ) следует отметить отсутствие характерного для рыб естественных акваторий застоя желчи, сопровождаемого расширением билиарных протоков, а также разноплановые нарушения в развитии гонад. Последнее обстоятельство в прогнозе позволяет качественно произвести отбор стерляди с целью достижения в условиях замкнутого водообеспечения нормального репродуктивного потенциала маточного стада.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

В условиях стресса достижение экстремальных уровней в микроструктуре органов демонстрирует адекватность отдельных сторон метаболизма в виде адаптивного ответа их составляющих на физиологический статус организма в целом.

Специфичность реакции маргинальной зоны печени проявляется в виде увеличения диаметра клеток и ядер, что сопоставимо с интерфазным протеканием процессов репарации и свидетельствует о повышении адаптационных возможностей особей.

Смена среды обитания приводит у рыб к переориентации отдельных сторон клеточного метаболизма, что определяет балансный характер содержания в гепатоцитах липидов, с последующей компенсацией дефицита гликогена как основного источника энергии.

Признаки нормализации функции ациноцитов поджелудочной железы стерляди выражаются в уменьшении объема гомогенного полюса, что обусловлено интенсивностью биосинтеза зимогена в связи с предшествующей активизацией функции клеточного состава слизистой тонкого кишечника.

Представленная фактическая информация дает возможность использования полученного материала не только в морфофизиологических исследованиях, но также и в практике осетроводства в связи с существующей проблемой снижения жизненного статуса особей в условиях стресса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абросимова Н. А., Лобзакова Т. В. Первый опыт domestikации диких осетровых рыб на Донском ОРЗ // Научные подходы к решению проблем производства продуктов питания : межвузовский сборник научных трудов. Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 2004. С. 107—111.
2. Алдохин А. С., Волосников Г. И. Сравнительный анализ морфометрических показателей стерляди зимовальных ям Нижнего Иртыша // Вестник АГТУ. 2018. № 4. С. 90—95. (Серия : Рыбное хозяйство).
3. Бахарева А. А., Грозеску Ю. Н., Сырбулов Д. Н. Опыт domestikации «дикой» стерляди в условиях рыбоводного комплекса на Волжской ГЭС // Повышение

- эффективности использования водных биологических ресурсов Мирового океана : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Москва, 2005. С. 131—133.
4. Бедняков Д. А., Федорова Н. Н., Неваленная Л. А. Сравнительная характеристика гистологического строения кишечного эпителия осетровых рыб и их гибридов // Вестник АГТУ. 2012. № 1. С. 121—124 (Серия : Рыбное хозяйство).
 5. Васильева Л. М., Кашеева А. Н., Астафьева С. С. Сравнительная оценка репродуктивной функции доместичированных самок русского осетра // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК — продукты здорового питания. 2014. № 4. С. 28—33.
 6. Грозеску Ю. Н., Бахарева А. А., Сырбулов Д. Н. Технологические системы для формирования и содержания ремонтно-маточных стад стерляди // Рыбное хозяйство. 2009. № 5. С. 47—49.
 7. Дубровская А. В., Шевелева Н. Н., Романов А. А. Гистоморфологические исследования некоторых органов и тканей осетровых в морской и речной период жизни // Рыбохозяйственные исследования на Каспии : Результаты НИР за 2000 год. Астрахань : КаспНИРХ, 2001. С. 407—411.
 8. Егорова В. И., Наумова В. В., Кирьянов Д. А. Ветеринарно-санитарная оценка качества и безопасности товарной стерляди, выращенной с использованием рециркуляционных технологий // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2018. № 4. С. 111—116 (Серия : Рыбное хозяйство).
 9. Калайда М. Л., Говоркова Л. К. Методы рыбохозяйственных исследований. Санкт-Петербург : Проспект науки, 2013. 288 с.
 10. Козий М. С. Оценка современного состояния гистологической техники и пути усовершенствования изучения ихтиофауны. Херсон : Олди-плюс, 2009. 310 с.
 11. Козий М. С. Гистоморфологические особенности ихтиофауны Юга Украины. Херсон : Олди-плюс, 2011. 180 с.
 12. Кокоза А. А. Искусственное воспроизводство осетровых рыб. Астрахань : АГТУ, 2004. 208 с.
 13. Корчунов А. А., Металлов Г. Ф., Григорьев В. А. Динамика биохимического состава тела и половых продуктов стерляди (*Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758) естественных популяций и выращенных в установках замкнутого водоснабжения // Вестник АГТУ. 2012. № 1. С. 136—143 (Серия : Рыбное хозяйство).
 14. Лакин Г. Ф. Биометрия. Москва : Высшая школа, 1990. 293 с.
 15. Наумова В. В., Кирьянов Д. А., Свешникова Е. В. Безопасность стерляди, выращенной в условиях УЗВ // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. С. 81—85.
 16. Пономарев С. В., Иванов Д. И. Осетроводство на интенсивной основе : учебник. Москва : Колос, 2009. 312 с.
 17. Свешникова Е. В., Наумова В. В., Кирьянов Д. А. Сравнительная характеристика использования обменной энергии карпа и толстолобика // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. № 3. С. 179—182.
 18. Строганов Н. С. Акклиматизация и выращивание осетровых рыб в прудах. Москва : МГУ, 1968. 254 с.

19. Сырбулов Д. Н., Николаев А. И., Дудин К. В. Формирование ремонтно-маточного стада — путь гарантированного получения молоди волжских осетровых // Рыбное хозяйство 2005. № 4. С. 22—23.
20. Хрусталева Е. И., Курапова Т. М., Гончаренко О. Е. Корма и кормление в аквакультуре. Санкт-Петербург : Лань, 2017. 388 с.
21. Чемагин А. А. Обзор некоторых аспектов экологии стерляди (*Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758) // Вестник АГТУ. 2018. № 2(66). С. 115—122.
22. Чипинов В. Г., Пономарев С. В., Чипинова Г. М. Руководство по формированию маточного стада осетровых рыб методом domestikации. Астрахань, 2004. 24 с.
23. Шевченко В. Н., Емелин М. В. Современное состояние ремонтно-маточного стада осетровых рыб, формируемого на НЭБ «БИОС» // Рыбохозяйственные исследования в низовьях реки Волги и Каспийском море : сборник научных трудов. Астрахань, 2012. С. 184—187.
24. Lenhardt M., Prokes M., Jaric I. Comparative analysis of morphometric characters of juvenile starlet *Acipenser ruthenus* L. from natural population and aquaculture // Journal of Fish Biology. 2005. № 65. P. 320—320.

REFERENCES

1. Abrosimova, N. A., & Lobzakova, T. V. (2004). Ervyj opyt domestikaczii dikikh osetrovyykh ryb na Donskom ORZ. *Mezhvuzovskij sbornik nauchnykh trudov: Nauchnye podkhody k resheniyu problem proizvodstva produktov pitaniya*. Rostov-na-Donu: Rostovskogo universiteta, 107-111.
2. Aldokhin, A. S., & Volosnikov, G. I. (2018). Sravnitelnyj analiz morfometricheskikh pokazatelej sterlyadi zimovalnykh yam Nizhnego Irtysha. *Vestnik AGTU, seriya: Rybnoe khozyajstvo*, 4, 90-95.
3. Bakhareva, A. A., Grozesku, Yu. N., & Syrbulov, D. N. (2005). Opyt domestikaczii «dikoj» sterlyadi v usloviyakhrybovodnogo kompleksa na Volzhskoj GES. *Materialy Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konf.: Povyshenie effektivnosti ispolzovaniya vodnykh biologicheskikh resursov Mirovogo okeana*. Moskva, 131-133.
4. Bednyakov, D. A., Fyodorova, N. N., & Nevalyonnaya, L. A. (2012). Sravnitel'naya kharakteristika gistologicheskogo stroeniya kishechnogo epiteliya osetrovyykh ryb i ikh gibridov. *Vestnik AGTU. Seriya: Rybnoe khozyajstvo*, 1, 121-124.
5. Vasileva, L. M., Kashheeva, A. N., & Astaf'eva, S. S. (2014). Sravnitel'naya ocenka reprodutivnoj funkczii domesticirovannykh samok russkogo osetra. *Tekhnologii pishhevoj i pererabatyvayushhej promyshlennosti APK — produkty zdorovogo pitaniya*, 4, 28-33.
6. Grozesku, Yu. N., Bakhareva, A. A., & Syrbulov D. N. (2009). Tekhnologicheskie sistemy dlya formirovaniya i soderzhaniya remontno-matochnykh stad sterlyadi. *Rybnoe khozyajstvo*, 5, 47-49.
7. Dubrovskaya, A. V., Sheveleva, N. N., & Romanov, A. A. (2001). Gistomorfologicheskie issledovaniya nekotorykh organov i tkanej osetrovyykh v morskoy i rechnoj period zhizni. *Rybokhozyajstvennye issledovaniya na Kaspii: Rezultaty NIR za 2000 god*, 407-411.
8. Egorova, V. I., Naumova, V. V., & Kiryanov, D. A. (2018). Veterinarno-sanitarnaya ocenka kachestva i bezopasnosti tovarnoj sterlyadi, vyrashhennoj s ispolzovaniem recirkulyacionnykh tekhnologij. *Vestnik Astrakhanskogo*

- gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Rybnoe khozyajstvo, 4, 111-116.
9. Kalajda, M. L., & Govorkova, L. K. (2013). *Metody rybokhozyajstvennykh issledovaniy*. Sankt-Peterburg: Prospekt nauki.
 10. Kozij, M. S. (2009). *Oценка современного sostoyaniya gistologicheskoy tekhniki i puti usovershenstvovaniya izucheniya ikhtiofauny*. Kherson: Oldi-plyus.
 11. Kozij, M. S. (2011). *Gistomorfologicheskie osobennosti ikhtiofauny Yuga Ukrainy*. Kherson: Oldi-plyus.
 12. Kokoza, A. A. (2004). *Iskusstvennoe vosproizvodstvo osetrovyykh ryb*. Astrakhan: AGTU.
 13. Korchunov, A. A., Metallov, G. F., & Grigor'ev, V. A. (2012). Dinamika biokhimicheskogo sostava tela i polovykh produktov sterlyadi (*Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758) estestvennykh populyaczij i vyrashhennykh v ustanovkakh zamknutogo vodosnabzheniya. *Vestnik AGTU. Seriya: Rybnoe khozyajstvo*, 1, 136-143.
 14. Lakin, G. F. (1990). *Biometriya*. Moskva: Vysshaya shkola.
 15. Naumova, V. V., Kir'yanov, D. A., & Sveshnikova, E. V. (2017). Bezopasnost sterlyadi, vyrashhennoj v usloviyakh UZV. *Vestnik Ulyanovskoy gosudarstvennoj sel'skokhozyajstvennoj akademii*, 81-85.
 16. Ponomarev, S. V., & Ivanov, D. I. (2009). *Osetrovodstvo na intensivnoj osnove*. Moskva: Kolos.
 17. Sveshnikova, E. V., Naumova, V. V., & Kir'yanov, D. A. (2019). Sravnitel'naya kharakteristika ispolzovaniya obmennoj energii karpa i tolstolobika. *Vestnik Ulyanovskoy gosudarstvennoj selskokhozyajstvennoj akademii*, 3, 179-182.
 18. Stroganov, N. S. (1968). *Akklimatizatsiya i vyrashhivanie osetrovyykh ryb v prudakh*. Moskva: MGU.
 19. Syrbulov, D. N., Nikolaev, A. I., & Dudin, K. V. (2005). Formirovanie remontno-matochnogo stada — put garantirovannogo polucheniya molodi volzhskikh osetrovyykh. *Rybnoe khozyajstvo*, 4, 22-23.
 20. Khrustalev, E. I., Kurapova, T. M., & Goncharenok, O. E. (2017). *Korma i kormlenie v akvakulture*. Sanlt-Peterburg: Lan.
 21. Chemagin, A. A. (2018). Obzor nekotorykh aspektov ekologii sterlyadi (*Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758). *Vestnik AGTU*, 2(66), 115-122.
 22. Chipinov, V. G., Ponomaryov, S. V., & Chipinova, G. M. (2004). *Rukovodstvo po formirovaniyu matochnogo stada osetrovyykh ryb metodom domestikaczii*. Astrakhan.
 23. Shevchenko, V. N., & Emelin, M. V. (2012). Sovremennoe sostoyanie remontno-matochnogo stada osetrovyykh ryb, formiruемого na NEB «BIOS». *Sbornik nauchnykh trudov: Rybokhozyajstvennye issledovaniya v nizovyakh reki Volgi i Kaspijskom more*, 184-192.
 24. Lenhardt, M., Prokes, M., & Jaric, I. (2005). Comparative analysis of morphometric characters of juvenile starlet *Acipenser ruthenus* L. from natural population and aquaculture. *Journal of Fish Biology*, 65, 320-320.

ДЕЯКІ ЦИТОМЕТРИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КАРАСЯ СРІБЛЯСТОГО (*CARASSIUS GIBELIO* BLOCH, 1782) Р. САМАРА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

К. А. Машкова, Tonks1511@gmail.com, Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Т. С. Шарамок, sharamok@i.ua, Дніпровський національний університет імені
Олеся Гончара, м. Дніпро

Мета. Визначити наявність функціональних змін у цитометричних та біохімічних показниках крові карася сріблястого р. Самара в умовах антропогенного навантаження.

Методика. Об'єктом дослідження були шестирічні особини обох статей карася сріблястого (*Carassius gibelio* (Bloch, 1782)). Матеріал для дослідження збирали за допомогою зябрових сіток під час проведення науково-дослідних ловів у літньо-осінній період упродовж 2019 р. Кров відбирали з хвостової вени. Морфологічні дослідження еритроцитів проводились на мазках крові, які фарбували за Романовським-Гімзою. Мазки крові досліджували при збільшенні об'єктиву 40X з використанням мікрофотозйомки цифровою камерою «Sciencelab T500 5.17 М». На препаратах проглядали 150 полів зору. Біохімічні дослідження проводили на автоматичних аналізаторах «OLYMPUS» AU400 та AU480 фірми «BeckmanCoulter» (США), реагентами «BeckmanCoulter». Статистичне опрацювання отриманих даних здійснювали за загальноприйнятими методами із застосуванням програми «MS Excel 2010».

Результати. Було виявлено, що у шестирічок карася сріблястого (*Carassius gibelio* (Bloch, 1782)) р. Самара в умовах антропогенного навантаження виявлені високі показники вмісту глюкози (28,5–37,4 ммоль/л) та спостерігалось підвищення активності АЛТ (46,5–52,8 ОД/л) і АСТ (85,1–100,5 ОД/л) у крові, що є свідченням формування адаптації до шкідливих чинників середовища. Максимальними ці показники спостерігались у риб, виловлених поблизу м. Новомосковська. Цитометричний аналіз показав статистично достовірне збільшення ядерної маси, розмірів еритроцитів та збільшення ядерно-плазматичного відношення клітин червоної крові карася сріблястого, виловленого поблизу с. Хащове та м. Новомосковська, що вказує на пригнічення функціональної активності еритроцитів. Значення альбумін-глобулінового коефіцієнта (0,6) та коефіцієнта де Рітца (1,8–1,9) у карася сріблястого в усіх дослідних точках р. Самара вказують на початок формування патологічних процесів в печінці та серці.

Наукова новизна. Дослідження цитометричних та біохімічних показників крові карася сріблястого р. Самара Дніпропетровської області, зважаючи на значне антропогенне навантаження на річку у даному регіоні, проводиться вперше.

Практична значимість. Отримані дані можуть бути використані для проведення гідроекологічного моніторингу природних водойм, а також визначення рівня впливу антропогенних чинників на стан здоров'я промислових видів прісноводних риб.

Ключові слова: карась сріблястий, цитометричні показники, біохімія крові, патології еритроцитів, ядерно-цитоплазматичне відношення.

SOME CYTOMETRIC AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF THE BLOOD OF PRUSSIAN CARP (*CARASSIUS GIBELIO* BLOCH, 1782) OF THE SAMARA RIVER, DNEPROPETROVSK REGION

K. Mashkova, Tonks1511@gmail.com, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipro

T. Sharamok, sharamok@i.ua, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipro

Purpose. To determine the presence of functional changes in the cytometric and biochemical parameters of the blood of Prussian carp of the Samara River under conditions of human impact.

Methodology. The object of the study was age-6 Prussian carp (*Carassius gibelio* (Bloch, 1782)) of both sexes. The material for the study was collected with the use of gill nets during scientific fishing in the summer-autumn period in 2019. Blood was collected from the caudal vein. Morphological studies of erythrocytes were carried out on blood smears, which were stained according to Romanovsky-Giemsa. Blood smears were studied at 40X magnification using a photomicrograph with a Sciencelab T500 5.17 M digital camera. On the preparations, 150 visual fields were examined. Biochemical studies were carried out on automatic analyzers OLYMPUS AU400 and AU480 from BeckmanCoulter (USA), using BeckmanCoulter reagents. Statistical processing of the data obtained was carried out according to generally accepted methods in MS Excel 2010.

Findings. Age-6 Prussian carp (*Carassius gibelio* (Bloch, 1782)) of the Samara river, under conditions of anthropogenic impact, were found to have an increase in their glucose content (28.5 - 37.4 mmol/l), as well as an increase in ALT (46.5 - 52.8 U/L) and AST (85.1 - 100.5 U/L) activities in blood that may indicate the formation of certain protective mechanisms for adaptation to the effects of harmful environmental factors. These parameters were highest in specimens caught near Novomoskovsk. Cytometric analysis showed a statistically significant increase in the nuclear weight, the size of erythrocytes and an increase in the nuclear-plasma ratio of red blood cells of fish caught near the village Khashchove and Novomoskovsk. It can indicate the inhibition of the functional activity of erythrocytes. The value of the albumin-globulin coefficient (0.6) and the de Ritis coefficient (1.8 - 1.9) of Prussian carp at all experimental points of the Samara river indicates the beginning of the formation of certain pathological processes in their liver and heart.

Originality. The study of cytometric and biochemical parameters of the blood of Prussian carp of the Samara river of the Dnepropetrovsk region subjected to the significant human impact was performed for the first time

Practical value. The data obtained can be used to conduct hydroecological monitoring of natural water bodies and to determine the degree of the effect of various anthropogenic factors on the health and productivity of commercial freshwater fish species.

Key words: Prussian carp, cytometric parameters, blood biochemistry, pathology of erythrocytes, nuclear-cytoplasmic ratio.

НЕКОТОРЫЕ ЦИТОМЕТРИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КАРАСЯ СЕРЕБРЯНОГО (*CARASSIUS GIBELIO* BLOCH, 1782) Р. САМАРА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

К. А. Машкова, Tonks1511@gmail.com, Днепропетровский национальный университет им. Олеса Гончара, г. Днепр

Т. С. Шарамок, sharamok@i.ua, Днепропетровский национальный университет им. Олеса Гончара, г. Днепр

Цель. Определить присутствие функциональных изменений в цитометрических и биохимических показателях крови карася серебряного р. Самара в условиях антропогенного воздействия.

Методика. Объектом исследования были шестилетки особей обоих полов карася серебряного (*Carassius gibelio* (Bloch, 1782)). Материал для исследований собирали с помощью жаберных сеток во время проведения научно-исследовательских ловов в летне-осенний период в течение 2019 г. Кровь отбирали из хвостовой вены. Морфологические исследования эритроцитов проводились на мазках крови, которые окрашивали по Романовскому-Гимзе. Мазки крови изучали при увеличении объектива 40X с использованием микрофото съемки цифровой камерой «Sciencelab T500 5.17 М». На препаратах просматривали 150 полей зрения. Биохимические исследования проводили на автоматических анализаторах «OLYMPUS» AU400 и AU480 фирмы «BeckmanCoulter» (США), реагентами «BeckmanCoulter». Статистическая обработка полученных данных проводилась по общепринятым методам с использованием программы «MS Excel 2010».

Результаты. Выявлено, что у шестилеток карася серебряного (*Carassius gibelio* (Bloch, 1782)) р. Самара в условиях антропогенного воздействия возрастали показатели содержания глюкозы (28,5–37,4 ммоль/л), а также наблюдалось повышение активности АЛТ (46,5–52,8 ОД/л) и АСТ (85,1–100,5 ОД/л) в крови, что может свидетельствовать о формировании определенных защитных механизмов для адаптации к воздействию вредных факторов среды. Максимальными эти показатели были у рыб, выловленных вблизи г.Новомосковска. Цитометрический анализ показал статистически достоверное повышение ядерной массы, размеров эритроцитов и увеличение ядерно-плазматического соотношения клеток красной крови карася серебряного, выловленного возле с. Хащевое и г. Новомосковска, что указывает на угнетение функциональной активности эритроцитов. Значение альбумин-глобулинового коэффициента (0,6) и коэффициента де Ритуса (1,8–1,9) у карася серебряного на всех опытных точках р. Самара указывает на начало формирования определенных патологических процессов в печени и сердце.

Научная новизна. Исследование цитометрических и биохимических показателей крови карася серебряного р. Самара Днепропетровской области, ввиду значительной антропогенной нагрузки на реки в данном регионе, проводится впервые.

Практическое значение. Полученные данные могут быть использованы для проведения гидроэкологического мониторинга естественных водоемов, а также определения степени влияния различных антропогенных факторов на состояние здоровья и продуктивность промысловых видов пресноводных рыб.

Ключевые слова: серебряный карась, цитометрические показатели, биохимия крови, патологии эритроцитов, ядерно-цитоплазматическое отношение.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Згідно з останніми даними, потреба населення України у продукції рибогосподарської галузі поступово зростає. На території Дніпропетровської області на сьогодні є 5 основних промислових видів риби, серед яких пріоритетним є карась сріблястий (*Carassius gibelio* (Bloch, 1782)) [8].

У той же час, Дніпропетровщина має могутній промисловий потенціал, зумовлений розвитком металургійної, гірничо-добувної, хімічної та інших галузей [24]. Цей факт значною мірою впливає на гідрохімічний стан річок регіону, і, відповідно, на продуктивність промислових видів риби.

Слід зазначити, що до природних водойм регіону потрапляє велика кількість промислових стоків, завислих речовин як органічного (хімічні, біологічні, бактеріальні), так і неорганічного походження. Джерелом такого забруднення є заводи, підприємства АПК, як великі, так і малі фермерські господарства, тваринницькі ферми [18]. Розміщення даних господарств уздовж річок сприяє

тому, що відходи від їх виробництва надходять у водну екосистему, змінюючи температурний та гідрохімічний режим.

Важливим при цьому є використання методів дослідження, які дозволять виявити на ранніх стадіях зміни фізіологічного стану риби, пов'язані з іншим харчуванням, хімічними параметрами води, наявністю чи відсутністю інфекційних захворювань. Дослідження гематологічних параметрів є важливим інструментом діагностики не лише забруднення навколишнього середовища, а й рівня захворюваності. У поєднанні з іншими методами дослідження характеризують толерантність організму риб, а, отже, і швидкість їх росту та продуктивність [2].

Кровоносна система риб є надзвичайно чутливою до вмісту у воді забруднювальних речовин. Зростання рівня ксенобіотиків, важких металів та гербіцидів у водоймі значною мірою впливає на біохімічні та цитометричні показники крові, оскільки ці речовини мають властивість до накопичення в організмі. На жаль, більшість поллютантів, на відміну від важких металів, не мають чітко визначених нормативів вмісту, незважаючи на те, що впливають на продуктивність риб [9, 21].

Гематологічні дослідження дозволяють визначити рівень адаптації риб в умовах досліджуваних водойм. Аналіз картини крові також може бути використано у якості еталону еколого-фізіологічного стану риб в умовах значного антропогенного навантаження на водойму [19]. Проте, вивчення цитометричних та біохімічних показників крові риб для визначення екологічного стану водойм та їх придатності для рибогосподарської діяльності використовується мало [21].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Річка Самара є джерелом водопостачання для промислових та сільськогосподарських підприємств області. Екологічне навантаження на басейн р. Самара є одним з найбільш напружених в Україні. Розвиток хімічної та важкої промисловості, сільського господарства та висока щільність населення, поряд із застарілою природоохоронною інфраструктурою, надають особливої гостроти водоохоронній проблемі в цьому регіоні. Надмірне техногенне навантаження протягом останніх десятиріч призвело до катастрофічного виснаження та забруднення водних ресурсів басейну р. Самари [23, 25].

У зв'язку із збільшенням впливу людини на водні екосистеми, порушенням гідрохімічного режиму та надходженням у водойми значної кількості поллютантів, необхідно виявити зв'язок між екологічними параметрами середовища існування та показниками крові риб, оскільки знання діапазонів їх змін має діагностичну цінність при оцінках ступеня забруднення водного середовища [22].

На сьогодні інформація щодо патологічних процесів на клітинному та системному рівні, які викликані впливом негативних чинників середовища на фізіологічний стан риби р. Самара, досить обмежена і стосується лише Самарської затоки Запорізького водосховища [19, 21–23].

Метою нашої роботи було визначення наявності функціональних змін у цитометричних та біохімічних показниках крові карася сріблястого р. Самара в умовах антропогенного навантаження.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Річка Самара — це ліва притока р. Дніпро. На території України бере свій початок на західних схилах Донецького кряжу. Далі її русло проходить Придніпровською низовиною і в межах м. Дніпро річка впадає у Запорізьке (Дніпровське) водосховище. Довжина р. Самара складає 311 км, площа басейну — 22660 км². Похил річки — 0,33 м/км. Ширина річки зростає від 2,5 до 12,0 км. Пригирлова ділянка р. Самари затоплена водами Самарської затоки.

Уздовж свого русла має багато населених пунктів та закладів рекреації, тому активно використовується для міського та промислового водопостачання, а також потреб сільського господарства [12]. Для всіх створів р. Самара характерне високе забруднення води завислими речовинами, залізом, нафтопродуктами, ХСК. У більшості створів річки вміст марганцю, нікелю, кобальту та кадмію перевищує нормативи рибогосподарських ГДК. В деяких точках р. Самари відмічається підвищений вміст нітритів та амонію [24]. Мінералізація води р. Самари досить висока — від 1750 до 2447 мг/дм³.

Наші дослідження проводилися на трьох ділянках, що мають різне антропогенне навантаження, вздовж акваторії р. Самара — с. Хащове, м. Новомосковськ та с. Новоселівка (рис. 1).

Поряд з точкою поблизу с. Хащове, на правому березі р. Самара, розташовані три бази відпочинку та фермерське господарство. Новомосковськ — це місто обласного підпорядкування, адміністративний центр Новомосковського району. Розташоване на правому березі р. Самари. Окрім цього, вздовж річки розміщені численні бази відпочинку та дитячі табори. Стічні води міської каналізації також надходять у р. Самару. Вздовж русла річки поблизу точки с. Новоселівка, на лівому березі р. Самара, знаходяться бази відпочинку та туристичний комплекс.

Рис. 1. Контрольні точки відбору проб на р. Самара

Fig. 1. Sampling points on the Samara river

Об'єктом дослідження були шестирічні особини обох статей карася сріблястого (*Carassius gibelio* (Bloch, 1782)). Матеріал для дослідження збирали за допомогою зябрових сіток. Було здійснено три науково-дослідні лови у літньо-осінній період упродовж 2019 р. В кожному лові було відібрано по 100 шестирічних особин карася сріблястого. Кров відбирали з хвостової вени. Морфологічні дослідження еритроцитів проводили на мазках крові, які фарбували за Романовським-Гімзою. Мазки крові досліджували при збільшенні об'єктива 40X з використанням мікрофотозйомки цифровою камерою «Sciencelab T500 5.17 М». На препаратах проглядали 150 полів зору. При цьому визначали наступні показники: великий повздовжній (D) та малий поперечний (d) діаметри зрілих еритроцитів, площу еритроцита (S), площу ядра еритроцита (s), ядерно-цитоплазматичне співвідношення (s/S), периметр еритроцита (P).

Біохімічні дослідження проводили на автоматичних аналізаторах «OLYMPUS» AU400 та AU480 фірми «BeckmanCoulter» (США), реагентами «BeckmanCoulter». Методи визначення активності аланінамінотрансферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ) та вмісту загального білка, альбуміну, глобуліну, сечовини та креатиніну засновані на рекомендаціях Міжнародної Федерації Клінічної Хімії (IFCC).

Статистичне опрацювання отриманих даних здійснювали за загальноприйнятими методами із застосуванням програми «MS Excel 2010».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

За біохімічними показниками крові риб можливо отримати інформацію про стан водної екосистеми. Кровоносна система швидко реагує на дію несприятливих чинників та може слугувати одним і ранніх показників погіршення здоров'я риб за умов забруднення навколишнього середовища. Це дозволяє не лише оцінювати та прогнозувати екологічні наслідки порушення якості водного середовища, але й розробляти методи оптимізації якості рибної продукції у водоймах [3].

Концентрація білка та його фракцій в сироватці крові часто використовується в якості надійного індикатора здоров'я риби. На основі аналізу вмісту білка у крові можливо зробити висновок, що на коливання його рівня значною мірою впливає інтенсивність і характер живлення, а також процеси метаболізму в організмі риби. Високий рівень вмісту загального білка в межах фізіологічної норми є позитивним показником, оскільки різке зменшення його кількості впливає на життєздатність риби і може призвести до її загибелі. В свою чергу, занижений рівень білка вказує на виснаження, наявність інфекційних захворювань та патологічних процесів в нирках [5].

За результатами досліджень, найвищий рівень загального білка в сироватці крові карася сріблястого виявлений в районі м. Новомосковськ — 43,6 г/л, а мінімальний — в районі с. Хащове — 38,8 г/л.

Слід зазначити, що показники вмісту загального білка в особин, відібраних з уловів на дослідних точках, не виходили за межі фізіологічної норми (27,0–56,0 г/л), проте були досить високими [13]. У риб з різних досліджуваних ділянок частка альбуміну від загального білка складала 40% при нормі 55%, а частка глобуліну становила 60% від загального білка за норми 45%.

Примітка. * — різниця між показниками статистично достовірна при $P \leq 0,05$

Notes. * — the difference between the indicators is statistically significant when $P \leq 0,05$

Рис. 2. Вміст загального білка в сироватці крові карася сріблястого

Fig. 2. The content of protein in the Prussian carps blood serum

Згідно з літературними даними, зменшення вмісту альбумінової і збільшення — глобулінової фракції пов'язують як із наявністю запальних процесів, так і з дією паразитів на організм риби [27].

Для характеристики білкового метаболізму при аналізі отриманих результатів було використано альбумін-глобуліновий коефіцієнт, що є комплексним показником для визначення активності процесів катаболізму та анаболізму. Значення даного коефіцієнта в нормі коливається в межах 1,2–2,2. В діагностиці найбільше значення має зменшення А/Гк. Це можливо при зменшенні вмісту альбумінів, підвищенні вмісту глобулінів крові або одночасно обох цих явищ за умови переважання якогось одного.

Оскільки альбуміни синтезуються гепатоцитами печінки, зниження їх рівня може бути наслідком порушення білоксинтетичної функції печінки або хвороби нирок. Під час запалення інфекційної природи спостерігається підвищення рівня глобулінів. Отже, зниження А/Гк можливе за патологічних станів або тривалого голодування [11].

Альбумін-глобуліновий коефіцієнт у карася сріблястого в усіх дослідних точках знаходився на рівні 0,6, що свідчить про наявність патологічних процесів печінки або нирок.

Концентрація у крові глюкози та загального білка характеризує рівень вуглеводного та білкового обміну [7]. За даними деяких авторів [5], вміст даних речовин на рівні 27,0–56,0 г/л для загального білка та 1,5–4,0 ммоль/л для глюкози вказує на нормальний перебіг процесів метаболізму, а також на високу неспецифічну резистентність організму риби.

Рівень глюкози в крові карася сріблястого р. Самара був майже вдвічі вищим порівняно з нашими попередніми дослідженнями [20]. Різке перевищення

глюкозою рівня фізіологічної норми свідчить про стан гострого або хронічного стресу у риби [5]. Максимальний вміст глюкози спостерігався у сироватці крові карася, виловленого в районі м. Новомосковська та був достовірно вищим порівняно з рибами, виловленими поблизу с. Новоселівка та с. Хашове — на 23,8 та 31,2% відповідно (рис. 3).

Примітка. * — різниця між показниками статистично достовірна при $P \leq 0,05$

Notes. * — the difference between the indicators is statistically significant when $P \leq 0,05$

Рис. 3. Вміст глюкози в сироватці крові карася сріблястого

Fig. 3. The content of glucose in the Prussian carps blood serum

Креатинін — важлива речовина, що бере участь у процесах скорочення м'язів, вивільнюється і з током крові транспортується до нирок, звідки виводиться разом з сечовиною. У нормі креатинін повністю виводиться з сечею з організму, тому збільшення його концентрації в сироватці крові свідчить про зниження фільтраційної функції нирок. Підвищений рівень креатиніну також спостерігається в крові риб, які піддаються впливу нітратів [4].

Вміст креатиніну у сироватці крові карася сріблястого р. Самара достовірно не відрізнявся в точках відбору проб та коливався від 0,52 до 0,58 мкмоль/л (рис. 4).

Підвищення рівня сечовини у крові риб може бути наслідком патологій печінки, дисфункції нирок або зябер. Концентрація сечовини у сироватці крові коропових риб не повинна перевищувати 1,83–6,2 мкмоль/л. Збільшення вказаного показника свідчить про недостатню видільну здатність нирок і порушення їх фільтрації [1].

Рівень вмісту сечовини в сироватці крові карася сріблястого з усіх досліджуваних ділянок знаходився у межах норми. Слід зазначити, що максимальним цей показник був у крові карася, виловленого поблизу м. Новомосковськ — 2,8 мкмоль/л, а найменшим — поблизу с. Новоселівка — 2,15 мкмоль/л. Різниця була достовірною та складала 21,8–30,2% між вмістом сечовини у риб з різних ділянок р. Самара.

Примітка. * — різниця між показниками статистично достовірна при $P \leq 0,05$

Notes. * — the difference between the indicators is statistically significant when $P \leq 0,05$

Рис. 4. Рівень вмісту сечовини та креатиніну в сироватці крові карася сріблястого

Figure: 4. Content level of urea and creatinine in the Prussian carps blood serum

АЛТ і АСТ — ензими печінки, що беруть участь не лише в амінокислотному обміні. Вони є маркерами, що свідчать про порушення роботи печінки та інших внутрішніх органів. Загалом, підвищення активності амінотрансфераз в сироватці крові свідчить про ушкодження гепатоцитів. Це явище спостерігається у риб під час значного забруднення водного середовища, а також під дією окремих токсикантів у лабораторних умовах [17].

Активність АСТ у сироватці крові карася сріблястого по всіх досліджуваних точках була досить високою. Найбільшим цей показник був у районі м. Новомосковськ, складаючи 100,5 Од/л. У карася, виловленого поблизу с. Хашчове та с. Новоселівка цей показник був нижчим на 14,5–15,3% (рис. 5). Подібна тенденція спостерігалась і за вмістом АЛТ в крові карася р. Самара. Активність аланінамінотрансферази у риб, виловлених поблизу с. Хашчове та с. Новоселівка, була меншою на 11 та 12% порівняно з одновіковими особинами, виловленими в районі м. Новомосковськ. Підвищення активності АЛТ і АСТ у крові карася сріблястого, виловленого поблизу м. Новомосковськ, може бути свідченням формування певних захисних адаптацій до шкідливих чинників середовища.

Для визначення можливого рівня ушкодження печінки використовували коефіцієнт де Рітиса — відношення аспартатамінотрансферази до аланінамінотрансферази. В умовах інтенсивного фізичного навантаження коефіцієнт де Рітиса характеризує активацію гліюкогенезу із використанням АЛТ [6].

За відношенням АСТ/АЛТ (коефіцієнт де Рітиса) можна робити висновок про рівень ураження органів. У нормі коефіцієнт де Рітиса дорівнює 1,30–1,75. Збільшення його значень свідчить про ураження серця (ушкодження міокарда), а зниження — про ураження печінки, зменшення її функціональної активності [9].

Примітка. * — різниця між показниками статистично достовірна при $P \leq 0,05$

Notes. * — the difference between the indicators is statistically significant when $P \leq 0,05$

Рис. 5. Активність АЛТ та АСТ в сироватці крові карася сріблястого

Fig. 5. Activity of alanine-aminotransferase (ALT) and aspartate-amino-transferase (AST) in the Prussian carps blood serum

Значення цього коефіцієнта було найбільшим у карася, виловленого в районі м. Новомосковськ, складаючи 1,9. У с. Хашчове та с. Новоселівка він був однаковим і становив 1,8. Такі дані вказують на початок формування патологічних процесів в серці риб.

Відомо, що еритроцити риб дуже чутливі до стану навколишнього середовища і реагують на зміну його екологічного стану морфофункціональними змінами. Ця властивість може бути використана у якості біоіндикації рівня токсичності водойми [10].

Дослідження цитометричних показників карася сріблястого дозволило виявити наявність відмінностей майже за всіма показниками (табл. 1). Виявлено збільшення розмірів клітин червоної крові у карася, виловленого поблизу с. Хашчове та м. Новомосковськ, порівняно з одновіковими особинами, що вилучені поблизу с. Новоселівка. Так, малий та великий діаметри ядра еритроцита були більшими на 24–31 та 16–22%, а площа та периметр ядра — на 38–50 і 18–26%. Збільшення ядерної маси є ознакою початку амітозу [22], який є одним з патоморфологічних станів клітин червоної крові, який може бути віднесено до проліферативних порушень клітини.

Різниця між площею еритроцитів та малим діаметром клітини карася сріблястого теж була достовірною на дослідних ділянках і складала 31–32 і 22–24% відповідно.

Площа поверхні еритроцитів характеризує інтенсивність обмінних процесів і загальний функціональний стан організму в певний період життя [16]. Зростання її може відбуватися за умов гіпоксії та інтоксикації організму.

Таблиця 1. Цитометричні показники клітин червоної крові карася сріблястого р. Самара

Table 1. Cytometric parameters of Prussian carps red blood cells from the Samara River

Показники / Indices		с. Хащове / Xashchove village	м. Новомосковськ / Novomoskovsk city	с. Новоселівка / Novoselivka village
Діаметр ядра, мкм / Diameter of the nucleus, μm	Малий, мкм / small, μm	$3,65 \pm 0,56^*$	$3,34 \pm 0,49^*$	$2,53 \pm 0,37^*$
	Великий, мкм / large, μm	$5,24 \pm 0,58^*$	$4,82 \pm 0,58^*$	$4,07 \pm 0,49^*$
Площа ядра, мкм ² / Area of the nucleus, μm^2		$17,65 \pm 3,57^*$	$14,23 \pm 2,85^*$	$8,78 \pm 1,73^*$
Периметр ядра, мкм / Perimeter of the nucleus, μm		$15,36 \pm 2,13^*$	$13,95 \pm 1,93^*$	$11,43 \pm 1,16^*$
Діаметр еритроцита, мкм / Diameter of the erythrocyte, μm	Малий, мкм / small, μm	$8,90 \pm 0,71^*$	$8,72 \pm 1,00^*$	$6,72 \pm 0,54^*$
	Великий, мкм / large, μm	$12,10 \pm 0,88$	$12,97 \pm 1,26$	$10,69 \pm 0,86$
Площа еритроцита, мкм ² / Area of the erythrocyte, μm^2		$90,98 \pm 9,01^*$	$89,24 \pm 9,25^*$	$61,48 \pm 8,14^*$
Периметр еритроцита, мкм / Perimeter of the erythrocyte, μm		$34,85 \pm 1,77$	$34,94 \pm 2,09$	$29,42 \pm 2,14$

Примітка. * — різниця між показниками статистично достовірна при $P \leq 0,05$ Notes. * — the difference between the indicators is statistically significant when $P \leq 0,05$

Ядерно-цитоплазматичне відношення — важлива морфологічна характеристика, що дозволяє оцінити рівень метаболізму, виявити появу компенсаторних реакцій. Вимірювання відношення площі ядра до площі цитоплазми дозволяє виявити запальні процеси та наявність пухлин.

Ядерно-цитоплазматичне співвідношення еритроцитів карася варіювало від 0,14 до 0,19 (рис. 6). Максимальним цей показник був у риб, виловлених поблизу с. Хащове. В інших значення його було меншим на 16–26%. Збільшене ядерно-цитоплазматичне відношення клітин червоної крові може свідчити про зменшення функціональної площі еритроцита, а, отже, пригнічення окисно-відновних процесів в ньому, та вказує на порушення його діяльності [21]. Також збільшення даного показника характеризується зменшенням вмісту гемоглобіну в крові досліджуваної риби, а, отже, може призвести до кисневого голодування і патологій серцево-судинної системи [26].

Примітка. * — різниця між показниками статистично достовірна при $P \leq 0,05$

Notes. * — the difference between the indicators is statistically significant when $P \leq 0,05$

Рис. 6. Ядерно-цитоплазматичне відношення еритроцитів карася сріблястого

Рис. 6. Nucleocytoplasmic late red of Prussian carps blood cells from the Samara River

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

У шестирічних особин карася сріблястого (*Carassius gibelio* (Bloch, 1782)) р. Самара в умовах антропогенного навантаження виявлені ознаки патологічних процесів печінки та серця.

Показники вмісту загального білка у особин, відібраних з уловів на різних дослідних точках, знаходилися у верхніх межах фізіологічної норми. При цьому зменшення вмісту альбумінової і збільшення — глобулінової фракції вказує на наявність запальних процесів в організмі риб. Зниження альбумін-глобулінового коефіцієнта у карася сріблястого в усіх дослідних точках за межі норми також свідчить про наявність патологічних процесів печінки або нирок.

Високий рівень глюкози та підвищення активності АЛТ і АСТ в сироватці крові карася, виловленого в районі м. Новомосковська, свідчить про стан гострого або хронічного стресу та формування захисних механізмів адаптації до шкідливих чинників середовища.

Цитометричний аналіз дозволив виявити статистично достовірне збільшення ядерної маси, розмірів еритроцитів та збільшення ядерно-плазматичного відношення клітин червоної крові карася сріблястого, виловленого поблизу с. Хашчове та м. Новомосковська, що вказує на пригнічення функціональної активності еритроцитів.

Згідно з отриманими даними цитометричних та біохімічних досліджень крові риб, найбільш сприятливими для фізіологічного стану карася сріблястого є умови водного середовища р. Самари поблизу с. Новоселівка.

Перспективою подальших досліджень є можливість використання біохімічних та цитометричних показників крові карася сріблястого для проведення гідроекологічного моніторингу природних водойм, а також визначення рівня впливу різних антропогенних чинників на стан здоров'я і продуктивність промислових видів прісноводних риб.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ali Alkaladi N. A. M., Nasr El-Deen Mohamed Afifi, Osama A. Abu Zinadah. Hematological and biochemical investigations on the effect of vitamin E and C on *Oreochromis niloticus* exposed to zinc oxiden an oparticles // Saudi Journal of Biological Sciences. 2015. Vol. 22(5). P. 556—563.
2. Fazio F. Fish hematology analysis as an important tool of aquaculture: A review // Aquaculture. 2019. Vol. 500. P. 237—242.
3. Comparative study of the biochemical and haematological parameters of four wild Tyrrhenian fishspecies / Fazio F. et al. // Veterinarni Medicina. 2013. Vol. 58. P. 576—581.
4. Raghavendra Kulkarni and Pruthviraj C. B. Blood Creatinine and some Enzyme Levels in Four Species of Indian Carp Fishes Collected from a Local Aquatic Body // International Letters of Natural Sciences. 2006. Vol. 60. P. 13—17.
5. Ахметова В. В., Васина С. Б. Оценка морфологической и биохимической картины крови карповых рыб, выращиваемых в ООО «Рыбхоз» Ульяновского района Ульяновской области // Физико-химическая биология. 2000. № 3. С. 53—58.
6. Вікуліна Г. В., Боровков С. Б. Діагностичне значення деяких біохімічних індексів крові та сечі // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2017. № 3. С. 118—121.
7. Воліченко Ю. М., Пентиліук С. І., Шерман І. М. Гематологічні показники крові цюголіток корошових риб (*Cyprinidae*), вирощених за пасовищною технологією в умовах півдня України // Рибогосподарська наука України. 2017. № 4. С. 90—99.
8. Глєбова Ю. А. Динаміка розвитку рибного господарства України у 2015–2018 роках // Рибогосподарська наука України. 2019. № 2. С. 5—20.
9. Гулієв Р. А., Мєлякіна Э. И. Некоторые биохимические показатели крови рыб дельты Волги // Вестник АГТУ. 2014. № 2. С. 85—91. (Серия : Рыбное хозяйство).
10. Курченко В.О., Шарамок Т.С., Маренков О.М. Вдосконалення способу фарбування мазків крові для визначення цитометричних показників крові риб // Біологічні системи. 2019. Т. 11, вип. 1. С. 15—18.
11. Макаренко Т. М., Радченко О. М. Співвідношення біохімічних показників крові в медичній практиці: клініко-діагностичне значення // Практикуючий лікар. 2017. Т. 6, № 2. С. 49—53.
12. Машкова К. А., Шарамок Т. С. Морфометричні показники карася сріблястого р. Самара Дніпропетровської області в умовах антропогенного навантаження // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : XII іхтіол. наук.-практ. конф. : матер. Дніпро, 2019. С. 138—141.
13. Машкова К. А., Шарамок Т. С. Біохімічні показники карася сріблястого річки Самара // Актуальні проблеми підвищення якості та безпеки виробництва й переробки продукції тваринництва. 2020. С. 250—251.

14. Пищенко Е. В. Гематология пресноводной рыбы : учебное пособие. Новосибирск : Новосиб. гос. аграр. ун-т, 2002. С. 16—17.
15. Маринич О. М. Географічна енциклопедія України : у 3 т. Київ : Українська Радянська Енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1989—1993.
16. Сементина Е. В. Ихтиогематологические показатели как критерий условий выращивания и обитания рыб : дис. ... канд. биол. наук : спец. 03.02.06 «Ихтиология». Калининград, 2011. 241 с.
17. Сигачева Т. Б., Чеснокова И. И., Гаврюсева Т. В. Характеристика некоторых биохимических показателей печени трех донных видов рыб Черного моря // Журнал эволюционной биохимии и физиологии рыб. 2020. Т. 56, № 1. С. 55—61.
18. Біохімічні показники крові коропа за дії стоків тваринницьких підприємств / Тупицька О. М. та ін. // Ветеринарна медицина. 2016. Вип. 102. С. 343—345.
19. Федоненко О. В., Маренков О. М. Біологічні основи зарибнення Запорізького (Дніпровського) водосховища // Рибогосподарська наука України. 2017. № 4. С. 42—52.
20. Fedonenko Olena, Sharamok Tetyana, Ananieva Tamila. Biochemical parameters of blood in fish from Zaporozhian Reservoir // International Letters of Natural Sciences. 2016. Vol. 51. P. 43—50.
21. Шарамок Т. С., Єсіпова Н. Б., Колесник Н. Л. Патоморфологічні та цитометричні показники клітин червоної крові дволіток карася сріблястого (*Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782)) за умови інтоксикації іонами міді // Рибогосподарська наука України. 2017. № 2. С. 98—108.
22. Еколого-гематологічна характеристика плітки звичайної (*Rutilus Rutilus* Linnaeus, 1758) Запорізького водосховища / Шарамок Т. С. та ін. // Біологічний вісник МДПУ імені Богдана Хмельницького. 2016. Вип. 6 (2). С. 303—310.
23. Яцюк М. В. Оцінка прогнозування та оптимізація гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на прикладі басейну р. Самари) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук. Київ, 2001. 19 с.
24. Пахніц О. В. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області за 2016 рік. Дніпропетровськ : Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 2017. С. 19—36.
25. Пахніц О. В. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області за 2017 рік. Дніпропетровськ : Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 2018. С. 20—33.
26. Омельковець Я. Порівняльно-морфологічне дослідження еритроцитів форелі струмкової, лина та сома звичайного // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 2. С. 64—71. (Біологічні науки).

REFERENCES

1. Ali Alkaladi, Nasr A. M., NasrEl-Deen, Mohamed Afifi, & Osama, A. Abu Zinadah. (2015). Hematological and biochemical investigations on the effect of vitamin E and C on *Oreochromis niloticus* exposed to zinc oxiden an oparticles. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 22(5), 556-563.
2. Fazio, F. (2019). Fish hematology analysis as an important tool of aquaculture: A review. *Aquaculture*, 500, 237-242.

3. Fazio, F., Marafioti, S., Arfuso, F., Piccione, G., & Faggio, C. (2013). Comparative study of the biochemical and haematological parameters of four wild Tyrrhenian fishspecies. *Veterinari Medicina*, 58, 576-581.
4. Raghavendra, Kulkarni, & Pruthviraj, C. B. (2016). Blood Creatinine and some Enzyme Levels in Four Species of Indian Carp Fishes Collected from a Local Aquatic Body. *International Letters of Natural Sciences*, 60, 13-17.
5. Akhmetova, V. V., & Vasina, S. B. (2000). Otsenka morfologicheskoy i biokhimicheskoy kartiny krovi karpovykh ryb, vyrashchivaemykh v OOO «Rybkhoz» Ul'yanovskogo rayona Ul'yanovskoy oblasti. *Fiziko-khimicheskaya biologiya*, 3, 53-58.
6. Vikulina, H. V., & Borovkov, S. B. (2017). Diahnostychnye znachennia deiakykh biokhimichnykh indeksiv krovi ta sechi. *Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii*, 3, 118-121.
7. Volichenko, Yu. M., Pentyliuk, S. I., & Sherman, I. M. (2017). Hematolohichni pokaznyky krovi tsoholitok koropovykh ryb (Cyprinidae), vyroshchennykh za pasovyshechnoiu tekhnolohiieiu v umovakh pivdnia Ukrainy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 90-99.
8. Hliebova, Yu. A. (2019). Dynamika rozvytku rybnoho hospodarstva Ukrainy u 2015–2018 rokakh. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 5-20.
9. Guliev, R.A., & Melyakina, E. I. (2014). Nekotorye biokhimicheskie pokazateli krovi ryb del'ty Volgi. *Vestnik AGTU. Seriya: Rybnoe khozyaystvo*, 2, 85-91.
10. Kurchenko, V. O., Sharamok, T. S., & Marenkov, O. M. (2019). Vdoskonalennia sposobu farbuвання mazkiv krovi dlia vyznachennia tsytometrychnykh pokaznykiv krovi ryb. *Biolohichni systemy*, 11, 1, 15-18.
11. Makarenko, T.M., & Radchenko, O.M. (2017). *Spivvidnoshennia biokhimichnykh pokaznykiv krovi v medychnii praktytsi: kliniko-diahnostychnye znachennia. Praktykuiuchy likar*, tom 6, №2. 2017. S 49 – 53.
12. Mashkova, K. A., & Sharamok, T. S. (2019). Morfometrychni pokaznyky karasia sribliastoho r. Samara Dnipropetrovskoi oblasti v umovakh antropohennoho navantazhennia. *Suchasni problemy teoretychnoi ta praktychnoi ikhtiologii: Materialy XII ikhtiologichnoi naukovo-praktychnoi konferentsii*. Dnipro, 138-141.
13. Mashkova, K. A., & Sharamok, T. S. (2020). Biokhimichni pokaznyky karasia sribliastoho richky Samara. *Aktualni problemy pidvyshchennia yakosti ta bezpeky vyrobnytstva y pererobky produktsii tvarynnytstva*, 250-251.
14. Pishchenko, E. V. (2002). *Gematologiya presnovodnoy ryby: uchebnoe posobie*. Novosibirsk: Novosib. gos. agrar. un-t, 16-17.
15. Marynych, O. M. (1989). Heohrafichna entsyklopediia Ukrainy. (Vol. 1-3). Kyiv: Ukrainska Radianska Entsyklopediia im. M.P.Bazhana, 1989-1993.
16. Sementina, E. V. (2011). Ikhtiogematologicheskie pokazateli kak kriteriy usloviy vyrashchivaniya i obitaniya ryb. *Candidate's thesis*. Kaliningrad.
17. Sigacheva, T. B., Chesnokova, I. I., & Gavryuseva, T. V. (2020). Kharakteristika nekotorykh biokhimicheskikh pokazateley pecheni trekh donnykh vidov ryb Chernogo morya. *Zhurnal evolyutsionnoy biokhimii i fiziologii ryb*, 56, 1, 55-61.
18. Tupytska, O. M., Klikh, L. V., Zakharenko, I. M., & Shabash, M. L. (2016). Biokhimichni pokaznyky krovi koropa za dii stokiv tvarynnytskykh pidpriemstv. *Veterynarna medytsyna*, 102, 343-345.
19. Fedonenko, O. V., & Marenkov, O. M. (2017). Biolohichni osnovy zarybnennia Zaporizkoho (Dniprovskoho) vodoskhovyscha. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 42-52.

20. Fedonenko, Olena, Sharamok, Tetyana, Ananieva, Tamila (2016). Biochemical parameters of blood in fish from Zaporozhian Reservoir. *International Letters of Natural Sciences*, 51, 43-50.
21. Sharamok, T. S., Yesipova, N. B., & Kolesnyk, N. L. (2017). Patomorfologichni ta tsytometrychni pokaznyky klityn chervonoï krovî dvolitok karasia sribliastoho (*Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782)) za umovy intoksykatsii ionamy midi. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 98-108.
22. Sharamok, T. S., Yesipova, N. B., Fedonenko, O. V., Biletska, O. V. (2016). Ekoloho-hematologichna kharakterystyka plitky zvychainoi (*Rutilus Rutilus* Linnaeus, 1758) Zaporizkoho vodoskhovyshcha. *Biologichnyi visnyk MDPU imeni Bohdana Khmelnytskoho*, 6 (2), 303-310.
23. Iatsiuk, M. V. (2001). Otsinka prohnouzuvannia ta optymizatsiia hidrokhimichnoho rezhymu v umovakh tekhnohenezu (na prykladi baseinu r. Samary). *Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv.
24. Pakhnits, O. V. (2017). *Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyscha v Dnipropetrovskii oblasti za 2016 rik*. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovska oblasna derzhavna administratsiia, 19-36.
25. Pakhnits, O. V. (2018). *Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyscha v Dnipropetrovskii oblasti za 2017 rik*. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovska oblasna derzhavna administratsiia, 20-33.
26. Omelkovets, Ya. (2016). Porivnialno-morfologichne doslidzhennia erytrotsytiv foreli strumkovoi, lyna ta soma zvychainoho. *Naukovyi visnyk Shhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky*, 2, 64-71.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІХТІОЛОГІЇ. ТЕМАТИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

І. Й. Грициняк, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Формування довідкового переліку україно- та російськомовних публікацій з питань застосування польових та лабораторних методів дослідження біологічних та екологічних характеристик риб, впливу окремих показників на їх промисел, методик оцінки стану іхтіофауни.

Методика. Під час системного пошуку у процесі підготовки тематичного переліку було застосовано як цілісний, так і вибіркового методи. Бібліографічне ядро складало виключно україно- та російськомовні наукові видання, наявні у фонді наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 211 джерел, що охоплюють часовий інтервал з 1946 по 2017 рр., та включають опис методів збору і обробки іхтіологічного матеріалу для визначення біологічних, морфометричних, екологічних показників риб, дослідження динаміки чисельності їх популяцій та прогнозування вилову. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Підготовлений список публікацій може бути використаний науковцями, практиками, студентами, до сфери інтересів яких належать питання іхтіології, рибництва, рибальства та гідроекології.

Ключові слова: популяції риб, промисел, біологія риб, рибопродуктивність, іхтіофауна.

RESEARCH METHODS IN ICHTHYOLOGY. THEMATIC BIBLIOGRAPHY

Ir. Hrytsyniak, library@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
T. Shvets, library@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Forming a thematic bibliographic list of publications on the use of field and laboratory methods for studying the biological and ecological characteristics of fish, the effect of individual indicators on their fishery, methods for assessing the status of ichthyofauna.

Methods. The complete and selective methods were applied in the process of the systematic search. The bibliographic core have been formed with the publications exclusively in Ukrainian and Russian from the fund of scientific library of the Institute of Fisheries NAAS of Ukraine.

Results. There was composed the thematic list of publications with a total quantity of 211 sources covering the time interval from 1946 to 2017, and containing a description of methods for collecting and processing ichthyological material to determine biological, morphometric, and

© І. Й. Грициняк, Т. М. Швець, 2020

ecological indicators of fish, to study the dynamics of their populations and to predict their catch. The literary sources are arranged in alphabetical order by author or title, and described according to DSTU 8302:2015 "Information and documentation. Bibliographic reference. General principles and rules of composition", with the amendments (code UKND 01.140.40), as well as in accordance with the requirements of APA style — international standard of references.

Practical value. *The list may be useful for scientists, practitioners, students, whose area of interests includes ichthyology, pisciculture, fisheries and hydroecology.*

Key words: *fish populations, fishing, fish biology, fish productivity, ichthyofauna.*

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИХТИОЛОГИИ. ТЕМАТИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Ир. И. Грициняк, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, г. Киев

Т. М. Швець, library@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, г. Киев

Цель. Формирование справочного перечня украино- и русскоязычных публикаций по вопросам применения полевых и лабораторных методов исследования биологических и экологических характеристик рыб, влияния отдельных показателей на их промысел, методик оценки состояния ихтиофауны.

Методика. В ходе системного поиска в процессе подготовки тематического перечня были применены как целостный, так и выборочный методы. Библиографическое ядро составляли исключительно украино- и русскоязычные научные издания, имеющиеся в фонде научной библиотеки Института рыбного хозяйства НААН Украины.

Результаты. Сформирован тематический библиографический перечень публикаций в количестве 211 источников, охватывающих временной интервал с 1946 по 2017 гг., и содержащих описание методов сбора и обработки ихтиологического материала для определения биологических, морфометрических, экологических показателей рыб, исследования динамики численности их популяций и прогнозирования вылова. Литературные источники размещены в алфавитном порядке по автору или названию, описаны согласно ДСТУ 8302:2015 «Інформація і документація. Бібліографічна посилка. Загальні положення і правила складання», с учетом поправок (код УКНД 01. 140. 40), а также в соответствии с требованиями к оформлению списка литературы по международному стандарту APA style.

Практическая значимость. Подготовленный список публикаций может быть использован учеными, практиками, студентами, в сферу интересов которых входят вопросы ихтиологии, рыбоводства, рыболовства и гидроэкологии.

Ключевые слова: популяции рыб, промысел, биология рыб, рыбопродуктивность, ихтиофауна.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аббасов Г. С., Поляков Г. Д. Оценка условий питания и биологического состояния стада рыб с помощью коэффициента упитанности // Вопросы ихтиологии. 1978. Т. 18, № 3. С. 444—459.
2. Аведикова Т. М., Козлитина С. В. К методике расчетов «абсолютной» численности и естественной убыли полупроходных рыб // Известия ГосНИОРХ. 1977. Т. 126. С. 76—82.
3. Аксенова Е. И., Идрисова Н. Х. Применение хлорофильного метода при изучении питания рыб // Гидробиологический журнал. 1978. Т. 14, № 5. С. 109—112.

4. Алдошина В. С. Методика анализа влияния природных факторов на экономическую эффективность промысла // Рыбное хозяйство. 1974. № 2. С. 78—80.
5. Андреев В. Л., Иванков В. Н. Опыт применения математических методов при анализе данных о строении яйцеклеток рыб для целей таксономии // Журнал общей биологии. 1981. Т. 42, № 1. С. 147—155.
6. Андреев В. Л., Решетников Ю. С. Исследование внутривидовой морфологической изменчивости сига *Coregonus lavaretus* (L.) методами многомерного статистического анализа // Вопросы ихтиологии. 1977. Т. 17, № 5. С. 862—878.
7. Антонюк А. В. Применение математических методов в прогнозировании уловов рыбы // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1983. Вып. 39. С. 51—57.
8. Артемьев Э. А., Юсупов Р. А. Оценка точности повременного метода учета молоди рыб // Рыбное хозяйство. 1997. № 4. С. 45—46.
9. Архипов А. Г., Ершова О. В., Чашин А. К. Оценка нерестового запаса рыб методом ихтиопланктонной съемки // Рыбное хозяйство. 1987. № 7. С. 36.
10. Бандура В. И., Шибяев С. В. Использование методов математического моделирования в целях определения параметров оптимального рыболовства на внутренних водоемах // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1986. Вып. 244. С. 4—37.
11. Баранова В. В. Применение комбинированного метода для оценки запасов плотвы // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1983. Вып. 202. С. 18—24.
12. Барулин Н. В. Идентификация пола осетровых рыб по костным пластинкам : монография. Горки : БГСХА, 2017. 408 с.
13. Бевертон Р. Х., Холт С. Дж. Обзор методов определения смертности облавливаемых популяций рыбы. Источники возникновения ошибок при взятии проб из уловов. Москва : Рыбное хозяйство ; ВНИРО, 1958. 58 с.
14. Белова Н. В. Некоторые методы изучения преднерестового и нерестового периодов жизни самцов рыб // Исследования размножения и развития рыб (методическое пособие). Москва : Наука, 1981. С. 58—66.
15. Бердичевский З. М., Ермольчев В. А., Теслер В. Д. Аппаратурный метод определения плотности разреженных и плотных скоплений рыб // Рыбное хозяйство. 1973. № 8. С. 40—43.
16. Билько В. П. Методы оценки жизнеспособности рыб в раннем онтогенезе // Гидробиологический журнал. 1992. Т. 28, № 4. С. 93—99.
17. Блинов В. В. О совершенствовании методов оценки и оптимизации селективности рыбного промысла // Рыбное хозяйство. 1984. № 3. С. 55—57.
18. Богданов Г. А. К методике оценки общего допустимого улова // Рыбное хозяйство. 2008. № 1. С. 65—67.
19. Борисов В. М. Изучение естественной смертности рыб и некоторые методы ее оценки : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Москва : ВНИРО, 1974. 27 с.
20. Борисовец Е. Э. Дискриминантный анализ проходных гольцов рода *Salvelinus* (*Salmonidae*) Чукотки // Вопросы ихтиологии. 1982. Т. 22, № 3. С. 365—373.
21. Брылиньска М., Брылиньски Э. Методы определения плодовитости рыб на примере леща *Salmonidae* // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 1. Вильнюс : Минтис, 1974. С. 45—56.

22. Брюзгин В. Л. Краткая методика обратных вычислений роста рыб по способу эмпирических шкал // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 1. Вильнюс : Минтис, 1974. С. 108—117.
23. Брюзгин В. Л. Методы изучения роста рыб по чешуе, костям и отолитам. Киев : Наукова думка, 1969. 188 с.
24. Ваганов Е. А. Склеритограммы как метод анализа сезонного роста рыб. Новосибирск : Наука, 1978. 136 с.
25. Веригина И. А., Ланге Н. О., Тимейко В. Н. Методы исследования пищеварительной системы рыб в онтогенезе // Исследования размножения и развития рыб (методическое пособие). Москва : Наука, 1981. С. 99—110.
26. Вершинин В. Г., Максименко В. П. К методике определения возраста вступления поколения в промысел // Рыбное хозяйство. 1984. № 9. С. 17.
27. Воловик С. П., Козлитина С. В., Жиликова Л. Ю. Планирование учетных ихтиологических съемок // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 141—145.
28. Вольскис Р. С. К методике исследования продуктивности промыслового вида рыб в пределах ареала // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 5. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1985. С. 112—129.
29. Вольскис Р. С. Метод комплексного исследования вида на всем пространстве ареала и его применение // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 3. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1978. С. 114—125.
30. Вольскис Р. С., Каминскене Б. А. Метод исследования плодовитости и ее зависимости от некоторых биологических параметров особей разных популяций вида // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 2. Вильнюс : Мокслас, 1976. С. 70—75.
31. Временная методика расчета национальных квот вылова осетровых рыб в Азовском море / Воловик С. П. и др. // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 232—238.
32. Вронский А. А., Николайчук Л. А., Белоусов А. Г. Метод исследования электрической активности осевой мускулатуры и кинематики плавания рыб // Вестник зоологии. 1983. № 6. С. 64—66.
33. Гершанович А. Д., Маркевич Н. Б., Дергалёва Ж. Т. Об использовании коэффициента упитанности в ихтиологических исследованиях // Вопросы ихтиологии. 1984. Т. 24, № 5. С. 740—752.
34. Гулидов М. В., Корде Б. А. Методы исследования развития и дыхания рыб в условиях различного газового режима в эмбриональных период жизни // Исследования размножения и развития рыб (методическое пособие). Москва : Наука, 1981. С. 149—184.
35. Гулин В. В. Методика определения абсолютной численности промыслового стада рыб, его размерно-возрастного состава, интенсивности промысла и коэффициентов уловистости экспериментальных орудий по результатам специального опытного лова // Известия ГосНИОРХ. 1974. Т. 90. С. 84—93.
36. Гулин В. В. Теоретическое обоснование и практическая разработка методов оценки общей, промысловой и естественной смертности рыб во внутренних водоемах // Известия ГосНИОРХ. 1971. Т. 73. С. 33—74.

37. Данилевский Н. Н., Новикова И. И. Метод количественного учета молоди кефали в Черном море // Рыбное хозяйство. 1976. № 4. С. 23—24.
38. Дгебуадзе Ю. Ю., Чернова О. Ф. Чешуя костистых рыб как диагностическая и регистрирующая структура. Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2009. 313 с.
39. Денисов Л. И. Методика прямого учета численности рыб на Каховском водохранилище // Известия ГосНИОРХ. 1977. Т. 126. С. 114—125.
40. Дислер Н. Н., Смирнов С. А. Методы изучения морфологии акустико-латеральной системы // Исследования размножения и развития рыб (методическое пособие). Москва : Наука, 1981. С. 88—99.
41. Діденко О. В. Використання емпіричних методів для оцінки природної смертності основних промислових видів риби Кременчуцького водосховища // Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 68—75.
42. Діденко О. В. Моделювання змін популяцій та запасів основних промислових видів риби Канівського та Кременчуцького водосховищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук. Київ : ІПГ УААН, 2008. 24 с.
43. Докукин М. М. Методика определения вероятной длины рыб, попадающих в рыбоотвод // Рыбное хозяйство. 1983. № 2. С. 71—72.
44. Дьяконов Ю. Н. К методу записи электрокардиограмм у рыб // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 4. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1981. С. 119—127.
45. Дячук И. Е. Методика обратных вычислений линейного роста леща Каховского водохранилища // Гидробиологический журнал. 1969. Т. 5, № 3. С. 81—87.
46. Есин Е. В. Сравнение разных методов количественного учёта молоди лососёвых рыб (*Salmonidae*) в малой реке Микочева (Западная Камчатка) // Вопросы ихтиологии. 2009. Т. 49, № 6. С. 800—808.
47. Євтушенко М. Ю., Худий О. І., Федоров В. І. Методологічні засади розробки програм системних моніторингових досліджень іхтіологічних комплексів // Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Вип. 416. С. 21—27.
48. Євтушенко М. Ю., Шевченко П. Г. Методи визначення характеристик головних угруповань гідробіонтів водних екосистем: Риби // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 156—193.
49. Жилукас В. Ю., Познанскене Д. А. Таблица для подсчета индекса видового разнообразия по Шэннону-Уиверу // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 5. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1985. С. 130—136.
50. Жиякова Л. Ю., Козлитина С. В., Нечепуренко И. Г. Оценка запаса промысловых рыб // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 173—181.
51. Житенева Т. С. О методе установления этапов развития в позднем онтогенезе леща (*Abramis brama* L. (*Cyprinidae*)) // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 5. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1985. С. 36—50.
52. Журавлев В. Б. К методике определения потенциальной рыбопродуктивности карасевых озёр // Рыбное хозяйство. 1989. № 2. С. 54—57.

53. Журавлев В. Б. Методы ихтиологических исследований на малых водоемах : монография. Барнаул : АлтГУ, 2014. 184 с.
54. Забавин Е. Ю., Игнатов В. А., Петров В. Н. К методике отбора ихтиологических проб на водозаборных сооружениях, оборудованных водоочистными сетками // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2013. № 9. С. 51—56.
55. Заморов В. В. Метод оцінки потенційної чисельності і біомаси риб-бентофагів континентальних водойм за станом макрозообентосу // Гидробиологический журнал. 2016. Т. 52, № 4. С. 47—54.
56. Заферман М. Л. Новая методология оценки уловистости донного трала // Рыбное хозяйство. 2006. № 1. С. 90—92.
57. Заферман М. Л., Киселев О. Н. Инструментальный метод определения численности промысловых объектов // Рыбное хозяйство. 1974. № 4. С. 22—25.
58. Золотарев В. Н., Шурова Н. М. Методы оценки смертности животных по продолжительности их жизни // Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений-2 : Междунар. науч. конф., 26-29 авг. 2008 г. : матер. Херсон, 2008. С. 11—16.
59. Золотухин С. Ф. Метод оценки заполнения нерестилищ лососей по их нерестовым буграм // Рыбное хозяйство. 1994. № 2. С. 40—41.
60. Зубова Е. М., Кашулин Н. А., Терентьев П. М. К методике расчисления темпа роста сига *Coregonus lavaretus* (L.) водоемов Северной Фенноскандии // Лимнология. 2016. № 9. С. 78—89.
61. Зуев Г. В., Мурзин Ю. Л. Применение графического метода вероятностной бумаги для изучения внутривидовой неоднородности азово-черноморской хамсы // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : II Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., 16-19 вер. 2009 р. : тези. Канів, 2009. С. 57—59.
62. Зыков Л. А. Метод оценки коэффициентов естественной смертности, дифференцированных по возрасту рыб // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1986. Вып. 243. С. 14—21.
63. Игнатьева Г. М. Использование метода относительной характеристики продолжительности развития при изучении временных закономерностей эмбриогенеза у лососевидных рыб // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1991. Вып. 307. С. 86—104.
64. Игумнова Л. В., Крылова В. Д. Экспресс-методы диагностики степени зрелости гонад самок русского осетра // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию Московской рыбоводно-мелиоративной опытной станции и 25-летию ее реорганизации в ГНУ ВНИИР, Москва, 11-13 апр. 2005 г. : матер. Т. 3. Москва, 2005. С. 177—181.
65. Изучение экосистем рыбохозяйственных водоемов, сбор и обработка данных о водных биологических ресурсах, техника и технология их добычи и переработки. Вып. 1 : Инструкции и методические рекомендации по сбору и обработке биологической информации в морях Европейского Севера и Северной Атлантики / отв. ред. Шевелев М. С. Москва : ВНИРО, 2004. 300 с.
66. Изучение экосистем рыбохозяйственных водоемов, сбор и обработка данных о водных биологических ресурсах, техника и технология их добычи и переработки. Вып. 5. Наставления для наблюдателей (ихтиология) / сост. Бондаренко М. Москва : ВНИРО, 2006. 84 с.

67. Кадильников Ю. В. Статистический метод определения интенсивности вылова и зачем нужно знать обловленный объем // Рыбное хозяйство. 1984. № 8. С. 62—64.
68. Казаков Р. В. Методика исследования половых продуктов самцов рыб // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 4. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1981. С. 108—118.
69. Калайда М. Л., Говоркова Л. К. Методы рыбохозяйственных исследований : учебное пособие. Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2013. 288 с.
70. Кантемирова В. М. Методы экономического обоснования показателей эффективности рыболовства и возможные направления их совершенствования // Вестник Астраханского государственного технического университета. Экономика. 2004. № 3. С. 44—46.
71. Карагойшиев К. К. Перспективные методы и орудия лова растительноядных рыб на водохранилищах // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 2007. Вып. 336. С. 168—179.
72. Кирочкин В. Методика оценки нерационального использования водных биоресурсов на примере Охотоморского минтая // Рыбное хозяйство. 2011. № 4. С. 49—52.
73. Китаев С. П. Экспресс-метод определения аллопатрии и симпатрии, многомерный статистический анализ по морфологическим признакам и вопросы о «реликтах» и «эндемиках» у лососевидных (на примере сегов, гольцов, ленков) // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 2007. Вып. 337. С. 243—258.
74. Коблицкая А. Ф. Изучение нереста пресноводных рыб : методическое пособие. Москва : Пищевая промышленность, 1966. 109 с.
75. Ковтун И. Ф., Корнеев А. А., Сыроватка И. И. Методы оценки эффективности воспроизводства промысловых рыб в Азово-Донском районе // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 123—129.
76. Козлитина С. В., Жиликова Л. Ю. Оценка коэффициентов смертности азовских рыб // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 182—203.
77. Козлитина С. В., Жиликова Л. Ю., Реков Ю. И. Определение объема выборки для характеристики биологического состояния популяций рыб // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 166—172.
78. Козлов В. В., Казаков Р. В. Метод оценки степени серебрения молоди проходных лососевых рыб по коэффициенту отражения света поверхностью тела // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 5. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1985. С. 106—111.
79. Количественная оценка проходных рыб гидроакустическим методом на мелководных водотоках / Дегтев А. И. и др. // Рыбное хозяйство. 2007. № 6. С. 102.

80. Комплексный морфометрический анализ [рыб] // Физиолого-биохимические и генетические исследования ихтиофауны Азово-Черноморского бассейна. Методическое руководство / Корниенко Г. Г. и др. Ростов-на-Дону : Эверест, 2005. С. 67—74.
81. Корляков К. А. О методе определения численности и биомассы рыб, обитающих среди зарослей водных растений // Вклад молодых ученых в рыбохозяйственную науку России : Всерос. молодеж. конф., 12-14 окт. 2010 г. : тезисы докл. Санкт-Петербург, 2010. С. 83—86.
82. Костоусов В. Г. Методические подходы в оценке рыбных запасов и степени их эксплуатации в водоемах Беларуси // Проблемы изучения, сохранения и восстановления водных биологических ресурсов в 21 веке : Междунар. науч.-практ. конф., 16-18 окт. 2007 г. : матер. Астрахань : КаспНИРХ, 2007. С. 66—67.
83. Костоусов В. Г. О методике определения оптимального улова для внутренних водоемов // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : Междунар. науч.-практ. конф., 17-19 дек. 2007 г. : матер. и докл. Москва : Россельхозакадемия, 2007. С. 89—91.
84. Костоусов В. Г. О методических подходах в оценке рыбных запасов и определении режимов рациональной эксплуатации природных ресурсов // Рыбогосподарська наука України. 2008. № 1. С. 21—27.
85. Котляр О. А. Методы рыбохозяйственных исследований (ихтиология) : учебное пособие. Рыбное : Дмитровский филиал АГТУ, 2004. 180 с.
86. Кочкин П. Н. Методика изготовления препаратов позвонков рыб для определения их возраста (нототений, клыкача, трески, минтая, морского окуня) // Вопросы ихтиологии. 1980. Т. 20, вып. 6. С. 941—944.
87. Кошелев Б. В. Изучение размножения рыб (гаметогенез, скорость полового созревания, половая цикличность, ритм икрометания и экология нереста) // Исследования размножения и развития рыб (методическое пособие). Москва : Наука, 1981. С. 5—16.
88. Кошелев Б. В. Исследование закономерностей гаметогенеза и половых циклов у рыб в различных частях ареала // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 1. Вильнюс : Минтис, 1974. С. 37—45.
89. Кручинин О. Н., Сеславинский В. И. Методика обоснования выбора орудий промышленного рыболовства // Рыбное хозяйство. 2004. № 3. С. 50—51.
90. Кублицкас А. К. Методика сбора и обработки материала по питанию рыб // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 1. Вильнюс : Минтис, 1974. С. 72—79.
91. Кудрявцев В. И., Дегтев А. И., Соколов А. В. Об особенностях количественной оценки запасов байкальского омуля гидроакустическим методом // Рыбное хозяйство. 2005. № 3. С. 66—69.
92. Кузнецов В. А. Количественный учет молоди рыб в водохранилищах и озерах (методические подходы и возможности) // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 5. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1985. С. 26—35.
93. Кузьменко Ю. Г., Спесивый Т. В. Экспрес-метод збору іхтіологічного матеріалу в польових умовах при дослідженні пластичних ознак риб з

- використанням цифрових технологій // Рибогосподарська наука України. 2009. № 2. С. 11—15.
94. Кухоренко К. Г., Галактионов Г. З. Гидроакустические методы в оценке запасов морских организмов. Калининград, 1983. 70 с.
 95. Лапин Ю. Е. Типы нерестовых популяций и некоторые вопросы методики исследования динамики численности промысловых рыб // Вопросы ихтиологии. 1961. Т. 1, вып. 4 (21). С. 666—680.
 96. Лебедько Е. Я. Определение живой массы сельскохозяйственных животных по промерам : практическое руководство. Москва : Аквариум, 2006. 48 с.
 97. Летичевский М. А. Метод определения пола белорыбицы в период анадромных миграций // Рыбное хозяйство. 1977. № 8. С. 35—36.
 98. Либосварски Й. Вычисление и применение уравнения роста по Берталанффи // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 4. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1981. С. 104—107.
 99. Либосварский Й. К методике определения численности рыб в малых проточных водоемах при помощи электролова // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 1. Вильнюс : Минтис, 1974. С. 117—123.
 100. Луц Г. И., Реков Ю. И. Методы сбора ихтиологического материала // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 146—162.
 101. Любарец М. А., Мясников А. Н. Об использовании акустических методов для обнаружения и видовой идентификации рыб // Таврійський науковий вісник. 1998. № 7. С. 223—226.
 102. Малкин Е. М. Формализация методики составления размерно-возрастных «ключей» при изучении состава популяций рыб // Рыбное хозяйство. 1974. № 9. С. 11—13.
 103. Малкин Е. М. Формализация методики установления характера зависимости между длиной особей и размерами чешуи и обратное расчисление роста рыб // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 2. Вильнюс : Мокслас, 1976. С. 46—53.
 104. Мальцев А. В., Меркулов Я. Г. Биометрический метод определения пола осетровых, в частности — русского осетра *Acipenser gueldenstaedtii* (*Acipenseridae*) азовской популяции // Вопросы ихтиологии. 2006. Т. 46, № 4. С. 536—540.
 105. Мантельман И. И. К методам оценки самок сиговых рыб по качеству икры // Известия ГосНИОРХ. 1978. Т. 134. С. 133—145.
 106. Мельникова Е. Б. Методика определения коэффициентов уравнения роста Берталанфи при неравных измерительных интервалах // Рибне господарство України. 2008. № 1. С. 25—26.
 107. Мельникова Е. Б. Определение внутривидовой неоднородности хамсы с помощью метода дискриминантного анализа // Рибне господарство України. 2011. № 6. С. 55—60.
 108. Мельникова Е. Б. Оценка состояния промыслового стада черноморского шпрота с использованием методов регрессионного анализа // Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений-2 : Междунар. науч. конф., 26-29 авг. 2008 г. : матер. Херсон, 2008. С. 279—284.

109. Мельникова Е. Б. Экспресс-метод определения возрастного состава уловов черноморского шпрота // Гидробиологический журнал. 2010. Т. 47, № 2. С. 41—47.
110. Мендусь А. П. Определение промысловых запасов леща методом прямого учета в Каховском водохранилище // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1988. Вып. 288. С. 90—91.
111. Меншуткин В. В. Метод моделирования в динамике численности рыб. (Обзор). Москва : ВНИРО, 1964. 60 с.
112. Метальникова К. В. Методика качественной оценки степени развития эмбрионов // Биофизика живой клетки : сборник научных трудов. 2008. Т. 9. С. 90—92.
113. Методи іхтіологічних досліджень : навчальний посібник / Пилипенко Ю. В. та ін. Херсон : Олді-Плюс, 2017. 432 с.
114. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України / Озінковська С. П., Єрко В. М., Коханова Г. Д. Київ : Інститут рибного господарства УААН, 1998. 47 с.
115. Методика исследования морфоэкологических особенностей развития рыб в зародышевый, личиночный и мальковый периоды / Ланге Н. О. и др. // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 1. Вильнюс : Минтис, 1974. С. 56—72.
116. Методика определения поверхности анчоусовидной кильки / Нестеров В. М. и др. // Рыбное хозяйство. 1977. № 10. С. 74—75.
117. Методика учета отложенной икры и скатывающихся личинок осетровых в русле рек / Вещев П. В. и др. // Гидробиологический журнал. 1993. Т. 29, № 2. С. 97—105.
118. Методические рекомендации по определению ОДУ азовских промысловых рыб / Жиликова Л. Ю. и др. // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 239—252.
119. Методические рекомендации по применению современных методов изучения питания рыб и расчета рыбной продукции по кормовой базе в естественных условиях. Ленинград, 1982. 26 с.
120. Методические указания по оценке численности рыб в пресноводных водоемах. Москва, 1986. 50 с.
121. Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях. Москва : Высшая школа, 1974. 254 с.
122. Методичні рекомендації до іхтіологічних досліджень. Ч. 1 : Методи вилову риб / упоряд. Трохимець В. М., Алексієнко В. Р. Київ : Український фітосоціологічний центр, 2011. 46 с.
123. Методичні рекомендації збору іхтіологічних матеріалів при встановленні лімітів промислового вилучення водних біоресурсів на внутрішніх водоймах / Кружиліна С. В. та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2015. 14 с.
124. Методы изучения поведенческих реакций молоди осетра на «запечатленный» химический стимул // Физиолого-биохимические и генетические исследования ихтиофауны Азово-Черноморского бассейна. Методическое руководство / Корниенко Г. Г. и др. Ростов-на-Дону : Эверест, 2005. С. 48—54.

125. Методы исследования биомеханических свойств кожного покрова рыб / Казаков Р. В. и др. // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 5. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1985. С. 90—105.
126. Милановский Ю. Е., Рекубратский В. А. О методах изучения стайного поведения рыб // Биологические науки. 1960. № 4. С. 77—81.
127. Мина М. В. Возможные подходы к определению численности выборок при проведении комплексных исследований популяций // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 2. Вильнюс : Мокслас, 1976. С. 25—30.
128. Мина М. В. О методике определения возраста рыб при проведении популяционных исследований // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 2. Вильнюс : Мокслас, 1976. С. 31—37.
129. Мина М. В. О разработке метода объективной оценки структуры зон на отолитах рыб. МГУ // Вопросы ихтиологии. 1965. Т. 5, вып. 4 (37). С. 732—735.
130. Мина М. В. Об использовании отоликов карповых рыб для определения возраста особей // Вопросы ихтиологии. 1989. Т. 29, вып. 6. С. 914—920.
131. Мина М. В., Савваитова К. А., Новиков Г. Г. Выявление специфики популяционной структуры при комплексном исследовании вида у рыб // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 2. Вильнюс : Мокслас, 1976. С. 123—130.
132. Модификация объемного метода подсчета икры рыб / Семенченко С. М. и др. // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1989. Вып. 293. С. 139—144.
133. Мосияш С. С. К методике определения рыбохозяйственного ущерба от гибели молоди рыб // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1995. Вып. 315. С. 138—144.
134. Мосияш С. С., Шашуловский В. А. О методических подходах к определению ОДУ для совокупности однотипных малых водоемов // Рыбное хозяйство. 2007. № 2. С. 84—86.
135. Мурза И. Г., Христофоров О. Л. Определение степени зрелости гонад и прогнозирование возраста достижения половой зрелости у атлантического лосося и кумжи. Ленинград : ГосНИОРХ, 1991. 102 с.
136. Муромцев А. М., Потайчук С. И. Использование метода обловленных объемов для изучения биопродуктивности // Рыбное хозяйство. 1985. № 11. С. 29.
137. Надолинский В. П. Методы сбора ихтиопланктона // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 256—257.
138. О границах применимости метода Шефера при оценке уравновешенного вылова / Покровский Б. И. и др. // Рыбное хозяйство. 1975. № 9. С. 7—8.
139. Оліфіренко В. В. Використання у лабораторній практиці експрес-методу біологічної оцінки риби // Таврійський науковий вісник. 1998. № 5. С. 102—104.
140. Опыт использования гидроакустического метода и аппаратуры количественной оценки водных биомасс во внутренних водоемах / Кудрявцев В. И. и др. // Рыбное хозяйство. 2006. № 5. С. 69—71.

141. Осипов В. В., Кияшко В. И. Методика определения возраста черноморско-каспийской тюльки *Clupeonella cultriventris* (*Clupeiformes*, *Clupeoidei*) по чешуе и отолитам // Вопросы ихтиологии. 2008. Т. 48, № 5. С. 668—674.
142. Особенности использования гидроакустического метода количественной оценки водных биомасс на примере оценки численности байкальского омуля / Дегтев А. И. и др. // Гидроакустические исследования на внутренних водоемах : Всерос. конф., Борок, 2-4 дек. 2008 г. : матер. докл. Борок, 2008. С. 39—44.
143. Оценка качества половых продуктов рыб люминесцентными методами / Хоменков А. С. и др. // Рыбное хозяйство. 1990. № 10. С. 44.
144. Оценка погрешностей методов гидробиологических и ихтиологических исследований // Труды ИБВВ АН СССР. 1982. Вып. 49 (57). 165 с.
145. Оценка пополнения промыслового стада / Воловик С. П. и др. // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 204—214.
146. Оценка ресурсов байкальского омуля гидроакустическим методом / Сиделева В. Г. и др. // Рыбное хозяйство. 1996. № 6. С. 37—38.
147. Павлов Д. А. Метод оценки качества спермы рыб // Вопросы ихтиологии. 2006. Т. 46, № 3. С. 384—392.
148. Павлов Д. С., Фомин В. К. Методика определения критических скоростей течения для рыб // Рыбное хозяйство. 1978. № 11. С. 30—31.
149. Парицкий Ю. А., Зыков Л. А. Методика оценки возможного допустимого улова анчоусовидной кильки по величине промыслового запаса и промыслового усилия // Комплексный подход к проблеме сохранения и восстановления биоресурсов Каспийского бассейна : Междунар. науч.-практ. конф., 13-16 окт. 2008 г. : матер. Астрахань, 2008. С. 125—128.
150. Паюсова А. Н. Измерение мышечной теплоустойчивости как метод изучения акклиматизации на примере белого толстолобика // Журнал общей биологии. 1985. Т. 46, № 5. С. 670—678.
151. Пермитин И. Е. О методике определения возраста у окуня // Вопросы ихтиологии. 1965. Т. 5, вып. 2 (35). С. 381—384.
152. Печников А. С., Терешенков И. И. К методике сбора и обработки ихтиологического материала. Сообщение 2. Простейшие методы определения численности рыб в озерах // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1984. Вып. 215. С. 13—38.
153. Печников А. С., Терешенков И. И. К методике сбора и обработки ихтиологического материала. Сообщение 1. Определение размерно-возрастной структуры улова // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1984. Вып. 225. С. 90—100.
154. Печников А. С., Терешенков И. И. Методы оценки численности рыб в малых озерах // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1986. Вып. 244. С. 89—92.
155. Поддубный А. Г., Гончаров А. И., Сметанин М. М. Спектрально-корреляционный метод определения возраста и изучения роста рыб с циклоидной чешуей // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 2. Вильнюс : Мокслас, 1976. С. 38—45.
156. Половков В. В., Пермитин И. Е. Использование гидроакустических рыбопоисковых приборов на внутренних водоемах // Типовые методики

- исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 2. Вильнюс : Мокслас, 1976. С. 6—14.
157. Полимский В. Н. К методике регулирования интенсивности промысла полупроходных рыб в период миграции // Известия ГосНИОРХ. 1978. Т. 136. С. 8—32.
 158. Попова О. А., Решетников Ю. С. О комплексных индексах при изучении питания рыб // Вопросы ихтиологии. 2011. Т. 51, № 5. С. 712—717.
 159. Правдин К. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1966. 376 с.
 160. Применимость математических методов оценки запаса и возможного вылова рыб : методические рекомендации / Бургин М. С. и др. Москва : ВНИРО, 1981. 55 с.
 161. Пробатов С. Н., Ляшенко А. Ф. К методике исследования выноса молоди рыб из водохранилищ в крупные оросительные каналы // Гидробиологический журнал. 1974. Т. 10, № 4. С. 122—126.
 162. Прогнозирование общего допустимого улова основных промысловых рыб Азовского моря / Козлитина С. В. и др. // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 215—231.
 163. Прусевич Н. А. Методика прогнозирования уловов полупроходных сиговых рыб // Рыбное хозяйство. 1975. № 3. С. 20—22.
 164. Пушкин С. В., Раутио Э. Э., Чечун И. С. Оценка абсолютной численности рыб Каховского водохранилища гидроакустическим методом // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1984. Вып. 215. С. 198—207.
 165. Резников В. Ф. Совершенствование методов косвенных измерений роста и обмена объектов рыбоводства // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1980. Вып. 29. С. 88—94.
 166. Репина Г. В. Инструментальные методы видовой идентификации рыбы и рыбопродукции // Рыбное хозяйство. 2001. № 5. С. 52—54.
 167. Ризевский В. К., Плюта М. В., Ермолаев В. В. Методика определения и оценка посещаемости водоемов Беларуси рыболовами-любителями // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2006. Вып. 22. С. 249—255.
 168. Романенко В. И. Разработка методики расчета оптимальных комплексов орудий лова для водохранилищ // Известия ГосНИОРХ. 1978. Т. 131. С. 126—149.
 169. Романов В. И., Петлина А. П., Бабкина И. Б. Методы исследования пресноводных рыб Сибири : учебное пособие. Томск : Томский государственный университет, 2012. 256 с.
 170. Руденко Г. П. Численность рыб, ихтиомасса, продукция выживших рыб и управление рыбопродукционным процессом в пресноводных водоемах : методическое пособие. Санкт-Петербург : ГосНИОРХ, 2014. 106 с.
 171. Руководство по изучению питания рыб в естественных условиях. Москва : АН СССР, 1961. 265 с.
 172. Рыкова И. Н. Изучение влияния солености среды на рыб в раннем онтогенезе // Исследования размножения и развития рыб (методическое пособие). Москва : Наука, 1981. С. 185—194.
 173. Сальников Н. Е., Кравченко Д. Н. К методике определения упитанности рыб // Рыбное хозяйство. 1978. № 6. С. 16—17.

174. Сальников Н. Е., Луговая Т. В. Применение нового метода для массового мечения молоди рыб // Рыбное хозяйство. 1971. Вып. 12. С. 128—129.
175. Серебров Л. И. Применение количественных методов для изучения поведения донных промысловых рыб // Рыбное хозяйство. 1974. № 9. С. 14—15.
176. Серенко В. А. Оценка запаса и лимитирование уловов с использованием метода прямого учета численности и методики П. В. Тюрина (на примере озера Белого Вологодской области) // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1984. Вып. 215. С. 39—60.
177. Сечин Ю. Т., Карагойшиев К. Методы определения коэффициента абсолютной уловистости донного трала // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1983. Вып. 198. С. 162—188.
178. Синоптический метод определения биомасс пелагических рыб (на примере скумбрии СВА) / Шатохин Б. М. и др. // Рыбное хозяйство. 2002. № 5. С. 23—26.
179. Сметанин М. М. Статистические методы в экологии рыб. Борок : Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина, 2003. 200 с.
180. Смирнов В. С., Божко А. М., Добринская Л. А. Основные требования к сбору и обработке материала по костистым рыбам при использовании метода морфофизиологических индикаторов // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 1. Вильнюс : Минтис, 1974. С. 26—37.
181. Сорокин Л. И. Контроль степени эксплуатации водоемов методом обловленного пространства // Рыбное хозяйство. 1984. № 6. С. 55.
182. Спановская В. Д., Григораш В. А. К методике определения плодовитости единовременно и порционно икротелющих рыб // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 2. Вильнюс : Мокслас, 1976. С. 54—62.
183. Спановская В. Д. Относительная плодовитость рыб (определение, использование как показателя разнокачественности самок) // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 2. Вильнюс : Мокслас, 1976. С. 63—69.
184. Сторожук А. Я. К методике обработки ихтиологических материалов // Рыбное хозяйство. 1974. № 5. С. 8—10.
185. Стрельцова С. В. Методы определения теплостойкости и холодостойкости у рыб // Известия ВНИОРХ. 1953. Т. 32. С. 223.
186. Терещенко В. Г., Зуянова О. В. Метод оценки относительной численности поколений основных промысловых видов рыб при неполной исходной информации // Биология внутренних вод. 2006. № 1. С. 93—98.
187. Устич В. І., Щербак В. І., Мрук А. І. До методології досліджень різноманіття біоти малих гірських водотоків // Рибогосподарська наука України. 2012. № 2. С. 59—63.
188. Федоров В. А. Методика оценки рыбных запасов озер Беларуси и определение оптимального коэффициента их промыслового использования на основе прироста рыбного стада // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 1996. Вып. 14. С. 179—195.
189. Фридман И. Л. К методике определения экономического эффекта сырьевых исследований в рыбном хозяйстве // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1984. Вып. 215. С. 217—228.

190. Фридман І. Л. Методика определения экономического эффекта прогнозирования уловов рыбы в озерах, реках и водохранилищах // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1986. Вып. 244. С. 138—149.
191. Хаберман Х. Х. Определение индивидуальной продуктивности рыб // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 5. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1985. С. 22—25.
192. Хилборн Р., Уолтерс К. Количественные методы оценки рыбных запасов. Выбор, динамика и неопределенность (избранные главы). Санкт-Петербург : Политехника, 2001. 228 с.
193. Хоревин Л. Д. Метод прогнозирования численности и динамики подходов искусственно воспроизводимых популяций кеты // Рыбное хозяйство. 1986. № 4. С. 26—27.
194. Цейтлин В. Б. Оценка суточных рационов рыб, получаемых в естественных условиях // Вопросы ихтиологии. 1991. Т. 31, № 2. С. 266—271.
195. Цуникова Е. П. Методы оценки эффективности воспроизводства промысловых рыб в Азово-Кубанских лиманах // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 130—140.
196. Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста и рост рыб. Москва : АН СССР, 1959. 164 с.
197. Шапошникова Г. Х., Клюканов В. А. Методика изучения скелетов рыб в целях систематики // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 1. Вильнюс : Минтис, 1974. С. 9—13.
198. Шентякова Л. Ф. О единой методике реконструкции роста рыб по чешуе // Вопросы ихтиологии. 1966. Т. 6, вып. 2 (39). С. 303—313.
199. Шибяев С. В. Классификация методов оценки смертности рыб во внутренних водоемах // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 2007. Вып. 337. С. 39—71.
200. Шимановская Л. Н. К вопросу о методике прогнозирования уловов // Известия ГосНИОРХ. 1977. Т. 126. С. 63—68.
201. Широков Л. В. О методах изучения влияния абиотических факторов на изменение численности промысловых рыб // Известия ГосНИОРХ. 1977. Т. 126. С. 69—75.
202. Шорыгин А. А. Количественный способ изучения пищевой конкуренции рыб // Зоологический журнал. 1946. Т. 25, вып. 1. С. 45—60.
203. Шуйский В. Ф. Метод количественной оценки потребления макрозообентоса рыбами в озерной литорали // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1988. Вып. 283. С. 99—110.
204. Щербовски Я. Метод установления критериев оценки темпа роста рыб // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 4. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1981. С. 96—103.
205. Юданов К. И. О методике съемок промысловой обстановки // Рыбное хозяйство. 1986. № 12. С. 44—46.
206. Юданов К. И., Теслер В. Д., Калихман И. Л. О единой методике гидроакустических съемок // Рыбное хозяйство. 1984. № 5. С. 59—60.
207. Юдович Ю. Б., Антонюк А. В. Выбор методики для прогноза уловов во внутренних водоемах // Рыбное хозяйство. 1979. № 3. С. 22—23.

208. Юдович Ю. Б., Антонюк А. В. Методика прогнозирования вылова рыбы в озерах, реках и водохранилищах // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1979. Вып. 25. С. 29—41.
209. Яковлев В. Н., Изюмов Ю. Г., Касьянов А. Н. Фенетический метод исследования популяций карповых рыб // Биологические науки. 1981. № 2. С. 98—101.
210. Якубовский М. Методы выявления и окраски системы каналов боковой линии и костных образований у рыб *in toto* // Зоологический журнал. 1970. Т. 49, вып. 9. С. 1398—1402.
211. Яндовская Н. И., Персов П. М. К методике прогнозов уловов при заводском воспроизводстве атлантического лосося // Известия ГосНИОРХ. 1978. Т. 129. С. 113—118.

REFERENCES

1. Abbasov, G. S., & Polyakov, G. D. (1978). Otsenka usloviy pitaniya i biologicheskogo sostoyaniya stada ryb s pomoshch'yu koeffitsienta upitannosti. *Voprosy ikhtiologii*, 18, 3, 444-459.
2. Avedikova, T. M., & Kozlitina, S. V. (1977). K metodike raschetov «absolyutnoy» chislennosti i estestvennoy ubyli poluprokhodnykh ryb. *Izvestiya GosNIORKh*, 126, 76-82.
3. Aksenova, E. I., & Idrisova, N. Kh. (1978). Primenenie khlorofil'nogo metoda pri izuchenii pitaniya ryb. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 14, 5, 109-112.
4. Aldoshina, V. S. (1974). Metodika analiza vliyaniya prirodnykh faktorov na ekonomicheskuyu effektivnost' promysla. *Rybnoe khozyaystvo*, 2, 78-80.
5. Andreev, V. L., & Ivankov, V. N. (1981). Opyt primeneniya matematicheskikh metodov pri analize dannykh o stroenii yaytsekletok ryb dlya tseley taksonomii. *Zhurnal obshchey biologii*, 42, 1, 147-155.
6. Andreev, V. L., & Reshetnikov, Yu. S. (1977). Issledovanie vnutrividovoy morfologicheskoy izmenchivosti siga *Coregonus lavaretus* (L.) metodami mnogomernogo statisticheskogo analiza. *Voprosy ikhtiologii*, 17, 5, 862-878.
7. Antonyuk, A. V. (1983). Primenenie matematicheskikh metodov v prognozirovanii ulovov ryby. *Sbornik nauchnykh trudov VNIIPRKh*, 39, 51-57.
8. Artem'ev, E. A., & Yusupov, R. A. (1997). Otsenka tochnosti povremennogo metoda ucheta molodi ryb. *Rybnoe khozyaystvo*, 4, 45-46.
9. Arkhipov, A. G., Ershova, O. V., & Chashchin, A. K. (1987). Otsenka nerestovogo zapasa ryb metodom ikhtioplanktonnoy s'emki. *Rybnoe khozyaystvo*, 7, 36.
10. Bandura, V. I., & Shibaev, S. V. (1986). Ispol'zovanie metodov matematicheskogo modelirovaniya v tselyakh opredeleniya parametrov optimal'nogo rybolovstva na vnutrennikh vodoemakh. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 244, 4-37.
11. Baranova, V. V. (1983). Primenenie kombinirovannogo metoda dlya otsenki zapasov plotvy. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 202, 18-24.
12. Barulin, N. V. (2017). *Identifikatsiya pola osetrovyykh ryb po kostnym plastinkam*. Gorki: BGhSKhA.
13. Beverton, R. Kh., & Holt, S. Dzh. (1958). *Obzor metodov opredeleniya smernosti oblavlivaemykh populyatsiy ryby. Istochniki vozniknoveniya oshibok pri vzyatii prob iz ulovov*. Moskva: Rybnoe khozyaystvo; VNIRO.
14. Belova, N. V. (1981). Nekotorye metody izucheniya prednerestovogo i nerestovogo periodov zhizni samtsov ryb. *Issledovaniya razmnzheniya i razvitiya*

- ryb (*metodicheskoe posobie*). Moskva: Nauka, 58-66.
15. Berdichevskiy, Z. M., Ermol'chev, V. A., & Tesler, V. D. (1973). Apparaturnyy metod opredeleniya plotnosti razrezhennykh i plotnykh skopleniy ryb. *Rybnoe khozyaystvo*, 8, 40-43.
 16. Bil'ko, V. P. (1992). Metody otsenki zhiznesposobnosti ryb v rannem ontogeneze. *Gidrobiologicheskyy zhurnal*, 28, 4, 93-99.
 17. Blinov, V. V. (1984). O sovershenstvovanii metodov otsenki i optimizatsii selektivnosti rybnogo promysla. *Rybnoe khozyaystvo*, 3, 55-57.
 18. Bogdanov, G. A. (2008). K metodike otsenki obshchego dopustimogo ulova. *Rybnoe khozyaystvo*, 1, 65-67.
 19. Borisov, V. M. (1974). Izuchenie estestvennoy smertnosti ryb i nekotorye metody ee otsenki. *Extended abstracts of candidate's thesis*. Moskva: VNIRO.
 20. Borisovets, E. E. (1982). Diskriminantnyy analiz prokhodnykh gol'tsov roda *Salvelinus* (*Salmonidae*) Chukotki. *Voprosy ikhtiologii*, 22, 3, 365-373.
 21. Brylin'ska, M., & Brylin'ski, E. (1974). Metody opredeleniya plodovitosti ryb na primere leshcha *Salmonidae*. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 1. Vil'nyus: Mintis, 45-56.
 22. Bryuzgin, B. L. (1974). Kratkaya metodika obratnykh vychisleniy rosta ryb po sposobu empiricheskikh shkal. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 1. Vil'nyus: Mintis, 108-117.
 23. Bryuzgin, V. L. (1969). *Metody izucheniya rosta ryb po cheshue, kostyam i otolitam*. Kiev: Naukova dumka.
 24. Vaganov, E. A. (1978). *Skleritogrammy kak metod analiza sezonno rosta ryb*. Novosibirsk: Nauka.
 25. Verigina, I. A., Lange, N. O., & Timeyko, V. N. (1981). Metody issledovaniya pishchevaritel'noy sistemy ryb v ontogeneze. *Issledovaniya razmnzheniya i razvitiya ryb (metodicheskoe posobie)*. Moskva: Nauka, 99-110.
 26. Vershinin, V. G., & Maksimenko, V. P. (1984). K metodike opredeleniya vozrasta vstupleniya pokoleniya v promysel. *Rybnoe khozyaystvo*, 9, 17.
 27. Volovik, S. P., Kozlitina, S. V., & Zhilyakova, L. Yu. (2005). Planirovanie uchetykh ikhtologicheskikh s'emok. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom basseyne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot*. Krasnodar: AzNIIRKh, 141-145.
 28. Vol'skis, R. S. (1985). K metodike issledovaniya produktivnosti promyslovogo vida ryb v predelakh areala. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 5. Vil'nyus: Institut zoologii i parazitologii AN Litovskoy SSR, 112-129.
 29. Vol'skis, R. S. (1978). Metod kompleksnogo issledovaniya vida na vsem prostranstve areala i ego primenenie. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 3. Vil'nyus: Institut zoologii i parazitologii AN Litovskoy SSR, 114-125.
 30. Vol'skis, R. S., & Kaminskene, B. A. (1976). Metod issledovaniya plodovitosti i ee zavisimosti ot nekotorykh biologicheskikh parametrov osobey raznykh populyatsiy vida. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 2. Vil'nyus: Mokslas, 70-75.
 31. Volovik, S. P., et al. (2005). Vremennaya metodika rascheta natsional'nykh kvot vylova osetrovyykh ryb v Azovskom more. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom basseyne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot*. Krasnodar: AzNIIRKh, 232-238.

32. Vronskiy, A. A., Nikolaychuk, L. A., & Belousov, A. G. (1983). Metod issledovaniya elektricheskoy aktivnosti oseyoy muskulatury i kinematiki plavaniya ryb. *Vestnik zoologii*, 6, 64-66.
33. Gershanovich, A. D., Markevich, N. B., & Dergaleva, Zh. T. (1984). Ob ispol'zovanii koeffitsienta upitannosti v ikhtiologicheskikh issledovaniyakh. *Voprosy ikhtiologii*, 24, 5, 740-752.
34. Gulidov, M. V., & Korde, B. A. (1981). Metody issledovaniya razvitiya i dykhaniya ryb v usloviyakh razlichnogo gazovogo rezhima v embrional'nykh period zhizni. *Issledovaniya razmnzheniya i razvitiya ryb (metodicheskoe posobie)*. Moskva: Nauka, 49-184.
35. Gulin, V. V. (1974). Metodika opredeleniya absolyutnoy chislennosti promyslovogo stada ryb, ego razmerno-vozrastnogo sostava, intensivnosti promysla i koeffitsientov ulovistosti eksperimental'nykh orudiy po rezul'tatam spetsial'nogo opyt'nogo lova. *Izvestiya GosNIORKh*, 90, 84-93.
36. Gulin, V. V. (1971). Teoreticheskoe obosnovanie i prakticheskaya razrabotka metodov otsenki obshchey, promyslovoy i estestvennoy smertnosti ryb vo vnutrennikh vodoemakh. *Izvestiya GosNIORKh*, 73, 33-74.
37. Danilevskiy, N. N., & Novikova, I. I. (1976). Metod kolichestvennogo ucheta molodi kefali v Chernom more. *Rybnoe khozyaystvo*, 4, 23-24.
38. Dgebuadze, Yu. Yu., & Chernova, O. F. (2009). *Cheshuya kostistyykh ryb kak diagnosticheskaya i registriruyushchaya struktura*. Moskva: Tovarishestvo nauchnykh izdaniy KMK.
39. Denisov, L. I. (1977). Metodika pryamogo ucheta chislennosti ryb na Kakhovskom vodokhranilishche. *Izvestiya GosNIORKh*, 126, 114-125.
40. Disler, N. N., & Smirnov, S. A. (1981). Metody izucheniya morfologii akustiko-lateral'noy sistemy. *Issledovaniya razmnzheniya i razvitiya ryb (metodicheskoe posobie)*. Moskva: Nauka, 88-99.
41. Didenko, O. V. (2007). Viktoristannya empirichnikh metodiv dlya otsinki prirodnoi smertnosti osnovnikh promislovikh vidiv rib Kremenchuts'kogo vodoshkhovishcha. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 68-75.
42. Didenko, O. V. (2008). Modelyuvannya zmin populyatsiy ta zapasiv osnovnikh promislovikh vidiv rib Kanivs'kogo ta Kremenchuts'kogo vodoshkhovishch. *Extended abstracts of candidate's thesis*. Kyiv: IRG UAAN.
43. Dokukin, M. M. (1983). Metodika opredeleniya veroyatnoy dliny ryb, popadayushchikh v rybootvod. *Rybnoe khozyaystvo*, 2, 71-72.
44. D'yakonov, Yu. N. (1981). K metodu zapisi elektrokardiogramm u ryb. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 4. Vil'nyus: Institut zoologii i parazitologii AN Litovskoy SSR, 119-127.
45. Dyachuk, I. E. (1969). Metodika obratnykh vychisleniy lineynogo rosta leshcha Kakhovskogo vodokhranilishcha. *Gidrobiologicheskyy zhurnal*, 5, 3, 81-87.
46. Esin, E. V. (2009). Sravnenie raznykh metodov kolichestvennogo ucheta molodi lososevykh ryb (*Salmonidae*) v maloy reke Mikocheva (Zapadnaya Kamchatka). *Voprosy ikhtiologii*, 49, 6, 800-808.
47. Ievtushenko, M. Yu., Khudiy, O. I., & Fedorov, V. I. (2008). Metodologichni zasadi rozrobki program sistemnykh monitoringovikh doslidzhen' ikhtiologichnikh kompleksiv. *Naukoviy visnik Chernivets'kogo universitetu*, 416, 21-27.
48. Ievtushenko, M. Yu., & Shevchenko, P. G. (2006). Metodi viznachennya kharakteristik golovnikh ugrupovan' gidrobiontiv vodnikh ekosistem: Ribi. *Metody gidroekologichnikh doslidzhen' poverkhnevikh vod*. Kyiv: Logos, 156-193.

49. Zhilyukas, V. Yu., & Poznanskene, D. A. (1985). Tablitsa dlya podscheta indeksa vidovogo raznoobraziya po Shennonu-Uiveru. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 5. Vil'nyus: Institut zoologii i parazitologii AN Litovskoy SSR, 130-136.
50. Zhilyakova, L. Yu., Kozlitina, S. V., & Nechepurenko, I. G. (2005). Otsenka zapasa promyslovykh ryb. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom bassejne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot*. Krasnodar: AzNIIRKh, 173-181.
51. Zhiteneva, T. S. (1985). O metode ustanovleniya etapov razvitiya v pozdnem ontogeneze leshcha (*Abramis brama* L. (Cyprinidae)). *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 5. Vil'nyus: Institut zoologii i parazitologii AN Litovskoy SSR, 36-50.
52. Zhuravlev, V. B. (1989). K metodike opredeleniya potentsial'noy ryboproduktivnosti karasevykh ozer. *Rybnoe khozyaystvo*, 2, 54-57.
53. Zhuravlev, V. B. (2014). *Metody ikhtiologicheskikh issledovaniy na malykh vodoemakh: monografiya*. Barnaul: AltGU.
54. Zabavin, E. Yu., Ignatov, V. A., & Petrov, V. N. (2013). K metodike otbora ikhtiologicheskikh prob na vodozabornykh sooruzheniyakh, oborudovannykh vodoochistnymi setkami. *Rybovodstvo i rybnoe khozyaystvo*, 9, 51-56.
55. Zamorov, V. V. (2016). Metod otsinki potentsiynoi chisel'nosti i biomasi rib-bentofagiv kontinental'nykh vodoym za stanom makrozoobentosu. *Gidrobiologicheskyy zhurnal*, 52, 4, 47-54.
56. Zaferman, M. L. (2006). Novaya metodologiya otsenki ulovistosti donnogo trala. *Rybnoe khozyaystvo*, 1, 90-92.
57. Zaferman, M. L., & Kiselev, O. N. (1974). Instrumental'nyy metod opredeleniya chislennosti promyslovykh ob'ektov. *Rybnoe khozyaystvo*, 4, 22-25.
58. Zolotarev, V. N., & Shurova, N. M. (2008). Metody otsenki smertnosti zhivotnykh po prodolzhitel'nosti ikh zhizni. *Sovremennye problemy gidrobiologii. Perspektivy, puti i metody resheniy-2: Mezhdunar. nauch. konf., 26-29 avg. 2008 g.: mater.* Kherson, 11-16.
59. Zolotukhin, S. F. (1994). Metod otsenki zapolneniya nerestilishch lososey po ikh nerestovym bugram. *Rybnoe khozyaystvo*, 2, 40-41.
60. Zubova, E. M., Kashulin, N. A., & Terent'ev, P. M. (2016). K metodike raschisleniya tempa rosta siga *Coregonus lavaretus* (L.) vodoemov Severnoy Fennoskandii. *Limnologiya*, 9, 78-89.
61. Zuev, G. V., & Murzin, Yu. L. (2009). Primenenie graficheskogo metoda veroyatnostnoy bumagi dlya izucheniya vnutrividovoy neodnorodnosti azovo-chernomorskoy khamsy. *Suchasni problemi teoretichnoi ta praktichnoi ikhtiologii: II Mizhnar. ikhtiol. nauk.-prakt. konf., 16-19 ver. 2009 r.: tezi*. Kaniv, 57-59.
62. Zykov, L. A. (1986). Metod otsenki koeffitsientov estestvennoy smertnosti, differentsirovannykh po vozrastu ryb. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 243, 14-21.
63. Ignat'eva, G. M. (1991). Ispol'zovanie metoda odnositel'noy kharakteristiki prodolzhitel'nosti razvitiya pri izuchenii vremennykh zakonomernostey embriogeneza u lososevidnykh ryb. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 307, 86-104.
64. Igumnova, L. V., & Krylova, V. D. (2005). Ekspress-metody diagnostiki stepeni zrelosti gonad samok russkogo osetra. *Akvakul'tura i integrirovannyye tekhnologii: problemy i vozmozhnosti: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posvyashch. 60-letiyu*

- Moskovskoy rybovodno-meliorativnoy opytnoy stantsii i 25-letiyu ee reorganizatsii v GNU VNIIR, Moskva, 11-13 apr. 2005 g.: mater.* (Vol. 3). Moskva, 177-181.
65. Shevelev, M. S. (Ed.). (2004). *Izuchenie ekosistem rybokhozyaystvennykh vodoemov, sbor i obrabotka dannykh o vodnykh biologicheskikh resursakh, tekhnika i tekhnologiya ikh dobychi i pererabotki.* (Vol. 1: Instruksii i metodicheskie rekomendatsii po sboru i obrabotke biologicheskoy informatsii v moryakh Evropeyskogo Severa i Severnoy Atlantiki). Moskva: VNIRO.
 66. Bondarenko, M. (Comp.). (2006). *Izuchenie ekosistem rybokhozyaystvennykh vodoemov, sbor i obrabotka dannykh o vodnykh biologicheskikh resursakh, tekhnika i tekhnologiya ikh dobychi i pererabotki.* (Vol. 5. Nastavleniya dlya nablyudateley (ikhtiologiya)). Moskva: VNIRO.
 67. Kadil'nikov, Yu. V. (1984). Statisticheskii metod opredeleniya intensivnosti vylova i zachem nuzhno znat' oblovlennyy ob'em. *Rybnoe khozyaystvo*, 8, 62-64.
 68. Kazakov, R. V. (1981). Metodika issledovaniya polovykh produktov samtsov ryb. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov.* Ch. 4. Vil'nyus: Institut zoologii i parazitologii AN Litovskoy SSR, 108-118.
 69. Kalayda, M. L., & Govorkova, L. K. (2013). *Metody rybokhozyaystvennykh issledovaniy: uchebnoe posobie.* Sankt-Peterburg: Prospekt Nauki.
 70. Kantemirova, V. M. (2004). Metody ekonomicheskogo obosnovaniya pokazateley effektivnosti rybolovstva i vozmozhnye napravleniya ikh sovershenstvovaniya. *Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Ekonomika*, 3, 44-46.
 71. Karagoyshev, K. K. (2007). Perspektivnye metody i orudiya lova rastitel'noyadnykh ryb na vodokhranilishchakh. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 336, 168-179.
 72. Kirochkin, V. (2011). Metodika otsenki neratsional'nogo ispol'zovaniya vodnykh bioresursov na primere Okhotomorskogo mintaya. *Rybnoe khozyaystvo*, 4, 49-52.
 73. Kitaev, S. P. (2007). Ekspres-metod opredeleniya allopatrii i simpatrii, mnogomernyy statisticheskii analiz po morfologicheskim priznakam i voprosy o „reliktakh” i „endematikakh” u lososevidnykh (na primere sigov, gol'tsov, lenkov). *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 337, 243-258.
 74. Koblitskaya, A. F. (1966). *Izuchenie neresta presnovodnykh ryb: metodicheskoe posobie.* Moskva: Pishchevaya promyshlennost'.
 75. Kovtun, I. F., Korneev, A. A., & Syrovatka, I. I. (2005). Metody otsenki effektivnosti vosproizvodstva promyslovykh ryb v Azovo-Donskom rayone. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom bassejne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot.* Krasnodar: AzNIIRKh, 123-129.
 76. Kozlitina, S. V., & Zhilyakova, L. Yu. (2005). Otsenka koeffitsientov smertnosti azovskikh ryb. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom bassejne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot.* Krasnodar: AzNIIRKh, 182-203.
 77. Kozlitina, S. V., Zhilyakova, L. Yu., & Rekov, Yu. I. (2005). Opredelenie ob"ema vyborki dlya kharakteristiki biologicheskogo sostoyaniya populyatsiy ryb. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom bassejne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot.* Krasnodar: AzNIIRKh, 166-172.
 78. Kozlov, B. V., & Kazakov, R. V. (1985). Metod otsenki stepeni serebreniya molodi prokhodnykh lososevykh ryb po koeffitsientu otrazheniya sveta

- poverkhnost'yu tela. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 5. Vil'nyus: Institut zoologii i parazitologii AN Litovskoy SSR, 106-111.
79. Degtev, A. I., et al. (2007). Kolichestvennaya otsenka prokhodnykh ryb gidroakusticheskim metodom na melkovodnykh vodotokakh. *Rybnoe khozyaystvo*, 6, 102.
 80. Kornienko, G. G., et al. (2005). Kompleksnyy morfometricheskyy analiz [ryb]. *Fiziologo-biokhimicheskie i geneticheskie issledovaniya ikhtiofauny Azovo-Chernomorskogo basseyina. Metodicheskoe rukovodstvo*. Rostov-na-Donu: Everest, 67-74.
 81. Korlyakov, K. A. (2010). O metode opredeleniya chislennosti i biomassy ryb, obitayushchikh sredi zarosley vodnykh rasteniy. *Vklad molodykh uchenykh v rybokhozyaystvennuyu nauku Rossii: Vseros. molodezh. konf., 12-14 okt. 2010 g.: tezisy dokl.* Sankt-Peterburg, 83-86.
 82. Kostousov, V. G. (2007). Metodicheskie podkhody v otsenke rybnykh zapasov i stepeni ikh ekspluatatsii v vodoemakh Belarusi. *Problemy izucheniya, sokhraneniya i vosstanovleniya vodnykh biologicheskikh resursov v 21 veke: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 16-18 okt. 2007 g.: mater.* Astrakhan': KaspNIRKh, 66-67.
 83. Kostousov, V. G. (2007). O metodike opredeleniya optimal'nogo ulova dlya vnutrennikh vodoemov. *Ratsional'noe ispol'zovanie presnovodnykh ekosistem - perspektivnoe napravlenie realizatsii natsional'nogo proekta „Razvitie APK”*: *Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 17-19 dek. 2007 g.: mater. i dokl.* Moskva: Rossel'khozakademiya, 89-91.
 84. Kostousov, V. G. (2008). O metodicheskikh podkhodakh v otsenke rybnykh zapasov i opredelenii rezhimov ratsional'noy ekspluatatsii prirodnikh resursov. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 21-27.
 85. Kotlyar, O. A. (2004). *Metody rybokhozyaystvennykh issledovaniy (ikhtiologiya): uchebnoe posobie*. Rybnoe: Dmitrovskiy filial AGTU.
 86. Kochkin, P. N. (1980). Metodika izgotovleniya preparatov pozvonkov ryb dlya opredeleniya ikh vozrasta (nototeny, klykacha, treski, mintaya, morskogo okunya). *Voprosy ikhtiologii*, 20, 6, 941-944.
 87. Koshelev, B. V. (1981). Izuchenie razmnozheniya ryb (gametogenez, skorost' polovogo sozrevaniya, polovaya tsiklichnost', ritm ikrometaniya i ekologiya neresta). *Issledovaniya razmnozheniya i razvitiya ryb (metodicheskoe posobie)*. Moskva: Nauka, 5-16.
 88. Koshelev, B. V. (1974). Issledovanie zakonomernostey gametogeneza i polovykh tsiklov u ryb v razlichnykh chastyakh areala. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 1. Vil'nyus: Mintis, 37-45.
 89. Kruchinin, O. N., & Seslavinskiy, V. I. (2004). Metodika obosnovaniya vybora orudiy promyshlennogo rybolovstva. *Rybnoe khozyaystvo*, 3, 50-51.
 90. Kublitskas, A. K. (1974). Metodika sbora i obrabotki materiala po pitaniyu ryb. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 1. Vil'nyus: Mintis, 72-79.
 91. Kudryavtsev, V. I., Degtev, A. I., & Sokolov, A. V. (2005). Ob osobennostyakh kolichestvennoy otsenki zapasov baykal'skogo omulya gidroakusticheskim metodom. *Rybnoe khozyaystvo*, 3, 66-69.
 92. Kuznetsov, V. A. (1985). Kolichestvennyy uchet molodi ryb v vodokhranilishchakh i ozerakh (metodicheskie podkhody i vozmozhnosti). *Tipovye*

- metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 5. Vil'nyus: Institut zoologii i parazitologii AN Litovskoy SSR, 26-35.
93. Kuz'menko, Yu. G., & Spesiviy, T. V. (2009). Ekspres-metod zboru ikhtiologichnogo materialu v pol'ovikh umovakh pri doslidzhenni plastichnikh oznak rib z vikoristannyam tsifrovikh tekhnologiy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 11-15.
 94. Kukhorenko, K. G., & Galaktionov, G. Z. (1983). *Gidroakusticheskie metody v otsenke zapasov morskikh organizmov*. Kaliningrad.
 95. Lapin, Yu. E. (1961). Tipy nerestovykh populyatsiy i nekotorye voprosy metodiki issledovaniya dinamiki chislennosti promyslovyykh ryb. *Voprosy ikhtiologii*, 1, 4 (21), 666-680.
 96. Lebed'ko, E. Ya. (2006). *Opredelenie zhivoy massy sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh po promeram: prakticheskoe rukovodstvo*. Moskva: Akvarium.
 97. Letichevskiy, M. A. (1977). Metod opredeleniya pola belorybitsy v period anadromnykh migratsiy. *Rybnoe khozyaystvo*, 8, 35-36.
 98. Libosvarski, Y. (1981). Vychislenie i primeneniye uravneniya rosta po Bertalanffii. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 4. Vil'nyus: Institut zoologii i parazitologii AN Litovskoy SSR, 104-107.
 99. Libosvarskiy, Y. (1974). K metodike opredeleniya chislennosti ryb v malyykh protochnyykh vodoemakh pri pomoshchi elektrolova. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 1. Vil'nyus: Mintis, 117-123.
 100. Luts, G. I., & Rekov, Yu. I. (2005). Metody sbora ikhtiologicheskogo materiala. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom bassejne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot*. Krasnodar: AzNIIRKh, 146-162.
 101. Lyubarets, M. A., & Myasnikov, A. N. (1998). Ob ispol'zovanii akusticheskikh metodov dlya obnaruzheniya i vidovoy identifikatsii ryb. *Tavriys'kiy nauchnyy visnik*, 7, 223-226.
 102. Malkin, E. M. (1974). Formalizatsiya metodiki sostavleniya razmerno-vozzrastnykh „klyuchey” pri izuchenii sostava populyatsiy ryb. *Rybnoe khozyaystvo*, 9, 11-13.
 103. Malkin, E. M. (1976). Formalizatsiya metodiki ustanovleniya kharaktera zavisimosti mezhdru dlinoj osoby i razmerami cheshui i obratnoe raschislenie rosta ryb. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 2. Vil'nyus: Mokslas, 46-53.
 104. Mal'tsev, A. V., & Merkulov, Ya. G. (2006). Biometricheskij metod opredeleniya pola osetrovyykh, v chastnosti - russkogo osetra *Acipenser gueldenstaedtii (Acipenseridae)* azovskoy populyatsii. *Voprosy ikhtiologii*, 46, 4, 536-540.
 105. Mantel'man, I. I. (1978). K metodam otsenki samok sigovykh ryb po kachestvu ikry. *Izvestiya GosNIORKh*, 134, 133-145.
 106. Mel'nikova, E. B. (2008). Metodika opredeleniya koeffitsientov uravneniya rosta Bertalanfi pri neravnykh izmeritel'nykh intervalakh. *Rybne gospodarstvo Ukrainy*, 1, 25-26.
 107. Mel'nikova, E. B. (2011). Opredelenie vnutrividovoy neodnorodnosti khamisy s pomoshch'yu metoda diskriminantnogo analiza. *Rybne gospodarstvo Ukrainy*, 6, 55-60.
 108. Mel'nikova, E. B. (2008). Otsenka sostoyaniya promyslovogo stada chernomorskogo shprota s ispol'zovaniem metodov regressiionnogo analiza.

- Sovremennyye problemy gidrobiologii. Perspektivy, puti i metody resheniy-2: Mezhdunar. nauch. konf., 26-29 avg. 2008 g.: mater.* Kherson, 279-284.
109. Mel'nikova, E. B. (2010). Ekspres-metod opredeleniya vozrastnogo sostava ulovov chernomorskogo shprota. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 47, 2, 41-47.
 110. Mendus', A. P. (1988). Opredelenie promyslovykh zapasov leshcha metodom pryamogo ucheta v Kakhovskom vodokhranilishche. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 288, 90-91.
 111. Menshutkin, V. V. (1964). *Metod modelirovaniya v dinamike chislennosti ryb. (Obzor)*. Moskva: VNIRO.
 112. Metal'nikova, K. V. (2008). Metodika kachestvennoy otsenki stepeni razvitiya embrionov. *Biofizika zhivoy kletki: sbornik nauchnykh trudov*, 9, 90-92.
 113. Pilipenko, Yu. V., et al. (2017). Metodi ikhtiologichnikh doslidzhen': navchal'niy posibnik. Kherson: Oldi-Plyus.
 114. Ozinkov'ska, S. P., Ierko, V. M., & Kokhanova, G. D. (Comp.). (1998). *Metodika zboru i obrobki ikhtiologichnikh i gidrobiologichnikh materialiv z metoyu viznachennya limitiv promislavogo viluchennya rib z velikikh vodoskhovishch i limaniv Ukraini*. Kyiv: Institut ribnogo gospodarstva UAAN.
 115. Lange, N. O., et al. (1974). Metodika issledovaniya morfoekologicheskikh osobennostey razvitiya ryb v zarodyshevyy, lichinochnyy i mal'kovyy periody. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 1. Vil'nyus: Mintis, 56-72.
 116. Nesterov, V. M., et al. (1977). Metodika opredeleniya poverkhnosti anchousovidnoy kil'ki. *Rybnoe khozyaystvo*, 10, 74-75.
 117. Veshchev, P. V., et al. (1993). Metodika ucheta otlozhennoy ikry i skatyvayushchikhsya lichinok osetrovyykh v rusle rek. *Gidrobiologicheskij zhurnal*, 29, 2, 97-105.
 118. Zhilyakova, L. Yu., et al. (2005). Metodicheskie rekomendatsii po opredeleniyu ODU azovskikh promyslovykh ryb. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom bassejne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot*. Krasnodar: AzNIIRKh, 239-252.
 119. *Metodicheskie rekomendatsii po primeneniyu sovremennykh metodov izucheniya pitaniya ryb i rascheta rybnoy produktsii po kormovoy baze v estestvennykh usloviyakh*. (1982). Leningrad.
 120. *Metodicheskie ukazaniya po otsenke chislennosti ryb v presnovodnykh vodoemakh*. (1986). Moskva.
 121. *Metodicheskoe posobie po izucheniyu pitaniya i pishchevykh otnosheniy ryb v estestvennykh usloviyakh*. (1974). Moskva: Vysshaya shkola.
 122. Trokhimets', V. M., & Aleksienko, V. R. (2011). *Metodichni rekomendatsii do ikhtiologichnikh doslidzhen'. Ch. 1: Metodi vilovu rib. uporyad*. Kyiv: Ukrains'kiy fitosotsiologichniy tsentr.
 123. Kruzhilina, S. V., et al. (2015). *Metodichni rekomendatsii zboru ikhtiologichnikh materialiv pri vstanovlenni limitiv promislavogo viluchennya vodnikh bioresursiv na vnutrishnikh vodoymakh*. Kyiv: Institut ribnogo gospodarstva NAAN.
 124. *Metody izucheniya povedencheskikh reaktsiy molodi osetra na «zapechatlenny» khimicheskiiy stimul*. (2005). *Fiziologo-biokhimicheskie i geneticheskie issledovaniya ikhtiofauny Azovo-Chernomorskogo basseyna. Metodicheskoe rukovodstvo*. Rostov-na-Donu: Everest, 48-54.
 125. Kazakov, R. V., et al. (1985). Metody issledovaniya biomekhanicheskikh svoystv kozhnogo pokrova ryb. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v*

- predelakh ikh arealov*. Ch. 5. Vil'nyus: Institut zoologii i parazitologii AN Litovskoy SSR, 90-105.
126. Milanovskiy, Yu. E., & Rekubratskiy, V. A. (1960). O metodakh izucheniya staynogo povedeniya ryb. *Biologicheskie nauki*, 4, 77-81.
 127. Mina, M. V. (1976). Vozmozhnye podkhody k opredeleniyu chislennosti vyborok pri provedenii kompleksnykh issledovaniy populyatsiy. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 2. Vil'nyus: Mokslas, 25-30.
 128. Mina, M. V. (1976). O metodike opredeleniya vozrasta ryb pri provedenii populyatsionnykh issledovaniy. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 2. Vil'nyus: Mokslas, 31-37.
 129. Mina, M. V. (1965). O razrabotke metoda ob"ektivnoy otsenki struktury zon na otolitakh ryb. *MGU. Voprosy ikhtiologii*, 5, 4 (37), 732-735.
 130. Mina, M. V. (1989). Ob ispol'zovanii otolitov karpovykh ryb dlya opredeleniya vozrasta osobey. *Voprosy ikhtiologii*, 29, 6, 914-920.
 131. Mina, M. V., Savvaitova, K. A., & Novikov, G. G. (1976). Vyyavlenie spetsifiki populyatsionnoy struktury pri kompleksnom issledovanii vida u ryb. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 2. Vil'nyus: Mokslas, 123-130.
 132. Semenchenko, S. M., et al. (1989). Modifikatsiya ob"emnogo metoda podscheta ikry ryb. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 293, 139-144.
 133. Mosiyash, S. S. (1995). K metodike opredeleniya rybokhozyaystvennogo ushcherba ot gibeli molodi ryb. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 315, 138-144.
 134. Mosiyash, S. S., & Shashulovskiy, V. A. (2007). O metodicheskikh podkhodakh k opredeleniyu ODU dlya sovokupnosti odnotipnykh malykh vodoemov. *Rybnoe khozyaystvo*, 2, 84-86.
 135. Murza, I. G., & Khristoforov, O. L. (1991). Opredelenie stepeni zrelosti gonad i prognozirovanie vozrasta dostizheniya polovoy zrelosti u atlanticheskogo lososya i kumzhi. Leningrad: GosNIORKh.
 136. Muromtsev, A. M., & Potaychuk, S. I. (1985). Ispol'zovanie metoda oblovlennykh ob"emov dlya izucheniya bioproduktivnosti. *Rybnoe khozyaystvo*, 11, 29.
 137. Nadolinskiy, V. P. (2005). Metody sbora ikhtioplanktona. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodoookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom bassejne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot*. Krasnodar: AzNIIRKh, 256-257.
 138. Pokrovskiy, B. I., et al. (1975). O granitsakh primenimosti metoda Shefera pri otsenke uravnoveshennogo vylova. *Rybnoe khozyaystvo*, 9, 7-8.
 139. Olifirenko, V. V. (1998). Vikoristannya u laboratorniy praktitsi ekspres-metodu biologichnoi otsinki ribi. *Tavriys'kiy naukoviyy visnik*, 5, 102-104.
 140. Kudryavtsev, V. I., et al. (2006). Opyt ispol'zovaniya gidroakusticheskogo metoda i apparatury kolichestvennoy otsenki vodnykh biomass vo vnutrennikh vodoemakh. *Rybnoe khozyaystvo*, 5, 69-71.
 141. Osipov, V. V., & Kiyashko, V. I. (2008). Metodika opredeleniya vozrasta chernomorsko-kaspiyskoy tyul'ki *Clupeonella cultriventris* (*Clupeiformes, Clupeoidei*) po cheshue i otolitam. *Voprosy ikhtiologii*, 48, 5, 668-674.
 142. Degtev, A. I., et al. (2008). Osobennosti ispol'zovaniya gidroakusticheskogo metoda kolichestvennoy otsenki vodnykh biomass na primere otsenki chislennosti baykal'skogo omulya. *Gidroakusticheskie issledovaniya na vnutrennikh vodoemakh: Vseros. konf., Borok, 2-4 dek. 2008 g.: mater. dokl. Borok*, 39-44.

143. Khomenkov, A. S., et al. (1990). Otsenka kachestva polovykh produktov ryb lyuminestsentnymi metodami. *Rybnoe khozyaystvo*, 10, 44.
144. *Otsenka pogreshnostey metodov gidrobiologicheskikh i ikhtiologicheskikh issledovaniy*. (1982). Trudy IBVV AN SSSR. (Vol. 49 (57)).
145. Volovik, S. P., et al. (2005). Otsenka popolneniya promyslovogo stada. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom bassejne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot*. Krasnodar: AzNIIRKh, 204-214.
146. Sideleva, V. G., et al. (1996). Otsenka resursov baykal'skogo omulya gidroakusticheskim metodom. *Rybnoe khozyaystvo*, 6, 37-38.
147. Pavlov, D. A. (2006). Metod otsenki kachestva spermy ryb. *Voprosy ikhtiologii*, 46, 3, 384-392.
148. Pavlov, D. S., & Fomin, V. K. (1978). Metodika opredeleniya kriticheskikh skorostey techeniya dlya ryb. *Rybnoe khozyaystvo*, 11, 30-31.
149. Paritskiy, Yu. A., & Zykov, L. A. (2008). Metodika otsenki vozmozhnogo dopustimogo ulova anchousovidnoy kil'ki po velichine promyslovogo zapasa i promyslovogo usiliya. *Kompleksnyy podkhod k probleme sokhraneniya i vosstanovleniya bioresursov Kaspiyskogo basseyna: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 13-16 okt. 2008 g.: mater. Astrakhan'*, 125-128.
150. Payusova, A. N. (1985). Izmerenie myshechnoy teploustoychivosti kak metod izucheniya akklimatizatsii na primere belogo tolstolobika. *Zhurnal obshchey biologii*, 46, 5, 670-678.
151. Permitin, I. E. (1965). O metodike opredeleniya vozrasta u okunya. *Voprosy ikhtiologii*, 5, 2 (35), 381-384.
152. Pechnikov, A. S., & Tereshenkov, I. I. (1984). K metodike sbora i obrabotki ikhtiologicheskogo materiala. Soobshchenie 2. Prosteyshie metody opredeleniya chislennosti ryb v ozerakh. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 215, 13-38.
153. Pechnikov, A. S., & Tereshenkov, I. I. (1984). K metodike sbora i obrabotki ikhtiologicheskogo materiala. Soobshchenie 1. Opredelenie razmerno-vozrastnoy struktury ulova. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 225, 90-100.
154. Pechnikov, A. S., & Tereshenkov, I. I. (1986). Metody otsenki chislennosti ryb v malykh ozerakh. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 244, 89-92.
155. Poddubnyy, A. G., Goncharov, A. I., & Smetanin, M. M. (1976). Spektral'no-korrelyatsionnyy metod opredeleniya vozrasta i izucheniya rosta ryb s tsikloidnoy cheshuey. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 2. Vil'nyus: Mokslas, 38-45.
156. Polovkov, V. V., & Permitin, I. E. (1976). Ispol'zovanie gidroakusticheskikh ryboposkovykh priborov na vnutrennikh vodoemakh. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 2. Vil'nyus: Mokslas, 6-14.
157. Polymskiy, V. N. (1978). K metodike regulirovaniya intensivnosti promysla poluprokhodnykh ryb v period migratsii. *Izvestiya GosNIORKh*, 136, 8-32.
158. Popova, O. A., & Reshetnikov, Yu. S. (2011). O kompleksnykh indeksakh pri izuchenii pitaniya ryb. *Voprosy ikhtiologii*, 51, 5, 712-717.
159. Pravdin, K. F. (1966). Rukovodstvo po izucheniyu ryb. Moskva: Pishchevaya promyshlennost'.
160. Burgin, M. S., et al. (1981). *Primenimost' matematicheskikh metodov otsenki zapasa i vozmozhnogo vylova ryb: metodicheskie rekomendatsii*. Moskva: VNIRO.

161. Probatov, S. N., & Lyashenko, A. F. (1974). K metodike issledovaniya vynosa molodi ryb iz vodokhranilishch v krupnye orositel'nye kanaly. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 10, 4, 122-126.
162. Kozlitina, S. V., et al. (2005). Prognozirovanie obshchego dopustimogo ulova osnovnykh promyslovykh ryb Azovskogo morya. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom basseyne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot*. Krasnodar: AzNIIRKh, 215-231.
163. Prusevich, N. A. (1975). Metodika prognozirovaniya ulovov poluprokhodnykh sigovykh ryb. *Rybnoe khozyaystvo*, 3, 20-22.
164. Pushkin, S. V., Rautio, E. E., & Chechun, I. S. (1984). Otsenka absolyutnoy chislennosti ryb Kakhovskogo vodokhranilishcha gidroakusticheskim metodom. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 215, 198-207.
165. Reznikov, V. F. (1980). Sovershenstvovanie metodov kosvennykh izmereniy rosta i obmena ob"ektov rybovodstva. *Sbornik nauchnykh trudov VNIIPRKh*, 29, 88-94.
166. Repina, G. V. (2001). Instrumental'nye metody vidovoy identifikatsii ryby i ryboproduktsii. *Rybnoe khozyaystvo*, 5, 52-54.
167. Rizevskiy, V. K., Plyuta, M. V., & Ermolaev, V. V. (2006). Metodika opredeleniya i otsenka poseshaemosti vodoemov Belarusi rybolovami-lyubitelyami. *Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi*, 22, 249-255.
168. Romanenko, V. I. (1978). Razrabotka metodiki rascheta optimal'nykh kompleksov orudiy lova dlya vodokhranilishch. *Izvestiya GosNIORKh*, 131, 126-149.
169. Romanov, V. I., Petlina, A. P., & Babkina, I. B. (2012). *Metody issledovaniya presnovodnykh ryb Sibiri: uchebnoe posobie*. Tomsk: Tomskiy gosudarstvennyy universitet.
170. Rudenko, G. P. (2014). *Chislennost' ryb, ikhtiomassa, produktsiya vyzhivshikh ryb i upravlenie ryboproduktsionnym protsessom v presnovodnykh vodoemakh: metodicheskoe posobie*. Sankt-Peterburg: GosNIORKh.
171. Rukovodstvo po izucheniyu pitaniya ryb v estestvennykh usloviyakh. (1961). Moskva: AN SSSR.
172. Rykova, I. N. (1981). Izuchenie vliyaniya solenosti sredy na ryb v rannem ontogeneze. *Issledovaniya razmnzheniya i razvitiya ryb (metodicheskoe posobie)*. Moskva: Nauka, 185-194.
173. Sal'nikov, N. E., & Kravchenko, D. N. (1978). K metodike opredeleniya upitannosti ryb. *Rybnoe khozyaystvo*, 6, 16-17.
174. Sal'nikov, N. E., & Lugovaya, T. V. (1971). Primenenie novogo metoda dlya massovogo mecheniya molodi ryb. *Rybnoe khozyaystvo*, 12, 128-129.
175. Serebrov, L. I. (1974). Primenenie kolichestvennykh metodov dlya izucheniya povedeniya donnykh promyslovykh ryb. *Rybnoe khozyaystvo*, 9, 14-15.
176. Serenko, V. A. (1984). Otsenka zapasa i limitirovanie ulovov s ispol'zovaniem metoda pryamogo ucheta chislennosti i metodiki P. V. Tyurina (na primere ozera Belogo Vologodskoy oblasti). *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 215, 39-60.
177. Sechin, Yu. T., & Karagoyshiev, K. (1983). Metody opredeleniya koeffitsienta absolyutnoy ulovistosti donnogo trala. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 198, 162-188.
178. Shatokhin, B. M., et al. (2002). Sinopticheskii metod opredeleniya biomass pelagicheskikh ryb (na primere skumbrii SVA). *Rybnoe khozyaystvo*, 5, 23-26.
179. Smetanin, M. M. (2003). *Statisticheskie metody v ekologii ryb*. Borok: Institut biologii vnutrennikh vod im. I. D. Papanina.

180. Smirnov, V. S., Bozhko, A. M., & Dobrinskaya, L. A. (1974). Osnovnye trebovaniya k sboru i obrabotke materiala po kostistym rybam pri ispol'zovanii metoda morfofiziologicheskikh indikatorov. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 1. Vil'nyus: Mintis, 26-37.
181. Sorokin, L. I. (1984). Kontrol' stepeni ekspluatatsii vodoemov metodom oblovlennogo prostranstva. *Rybnoe khozyaystvo*, 6, 55.
182. Spanovskaya, B. D., & Grigorash, V. A. (1976). K metodike opredeleniya plodovitosti edinovremenno i portsiionno ikromechushchikh ryb. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 2. Vil'nyus: Mokslas, 54-62.
183. Spanovskaya, V. D. (1976). Otnositel'naya plodovitost' ryb (opredelenie, ispol'zovanie kak pokazatelya raznokachestvennosti samok). *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 2. Vil'nyus: Mokslas, 63-69.
184. Storozhuk, A. Ya. (1974). K metodike obrabotki ikhtiologicheskikh materialov. *Rybnoe khozyaystvo*, 5, 8-10.
185. Strel'tsova, S. V. (1953). Metody opredeleniya teplostoykosti i kholodostoykosti u ryb. *Izvestiya VNIORKh*, 32, 223.
186. Tereshchenko, V. G., & Zuyanova, O. V. (2006). Metod otsenki otnositel'noy chislennosti pokoleniy osnovnykh promyslovykh vidov ryb pri nepolnoy iskhodnoy informatsii. *Biologiya vnutrennikh vod*, 1, 93-98.
187. Ustich, V. I., Shcherbak, V. I., & Mruk, A. I. (2012). Do metodologii doslidzhen' riznomanittya bioti malikh girs'kikh vodotokiv. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 59-63.
188. Fedorov, V. A. (1996). Metodika otsenki rybnykh zapasov ozer Belarusi i opredelenie optimal'nogo koeffitsienta ikh promyslovogo ispol'zovaniya na osnove prirosta rybnogo stada. *Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi*, 14, 179-195.
189. Fridman, I. L. (1984). K metodike opredeleniya ekonomicheskogo efekta syr'evykh issledovaniy v rybnom khozyaystve. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 215, 217-228.
190. Fridman, I. L. (1986). Metodika opredeleniya ekonomicheskogo efekta prognozirovaniya ulovov ryby v ozerakh, rekakh i vodokhranilishchakh. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 244, 138-149.
191. Khaberman, Kh. Kh. (1985). Opredelenie individual'noy produktivnosti ryb. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 5. Vil'nyus: Institut zoologii i parazitologii AN Litovskoy SSR, 22-25.
192. Khilborn, R., & Uolters, K. (2001). *Kolichestvennye metody otsenki rybnykh zasposov. Vybory, dinamika i neopredelennost' (izbrannye glavy)*. Sankt-Peterburg: Politekhnik.
193. Khorevin, L. D. (1986). Metod prognozirovaniya chislennosti i dinamiki podkhodov iskusstvenno vosproizvodimykh populyatsiy kety. *Rybnoe khozyaystvo*, 4, 26-27.
194. Tseytlin, V. B. (1991). Otsenka sutochnykh ratsionov ryb, poluchaemykh v estestvennykh usloviyakh. *Voprosy ikhtiologii*, 31, 2, 266-271.
195. Tsunikova, E. P. (2005). Metody otsenki effektivnosti vosproizvodstva promyslovykh ryb v Azovo-Kubanskikh limanakh. *Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh issledovaniy v Azovo-Chernomorskom basseyne: sbornik nauchno-metodicheskikh rabot*. Krasnodar: AzNIIRKh, 130-140.

196. Chugunova, N. I. (1959). *Rukovodstvo po izucheniyu vozrasta i rost ryb*. Moskva: AN SSSR.
197. Shaposhnikova, G. Kh., & Klyukanov, V. A. (1974). Metodika izucheniya skeletov ryb v tselyakh sistematiki. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 1. Vil'nyus: Mintis, 9-13.
198. Shentyakova, L. F. (1966). O edinoy metodike rekonstruktsii rosta ryb po cheshue. *Voprosy ikhtiologii*, 6, 2 (39), 303-313.
199. Shibaev, S. V. (2007). Klassifikatsiya metodov otsenki smernosti ryb vo vnutrennikh vodoemakh. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 337, 39-71.
200. Shimanovskaya, L. N. (1977). K voprosu o metodike prognozirovaniya ulovov. *Izvestiya GosNIORKh*, 126, 63-68.
201. Shirokov, L. V. (1977). O metodakh izucheniya vliyaniya abioticheskikh faktorov na izmenenie chislennosti promyslovykh ryb. *Izvestiya GosNIORKh*, 126, 69-75.
202. Shorygin, A. A. (1946). Kolichestvennyy sposob izucheniya pishchevoy konkurentsii ryb. *Zoologicheskii zhurnal*, 25, 1, 45-60.
203. Shuyskiy, V. F. (1988). Metod kolichestvennoy otsenki potrebleniya makrozoobentosa rybami v ozerney litorali. *Sbornik nauchnykh trudov GosNIORKh*, 283, 99-110.
204. Shcherbovski, Ya. (1981). Metod ustanovleniya kriteriev otsenki tempa rosta ryb. *Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov*. Ch. 4. Vil'nyus: Institut zoologii i parazitologii AN Litovskoy SSR, 96-103.
205. Yudanov, K. I. (1986). O metodike s'emok promyslovoy obstanovki. *Rybnoe khozyaystvo*, 12, 44-46.
206. Yudanov, K. I., Tesler, V. D., & Kalikhman, I. L. (1984). O edinoy metodike gidroakusticheskikh s'emok. *Rybnoe khozyaystvo*, 5, 59-60.
207. Yudovich, Yu. B., & Antonyuk, A. V. (1979). Vybory metodiki dlya prognoza ulovov vo vnutrennikh vodoemakh. *Rybnoe khozyaystvo*, 3, 22-23.
208. Yudovich, Yu. B., & Antonyuk, A. V. (1979). Metodika prognozirovaniya vylova ryby v ozerakh, rekakh i vodokhranilishchakh. *Sbornik nauchnykh trudov VNIIPRKh*, 25, 29-41.
209. Yakovlev, V. N., Izyumov, Yu. G., & Kas'yanov, A. N. (1981). Feneticheskii metod issledovaniya populyatsiy karpovykh ryb. *Biologicheskii nauki*, 2, 98-101.
210. Yakubovskiy, M. (1970). Metody vyyavleniya i okraski sistemy kanalov bokovoy linii i kostnykh obrazovaniy u ryb in toto. *Zoologicheskii zhurnal*, 49, 9, 1398-1402.
211. Yandovskaya, N. I., & Persov, P. M. (1978). K metodike prognozov ulovov pri zavodskom vosproizvodstve atlanticheskogo lososya. *Izvestiya GosNIORKh*, 129, 113-118.

ПАМ'ЯТІ ОЗІНКОВСЬКОЇ СВІТЛАНИ ПЕТРІВНИ

23 серпня 2020 р. на 82 році життя перестало битися серце провідного іхтіолога, кандидата біологічних наук, завідуючого відділу вивчення біоресурсів водосховищ Інституту рибного господарства НААН України Озінковської Світлани Петрівни.

С.П. Озінковська народилася 14 січня 1938 р. у м. Керч Кримської обл. У 1959 р. закінчила Центральний заочний інститут рибної промисловості у м. Москва, у 1961 р. — рибогосподарський факультет Всесоюзного заочного інституту харчової промисловості за спеціальністю «іхтіолого-рибовод» у м. Москва.

Понад 50 років свого життя С.П. Озінковська присвятила рибній галузі. Свій трудовий шлях вона розпочала у 1955 р. спостерігачем на судні Азовочоррибопромрозвідки у м. Керч. З 1959 р. працювала молодшим науковим співробітником Азово-Чорноморського науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії у м. Керч.

Починаючи з 1964 р. праця С.П. Озінковської тісно пов'язана з Інститутом рибного господарства НААН України, де вона пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділом водосховищ. За час роботи в Інституті очолювала лабораторії Канівського та дослідно-виробничого Каховського водосховищ. На посаді старшого наукового співробітника працювала у Дніпропетровському опорному пункті та лабораторії акліматизації нових об'єктів рибництва, групи вселення рослинодільних риб у дніпровські водосховища. З 1989 р. по 2001 р. працювала на посаді завідувача відділу водосховищ.

У 1967 р. закінчила аспірантуру і захистила кандидатську дисертацію за темою «Біологія розмноження тюльки Каховського водосховища» з присвоєнням наукового ступеня кандидата біологічних наук. У 1976 р. отримала наукове звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «іхтіологія».

С.П. Озінковська входила до складу проблемно-методичної ради Інституту, була членом ученої та спеціалізованої рад Інституту із захисту кандидатських

дисертацій, головою профкому Інституту. Під її керівництвом підготовлено трьох кандидатів наук для рибного господарства. Мала близько 130 наукових праць, брала участь у багатьох міжнародних та вітчизняних наукових конференціях та нарадах.

За багаторічну віддану, добросовісну працю С.П. Озінковська відзначена почесними грамотами Інституту рибного господарства, медаллю «Ветеран праці». За розроблення «Режиму рибогосподарської експлуатації дослідно-виробничого Каховського водосховища» нагороджена бронзовою медаллю ВДНГ СРСР.

Основна наукова діяльність С.П. Озінковської була пов'язана з розробленням методів раціонального використання біоресурсів дністровських водосховищ та інших внутрішніх водойм України. Вона брала участь у вивченні значення окремих нерестовищ водосховищ дніпровського каскаду у відтворенні рибних запасів. Під її керівництвом розроблено та впроваджено «Временные правила рыболовства» (1972) та «Режим рибогосподарської експлуатації Каховського водосховища» (1974), що було закладено в основу рекомендацій щодо підвищення рибопродуктивності дніпровських водосховищ. Як заступник керівника теми та відповідальний виконавець розділу працювала над розробкою методів підвищення рибопродуктивності водосховищ Дніпра шляхом вселення до них рослиноїдних риб.

С.П. Озінковська була співавтором «Правил промислового рибальства у рибогосподарських водних об'єктах України», «Програми збільшення обсягів вирощування та вилову риби з дніпровських водосховищ та Дніпровсько-Бузького лиману», «Методики збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилову риб з великих водосховищ і лиманів України».

Науково-дослідні роботи очолюваного С.П. Озінковською відділу водосховищ спрямовувались на розробку рекомендацій та пропозицій з поліпшення умов відтворення та нагулу риб, якісного складу промислових уловів, біологічних обґрунтувань прогнозів вилову риби.

Всі, кому доводилось працювати та спілкуватись із С.П. Озінковською, співробітники Інституту, учні, завжди пам'ятатимуть її як відповідальну, сильну, цікаву, цілеспрямовану людину, справжнього науковця, фахівця своєї справи. Терпляча та чуйна, вона завжди приходила на допомогу. Очолюючи протягом багатьох років відділ водосховищ, Світлана Петрівна навчала молодь азам професії. Життєлюбна, добра, світла, гостинна господиня, вірна подруга, вона на завжди запам'ятається такою.

ПАМ'ЯТІ ОЛЕКСІЄНКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА

Провідний вчений-селекціонер, який зробив значний внесок у розвиток селекційно-племінної справи в Україні.

Народився О.О. Олексієнко 2 квітня 1941 року в селі Іванків Київської області в родині службовця. З 1948 по 1958 рр. навчався в Іванківській середній школі.

У 1959 р. був зарахований на заочне відділення зоотехнічного факультету Української сільськогосподарської академії, того ж року розпочав свою трудову діяльність, адже з 1959 по 1962 рр. виконував різні роботи в колгоспі с. Іванків, а з 1963 по 1965 рр. вже працював помічником зоотехніка.

У 1965 р. закінчив Українську сільськогосподарську академію та отримав спеціальність «зоотехнія». З цього року працював в Інституті рибного господарства старшим лаборантом лабораторії селекції риб.

Кругозір і науковий інтерес О.О. Олексієнка плекалися завдяки майстерності та доброзичливості колективу селекціонерів, який на той час був сформований в Інституті. Вибір спеціальності був зроблений під впливом авторитету видатного селекціонера О.І. Кузьоми. Незабаром, за результатами експериментальних досліджень, з'явилися і перші наукові публікації, які були цілком присвячені методам селекційно-племінної справи, зокрема лінійного розведення, масового та гніздового відбору.

А вже у 1982 р. Олександр Олександрович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. У 1991 р. йому було присуджено наукове звання старшого наукового співробітника.

Ведучи наукову діяльність у відділі селекції та генетики риб, паралельно з 1994 по 2011 рр. він працював вченим секретарем, займався перспективним плануванням науково-дослідних робіт Інституту. Забезпечував роботу вченої ради, де особлива увага приділялася звітам про виконання науково-дослідних робіт, їх методичному рівню, якості наукової продукції.

Загальний науковий стаж О.О. Олексієнка склав понад 50 років, які він присвятив питанням селекції українських порід коропа, зокрема створення високопродуктивних зональних стад українських порід коропа, амурського сазана та проведення на їх основі промислової гібридизації в рибних господарствах України, а також проблемам розроблення теоретичних основ підвищення рибопродуктивності внутрішніх водойм України, де за низку років проаналізовано масив експериментальних та літературних даних щодо такого важливого чинника як селекційна робота у ставових господарствах.

Завдяки цьому українські породи здобули загальне визнання — вони використовуються для покращення і створення нових порід, порідних груп, племінних стад, набули широкого впровадження як в Україні, так і в близькому та далекому зарубіжжі.

О.О. Олексієнко був неодноразовим учасником ВДНГ України та колишнього СРСР, за досягнуті успіхи в роботі нагороджений двома срібними медалями ВДНГ СРСР, а також медаллю «У пам'ять 1500-річчя Києва».

У складі авторського колективу в 2018 р. було подано заявку на апробацію антонінсько-зозуленецького внутрішньопородного типу українських порід коропа, де його авторська частка складала 54%.

Олександр Олександрович щедро ділився своїми знаннями з виробничниками, а також з молодими спеціалістами в галузі селекції риби, ним підготовлено ряд спеціалістів рибного господарства із наукових організацій, які займаються педагогічною і науковою діяльністю і до теперішнього часу.

Помер О.О. Олексієнко 20 липня 2020 року.

FISHERIES SCIENCE OF UKRAINE

“Fisheries Science of Ukraine” — a scientific journal, has been published in Ukraine since 2007. “Fisheries Science of Ukraine” included in the List of Specialized Publications of Ukraine, which can be used for publishing results of doctor’s and candidate’s thesis (biological and agricultural subject specialism – 091, 207), recertification of 17.03.2020 (decision of Ministry of Education and Science of Ukraine №409)

Founder and publisher of the journal — Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

State registration certificate KB № 20934-10734 PR of 18.08.2014

EDITOR-IN-CHIEF

Natalia Matvienko, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Ichthyopathology, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF

Ihor Hrytsyniak, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Academician of the NAAS of Ukraine, Director, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Natalia Kolesnyk, Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of International Scientific and Technical Cooperation and Intellectual Property, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

EDITORIAL BOARD

BIOLOGY

Daniel Patrick, Doctor of Biological Sciences, Head of Biology Department Laboratories of the Pyrenees and Landes, FRENCH REPUBLIC

Ihor Buzevych, Doctor of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Leonid Buchatskyi, Doctor of Biological Sciences, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Leading Research Scientist of the Laboratory of Biotechnologies in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Oleksandr Didenko, Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Department of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Vasyl Sondak, Doctor of Biological Sciences, Head of the Water Bioresources Department, National University of Water and Environmental Engineering, UKRAINE

Yuriy Rud’, Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Bio-technology in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Oleksandr Potrokhov, Doctor of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Biology of reproduction of fish, Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, UKRAINE

Pavlo Kutishchev, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Aquatic Bioresources and Aquaculture, Kherson State Agricultural University, UKRAINE

Liudmyla Dragan, Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Ecological Studies Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Kruzhilina Svetlana, Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the section of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Oleh Marenkov, Candidate of Biological Sciences, Assistant professor in the Department of General Biology and Water Bioresources, Oles Honchar Dnipro National University, UKRAINE

AQUATIC BIORESOURCES & AQUACULTURE

Boris Gomelsky, Doctor of Biological Sciences, Professor, Kentucky State University, UNITED STATES OF AMERICA

XU Pao, Doctor, Professor, Director of Freshwater Fisheries Research Center, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Jedrzej Krupinski, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director, National Research Institute of Animal Production, POLAND

Gautam V. Zodape, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Zoology of Shivaji University Kolhapur, REPUBLIC OF INDIA

Oleksandr Tretiak, Doctor of Agricultural Sciences, Senior Research Scientist, Deputy Director in scientific works, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Serhiy Tarasiuk, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences, UKRAINE

Vitaliy Bekh, Doctor of Agricultural Sciences, Aquaculture Department, National University of Life and Environmental Sciences, UKRAINE

Oleksandr Kostenko, Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Veterinary Medicine and Zootechnics Department, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, UKRAINE

Tetiana Sharamok, Candidate of Agricultural Sciences, Assistant professor in the Department of General Biology and Water Bioresources, Oles Honchar Dnipro National University, UKRAINE

Liudmyla Chepil, Candidate of Agricultural Sciences, Assistant professor in the Department of Animal Biology, National University of Life and Environmental Sciences, UKRAINE

Zsigmond Jeney, Doctor of Sciences, Honorary Professor of Pannon University, HUNGARY

Denys Breus, Candidate of Agricultural Sciences, Assistant professor in the Department of Ecology and Sustainable Development named after Professor Yu.V. Pilipenko, Kherson State Agrarian University, UKRAINE

SCIENTIFIC EDITORS OF SECTIONS

are staff employees of the Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine: **Natalia Tushnytska**, Candidate of Veterinary Sciences, Senior Research Scientist, Scientific Secretary of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yaroslav Tuchapskyi**, Candidate of Agricultural Sciences, Head of the Carp Breeding Laboratory of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Zabytivskyi**, Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist of Section of Sturgeon of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Antonina Mruk**, Head of the Laboratory Salmonids Culture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Tetiana Hryhorenko**, Candidate of Agricultural Sciences, Head of the Laboratory of Hydrobiology and Technology of Invertebrates Cultivation of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Hanna Kurinenko**, PhD of Agricultural Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Fish Selection.

Editorial board of the Journal “Fisheries Science of Ukraine”: Institute of Fisheries NAAS, 135, Obukhivska St, Kiev-164, Ukraine, 03164; tel.:

+38 097 700 77 25. <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Layout design: Natalia Kolesnik, Serhiy Shinkar, Yevheniy Arkhanhelskyi, Oleksandr Bezusyi; **Making-up:** Yevheniy Arkhanhelskyi, Maria Simon;

Literature editing: Tetiana Shvets; **Corrector:** Hanna Kovalchuk

Postal address:

Editorial board of the Journal "Fisheries Science of Ukraine",
Institute of Fisheries NAAS,
135, Obukhivska St, Kiev-164, Ukraine, 03164

Phone mobile: +38(094) 827-01-86

Web-site: <http://fsu.ua>

E-mail: fsu.journal@gmail.com