ISSN 2312-9581 (Online)

ISSN 2075-1508 (Print)

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu>

F S U

FISHERIES SCIENCE OF UKRAINE

Institute of Fisheries
of the National Academy
of Agrarian Sciences
of Ukraine

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

3

Інститут рибного господарства
Національної академії аграрних наук України

2021

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські спеціальності — 091, 207), категорія «Б», переатестація від 17.03.2020 (наказ Міністерства освіти і науки України № 409)

Засновник та видавник — Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Свідчення про державну реєстрацію KB № 20934-10734 ПР від 18.08.2014

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

МАТВІЄНКО Наталія Миколаївна, доктор біол. наук, с. н. с., зав. відділу іхтіопатології, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ГРИЦІНЯК Ігор Іванович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, директор Інституту рибного господарства НААН, УКРАЇНА

КОЛЕСНИК Наталія Леонідівна, кандидат с.-г. наук, с. н. с., зав. лаб. міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

БІОЛОГІЯ

Патрік Даніель, доктор біол. наук, голова департаменту біології Лабораторії Піренеїв, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА

Бузевич Ігор Юрійович, доктор біол. наук, с. н. с., зав. відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Бучацький Леонід Петрович, доктор біол. наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), провідний науковий співробітник лаб. біотехнологій в рибництві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Діденко Олександр Володимирович, канд. біол. наук, с. н. с., відділ вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, зав. каф. водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА

Рудь Юрій Петрович, канд. біол. наук, с. н. с., зав. лабораторії біотехнологій в рибництві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Потрохов Олександр Спиридонович, доктор біол. наук, с. н. с., зав. лаб. біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, УКРАЇНА

Кутіщев Павло Сергійович, канд. біол. наук, зав. каф. водних біоресурсів та аквакультури, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

Драган Людмила Петрівна, канд. біол. наук, с. н. с., зав. лаб. екологічних досліджень, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Кружиліна Світлана Володимирівна, канд. біол. наук, с. н. с., зав. сектору відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Маренков Олег Миколайович, канд. біол. наук., завідувач каф. загальної біології та водних біоресурсів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, УКРАЇНА

ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА

Гомельський Борис, доктор біол. наук, професор, Державний Університет Кентуккі, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Ху Пао, доктор с.-г. наук, професор, директор Центру прісноводного рибного господарства, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

Крупінські Єджей, доктор с.-г. наук, професор, іноземний член Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут зоотехнії Польщі, ПОЛЬЩА

Зодапе Гаутам В., доктор біол. наук, професор, декан факультету зоології Державного Університету Шиваджи в Колхапурі, РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ

Третяк Олександр Михайлович, доктор с.-г. наук, с. н. с., заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Бех Віталій Валерійович, доктор с.-г. наук, професор, каф. аквакультури, Національний університет біоресурсів і природокористування, УКРАЇНА

Костенко Олександр Іванович, канд. с.-г. наук, с. н. с., зав. відділу ветеринарної медицини та зоотехнії, Національна академія аграрних наук України, УКРАЇНА

Шарамок Тетяна Сергіївна, канд. с.-г. наук, доцент каф. загальної біології та водних біоресурсів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, УКРАЇНА

Чепіль Людмила Василівна, канд. с.-г. наук, доцент каф. біології тварин, Національний університет біоресурсів і природокористування, УКРАЇНА

Жигмонд Женей, доктор с.-г. наук, професор, Паннонський університет, УГОРЩИНА

Бреус Денис Сергійович, канд. с.-г. наук, доцент каф. екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

є штатними працівниками Інституту рибного господарства НААН України: **Тушницька Наталія Йосифівна**, канд. вет. наук, с. н. с., вчений секретар ІРГ НААН; **Тучапський Ярослав Васильович**, канд. с.-г. наук, с. н. с. відділу селекції риб ІРГ НААН; **Забитівський Юрій Михайлович**, канд. біол. наук, с. н. с., заступник директора Львівської дослідної станції ІРГ НААН; **Мрук Антоніна Іванівна**, зав. лаб. лососівництва ІРГ НААН; **Григоренко Тетяна Володимирівна**, канд. с.-г. наук, зав. лаб. гідробіології та технологій культивування цінних безхребетних ІРГ НААН; **Куріненко Ганна Анатоліївна**, канд. с.-г. наук, зав. відділу селекції риб ІРГ НААН.

Редакція журналу «Рибогосподарська наука України»: вул. Обухівська, 135, м. Київ-164, 03164
тел.: +38(097) 700-77-25; <http://fsu.ua>; Емайл: fsu.journal@gmail.com

Підписано до друку 19.08.2021 р. Формат 70×108/16. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 8,0. Наклад 500 прим.
Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту рибного господарства НААН (Протокол № 6 від 19.08.2021 р.)

Дизайн макету: Колесник Н. Л., Шинкар С. В., Архангельський Є. Ю., Безусий О. Л.

Верстка: Архангельський Є. Ю., Симон М. Ю. Літературне редагування: Швець Т. М. Коректор: Ковальчук Г. В.

Друкарня ТОВ «ПРО ФОРМАТ», 02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 45 Б, оф. 16, тел.: +38(044) 353-85-58

РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

3/2021(57)

Заснований у 2007 р.
Виходить 4 рази на рік

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 1-120
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03>

З М І С Т

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 5-22
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.005>

*В. О. Литвиненко, Д. С. Христенко, Г. О. Котовська, Н. Л. Колесник,
М. Ю. Симон*

Особливості вилову плоскирки (*Blicca bjoerkna* (Linnaeus, 1758)) з
Київського водосховища (огляд) 5

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 23-32
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.023>

Д. Ю. Шарило, В. О. Коваленко, Б. Ю. Коваленко

Особливості застосування гіпохлориту натрію для регенерації
високопористих наповнювачів після їх використання у біофільтраційних
системах установок замкнутого водопостачання..... 23

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 33-47
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.033>

*Т. В. Григоренко, Н. М. Савенко, Н. П. Чужма, А. М. Базаєва,
Т. О. Берсан*

Вирощування цьоголіток коропа із застосуванням суспензії хлорели 33

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 48-59
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.048>

*В. В. Гурбик, О. І. Стрілецький, Г. А. Куріненко, В. Л. Ткачук,
Ю. П. Черник*

До апробації галицького масиву коропа 48

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 60-71
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.060>

О. П. Добрянська

Ефективність використання в годівлі коропа пребіотика на основі
мананових олігосахаридів 60

© Інститут рибного господарства НААН України, 2021

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 72-86

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.072>*О. В. Дерень, Н. Ю. Сироватка, М. З. Кориляк, О. П. Добрянська*Результати використання в годівлі коропа сорбенту у складі корму з
ознаками контамінування мікотоксинами **72****ІХТІОПАТОЛОГІЯ**

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 87-106

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.087>*А. В. Ващенко, Н. М. Матвієнко, І. А. Кравченко, А. І. Мрук*Паразитарні хвороби сигових риб (*Coregoninae*) (огляд) **87**

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 107-120

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.107>*Н. В. Шмиголь, Н. Б. Єсінова, Т. С. Шарамок*Використання антигельмінтного препарату для боротьби з паразитичними
нематодами молюска гелікса малого сірого (*Helix aspersa* (Müller)) **107**

СОДЕРЖАНИЕ

БИОРЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ ВОДОЕМОВ

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 5-22

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.005>

- В. А. Литвиненко, Д. С. Христенко, А. А. Котовская, Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон
Особенности вылова густеры (*Blicca bjoerkna* (Linnaeus, 1758)) из Киевского
водохранилища (обзор) 5

ТЕХНОЛОГИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 23-32

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.023>

- Д. Ю. Шарило, В. А. Коваленко, Б. Ю. Коваленко
Особенности применения гипохлорита натрия для регенерации высокопористых
наполнителей после их использования в биофильтрационных системах установок
замкнутого водоснабжения 23

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 33-47

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.033>

- Т. В. Григоренко, Н. Н. Савенко, Н. П. Чужма, А. Н. Базаева, Т. А. Берсан
Выращивание сеголеток карпа с использованием суспензии хлореллы (*Chlorella*
(Beijerinck, 1890)) 33

СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 48-59

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.048>

- В. В. Гурбик, О. И. Стрелецкий, А. А. Куриненко, В. Л. Ткачук, Ю. П. Черник
К апробации галицийского массива карпа 48

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 60-71

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.060>

- О. П. Добрянская
Эффективность использования в кормлении карпа пребиотика на основе маннанных
олигосахаридов 60

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 72-86

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.072>

- О. В. Дерень, Н. Ю. Сыворотка, М. З. Корыляк, О. П. Добрянская
Результаты использования в кормлении карпа сорбента в составе корма с признаками
контаминирования микотоксинами 72

ИХТИОПАТОЛОГИЯ

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 87-106

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.087>

- А. В. Ващенко, Н. Н. Матвиенко, И. А. Кравченко, А. И. Мрук
Паразитарные болезни сиговых рыб (*Coregoninae*) (обзор) 87

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 107-120

DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.107>

- Н. В. Шмыголь, Н. Б. Есипова, Т. С. Шапарок
Использование антигельминтного препарата для борьбы с паразитическими
нематодами моллюска геликса малого серого (*Helix aspersa* (Müller)) 107

CONTENTS

BIORESOURCES AND ECOLOGY OF WATER BODIES

- Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 5-22
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.005>
V. Lytvynenko, D. Khrystenko, G. Kotovska, N. Kolesnik, M. Simon
Features of catching white bream (*Blicca bjoerkna* (Linnaeus, 1758)) from Kyiv reservoir (a review)..... 5

TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE

- Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 23-32
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.023>
D. Sharylo, V. Kovalenko, B. Kovalenko
Sodium hypochlorite peculiarities in application for restoration of highly porous fillers after their use in biofiltration systems of recirculating aquaculture systems..... 23
- Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 33-47
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.033>
T. Hryhorenko, N. Savenko, N. Chuzhma, A. Bazaieva, T. Bersan
Cultivation of young-of-the-year carp with the use of chlorella (*Chlorella* (Beijerinck, 1890)) suspension..... 33

SELECTION, GENETICS AND BIOTECHNOLOGY

- Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 48-59
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.048>
V. Gurbyk, O. Striletsky, H. Kurinenko, V. Tkachuk, Yu. Chernik
To the approval of the Galician carp group 48

FEEDS AND FEEDING

- Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 60-71
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.060>
O. Dobryanska
Efficiency of use of prebiotics based on manane oligosaccharides in carp feeding..... 60

PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

- Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 72-86
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.072>
O. Deren, N. Syrovatka, M. Koryliak, O. Dobryanska
Results of the use of a sorbent in a carp feed with signs of mycotoxin contamination 72

ICHTHYOPATHOLOGY

- Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 87-106
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.087>
A. Vashchenko, N. Matvienko, I. Kravchenko, A. Mruk
Parasitic diseases of whitefish (*Coregoninae*) (a review)..... 87
- Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 107-120
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.107>
N. Shmyhol, N. Yesipova, T. Sharamok
Use of an anthelmintic to control parasitic nematodes of *Helix aspersa* (Müller) 107

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 5-22
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.005>
УДК 639.215.43(282.247.323)

Received 02.03.21
Received in revised form 20.04.21
Accepted 14.05.21

ОСОБЛИВОСТІ ВИЛОВУ ПЛОСКИРКИ (*BLICCA BJOERKNA* (LINNAEUS, 1758)) З КИЇВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА (ОГЛЯД)

В. О. Литвиненко, dskhrist@gmail.com, Державне екологічна інспекція, м. Київ
Д. С. Христенко, dskhrist@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Г. О. Котовська, gannkot@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Л. Колесник, kolenataleo@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати масив спеціальної літератури та узагальнити отриману інформацію щодо особливостей промислового вилову плоскирки (*Blicca bjoerkna* (Linnaeus, 1758)) з Київського водосховища. Розглянути основні принципи його прогнозування, виходячи з сучасного екологічного стану даної водойми, що має стратегічне значення для України.

Результати. Представлено огляд сучасних наукових публікацій, присвячених особливостям промислового вилову плоскирки з Київського водосховища, його прогнозуванню та перспективам використання даного виду у рибному господарстві. Узагальнено літературні дані щодо специфіки промислового лову на Київському водосховищі, виходячи з екологічних особливостей цієї водойми. Описано основні чинники, що впливають на пристосованість популяцій плоскирки до промислової експлуатації. Розглянуто загальні напрями впливу на них антропогенного тиску та його наслідки. Показано перспективність використання плоскирки у якості господарсько цінної риби за умови раціонального промислового лову на Київському водосховищі.

Практична значимість. Огляд може бути корисним для науковців, здобувачів, студентів, державних службовців та приватних підприємців, які задіяні у процес дослідження чи використання водних живих ресурсів на водосховищах, насамперед — Київському.

Ключові слова: плоскирка (*Blicca bjoerkna* Linnaeus, 1758), Київське водосховище, промисловий лов, іхтіофауна.

FEATURES OF CATCHING WHITE BREAM (*BLICCA BJOERKNA* (LINNAEUS, 1758)) FROM KYIV RESERVOIR (A REVIEW)

V. Lytvynenko, dskhrist@gmail.com, State Environmental Inspectorate of Ukraine, Kyiv
D. Khrystenko, dskhrist@gmail.com, Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences, Kyiv
G. Kotovska, gannkot@gmail.com, Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences, Kyiv
N. Kolesnik, kolenataleo@gmail.com, Institute of Fisheries of the NAAS, Kyiv
M. Simon, seemann.sm@gmail.com, Institute of Fisheries of the NAAS, Kyiv

© В. О. Литвиненко, Д. С. Христенко, Г. О. Котовська, Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон, 2021

Purpose. To analyze the array of special literature and summarize the information obtained on the features of the white bream (*Blicca bjoerkna* (Linnaeus, 1758)) and its commercial catch from the Kyiv reservoir. Consider the basic principles of its forecasting, based on the current ecological state of this reservoir, which is of strategic importance for Ukraine.

Findings. An overview of modern scientific publications devoted to the peculiarities of the commercial catch of white bream from the Kyiv reservoir, its forecasting and the prospects for using this species in fisheries is presented. The literature data on the specifics of industrial fishing in the Kyiv reservoir are summarized based on the ecological characteristics of this reservoir. The main factors influencing the adaptation of white bream populations to their commercial exploitation are described. The general directions of the impact of anthropogenic pressure on them and their consequences are considered. The prospects of using white bream as an economically valuable species are shown under the condition of rational industrial fishing in the Kyiv reservoir.

Practical Value. The review can be useful for scientists, applicants, students, government authorities and private entrepreneurs involved in the process of research and commercial harvesting of living aquatic resources in reservoirs, namely in Kyiv reservoir.

Keywords: white bream (*Blicca bjoerkna* Linnaeus, 1758), Kyiv reservoir, industrial fishing, ichthyofauna.

ОСОБЕННОСТИ ВЫЛОВА ГУСТЕРЫ (BLICCA BJOERKNA (LINNAEUS, 1758)) ИЗ КИЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА (ОБЗОР)

В. А. Литвиненко, dskhrist@gmail.com, Государственная экологическая инспекция, г. Киев

Д. С. Христенко, dskhrist@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

А. А. Котовская, gannkot@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Н. Л. Колесник, kolenataleo@gmail.com, Институт рыбного хозяйства, г. Киев

М. Ю. Симон, seemann.sm@gmail.com, Институт рыбного хозяйства, г. Киев

Цель. Проанализировать массив специальной литературы и обобщить полученную информацию об особенностях промышленного вылова густеры (*Blicca bjoerkna* (Linnaeus, 1758)) из Киевского водохранилища. Рассмотреть основные принципы его прогнозирования, исходя из современного экологического состояния данного водоема, имеющего стратегическое значение для Украины.

Результаты. Представлен обзор современных научных публикаций, посвященных особенностям промышленного вылова густеры из Киевского водохранилища, его прогнозированию и перспективам использования этого вида в рыбном хозяйстве. Обобщены литературные данные о специфике промышленного лова на Киевском водохранилище, исходя из экологических особенностей данного водоема. Описаны основные факторы, влияющие на адаптированность популяций густеры к их промысловой эксплуатации. Рассмотрены общие направления воздействия на них антропогенного пресса и его последствия. Показана перспективность использования густеры в качестве хозяйственно ценного вида при условии рационального промышленного лова на Киевском водохранилище.

Практическая значимость. Обзор может быть полезным для ученых, соискателей, студентов, государственных служащих и частных предпринимателей, задействованных в процессе исследования или использования водных живых ресурсов на водохранилищах, прежде всего — Киевском.

Ключевые слова: густера (*Blicca bjoerkna* Linnaeus, 1758), Киевское водохранилище, промышленный лов, ихтиофауна.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Іхтіофауна Київського водосховища представлена усіма видами риб, що існували до зарегулювання на відповідній ділянці річки Дніпро, однак після нього змінилося їх кількісне співвідношення та з'явилися нові види [1–3].

Наразі масовими у ньому стали риби озерного комплексу (плітка, щука, лин, лящ, синець, срібний карась, верховодка, краснопірка, окунь), а загалом у ньому зустрічається 40 видів риб, із яких 24 є перспективними для промислу та 18 стабільно зустрічаються у промислових уловах. Сировинну базу промислових уловів цієї водойми утворюють фітофільні еврибіонтні види понто-каспійського та бореального рівнинного фауністичних комплексів — лящ, плітка, судак, щука. Причому більшість цих промислово цінних видів риб є консументами другого та третього порядків, а частка хижаків у загальній іхтіомасі відносно невелика. В цілому, популяції ляща, плоскирки, плітки, європейського сома, білизни, окуня та карася сріблястого Київського водосховища знаходяться в задовільному стані на тлі помірної експлуатації промислового ядра, а їх умови нагулу та формування промислового запасу є сприятливими [2, 4–7].

Загалом, якщо оцінювати видове різноманіття іхтіофауни Київського водосховища за всіма видами, а не лише промисловими, то виявиться, що індекс Шеннона зріс, порівняно з радянськими роками. Причому, інтерпретація ентропійного індексу Шеннона свідчить, що різноманітність визначається як кількість інформації, яка припадає на одну особину та вміщується в розподілі за акумульованою іхтіомасою або за особинами. Таким чином, вплив рибного промислу на біологічне різноманіття іхтіофауни Київського водосховища не є визначальним, на відміну від інших форм антропогенного навантаження (несприятливий рівневий режим, забруднення поліутантами, знищення нерестовищ та місць нагулу). Наприклад, у цьому водосховищі підтримується постійний рівень води упродовж вегетаційного періоду, що перешкоджає розвитку м'якої лугової рослинності — оптимального субстрату для нересту таких господарсько цінних представників бореального рівнинного фауністичного комплексу як плітка, щипавка, щука або ж в'язь, що потерпає від скорочення площ як нерестовищ, так і нагулу [5, 8–10].

На межі зникнення у Київському водосховищі знаходяться такі види як в'язь, підуст, лин та осетрові. Це пояснюється антропогенним навантаженням в цілому, та відсутністю заходів із формування промислової іхтіофауни під час введення водосховища у експлуатацію. Наприклад, зміна гідрологічного режиму призвела до масових елімінацій таких реофільних видів риб, як білизна, підуст та рибець. Відповідно, промислові запаси риб визначали процеси сукцесій у біоценозах, що більшою мірою й пояснює декілька стрімких знижень показників кількісного та якісного складу промислових уловів вже за часів Незалежності України [5, 7, 11–14].

Наявний стан якісної та кількісної структури складу іхтіофауни цієї водойми зумовлений тим, що у порівнянні з іншими, на даному водосховищі є відкрита вершина, спостерігається достатня проточність та на більшості ділянок акваторії умови максимально наближені до тих, що були до зарегулювання. Окрім того, з метою підтримання наявної іхтіофауни, за сприяння Інституту рибного господарства НААН регулярно, здебільшого один раз на три роки, за кошти

бюджету та щорічно за кошти громадських організацій та рибопромислових підприємств здійснюються зарибнення. Під час нього у досліджувану водойму випускають підрощену молодь далекосхідних рослиноїдних (строкатий та білий товстолобики і їх гібриди, чорний та білий амури) та аборигенних (щука, судак, сазан, європейський сом, стерлядь) видів риб [12, 15–17]. Причому, основне значення зарибнення трьома видами хижих риб (щука, судак, європейський сом) полягає не лише у створенні промислового запасу, а й у формуванні збалансованої структури іхтіофауни, що є обов'язковою умовою ефективного рибного промислу на тлі стабільного гомеостазу екосистеми водосховища. Зауважимо, що традиційно у водосховище вселяють дволіток далекосхідних рослиноїдних риб, що характеризуються високими товарними якість, однак не здатні сформувати популяцію з самовідтворенням. Власне, до 90% поповнення промислових запасів забезпечує природне відтворення. Воно ж знаходиться під тиском антропогенного навантаження, що у підсумку призвело до втрати частини нерестовищ, сповільнення природного відновлення рибних запасів, і перебування окремих популяцій риб на межі, коли показники загальної смертності лише трішки менші, ніж відтворювальна здатність. Наприклад, якщо показники уловів основного аборигенного об'єкта зарибнення — сазана — збільшились втричі, то вищезгаданих трьох хижих видів зменшились, і наразі їх частка в уловах може доходити до 4% [5, 18–20].

Загалом, Київське водосховище характеризується достатньою розвиненістю біотопів для існування основних господарсько цінних риб, а рівень розвитку синьо-зелених водоростей та заростання макрофітами не є критичним для формування промислової іхтіофауни [21–24].

Отже, завдяки вищенаведеним умовам та заходам, у Київському водосховищі стан запасів основних цінних промислових видів риб стабільний, а середня біопродуктивність становить понад 13 кг/га. Основу уловів крупновічковими сітками утворює лящ, білий і строкатий товстолобики та їх гібриди. Основу уловів дрібновічковими сітками складають: плоскирка, плітка, чехоня, окунь та синець. Загалом, упродовж останніх років створено оптимальний запас водних біоресурсів із якісними та кількісними показниками, що свідчать про можливість ведення ефективного рибного промислу на Київському водосховищі [7, 8, 12, 25–27].

З метою економічно ефективного забезпечення максимальних уловів у Київському водосховищі необхідно цілеспрямовано формувати достатній промисловий запас із найбільш перспективних у господарському відношенні видів та експлуатувати саме їх, постійно відслідковуючи регресійні явища у біоценозах. Стратегічними завданнями для стабільного розвитку рибного промислу у цьому водосховищі є зарибнення молоддю стенобіонтних видів із низькою чисельністю плідників (щука, сазан, європейський сом, лин) та облаштування штучних нерестовищ для еврибіонтних видів із достатньою чисельністю плідників (лящ, плітка, судак) [5, 11, 28–30].

Разом з тим, жодного з вищезазначених заходів, що були б спрямовані на підтримання чисельності популяцій такого виду, як плоскирка, не здійснювалось. Однак, саме він є широкопоширеним в Україні в цілому та у даній водоймі зокрема, що становить потенційно високе значення для промислового рибальства [7, 8, 31, 32]. Саме тому метою роботи був аналіз особливостей її промислового

вилову у Київському водосховищі, що є головним у каскаді дніпровських водосховищ, та адаптованості її популяцій до антропогенного навантаження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Київське водосховище є водним об'єктом комплексного призначення, що характеризується значною цінністю у якості рибогосподарської водойми. Останнє підтверджується численними нормативно-правовими документами, в яких контролюючими природоохоронними органами визначено основні параметри ефективності саме рибогосподарського використання цього водосховища. Насамперед, це стосується нормативу рибопродуктивності, що є кількісним аспектом, який здебільшого визначається, виходячи із проектних показників, узгоджених під час введення його в експлуатацію у 1966 р. Так, передбачалося, що рибопродуктивність цієї водойми має бути близько 40 кг/га, або ж забезпечувати 25 тис. т загального вилову риби щороку [33, 34]. Необхідно підкреслити, що понад 50% цих обсягів вилову мало б бути досягнуто шляхом щорічних комплексних заходів зі сприяння відтворенню його іхтіофауни, насамперед за допомогою облаштування нерестовищ та зариблення. Зокрема, лише для отримання 18 кг риби з 1 га Київського водосховища кожної осені треба було б випускати з нерестово-виращувальних господарств підрощену молодь. Виходячи з соціально-економічних реалій, не дивно, що єдиними двома роками, коли вдалося отримати близько 23,8 тис. т риби, або ж досягти рибопродуктивності 25 кг/га, були 1972 й 1989 рр. Важливо, що за радянських часів частка плоскирки у рибному промислі на вищезгаданій водоймі становила близько 18% від загального числа інших видів риб. На сьогодні, рибопродуктивність даного водосховища не перевищує 10 кг/га, а резервні запаси ресурсної бази, у тому числі й плоскирки, використовуються промисловим рибальством нераціонально [7, 8, 10, 11, 35, 36].

Загалом, антропогенна трансформація цієї водойми триває й понині, взаємозалежно відбиваючись з соціально-економічними реаліями сьогодення. Разом вони впливають не лише на кількісний та якісний стан популяцій плоскирки у даному водосховищі, але і на його значення для населення в короткостроковій та довгостроковій перспективах. Актуальності цій проблематиці надає те, що власне плоскирка є масовим видом у ньому, а показники її промислових уловів відзначаються порівняною стабільністю упродовж багатьох років. Окрім того, масовість плоскирки — це опосередкована ознака важливої функціональної ролі даного виду в підтриманні сталості екосистеми Київського водосховища. Наприклад, у наш час плоскирка сприяє зниженню його евтрофікації шляхом виїдання організмів зоопланктону. Примітно, що коли це водосховище лише вводилося в експлуатацію, плоскирка у ньому належала до фонових видів з помірною чисельністю і споживала в основному безхребетні організми бентосу. Більш того, навіть здійснювали її меліоративні вилови, аби підтримати популяції ляща, з яким у неї дотичні спектри живлення. Однак, здатність цієї риби змінювати свій раціон живлення, пристосовуючись до зміни умов навколишнього середовища під антропогенним впливом, зробила її однією з цільових у біоманіпуляціях [5, 7, 8, 16, 19, 37–39].

Саме тому, щорічною необхідністю є розрахунки економічного та екологічного ефектів від рибогосподарської діяльності на Київському

водосховищі. У свою чергу, ці розрахунки та комплексні прогнози щодо кожного окремого виду риб можливі лише завдяки регулярним іхтіологічним дослідженням. Останні дають змогу визначити й передбачити основні характеристики перебігу внутрішньо- та міжпопуляційних процесів у взаємодії з антропогенними чинниками, що не обмежуються браконьєрським вилученням чи спорудженням гідроспоруд без систем захисту риб [40, 41].

Наприклад, під дією антропогенних чинників у плоскирки з Київського водосховища спостерігаються зміни низки морфологічних ознак (зазвичай — нормальної висоти тіла й довжини хвостового стебла, а також діаметра очей), що є адекватним пристосуванням до нового гідрологічного та екологічного режимів у річкових риб, пристосованих до течії. Навіть у наш час, коли пройшов не один десяток років від введення цього водосховища в експлуатацію, відносна чисельність цьоголіток плоскирки на його прибережних біотопах річкової та озерно-річкової ділянок перевищує середню по водоймі у 3–8 рази, а величина індексу Шеннона коливається від 1,92 до 2,37 біт/екз. [5, 7, 8, 42, 43].

Набагато гіршим є зростання частоти зустрічання патологій розвитку. Найпоширенішими для даного виду риб є патології бічної лінії (насамперед, аномалії числа отворів сейсмоденситивних каналів), променів плавців (переважно — викривлення) та пігментації луски (здебільшого, плями від рожевого до темно-червоного кольору на голові). Останніми роками ці значення становлять 20, 27 та 9% відповідно. В цілому, кількість особин даного виду риб з фенотиповими змінами у цій водоймі зросла до 25%, що свідчить про депресивний стан екосистеми. Водночас, основні рибпромислові показники якості (вгодованість, ступінь наповнення кишечника, жирність) у риб з фенотиповими змінами не відрізнялись від таких у риб, чий фенотип відповідав нормі. Окрім того, у плоскирки здебільшого реєструється одна патологія розвитку, з рівною частотою у риб обох статей [44, 45].

Та найбільш загрозливим наслідком системного негативного впливу антропогенного навантаження на плоскирку з Київського водосховища є наявність у її особин з промислових уловів значного рівня вмісту важких металів. Так, порівняно з лящем, карасем, синцем та краснопіркою, саме у органах і тканинах плоскирки зареєстровано найвищі показники концентрації сполук феруму (для якого ГДК відсутня) — від 18,4 мг/кг сирової маси у м'язах до 198,2 мг/кг сирової маси у нирках. Сполуки цинку (ГДК 40,0 мг/кг сирової маси) більш рівномірно, ніж такі феруму, розподілялись в організмі плоскирки та за вмістом варіювали в межах від 4,7 мг/кг сирової маси у м'язах до 54,8 мг/кг — у печінці. За загальним вмістом сполук мангану (ГДК якого відсутня) плоскирка з Київського водосховища значно поступається чехоні та синцю з цієї ж водойми. В неї його вміст найбільших у зябрах — 1,74 мг/кг сирової маси та найменший — у м'язах — 0,1 мг/кг сирової маси. Загальний вміст сполук купруму (ГДК — 10,0 мг/кг сирової маси) у плоскирки, карася та краснопірки приблизно однаковий та вищий, ніж такий у чехоні та краснопірки. Зокрема, найбільша концентрація — у печінці, для плоскирки це 14,86 мг/кг сирової маси, та найменша — у м'язах — 1,28 мг/кг сирової маси. Для сполук нікелю ГДК відсутня, та у плоскирки з вищезгаданої водойми їх вміст варіював від 0,09 мг/кг сирової маси у нирках до 1,53 мг/кг сирової маси у зябрах. І знову, за вмістом цього елемента плоскирка, краснопірка та карась характеризувались майже однаковими показниками, тоді як у ляща та синця його було істотно менше. За рівнем вмісту кобальту, для якого значення ГДК не

встановлене, також плоскирка й краснопірка перевершували інші вищезгадані види риб. Так, у плоскирки найменше його було у нирках (0,07 мг/кг сиріої маси), та найбільше — у зябрах (0,46 мг/кг сиріої маси). Вкрай токсичні сполуки свинцю (ГДК — 1,0 мг/кг сиріої маси) переважають у плоскирки, в якій за вмістом вони були приблизно на одному рівні з такими у краснопірки та чехоні (від 0,65 мг/кг сиріої маси у м'язах до 1,7 мг/кг сиріої маси в шкірі). Інший здатний до акумуляції токсикант — кадмій (ГДК — 0,2 мг/кг сиріої маси) — переважав у нирках плоскирки (0,036 мг/кг сиріої маси) за найменшого вмісту у печінці (0,007 мг/кг сиріої маси). Концентрація його сполук також була найвищою у плоскирки, краснопірки та карася, порівняно з іншими вищезгаданими представниками іхтіофауни Київського водосховища [45–50].

Серед екологічних змін, опосередковано спричинених антропогенним навантаженням і загрозливих для плоскирки, необхідно назвати глобальну зміну клімату на більш теплий та посушливий. Так, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО), це є однією зі стратегічних загроз для ведення рибальства в Україні. У Київському водосховищі через глобальне потепління починають реєструватись більш ранні строки настання та завершення нерестового періоду. Навіть у роки з нестійкими погодними умовами та зниженням температури зміни нерестового періоду характеризуються зсувами на більш ранній час. Окрім того, існує залежність між середніми показниками температури впродовж літа та строками початку нересту плоскирки — чим вони вищі, тим раніше він розпочинається. Врешті решт, це призводить до дисбалансу та розсинхронізації риб у настанні статевої зрілості та повноцінному формуванні статевих продуктів. При чому фенологічні дати початку нересту плоскирки на різних біотопах Київського водосховища наближені одна до одної, а тривалість нересту цієї риби повсюдно скорочується. Втім, на частинах акваторії водосховища зі значною проточністю, навіть за малого числа нерестових ділянок, строки початку нересту плоскирки більш пізні, а його тривалість — довша, у порівнянні з заплавними частинами. На останніх плоскирка більше залежить від екологічних та гідрохімічних чинників, та ефективність її природного відтворення досить низька. Саме тому вкрай важливо реально оцінювати загальний стан популяції плоскирки Київського водосховища з метою прогнозування співвіднесеності її природного поповнення та промислового навантаження, а також розробляти та впроваджувати ефективні заходи для раціонального господарського використання даного виду риб [16, 19, 51–54].

Отже, дослідження популяцій плоскирки Київського водосховища дозволяє отримати дані щодо її розмірно-вікового складу, іхтіопатологічного стану, просторового розподілу в акваторії та раціонально спрямовувати перебіг комплексних процесів у цій екосистемі. Зауважимо, що у ній на сьогодні саме плоскирка є особливо важливим господарсько цінним видом риб, поряд з лящем та пліткою. Так, молодь цих трьох видів риб з екологічної групи фітофілів становить 80% чисельності від загальної для іхтіофауни даної водойми, у тому числі й через її здатність до нагулу на ділянках, зарослих макрофітами [26, 37–39].

Те, що плоскирка належить до фітофільних видів риб, вкрай важливо саме у розрізі досліджень стану її популяцій у Київському водосховищі, адже в ньому нагальним є питання забезпеченості плідників цього виду нерестовищами.

Історично, Київське водосховище характеризується найбільшою, порівняно з іншими водосховищами дніпровського каскаду, питомою площею мілководь, оптимальних для нересту плоскирки. Втім, упродовж останніх десятиріч на них спостерігається масовий розвиток водяного горіха, що призводить до їх знищення і як нерестових ділянок, і як місць нагулу молоді. Власне, через це заростання водяним горіхом мілководь набагато загрозливіше для популяцій плоскирки, ніж заростання вищою водяною рослинністю. На сьогодні, близько 95% від усієї чисельності придатних до нересту плоскирки ділянок Київського водосховища зосереджено у його верхів'ях. Так, найбільш цінними у цьому сенсі є акваторії поблизу населених пунктів Страхолісся, Домантово, Ківак, Хільча, Сорокошичі, Косачівка й Березова Кладь. Саме поблизу них чисельність молоді плоскирки перевищувала середні по водосховищу показники удвічі. Водночас, останніми роками спостерігається інтенсивне заростання водяним горіхом ділянок поблизу чотирьох з них (Страхолісся, Хільчі, Косачівки та Сорокошичей). Відповідно, разом із зменшенням придатних до нересту ділянок і поєднання з нагульними, зростають показники щільності плідників плоскирки на них. Наприклад, у 2018 р., з урахуванням показників допустимих обсягів вилову, сумарна розрахункова чисельність плідників становила 1370 екз. на 1 га, що є понад вдвічі більшим, порівняно зі значенням цього показника у 2010 р. — 600 екз./га [16, 19, 55–57].

Важливою проблемою, що негативно впливає на стан популяції плоскирки Київського водосховища, є незадовільне управління режимом рівня води у ньому. Так, оптимальним для цього виду риб є нормальний підпірний рівень 103,0 м. Водночас, через вищезгадані значні площі мілководь, цей показник можливо зменшити до 102,8 м із підтриманням наявного нерестового фонду. Подальше зниження рівня води навіть на кілька десятків призводить до зменшення придатних для нересту плоскирки площ на 20 та більше відсотків від їх загального обсягу [4, 5, 7, 58].

Підсумовуючи вищенаведене, можливо стверджувати, що відсутність раціонального управління рівневим режимом та повсюдне заростання мілководних ділянок жорсткою рослинністю є основними лімітувальними чинниками, що обмежують можливості плідників плоскирки до повноцінного нересту.

З огляду на те, що до вищезазначеного додається відсутність системних заходів зі встановлення штучних нерестовищ до фіксації нормального підпірного рівня води на позначці 102,5 м (тобто до квітня–травня, коли вони втрачають свою ефективність), цілком логічно, що у кращому випадку середня рибопродуктивність нерестовищ цієї водойми за промисловим поверненням становить близько 560 кг/га. У підсумку, це призводить до того, що, навіть за можливості часткового перерозподілу плідників плоскирки та інших промислових видів риб, втрати потенційної рибної продукції становлять щонайменше 400–500 т на рік [4, 5, 7, 16, 40, 41, 51, 58].

Динаміка промислових уловів плоскирки підтверджує останнє твердження, адже історично плоскирка не лише утворювала численну дніпровську популяцію, але й упродовж 10 років після заповнення Київського водосховища збільшувала свою іхтіомасу у ньому. Загалом, у кожному з водосховищ Дніпровського каскаду склад основних та другорядних видів-домінантів варіює. Для Київського

водосховища основними видами є плітка, щука та плоскирка, а другорядними – лящ і товстолобики. Дані види становлять основу промислу на цій водоймі, а динаміка їх вилову характеризується піками з кроком у десятки років із незначними флуктуаціями рік від року. Так, найбільша кількість плоскирки з даного водосховища була виловлена у 1972, 1989 та 2002 роках. За період Незалежності України середньорічний промисловий вилов вищезгаданих видів риб із Київського водосховища у середньому становив 9 тис. т, з найменшими показниками в період з 1995 по 1999 рр., коли було виловлено лише 7,9 тис. т на рік. Втім, існує проблема з достовірністю даних промислової статистики та реальним станом речей, особливо на Київському водосховищі. Наприклад, у 2007 р., за офіційними даними, стрімко знизилась рибопродуктивність цієї водойми — з 10,8 кг/га до 4,8 кг/га. І це було зумовлено не певним екологічним лихом, а економічним рішенням передати частину акваторії верхньої частини водосховища від промислового рибальства до аматорського [12, 16, 19, 51, 52, 53, 57].

Іншим важливим чинником, який необхідно враховувати під час дослідження та прогнозування стану популяцій плоскирки у Київському водосховищі, є наявність або відсутність ліміту на її вилов у той чи інший рік. Згідно із Законами України, обов'язкове встановлення лімітів необхідно для тих видів риб, промислові запаси яких скорочуються або інтенсивно експлуатуються. У Київському водосховищі здебільшого встановлюють ліміти на вилов плоскирки, плітки, ляща та судака. Всі вони належать до частикових видів риб, щодо яких прослідковується стійка тенденція до зростання міри освоєння загальних лімітів. Наприклад, з 2003 р. використання ліміту за даними промислової статистики зросло на більше ніж 27%, хоча тотальне встановлення ліміту спричинює негативний вплив на ефективність промислу, оскільки спостерігається недостатній вилов другорядних об'єктів промислу. Основними критеріями під час лімітування вилову плоскирки у Київському водосховищі є те, що її частка в уловах перевищує частку в запасі, а коефіцієнт річної промислової смертності перевищує оптимальний (0,25). Вибір саме цих критеріїв для встановлення лімітів пояснюється тим, що максимально вірогідними параметрами стану запасу кожного виду є його абсолютні значення та питомий (у порівнянні з іншими об'єктами промислу) рівень експлуатації, а показник річної промислової смертності є коректним відображенням інтенсивності промислового використання. Так, можливо стверджувати, що плоскирка є стійким до промислового навантаження видом, адже з 1989 р. показники промислової смертності плоскирки удвічі переважають такі для природної. Насамперед — у вікових групах від п'яти до дев'яти років, із максимальними значеннями для особин віком вісім–дев'ять років. Водночас, рівень її промислової експлуатації жодного разу за цей час не перевищував MSY, що лише частково можливо пояснити стабільним щорічним природним поповненням популяції та особливо врожайними декотрими поколіннями, здебільшого з кроком у три–чотири роки [5, 7, 12, 16, 19, 20, 26, 40, 41].

На сьогодні основу уловів дрібновічковими сітками у Київському водосховищі становлять такі представники озерно-річкового іхтіокомплексу, як плоскирка, сріблястий карась, чехоня та судак. Упродовж останніх років улови плоскирки в цій водоймі за кількісними показниками посідають третє–четверте місце після плітки, ляща та товстолобиків. Згідно з даними аналізу уловів

промисловими сітками, плоскирка починає траплятись в них у віці близько двох років, за довжини понад 13 см. При досягненні довжини понад 28 см, що здебільшого співпадає з віком восьми років, вона майже припиняє зустрічатись у сітках. Тобто, основу промислових уловів плоскирки у Київському водосховищі утворюють особини з віком близько п'яти років та довжиною 24 см. Загалом, найбільша біомаса, необхідна для оптимальної експлуатації плоскирки з цієї водойми має припадати на вік шести років, із середньою довжиною понад 21 см. Втім, ще основоположник сучасних методик ведення рибного господарства на внутрішніх водоймах — В. П. Тюрін — відзначав, що мінімальні промислові довжини для мирних видів риб необхідно встановлювати на один рік менше, ніж той, коли досягаються найбільші значення їхтіомаси. Отже, мінімальний вік та розміри для промислового вилову плоскирки з Київського водосховища мали б дорівнювати п'яти рокам і середній довжині 19 см. Таким чином, загострюється проблема встановлення раціональної промислової міри для даного виду риб [20, 22, 25, 28, 51, 59, 60].

Окрім того, використання однотипних дрібновічкових сіток з кроком вічка 36–40 мм спричинює своєрідне «омолодження» популяції плоскирки. Це відбувається за рахунок того, що старші вікові групи даного виду риб не потрапляють у промислові сітки й основний акцент припадає на особини молодших вікових груп. У свою чергу, це загострює питання нормального, як такого, що здатне забезпечити сталість показників, співвідношення статей в популяції плоскирки. Адже, якщо у середньому його показники мають бути 1:1, то вищезгадане використання дрібновічкових сіток ініціює зміни статевого співвідношення зі збільшенням віку даного виду риб. Так, оскільки самці зазвичай ростуть повільніше, ніж самиці, то вони переважають у молодших вікових групах, що становлять основу промислових уловів плоскирки. Відповідно, розпочинаються зсуви у співвідношенні статей нерестового стада, у якому починають до 75–80% від усієї кількості плідників займати самці [5, 7, 8, 30, 39, 40, 52, 61].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

У Київському водосховищі відбуваються іхтіологічні сукцесії та загальна дестабілізація екосистеми, що призводять до зменшення промислового запасу плоскирки. Експлуатація останнього повинна підлягати обов'язковій регламентації, адже він є вичерпним і належить до стратегічних державних харчових резервів, покликаних забезпечити продовольчу безпеку країни [62]. Відомо, що за відсутності обмежень вилову плоскирки з Київського водосховища у кількісному та якісному вимірах, відтворювальна здатність її популяції буде знищена щонайбільше за п'ять років. Аби запобігти цьому, щороку затверджуються прийнятні обсяги вилову, які стають основою під час створення квот для окремих користувачів. У свою чергу, будь-які ліміти та квоти визначаються, виходячи з біологічних обґрунтувань промислу на внутрішніх водоймах. Створення останніх неможливо поза багаторічними сезонними моніторинговими іхтіологічними дослідженнями, аналізом структурно-функціональних показників сировинної бази промислу та його технічної організації.

Необхідно підкреслити, що плоскирка з Київського водосховища має суттєве

промислове значення як масовий малоцінний вид риб. Тим паче, що останніми роками спостерігається тенденція до збільшення чисельності її популяції у даній водоймі, що безпосередньо впливає і на збільшення придатної до промислу біомаси та показники прогнозованої рибопродуктивності. Відповідно, дослідження особливостей раціонального лову плоскирки є необхідними для розуміння специфіки формування промислової іхтіофауни та прогнозування майбутніх уловів у цій водоймі. Останнє дозволить оперативно та гнучко вилучати іхтіомасу, не завдаючи шкоди екосистемі та економічному благополуччю населення. Загалом, умови промислового та аматорського лову є одними з найбільш важливіших чинників формування структурних та функціональних показників Київського водосховища.

ЛІТЕРАТУРА

1. Шерман І. М., Пелих В. Г. Генезис трансформації іхтіофауни після зарегулювання стоку річкових систем і утворення водосховищ. Рибогосподарська наука України. 2009. № 2. С. 39—42.
2. Щербуха А. Я. Іхтіофауна України у ретроспективі та сучасні проблеми збереження її різноманіття // Вестник зоологии. 2004. № 38(3). С. 3—18.
3. Білий М. Д., Біла В. К. Біологічні основи промислу густери (*Blicca bjoerkna*) р. Дніпр // Наукові записки державного епд. ін-ту. 1954. № 2. С. 97—112.
4. Вятчанина Л. И. Рыбохозяйственное освоение каскада днепровских водохранилищ и пути повышения их рибопродуктивности // Рыбное хозяйство. 1980. Вып. 31. С. 3—9.
5. Вивчити механізми функціонування біогеоценозів внутрішніх водних об'єктів України загальнодержавного значення : звіт про НДР (заклучний, 2006—2010 рр.) : № ДР 0110U002811 / ІРГ УААН. Київ, 2010. 368 с.
6. Бузевич О. А. Біологічний стан популяції ляща Київського водосховища в умовах інтенсивного промислового використання // Рибогосподарська наука України. 2008. № 4. С. 9—13.
7. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи рибогосподарського використання промислової іхтіофауни великих рівнинних водосховищ України : дис. ... доктора біол. наук : 03.00.10. Київ, 2012. 297 с.
8. Бузевич І. Ю. Наукові аспекти рибпромислової експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду // Рибогосподарська наука України. 2007. № 2. С. 64—70.
9. Владимиров В. И., Сухойван П. Г., Бугай К. С. Размножение рыб в условиях зарегулированного стока реки (на примере Днепра). Киев : АН УССР. 1963. 385 с.
10. Дніпровський екологічний коридор. Київ : Чорноморська програма Wetlands International, 2008. 340 с.
11. Дегодюк Е. Г., Дегодюк С. Е. Характеристика водосховищ дніпровського каскаду. Київ : ЕКМО, 2006. 136 с.
12. Киреева И. Ю., Кожух А. Ю., Соколенко В. М. Состояние запасов промысловых гидробионтов Киевского и Каневского водохранилищ // Вестник АГТУ. 2018. № 4. С. 46—52.
13. Кузнецов В. А., Лукин А. В. Особенности воспроизводства рыб в условиях зарегулированного стока реки. Казань : КГУ, 1978. 160 с.

14. Ерко В. М. Условия и эффективность размножения рыб Киевского водохранилища в начальный период его существования // Рыбное хозяйство. 1973. № 16. С. 63—77.
15. Шерман І. М., Шевченко В. Ю. Сучасні проблеми і перспективи осетрівництва в Україні. Проблеми і перспективи розвитку аквакультури в Україні // Рибне господарство. 2004. Вип. 64. С. 102—106.
16. Курганський С. В., Бузевич О. А., Рудик-Леуська Н. Я. Стан запасів другорядних промислових видів риб Київського водосховища // Наукові доповіді НУБіПУ. 2014. № 7(49). С. 1—15.
17. Балтаджи Р. А., Лупачева Л. И., Тарасова О. М. Результаты работ по акклиматизации растительноядных рыб на Украине // Рыбное хозяйство. 1980. Вып. 31. С. 38—44.
18. Козлов В. И. Оценка эффективности искусственного воспроизводства рыбных запасов // Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб. Киев, 2005. С. 84—88.
19. Грициняк И. И., Бузевич И. Ю. Стратегия рационального и эффективного рыбопромыслового использования водохранилищ днепровского каскада // Комплексный подход к проблеме сохранения и восстановления биоресурсов каспийского бассейна : Международная науч.-практ. конф. : матер. Астрахань. 2008. С. 76—79.
20. Стан іхтіофауни затоки Київського водосховища, яка експлуатується в режимі товарного рибного господарства / Бузевич І. Ю. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2014. № 4. С. 17—25.
21. Зеров К. К. Формирование и зарастание водохранилищ Днепровского каскада. Київ : Наукова думка, 1976. 142 с.
22. Ерко В. М. Рост сеголетков рыб в Киевском водохранилище // Рыбное хозяйство. 1979. № 28. С. 62—65.
23. Козлов В. И. Экологическое прогнозирование ихтиофауны пресных вод. Москва, 1993. 251 с.
24. Евтушенко Н. Ю., Кузьменко М. И., Сиренко Л. А. Гидроэкологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Киев : Наукова думка, 1992. 268 с.
25. Курганський С. В., Бузевич О. А. Сучасний стан промислової іхтіофауни Київського водосховища та оцінка наслідків екстремальної зими 2010 року // Рибогосподарська наука України. 2010. № 4. С. 58—65.
26. Кружиліна С. В., Котовська Г. О. Кормова база риб та потенційні біопродукційні можливості водосховищ дніпровського каскаду // Вісник Запорозького національного університету. 2013. № 3. С. 22—31.
27. Озинковская С. П. Рыбохозяйственное изучение водохранилищ днепровского каскада // Рибне господарство. 2000. Вип. 57. С. 155—162.
28. Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1974. 446 с.
29. Оксик О. П., Тимченко В. М., Полищук В. С. Управление состоянием экосистемы и качеством воды в устьевом участке Днепра. Киев : Институт гидробиологии НАН Украины, 1996. 64 с.
30. Тюрин П. В. Биологическое обоснование регулирования рыболовства на внутренних водоемах. Москва : Пищепромиздат, 1963. 120 с.
31. Мовчан Ю. В. Риби України. Київ : Золоті ворота, 2011. 424 с.

32. Мальцев В. І., Зуб Л. М., Карпова Г. О. Водно-болотні угіддя Дніпровського екологічного коридору. Київ : ІНЕКО. 2010. 142 с.
33. Лукин А. В. Пути направленного формирования ихтиофауны в водохранилищах // Труды совещания по проблеме акклиматизации рыб и кормовых беспозвоночных. Москва : АН СССР, 1954. С. 24—31.
34. Исаев А. Й., Карпова Е. Й. Рыбное хозяйство водохранилищ : Справочник. Москва : Агропромиздат, 1989. 255 с.
35. Марушевський Г. Б., Жарук І. С. Водно-болотні угіддя України. Київ : Чорноморська програма Wetlands International, 2006. 312 с.
36. Коханова Г. Д., Семенюк А. Ф. Современное состояние и перспективы освоения мелководий Днепровских водохранилищ // Рыбное хозяйство. 1980. Вып. 30. С. 34—38.
37. Зимбалева Л. Н., Сухойван П. Г., Черногоренко М. И. Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ. Київ : Наукова думка, 1989. 212 с.
38. Романенко В. Д. Природа Украинской ССР. Моря и внутренние водоемы. Київ : Наукова думка, 1987. 224 с.
39. Цыплаков Э. П. Мелкий частик (плотва и густера) // Труды ГосНИОРХ, 1972. № 12. С. 170—174.
40. Бузевич І. Ю., Третяк О. М. Наукові основи спрямованого формування іхтіофауни дніпровських водосховищ // Проблеми воспроизводства аборигенных видов рыб. Черкассы, 2005. С. 213—216.
41. Ульман Э. Ж., Борбат А. Е. Методические рекомендации по улучшению условий естественного воспроизводства, охране рыбных запасов и совершенствованию организации рыболовства на Киевском водохранилище. Киев : УкрНИИРХ, 1982. 11 с.
42. Савваитова К. А., Чеботарева Ю. В., Пичугин М. Ю. Аномалии в строении рыб как показатели состояния природной среды // Вопросы ихтиологии. 1995. № 2. С. 182—188.
43. Терещенко В. Г., Терещенко Л. И., Сметанин М. М. Оценка различных индексов для выражения биологического разнообразия сообщества // Биоразнообразие: степень таксономической изученности. 1994. С. 86—98.
44. Дохолен В. К., Магомедов А. К., Нурмагомедов Г. Н. Уровни содержания и влияния токсикантов на жизнедеятельность гидробионтов. Київ : Наукова думка, 1981. 78 с.
45. Евтушенко Н. Ю. Влияние загрязнения тяжелыми металлами на состояние ихтиофауны. // Проблемы рационального использования биоресурсов водохранилищ : Междунар. конф., Киев, 6-8 сент. : матер. Киев, 1995. С. 165—166.
46. Зубенко И. Б., Машинская Л. А. Содержание тяжелых металлов в водохранилищах Днепра и их ПДК для рыбного хозяйства // Проблемы рационального использования биоресурсов водохранилищ : Междунар. конф., Киев, 6-8 сент. 1995 г. : матер. Киев, 1995. С. 172.
47. Мельник А. П., Курганський С. В., Власова Н. М. Вміст та розподіл важких металів в органах і тканинах промислових видів риб Київського водосховища // Рибогосподарська наука України. 2009. № 1. С. 93—99.
48. Никоноров А. М., Жулидов А. В., Покаржевский А. Д. Биомониторинг тяжелых металлов в пресноводных экосистемах. Ленинград : Гидрометеиздат, 1985. 143 с.

49. Романенко В. Д., Кузьменко М. И., Евтушенко Н. Ю. Радиоактивное и химическое загрязнение Днепра и его водохранилищ после аварии на Чернобыльской АЭС. Київ : Наукова думка, 1992. 196 с.
50. Щербак С. Д., Афанасьєва С. О. Екологічні проблеми водокористування на території, що постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС та рекомендації для населення. Київ : А-Центр, 2005. 96 с.
51. Чуклін А. В. Принципи встановлення допустимих обсягів вилову водних біоресурсів у дніпровських водосховищах // Рибогосподарська наука України. 2012. № 3. С. 3—8.
52. Юдович Ю. Б., Доценко Б. Н., Антонюк А. В. Методика прогнозирования вылова рыбы в озерах, реках и водохранилищах. Москва : ВНИИПРХ, 1982. 46 с.
53. Шевченко П. Г., Мальцев В. И. Рыбное хозяйство Украины и виды-вселенцы — проблемы и перспективы // Світ рибалки. 2005. № 8. С. 204—213.
54. Романенко В. Д. Біорізноманіття та біоресурсний потенціал екосистем Дніпровських водосховищ в умовах кліматичних змін і розвитку біологічної інвазії. Київ : Наукова думка, 2019. 254 с.
55. Романенко В. Д., Євтушенко М. Ю., Линник П. М. Комплексна оцінка екологічного стану басейну Дніпра. Київ : Інститут гідробіології НАНУ, 2000. 146 с.
56. Зеров К. К. Мелководья Днепровских водохранилищ // Гидробиологический журнал. 1972. Т. 8, № 2. С. 15—22.
57. Тимченко В. М., Окснюк О. П., Романенко В. Д. Екологічні вимоги до правил експлуатації дніпровських водосховищ (наукові засади та проблеми). Київ : Інститут гідробіології НАН України, 2002. 36 с.
58. Яковлева Т. В. Штучне відтворення іхтіофауни дніпровських водосховищ: сучасний стан, проблеми і перспективи // Рибогосподарська наука України. 2013. № 1. С. 5—11.
59. Гиляров А. М. Индекс разнообразия и экологическая сукцессия // Журнал общей биологии. 1969. № 6. С. 652—657.
60. Тюрин П. В. «Нормальные» кривые переживания и темпов естественной смертности рыб как теоретическая основа регулирования рыболовства // Известия ГосНИОРХ. 1972. № 71. С. 71—128.
61. Протасов А. А. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная диверсикология. Київ, 2002. 106 с.
62. Романенко В. Д. Основи гідроекології. Київ : Обереги, 2001. 728 с.

REFERENCES

1. Sherman, I. M., & Pelykh, V. H. (2009). Henezys transformatsii ikhtiofauny pislia zarehuliuvannia stoku richkovykh system i utvorennia vodoskhovyshch. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 39-42.
2. Shcherbukha, A. Ya. (2004). Ikhtiofauna Ukrainy u retrospektyvi ta suchasni problemy zberezhenntia yii riznomanittia. *Vestnyk zoolohyy*, 38(3), 3-18.
3. Bilyi, M. D. & Bila, V. K. (1954). Biolohichni osnovy promyslu hustery (*Blicca bjorkena*) r. Dnpr. *Naukovi zapysky derzhavnoho epd. in-tu.*, 2, 97-112.
4. Vyatchanina, L. I. (1980). Rybokhozyaystvennoe osvoenie kaskada dneprovskikh vodokhranilishch i puti povysheniya ikh ryboproduktivnosti. *Rybnoe khozyaystvo*, 31, 3-9.

5. *Vyvchyty mekhanizmy funktsionuvannya bioheotsenoziv vnutrishnikh vodnykh ob"yektiv Ukrainy zahal'noderzhavnoho znachennya* (2010). Zvit pro NDR (zaklyuchnyy, 2006–2010 rr.). № DR 0110U002811. Kyiv.
6. Buzevych, O. A. (2008). Biologichnyi stan populatsii liashcha Kyivskoho vodoskhovyshcha v umovakh intensyvnoho promyslovoho vykorystannia. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 9-13.
7. Buzevych, I. Yu. (2012). Stan ta perspektyvy rybohospodars'koho vykorystannya promyslovoi ikhtiofauny velykykh rivnynnnykh vodoskhovyshch Ukrainy. *Doctor's thesis*. Kyiv.
8. Buzevych, Y. Yu. (2007). Naukovi aspekty rybopromyslovoi ekspluatatsii vodoskhovyshch Dniprovskoho kaskadu. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 64-70.
9. Vladimirov, V. I., Suhojvan, P. G., & Bugaj, K. S. (1965). *Razmnozhenie ryb v usloviyah zaregulirovanogo stoka reki*. Kiev: AN USSR.
10. *Dniprovskiy ekologichnyi korydor*. (2008). Kyiv: Chornomorska prohrama Wetlands International.
11. Dehodiuk, E. H., & Dehodiuk, S. E. (2006). *Kharakterystyka vodoskhovyshch dniprovskoho kaskadu*. Kyiv : EKMO.
12. Kireeva, I. Yu., Kozhukh, A. Yu., & Sokolenko, V. M. (2018). Sostoyanie zapasov promyslovykh gidrobiontov Kievskogo i Kanevskogo vodokhranilishch. *Vestnik AGTU*, 4, 46-52.
13. Kuznetsov, V. A., & Lukin, A. V. (1978). *Osobennosti vosproizvodstva ryb v usloviyakh zaregulirovannogo stoka reki*. Kazan': KGU.
14. Erko, V. M. (1973). Usloviya i effektivnost' razmnozheniya ryb Kievskogo vodokhranilishcha v nachal'nyy period ego sushchestvovaniya. *Rybnoe khozyaystvo*, 16, 63-77.
15. Sherman, I. M., & Shevchenko, V. Yu. (2004). Suchasni problemy i perspektyvy osetrivnystva v Ukraini. Problemy i perspektyvy rozvytku akvakultury v Ukraini. *Rybne hospodarstvo*, 64, 102-106.
16. Kurhanskyi, S. V., Buzevych, O. A., & Rudyk-Leuska, N. Ya. (2014). Stan zapasiv druhoriadnykh promyslovykh vydiv ryb Kyivskoho vodoskhovyshcha. *Naukovi dopovidi NUBiPU*, 7(49), 1-15.
17. Baltadzhi, R. A., Lupacheva, L. I., & Tarasova, O. M. (1980). Rezul'taty rabot po akklimatizatsii rastitel'noyadnykh ryb na Ukraine. *Rybnoe khozyaystvo*, 31, 38-44.
18. Kozlov, V. I. (2005). Otsenka effektivnosti iskusstvennogo vosproizvodstva rybnnykh zapasov. *Problemy vosproizvodstva aborigennykh vidov ryb*, 84-88.
19. Hrytsyniak, I. I., & Buzevich, I. Yu. (2008). Strategiya ratsional'nogo i effektivnogo rybopromyslovogo ispol'zovaniya vodokhranilishch dneprovskogo kaskada. *Kompleksnyy podkhod k probleme sokhraneniya i vostanovleniya bioresursov kaspiskogo basseyna: Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya*. Astrakhan', 76-79.
20. Buzevych, I. Yu., Rubtsova, N. Yu., Shevchenko, R. V., Dolhopol, P. P., & Solomatina, V. D. (2014). Stan ikhtiofauny zatoky Kyivskoho vodoskhovyshcha, yaka ekspluatuietsia v rezhymi tovarnoho rybnoho hospodarstva. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 17-25.
21. Zerov, K. K. (1976). *Formirovanie i zarastanie vodokhranilishch Dneprovskogo kaskada*. Kyiv: Naukova dumka.
22. Erko, V. M. (1979). Rost segoletkov ryb v Kievskom vodokhranilishche. *Rybnoe khozyaystvo*, 28, 62-65.

23. Kozlov, V. I. (1993). *Ekologicheskoe prognozirovanie ikhtiofauny presnykh vod.* Moskva.
24. Evtushenko, N. Yu., Kuz'menko, M. I., & Sirenko L. A. (1992). *Gidroekologicheskie posledstviya avarii na Chernobyl'skoy AES.* Kiev: Naukova dumka.
25. Kurhanskyi, S. V., & Buzevych, O. A. (2010). Suchasnyi stan promyslovoi ikhtiofauny Kyivskoho vodoskhovysheha ta otsinka naslidkiv ekstremalnoi zymivli 2010 roku. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 58-65.
26. Kruzhylina, S. V., & Kotovska, H. O. (2013). Kormova baza ryb ta potentsiini bioproduktiini mozhlyvosti vodoskhovysheh dniprovskoho kaskadu. *Visnyk Zaporozkoho natsionalnoho universytetu*, 3, 22-31.
27. Ozinkovskaya, S. P. (2000). Rybokhozyaystvennoe izuchenie vodokhranilishch dneprovskogo kaskada. *Rybne gospodarstvo*, 57, 155-162.
28. Nikol'skiy, G. V. (1974). *Teoriya dinamiki stada ryb.* Moskva: Pishchevaya promyshlennost'.
29. Oksiyuk, O. P., Timchenko, V. M., & Polishchuk, V. S. (1996). *Upravlenie sostoyaniem ekosistemy i kachestvom vody v ust'evom uchastke Dnepra.* Kiev: Institut gidrobiologii NAN Ukrainy.
30. Tyurin, P. V. (1963). *Biologicheskoe obosnovanie regulirovaniya rybolovstva na vutrennikh vodoemakh.* Moskva: Pishchepromizdat.
31. Movchan, Yu. V. (2011). *Ryby Ukrainy.* Kyiv: Zoloti vorota.
32. Maltsev, B. I., Zub, L. M., & Karpova, H. O. (2010). *Vodno-bolotni uhiddia Dniprovskoho ekolohichnoho korydoru.* Kyiv: INEKO.
33. Lukin, A. V. (1954). Puti napravlennoho formirovaniya ikhtiofauny v vodokhranilishchakh. *Trudy soveshchaniya po probleme akklimatizatsii ryb i kormovykh bespozvonochnykh*, 24-31.
34. Isaev, A. Y., & Karpova, E. Y. (1989). *Rybnoe khozyaystvo vodokhranilishch: Spravochnik.* Moskva: Agropromnzdat.
35. Marushevskyi, H. B., & Zharuk, I. S. (2006). *Vodno-bolotni uhiddia Ukrainy.* Kyiv: Chornomorska prohrama Wetlands International.
36. Kokhanova, G. D., & Semenyuk, A. F. (1980). Sovremennoe sostoyanie i perspektivy osvoeniya melkovodiy Dneprovskikh vodokhranilishch. *Rybnoe khozyaystvo*, 30, 34-38.
37. Zimbalevskaya, L. N., Sukhoyvan, P. G., & Chernogorenko, M. I. (1989). *Bespozvonochnye i ryby Dnepra i ego vodokhranilishch.* Kyiv: Naukova dumka.
38. Romanenko, V. D. (1987). Priroda Ukrainskoy SSR. Morya i vnutrennie vodoemy. Kyiv: Naukova dumka.
39. Tsyplakov, E. P. (1972). Melkiy chastik (plotva i guster). *Trudy GOSNIORKh*, 12, 170-174.
40. Buzevych, I. Yu., & Tretiak, O. M. (2005). Naukovi osnovy spriamovanoho formuvannia ikhtiofauny dniprovskykh vodoskhovysheh. *Problemy vosproyzvodstva aboryhennykh vydov ryb*, 213-216.
41. Ul'man, E. Zh., & Borbat, A. E. (1982). *Metodicheskie rekomendatsii po uluchsheniyu usloviy estestvennogo vospriizvodstva, okhrane rybnikh zapasov i sovershenstvovaniyu organizatsii rybolovstva na Kievskom vodokhranilishche.* Kiev: UkrNIIRKh.
42. Savvaitova, K. A., Chebotareva, Yu. V., & Pichugin, M. Yu. (1995). Anomalii v stroenii ryb kak lokazateli sostoyaniya prirodnoy sredy. *Voprosy ikhtiologii*, 2, 182-188.

43. Tereshchenko, V. G., Tereshchenko, L. I., & Smetanin, M. M. (1994). Otsenka razlichnykh indeksov dlya vyrazheniya biologicheskogo raznoobraziya soobshchestva. *Bioraznoobrazie: stepen' taksonomicheskoy izuchennosti*, 86-98.
44. Dokholen, V. K., Magomedov, A. K., & Nurmagomedov, G. N. (1981). *Urovni sodержaniya i vliyaniya toksikantov na zhiznedejatel'nost' gidrobiontov*. Kyiv: Naukova dumka.
45. Evtushenko, N. Yu. (1995). Vliyanie zagryazneniya tyazhelymi metalami na sostoyanie ikhtiofauny. *Problemy ratsional'nogo ispol'zovaniya bioresursov vodokhranilishch. Materialy mezhdunarodnoy konferentsii*, Kiev, 6-8 sentyabrya. Kiev, 165-166.
46. Zubenko, I. B., & Mashnovskaya, L. A. (1995). Soderzhanie tyazhelykh metalov v vodokhranilishchakh Dnepra i ikh PDK dlya rybnogo khozyaystva. *Problemy ratsional'nogo ispol'zovaniya bioresursov vodokhranilishch. Materialy mezhdunarodnoy konferentsii*, Kiev, 6-8 sentyabrya 1995 g. Kiev, 172.
47. Melnyk, A. P., Kurhanskyi, S. V., & Vlasova, N. M. (2009). Vmist ta rozpodil vazhkykh metaliv v orhanakh i tkanynakh promyslovykh vydiv ryb Kyivskoho vodoshkovyshcha. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 93-99.
48. Nikonorov, A. M., Zhulidov, A. V., & Pokarzhevskiy A. D. (1985). Biomonitoring tyazhelykh metalov v presnovodnykh ekosistemakh. Leningrad: Gidrometeoizdat.
49. Romanenko, V. D., Kuz'menko, M. I., & Evtushenko, N. Yu. (1992). *Radioaktivnoe i khimicheskoe zagryaznenie Dnepra i ego vodokhranilishch posle avarii na Chernobyl'skoy AES*. Kyiv: Naukova dumka.
50. Shcherbak, S. D., & Afanasieva, S. O. (2005). *Ekolohichni problemy vodokorystuvannya na terytorii, shcho postrazhdala vid avarii na Chornobyl'skii AES ta rekomendatsii dlia naselennia*. Kyiv: A-Tsentr.
51. Chuklin, A. V. (2012). Pryntsypy vstanovlennia dopustymykh obsiahiv vylovu vodnykh bioresursiv u dniprovskykh vodoshkovyshchakh. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 3, 3-8.
52. Yudovich, Yu. B., Dotsenko, B. N., & Antonyuk, A. V. (1982). *Metodika prognozirovaniya vylova ryby v ozerakh, rekakh i vodokhranilishchakh*. Moskva: VNIIPRKh.
53. Shevchenko, P. G., & Mal'tsev, V. I. (2005). Rybnoe khozyaystvo Ukrainy i vidy-vselentsy — problemy i perspektivy. *Svit rybalky*, 8, 204-213.
54. Romanenko, V. D. (2019). *Bioriznomanittia ta bioresursnyi potentsial ekosystem Dniprovskykh vodoshkovyshch v umovakh klimatychnykh zmin i rozvytku biolohichnoi invazii*. Kyiv: Naukova dumka.
55. Romanenko, V. D., Yevtushenko, M. Yu., & Lynnyk, P. M. (2000). *Kompleksna otsinka ekolohichnoho stanu baseinu Dnipro*. Kyiv: Instytut hidrobiolohii NANU.
56. Zerov, K. K. (1972). Melkovod'ya Dneprovskikh vodokhranilishch. *Gidrobiologicheskii zhurnal*, 8, 15-22.
57. Tymchenko, V. M., Oksyiuk, O. P., & Romanenko, V. D. (2002). *Ekolohichni vymohy do pravyl ekspluatatsii dniprovskykh vodoshkovyshch (naukovi zasady ta problemy)*. Kyiv: Instytut hidrobiolohii NAN Ukrainy.
58. Yakovlieva, T. V. (2013). Shtuchne vidtvorennia ikhtiofauny dniprovskykh vodoshkovyshch: suchasnyi stan, problemy i perspektivy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 5-1.
59. Gilyarov, A. M. (1969). Indeks raznoobraziya i ekologicheskaya suksessiya. *Zhurnal obshchey biologii*, 6, 652-657.

60. Tyurin, P. V. (1972). "Normal'nye" krivye perezhivaniya i tempov estestvennoy smertnosti ryb kak teoreticheskaya osnova regulirovaniya rybolovstva. *Izvestiya GosNIORKh*, 71, 71-128.
61. Protasov, A. A. (2002). *Bioraznoobrazie i ego otsenka. Kontseptual'naya diversikologiya*. Kyiv.
62. Romanenko, V. D. (2001). *Osnovy hidroekologii*. Kyiv: Oberehy.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ ВИСОКОПОРИСТИХ НАПОВНЮВАЧІВ ПІСЛЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У БІОФІЛЬТРАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ УСТАНОВОК ЗАМКНУТОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Д. Ю. Шарило, sharylo.dmitrii@gmail.com, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

В. О. Коваленко, kovalenko_va_58@i.ua, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Б. Ю. Коваленко, bogdankovalenko@ukr.net, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Мета. Розроблення методу регенерації високопористих наповнювачів для біофільтру після зашлаковування їхніх пор залишками біоплівки в процесі вирощування об'єктів аквакультури в установках замкнутого водопостачання.

Методика. Регенерацію наповнювачів для біофільтру, після їх експлуатації протягом 6 місяців, проводили за допомогою розчину гіпохлориту натрію з різною концентрацією активного хлору: 2,5%; 1,0% і 0,5%. Контроль ефективності очищення здійснювали за різницею маси наповнювачів до і після їх обробки у розчині гіпохлориту натрію.

Результати. За результатами дослідження доведено ефективність та економічну доцільність використання гіпохлориту натрію для очищення високопористих наповнювачів для біофільтру (на прикладі пористого керамічного наповнювача та спіненого скла «JBL Micromes»). Зменшення маси досліджуваних зразків становило, в середньому, 12,95% для пористої кераміки та 15,0 % для спіненого скла. Встановлено, що різна концентрація активного хлору у водному розчині не має яскраво вираженого впливу на ефективність процесу очищення наповнювачів, у зв'язку з чим рекомендовано для використання 0,5%-й розчин гіпохлориту натрію.

Наукова новизна. Використання у рибицтві високопористих наповнювачів для біофільтру тривалий час було нерентабельним через швидку втрату їх основної переваги — високого показника питомої площі на одиницю об'єму, в результаті зашлаковування мікропор залишками біоплівки. Потребувалася щорічна повна заміна наповнювачів, що, враховуючи значно вищу їхню вартість, у порівнянні з полімерними наповнювачами, робило нерентабельним їх використання. Запропонований метод відновлення наповнювачів з пористої кераміки та спіненого скла для біофільтру значно подовжує строки їх експлуатації, із повною заміною лише після значного механічного зносу матеріалу.

Практична значимість. Використання методу відновлення високопористих наповнювачів для біофільтру сприятиме широкому впровадженню цих високоефективних фільтруючих матеріалів на підприємствах інтенсивної аквакультури, що, у свою чергу, приведе до збільшення обсягів виробництва і зростання якості товарної харчової продукції.

Ключові слова: УЗВ, біофільтр, наповнювач, регенерація, гіпохлорит натрію.

SODIUM HYPOCHLORITE PECULARITIES IN APPLICATION FOR RESTORATION OF HIGHLY POROUS FILLERS AFTER THEIR USE IN BIOFILTRATION SYSTEMS OF RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEMS

D. Sharylo, sharylo.dmitrii@gmail.com, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

V. Kovalenko, kovalenko_va_58@i.ua, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

B. Kovalenko, bogdankovalenko@ukr.net, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Purpose. Development of a method for the regeneration of highly porous fillers for biofilters after slagging of their pores with biofilm residues in the process of growing aquaculture objects in recirculating aquaculture systems (RAS).

Methodology. Regeneration of fillers was performed with solutions of sodium hypochlorite of different concentrations (2.5%, 1%, 0.5% of active chlorine) after their exploitation for 6 months. The cleaning efficiency was monitored by the difference in fillers weights after cleaning.

Findings. According to the study, the use of sodium hypochlorite for cleaning highly porous fillers for biofilters (using an example of porous ceramic filler and foamed glass «JBL Micromec») is efficient and cost-effective. A reduction in the weight of the test samples averaged 12.95% for porous ceramics and 15.01% for foamed glass. Based on the obtained data, aqueous solutions with different concentrations of sodium hypochlorite do not have a pronounced difference in efficiency, respectively; the optimal for use is a 0.5% solution.

Originality. The use of highly porous fillers for biofilters has long been unprofitable in fish farming due to the rapid loss of their main advantages - a high specific area per unit volume as a result of micropore slagging with biofilm residues. As a result, complete regeneration of these filter materials was required annually, which, given the significantly higher cost compared to polymeric fillers, made their use unprofitable. The described technique allows the use of porous ceramics and foamed glass, after their restoration, for a long time, with replacement only after mechanical wear.

Practical value. The described method allows using highly porous fillers for biofilters in the process of growing aquaculture objects without their main disadvantage - a rapid decrease in efficiency as a result of pore slagging with biofilm residues.

Keywords: RAS, biofilter, filler, restoration, sodium hypochlorite.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ВЫСОКОПОРИСТЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ПОСЛЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БИОФИЛЬТРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ УСТАНОВОК ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Д. Ю. Шарило, sharylo.dmitrii@gmail.com, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

В. А. Коваленко, kovalenko_va_58@i.ua, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

Б. Ю. Коваленко, bogdankovalenko@ukr.net, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

Цель. Разработка метода регенерации высокопористых наполнителей для биофильтров после зашлаковывания их пор остатками биопленки в процессе выращивания объектов аквакультуры в установках замкнутого водоснабжения.

Методика. Регенерацию наполнителей для биофильтра, после их эксплуатации на протяжении 6 месяцев, проводили с помощью раствора гипохлорита натрия с разной концентрацией активного хлора — 2,5%; 1,0% и 0,5%. Контроль эффективности очистки осуществляли по разнице массы наполнителей до и после их обработки в растворе гипохлорита натрия.

Результаты. По результатам исследования доказана эффективность и экономическая целесообразность использования гипохлорита натрия для очистки высокопористых наполнителей для биофильтра (на примере пористого керамического наполнителя и вспененного стекла «JBL Micromes»). Уменьшение массы исследуемых образцов составило в среднем 12,95% для пористой керамики и 15,01% для вспененного стекла. Установлено, что разная концентрация активного хлора в водном растворе не имеет ярко выраженного влияния на эффективность процесса очистки наполнителей, в связи с чем рекомендуется для использования 0,5%-й раствор гипохлорита натрия.

Научная новизна. Использование в рыбоводстве высокопористых наполнителей для биофильтра долгое время было нерентабельным из-за быстрой потери их основного преимущества — высокого показателя удельной площади на единицу объема, в результате зашлаковывания микропор остатками биопленки. Требовалась ежегодная полная замена наполнителей, что, учитывая значительно более высокую их стоимость, по сравнению с полимерными наполнителями, делало нерентабельным их использование. Предложенный метод восстановления наполнителей из пористой керамики и вспененного стекла для биофильтра значительно продлевает сроки их эксплуатации, с полной заменой только после значительного механического износа материала.

Практическая значимость. Использование метода восстановления высокопористых наполнителей для биофильтра будет способствовать широкому внедрению этих высокоэффективных фильтрующих материалов на предприятиях интенсивной аквакультуры, что, в свою очередь, приведет к увеличению объемов производства и повышению качества товарной пищевой продукции.

Ключевые слова: УЗВ, биофильтр, наполнитель, регенерация, гипохлорит натрия.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Останніми роками спостерігається тенденція до розвитку високоінтенсивних систем аквакультури — установок замкнутого водопостачання (УЗВ), в яких технологічна вода циркулює у закритому контурі з постійним її очищенням у блоці регенерації. Така технологія дозволяє мінімізувати витрати води [1, 2]. Рециркуляція в аквакультурі є важливою альтернативою традиційним методам виробництва. Вона дозволяє зменшити залежність від природних водних ресурсів і дає можливість керувати якісними характеристиками води [3].

Вирощування риби в рециркуляційних установках дає змогу підвищити продуктивність рибницьких господарств за рахунок інтенсифікації процесу культивування [4]. Такий спосіб вирощування вимагає порівняно високих витрат на матеріально-технічне облаштування аквасистеми та її експлуатацію. Виправданим в економічному сенсі є використання таких видів риб, ціна товарної продукції яких дає змогу компенсувати витрати на виробництво. Не менш важливими чинниками є швидкість росту і рівень виживання об'єктів культивування на всіх етапах вирощування та вихід товарної продукції з одиниці площі чи об'єму води. Використання технологій УЗВ дозволяє рибницьким підприємствам зменшити цикл виробництва товарної продукції від двох–трьох років до одного, що значно скорочує терміни окупності коштів, вкладених у

побудову господарства [4].

Сучасні технології вирощування риби в рециркуляційних установках все ще потребують значних водовитрат для підміни частини води і компенсації її випаровування — від 3–5 до 100% об'єму системи на добу. Значний об'єм води, крім рибницьких ємностей, знаходиться у блоці регенерації води, і у першу чергу — в біофільтрі, що, у разі використання найпоширенішого у сучасній практиці аквакультури полімерного плаваючого біозавантаження, становить від 10 до 130% від об'єму води в рибницьких басейнах [6, 7].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

У класичних технологіях вирощування риби та інших гідробіонтів в УЗВ можливе використання біофільтрів різних типів та конструкцій. Головним елементом біофільтра є субстрат чи завантаження, ефективність роботи якого оцінюється за питомою площею робочої поверхні ($S_{\text{пт}}$, $\text{м}^2/\text{м}^3$) в одиниці об'єму активної зони біофільтра. Чим більша питома площа субстрату, тим більше бактерій може поселитись у кубічному метрі активної зони біофільтру [8].

На сьогодні практично всі біофільтраційні установки потребують досить великої кількості наповнювачів, поверхня яких слугує субстратом для біоплівки, ємностей відповідного об'єму та площі для їх розміщення і, як наслідок, значних витрат на побудову та експлуатацію таких установок. Використання завантаження для біофільтрів із високими показниками питомої площі поверхні може вирішити цю проблему і, в результаті, знизити собівартість виробництва рибної продукції [7, 9].

Одним із напрямків розробки ресурсозберігаючих технологій є удосконалення системи біофільтрації води в УЗВ. Враховуючи велику корисну площу високопористих наповнювачів, в найближчому майбутньому вони можуть замінити класичні субстрати для заселення нітрифікуючими бактеріями. Однак висока вартість і швидкі темпи зашлаковування мікропор цих наповнювачів, навіть враховуючи їх значну зносостійкість, є суттєвою перепорою для їх використання у рибористві [10].

Перспективні у рибористві високопористі наповнювачі із запеченої кераміки та вспіненого скла мають багато переваг: їх питома площа поверхні становить від 250 до 2400 $\text{м}^2/\text{л}$. Ще однією перевагою такого біозавантаження є його довговічність. При виборі фільтруючого матеріалу для біологічної очистки слід враховувати, що наповнювачі з дрібною фракцією та високим показником корисної площі досить швидко зашлаковуються, а це призводить до явища т. з. «задухи» біофільтру [11].

Недоліком високопористих наповнювачів є необхідність у повній їх заміні після 1 року експлуатації. Традиційний метод поверхневого очищення таких наповнювачів в процесі експлуатації біофільтру оснований на утворенні протитечі і проводиться не частіше 1 разу на місяць. Для швидкого входу

біофільтру в робочий режим рекомендується залишати до 10% об'єму не пошкодженого «старого» завантаження [12].

Також існує спосіб очищення високопористих наповнювачів випалюванням, який швидко і порівняно просто звільняє пори від шламу та залишків застарілої біоплівки. Недоліками даного способу є потреба у специфічному обладнанні (муфельна піч) та висока енерговитратність процесу [13].

Гіпохлорит натрію (NaClO) є сильним окиснювачем і вступає у численні реакції з різноманітними відновлювачами, незалежно від кислотно-лужного характеру середовища. Використання гіпохлориту натрію на сьогодні є одним із кращих відомих засобів очищення і дезінфекції. Наявність гіпохлоритної кислоти у водному розчині цієї речовини пояснює її сильні дезінфікуючі і відбілюючі властивості. Гіпохлорит-аніони мають сильну антибактеріальну активність і вбивають мікроорганізми дуже швидко та за досить низьких концентрацій. Розкладання гіпохлориту натрію супроводжується утворенням низки активних частинок (радикалів) і, зокрема, синглетного кисню, що характеризуються високою біоцидною дією. Крім того, ця речовина відносно безпечна при зберіганні та використанні [14, 15].

Мета роботи — розробка способу очищення мікроотворів високопористих наповнювачів для біофільтру УЗВ від відмерлих частинок біоплівки та детриту, що дасть можливість багаторазового використання фільтрувальних матеріалів, а широкє впровадження цих матеріалів в практику інтенсивної аквакультури з використанням УЗВ дозволить зменшити об'єм біофільтру та витрати на воду і енергоносії.

Завдання дослідження полягало у перевірці ефективності використання розчину гіпохлориту натрію для глибокого очищення високопористих наповнювачів від мертвої біоплівки після їх використання в блоці біологічної фільтрації УЗВ з вирощування кларієвого сома (*Clarias gariepinus*).

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Наповнювачі для біофільтру — запечена високопориста кераміка і сепаракс (впінене скло) — інертні і нерозчинні у хлорвмістних сполуках матеріали. Очищення наповнювачів, після 6 місяців їх інтенсивного використання у біофільтрі УЗВ при вирощуванні кларієвого сома, проводили витримуванням у попередньо розбавленому в різних варіантах стандартному розчині гіпохлориту натрію (вміст активного хлору — 19%). Кожен варіант експерименту було проведено із потрібною повторністю:

1. Для високопористої кераміки з показником корисної площі $250 \text{ м}^2/\text{дм}^3$:

1.1. Варіант № 1 — розбавлення стандартного розчину гіпохлориту натрію дистильованою водою у 7,5 раза (концентрація активного хлору в розчині для очищення — 2,5%).

1.2. Варіант № 2 — розбавлення стандартного розчину гіпохлориту натрію дистильованою водою у 19 разів (концентрація активного хлору — 1%).

1.3. Варіант № 3 — розбавлення стандартного розчину гіпохлориту натрію дистильованою водою у 37 разів (концентрація активного хлору — 0,5%).

2. Для сепараксу «JBL Micromes» з корисною площею $1600 \text{ м}^2/\text{дм}^3$ (аеробна зона, доступна для нітрифікаторів — 10 %, анаеробна зона денітрифікації — 90%):

2.1. Варіант № 4 — розбавлення стандартного розчину гіпохлориту натрію дистильованою водою у 7,5 раза (концентрація активного хлору — 2,5%).

2.2. Варіант № 5 — розбавлення стандартного розчину гіпохлориту натрію дистильованою водою у 19 разів (концентрація активного хлору — 1%).

2.3. Варіант № 6 — розбавлення стандартного розчину гіпохлориту натрію дистильованою водою у 37 разів (концентрація активного хлору — 0,5%).

Технологічна схема процесу регенерації високопористих наповнювачів включала наступні етапи:

1) вилучення використаного наповнювача з біофільтру після 6 місяців експлуатації;

2) промивання гранул наповнювача водою від залишків біоплівки і детриту та їх висушування;

3) очищення пор наповнювача витримуванням протягом 30 хв у розчині гіпохлориту натрію з обраною концентрацією за температури води 24°C , із подальшим промиванням і висушуванням. Об'єм розчину для очищення дорівнював об'єму наповнювача.

Оцінку якості очищення наповнювачів біофільтру проводили за різницею у масі сухого наповнювача до і після витримування у розчині гіпохлориту натрію. За рівнем зменшення маси наповнювача була обрана оптимальна схема відновлення біофільтраційних можливостей високопористої кераміки та спіненого скла.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Встановлено, що у всіх 6 варіантах дослідження маса високопористих наповнювачів для біофільтру зменшилася внаслідок розчинення залишків біоплівки і детриту у порах у гранулах наповнювача. Це засвідчило ефективність використання водного розчину гіпохлориту натрію для відновлення пористих наповнювачів.

У дослідних варіантах з високопористою керамікою маса цього наповнювача зменшилася в середньому на 12,95%. Найменш ефективним виявився варіант № 1 (концентрація активного хлору в розчині — 2,5%) — зменшення маси на 11,75%. У варіантах №№ 2 і 3 ефективність очищення виявилася дещо кращою — 13,26 і 13,85%, відповідно. Разом із цим, у кожному з варіантів досліду були повторності як із порівняно низькими (Д. 1.2 — 9,57%, Д. 2.1 — 10,55%, Д. 3.1 — 11,20%), так і з високими (Д. 1.3 — 15,5%, Д. 2.3 — 17,31%, Д. 3.3 — 16,41%) показниками ефективності очищення (див. табл. 1).

Таблиця 1. Ефективність відновлення пористої кераміки водним розчином гіпохлориту натрію**Table 1. The efficiency of recovery of porous ceramics with an aqueous solution of sodium hypochlorite**

Показник / Indicator	Варіант № 1 / Version № 1			Варіант № 2 / Version № 2			Варіант № 3 / Version № 3		
	Дослід 1.1 / Expe- riment 2.2	Дослід 1.2 / Expe- riment 1.2	Дослід 1.3 / Expe- riment 1.3	Дослід 2.1 / Expe- riment 2.1	Дослід 2.2 / Expe- riment 2.2	Дослід 2.3 / Expe- riment 2.3	Дослід 3.1 / Expe- riment 3.1	Дослід 3.2 / Expe- riment 3.2	Дослід 3.3 / Expe- riment 3.3
	2.2	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3
Стартова маса, г / Starting weight, g	104,114	98,928	96,842	104,169	102,751	96,473	106,837	102,403	110,29
Кінцева маса, г / Finishing weight, g	93,509	89,46	81,826	93,178	90,503	79,77	94,867	88,124	92,188
Зменшення маси, г / Weight loss, %	10,605	9,468	15,016	10,991	12,248	16,703	11,97	14,279	18,102
Зменшення маси, % / Weight loss, %	10,186	9,571	15,506	10,551	11,920	17,314	11,204	13,944	16,413
Зменшення маси в середньому, % / Weight loss on average, %	11,75			13,26			13,85		

Досліди з відновлення спіненого скла показали схожі результати. Ефективність використання гіпохлориту натрію тут виявилася дещо вищою — зменшення маси наповнювача після обробки, в середньому, на 15,01% (див. табл. 2). Це можна пояснити більшою питомою площею поверхні даного наповнювача, і як наслідок, більшою кількістю органіки, накопиченої в порах.

Як видно з таблиці, найкращу ефективність очищення сепараксу продемонстрував варіант № 5 (концентрація активного хлору в розчині — 1%) — зменшення маси наповнювача в середньому, на 15,3%. Дещо менша ефективність спостерігалась у варіантах №№ 4 та 6 — 14,86 і 14,87%, відповідно.

Отримані результати експерименту свідчать про ефективність методу відновлення високопористих наповнювачів для біофільтру промиванням їх у розчині гіпохлориту натрію. Витримування фільтрувального матеріалу у розчині для очищення із різною концентрацією активного хлору — 2,5%; 1,0% та 0,5% — майже однаково ефективно звільняє пори наповнювача, а незначна різниця в отриманих даних за різними варіантами, ймовірно, пов'язана з нерівномірністю заростання пор наповнювачів біоплівкою.

Згідно з отриманими результатами, для регенерації високопористих наповнювачів пропонується використовувати водний розчин гіпохлориту натрію з концентрацією активного хлору 0,5 %, як більш ефективний в економічному відношенні.

Таблиця 2. Ефективність відновлення спіненого запеченого скла водним розчином гіпохлориту натрію

Table 2. The efficiency of recovery of foamed baked glass with an aqueous solution of sodium hypochlorite

Показник / Indicator	Варіант № 4 / Version № 4			Варіант № 5 / Version № 5			Варіант № 6 / Version № 6		
	Дослід 4.1 / Expe- riment 4.2	Дослід 4.2 / Expe- riment 4.2	Дослід 4.3 / Expe- riment 4.3	Дослід 5.1 / Expe- riment 5.1	Дослід 5.2 / Expe- riment 5.2	Дослід 5.3 / Expe- riment 5.3	Дослід 6.1 / Expe- riment 6.1	Дослід 6.2 / Expe- riment 6.2	Дослід 6.3 / Expe- riment 6.3
Стартова маса, г / Starting weight, g	101,956	97,356	96,866	102,836	96,39	100,282	105,95 8	97,855	99,612
Кінцева маса, г / Finishing weight, g	90,293	81,365	80,671	90,034	80,363	83,404	91,937	83,468	82,975
Зменшення маси, г / Weight loss, %	11,663	15,991	16,195	12,802	16,027	16,878	14,021	14,387	16,637
Зменшення маси, % / Weight loss, %	11,439	16,425	16,719	12,449	16,627	16,831	13,233	14,702	16,702
Зменшення маси у середньому, % / Weight loss on average, %		14,86			15,30			14,87	

ВИСНОВКИ

1. Використання у рибництві високопористих наповнювачів для біофільтру УЗВ тривалий час було нерентабельним через швидке зашлаковування мікропор залишками біоплівки і відсутність ефективного методу регенерації цих матеріалів. Як наслідок, виникала необхідність у повній заміні високопористих наповнювачів щорічно, що, враховуючи значно вищу їхню вартість, у порівнянні з полімерними наповнювачами, робило нерентабельним використання цих наповнювачів.

2. Запропоновано метод відновлення високопористих наповнювачів із запеченої кераміки та спіненого скла для біофільтрів рибницьких установок замкнутого водопостачання шляхом витримування протягом 30 хв у розчині гіпохлориту натрію із вмістом активного хлору 0,5% за температури води 24°C, із подальшим промиванням водою та висушуванням. Для приготування розчину для очищення наповнювача на основі побутового розчину гіпохлориту натрію, із стандартною концентрацією активного хлору 19%, потрібне розбавлення препарату дистильованою водою в співвідношенні 1 : 37. Співвідношення об'ємів розчину для очищення і наповнювача — 1 : 1.

3. З урахуванням вартості розчину гіпохлориту натрію марки «А» (концентрація активного хлору 19%, середня ціна у роздрібній торгівлі на момент проведення досліджень — 27,87 грн/дм³), доцільно використовувати водний розчин препарату з концентрацією 0,5%. На відновлення 1 м³ наповнювача необхідно витратити 26,3 дм³ препарату на загальну суму 733,42 грн. Враховуючи

високу поверхневу площу високопористих наповнювачів, даний об'єм розчину гіпохлориту натрію дозволить відновити 250 000 м² корисної площі пористого керамічного наповнювача або 1600000 м² корисної площі сепараксу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Schuster C., Stelz H. Reduction in the make-up water in semi-closed recirculating aquaculture systems // *Aquac. Eng.* 1998. Vol. 17. P. 167—174.
2. Influence of filter medium type, temperature and ammonia production on nitrifying trickling filters performance / Godoy-Olmos S. et al. // *Journal of environmental chemical engineering*. 2016. Vol. (1). P. 328—340.
3. An evaluation of solid waste capture from recirculating aquaculture systems using a geotextile bag system with a flocculant-aid / Guerdat T. C. et al. // *Aquac. Eng.* 2013. Vol. 54. P. 1—8.
4. Гріневич Н. Є. Особливості використання біофільтрів з різними типами наповнювача в установках замкнутого водопостачання в аквакультури // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. 2016. Т. 18, вип. № 3 (70). С. 57—61.
5. Брайнбалле Я. Руководство по аквакультуре в установках замкнутого водоснабжения. Копенгаген, 2010. 70 с.
6. Timmons M. B., Ebeling J. M. *Recirculating Aquaculture*. USA: Cayuga Aqua Ventures, 2006. 975 p.
7. Проскуренок И. В. Замкнутые рыбоводные установки. Москва : ВНИРО, 2003. 152 с.
8. Спотт С. Содержание рыбы в замкнутых системах : пер. с англ. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1982. 192 с.
9. Шарило Д. Ю., Коваленко В. О., Коваленко Б. Ю. Особливості використання біофільтрів з різними типами наповнювачів на етапі встановлення біологічної рівноваги в установках замкнутого водозабезпечення // Тваринництво та технології харчових продуктів. 2019. Т. 10, вип. 2. С. 61—73.
10. Сандер М. Техническое оснащение аквариума. Москва : Астрель, 2004. 256 с.
11. Укравваиндустрия. Загрузка для биофилтра. URL: <http://www.osetr.org.ua/loading.htm>.
12. Загрузка для биофилтров : пат. 5058939/26 ; заявл. от 18.08.1992 ; опубл. 15.10.1994.
13. Бабаджанова О. Ф., Тарнавський А. Б. Застосування гіпохлориту натрію на фільтрувальних станціях // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика : XVI Міжнар. наук.-метод. конф., м. Львів, 2018 : матеріали. Львів, 2018. С. 147—148.
14. Черкасов С. В. Гипохлорит натрия. Свойства, теория и практика применения. URL : <http://wwtec.ru/index.php?id=410>.

REFERENCES

1. Schuster, C., & Stelz, H. (1998). Reduction in the make-up water in semi-closed recirculating aquaculture systems. *Aquac. Eng.*, 17, 167-174.
2. Godoy-Olmos, S., Martinez-Llorens, S., Tomas-Vidal, A., Jover-Cerda, M. (2016). Influence of filter medium type, temperature and ammonia production on nitrifying trickling filters performance. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 4(1), 328-340.

3. Guerdat, T. C., Losordo, T. M., DeLong, D. P., Jones, R. D. (2013). An evaluation of solid waste capture from recirculating aquaculture systems using a geotextile bag system with a flocculant-aid. *Aquac. Eng.*, 54, 1-8.
4. Hrinevych, N. YE. (2016). Osoblyvosti vykorystannya biofil'triv z riznymi typamy napovnyuvacha v ustanovkakh zamknutoho vodopostachannya v akvakul'turi [Features of the use of biofilters with different types of filler in closed water supply systems in aquaculture]. *Naukovyy visnyk LNUVMBT im. S.Z. Gzhyts'koho*, 3, 57-61.
5. Braynballe, Y. (2010). *Kerivnytstvo po akvakul'turi v ustanovkakh zamknutoho vodopostachannya [Guidance on aquaculture in closed water installations]*. Copenhagen.
6. Timmons, M. B., & Ebeling, J. M. (2006). *Recirculating Aquaculture*. USA: Cayuga Aqua Ventures.
7. Proskurenko, I. V. (2003). *Zamknutyye rybovodnyye ustanovki [Recirculating aquaculture systems]*. Moscow: VNIRO.
8. Spott, S. (1982). *Soderzhaniye ryby v zamknytykh sistemakh [Fish and invertebrate culture water management in closed systems]*. Moscow: Legkaya i pishchevaya promyshlennost.
9. Sharylo, D. Yu., Kovalenko, V. O., & Kovalenko, B. Yu. (2019). Osoblyvosti vykorystannya biofil'triv z riznymi typamy napovniuvachiv na etapi vctanovlennia biolohichnoi rivnovahy v ustanovkakh zamknеноho vodo zabezpechennia. *Tvarynnytstvo ta tekhnologii kharchovykh produktiv*, 10(2), 61-73.
10. Sander, M. (2004). *Tekhnicheskoe osnashchenye akvaryuma*. Moscow: Astrel.
11. Ukrakvayndustryia. Zahruzka dlia byofyltra. *osetr.org.ua*. Retrieved from: <http://www.osetr.org.ua/loading.htm>.
12. *Zahruzka dlia byofyl'trov* (1994). Patent. № 5058939/26;
13. Babadzhanova, O. F., & Tarnavskiy, A. B. (2018). Zastosuvannia hipokhlorytu natriiu na fil'truvalnykh stantsiiakh. *Bezpeka zhyttia i diialnosti liudyny – osvita, nauka, praktyka: materialy XVI mizhnar. naukovometodychnoi konferentsii*. Lviv.
14. Cherkasov, S. V. *Hypokhloryt natryia. Svoistva, teoriya y praktyka prymereniyia*. *wwtec.ru*. Retrieved from: <http://wwtec.ru/index.php?id=410>.

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 33-47
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.033>
УДК 639.311.043.2:631.874

Received 27.07.21
Received in revised form 30.08.21
Accepted 05.09.21

ВИРОЩУВАННЯ ЦЬОГОЛІТОК КОРОПА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУСПЕНЗІЇ ХЛОРЕЛИ

Т. В. Григоренко, grygorenko-@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

Н. М. Савенко, nelya_savenko@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ

Н. П. Чужма, n_chuzhma@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

А. М. Базаєва, a_bazaeva@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Т. О. Берсан, bersanto@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити екологічні умови та визначити рибопродуктивність ставів при вирощуванні цьоголіток коропа із застосуванням суспензії зеленої водорості хлорели.

Методика. При проведенні досліджень були використані загальноприйняті в гідрохімії, гідробіології та рибництві методики.

Результати досліджень. У статті представлено результати досліджень щодо застосування суспензії хлорели при вирощуванні рибопосадкового матеріалу коропа. У результаті проведених досліджень встановлено, що в дослідному ставу із застосуванням суспензії хлорели створювалися сприятливі гідрохімічні умови та спостерігався інтенсивний розвиток зоопланктону, що позитивно відобразилося на рості цьоголіток коропа та рибопродуктивності ставу. Розвиток природної кормової бази був достатнім для забезпечення потреб живлення молоді коропа. Середньосезонна біомаса зоопланктону в дослідному ставу становила $28,68 \text{ г/м}^3$ і була в 1,5 раза вищою, ніж у контрольному. При цьому частка гіллястовусих ракоподібних у загальній біомасі зоопланктону дослідного ставу становила 76,6%, проти 36,8% — у контрольному. Середня за вегетаційний сезон біомаса зообентосу в досліді була в 1,3 раза вищою, ніж у контролі, і формувалася за рахунок розвитку цінних у кормовому значенні личинок хірономід.

Середня маса вирощених цьоголіток коропа у досліді була на рівні $34,3 \pm 1,78 \text{ г}$, а виживання — 45,4%, проти відповідно $32,1 \pm 1,88 \text{ г}$ та 39,2% у контролі. Рибопродуктивність у досліді становила $778,6 \text{ кг/га}$ і була в 1,2 раза вищою, ніж у контролі.

Наукова новизна. Досліджено екологічні умови та визначено рибопродуктивність вирощувальних ставів за умов застосування перегною великої рогатої худоби та суспензії зеленої водорості хлорели при вирощуванні цьоголіток коропа в монокультурі.

Практична значимість. На підставі отриманих результатів встановлено, що застосування суспензії хлорели сприяє інтенсифікації розвитку зоопланктонних організмів у ставах. Отримані дані можуть бути використані для розробки практичних рекомендацій щодо оптимізації умов вирощування рибопосадкового матеріалу коропових видів риб та підвищення біопродуктивності ставів.

Ключові слова: вирощувальні стави, природна кормова база, фітопланктон, зоопланктон, зообентос, цьоголітки коропа, суспензія хлорели, рибопродуктивність.

© Т. В. Григоренко, Н. М. Савенко, Н. П. Чужма, А. М. Базаєва, Т. О. Берсан, 2021

CULTIVATION OF YOUNG-OF-THE-YEAR CARP WITH THE USE OF CHLORELLA SUSPENSION

T. Hryhorenko, grygorenko@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

N. Savenko, nelya_savenko@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

N. Chuzhma, n_chuzhma@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

A. Bazaieva, a_bazaeva@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

T. Bersan, bersanto@ukr.net, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Investigate ecological conditions and determine fish productivity of ponds when growing young-of-the-year carp using a suspension of chlorella.

Methodology. During the study, we used methods generally accepted in hydrochemistry, hydrobiology and fish farming.

Findings. The article presents the results of the study on the use of chlorella suspension in the cultivation of carp. It was found that the use of chlorella suspension created favorable hydrochemical conditions resulting in intensive development of zooplankton, which had a positive effect on the growth of young-of-the-year carp and fish productivity of the pond. The development of the natural food supply was sufficient to meet the nutritional needs of juvenile carp. The average seasonal biomass of zooplankton in the experimental pond was 28.68 g/m³ that was 1.5 times higher than in the control. The share of cladocerans in the total biomass of zooplankton in the experimental pond was 76.6%, versus 36.8% in the control. The average biomass of zoobenthos for the growing season in the experimental was 1.3 times higher than in the control, and was formed by chironomid larvae, which are valuable in the food chain.

Originality. The study investigated ecological conditions and fish productivity of growing ponds under conditions of the application of cattle manure and suspension of chlorella when growing carp in monoculture.

Practical value. It was found that the use of chlorella suspension promotes the intensification of the development of zooplankton organisms in ponds. The obtained data can be used to develop practical recommendations for optimizing the conditions for growing carp seeds and increasing the biological productivity of ponds.

Key words: nursery ponds, natural food supply, phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, young-of-the-year carp, chlorella suspension, fish productivity.

ВЫРАЩИВАНИЕ СЕГОЛЕТОК КАРПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУСПЕНЗИИ ХЛОРЕЛЛЫ

Т. В. Григоренко, grygorenko@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Н. Н. Савенко, nelya_savenko@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Н. П. Чужма, n_chuzhma@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

А. Н. Базаева, a_bazaeva@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Т. А. Берсан, bersanto@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Цель. Исследовать экологические условия и определить рыбопродуктивность прудов при выращивании сеголеток карпа с использованием суспензии зеленой водоросли хлореллы.

Методика. При проведении исследований были использованы общепринятые в гидрохимии, гидробиологии и рыбоводстве методики.

Результаты исследований. В статье представлены результаты исследований по применению суспензии хлореллы при выращивании рыбопосадочного материала карпа. В результате проведенных исследований установлено, что в опытном пруду с применением суспензии хлореллы создавались благоприятные гидрохимические условия, и наблюдалось интенсивное развитие зоопланктона, что положительно отобразилось на росте

сеголеток карпа и рыбопродуктивности пруда. Развитие естественной кормовой базы было достаточным для обеспечения пищевых потребностей молоди карпа. Среднесезонная биомасса зоопланктона в опытном пруду составляла 28,68 г/м³ и была в 1,5 раза выше, чем в контрольном. При этом доля ветвистоусых ракообразных в общей биомассе зоопланктона в опытном пруду составляла 76,6%, против 36,8% – в контрольном. Средняя за вегетационный сезон биомасса зообентоса в опыте была в 1,3 раза выше, чем в контроле, и формировалась за счёт развития ценных в кормовом значении личинок хирономид.

Научная новизна. Исследованы экологические условия и определена рыбопродуктивность прудов в условиях применения перегноя крупного рогатого скота и суспензии зеленой водоросли хлореллы при выращивании сеголеток карпа в монокультуре.

Практическая значимость. На основании полученных результатов установлено, что применение суспензии хлореллы способствует интенсификации развития зоопланктонных организмов в прудах. Полученные данные могут быть использованы для разработки практических рекомендаций по оптимизации условий выращивания рыбопосадочного материала карповых видов рыб и повышению биопродуктивности прудов.

Ключевые слова: выростные пруды, естественная кормовая база, фитопланктон, зоопланктон, зообентос, сеголетки карпа, суспензия хлореллы, рыбопродуктивность.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Забезпечення рентабельності рибних господарств України вимагає постійної розробки нових і вдосконалення існуючих екологічно безпечних ресурсощадних технологій вирощування риби. Основним завданням підприємств рибної галузі є отримання максимальної кількості продукції належної якості за мінімальної собівартості. Проте, поряд з чинниками економічного характеру, актуальним аспектом наукових досліджень в умовах сьогодення є зменшення антропогенного навантаження на біосферу в процесі господарської діяльності людини та пропозиція більш безпечних в екологічному сенсі речовин або технологій [1–5].

Відомо, що певний рівень рыбопродуктивності ставів визначається сукупною дією низки взаємопов'язаних абіотичних і біотичних чинників середовища, продуктивністю угруповань в екосистемах і досягається комплексною інтенсифікацією рибництва [6].

Однією із найважливіших умов інтенсифікації рибництва є стимулювання природної кормової бази, підвищення розвитку якої забезпечує не лише економію штучних кормів, а й кращу ефективність використання останніх [1].

Для стимулювання розвитку всього комплексу природної кормової бази риб передусім впливають на його автотрофний компонент, тобто фітопланктон, адже саме фітопланктон, будучи початковою ланкою трофічного ланцюга в екосистемі рибницьких ставів, першим реагує на дефіцит чи забезпеченість такої системи абіотичними чинниками, необхідними для біосинтезу органічної речовини, зокрема біогенними мінеральними речовинами. З метою недопущення такого дефіциту в рибницькі стави вносять різні види добрив [1–2, 7].

Наступним кроком розвитку рибогосподарської науки став пошук і пропозиція способів оптимального використання того біопродукційного потенціалу, який формується у водоймах після удобрення. Такий спосіб вдалося запропонувати після того, як стало зрозуміло, що роль фітопланктону у

забезпеченні як екологічної рівноваги у водоймі, так і трофічних потреб біоти, може суттєво відрізнитися, залежно від його видового складу, і що на видовий спектр фітопланктону можна активно впливати шляхом вселення у водойму одного або збалансованого комплексу з кількох видів представників планктонних водоростей, або так званої альголізації [8–10]. Особливо це актуально для таких, порівняно невеликих за розміром, водойм, якими є більшість рибиницьких ставів, зокрема ті, в яких вирощують рибопосадковий матеріал.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

У рибистві роль альголізації передусім полягає в реалізації створеного попереднім удобренням продукційного потенціалу, тобто конвертації привнесених біогенів у корисну органічну речовину і включення її у харчові ланцюги. По-друге, це спрямоване профілювання видового спектру фітопланктону для підвищення його поживної цінності. Важливим наслідком вселення суспензії водоростей, зокрема таких видів, як хлорела, є пригнічення розвитку синьо-зелених водоростей, що перешкоджає розвитку цвітіння водойм, таким чином забезпечуючи у водоймі оптимальний газовий режим та загалом умови вирощування риби. Важливо, що при цьому усуваються з раціону зоопланктону та риб-фільтраторів токсичні види ціанобактерій [8–11].

На даний час існує масив даних щодо застосування штамів хлорели для очищення стічних вод, альголізації водойм багаточільового використання, що передбачає боротьбу з «цвітінням» води синьо-зеленими водоростями, також є дані про застосування хлорели як профілактичного і лікувального засобу при захворюваннях риб. У цьому сенсі в умовах сьогодення перспективним для рибиництва є застосування одноклітинної зеленої водорості — хлорели, яка постає основним об'єктом масової аквакультури водоростей для практичного використання в різних напрямках [9–17].

Виходячи з вищевикладеного, метою даної роботи було дослідження екологічних умов та визначення рибопродуктивності ставів при вирощуванні цьоголіток коропа із застосуванням суспензії зеленої водорості хлорели.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проводилися в 2020 р. на базі Державного підприємства «Дослідне господарство “Нивка”» Інституту рибного господарства НААН (ДП «ДГ “Нивка”» ІРГ НААН) у двох вирощувальних ставах площею 0,05–0,08 га та середньою глибиною 1,0 м, один з яких був контролем. У ставах вирощувався рибопосадковий матеріал коропа на природній кормовій базі, за густоти посадки непідрощених личинок на рівні 50,0 тис. екз./га. Для інтенсифікації розвитку природної кормової бази навесні в контрольний став одноразово вносили перегній великої рогатої худоби (1,0 т/га), а в дослідний — перегній (1,0 т/га) та суспензію хлорели із розрахунку 50 дм³/га. Зарибнення експериментальних ставів проводилося на початку червня.

Упродовж періоду вирощування риби сліdkували за формуванням екологічних умов (температурний режим, хімічний склад води, розвиток природної кормової бази) експериментальних ставів. Температуру води вимірювали раз на добу. Відбір та обробку гідрохімічних проб здійснювали згідно

із загальноприйнятими у рибницькій практиці методиками [18]. Отримані значення порівнювали із чинними рибницькими нормативами [19].

Гідробиологічні проби (фіто-, зоопланктон, зообентос) відбирали та опрацьовували згідно з відповідними методиками [20]. Для визначення якісного складу планктонних водоростей та безхребетних тварин використовувались визначники [21–28].

Гідрохімічні та гідробиологічні проби впродовж вегетаційного сезону відбирали 2 рази на місяць. Тривалість вегетаційного сезону складала 135 діб.

Індивідуальну масу цьоголіток визначали за допомогою електронних вагів KERN – 440-45 N з точністю до 0,1 г. Коефіцієнт вгодованості цьоголіток розраховували за формулою Фультонна [29, 30].

Після завершення польових досліджень ефективність застосування суспензії хлорели при вирощуванні рибопосадкового матеріалу коропа оцінювали за отриманими рибницькими показниками, а саме: рибопродуктивністю ставів (кг/га), відсотком виходу цьоголіток від посаджених на вирощування непідрощених личинок (%), середньою індивідуальною масою риб (г) [31].

За період дослідження загалом було відібрано, опрацьовано та проаналізовано 12 гідрохімічних та 48 гідробиологічних проб, морфометрично досліджено та зважено 110 екземплярів цьоголіток коропа.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Екологічні умови при вирощуванні рибопосадкового матеріалу коропа були задовільними. Температура води в експериментальних вирощувальних ставках впродовж вегетаційного періоду коливалася в межах 20,4–25,3°C, а максимальні показники було зафіксовано в червні (до 25,3°C) та липні (24,8–25,1°C).

Проведений хімічний аналіз проб води показав, що згідно з класифікацією О.О. Алюкіна, вода експериментальних ставів належала до гідрокарбонатного класу групи кальцію, оскільки серед аніонів переважали гідрокарбонати, а серед катіонів — іони кальцію. У воді виявлено незначну кількість катіонів магнію (Mg^{2+}) — $18,9 \pm 3,2$ – $20,1 \pm 2,1$ мг/дм³ (за НЗ — 30,0 мг/дм³). Величина загальної твердості перебувала в межах $5,2 \pm 0,4$ – $5,3 \pm 0,5$ мг-екв./дм³. Мінералізація води була середньою, із сумою іонів на рівні $501,3 \pm 15,4$ у досліді та $509,6 \pm 13,5$ мг/дм³ — у контролі (табл. 1).

Досліджувана вода виявилася слабколужною, з рН на рівні 8,14 у контролі та 8,01 — у досліді. Підлучення водного середовища вплинуло і на вміст вільного аміаку, концентрація якого перебувала на рівні 0,08–0,06 мг/дм³ і в 1,6–1,2 раза перевищувала нормативні значення (табл. 1).

Кількість легкоокиснюваних органічних сполук, що визначалася за показником перманганатної окиснюваності, впродовж досліджень знаходилася в межах 6,0–16,4 мг О/дм³ у контролі та 7,6–18,3 мг О/дм³ у ставках з внесенням культури хлорели. При цьому максимальні показники було зафіксовано в кінці вегетаційного періоду (вересні), що найімовірніше пов'язано з відмиранням рослинного планктону і накопичення органічних речовин. У середньому за період досліджень показники перманганатної окиснюваності знаходилися в межах нормативних величин і становили $13,6 \pm 1,1$ мг О/дм³ у досліді та $12,2 \pm 1,4$ мг О/дм³ — у контролі (див. табл. 1).

Таблиця 1. Гідрохімічний режим експериментальних ставів ДП «ДГ «Нивка»», 2020 р. (усереднені дані)

Table 1. The results of samples from experimental ponds of SE «EE Nyvka» water chemical analysis in 2020 (averaged data)

№	Показники якості води / Water quality indicators	Контроль / Control	Дослід / Experiment	Показники якості води / Water quality indicators [19]
1	Водневий показник, pH / Hydrogen ion concentration, pH, units pH	8,14±0,15	8,01±0,18	6,5-8,5
2	Вільний аміак NH ₃ , мгN/дм ³ / Uncombined ammonia, NH ₃ , mg N/dm ³	0,08±0,02	0,06±0,01	до 0,05
3	Перманганатна окиснюваність, мгО/дм ³ / Permanganate index, mg O/dm ³	12,2±1,4	13,6±1,1	до 15,0
4	Біхроматна окиснюваність, мгО/дм ³ / Dichromate oxidizability, mg O/dm ³	30,5±3,4	34,1±2,6	до 50,0
5	Амонійний нітроген, NH ₄ ⁺ , мгN/дм ³ / Ammonium nitrogen, NH ₄ ⁺ , mg N/dm ³	1,14±0,06	1,01±0,05	до 2,0
6	Нітрити, NO ₂ ⁻ , мгN/дм ³ / Nitrites, NO ₂ ⁻ , mg N /dm ³	0,09±0,01	0,09±0,01	до 0,1
7	Нітрати, NO ₃ ⁻ , мгN/дм ³ / Nitrates, NO ₃ ⁻ , mg N/dm ³	0,15±0,03	0,19±0,02	до 2,0
8	Мінеральний фосфор, PO ₄ ³⁻ , мгP/дм ³ / Inorganic phosphorus, PO ₄ ³⁻ , mg P/dm ³	0,58±0,18	0,46±0,05	до 0,7
9	Загальне залізо, Fe ²⁺ + Fe ³⁺ , мгFe/дм ³ / Total ferum, Fe ²⁺ + Fe ³⁺ , mg Fe/dm ³	1,39±0,10	1,14±0,10	до 1,0
10	Кальцій, Ca ²⁺ , мг/дм ³ / Calcium, Ca ²⁺ , mg/dm ³	72,1±0,00	72,1±0,00	до 70,0
11	Магній, Mg ²⁺ , мг/дм ³ / Magnesium, Mg ²⁺ , mg/dm ³	18,9±3,2	20,1±2,1	до 30,0
12	Натрій+Калій, Na ⁺ +K ⁺ , мг/дм ³ / Sodium + Potassium, Na ⁺ + K ⁺ , mg/dm ³	53,3±8,7	47,9±9,5	до 50,0
13	Гідрокарбонати, HCO ₃ ⁻ , мг/дм ³ / Hydrocarbonates, HCO ₃ ⁻ , mg/dm ³	238,0±2,7	238,0±2,7	до 300,0
14	Хлориди, Cl ⁻ , мг/дм ³ / Chlorides, Cl ⁻ , mg/dm ³	98,6±2,8	94,4±4,2	до 70,0
15	Сульфати, SO ₄ ²⁻ , мг/дм ³ / Sulfates, SO ₄ ²⁻ , mg/dm ³	28,8±3,3	28,8±4,1	до 70,0
16	Загальна твердість, мг-екв./дм ³ / Total hardness, mg-q/dm ³	5,2±0,4	5,3±0,5	5,0-7,0
17	Мінералізація, мг/дм ³ / Mineralization, mg/dm ³	509,6±13,5	501,3±15,4	до 1000

У воді були присутні біогенні елементи (NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , Fe^{2+3+}). Вміст амонійного азоту, нітритів, нітратів та мінерального фосфору перебував у межах нормативних величин, а загального заліза — перевищував нормативні значення в 1,39 раза у контролі та 1,14 — у досліді (див. табл. 1). Вищі показники концентрації азотно-фосфорних сполук були відмічені на початку вегетаційного сезону при заповненні ставів забрудненими водами. В подальшому, завдяки активному споживанню біогенів фітопланктоном, вміст їх у воді експериментальних ставів до кінця вегетаційного сезону поступово знижувався.

В експериментальних ставах виявлено високі концентрації хлоридів, які в 1,3–1,4 раза перевищували нормативні значення. При цьому найвищий вміст хлоридів (до 98,8–101,4 мг/дм³) у ставах було зафіксовано на початку вегетаційного сезону, що свідчить про надходження забруднювальних речовин із джерела водопостачання. Вміст сульфатів у воді ставів перебував на рівні 28,8 мг/дм³ і не перевищував нормативні величини (див. табл. 1).

В цілому, гідрохімічний режим експериментальних ставів був задовільним, основні хімічні показники знаходилися в межах нормативних значень, прийнятих у рибництві [19].

Дослідження розвитку природної кормової бази показали, що фітопланктон експериментальних ставів був представлений 119–123 видами та внутрішньовидовими таксонами, що відносяться до 6 систематичних відділів водоростей: Cyanophyta, Euglenophyta, Bacillariophyta, Dinophyta, Chrysophyta та Chlorophyta. Провідна роль у формуванні флористичного спектру рослинного планктону в обох ставах належала зеленим водоростям, частка яких становила 58,0–61,0% від загальної кількості виявлених видів.

Кількісний розвиток рослинного планктону характеризувався помірними показниками. Так, біомаса фітопланктону впродовж вегетаційного сезону в дослідному ставу змінювалася в межах від 6,32 до 22,11 мг/дм³, а у контрольному — від 3,65 до 32,92 мг/дм³. Максимальні значення біомаси фітопланктону в обох ставах було зафіксовано на початку вегетаційного сезону, при цьому в контролі вона була в 1,5 раза вищою, що і відобразилося на середніх показниках. У середньому за вегетаційний сезон біомаса рослинного планктону у дослідному ставу знаходилася на рівні $12,90 \pm 1,87$ мг/дм³, у контролі — $19,50 \pm 3,60$ мг/дм³ (табл. 2).

У дослідному ставу (із застосуванням суспензії хлорели) середньосезонна біомаса фітопланктону в першу чергу формувалася за рахунок розвитку зелених водоростей, частка яких складала 41,0%, а в контрольному — синьо-зелених водоростей (38,5%) (див. табл. 2). Частка внесеної хлорели у загальній біомасі водоростей не перевищувала 3–4%, що, ймовірно, пов'язано з активним виїданням її зоопланктоном.

Зоопланктон експериментальних ставів був представлений 24 таксонами, що відносяться до трьох основних груп — Rotifera, Cladocera, Copepoda. При цьому видовий спектр тваринного планктону мав кладоцерно-ротіферний характер.

Таблиця 2. Середньосезонні показники біомаси фітопланктону в експериментальних ставах ДП «ДГ “Нивка”», 2020 р. (n = 7)

Table 2. Average seasonal biomass of phytoplankton from experimental ponds of SE "EE "Nyvka ", 2020 (n = 7)

Систематичні відділи водоростей / Systematic divisions of algae	Контроль / Control		Дослід / Experiment	
	мг/дм ³ / mg/dm ³	%	мг/дм ³ / mg/dm ³	%
<i>Cyanophyta</i>	7,50	38,5	4,20	32,5
<i>Euglenophyta</i>	2,18	11,2	0,90	7,0
<i>Dinophyta</i>	1,32	6,8	0,80	6,2
<i>Chrysophyta</i>	0,13	0,7	0,01	0,1
<i>Bacillariophyta</i>	3,13	16,1	1,70	13,2
<i>Chlorophyta</i>	5,24	26,9	5,30	41,0
Всього / Total	19,50±3,60	100	12,91±1,87	100

Щодо кількісного розвитку, то біомаси зоопланктону в контрольному ставу змінювалися в межах 2,26-38,88 г/м³, у дослідному — 1,67–77,27 г/м³. Внесення суспензії хлорели сприяло інтенсифікації розвитку зоопланктонних організмів. Середньосезонна біомаса зоопланктону в дослідному ставу становила 28,68 г/м³ і була в 1,5 раза вищою, ніж у контрольному. При цьому частка гіллястосусих ракоподібних у загальній біомасі зоопланктону дослідного ставу становила 76,6% і виявилася значно вищою, ніж контрольного 36,8% (табл. 3).

Таблиця 3. Середньосезонні значення біомаси зоопланктону в експериментальних ставах ДП «ДГ “Нивка”», 2020 р. (n = 7)

Table 3. Average seasonal biomass of zooplankton from experimental ponds of SE "EE "Nyvka ", 2020 (n = 7)

Основні групи організмів / The main groups of organisms	Контроль / Control		Дослід / Experiment	
	г/м ³ / g/m ³	%	г/м ³ / g/m ³	%
<i>Rotifera</i>	0,10	0,5	0,26	0,9
<i>Cladocera</i>	7,17	36,8	21,98	76,6
<i>Copepoda</i>	11,49	58,9	5,12	17,9
Інші / Other	0,73	3,7	1,32	4,6
Всього / Total	19,49±4,80	100	28,68±9,33	100

Донна фауна експериментальних ставів була представлена личинками комарів-дзвінців із родини *Chironomidae*. При цьому в контрольних ставах переважали, в основному, дрібні заростеві форми личинок хірономід, а в дослідних — крупні форми (*Chironomus plumosus*, *Cryptohironomus ex. gr. defectus*).

Середні за вегетаційний сезон показники біомаси бентофауни в досліді були на рівні $3,80 \pm 2,20$ г/м², а у контролі — $3,03 \pm 2,42$ г/м² (табл. 4), і відповідали оптимальним показникам розвитку, необхідним для забезпечення харчових потреб молоді коропа [1].

Таблиця 4. Середньосезонні біомаси зообентосу в експериментальних ставах ДП «ДГ «Нивка», 2020 р. (n = 7)

Table 4. Average seasonal biomass of zoobenthos from experimental ponds of SE "EE "Nyvka ", 2020 (n = 7)

Основні групи організмів / The main groups of organisms	Контроль / Control		Дослід / Experiment	
	г/м ² / g/m ²	%	г/м ² / g/m ²	%
<i>Chironomidae larvae</i>	$3,03 \pm 2,42$	100	$3,80 \pm 2,20$	100
Total	$3,03 \pm 2,42$	100	$3,80 \pm 2,20$	100

Проведені дослідження із застосуванням суспензії хлорели, показали, що у дослідному ставу створювалися сприятливі гідрохімічні умови та спостерігався інтенсивний розвиток зоопланктону, що позитивно відобразилося на рості цьоголіток коропа (рис. 1), а разом з тим і рибопродуктивності ставу.

Рис. 1. Динаміка росту цьоголіток коропа у вирощувальних ставах впродовж вегетаційного сезону, 2020 р.

Fig. 1. Growth dynamics of carp's underyearlings from experimental ponds of SE "EE "Nyvka ", 2020

При обловах середня маса вирощених цьоголіток коропа в досліді була на 6,9% вищою і складала $34,30 \pm 1,78$ г, проти $32,10 \pm 1,88$ г у контролі. Коефіцієнт вгодованості (K_v) цьоголіток коропа знаходився у межах 3,02–3,40. Такі показники вгодованості, згідно з нормативами, для цьоголіток коропа є досить високими і зумовлені позитивним впливом формування природної кормової бази риб, спрямованої на забезпечення їх фізіологічних потреб (табл. 5).

Таблиця 5. Результати вирощування цьоголіток коропа в ДП «ДГ «Нивка»» ІРГ НААН, 2020 р.

Table 5. The results of cultivating carp's underyearlings from experimental ponds of SE "EE "Nyvka ", 2020

Варіанти дослідів / Version of experiment	Посаджено непідрощених личинок коропа тис. екз./га / Stoking of carp larvae, thousands spc./ ha	Виловлено цьоголіток / Catches of underyearlings				Рибопродуктивність, кг/га / Fishproductivity, kg/ha
		тис. екз./га / thousands spc./ ha	середня маса, г (n=25) / average weight, g (n=25)	вихід, % / output, %	коефіцієнт вгодованості (K _в), (n=25) / condition factor (C _f), (n=25)	
Контроль / Control	50,0	19,6	32,1±1,88	39,2	3,02±0,11	629,2
Дослід / Experiment	50,0	22,7	34,3±1,78	45,4	3,40±0,13	778,6

Вихід цьоголіток коропа від посаджених на вирощування непідрощених личинок в дослідному ставу (із застосуванням суспензії хлорели), був вищим і становив 45,4%, проти 39,2% у контрольному (табл. 5). Це ще раз підтверджує те, що внесення в стави суспензії хлорели не тільки не знижує вихід цьоголіток, а, навпаки, підвищує життєстійкість та ріст молоді, поліпшуючи умови водного середовища і, перш за все, природну кормову базу для живлення риби.

За рахунок отриманих вищих показників середньої маси та виходу цьоголіток коропа, в досліді було отримано і більшу на 23,7%, ніж у контролі, рибопродуктивність (табл. 5).

Економічну доцільність застосування суспензії хлорели для інтенсифікації природної кормової бази оцінювали за величиною грошових витрат на вирощування 1 кг цьоголіток коропа і за показником виручки від реалізації рибопосадкового матеріалу, вирощеного в експериментальних ставах (т. з. умовного прибутку). При розрахунку економічної ефективності за основу було взято лише витрати на удобрення 1 га ставів; оскільки інші супутні виробничі витрати для експериментальних ставів були однаковими, то відсоткова закономірність збережеться при їх відрахуванні із показників економічної ефективності вирощування.

Результати розрахунків при вирощуванні рибопосадкового матеріалу коропа в експериментальних ставах наведено в таблиці 6.

Розрахунки економічної ефективності показали, що у дослідному ставу витрати на вирощування 1 кг цьоголіток коропа були в 1,9 раза вищими, порівняно з контрольними. Водночас, загальна рибопродуктивність за таких витрат у дослідному ставу перевищувала контрольні показники в 1,2 раза. При цьому умовний прибуток від реалізації рибопосадкового матеріалу в досліді становив 33337,0 грн, і на 20,7% перевищував контроль (табл. 6).

Таблиця 6. Економічні показники вирощування рибопосадкового матеріалу в експериментальних ставах ДП «ДГ “Нивка”», 2020 р.**Table 6. Economic indicators of growing carp's stocking material from the experimental ponds of SE "EE" Nyvka "", 2020**

Показники / Indicators	Контроль / Control	Дослід / Experiment
Виловлено риби, кг/га / Caught of fish, kg / ha	629,2	778,6
Витрати на удобрення, грн./га / Fertilizer costs, UAH / ha		
Суспензія хлорели / Suspension of chlorella	—	1000
Перегній ВРХ / Cattle humus	700	700
Всього змінних витрат, грн./ Total variable costs, UAH / ha	700	1700
Витрати на 1 кг вирощених цьоголіток, грн./га / Costs per 1 kg of underyearlings, UAH / ha	1,11	2,18
Ринкова вартість, вирощеної продукції / cultivated products грн./га / Market value, UAH / ha	28314	35037
1 кг риби / 1 kg of fish	45	45
Умовний прибуток від реалізації рибопосадкового матеріалу, грн./га / Conditional profit from the sale of carp's stocking material, UAH/ha	27614	33337
Умовний прибуток від реалізації рибопосадкового матеріалу, % / Conditional profit from the sale of carp's stocking material,%	—	20,7

Примітка. ** — використані ціни 2020 року: суспензія хлорели — 20 грн/л; перегній — 700 грн/т.

** — used prices of 2020: suspension of chlorella - 20 UAH / l; cattle humus - 700 UAH / t.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Екологічні умови вирощування рибопосадкового матеріалу коропа були задовільними. Температурний та гідрохімічний режими експериментальних ставів були сприятливими для розвитку кормових організмів та вирощування цьоголіток коропа.

Розвиток природної кормової бази був достатнім для забезпечення харчових потреб молоді коропа. Внесення суспензії хлорели сприяло інтенсифікації розвитку зоопланктонних організмів. Середньосезонна біомаса зоопланктону в дослідному ставу становила 28,68 г/м³ і була в 1,5 раза вищою, ніж у контрольному. При цьому частка гіллястовусих ракоподібних у загальній біомасі зоопланктону дослідного ставу становила 76,6% і була значно вищою, ніж контрольного (36,8%). Донна фауна експериментальних ставів була представлена цінними в кормовому значенні личинками хірономід. Середня за вегетаційний сезон біомаса зообентосу в досліді була в 1,3 раза вищою, ніж у контролі.

Середня маса вирощених цьоголіток коропа у досліді перебувала на рівні 34,3±1,78 г, а виживання — 45,4%, проти відповідно 32,1±1,88 г та 39,2% — у контролі. Рибопродуктивність у досліді становила 778,6 кг/га і була в 1,2 раза вищою, ніж у контролі.

Застосування суспензії хлорели приводило до зростання витрат на вирощування 1 кг цьоголіток коропа в досліді в 2 рази, але, в той же час, за рахунок отриманої на 23,7% вищої рибопродуктивності, вело і до збільшення відсотку виручки за рахунок одержаної додаткової продукції на 20,7%.

ЛІТЕРАТУРА

1. Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / Андрющенко А. І. та ін.; ред. Гринжевський М. В. Київ, 1998. 124 с.
2. Головки Г. В. Оптимизация способов формирования планктона в прудах Нижнего Дона : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.18 «Гидробиология». Астрахань, 2007. 20 с.
3. Пестис В., Козлова Т., Козлов А. Новое слово в технологиях аквакультуры // Наука и инновации. Минск : Беларуская наука, 2018. С. 28—34.
4. Онищенко О. М., Дворецкий А. І. Мікрводорості як відновлюваний біологічний ресурс для потреб сільського господарства // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2013. № 2(32). С. 48—50.
5. Михеева Т. Перспективы использования культивируемых и планктонных микроскопических водорослей // Наука и инновации. Минск : Беларуская наука, 2018. С. 15—20.
6. Харитонов Н. Н., Галасун П. Т., Панченко С. Т. Методические рекомендации по совершенствованию метода комплексной интенсификации прудового рыбоводства УССР в зависимости от зонального положения хозяйств. Киев, 1976. 30 с.
7. Харитонов Н. Н. Влияние удобрений на повышение рыбопродуктивности прудов // Технология производства рыбы. Москва : Колос, 1974. С. 66—72.
8. Экологические проблемы эвтрофирования внутренних континентальных водоемов Юга России и биотехнологический метод повышения качества воды / Кузнецов П. И. и др. // Межвузовский сборник научных статей под редакцией О.А. Полумордвинова. Астрахань : АИСИ, 2013. № 2(5). Спецвыпуск. С. 61—67.
9. Богданов Н. И. Биологическая реабилитация водоёмов. Пенза : РИО ПГСХА, 2008. 126 с.
10. Шарило Ю. Є., Деренько О. О., Дюдяєва О. А. Використання водоростей виду як біологічний метод очищення водойм // Водні біоресурси та аквакультура. 2020. № 1. С. 88—102.
11. Особенности влияния штамма *Chlorella vulgaris* ИФР №С-111 на качество воды в прудовом рыбоводстве / Фролова М. В. и др. // Орошаемое земледелие. 2019. № 3. С. 46—49.
12. Богданов Н. И. Суспензия хлореллы в рационе сельскохозяйственных животных. Пенза, 2007. 48 с.
13. Амбросимова Н. А., Арутюнян Т. В. Продуктивное действие хлореллы в составе стартового комбикорма севрюги // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2019. № 7.
14. Опыт выращивания молоди пеляди *Coregonus peled* при добавлении суспензии хлореллы / Трофимчук О. А. и др. // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2020. №5. С.62-69.

15. Інтенсивність масонакопичення молоді стерляді прісноводної за дії суспензії живих клітин *Clorella vulgaris* / Джуравець Ю.Ю. та ін. // Проблеми функціонування та підвищення біопродуктивності водних екосистем. С. 55—57.
16. Brown M. R., Blackburn S. I. Live microalgae as feed in aquaculture hatcheries // *Advances in Aquaculture Hatchery Technology*. [S. l.] : Woodhead Publishing Limited, 2013. P. 117—158.
17. Liu L., Pohner, G., Wei D. Extracellular metabolites from industrial microalgae and their biotechnological potential // *Marine drugs*. 2016. Vol. 14, № 10. P. 1—19.
18. Алёкин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеиздат, 1973. 262 с.
19. СОУ-05.01.-37-385:2006. Вода рыбогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 7 с.
20. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін.; ред. Романенко В. Д. Київ : Логос, 2006. 408 с.
21. Кражан С. А., Лупачева Л. И. Естественная кормовая база водоемов и методы ее определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства (Справочный материал для работников прудовых хозяйств УССР). Львов, 1991. 105 с.
22. Асаул З. И. Определитель пресноводных водорослей. Эвгленовые. Москва : Наука, 1973. 330 с.
23. Водоросли. Справочник / Вассер С. П. и др. Киев : Наукова думка, 1989. 608 с.
24. Пресноводные водоросли Украинской ССР / Топачевский А. В., Масюк Н. П. ; ред. Макаревич М. Ф. Киев : Вища школа, 1984. 336 с.
25. Царенко П. М. Краткий определитель хлорококковых водорослей Украинской ССР. Киев : Наукова думка, 1990. 208 с.
26. Кутикова Л. А. Коловратки фауны СССР. Ленинград : Наука, 1970. 744 с.
27. Мануйлова Е. Ф. Ветвистоусые рачки (*Cladocera*) фауны СССР. Москва — Ленинград : Наука, 1964. 328 с.
28. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части ССР (Планктон, бентос). Ленинград : Гидрометеиздат, 1977. 512 с.
29. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая пром-ть, 1966. 376 с.
30. Шерман І. М. Ставове рибництво. Київ : Урожай, 1994. 336 с.
31. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. Москва : Агропромиздат, 1986. Т. 1. 259 с.

REFERENCES

1. Andriushchenko, A. I., et al. (1998). *Metody pidvyshchennia pryrodnoi ryboproduktyvnosti staviv*. Kyiv.
2. Golovko, G. V. (2007). Optimizatsiya sposobov formirovaniya planktona v prudakh Nizhnego Dona. *Extended abstract of candidate's thesis*. Astrakhan', 2007. 20 s.
3. Pestis, V., Kozlova, T., & Kozlov, A. (2018). Novoe slovo v tekhnologiyakh akvakul'tury. *Nauka i innovatsii*. Minsk: Belarusskaya nauka, 28-34.
4. Onyshchenko, O. M., & Dvoretzkyi, A. I. (2013). Mikrovodorosti yak vidnovliuvanyi biolohichniy resurs dlia potreb silskoho hospodarstva. *Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnogo ahrarnoho universytetu*, 2(32), 48-50.

5. Mikheeva, T. (2018). Perspektivy ispol'zovaniya kul'tiviruemykh i planktonnykh mikroskopicheskikh vodorosley. *Nauka i innovatsii*. Minsk: Belarusskaya nauka, 15-20.
6. Kharitonova, N. N., Galasun, P. T., & Panchenko, S. T. (1976). *Metodicheskie rekomendatsii po sovershenstvovaniyu metoda kompleksnoy intensifikatsii prudovogo rybovodstva USSR v zavisimosti od zonal'nogo polozheniya khozyaystv*. Kiev.
7. Kharitonova, N. N. (1974). Vliyanie udobreniy na povyshenie ryboproduktivnosti prudov. *Tekhnologiya proizvodstva ryby*. Moskva: Kolos, 66-72.
8. Kuznetsov, P. I., et al. (2013). Ekologicheskie problemy evtrofirovaniya vnutrennikh kontinental'nykh vodoemov Yuga Rossii i biotekhnologicheskiiy metod povysleniya kachestva vody. *Mezhvuzovskiy sbornik nauchn. statey pod redaktsiey O.A. Polumordvinova*. Astrakhan': AISI, 2(5), Spetsvypusk, 61-67.
9. Bogdanov, N. I. (2008). *Biologicheskaya rehabilitatsiya vodoemov*. Penza: RIO PGSKhA.
10. Sharylo, Yu. Ye., Derenko, O. O., & Diudiaieva, O. A. (2020). Vykorystannia vodorostei vydu yak biolohichnyi metod ochyshchennia vodoim. *Vodni bioresursy ta akvakultura, I*, 88-102.
11. Frolova, M. V., et al. (2019). Osobennosti vliyaniya shtamma *Chlorella vulgaris* IFR №S-111 na kachestvo vody v prudovom rybovodstve. *Oroshaemoe zemledelie*, 3, 46-49.
12. Bogdanov, N. I. (2007). *Suspenziya khlorelly v ratsione sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh*. Penza.
13. Ambrosimova, N. A., & Arutyunyan, T. V. (2019). Produktivnoe deystvie khlorelly v sostave startovogo kombikorma sevryugi. *Rybovodstvo i rybnoe khozyaystvo*, 7.
14. Trofimchuk, O. A., et al. (2020). Opyt vyrashchivaniya molodi pelyadi *Coregonus peled* pri dobavlenii suspenzii khlorelly. *Rybovodstvo i rybnoe khozyaystvo*, 5, 62-69.
15. Dzhuravets, Yu. Iu., et al. Intensyvnist masonakopychennia molodi sterliadi prisnovodnoi za dii suspenzii zhyvykh klityn *Clorella vulgaris*. *Problemy funktsionuvannia ta pidvyshchennia bioproduktyvnosti vodnyi ekosystem*, 55-57.
16. Brown, M. R., & Blackburn, S. I. (2013). Live microalgae as feed in aquaculture hatcheries. *Advances in Aquaculture Hatchery Technology*, 117-158.
17. Liu, L., Pohner, G., & Wei, D. (2016). Extracellular metabolites from industrial microalgae and their biotechnological potential. *Marine drugs*, 14, 10, 1-19.
18. Alekin, O. A., Semenov, A. F., & Skopintsev, V. A. (1973). *Rukovodstvo po khimicheskomu analizu vod sushi*. Leningrad: Gidrometizdat.
19. Voda rybohospodarskykh pidpriemstv. Zahalni vymohy ta normy. (2006). *SOU-05.01.-37-385:2006*. Kyiv: Ministerstvo ahrarynoi polityky Ukrainy.
20. Arsan, O. M., et al. (2006). *Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevyykh vod*. Kyiv: Lohos.
21. Krazhan, S. A., & Lupacheva, L. I. (1991). *Estestvennaya kormovaya baza vodoemov i metody ee opredeleniya pri intensivnom vedenii rybnogo khozyaystva (Spravochnyy material dlya rabotnikov prudovykh khozyaystv USSR)*. L'vov.
22. Asaul, Z. I. (1973). *Opredelitel' presnovodnykh vodorosley*. Evgenovye. Moskva: Nauka.
23. Vasser, S. P., et al. (1989). *Vodorosli. Spravochnik*. Kiev: Naukova dumka.
24. Topachevskiy, A. V., & Masyuk, N. P. (1984). *Presnovodnye vodorosli Ukrainskoy SSR*. Kyiv: Vishcha shkola. Golovnoe izd-vo.

25. Tsarenko, P. M. (1990). *Kratkiy opredelitel' khlorokokkovykh vodorosley Ukrainskoy SSR*. Kiev: Nauk. dumka.
26. Kutikova, L. A. (1970). *Kolovratki fauny SSSR*. Leningrad: Nauka.
27. Manuylova, E. F. (1964). *Vetvistousye rachki (Cladocera) fauny SSSR*. Moskva — Leningrad: Nauka.
28. *Opredelitel' presnovodnykh bespozvonochnykh Evropeyskoy chasti SSR (Plankton, bentos)*. (1977). Leningrad: Gidrometeoizdat.
29. Pravdin, I. F. (1966). *Rukovodstvo po izucheniyu ryb*. Moskva: Pishchevaya prom-t'.
30. Sherman, I. M. (1994). *Stavove rybnytstvo*. Kyiv: Urozhay.
31. *Sbornik normativno-tekhnologicheskoy dokumentatsii po tovarnomu rybovodstvu* (1986). Vol. 1. Moskva: Agropromizdat.

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 48-59
DOI: <https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.048>
УДК 639.371.52:639.3.032(477)

Received 27.07.21
Received in revised form 31.08.21
Accepted 07.09.21

ДО АПРОБАЦІЇ ГАЛИЦЬКОГО МАСИВУ КОРОПА

В. В. Гурбик, viktoriagurbyk@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

О. І. Стрілецький, striletsky_89@ukr.net, СФГ «Короп», с. Рата, Львівська обл.

Г. А. Куріненко, annazakharenko@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

В. Л. Ткачук, nektar1@ukr.net, ТОВ СФГ «Джерела», с. Пляшівка, Рівненська обл.

Ю. П. Черник, dp_fish@ukr.net, ДП «ДГ Львівської дослідної станції», смт Великий Любін, Львівська обл.

Мета. Надати оцінку репродуктивним показникам та екстер'єрним характеристикам племінного маточного стада галицького масиву коропа у господарствах-оригінаторах, а саме СФГ «Короп», СФГ «Джерела», ДП «ДГ Львівської дослідної станції».

Методика. Дослідження проводили згідно з загальноприйнятими методиками в рибництві і селекції з використанням статистичного опрацювання і аналізу даних. Продуктивні особливості галицького коропа удосконалювались методом масового відбору та спрямованого добору. Завданням селекції стало отримання племінного стада галицького масиву, яке забезпечить одержання потомства з підвищеною індивідуальною масою вже на першому році життя.

Результати. Вік досягнення статевої зрілості у плідників галицького коропа становив 3–4 роки у самців та 4–5 років у самиць. Після проведення гіпофізарної стимуляції в умовах заводського відтворення встановлено позитивну реакцію плідників, яка перевищила 92%. При формуванні племінних стад галицького коропа на першому році життя напруженість відбору становила 15%. Спрямований відбір за показником середньої індивідуальної маси починали з другого року життя. Напруженість відбору дволіток галицького масиву коропа склала 50%, надалі цей показник перевищував 85% та набував коригувального характеру.

Відтворення галицького масиву коропа проходило у нерестових ставах та у заводських умовах. Робоча плодючість самиць становила $1256,0 \pm 132,80$ тис. ікр., відносна плодючість — $127,5 \pm 5,52$ тис. ікр./кг, що є досить високими показниками в порівнянні з українською рамчастою породою коропа. При відтворенні галицького коропа у ставах вихід тридобових личинок з 1 гнізда склав 241 тис. екз.

Відповідно до отриманих даних, за екстер'єрними показниками галицький масив коропа характеризується високоспинною тілобудовою та м'ясистою структурою, яка зберігається впродовж всього життя.

З огляду на проведені дослідження, галицький масив коропа повністю відповідає вимогам «Положення про апробацію селекційних досягнень у тваринництві» і може бути представлений відповідним органам для розгляду та затвердження як внутрішньопорідний тип української рамчастої породи коропа.

Наукова новизна. Аналіз репродуктивних показників маточного племінного стада галицького коропа стане основою для представлення масиву в статусі внутрішньопорідного типу і затвердження його як селекційного досягнення.

© В. В. Гурбик, О. І. Стрілецький, Г. А. Куріненко, В. Л. Ткачук, Ю. П. Черник, 2021

Практична значимість. Отримані результати сприятимуть розширенню масиву галицького коропа, як в аквакультурі України, так і за її межами. Племінний маточний матеріал як об'єкт селекції, буде залучено у роботі з рамчастими помісями.

Ключові слова: селекція, короп, інвентаризація, бонітування, помісі, організація нересту, відтворення.

TO THE APPROVAL OF THE GALICIAN CARP GROUP

V. Gurbyk, viktoriagurbyk@gmail.com, Institute of Fisheries of NAAS of Ukraine, Kyiv

O. Striletsky, 89@ukr.net, SFG "Korop", p. Rata, Lviv region

H. Kurinenko, annazakharenko@ukr.net, Institute of Fisheries of NAAS of Ukraine, Kyiv

V. Tkachuk, nektar1@ukr.net, SFG "Sources" Ltd., p. Plyashivka, Rivne region

Yu. Chernik, dp_fish@ukr.net, SE "Lviv Research Station", p. Velyki Lyubin, Lviv region

Purpose. To evaluate the reproductive indicators and exterior characteristics of the breeding brood stock of the Galician carp group at the original farms, namely farms "Korop" and "Dzherelo", State Enterprise "Lviv Experimental Station".

Methodology. The study was conducted according to generally accepted methods in fish farming and breeding using statistical processing and data analysis. The productive features of the Galician carp were improved by the method of mass selection and directional selection. The tasks of the selection were to obtain a breeding stock of the Galician group, which will ensure the production of offspring with high individual weight in the first year of life.

Findings. The age of maturity in brood Galician carp was 3-4 years in males and 4-5 years in females. After pituitary stimulation in the conditions of industrial reproduction, a positive reaction of the brood fish was established, which exceeded 92%.

When forming breeding stocks of Galician carp in the first year of life, the intensity of selection was 15%. Directional selection on the basis of average individual weight started on the second year of life. The intensity of selection of age-1+ Galician carp group was 50%, then this parameter exceeded 85%.

Reproduction of the Galician carp group occurred in spawning ponds and in industrial conditions. Working fertility of females was 1256.0 ± 132.80 thousand eggs, relative fertility - 127.5 ± 5.52 thousand eggs/kg, which was quite high in comparison with the Ukrainian framed carp. During the reproduction of Galician carp in ponds, the yield of three-day-old larvae from one nest amounted to 241 thousand individuals.

According to the obtained data, based on the exterior indicators, the Galician carp group is characterized by a high-backed physique and fleshy structure, which is preserved throughout life.

In view of the conducted study, the Galician carp group fully complies with the requirements of the Regulation on approbation of selection achievements in animal husbandry and can be submitted to the relevant authorities for consideration and approval as an intrabreed type of Ukrainian framed and scaly carp breeds.

Originality. The analysis of reproductive indicators of the breeding brood stock of Galician carp will serve as a basis for the presentation of this group in the status of intrabreed type and its approval as a selection achievement.

Practical value. The obtained results will contribute to the expansion of the Galician carp group both in the aquaculture of Ukraine and abroad. Breeding brood material as an object of selection will be involved in work with framed carp mixes.

Key words: breeding, carp, inventory, grading, crossbreeding, organization of spawning, reproduction.

К АПРОБАЦИИ ГАЛИЦИЙСКОГО МАССИВА КАРПА

В. В. Гурбик, viktoriagurbyk@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

О. И. Стрелецкий, strelitsky_89@ukr.net, КФХ «Карп», с. Рата, Львовская обл.

А. А. Куриненко, annazakharenko@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

В. Л. Ткачук, nektar1@ukr.net, ООО КФХ «Джерела», с. Пляшивка, Ровенская обл.

Ю. П. Черник, dp_fish@ukr.net, ГП «ОХ Львовской опытной станции», пгт Великий Любень, Львовская обл.

***Цель.** Дать оценку репродуктивным показателям и экстерьерным характеристикам племенного маточного стада галицийского массива карпа в хозяйствах-оригинаторах, а именно — фермерских хозяйствах «Короп» и «Джерела», ГП «Опытное хозяйство Львовской опытной станции».*

***Методика.** Исследования проводили в соответствии с общепринятыми методиками в рыбоводстве и селекции с использованием статистической обработки и анализа данных. Продуктивные особенности галицийского карпа совершенствовались методом массового отбора и направленного отбора. Задачей селекции явилось получение племенного стада галицийского массива, которое обеспечит получение потомства с повышенной индивидуальной массой уже на первом году жизни.*

***Результаты.** Возраст достижения половой зрелости у производителей галицийского карпа составлял 3–4 года у самцов и 4–5 лет у самок. Вследствие проведения гипофизарной стимуляции в условиях заводского воспроизводства установлено положительную реакцию производителей, превысившую 92%.*

При формировании племенных стад галицийского карпа на первом году жизни напряженность отбора составляла 15%. Направленный отбор по показателю средней индивидуальной массы начинали со второго года жизни. Напряженность отбора двухлеток галицийского массива карпа составила 50%, в дальнейшем этот показатель превышал 85%.

Воспроизводство галицийского массива карпа проходило в нерестовых прудах и в заводских условиях. Рабочая плодовитость самок составила $1256,0 \pm 132,80$ тыс. икр., относительная плодовитость — $127,5 \pm 5,52$ тыс. икр./кг, что является высокими показателями по сравнению с украинской рамчатой породой карпа. При воспроизводстве галицийского карпа в прудах выход трехсуточных личинок с 1 гнезда составил 241 тыс. экз.

Согласно полученным данным, по экстерьерным показателям галицийский массив карпа характеризуется высокоспинностью и мясистой структурой, которые наблюдаются в течение всей жизни.

Учитывая проведенные исследования, галицийский массив карпа полностью соответствует требованиям «Положения об апробации селекционных достижений в животноводстве» и может быть представлен соответствующим органам для рассмотрения и утверждения в качестве внутрипородного типа украинской рамчатой породы карпа.

***Научная новизна.** Анализ репродуктивных показателей маточного племенного стада галицийского карпа послужит основой для представления массива в статусе внутрипородного типа и утверждения его как селекционного достижения.*

***Практическая значимость.** Полученные результаты будут способствовать расширению массива галицийского карпа, как в аквакультуре Украины, так и за ее пределами. Племенной маточный материал как объект селекции будет привлечен к работе с рамчатыми помесями.*

***Ключевые слова:** селекция, карп, инвентаризация, бонитировка, помеси, организация нереста, воспроизводство.*

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Ріст продукції рибництва можливий лише за умови комплексної інтенсифікації. Одним із найважливіших шляхів інтенсифікації є поліпшення продуктивних якостей об'єктів вирощування, яке досягається шляхом створенням нових або відновленням аборигенних високопродуктивних порід риб. Короп є одним з найбільш поширених об'єктів у ставовому рибництві, якого вирощували протягом століть не лише в Україні, а й за її межами [1–4].

Уперше галицький короп був представлений під час сільськогосподарської виставки в Берліні у 1880 р. фермою «Каньов», розташованої на території Галичини. Широкого розповсюдження як об'єкт ставового рибництва галицький масив коропа набув із введенням у коропівництво нової прогресивної системи Дубіша [5–7].

Відомий український селекціонер О. І. Кузьома вперше систематизував та вивчив популяцію українських коропів, що дозволило йому розпочати спрямовану селекційну роботу. Методом відтворного схрещування місцевих безпорідних коропів Антонінського держриборозплідника з дзеркальними галицькими були виведені нові породи коропа — українська луската та українська рамчата. На сьогодні масив галицького коропа залишився в декількох ставових господарствах на території Прикарпаття України та в Польщі [8–11].

Враховуючи майже піввікову відсутність наукового супроводу, проблема збереження чистоти крові аборигенного галицького коропа є дуже актуальною як в контексті селекції, так і для подальшої роботи з малолускатими помісями.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Основним напрямом селекції галицького масиву коропа став метод безперервно поліпшувального відбору, який передбачав такі завдання: виділити зі стада коропа ті форми, які реагують на створені умови корисною мінливістю, а саме відрізняються здоровою міцною конституцією, найбільш пристосовані до умов вирощування, здатні за існуючої системи риборозведення забезпечувати високу рибопродуктивність і давати якісну товарну продукцію. Відбір племінного маточного стада галицького коропа проводили за комплексом ознак у різновікових груп на різних етапах вирощування. Неповноцінні особини за племінними показниками вибраковувались.

Перевагу надавали рамчастому розміщенню луски, адже голі екземпляри характеризуються зниженими продуктивними показниками та рівнем виживання. В умовах вирощування малолускатого коропа забезпечується підвищення виходу їстівної частки тіла на 5% в порівнянні з лускатими формами. Під час технологічних процесів вирощування спостерігається зменшення травматизації маточного стада, що зумовлює менший відхід племінних представників в умовах заводського відтворення.

Продуктивні особливості галицького коропа удосконалювались методом масового відбору та спрямованого добору. Завданням селекції було отримання

племінного стада галицького коропа, яке забезпечить отримання потомства з підвищеною індивідуальною масою вже на першому році життя. В подальшому це зумовило одержання рибопродукції з високими товарними кондиціями за індивідуальною масою на другому та третьому роках вирощування.

Отже, аналіз репродуктивних показників маточного племінного стада галицького масиву коропа слугуватиме основою для представлення масиву в статусі внутрішньопорідного типу і затвердження його як селекційного досягнення. Отримані результати сприятимуть розширенню масиву галицького коропа як в аквакультури України, так і за її межами. Племінний маточний матеріал як об'єкт селекції буде залучено у роботі з рамчастими помісями.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проводили згідно із загальноприйнятими методиками в рибництві і селекції з використанням статистичного опрацювання і аналізу даних [12, 13]. Продуктивні особливості галицького коропа удосконалювались методом масового відбору та спрямованого добору. Завданням селекції стало отримання племінного стада галицького коропа, яке забезпечить отримання потомства з підвищеною індивідуальною масою вже на першому році життя. Дослідження проводили на базі господарств-оригінакторів, а саме СФГ «Короп», ТОВ СФГ «Джерела», ДП «ДГ Львівської дослідної станції».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Вирощування племінного матеріалу галицького коропа проходило за умов монокультури та розрідженої густоти посадки. При формуванні племінних стад галицького коропа на першому році життя напруженість відбору становила 15%. Селекцію проводили за тілобудовою та лусковим покривом. Направлений відбір за показником середньої індивідуальної маси починали з другого року життя. В цей період напруженість відбору становила 50%.

Цьоголіток утримували за густоти посадки 12500 екз./га, однорічок — 1000 екз./га, дворічок — 500 екз./га. Для оцінки потенціалу росту цього масиву додатково проводили підгодівлю маточного матеріалу подрібненим зерном та високоякісним кормом «Aller Aqua».

Починаючи з трирічного віку риб, напруженість відбору набувала коригувального характеру та перевищувала 85%. Густота посадки в цей період становила у самиць — 350 екз./га, у самців — 400 екз./га. Маточне племінне стадо після досягнення чотирирічного віку утримували за густоти посадки 250 екз./га для самців та не більше 150 екз./га для самиць (табл. 1).

Вік досягнення статевої зрілості у плідників галицького коропа складав 3–4 роки у самців та 4–5 років у самиць. При організації нересту галицького масиву коропа у ставах вихід тридобових личинок галицького коропа з 1 гнізда склав 241 тис. екз.

Таблиця 1. Норми відбору та вирощування племінного матеріалу коропа галицького внутрішньопорідного типу**Table. 1. Norms of selection and cultivation of breeding material of Galician intrabreed type of carp**

Вік / Age	Густота посадки, екз./га / Planting density, specimens/ha	Середня індивідуальна маса, г / Average individual weight, g	Норми відбору, % / Selection standards,%
Личинка / Larva	12500	120	-
Однорічка / One year old	1000	1680	15
Дворічка / Two-year-old	500	2500	50
Трирічка / Three years			
Самиці / Females	350	3600	85
Самці / Males	400	3200	
Чотирирічка / Four years			
Самиці / Females	150	4400	90
Самці / Males	250	3700	
П'ятирічка / Five years			
Самиці / Females	120	5700	90

Після проведення гіпофізарної стимуляції в умовах заводського відтворення встановлено позитивну реакцію плідників, яка перевищила 92%. Середня маса овульованих ікринок знаходилась на рівні $1,30 \pm 0,08$. Робоча плодючість становила $1256,0 \pm 132,80$ тис. ікр., що засвідчує високу репродуктивну здатність галицького коропа. Відносна плодючість самиць галицького коропа досягала $127,5 \pm 5,52$ тис. ікринок/кг, що є достатньо високим показником в порівнянні з українською рамчатою породою коропа. Співвідношення маси відібраної ікри до маси самиці склало 18,5%. Рівень виживання личинок в умовах заводського відтворення становив 70%, що не виходить за межі нормативних значень (табл. 2).

Оцінку екстер'єрних показників різновікових груп галицького коропа проводили за декількома віковими категоріями. За екстер'єрними показниками встановлено, що чотирілітки галицького коропа характеризуються підвищеною індивідуальною масою екземпляра в порівнянні з нормативними значеннями. Так, у господарстві СФГ «Короп» на четвертому році життя середня індивідуальна маса самиць становила $4,39 \pm 0,3$ кг, самців — $3,86 \pm 0,3$ кг. На базі ДП ДГ «Великий Любін» середня індивідуальна маса була дещо нижчою та становила $4,19 \pm 0,3$ кг у самок, $3,45 \pm 0,3$ — у самців.

Представники галицького внутрішньопорідного типу відзначаються високоспинною структурою. У самиць галицького коропа на четвертому році життя індекс високоспинності встановлено на рівні $2,8 \pm 0,1$ – $3,0 \pm 0,2$. У самців цей показник знаходився в межах $2,78 \pm 0,1$ – $2,9 \pm 0,1$. Індекс обхвату тіла у самиць галицького коропа становив $1,09 \pm 0,03$ – $1,17 \pm 0,05$; у самців – $1,13 \pm 0,02$ – $1,18 \pm 0,03$.

Таблиця 2. Репродуктивні показники племінних плідників галицького коропа

Table. 2. Reproductive indicators of breeding breeders of Galician carp

Показники/ Indexes	Середні значення / Average values	
Вік досягнення статевої зрілості / Age of puberty	4–5	
Виживання тридобових личинок з 1 гнізда, тис. екз. / Survival of three-day-old larvae from 1 nest, thousand larvae	241	
Виживання личинок в період інкубації, % / Survival of larvae during incubation, %	70	
Реакція самиць на гіпофізарну ін'єкцію / Female reaction to pituitary injection	Позитивна	
Середня маса ікринки, мг / The average weight of the egg, mg	M±m	1,30±0,08
	σ	0,12
	Cv, %	9,02
Робоча плодючість, тис. ікринок / Working fertility, thousands of eggs	M±m	1256,0±132,80
	σ	178,92
	Cv, %	14,25
Відносна плодючість, тис. ікринок/кг / Relative fertility, thousand eggs / kg	M±m	127,5±5,52
	σ	8,72
	Cv, %	6,84
Співвідношення маси відібраної ікри до маси самиці, % / The ratio of the weight of the selected eggs to the weight of the female, %	M±m	18,5±1,46
	σ	1,89
	Cv, %	10,25

Галицький короп характеризується невеликою головою: так, індекс голови у самиць становив $3,6 \pm 0,3$ – $3,78 \pm 0,1$, а у самців — $3,78 \pm 0,1$ – $3,6 \pm 0,3$. Статистично достовірної різниці між племінними чотирилітками галицького коропа обох господарств-оригінацій не встановлено (табл. 3).

Оцінку екстер'єру маточного стада на шостому та сьомому роках життя проводили під час весняного бонітування плідників галицького коропа. Індекс високоспинності у самиць СФГ «Короп» знаходився на рівні $2,5 \pm 0,02$, у самців — $2,7 \pm 0,1$, що засвідчує високоспинну структуру масиву. Середня індивідуальна маса плідників знаходилась на рівні $8,7 \pm 0,15$ кг у самок та $8,75 \pm 0,1$ — у самців. Індекс обхвату тіла у самиць становив $1,14 \pm 0,02$, що на 6% менше, ніж такий у самців, що констатує підготовку плідників до майбутнього нересту. Голова відзначається невеликими розмірами: індекс голови у самиць склав $3,78 \pm 0,16$, у самців — $3,88 \pm 0,05$. Статистично достовірної різниці між самицями та самцями не встановлено, згідно з екстер'єрними показниками.

Середня індивідуальна маса плідників галицького коропа у ДП ДГ «Великий Любін» набувала достатньо високих показників. Так, у самиць цей показник знаходився на рівні $8,0 \pm 0,6$, у самців — $7,5 \pm 0,4$. Індекс голови перебував на рівні $3,41 \pm 0,1$ — $3,5 \pm 0,2$. Індекс обхвату у самок галицького коропа склав $1,0 \pm 0,4$. Індекс високоспинності становив $2,4 \pm 0,2$ у самців та $2,37 \pm 0,1$ у самиць, що свідчить про м'ясисту тілобудову (табл. 4).

Таблиця 3. Екстер'єрна характеристика племінного стада галицького масиву коропа на четвертому році життя

Table. 3. Exterior characteristics of the breeding herd of the Galician carp massif in the fourth year of life

Показники / Indexes	СФГ «Короп» / Selective farm "Korop"		ДП ДГ «Великий Любін» / State Enterprise "Experimental Farm Velykyi Lyubin"	
	Самиці (♀), n=20	Самці (♂), n=19	Самиці (♀), n=18	Самці (♂), n=12
Р, г				
M±m	4,39±0,3	3,86±0,3	4,19±0,3	3,45±0,3
σ	0,37	0,41	0,45	0,46
C _v , %	8,62	10,7	10,6	13,3
K_{вг}				
M±m	3,05±0,17	2,8±0,2	2,9±0,5	2,9±0,2
σ	0,2	0,2	0,6	0,2
C _v , %	7,7	6,8	20,1	13,4
I/Н				
M±m	2,8±0,1	2,7±0,1	3,0±0,2	2,9±0,1
σ	0,13	0,12	0,2	0,2
C _v , %	5,0	4,5	6,9	5,2
I/О				
M±m	1,09±0,03	1,13±0,02	1,17±0,05	1,18±0,03
σ	0,04	0,04	0,06	0,04
C _v , %	3,9	3,2	5,1	3,5
I/С				
M±m	3,72±0,1	3,78±0,1	3,6±0,1	3,6±0,3
σ	0,1	0,1	0,2	0,5
C _v , %	3,8	3,0	4,97	5,15

Середня індивідуальна маса самиць галицького коропа СФГ «Джерела» становила 8,4±0,5 кг, що перевищило на 14% показник самців. Зафіксовано вищий коефіцієнт вгодованості у самців (3,6±0,13), ніж у самок (3,16±0,1). Інші показники екстер'єру плідників галицького коропа засвідчили його високоспинну та м'ясисту тілобудову.

При порівнянні стад трьох господарств-оригінакторів зафіксовано різницю у високоспинності між самцями СФГ «Короп» та ДП ДГ «Великий Любін», що зумовлено вищою вгодованістю племінного матеріалу у господарстві, розташованому у смт Великий Любін. Статистично достовірної різниці між племінними маточними стадами галицького масиву коропа не встановлено.

Таблиця 4. Екстер'єрна характеристика маточного стада галицького коропа на шостому та сьомому роках життя

Table. 4. Exterior characteristics of the uterine herd of Galician carp in the sixth and seventh years of life

Показники	ФСГ «Короп»/Selective farm "Korop"		ДП ДГ «Великий Любін» / State Enterprise "Experimental Farm Velykyi Lyubin"		ФСГ «Джерела» / «Dzherela peasant farm»	
	Самиці (♀), n=20	Самці (♂), n=19	Самиці (♀), n=18	Самці (♂), n=12	Самиці (♀), n=18	Самці (♂), n=12
P, г						
M±m	8,75±0,15	8,7±0,1	8,0±0,6	7,5±0,4	8,4±0,5	7,3±0,4
σ	0,2	0,1	0,7	0,5	0,7	0,5
C _v , %	2,4	1,6	9,0	6,9	8,6	7,2
K_{Br}						
M±m	3,5±0,1	3,2±0,1	3,35±0,13	3,69±0,2	3,16±0,7	3,6±0,1
σ	0,1	0,1	0,2	0,3	1,1	0,1
C _v , %	4,0	4,6	6,3	8,9	15,3	4,1
I/H						
M±m	2,5±0,02	2,7±0,1	2,37±0,1	2,42±0,1	2,45±0,1	2,5±0,02
σ	0,1	0,1	0,1	0,04	0,06	0,04
C _v , %	1,0	4,1	5,3	4,2	2,5	1,7
I/O						
M±m	1,14±0,02	1,2±0,02	1,0±0,4	1,03±0,02	1,01±0,04	1,04±0,01
σ	0,03	0,03	0,05	0,04	0,06	0,01
C _v , %	3,0	2,7	5,4	4,2	6,1	1,1
I/C						
M±m	3,78±0,16	3,88±0,05	3,41±0,1	3,5±0,2	3,4±0,16	3,48±0,2
σ	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3
C _v , %	6,2	1,9	4,7	5,9	6,7	7,4

При оцінці племінних маточних стад на восьмому та дев'ятому роках встановлено, що самиці СФГ «Короп» за показником середньої індивідуальної маси перевищили інші господарства-оригінатори. У самців коефіцієнт вгодованості встановлено на рівні $2,9 \pm 0,15$, що на 13% менше, ніж у самиць галицького коропа. Індекс високоспинності у самиць становив $2,5 \pm 0,1$, самці характеризувалися більш прогонистою формою. Індекс обхвату тіла у самиць становив $1,10 \pm 0,02$, у самців — $1,13 \pm 0,04$.

У племінних самців ДП ДГ «Великий Любін» середня індивідуальна маса становила $7,9 \pm 0,6$, у самиць — $10,2 \pm 0,8$. Коефіцієнт вгодованості у племінного маточного матеріалу знаходився на досить високому рівні: у самок — $3,8 \pm 0,4$, у самців — $3,7 \pm 0,17$. Індекс високоспинності у самиць досяг $2,45 \pm 0,2$, у самців — $2,4 \pm 0,1$.

На базі СФГ «Джерела» самиці за середньою індивідуальною масою перевершили самців на 25%. У самців маса екземпляру становила $8,5 \pm 0,6$ кг, у самиць — $10,6 \pm 0,7$ кг. Коефіцієнт вгодованості зафіксовано на рівні $3,9 \pm 0,4$ у самиць та $3,8 \pm 0,26$ — у самців. Індекс обхвату тіла у племінного маточного стада встановлено близько 1,0. Плідники характеризувалися високоспинною тілобудовою, у самців цей показник перевищив такий самиць та становив $2,3 \pm 0,1$ (табл. 5).

Таблиця 5. Екстер'ерна характеристика племінного маточного стада галицького коропа на восьмому та дев'ятому роках життя

Table. 5. Exterior characteristics of the breeding stock of Galician carp in the eighth and ninth years of life

Показники	ФСГ «Короп» / Selective farm "Korop"		ДП ДГ «Великий Любін» / State Enterprise "Experimental Farm Velykyi Lyubin"		ФСГ «Джерела» / «Dzherela peasant farm»	
	Самиці (♀), n=20	Самці (♂), n=19	Самиці (♀), n=18	Самці (♂), n=12	Самиці (♀), n=18	Самці (♂), n=12
P, кг						
M±m	10,0±0,24	10,3±0,6	10,2±0,8	7,9±0,6	10,6±0,7	8,5±0,6
σ	0,4	0,7	1,4	0,8	0,9	0,7
C _v , %	3,5	7,6	11,2	10,9	8,5	8,3
K_{вг}						
M±m	3,3±0,13	2,9±0,15	3,8±0,4	3,7±0,17	3,9±0,4	3,8±0,26
σ	0,17	0,22	0,5	0,3	0,5	0,34
C _v , %	5,4	7,6	12,6	7,6	12,2	9,1
I/H						
M±m	2,5±0,1	2,7±0,05	2,45±0,2	2,4±0,1	2,5±0,2	2,3±0,1
σ	0,05	0,07	0,2	0,1	0,2	0,1
C _v , %	2,4	2,7	8,6	4,9	9,7	9,1
I/O						
M±m	1,10±0,02	1,13±0,04	1,0±0,06	1,0±0,02	1,0±0,05	1,0±0,03
σ	0,04	0,06	0,07	0,04	0,1	0,1
C _v , %	3,6	5,7	7,0	3,7	7,5	4,9
I/C						
M±m	3,7±0,14	3,6±0,5	3,52±0,2	3,5±0,2	3,5±0,2	3,47±0,1
σ	0,19	0,7	0,2	0,2	0,3	0,13
C _v , %	5,2	1,8	6,4	5,4	7,3	3,7

Статистично достовірної різниці між групами плідників галицького коропа не встановлено, проте чітко простежується мінливість індексів високоспинності та обхвату тіла. Слід зазначити, що ця мінливість є сприятливим фоном для

використання племінних маточних стад у подальшій синтетичній селекції, спрямованій на отримання більш продуктивного потомства.

Згідно з отриманими репродуктивними показниками та індексами екстер'єру, галицький масив коропа визначається племінної цінністю за породністю, середньою індивідуальною масою та тілобудовою.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Галицький масив поклав основу для виведення українських порід коропа, однак через низку чинників значно скоротився ареал його поширення. Одним із завдань селекції стало отримання підвищеної індивідуальної маси потомства вже на першому році життя, що підтримало інтерес рибників до галицького коропа в Україні та за її межами. В подальшому це зумовило одержання рибопродукції з високими товарними кондиціями за масою екземпляра на другому та третьому роках вирощування у промислових умовах. І, відтак, цьоголітки цього масиву характеризуються середньою індивідуальною масою близько 100 г, що на 20% перевищило нормативні показники для цієї вікової категорії риб.

Слід відзначити і репродуктивний потенціал галицького масиву, який дозволяє при відтворенні у ставах з 1 гнізда отримувати 241 тис. екз. личинок, що на 17% перевищує нормативний показник. Співвідношення маси відібраної ікри до маси самиці зафіксовано на досить високому рівні — 18,5%. Об'єм еякуляту у самців склав 292,9 млрд спермій. Позитивна реакція самиць галицького коропа перевищила 90%, що слугуватиме основою для подальшої селекційної роботи з отримання малолускатих помісей.

Відповідно до отриманих даних, за екстер'єрними показниками галицький масив коропа характеризується високоспинною тілобудовою та м'ясистою структурою, яка зберігається впродовж всього життя.

З огляду на проведені дослідження, галицький масив коропа повністю відповідає вимогам «Положення про апробацію селекційних досягнень у тваринництві» і може бути представленим відповідним органам для розгляду та затвердження як внутрішньопорідний тип українських рамчатої та лускатої порід коропа.

ЛІТЕРАТУРА

1. Олексієнко О. О. Антонінсько-зозуленецький тип — структурна ланка українських порід коропа // Таврійський науковий вісник. 2004. Вип. 32. С. 157—163.
2. Białowas H., Szarowski L. Czy znamy historię, osiągnięcia i stan aktualny hodowli karpia w Polsce? // Przegląd Rybacki. 1998. № 1. С. 43—45.
3. Грициняк І. І. Наукове забезпечення розвитку аквакультури та підвищення ефективності використання водних біоресурсів внутрішніх водойм України // Рибогосподарська наука України. 2010. № 1. С. 4—13.
4. Guziur J., Białowas H., Milczarzewicz W. Ribactwo stawowe w stawach karpowych, urządzeniach pezemysłowych oraz małych zbiornikach śródlądowych. Warszawa, 2003. 300 с.
5. Międzynarodowa wystawa rybacka w Wiedniu // Okólnik Rybacki. 1903. № 64. S. 152—163.
6. Białowas H. Linie hodowlane Karpia w Polsce: Linia Polska nr 6 Gołyska // Przegląd Rybacki. 1998. № 2. S. 40—42.

7. Олексієнко О. О., Грициняк І. І. Внутрішньопорідна структура українських короїв // Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 21—27.
8. Марценюк В. П., Гуцол А. В. Породи та породні групи малолускатих короїв // Збірник наукових праць ВНАУ. 2013. Вип. 3(73). С. 95—102.
9. Каталог порід карпа (*Cyprinus carpio*) стран Центральной и Восточной Европы / ред. Богерук А. К. Москва, 2008. 174 с.
10. Алимов С. И. Рибне господарство України: стан і перспективи. Київ : Вища освіта, 2003. 336 с.
11. Олексієнко О. О., Бех В. В., Грициняк І. І. До питання апробації антонінсько-зозуленецьких короїв українських порід // Рибогосподарська наука України. 2015. № 4. С. 65—73.

REFERENCES

1. Oleksijenko, O. O. (2009). Antoninsjko-zozulenecjkyj typ – strukturna lanka ukrajinsjkykh porid koropa. *Tavrijsjkyj naukovyj visnyk*, 32, 157-163.
2. Białowas, H. & Szarowski L. (1998). Czy znamy historię, osiągnięcia i stan aktualny Hodowli Karpia w Polsce? *Przegląd Rybacki*, 1, 43-45.
3. Hrytsyniak, I. I. (2010). Naukove zabezpechennia rozvytku akvakultury ta pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia vodnykh bioresursiv vnutrishnykh vodoim Ukrainy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 4-13.
4. Guziur, J., Białowas, H., & Milczarzewicz, W. (2003) *Ribactwo stawowe w stawach karpowych, urzędzeniach pezemysłowych oraz małych zbiornikach śródlądowych*. Warszawa.
5. Międzynarodowa wystawa rybacka w Wiedniu (1903). *Okólnik Rybacki*, 64, 152-163.
6. Białowas, H. (1998). Linie hodowlane Karpia w Polsce: Linia Polska nr 6 Gołyska. *Przegląd Rybacki*, 2, 40-42.
7. Oleksijenko, O. O., & Hrytsyniak, I. I. (2007) Vnutrishnoporidna struktura ukrainskykh koropiv. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 1, 21-27.
8. Martseniuk, V. P., & Hutsol, A. V. (2013) Porody ta porodni hrupy maloluskatykh koropiv. *Zbirnyk naukovykh prats VNAU*, 3(73), 95-102.
9. Bogeruk, A. K. (Ed.). (2008) *Katalog porod karpa (Cyprinus carpio) stran Central'noj i Vostochnoj Evropy*. Moskva.
10. Alymov, S. Y. (2003). Rybne gospodarstvo Ukrainy: stan i perspektyvy. Kyiv : Vyshcha osvita.
11. Oleksijenko, O. O., Bekh, V. V., & Hrytsyniak, I. I. (2015). Do pyttannia aprobatsii antoninsko-zozulenetskykh koropiv ukrainskykh porid. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 4, 65-73.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ В ГОДІВЛІ КОРОПА ПРЕБІОТИКА НА ОСНОВІ МАНАНОВИХ ОЛІГОСАХАРИДІВ

О. П. Добрянська, olya_dobryanska@ukr.net, Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт Великий Любін

Мета. Аналіз продуктивних та економічних показників при вирощуванні дволіток коропа в результаті використання в годівлі пребіотика на основі мананових олігосахаридів (МОС).

Методика. Для проведення експериментальних досліджень використано чотири стави, два з яких дослідні та два контрольних, які зарибнено однорічками лускатого коропа середньою масою 76–77 г за густоти посадки 2200 екз./га. В годівлі коропа Досліді 1 і Контролю 1 використовували екструдований комбікорм з вмістом протеїну 24%, Досліді 2 і Контролю 2 — зерноsumіш з вмістом протеїну 19%. До раціону дослідних груп коропа впродовж всього вегетаційного періоду вводили пребіотик на основі МОС «Актіген» в кількості 0,05%. Забезпечено оптимальні умови вирощування коропа, при цьому здійснено контроль кисневого, гідрохімічного та гідробіологічного режимів у ставах за загальноприйнятими у рибництві методиками. Після облову ставів визначено рибогосподарські та економічні показники вирощування дволіток.

Результати. Встановлено, що основні гідрохімічні показники в усіх ставах знаходились у межах нормативних значень. Середньосезонні показники біомаси кормових організмів зоопланктону та зообентосу впродовж вегетаційного періоду практично не відрізнялися в експериментальних ставах та склали відповідно 10,33–16,23 г/м³ та 1,23–2,96 г/м³.

Виявлено позитивний вплив використання пребіотика на основі МОС в годівлі дволіток коропа. При згодовуванні у складі екструдованого комбікорму середня маса була більшою на 11,5%, а рибопродуктивність — на 22,7% щодо показників контрольної групи, при цьому витрати корму на вирощування були нижчими на 20%. При згодовуванні у складі зерноsumіші — на 12,9; 16,3 та 16,7% відповідно.

Прибуток в результаті використання в годівлі коропа пребіотика на основі МОС у складі екструдованого корму зріс щодо Контролю 1 на 43,3%, а у складі зерноsumіші — на 19,1% щодо Контролю 2.

Наукова новизна. Вперше здійснено порівняльний аналіз ефективності використання пребіотика на основі МОС у складі екструдованого корму та зерноsumіші з огляду на продуктивні та економічні показники.

Практична значимість. Одержані результати свідчать про доцільність та ефективність використання пребіотика на основі МОС в годівлі дволіток коропа. Введення експериментальної добавки до кормів різного складу сприяє отриманню додаткових приростів та підвищення економічної складової при вирощуванні коропа до товарних кондицій.

Ключові слова: короп, пребіотик, корм, продуктивність, ефективність, прибуток, гідрохімічні та гідробіологічні показники.

EFFICIENCY OF USE OF PREBIOTICS BASED ON MANANE OLIGOSACCHARIDES IN CARP FEEDING

O. Dobryanska, olya_dobryanska@ukr.net, Lviv Research Station of the Institute of Fisheries NAAS, Velykyj Lubin

Purpose. Analysis of productive and economic indicators in the cultivation of age-1+ carp as a result of the use of prebiotics based on mannan oligosaccharides (MOS) in feeding.

Methodology. Four ponds were used, two of which were experimental and two control ponds, which were stocked with age-1 scaly carp with an average weight of 76–77 g at a stocking density of 2200 specimens/ha. Fish of Experiment 1 and Control 1 were fed with extruded feed with a protein content of 23%, fish in Experiment 2 and Control 2 were fed with a grain mixture with a protein content of 19%. 0.05% prebiotic based on MOS "Actigen" was added to the diet of experimental groups of carp throughout the growing season. Optimal conditions for carp farming were ensured including control over oxygen, hydrochemical and hydrobiological regimes in ponds, which were measured according to the generally accepted methods in fish farming. Fishery and economic indicators of growing age-1+ were determined after harvesting fish in autumn.

Findings. Major hydrochemical parameters in all ponds were within the normative values. The average seasonal biomass of forage organisms of zooplankton and zoobenthos during the growing season did not differ in the experimental ponds and amounted to 10.33-16.23 g/m³ and 1.23-2.96 g/m³.

A positive effect of the use of prebiotics based on MOS in the feeding of age-1+ carp was established. When the prebiotic was given as a part of the extruded feed, the average weight of fish was higher by 11.5%, and fish productivity by 22.7% relative to the control group, while the cost of feed for cultivation was lower by 20%. When it was added to the grain mixture, these values were higher by 12.9%, 16.3% and 16.7%, respectively.

The profit, as a result of the use of the prebiotic based on MOS in the composition of the extruded feed increased by 43.3% compared to Control 1, and by 19.1% compared to Control 2 when it was added to the grain mixture.

Originality. For the first time, a comparative analysis of the effectiveness of the use of the prebiotic based on MOS in the composition of extruded feed and grain mixtures was performed taking into account productivity and economic indicators.

Practical value. The obtained results indicate the feasibility and effectiveness of the use of prebiotics based on MOS in the feeding of age-1+ carp. Introduction of experimental additives to feeds of different composition helps to obtain additional growth and increase the economic component in the cultivation of carp to marketable condition.

Key words: carp, prebiotic, feed, productivity, efficiency, profit hydrochemical and hydrobiological indicators.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОРМЛЕНИИ КАРПА ПРЕБИОТИКА НА ОСНОВЕ МАННАНОВЫХ ОЛИГОСАХАРИДОВ

О. П. Добрянская, olya_dobryanska@ukr.net, Львовская опытная станция ИРХ НААН, пгт Великий Любень

Цель. Анализ продуктивных и экономических показателей при выращивании двухлеток карпа в результате использования в кормлении пребиотика на основе маннанных олигосахаридов (МОС).

Методика. Для проведения экспериментальных исследований использовано четыре пруда, два из которых опытные и два контрольных, зарыбленные годовиками чешуйчатого карпа средней массой 76–77 г при плотности посадки 2200 экз./га. В кормлении карпа Опыта 1 и Контроля 1 использовали экструдированный комбикорм с содержанием протеина 23%; Опыта 2 и Контроля 2 — зерносмесь с содержанием протеина на уровне 19%. В рацион

опытных групп карпа в течение всего вегетационного периода вводили пребиотик на основе МОС «Актиген» в количестве 0,05%. Обеспечено оптимальные условия выращивания карпа, при этом осуществлен контроль кислородного, гидрохимического и гидробиологического режимов в прудах по общепринятым в рыбоводстве методикам. После облова прудов определены рыбохозяйственные и экономические показатели выращивания двухлеток.

Результаты. Определено, что основные гидрохимические показатели во всех прудах находились в пределах нормативных значений. Среднесезонные показатели биомассы кормовых организмов зоопланктона и зообентоса в течение вегетационного периода практически не отличались в экспериментальных прудах и составили соответственно 10,33–16,23 г/м³ и 1,23–2,96 г/м³.

Выявлено положительное влияние использования пребиотика на основе МОС в кормлении двухлеток карпа. При скормливания в составе экструдированного комбикорма средняя масса была больше на 11,5%, а рыбопродуктивность на 22,7% сравнительно с показателями контрольной группы, при этом затраты корма на выращивание были ниже на 20%. При скормливания в составе зерносмеси — на 12,9, 16,3 и 16,7% соответственно.

Прибыль, в результате использования в кормлении карпа пребиотика на основе МОС в составе экструдированного корма возросла по сравнению с Контролем 1 на 43,3%, а в составе зерносмеси — на 19,1% по отношению к Контролю 2.

Научная новизна. Впервые осуществлен сравнительный анализ эффективности использования пребиотика на основе МОС в составе экструдированного корма и зерносмеси, учитывая продуктивные и экономические показатели.

Практическая значимость. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности и эффективности использования пребиотика на основе МОС в кормлении двухлеток карпа. Введение экспериментальной добавки к кормам различного состава способствует получению дополнительных приростов и повышение экономической составляющей при выращивании карпа до товарных кондиций.

Ключевые слова: карп, пребиотик, корм, производительность, эффективность, прибыль гидрохимические и гидробиологические показатели.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Глобальний розвиток аквакультури є динамічним, а це, у свою чергу, зумовлює пошук засобів та методів інтенсифікації виробництва рибної продукції [1]. Зокрема, розроблення способів зниження собівартості продукції, підвищення продуктивності та рентабельності виробництва за рахунок оптимізації годівлі є одним із пріоритетних завдань, адже витрати на штучні корми складають основу усіх витрат в аквакультурі [2].

В Україні головним об'єктом аквакультури є короп. Основу раціону коропа при вирощуванні до товарних кондицій складають злакові компоненти, рівень перетравності та поживна цінність яких є низькими. Це не забезпечує повною мірою біологічних потреб коропа, а, відповідно, і оптимальних приростів, рівня виживання та функціонального стану органів і систем організму. Відповідно, економічна складова рибогосподарської діяльності безпосередньо залежить від повноцінної годівлі [2, 3]. Тому доцільним є застосування в годівлі коропа компонентів та добавок, які позитивно впливають на перетравлення та засвоєння поживних речовин штучних кормів [4, 5]. Останні, здатні прямо чи побічно впливати на мікрофлору кишечника, функціональний стан організму загалом, покращувати перетравність поживних речовин корму, збільшуючи тим самим рыбопродуктивність та рівень виживання об'єктів аквакультури [6].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРИШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

У цьому контексті особливої уваги заслуговують пребіотики на основі мананових олігосахаридів (МОС), які чинять позитивний вплив на активність ферментів захисної мікрофлори кишечника та імунну систему риб, що веде до підвищення продуктивних показників та конверсії штучних кормів [7]. Основна перевага цих складних вуглеводів полягає в їх здатності адсорбувати бактерії певних штамів, які мають фімбрії типу I (розпізнають манозу). Більшість кишкових патогенів мають фімбрії типу I. Таким чином, включення до раціону МОС може запобігти колонізації кишечника певними патогенними мікроорганізмами [8].

Однією з таких добавок є пребіотик нового покоління на основі МОС «Актиген» («Alltech Inc.», США). Низкою дослідників встановлено ефективність використання даного пребіотика у тваринництві [5, 8, 9], зокрема у рибництві. Так, дослідженнями встановлено позитивний вплив пребіотика на рівень виживання, збільшення продуктивності, покращення конверсії корму та показників неспецифічного імунітету сома [10], а також зростання темпів росту та коефіцієнта перетравності корму нільської тиляпії [11], морського окуня [12] та сибірського осетра [13]. Проте, відсутні наукові дослідження ефективності застосування даного пребіотика при вирощуванні коропа.

Метою роботи було дослідження ефективності використання в годівлі дволіток коропа пребіотика на основі МОС, з огляду на продуктивні показники та економічну складову вирощування.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проведено у 2020 р. на базі рибного господарства ТЗОВ «Карпатський водограй» Пустомитівського району Львівської області в умовах ставів площею 0,50–0,82 га з одним джерелом водопостачання.

Для виконання завдання використано 4 стави, які зариблено однорічками лускатого коропа середньою масою 76–77 г, за густоти посадки 2200 екз./га. Коропам Досліді 1 і Контролю 1 згодовували екструдований комбікорм із вмістом протеїну 24%, до складу якого входили, %: 50 — пшениця, 30 — соняшниковий шрот, 10 — м'ясо-кісткове борошно, 9 — ячмінні висівки, 1 — крейда. Коропам Досліді 2 і Контролю 2 — зерноsumіш із вмістом протеїну на рівні 19%, до складу якої входили, %: 40 — пшениця, 30 — ячмінні висівки, 20 — соняшниковий шрот, 10 — кукурудза. Штучні корми згодовували риbam один раз на добу впродовж 90 діб. У якості експериментальної добавки використовували пребіотик на основі МОС «Актиген» («Alltech Inc.», США), яку додавали в кількості 0,05% до корму коропа дослідних груп.

У ході експериментальних робіт забезпечено аналогічні оптимальні умови утримання риб та середовища вирощування. Відбір проб води для хімічного аналізу здійснювали раз на місяць, опрацьовували, користуючись загальноприйнятими методиками [14]. Відповідність результатів аналізів оцінювали за державним стандартом СОУ 05.01–37–385:2013 [15]. Визначення вмісту розчиненого у воді кисню проводили подекадно за методом Вінклера [16].

Відбір та обробку гідробіологічних проб здійснювали за методиками, описаними С. А. Кражан [17]. Якісний склад зоопланктону встановлювали за допомогою визначників [18], біомасу зоопланктонних безхребетних у воді ставів, яку відціджували за допомогою планктонної сітки Апштейна [17], та біомасу зообентосу визначали за таблицями індивідуальних мас організмів [19].

Годівлю коропа здійснювали за схемами нормованої годівлі. Після закінчення досліду визначали відсоток виходу риби з вирощування, її середню масу, показники рибопродуктивності та витрат кормів на вирощування [20]. Коефіцієнт конверсії корму обчислювали за відношенням кількості витрачених кормів до різниці між кінцевою та початковою загальними масами риби [21].

Розрахунки ефективності використання пребіотика здійснювали, застосовуючи загальноприйняті економічні методи обчислень та оцінки. При розрахунку собівартості вирощеної рибної продукції враховували витрати на корми, посадковий матеріал та оплату праці. Собівартість кілограма вирощеної продукції розраховували як відношення загальних витрат на виробництво до маси вирощеної за сезон риби.

Прибуток від вирощування обчислювали за різницею між ринковою вартістю вирощеної продукції та загальними виробничими витратами, враховуючи площу дослідних ставів [22].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Знання фізико-хімічних властивостей водного середовища є однією з важливих складових для успішного вирощування об'єктів аквакультури [14].

Впродовж вегетаційного періоду в результаті проведення хімічного складу води експериментальних ставів встановлено, що активна реакція водного середовища (рН) була слаболужною, її значення були оптимальними [15] та коливались у межах рН 7,1–8,4. Слід зауважити, що в усіх ставах не відбувалось накопичення легкоокиснюваних органічних сполук, значення перманганатної окиснюваності знаходилось в межах 7,9–19,2 мг О₂/дм³, з максимальним показником у ставу Досліду 1 в середині літа, в період високих показників температури води. Лужність ставової води, а, відповідно, вміст гідрокарбонатів, незначно зростали від весни до осені. Концентрація іонів Ca²⁺ набувала високих значень, коливаючись від 54,0 до 61,0 мг/дм³, що позитивно впливало на санітарний стан вирощувальних ставів. Мінеральний фосфор, як один із важливих біогенних елементів, був присутній в усіх ставах на початку сезону в достатній кількості з максимальною концентрацією в ставу Досліду 1 (0,46 мг Р/дм³). Нітриту, нітрату, хлориду та амонійний азот були присутні у воді в кількостях, що не перевищують нормативні значення (НЗ). Концентрація сульфатів у воді усіх ставів була високою, що пояснюється якістю джерела водопостачання.

У середньому за сезон вміст розчиненого у воді кисню коливався у межах 4,0–8,0 мг О₂/дм³.

Отже, суттєвих відмінностей гідрохімічного режиму експериментальних ставів не відмічено. Основні показники якості ставової води відповідали НЗ [15] для вирощування коропа в умовах ставів.

Таблиця 1. Хімічний склад води дослідних ставів, максимальне – мінімальне / середнє значення

Table 1. Chemical composition of water in experimental ponds, min–max / average

Досліджувані показники/ Researched indicators	Контроль 1 / Control 1	Дослід 1 / Experiment 1	Контроль 2 / Control 2	Дослід 2 / Experiment 2	НЗ / SV[15]
pH	<u>7,4–8,3</u> 7,7	<u>7,3–8,4</u> 7,7	<u>7,2–8,2</u> 7,5	<u>7,1–8,3</u> 7,6	7,0–8,5
Перманганатна окиснюваність, мг О/дм ³ / Permanganate oxygen consumed, mg O ₂ /dm ³	<u>8,2–13,7</u> 10,6	<u>7,9–19,2</u> 11,8	<u>8,9–13,2</u> 11,5	<u>8,5–12,4</u> 10,8	15
Лужність, мг-екв/дм ³ / Alkaline hardness, mg-equiv/dm ³	<u>3,0–3,7</u> 3,4	<u>3,4–3,8</u> 3,6	<u>3,3–3,9</u> 3,7	<u>3,2–4,0</u> 3,8	3,0–6,0
HCO ₃ ⁻ , мг/дм ³ / mg/dm ³	<u>183,0–225,7</u> 207,4	<u>207,4–231,8</u> 219,6	<u>201,3–237,9</u> 229,5	<u>195,2–244,0</u> 226,3	300–400
NO ₂ ⁻ , мг N/дм ³ / mg N/dm ³	<u>0,00–0,06</u> 0,04	<u>0,01–0,05</u> 0,05	<u>0,00–0,06</u> 0,04	<u>0,00–0,04</u> 0,03	0,1
NH ₄ ⁺ , мг N/дм ³ / mg N/dm ³	<u>0,01–0,21</u> 0,10	<u>0,01–0,24</u> 0,10	<u>0,04–0,28</u> 0,18	<u>0,02–0,29</u> 0,17	2,0
NO ₃ ⁻ , мг N/ дм ³ / mg N/dm ³	<u>0,00–0,37</u> 0,20	<u>0,00–0,60</u> 0,32	<u>0,00–0,30</u> 0,26	<u>0,00–0,31</u> 0,24	≤2,0
PO ₄ ³⁻ , мг P/дм ³ / mg P/dm ³	<u>0,07–0,36</u> 0,23	<u>0,18–0,46</u> 0,31	<u>0,16–0,38</u> 0,29	<u>0,12–0,35</u> 0,26	0,7
Fe, мг/дм ³ / mg/dm ³	<u>0,21–0,32</u> 0,26	<u>0,23–0,34</u> 0,28	<u>0,22–0,35</u> 0,29	<u>0,21–0,36</u> 0,30	1,0
Твердість заг., мг-екв./дм ³ / Total hardness, mg-equiv/dm ³	<u>3,4–3,9</u> 3,7	<u>3,2–3,8</u> 3,5	<u>3,6–3,9</u> 3,5	<u>3,5–3,9</u> 3,6	3–7
Ca ²⁺ , мг/дм ³ / mg/dm ³	<u>57,6–60,2</u> 59,1	<u>54,0–58,0</u> 56,0	<u>55,0–60,0</u> 57,0	<u>56,0–61,0</u> 58,3	50–60
Mg ²⁺ , мг/дм ³ / mg/dm ³	<u>6,3–10,9</u> 8,9	<u>4,9–10,9</u> 8,5	<u>6,0–9,4</u> 7,1	<u>6,1–9,7</u> 7,9	30,0
Cl ⁻ , мг/дм ³ / mg/dm ³	<u>19,4–20,2</u> 19,9	<u>20,8–22,0</u> 21,3	<u>20,0–21,1</u> 20,2	<u>20,3–21,9</u> 21,1	50–70
SO ₄ ²⁻ , мг/дм ³ / mg/dm ³	<u>104,0–108,2</u> 106,1	<u>105,0–110,0</u> 107,7	<u>106,0–112,0</u> 106,2	<u>108,0–115,0</u> 107,6	50–70
Σ K ⁺ , Na ⁺ , мг/дм ³ / mg/dm ³	<u>50,0–75,0</u> 65,7	<u>70,0–78,0</u> 74,3	<u>56,4–74,2</u> 69,2	<u>55,6–73,3</u> 68,3	50
Мінералізація, мг/дм ³ / Mineralization, mg/dm ³	<u>432,3–493,2</u> 467,9	<u>476,6–497,5</u> 487,2	<u>460,0–535,8</u> 498,0	<u>453,0–587,4</u> 492,3	1000
Розчинений кисень, мг O ₂ /дм ³ / Dissolved Oxygen, mg O ₂ /dm ³	<u>4,0–7,2</u> 6,0	<u>4,4–7,6</u> 5,8	<u>4,3–7,8</u> 6,5	<u>4,9–8,0</u> 6,3	≥6

Зоопланктон дослідних ставів був представлений організмами трьох систематичних груп: тип нижчі черви Rotifera, ракоподібні підряду Cladocera та ряду Copepoda. Також розвивалися коловертки родів *Brachionus*, *Asplanchna*, *Filinia*. Гіллястовусі ракоподібні були представлені видами роду *Moina*, *Cladocera*, *Ceriodaphnia*, *Polyphemus*, *Bosmina*, *Chydorus*, зустрічались веслоногої ракоподібні родів *Cyclops*, *Acanthocyclops*, *Mesocyclops*.

Показники розвитку зоопланктону впродовж вегетаційного сезону у контрольних ставах 1 та 2 перебували в межах 432,0–542,0 тис. екз./м³ за чисельністю та 10,33–12,82 г/м³ за біомасою та 492,0–603,0 тис. екз./м³ за чисельністю і 12,58–14,35 г/м³ за біомасою, відповідно (табл. 2). У ставу Дослід 1 — 451,0–556,0 тис. екз./м³ та 10,60–13,36 г/м³; у ставу Дослід 2 — 467,3–585,0 тис. екз./м³ та 11,54–16,23 г/м³ відповідно.

Загалом, розвиток зоопланктону був оптимальним і характеризувався середніми показниками для рибиницької зони Полісся.

Таблиця 2. Динаміка розвитку зоопланктону у дослідних ставах, чисельність (тис. екз./м³) / біомаса (г/м³)

Table 2. Dynamics of zooplankton development in experimental ponds, (thousand specimen / m³) / biomass (g / m³)

Група риб / Group of fish	Період вегетаційного сезону, місяць / Season of the growing, month			Середнє значення / Average value
	червень / june	липень / july	серпень / august	
Контроль 1/ Control 1	432,0	536,8	542,0	503,6
	10,33	11,67	12,82	11,61
Дослід 1/ Experiment 1	451,0	556,0	515,0	507,3
	10,60	12,78	13,36	12,25
Контроль 2/ Control 2	492,0	603,0	505,8	533,6
	13,89	14,35	12,58	13,61
Дослід 2/ Experiment 2	467,3	495,6	585,0	515,9
	11,54	12,15	16,23	13,31

Бентофауна експериментальних ставів була представлена личинками двокрилих із родини дзвінцевих — Chironomidae (ряд *Diptera*), в незначній кількості зустрічались малоштиткові черви — Oligochaetae.

Спостерігалось зменшення кількісних показників чисельності та біомаси зообентосу впродовж сезону вирощування, що пов'язано із активним виїданням їх коропом (табл. 3). Середньосезонні показники чисельності та біомаси зообентосу у ставу Контролю 1 перебували на рівні 211,2 екз./м² та 2,31 г/м², ставу Контролю 2 — 202,5 екз./м² та 2,00 г/м², Дослід 1 — 186,0 екз./м² та 2,10 г/м², а у ставу Дослід 2 — 204,1 екз./м² та 2,26 г/м² відповідно.

Після обловів ставів проведено аналіз отриманих рибогосподарських показників (табл. 4), за якими встановлено, що середня маса дволіток коропа Дослід 1 на 11,5%, Дослід 2 — на 12,9% були вищими у порівнянні з Контролем. Відповідно, рибопродуктивність ставів Дослід 1 та Дослід 2 була на 22,7 та 16,3% вищою, ніж ставу Контролю.

Коефіцієнти конверсії корму в Досліді 1 на 20,0% та Досліді 2 — на 16,7% були нижчими ніж у Контролі.

Таблиця 3. Динаміка розвитку зообентосу у дослідних ставах, чисельність (екз./м²) / біомаса (г/м²)

Table 3. Dynamics of development of zoobenthos in flow-out ponds (specimen / m²) / biomass (g/m²)

Група риб / Group of fish	Період вегетаційного сезону, місяць / Season of the growing, month			Середні значення / Average values
	червень / june	липень / july	серпень / august	
Контроль 1/ Control 1	<u>349,8</u>	<u>184,9</u>	<u>98,9</u>	<u>211,2</u>
	2,94	2,15	1,85	2,31
Дослід 1 / Experiment 1	<u>323,7</u>	<u>149,8</u>	<u>84,5</u>	<u>186,0</u>
	2,80	2,26	1,23	2,10
Контроль 2/ Control 2	<u>342,8</u>	<u>174,9</u>	<u>89,9</u>	<u>202,5</u>
	2,14	2,54	1,32	2,00
Дослід 2 / Experiment 2	<u>353,2</u>	<u>159,6</u>	<u>99,6</u>	<u>204,1</u>
	2,32	2,96	1,52	2,26

Таблиця 4. Результати вирощування дволіток коропа за використання у складі корму пребіотика на основі МОС

Table 4. The results of growing two-year-old carp for use in the feed of prebiotics based on MOS

Показники / Indices		Кон-троль 1 / Control 1	Дослід 1 / Experiment 1	Кон-троль 2 / Control 2	Дослід 2 / Experiment 2
Площа ставу, га / pond area, ha		0,82	0,53	0,50	0,52
Посаджено на вирощування / Stocking for cultivation	всього, екз. / total, specimen	1804	1166	1124	1134
	сер. маса, г / average weight, g	77	77	76	76
	заг. маса, кг / total weight, kg	139	89,8	85,4	86,2
	вихід, % / yield, %	91,9	89,2	88,0	91,0
	всього, екз. / total, specimen	1658	1145	989	1032
Виловлено / Fish out	сер. маса, г / average weight, g	540	602	480	542
	заг. маса, кг / total weight, kg	895,3	689,3	474,7	557,3
	Рибопрод., кг/га / fish productivity kg/ha	922	1131	779	906
Згодовано корму / Fed feed	кг / kg	2641	1706	1623	1638
Коефіцієнт конверсії корму / Feed conversion factor	од. / units	3,5	2,8	4,2	3,5

Таблиця 5. Економічна ефективність застосування пребіотики на основі МОС у кормах різного складу при вирощуванні дволіток коропа

Table 5. Economic efficiency of the use of prebiotics based on MOS in feeds of different composition in the cultivation of biennial carp

Досліджувані показники / Researched indicators	Контроль 1 / Control 1	Дослід 1 / Experiment 1	Контроль 2 / Control 2	Дослід 2 / Experiment 2
Площа ставу, га / Pond area, ha	0,82	0,53	0,50	0,52
Вирощено коропа, кг / Grown carp, kg	895,3	689,3	474,7	557,3
Витрати на комбікорм / корм*, грн / The cost of feed*, UAH	25090	16199	8113	8184
Актиген / Actigen	-	273	-	262
Всього / Total	25090	16472	8113	8446
Витрати на посадковий матеріал, грн ** / The cost of carp stocking material**, UAH	8340	5388	5172	5124
Інші витрати***, грн / Other expenses***, UAH	41	26,5	25	26
Ринкова вартість вирощеної продукції**, грн / Market price grown products**, UAH	58194,5	44804,5	31577	36224,5
Прибуток, грн/га / Profit, UAH/kg	30151	43242	36534	43516
Прибуток відносно Контролю, % / Profit relative to Control, %	-	43,3	-	19,1

Примітка. * — ціна комбікорму — 9,5 грн/кг, зерноsumіші — 5,0 грн/кг, пребіотики — 320 грн/кг, ** — ціна посадкового матеріалу — 60 грн/кг, дволіток коропа — 65 грн/кг, *** — загальновиробничі витрати господарства — 50 грн/га.

Note. * — the price of compound feed — 9.5 UAH / kg, the price of a grain mix — 5,0 UAH/kg, prebiotic — 320 UAH/kg, ** — carp planting material — 60 UAH/kg, biennial carp — 65 UAH / kg, *** — overhead costs of the economy — 50 UAH/kg.

Враховуючи вартість пребіотичного препарату, посадкового матеріалу, витрачених кормів на вирощування, витрати електроенергії та оплату праці, отримано прибуток від вирощування коропа при згодовуванні пребіотики в складі екструдованого комбікорму — 43242 грн/га, що більше на 43,3%, порівняно з Контролем. При застосуванні зерноsumіші прибуток від вирощування коропа склав 43516 грн/га, що більше на 19,1%, ніж у Контролі.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Встановлено, що основні гідрохімічні показники середовища вирощування дволіток коропа знаходились в межах НЗ. Показники розвитку зоопланктону та зообентосу за кількістю і біомасою в середньому за сезон були на задовільному рівні для забезпечення коропа природним кормом і практично не відрізнялися в усіх експериментальних ставах. За результатами досліджень двох експериментальних груп встановлено покращення рибогосподарських показників,

що, в свою чергу, позитивно вплинуло на економічну складову вирощування. Відповідно, отримані результати свідчать про ефективність використання пребіотика на основі МОС в кількості 0,05% за різного складу раціону дволіток коропа впродовж вегетаційного періоду.

ЛІТЕРАТУРА

1. World Bank. Fish to 2030: Prospects for Fisheries and Aquaculture. Washington, DC : World Bank; 2013.
2. Годівля риб / Шерман І. М. та ін. Київ : Вища освіта, 2001. 268 с.
3. Грициняк І. І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб. Київ : Рибка моя, 2007. 306 с.
4. Бурлака В. А., Меленівський О. М. Динаміка затрат корму при вирощуванні цьоголіток коропа // Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2016. Т. 4, № 1. С. 56—60.
5. Чернікова Г., Прокопенко Н. Забійні якості курчат-бройлерів за використання пребіотичного препарату // Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality. 2017. № 1. Р. 50—53. doi:10.15414/agrobiodiversity.2017.2585-8246.50-53.
6. Probiotics and prebiotics associated in aquaculture: a review / Akhter N. et al. // Fish Shellfish Immunol. 2015. Vol. 45. P. 733—741. <https://doi.org/10.1016/j.fsi.2015.05.038>.
7. Single or combined effects of fructo- and mannan oligosaccharide supplements and *Bacillus clausii* on the growth, feed utilization, body composition, digestive enzyme activity, innate immune response and lipid metabolism of the Japanese flounder *Paralichthys olivaceus* / Ye, J. D. et al. // Aquaculture Nutrition. 2011. Vol. 17(4). e902-e911. doi: 10.1111/j.1365-2095.2011.00863.x.
8. A review of 733 published trials on Bio-Mos®, a mannan oligosaccharide, and Actigen®, a second generation mannose rich fraction, on farm and companion animals / Spring P. et al. // Journal of Applied Animal Nutrition. 2015. Vol. 3. P. 1—11. doi:10.1017/jan.2015.6.
9. Mannan oligosaccharide increases serum concentrations of antibodies and inflammatory mediators in weanling pigs experimentally infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus / Che T. M. et al. // Journal of Animal Science. 2012. Vol. 90. P. 2784—2793.
10. Hung L. T. Building new aquafeeds: Feeding for health and performance in Tra catfish (*Pangasiaodon hypophthalmus*) // Science and Technology in the Feed Industry: Alltech's 28th Annual International symposium, May 20-23, (conclusion of posters presented). Lexington, Kentucky, USA, 2012.
11. Mohsen Abdel-Tawwab. Interactive effects of dietary protein and live bakery yeast, *Saccharomyces cerevisiae* on growth performance of Nile tilapia, *Oreochromis niloticus* (L.) fry and their challenge against *Aeromonas hydrophila* infection // Aquacult Int. 2012. Vol. 20. P. 317—331.
12. Immune stimulation and improved infection resistance in European sea bass (*Dicentrarchus labrax*) fed mannan oligosaccharides / Torrecillas S. et al. // Fish Shellfish Immunol. 2007. Vol. 23. P. 969—981.
13. Sverinciuc C., Bențea M. I., Sara A. The effects of some fodder additives on growth performance of Siberian sturgeon (*Acipenser baeri*) // Agriculture Science and

- Practice. 2017. No. 1–2(101–102). P. 105—109.
14. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеиздат, 1970. 412 с.
15. СОУ 05.01–37–385:2006. Вода рыбогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2013. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
16. Привезенцев Ю. А. Указания по определению качества воды в рыбоводных прудах. Москва : Колос, 1971. 18 с.
17. Кражан С. А., Хижняк М. І. Природна кормова база рыбогосподарських водойм : навчальний посібник. Київ : Аграрна освіта, 2014. 333 с.
18. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. ; ред. Романенко В. Д. Київ : Логос, 2006. 408 с.
19. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон и бентос) / ред. Кутикова Л. А., Старобогатов Я. И. Ленинград : Гидрометеиздат, 1977. 512 с.
20. Желтов Ю. О. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб // Рибне господарство. 2003. Вип. 62. С. 23—28.
21. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. Т. 1. Москва : Агропромиздат, 1986. 259 с.
22. Вдовенко Н. М. Економіка рыбогосподарських підприємств: підручник. Київ : Кондор, 2017. 212 с.

REFERENCES

1. World Bank (2013). *Fish to 2030: Prospects for Fisheries and Aquaculture*. Washington, DC: World Bank.
2. Sherman, I. M., et al. (2001). *Feeding fish*. Kyiv: Higher Education.
3. Hrytsyniak, I. I. (2007). *Scientific and practical bases of rational feeding of fish*. Kyiv: Rybka moja.
4. Burlaka, V. A., & Melenovsky, O. M. (2016). Dynamics of feed costs in the cultivation of carp this year. *Scientific and Technical Bulletin of the Research Center for Biosafety and Environmental Control of Agricultural Resources of Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University*, 4(1), 56-60.
5. Chernikova, G., & Procopenko, N. (2017). Slaughter quality of broiler-chickens by prebiotic Actigen using. *Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality*, 1, 50-53. doi:10.15414/agrobiodiversity.2017.2585-8246.50-53.
6. Akhter, N., Wu, B., Memon, A. M., & Mohsin, M. (2015). Probiotics and prebiotics associated in aquaculture: a review. *Fish Shellfish Immunol*, 45, 733-741. <https://doi.org/10.1016/j.fsi.2015.05.038>.
7. Ye, J. D., Wang, K., Li, F. D., & Sun, Y. Z. (2011). Single or combined effects of fructo-and mannan oligosaccharide supplements and *Bacillus clausii* on the growth, feed utilization, body composition, digestive enzyme activity, innate immune response and lipid metabolism of the Japanese flounder *Paralichthys olivaceus*. *Aquaculture Nutrition*, 17(4), e902-e911. doi: 10.1111/j.1365- 2095.2011.00863.x.
8. Spring, P., Wenk, C., Connolly, A., & Kiers, A. (2015). A review of 733 published trials on Bio-Mos®, a mannan oligosaccharide, and Actigen®, a second generation mannose rich fraction, on farm and companion animals. *Journal of Applied Animal Nutrition*, 3, 1-11. doi:10.1017/jan.2015.6.
9. Che, T. M., Song, M., Liu, Y., Johnson, R. W., Kelley, K. W., Van Alstine, W. G., Dawson, K. A., & Pettigrew, J. E. (2012). Mannan oligosaccharide increases serum

- concentrations of antibodies and inflammatory mediators in weanling pigs experimentally infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus. *Journal of Animal Science*, 90, 2784-2793.
10. Hung, L. T. (2012). Building new aquafeeds: Feeding for health and performance in Tra catfish (*Pangasiao don hypophthalmus*). *Science and Technology in the Feed Industry: Alltech's 28th Annual International symposium, May 20-23, (conclusion of posters presented)*. Lexington, Kentucky, USA.
  11. Mohsen, Abdel-Tawwab (2012). Interactive effects of dietary protein and live bakery yeast, *Saccharomyces cerevisiae* on growth performance of Nile tilapia, *Oreochromis niloticus* (L.) fry and their challenge against *Aeromonas hydrophila* infection, *Aquacult Int.*, 20, 317-331.
  12. Torrecillas, S., Makol, A., Caballero, M. J., Montero, D., & Robaina, L. et al., (2007). Immune stimulation and improved infection resistance in European sea bass (*Dicentrarchus labrax*) fed mannan oligosaccharides. *Fish Shellfish Immunol.*, 23, 969-981.
  13. Sverinciu, C., Bențea, M. I., & Sara, A. (2017). The effects of some fodder additives on growth performance of Siberian sturgeon (*Acipenser baeri*). *Agriculture Science and Practice*, 1-2(101-102), 105-109.
  14. Alekin, O. A. (1970). *Osnovy gidrohimii*. Leningrad: Gidrometeoizdat.
  15. Voda rybohospodarskykh pidpriemstv. Zahalni vymohy ta normy (2013). *SOU 05.01–37–385:2006*. Standart Minahropolityky Ukrainy. Kyiv: Ministerstvo aharnoi polityky Ukrainy.
  16. Privezentsev, Yu. A. (1971). *Instructions for determining the quality of water in fish ponds*. Moskva: Kolos.
  17. Krazhan, S. A., Khyzhnyak, M. I. (2014). *Natural fodder base of fishery reservoirs: a textbook*. Kyiv: Aharna nauka.
  18. Arsan, O. M., Davydov, O. Ya., Diachenko, T. M., Yevtushenko, M. Yu., & Zhukynskyi, V. M. (2006). *Metody hidroekologichnykh doslidzen poverkhnevyykh vod*. Romanenko, V. D. (Ed.). Kyiv: Lohos.
  19. Kutikova, L. A., & Starobogatov, Ya. I. (Eds.). (1977). *Opredelitel presnovodnykh bespozvonochnykh Evropeyskoy chasti SSSR (plankton i bentos)*. Leningrad: Gidrometeoizdat.
  20. Zheltov, Yu. O. (2003). Metodychni vказivky z provedennia doslidiv po hodivli ryb. *Rybne hospodarstvo*, 62, 23-28.
  21. Sbornik normativno-tehnologicheskoy dokumentatsii po tovarnomu rybovodstvu. (1986). Vol. 1. Moskva: Agropromizdat.
  22. Vdovenko, N. M. (2017). *Economics of fisheries: a textbook*. Kyiv: Condor Publishing House.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ В ГОДІВЛІ КОРОПА СОРБЕНТУ У СКЛАДІ КОРМУ З ОЗНАКАМИ КОНТАМІНУВАННЯ МІКОТОКСИНАМИ

О. В. Дерень, derenj@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Ю. Сироватка, natysik_2g2@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН,
м. Київ
М. З. Кориляк, stasiv8@gmail.com, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. П. Добрянська, olya_dobryanska@ukr.net, Львівська дослідна станція Інституту
рибного господарства НААН, смт Великий Любін

Мета. Метою роботи було дослідження окремих морфо-фізіологічних показників коропа в результаті додаткового введення сорбенту мікотоксинів до корму з ознаками псування.

Методика. Впродовж 2019–2020 рр. проведено два експерименти в лабораторних умовах. У першому сформовано 7 груп-аналогів однорічок нивківського коропа, по 20 екз. у кожній, середньою масою 22,5 г. Контрольній групі риб протягом 24 днів згодовували комбікорм з ознаками псування, до раціону дослідних груп додатково вводили препарат «Мікосорб» в кількості, відповідно, 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 та 0,40%. У другому експерименті — 4 групи однорічок коропа, по 12 екз. у кожній, середньою масою 20,0 г. Раціон контрольної групи був ідентичним першому експерименту, а дослідних груп — з добавкою 0,050; 0,075 та 0,100% «Мікосорбу» відповідно. Впродовж досліджень забезпечено оптимальні умови утримання риб. Після вилову однорічок вивчали розмірно-вагові показники, аналізували приріст маси за загальноприйнятими у рибництві методиками. Вивчали активність антиоксидантних ензимів та уміст продуктів перекисного окиснення ліпідів в залежності від складу раціону.

Результати. У дослідженнях використано комбікорм з ознаками псування в результаті порушення технології зберігання, у якому виявлено три групи токсинів: Афлатоксин В1, Зеараленон та Дезоксиніваленон.

В результаті першого етапу досліджень визначено норми введення до раціону коропа сорбенту мікотоксинів у кількості 0,05–0,20%. При цьому не встановлено чіткої пропорційної закономірності зміни середньої маси риб в залежності від кількості введення «Мікосорбу», показник зріс в усіх дослідних групах у порівнянні з контрольною на 0,4–15,2%. У м'язах однорічок встановлено вищу ($p < 0,001$) активність каталази за введення 0,15% досліджуваного препарату у 1,4 раза, 0,20% — на 46%, 0,25% — на 69 та 0,40% — на 79%. Активність супероксиддисмутази теж зростала, окрім груп за введення 0,20; 0,25 та 0,40% «Мікосорбу». Відмічено тенденцію до зниження на 21,0 та 22,6% вмісту дієнових кон'югатів в результаті згодовування 0,05 та 0,10 сорбенту та деяке підвищення в результаті згодовування 0,15; 0,20; 0,25 та 0,40% добавки.

Дослідженнями наступного етапу встановлено, що за згодовування у складі корму «Мікосорбу» з розрахунку 0,050; 0,075 та 0,100%, середня маса однорічок коропа у дослідних

© О. В. Дерень, Н. Ю. Сироватка, М. З. Кориляк, О. П. Добрянська, 2021

групах зросла відповідно на 45,4; 37,2 та 30,3%, коефіцієнт вгодованості риб — на 41,9; 40,8 та 42,7%, показник відносного приросту — у 4,3; 5,9 та 4,6 рази відповідно. Індекс високоспинності був нижчим на 10,3; 7,0 та 7,4% щодо показників контрольної групи. За додаткового згодовування 0,050; 0,075 та 0,100% «Мікосорбу», підвищилась опірність організму риб, з огляду на зростання у гепатопанкреасі активності антиоксидантних ензимів: супероксиддисмутази на 28,3; 30,5 і 5,0% та каталази на 56,5 ($p<0,001$); 55,5 ($p<0,001$) та 46,3% ($p<0,05$). При цьому за згодовування 0,05 та 0,10% «Мікосорбу» відмічено збільшення вмісту дієнових кон'югатів відповідно на 11,3 ($p<0,01$) та 12,3% ($p<0,01$), а також ТБК-активних продуктів — на 19,7 ($p<0,05$) та 13,2%.

Наукова новизна. Вперше досліджено доцільність введення сорбенту мікотоксинів «Мікосорб» до складу коропового корму з ознаками псування. Здійснено аналіз впливу згодовування раціону різного складу на окремі морфо-фізіологічні показники коропа в умовах модельних випробувань.

Практична значимість. Отримано додаткові прирости та покращення показників системи антиоксидантного захисту організму коропа. Використання в годівлі коропа препарату «Мікосорб» дозволяє зменшити негативний вплив на організм риб кормів низької якості, що були використані у експериментах.

Ключові слова: короп, корм, кормові добавки, мікотоксини, сорбент, морфологічні показники, приріст, система антиоксидантного захисту.

RESULTS OF THE USE OF A SORBENT IN A CARP FEED WITH SIGNS OF MYCOTOXIN CONTAMINATION

O. Deren, derenj@ukr.net, Institute of Fisheries of NAAS, Kyiv

N. Syrovatka, natysik_2g2@ukr.net, Institute of Fisheries of NAAS, Kyiv

M. Koryliak, stasiv8@gmail.com, Institute of Fisheries of NAAS, Kyiv

O. Dobryanska, olya_dobryanska@ukr.net, Lviv Research Station of the Institute of Fisheries of NAAS, Velykyj Lubin

Purpose. The aim of the work was to study certain morpho-physiological parameters of carp as a result of additional introduction of a mycotoxin sorbent to a feed with signs of spoilage.

Methodology. During 2019–2020, two experiments were conducted in the laboratory. The first one included 7 groups-analogues of age-1+ Nyvky carp, 20 fish in each group, with an average weight of 22.5 g. The control group of fish was fed for 24 days with a compound feed with signs of spoilage, «Mykosorb» was additionally added to the diet of the experimental groups in the amounts of 0.05, 0.1; 0.15; 0.2; 0.25 and 0.4%, respectively. The second group included 4 groups of age-1+ fish, 12 fish in each group, with an average weight of 20.0 g. The diet of the control group was identical to that of the first experiment, and the experimental groups with the addition of 0.05, 0.075 and 0.1% of «Mycosorb», respectively. During the study, optimal conditions for keeping fish were provided. Fish after were measured and weighed at the end of the experiment and their weight gains were analyzed according to generally accepted methods in fish farming. The activity of antioxidant enzymes and the content of lipid peroxidation products depending on the composition of the diet were studied.

Findings. The studies used compound feed with signs of spoilage as a result of violation of their storage technology, which identified three groups of toxins: Aflatoxin B1, Zearalenone and Deoxynivalenol.

As a result of the first stage of the study, the rates of application of mycotoxin sorbent into the diet of carp at amounts of 0.05 - 0.2% were determined. At the same time, there was no clear proportional pattern of changes in the average weight of fish depending on the amount of introduction of «Mycosorb», the value increased in all experimental groups compared to the control by 0.4 – 15.2%. Muscles of age-1+ fish were found to have higher ($p<0,001$) catalase activity after application of 0.15% of the test drug by 1.4 times, 0.2% — by 46%, 0.25% — by 69 and 0.4% — by

79%. Superoxide dismutase activity also increased, except for the groups of 0.2, 0.25 and 0.4% of «Mycosorb». There was a tendency of 21.0 and 22.6% decrease in the content of diene conjugates as a result of feeding 0.05 and 0.1% sorbent and some increase as a result of feeding 0.15; 0.2; 0.25 and 0.4% additives.

Studies of the next stage showed that addition of «Mykosorb» at the rate of 0.05, 0.075 and 0.1% to the feed, the average weight of age-1+ carp in the experimental groups increased by 45.4; 37.2 and 30.3%, the condition factor — by 41.9; 40.8 and 42.7%, the relative growth rate is 4.3; 5.9 and 4.6 times, respectively. The fish body height to length ratio was lower by 10.3, 7.0 and 7.4% relative to the control group. Addition of 0.05, 0.075 and 0.1% of «Mycosorb» increased resistance of fish due to an increase in the hepatopancreatic activity of antioxidant enzymes: superoxide dismutase by 28.3, 30.5 and 5.0% and catalase by 56.5 ($p<0.001$), 55.5 ($p<0.001$) and 46.3% ($p<0.05$). At the same time, addition of 0.05 and 0.1% of «Mykosorb» increased the content of diene conjugates by 11.3 ($p<0.01$) and 12.3% ($p<0.01$), TBC-active products by 19.7 ($p<0.05$) and 13.2%.

Originality. For the first time, the feasibility of addition of the mycotoxin sorbent «Mykosorb» into the feed with signs of spoilage was studied. The effect of feeding age-1+ carp with diets of various compositions on some morpho-physiological parameters of carp in the conditions of model tests was carried out.

Practical value. Additional weigh gains and improvements of the antioxidant defense system of the carp organism were observed. The use of «Mykosorb» in carp feeding allows reducing the negative impact of low quality feed on fish body.

Key words: carp, feed, feed additives, mycotoxins, sorbent, morphological parameters, growth, antioxidant defense system.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОРМЛЕНИИ КАРПА СОРБЕНТА В СОСТАВЕ КОРМА С ПРИЗНАКАМИ КОНТАМИНИРОВАНИЯ МИКОТОКСИНАМИ

О. В. Дерень, deren@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Н. Ю. Сыворотка, natysik_2g2@ukr.net, Институт рыбного хозяйства НААН., г. Киев

М. З. Корыляк, stasiv8@gmail.com, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

О. П. Добрянская, olya_dobryanska@ukr.net, Львовская опытная станция ИРХ НААН, пгт Великий Любень

Цель. Целью работы было исследование отдельных морфо-физиологических показателей карпа в результате дополнительного введения сорбента микотоксинов в корм с признаками порчи.

Методика. В течение 2019-2020 гг. проведено два эксперимента в лабораторных условиях. В первом было сформировано — 7 групп-аналогов годовиков нивчанского карпа, по 20 экз. в каждой, средней массой 22,5 г. Контрольной группе рыб в течение 24 сут. скармливали комбикорм с признаками порчи, в рацион опытных групп дополнительно вводили препарат «Микосорб» в количестве соответственно 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 и 0,40%. Во втором эксперименте — 4 группы годовиков карпа, по 12 экз. в каждой, средней массой 20,0 г. Рацион контрольной группы был идентичным первому эксперименту, а опытных групп — с добавкой 0,050; 0,075 и 0,100% «Микосорба» соответственно. В течение исследований обеспечено оптимальные условия содержания рыб. После отлова годовиков изучали размерно-весовые показатели, анализировали прирост массы по общепринятым в рыбоводстве методикам. Изучали активность антиоксидантных ферментов и содержание продуктов перекисного окисления липидов в зависимости от состава рациона.

Результаты. В исследованиях использован комбикорм с признаками порчи в результате нарушения технологии хранения, в котором обнаружены три группы токсинов: Афлатоксин В1, Зеараленон и Дезоксиниваленон.

В результате первого этапа исследований определены нормы введения в рацион карпа сорбента микотоксинов в количестве 0,05–0,20%. При этом не установлено четкой пропорциональной закономерности изменения средней массы рыб в зависимости от количества введения «Микосорба», показатель вырос во всех опытных группах по сравнению с контрольной на 0,4–15,2%. В мышцах годовиков установлено более высокую ($p < 0,001$) активность каталазы при введении 0,15% исследуемого препарата в 1,4 раза, 0,2% — на 46%, 0,25% — на 69 и 0,4% — на 79%. Активность супероксиддисмутазы тоже возросла, кроме групп при введении 0,20; 0,25 и 0,40% «Микосорба». Отмечена тенденция к снижению на 21,0 и 22,6% содержания диеновых конъюгатов в результате скормливания 0,05 и 0,10 сорбента и некоторое повышение в результате скормливания 0,15; 0,20; 0,25 и 0,40% добавки.

Исследованиями следующего этапа установлено, что при скормливании в составе корма «Микосорба» из расчета 0,050; 0,075 и 0,100% средняя масса годовиков карпа в опытных группах возросла соответственно на 45,4; 37,2 и 30,3%, коэффициент упитанности рыб — на 41,9; 40,8 и 42,7%, показатель относительного прироста — в 4,3; 5,9 и 4,6 раза соответственно. Индекс вискоспинности был ниже на 10,3; 7,0 и 7,4% относительно показателей контрольной группы. При дополнительном скормливании 0,050; 0,075 и 0,100% «Микосорба» повысилась сопротивляемость организма рыб, учитывая рост в гепатопанкреасе активности антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутазы — на 28,3; 30,5 и 5,0% и каталазы на 56,5 ($p < 0,001$); 55,5 ($p < 0,001$) и 46,3% ($p < 0,05$). При этом при скормливании 0,05 и 0,10% «Микосорба» отмечено увеличение содержания диеновых конъюгатов соответственно на 11,3 ($p < 0,01$) и 12,3% ($p < 0,01$), а также ТБК-активных продуктов — на 19,7 ($p < 0,05$) и 13,2%.

Научная новизна. Впервые исследована целесообразность введения сорбента микотоксинов «Микосорб» в состав карпового корма с признаками порчи. Осуществлен анализ влияния скормливания рациона различного состава на отдельные морфо-физиологические показатели карпа в условиях модельных испытаний.

Практическая значимость. Получены дополнительные приросты и улучшения показателей системы антиоксидантной защиты организма карпа. Использование в кормлении карпа препарата «Микосорб» позволяет уменьшить негативное влияние на организм рыб кормов низкого качества, которые были использованы в экспериментах.

Ключевые слова: карп, корм, кормовые добавки, микотоксины, сорбент, морфологические показатели, прирост, система антиоксидантной защиты.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

З метою забезпечення оптимальних умов для росту та розвитку в процесі промислового вирощування риби необхідно дотримуватись основних технологічних параметрів. При цьому важливим аспектом є використання в годівлі кормів, які забезпечують потреби риби у поживних і мінеральних речовинах, добре перетравних та безпечних для екосистеми [1–3].

Важливим в екологічному контексті є те, що при вирощуванні рослинні компоненти корму накопичують ряд шкідливих речовин та підлягають грибковому ураженню. Недостатня термічна обробка в процесі виготовлення та порушення технології зберігання комбикормів є додатковими чинниками, що призводять не лише до зниження якості, а й безпечності в результаті накопичення в них микотоксинів [4, 5]. Додаткове введення до кормів препаратів з сорбційними властивостями дозволяє запобігти негативному впливу токсинів на організм тварин [6].

Тому пошук нових засобів, які дозволяють зменшити вплив екологічного тиску на водойму внаслідок інтенсифікаційно-екологічних чинників, є актуальним. Перспективним є дослідження з вивчення та аналізу механізму дії на організм коропа препаратів нового покоління із селективними сорбційними характеристиками.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Застосування адсорбентів мікотоксинів може бути дієвим з метою профілактики бактеріальних захворювань, а також сприяє попередженню харчових токсикоінфекцій, які негативно впливають на резистентність та функціональний стан окремих систем організму, зумовлюють генетичні порушення [7–9].

У дослідженнях використано новий у рибистві препарат «Мікосорб» («Alltech Inc.», США), що є унікальним поєднанням етерифікованих глюкомананів, виділених із стінок клітин дріжджів, які, потрапляючи у травний тракт, зв'язують і виводять з організму широкий спектр мікотоксинів, запобігаючи їхньому всмоктуванню у кишечнику [10].

Огляд наукових праць свідчить про ефективність його використання в різних підгалузях тваринництва з метою покращення фізіолого-біохімічних показників організму різних видів тварин, а також конверсії корму [11–13]. Проте, є лише фрагментарні дані щодо застосування схожих за призначенням, але відмінних за спектром та механізмом дії препаратів у вітчизняному рибистві [14].

Метою роботи є оцінка ефективності додаткового введення до складу основного раціону коропа сорбенту мікотоксинів відповідно до впливу на основні рибицькі та антиоксидантні показники організму.

Розроблення і впровадження поставленого завдання дозволить забезпечити можливість збільшити продуктивні характеристики коропа і зменшити витрати кормів на вирощування з одночасним поліпшенням якісних характеристик отриманої рибиної продукції.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проводили впродовж 2019–2020 рр. в умовах лабораторного комплексу Інституту рибного господарства НААН.

При проведенні досліджень 2019 р. сформовано 7 груп-аналогів однорічкових коропів, по 20 екз. у кожній, середньою масою 22,5 г. Коропів утримували в акваріумах з аерацією, підігрівом та постійним водообміном, за середньої температури води 18–20°C. Зрівняльний період перед проведенням дослідів тривав 10 діб, впродовж якого забезпечували аналогічні оптимальні умови утримання. Після закінчення зрівняльного періоду, коли однорічки коропа адаптувалися до умов утримання, їх розділили на контрольну і дослідні групи. Основний раціон риб складався із комбікорму рецепту ПКС111-2/2/4 з ознаками грибкового ураження, що виникло в результаті недотримання технології зберігання. Однорічки коропа контрольної групи отримували основний раціон, а дослідних груп — такий з додаванням сорбенту мікотоксинів «Мікосорб» у різних

концентраціях: Дослід 1 — 0,05%, Дослід 2 — 0,10%, Дослід 3 — 0,15%, Дослід 4 — 0,20%, Дослід 5 — 0,25%, Дослід 6 — 0,40%. Експериментальна годівля тривала 24 діб.

Наступним етапом 2020 р. було повторне дослідження ефективності введення попередньо визначених, відповідно до рибогосподарських та біохімічних показників організму, оптимальних концентрацій досліджуваної добавки в годівлі коропа. Сформовано 4 групи-аналоги однорічок нивківського внутрішньопородного типу української лускатої породи коропа, по 12 екз. у кожній, середньою масою риб — 20,0 г. Адаптаційний період становив 14 діб, експериментальна годівля тривала 25 діб. В годівлі використовували комбікорм рецепту ПКС111-2/2/4 із зовнішніми ознаками грибкового ураження. Коропам дослідних груп додатково до корму вводили препарат «Мікосорб» з розрахунку відповідно: 0,050% (Дослід 1), 0,075% (Дослід 2) та 0,100% (Дослід 3).

Перед проведенням експерименту досліджували наявність мікотоксинів у використовуваному кормі. Таким чином, було виявлено три групи токсинів у комбікормі: Афлатоксин В1 — 1,5 мкг/кг (при гранично допустимій концентрації (ГДК) — 5 мкг/кг); Зеараленон — 62,5 мкг/кг (при ГДК — 200 мкг/кг); Дезоксиніваленол — 3360,0 мкг/кг (при ГДК — 2000 мкг/кг). Тобто, основні досліджувані токсини виявлені у зразках корму, при цьому вміст Дезоксиніваленолу перевищував ГДК в 1,68 раза.

Експериментальні рибогосподарські роботи проведено з дотриманням загальноприйнятих у рибництві правил постановки та повторностей [15]. Добову потребу корму визначали за комплексною оцінкою показників маси риб. При цьому забезпечували оптимальну температуру води у акваріумах, а також контролювали основні хімічні показники та вміст у ній розчиненого кисню.

Для аналізу екстер'єру дослідних риб проводили вимірювання основних морфометричних показників: L — загальна довжина; l — мала довжина; O — обхват тіла; H — висота тіла. Довжину риби вимірювали за допомогою мірної стрічки з точністю до 1 мм. Зважували рибу електронними вагами дискретністю до 0,1 г. Усі проміри проводили згідно з правилами морфометричного аналізу коропових риб [16].

Після обробки показників визначали коефіцієнт вгодованості (Кв, од.) за Фультоном. Абсолютний приріст (A_n , г) визначали як різницю між живою масою риб наприкінці й на початку періоду досліджень. Відносний приріст (B_n , %), який характеризує темп росту, визначали за відношенням абсолютного приросту до живої маси риб на початку періоду досліджень, помноженим на сто відсотків [17].

Експерименти на тваринах проводили відповідно до правил, прийнятих Європейською Конвенцією із захисту хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та інших наукових цілей [18].

Для біохімічних досліджень використовували 10% гомогенати тканин гепатопанкреасу і скелетних м'язів коропа. Досліджували концентрацію дієнових кон'югатів за методом, що ґрунтується на реакції оптичної густини гептанізопропанольного екстракту ліпідів [19]. Визначення концентрації ТБК-активних продуктів (ТБК) проводили спектрофотометрично за кольоровою

реакцією з тіобарбітуровою кислотою [20]. Активність супероксиддисмутази (СОД) — за визначенням відсотка гальмування реакції відновлення нітросинього тетразолію в присутності феназинметасульфату [21]. Активність каталази — за зміною концентрації H_2O_2 [22]. Визначення вмісту білка проводили за методом Бредфорд [23].

Одержані цифрові результати опрацьовували статистично за допомогою стандартного пакету статистичних програм «Microsoft Excel». Обчислювали середні арифметичні величини (М), середню квадратичну помилку (m) і вірогідність різниць (Р) між досліджуваними середньоарифметичними величинами. Статистично вірогідну різницю отриманих показників оцінювали за t-критерієм Стьюдента [24].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Як було зазначено, моделювання досліджень передбачало, що цьогорітки отримували основний раціон у вигляді комбікорму з ознаками грибового ураження та псування в результаті порушення технології його зберігання. Відомо, що наявність пліснявих грибів призводить до продукування у кормі мікотоксинів. Негативний вплив від згодовування таких кормів в першу чергу проявляється у порушенні функціонального стану органів і тканин, стимуляції процесів антиоксидантного захисту, впливі на активність ензимів [25, 26]. Тому, при дослідженні сорбційних властивостей «Мікосорбу» здійснено порівняльний аналіз розмірно-вагових показників, а також активності травних та антиоксидантних ензимів в організмі однорічок коропа дослідних та контрольної груп.

В результаті досліджень 2019 р. не встановлено чіткої пропорційної закономірності зміни середньої маси риб в залежності від кількості введення до раціону «Мікосорбу», проте даний показник збільшився в усіх дослідних групах у порівнянні з контрольною (табл. 1). Так, в Контролі середня маса риб склала 23,90 г. В Досліді 1 — 25,54; Досліді 2 — 25,60; Досліді 3 — 24,0; Досліді 4 — 28,17; Досліді 5 — 26,23; Досліді 6 — 27,80 г, що більше відповідно — на 8,9; 6,6; 0,4; 15,2; 8,9 та 14,0%. Відповідно до маси риб, не відмічено суттєвої зміни розмірних показників та залежності їх зміни відносно кількості згодовування досліджуваної добавки. Так, індекс високоспинності (I/H) коливався у невеликих межах — від 2,59 до 2,82 од.

Разом з тим, можна відзначити незначну відмінність показника Кв однорічок дослідних і контрольної груп (рис. 1). У Контролі даний показник склав 2,59 од. У Досліді 1 Кв становить 2,68 од., що на 3,4% більше, ніж у Контролі, в Досліді 2 — 2,62 од. та 1,2%, Досліді 4 — 2,69 од. та 3,7% відповідно. В решті дослідних груп даний показник був нижче, порівняно з Контролем: в Досліді 3 — 2,33 од. та 10%, Досліді 5 — 2,42 од. та 6,6%, Досліді 6 — 2,55 од. та 1,6%.

Відповідно, встановлено зміну значень A_p і B_p відносно показників контрольної групи. Так, B_p коропів контрольної групи склав 6,22%, у Дослідах 1 і 2 — був вищим у 2,2 раза, у Досліді 5 — у 2,7 раза, у Досліді 3 практично не відрізнявся від показника Контролю. Найвищим B_p був у Дослідах 4 і 6, що відповідно у 4,1 і у 3,8 раза більше, ніж у Контролі.

Таблиця 1. Розмірно-вагові показники однорічок коропа за введення «Мікосорбу» до складу раціону, 2019 р. ($M \pm m$, $n = 10$)Table 1. Size and weight indicators of 1+ carp for the introduction of «Mikosorb» in the diet, 2019 ($M \pm m$, $n = 10$)

Група риб / Group of fish	P, г / P, g	l, см / l, cm	L, см / L, cm	H, см / H, cm	O, см / O, cm	I/H / I/H
Контроль / Control	23,90±2,79	9,63±0,31	12,34±0,33	3,66±0,13	8,01±0,29	2,64±0,05
Дослід 1 / Experiment 1	25,54±1,50	9,86±0,22	12,78±0,33	3,75±0,13	8,08±0,25	2,65±0,07
Дослід 2 / Experiment 2	25,60±1,45	9,92±0,21	12,71±0,28	3,84±0,11	8,22±0,18	2,59±0,04
Дослід 3 / Experiment 3	24,00±1,03	10,12±0,18	12,57±0,20	3,68±0,08	7,89±0,16	2,76±0,05
Дослід 4 / Experiment 4	28,17±3,30	10,05±0,33	12,88±0,42	3,87±0,18	8,31±0,30	2,62±0,06
Дослід 5 / Experiment 5	26,23±1,65	10,30±0,32	12,33±0,32	3,68±0,11	8,07±0,25	2,82±0,09
Дослід 6 / Experiment 6	27,80±2,30	10,27±0,33	12,88±0,41	3,79±0,15	8,28±0,34	2,72±0,07

Рис. 1. Морфологічні показники експериментальних груп коропа за введення «Мікосорбу» до складу раціону, 2019 р. ($M \pm m$, $n = 10$)Fig. 1. Morphological parameters of experimental groups of carp for the introduction of «Mikosorb» in the diet, 2019 ($M \pm m$, $n = 10$)

Визначали активність антиоксидантних ензимів (каталази і СОД) у скелетних м'язах однорічок у результаті введення до складу корму «Мікосорбу» (табл. 2). У м'язах коропів Досліді 3 активність каталази збільшилася в 1,4 рази ($p < 0,001$), Досліді 4 — на 46% ($p < 0,001$), Досліді 5 і 6 — на 69 ($p < 0,001$) та 79% ($p < 0,001$) відповідно, у порівнянні з Контролем. Разом з тим, спостерігалися достовірні різниці у зниженні активності СОД у м'язах коропів Дослідів 4, 5 і 6 — відповідно у 4,5 ($p < 0,001$); 2,6 ($p < 0,001$) та 5,1 ($p < 0,001$) рази, що може свідчити про підвищення рівня вільнорадикальних процесів з одночасним посиленням активності каталази.

При оцінці вмісту продуктів ПОЛ встановлено достовірно виражене підвищення вмісту ТБК у Досліді 5, у порівнянні з Контролем, на 44% ($p < 0,01$). Разом з тим, у Досліді 1 цей показник достовірно знизився на 31% ($p < 0,01$) щодо Контролю. Вміст дієнових кон'югатів в Дослідах 3–6 був дещо підвищеним, а в Дослідах 1 і 2 знизився на 21,0 та 22,6% відповідно, хоча ці показники не є достовірними.

Таблиця 2. Активність антиоксидантних ензимів та вміст продуктів ПОЛ в скелетних м'язах коропа в результаті згодовування препарату «Мікосорб», 2019 р. ($M \pm m$, $n = 5$)

Table 2. The activity of antioxidant enzymes and the content of lipid peroxidation products in the skeletal muscles of carp as a result of «Mikosorb» feeding, 2019 ($M \pm m$, $n = 5$)

Група риб / Group of fish	СОД, уо/хв. × мг білка / SOD, con. units / min. × mg protein	Каталаза, мкмоль H ₂ O ₂ /хв. × мг білка / Catalase, mkmol H ₂ O ₂ / min. × mg protein	Дієнові кон'югати, нмоль/мг білка / Dyne conjugates, nmol/mg protein	ТБК, нмоль/мг білка / TBA-reactive substances, nmol/mg protein
Контроль / Control	5,41±0,515	3,53±0,224	1,90±0,255	2,17±0,139
Дослід 1 / Experiment 1	5,92±0,355	3,96±0,108	1,50±0,090	1,55±0,073**
Дослід 2 / Experiment 2	3,83±0,408*	2,36±0,226**	1,47±0,119	2,29±0,105
Дослід 3 / Experiment 3	3,68±0,638	4,96±0,088***	1,91±0,045	2,47±0,099
Дослід 4 / Experiment 4	1,18±0,084***	5,04±0,113***	1,89±0,086	2,40±0,129
Дослід 5 / Experiment 5	2,06±0,379***	5,84±0,169***	2,34±0,087	3,13±0,188**
Дослід 6 / Experiment 6	1,05±0,155***	6,19±0,453***	2,12±0,054	2,25±0,069

Примітка. Тут і надалі вірогідні різниці у показниках дослідних груп риб в порівнянні з контрольною: * — $p < 0,05$, ** — $p < 0,01$, *** — $p < 0,001$.

Note. In this and subsequent tables the difference is statistically significant compared to the control group: * — $p < 0,05$, ** — $p < 0,01$, *** — $p < 0,001$.

Виходячи з аналізу описаних вище показників, для проведення подальших досліджень рекомендовано додавання до основного раціону коропа сорбенту «Мікосорб» у кількості 0,05–0,20%.

Після закінчення експериментальних робіт 2020 р. здійснено аналіз розмірно-вагових показників однорічок коропа. Встановлено, що за введення до складу раціону «Мікосорбу» збільшилася середня маса риб в усіх дослідних групах в

порівнянні з контрольною (табл. 3). Так, у Контролі цей показник склав 22,77 г, а в Дослідах 1–3 — відповідно 41,71; 36,25 та 32,67 г. У відсотковому виразі ця різниця склала 45,4; 37,2 та 30,3%. Розмірні показники були дещо нижчими у дослідних варіантах відносно контрольного, проте, як і в попередньому експерименті, не відмічено суттєвих змін. Показник індексу високоспинності (I/H) у Контролі склав 2,72; у Досліді 1 — 2,44; у Досліді 2 — 2,53; у Досліді 3 — 2,52 од.; різниця склала відповідно 10,3; 7,0 та 7,4%.

Таблиця 3. Розмірно-вагові показники одnorічок коропа за введення «Мікосорбу» до складу раціону, 2020 р. ($M \pm m$, $n = 12$)

Table 3. Size and weight indicators of 1+ carp for the introduction of «Mikosorb» in the diet, 2020 ($M \pm m$, $n = 12$)

Група риб / Group of fish	P, г / P, g	I, см / I, cm	L, см / L, cm	H, см / H, cm	O, см / O, cm	I/H / I/H
Контроль / Control	22,77±2,63	11,18±0,43	13,49±0,50	9,35±0,35	4,12±0,17	2,72±0,02
Дослід 1 / Experiment 1	31,77±2,48	10,61±0,40	12,92±0,45	9,05±0,41	4,38±0,19	2,44±0,04
Дослід 2 / Experiment 2	36,25±4,41	10,93±0,47	13,28±0,55	9,21±0,38	4,33±0,19	2,53±0,04
Дослід 3 / Experiment 3	32,67±3,28	10,51±0,41	12,85±0,50	8,99±0,37	4,18±0,16	2,52±0,04

Разом з тим, можна відмітити збільшення Кв в усіх дослідних групах відносно Контролю, де даний показник склав 1,57 од. (рис. 2). В Досліді 1 Кв становив 2,70 од., що на 41,9% більше, ніж у Контролі, в Досліді 2 — 2,65 од. та 40,8%, в Досліді 3 — 2,74 од. та 42,7% відповідно.

Виходячи з показників A_n експериментальних груп риб, встановлено, що B_n у Контролі склав 13,85%, у Досліді 1 — 58,85%, у Досліді 2 — 81,25 та у Досліді 3 — 63,35%. Тобто, показники B_n коропів дослідних груп були вищими щодо контрольної у 4,3; 5,9 та 4,6 раза відповідно.

Рис. 2. Морфологічні показники експериментальних груп коропа за введення «Мікосорбу» до складу раціону, 2020 р. ($M \pm m$, $n = 12$)

Fig. 2. Morphological parameters of experimental groups of carp for the introduction of «Mikosorb» in the diet, 2020 ($M \pm m$, $n = 12$)

Отже, в результаті здатності «Мікосорбу» до сорбції мікотоксинів кормів, вдалося отримати додаткові прирости риб у дослідних групах щодо контрольної. Це свідчить про кращий функціональний стан їхнього організму. Здійснено аналіз активності ензимів АОС та рівня продуктів ПОЛ у гепатопанкреасі за даних умов експерименту та дії досліджуваного сорбенту. Процеси ПОЛ і стан антиоксидантної системи є інформативними показниками для оцінки ступеня впливу токсикантів на організм, а їх порушення призводить до розвитку в риб різноманітних патологій, зумовлених окисненням у ліпідах клітин поліненасичених жирних кислот активними формами кисню.

Спостерігалися відмінності за показниками активності ферментної ланки АОС контрольної і дослідних груп (табл. 4). Показники активності СОД у Контролі були найнижчими і склали $1,52 \pm 0,298$ уо/хв. $\times$ мг білка, а в Дослідах 1–3 переважали контрольні значення на 28,3; 30,5 і 5,0% відповідно.

Відповідно до активації СОД, активність каталази у гепатопанкреасі дослідних груп достовірно зростала. Найвище значення даного показника зафіксовано у Досліді 1, за згодовування 0,050% «Мікосорбу», — $54,14 \pm 0,531$ мкмоль H_2O_2 /хв. $\times$ мг білка та в Досліді 2, за згодовування 0,075% «Мікосорбу», — $52,87 \pm 2,429$ мкмоль H_2O_2 /хв. $\times$ мг білка. Найнижчим вміст каталази був у гепатопанкреасі однорічок контрольної групи, складаючи $23,54 \pm 3,431$ мкмоль H_2O_2 /хв. $\times$ мг білка. Загалом, у Дослідах 1–3 активність каталази зросла відповідно на 56,5 ($p < 0,001$); 55,5 ($p < 0,001$) та 46,3% ($p < 0,05$) відносно показників контрольної групи.

Таблиця 4. Активність антиоксидантних ензимів та вміст продуктів ПОЛ в гепатопанкреасі коропа в результаті згодовування препарату «Мікосорб», 2020 р. ($M \pm m$, $n = 5$)

Table 4. The activity of antioxidant enzymes and the content of lipid peroxidation products in the hepatopancreas of carp as a result of «Mikosorb» feeding, 2019 ($M \pm m$, $n = 5$)

Група риб / Group of fish	СОД, уо/хв. $\times$ мг білка / SOD, con. units / min. $\times$ mg protein	Каталаза, мкмоль H_2O_2 /хв. $\times$ мг білка / Catalase, mkmol H_2O_2 / min. $\times$ mg protein	Дієнові кон'югати, нмоль / мг білка / Dyne conjugates, nmol / mg protein	ТБК, нмоль/мг білка / TBA-reactive substances, nmol/mg protein
Контроль / Control	$1,52 \pm 0,298$	$23,54 \pm 3,431$	$2,36 \pm 0,076$	$1,84 \pm 0,124$
Дослід 1 / Experiment 1	$2,12 \pm 0,315$	$54,14 \pm 0,531^{***}$	$2,66 \pm 0,026^{**}$	$2,29 \pm 0,091^*$
Дослід 2 / Experiment 2	$2,19 \pm 0,108$	$52,87 \pm 2,429^{***}$	$2,30 \pm 0,192$	$1,85 \pm 0,060$
Дослід 3 / Experiment 3	$1,60 \pm 0,110$	$43,83 \pm 6,480^*$	$2,69 \pm 0,029^{**}$	$2,12 \pm 0,148$

Серед чинників оксидантних змін простежується тенденція узгодженості між активністю антиоксидантних ензимів та пероксидацією ліпідів. В Досліді 2, за використання в годівлі 0,075% «Мікосорбу», вміст продуктів ПОЛ був на рівні показників контрольної групи (табл. 4). У Досліді 1 відмічено достовірне, але не значне збільшення вмісту дієнових кон'югатів — на 11,3% ($p < 0,01$) та ТБК — на

19,7% ($p < 0,05$). У Досліді 3 дані показники зросли відповідно на 12,3 ($p < 0,01$) та 13,2%.

Отже, в результаті досліджень встановлено, що за згодовування однорічкам коропа комбікорму, контамінованого мікотоксинами, характерним є виражений інгібували вплив на АОС у контрольній групі відносно дослідних, з огляду на зниження активності антиоксидантних ензимів та відповідного зростання кількості продуктів ПОЛ. Тобто, найбільш ефективним в контексті підвищення резистентності організму коропа є введення до складу ураженого мікотоксинами корму сорбенту «Мікосорб» з розрахунку 0,050 та 0,075%.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

У дослідженнях використано комбікорм з ознаками псування в результаті порушення технології зберігання, в якому виявлено три групи токсинів: 1,5 мкг/кг Афлатоксину В1 (за ГДК 5 мкг/кг); 62,5 мкг/кг Зеараленону (за ГДК 200 мкг/кг) та 3360,0 мкг/кг Дезоксиніваленолу (за ГДК 2000 мкг/кг).

Відповідно до аналізу результатів першого етапу досліджень, визначено оптимальними концентрації введення препарату «Мікосорб» до складу раціону коропа в кількості 0,05–0,20%. Встановлено, що середня маса однорічок за додаткового згодовування 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,40% була вищою щодо контрольного варіанту відповідно на 8,9; 6,6; 0,4; 15,2; 8,9 та 14,0%. Не відмічено суттєвої зміни розмірних показників та залежності їхньої зміни відносно кількості згодовування досліджуваної добавки. V_p за згодовування 0,05 та 0,10% добавки був вищим у 2,2 раза, за згодовування 0,20; 0,25 та 0,40%, відповідно у 4,1; 2,7 та 3,8 раза щодо Контролю.

Аналізуючи активність ензимів АОС у м'язах однорічок, встановили вищу ($p < 0,001$) активність каталази за введення «Мікосорбу» у кількості 0,15% у 1,4 раза; 0,2% — на 46%; 0,25% — на 69 та 0,40% — 79% у порівнянні з контрольною групою. Активність СОД теж зростала, окрім груп за введення 0,20; 0,25 та 0,40% «Мікосорбу», в яких вона знизилась ($p < 0,001$) відповідно у 4,5; 2,6 та 5,1 раза, що може свідчити про підвищення рівня вільнорадикальних процесів, з одночасним посиленням активності каталази. При цьому встановлено зниження вмісту на 31% ($p < 0,01$) ТБК за згодовування 0,05% «Мікосорбу» та підвищення на 44% ($p < 0,01$) за згодовування 0,25%. Відмічено тенденцію до зниження на 21,0 та 22,6% вмісту дієнових кон'югатів в результаті згодовування 0,05 та 0,1 сорбенту та деяке зростання в результаті згодовування 0,15; 0,20; 0,25 та 0,40% добавки.

Дослідженнями наступного етапу встановлено, що за згодовування в складі корму «Мікосорбу» з розрахунку 0,050; 0,075 та 0,100%, середня маса однорічок коропа у дослідних групах зросла відповідно на 45,4; 37,2 та 30,3%, коефіцієнт вгодованості риб — на 41,9; 40,8 та 42,7%, показник V_p — у 4,3; 5,9 та 4,6 раза відповідно.

Відмічено виражений інгібувальний вплив згодовування контамінованого грибками корму на антиоксидантну активність у гепатопанкреасі коропів контрольної групи відносно дослідних. За додаткового згодовування 0,050; 0,075 та 0,100% «Мікосорбу» підвищила опірність організму риб, з огляду на зростання у гепатопанкреасі активності антиоксидантних ензимів: СОД — на 28,3; 30,5 і 5,0% та каталази — на 56,5 ($p < 0,001$); 55,5 ($p < 0,001$) та 46,3% ($p < 0,05$). При цьому за згодовування 0,05 та 0,10% «Мікосорбу» відмічено збільшення вмісту дієнових кон'югатів відповідно на 11,3 ($p < 0,01$) та 12,3% ($p < 0,01$), а також ТБК — на 19,7

($p < 0,05$) та 13,2%.

Перспективним є поглиблений аналіз впливу досліджуваного препарату на організм піддослідних риб, відповідно до його функціональних особливостей, з наступним розробленням методичних рекомендацій із застосування у виробничих умовах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Фермерське рибництво / Грициняк І. І. та ін. Київ : Герб, 2008. 560 с.
2. Дехтярьов П. А., Євтушенко М. Ю., Шерман І. М. Фізіологія риб. Київ : Аграрна освіта, 2008. 342 с.
3. Wrona F. G., Cash K. J. The ecosystem approach to environment assessment: moving from theory to practice // J. Aquat. Ecosyst. Health. 1996. № 5. Р. 89—97.
4. Мікотоксикологічний моніторинг концентрованих кормів лісостепу України / Малінін О. та ін. // Тваринництво України. 2003. №12. С. 26—28.
5. Попова С. А., Скопцова Т. И., Лосякова Е. В. Микотоксины в кормах: причины, последствия, профилактика // Известия Великолукской ГСХА. 2017. № 1. С. 16—23.
6. Осулливан Д. Микотоксины — бесшумная опасность // Комбикорма. 2005. № 5. С. 54—56.
7. Гогин А. Микотоксины: эффективный контроль — эффективное производство // Комбикорма. 2005. № 2. С. 68—69.
8. Дворська Ю. Є. Мікотоксини в кормах птиці: оцінка ризику // Аграрний вісник причорномор'я. 2013. Вип. 68. С. 62—69.
9. Дворская Ю., Донец В., Кузьменко С. Микотоксины опасны для свиней // Тваринництво України. 2008. № 5. С. 14—15.
10. Ефективність препарату «Мікосорб» (Alltech) в умовах періодичної контамінації кормів мікотоксинами / Котик А. М. та ін. // Ефективне тваринництво і птахівництво. 2004. № 1. С. 46—49.
11. Адамс Ник. Эффективность одновременного связывания нескольких микотоксинов различными адсорбентами в условиях модели желудочно-кишечного тракта *in vitro* // Животноводство России. 2020. № 7. С. 56—60.
12. Сурмач В. Н., Ковалевский В. Ф., Сехин А. А. Адсорбент микотоксинов «Микосорб™»-эффективная защита комбикормов для цыплят-бройлеров // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. 2011. № 14(1). С. 17—25.
13. Сурмач В. Н. Ковалевский В. Ф., Сехин А. А. Кормовая добавка «Микосорб» в кормлении дойных коров // Сельское хозяйство — проблемы и перспективы : сборник научных трудов. В 2-х т. 2010. Т. 1. С. 213—220.
14. Сироватко К. М., Зотько М. О. Технологія кормів та кормових добавок : навчальний посібник. Вінниця : ВНАУ, 2020. 263 с.
15. Желтов Ю. О. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб // Рибне господарство. 2003. Вип. 62. С. 23—28.
16. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва : Пищевая промышленность, 1966. 377 с.
17. Инструкции по физиолого-биохимическим анализам рыб / Лиманский В. В. и др. Москва : ВНИИПРХ, 1984. 58 с.
18. European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes. Strasbourg, 18/03/1986. ETS No.123.

19. Стальная И. Д. Метод определения диеновой конъюгации ненасыщенных высших жирных кислот // Современные методы в биохимии. 1977. С. 63—64.
20. Коробейникова Е. Н. Модификация определения продуктов перекисного окисления липидов в реакции с тиобарбитуровой кислотой // Лабораторное дело. 1989. № 7. С. 8—9.
21. Дубинина Е. Е., Сальникова Л. А., Ефимова Л. Ф. Активность и изоферментный спектр супероксиддисмутазы эритроцитов и плазмы крови человека // Лабораторное дело. 1983. № 10. С. 30—33.
22. Королюк М. А., Иванова Л. И., Майорова И. Г. Метод определения активности каталазы // Лабораторное дело. 1988. № 1. С. 16—19.
23. Bradford M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding // Anal. Biochem. 1976. Vol. 72. P. 248—254.
24. Плохинский Н. А. Проблемы современной биометрии. Москва : Моск. ун-т, 1981. 166 с.
25. Кожевников Ю. Н. О перекисном окислении липидов в норме и патологии (обзор) // Вопросы медицинской химии. 1985. № 1. С. 2—7.
26. Комаров А. А., Панин А. Н. Микотоксикозы животных. Методическое пособие для профессиональной переподготовки работников предприятий АПК. Москва : Пищепромиздат, 2003. 82 с.

REFERENCES

1. Hrytsyniak, I. I., Hrynzhovskyi, M. V., Tretiak, O. M., Kiva, M. S., & Mruk, A. I. (2008). *Fermerske rybnytstvo*. Kyiv: Herb.
2. Dekhtiarov, P. A., Yevtushenko, M. Yu., & Sherman, I. M. (2008). *Fiziolohiia ryb*. Kyiv: Ahrarna osvita.
3. Wrona, F. G., & Cash, K. J. (1996). The ecosystem approach to environment assessment: moving from theory to practice. *J. Aquat. Ecosyst. Health*, 5, 89-97.
4. Malinin, O., Kutsan, O., Shevtsova, H., & Semerina, O. (2003). Mikotoksykologichnyi monitorynh kontsentrovanykh kormiv lisostepu Ukrainy. *Tvarynnytstvo Ukrainy*, 12, 26-28.
5. Popova, S. A., Skoptsova, T. I., & Losyakova, E. V. (2017). Mikotoksiny v kormakh: prichyny, posledstviya, profilaktika. *Izvestiya velikolukskoy GSKhA*, 1, 16-23.
6. Osullivan, D. (2005). Mikotoksiny – besshumnaya opasnost'. *Kombikorma*, 5, 54-56.
7. Gogin, A. (2005). Mikotoksiny: effektivnyy kontrol' – effektivnoe proizvodstvo. *Kombikorma*, 2, 68-69.
8. Dvorska, Yu. Ye. (2013). Mikotoksiny v kormakh ptytsi: otsinka ryzyku. *Ahrarnyi visnyk prychnomoria*, 68, 62-69.
9. Dvorskaya, Yu., Donets, V., & Kuz'menko, S. (2008). Mikotoksiny opasny dlya sviney. *Tvarynnytstvo Ukrainy*, 5, 14-15.
10. Kotyk, A. M., Trufanova, V. O., Ledneva, O. L., & Andriienko, O. M. (2004). Efektyvnist preparatu "Mikosorb" (Alltech) v umovakh periodychnoi kontaminatsii kormiv mikotoksynamy. *Efektivne tvarynnytstvo i ptakhivnytstvo*, 1, 46-49.
11. Adams, Nik (2020). Effektivnost' odnoremennogo svyazyvaniya neskol'kikh mikotoksinov razlichnymi adsorbentami v usloviyakh modeli zheludochno-

- kishechnogo trakta *in vitro*. *Zhivotnovodstvo Rosii*, 7, 56-60.
12. Surmach, V. N., Kovalevskiy, V. F., & Sekhin, A. A. (2011). Adsorbent mikotoksinov "Mikosorb™" — effektivnaya zashchita kombikormov dlya tsyplyat-broylerov. *Aktual'nye problemy intensivnogo razvitiya zhivotnovodstva*, 14(1), 17-25.
  13. Surmach, V. N., Kovalevskiy, V. F., & Sekhin, A. A. (2010). Kormovaya dobavka «Mikosorb» v kormlenii doynykh korov. *Sel'skoe khozyaystvo — problemy i perspektivy: sbornik nauchnykh trudov*, 1, 213-220.
  14. Syrovatko, K. M., & Zotko, M. O. (2020). *Tekhnolohiia kormiv ta kormovykh dobavok: navchalnyi posibnyk*. Vinnytsia: VNAU.
  15. Zheltov, Yu. O. (2003). Metodichni vказivki z provedennya doslidiv po godivli rib. *Rybne gosподarstvo*, 62, 23-28.
  16. Pravdin, I. F. (1966). *Rukovodstvo po izucheniyu ryb (preimushchestvenno presnovodnykh)*. Moskva: Pishchevaya promyshlennost'.
  17. Limanskiy, V. V., Yarzhombe, A. A., Bekina, E. N., & Andronikov, S. B. (1984). *Instruktsii po fiziologo-biokhimicheskim analizam ryb*. Moskva: VNIIPRH.
  18. *European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes*. (1986). Strasbourg, 18/03/1986. ETS No.123.
  19. Stal'naja, I. D. (1977). Metod opredelenija dienovoj kon'jugacii nenasyshennykh vysshih zhirnih kislot. *Sovremennye metody v biohimii*, 63-64.
  20. Korobejnikova, E. N. (1989). Modifikacija opredelenija produktov perekisnogo okislenija lipidov v reakcii s tiobarbiturovoj kislotoj. *Laboratornoe delo*, 7, 8-9.
  21. Dubinina, E. E., Sal'nikova, L. A., & Efimova, L. F. (1983). Aktivnost' i izofermentnyj spektr superoksiddismutazy jeritrocytov i plazmy krovi cheloveka. *Laboratornoe delo*, 10, 30-33.
  22. Koroljuk, M. A., Ivanova, L. I., & Majorova, I. G. Metod opredelenija aktivnosti katalazy. *Laboratornoe delo*, 1, 16-19.
  23. Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Anal. Biochem*, 72, 248-254.
  24. Plohinskij, H. A. (1969). *Rukovodstvo po biometrii dlja zootehnikov*. Moskva: Kolos.
  25. Kozhevnikov, Yu. N. (1985). O perekisnom okislenii lipidov v norme i patologii (obzor). *Voprosy meditsinskoj khimii*, 1, 2-7.
  26. Komarov, A. A., & Panin, A. N. (2003). *Mikotoksikozy zhivotnykh. Metodicheskoe posobie dlya professional'noj perepodgotovki rabotnikov predpriyatij APK*. Moskva: Pishchepromizdat.

ПАЗАРИТАРНІ ХВОРОБИ СИГОВИХ РИБ (ОГЛЯД)

А. В. Ващенко, andreaschenko@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Н. М. Матвієнко, mnarine73@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

І. А. Кравченко, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

А. І. Мрук, amruk@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати масив спеціальної літератури та узагальнити інформацію щодо основних розповсюджених паразитарних хвороб сигових видів риб.

Результати. Представлена робота містить характеристику основних паразитарних хвороб сигових риб з описом основних збудників, клінічних ознак хвороб та основних заходів профілактики для запобігання виникненню цих захворювань у господарствах, що спеціалізуються на вирощуванні сигів.

Практична значимість. Огляд може бути корисним як для науковців, які займаються проблемою акліматизації сигів на території України, так і для рибників, які вже задіяні у процесах розведення сигових риб в Україні та за її межами. Описи симптомів захворювань будуть корисними для попередньої діагностики останніх.

Ключові слова: сиви, паразити, ектопаразити, гельмінти, хвороби, іхтіободоз, триходіноз, хілодонельоз, іхтіофтиріоз, трихофтіріоз, хлоромікоз, ергазильоз, лернеоз, аргульоз, ротеоцефальоз, метехіноринхоз, диплостомоз.

PARASITIC DISEASES OF WHITEFISH (A REVIEW)

A. Vashchenko, andreaschenko@ukr.net, Institute of Fisheries of NAAS of Ukraine, Kyiv

N. Matvienko, mnarine73@ukr.net, Institute of Fisheries of NAAS of Ukraine, Kyiv

I. Kravchenko, Institute of Fisheries of NAAS of Ukraine, Kyiv

A. Mruk, amruk@ukr.net, Institute of Fisheries of NAAS of Ukraine, Kyiv

Purpose: To analyze the specialized literature and summarize the information on the main parasitic diseases of whitefish.

Findings: Whitefish are members of the Salmoniformes, which are currently represented by 3 subgroups (Salmonidae, Coregonidae, Thymallidae). Whitefishes are widespread species of fish in the subarctic and boreal zones of Europe, Asia and North America and are the most important components of the ecological system and valuable objects of local and industrial fishery. But these fishes are frequently affected by parasitic diseases. This article contains the description of most common parasitic diseases of whitefish and of the main causative agent, clinical signs of diseases,

© А. В. Ващенко, Н. М. Матвієнко, І. А. Кравченко, А. І. Мрук, 2021

and the main preventive measures to prevent the occurrence of these diseases in whitefish culture. Aquaculture of whitefish creates a competitive food production for one or two fattening seasons with their delicacy gastronomic benefits and high economic profitability. Products of whitefish are popular on external markets that is also a good motivation for improvement of the biotechnological development for various methods of cultivation of these valuable fish. However, with increasing amounts of production, transporting fish from one farm to another and crowded stocks of fish result in problems with diseases of different etiology. The above material describes main parasitic diseases that occur in whitefish including their main symptoms, which will help to identify them in time.

Practical value. Information on the main parasitic diseases of whitefish was systematized. Most of the parasitic diseases known to the whitefish are ectoparasitosis. These are ichthyobodosis (costosis), trichodinosis, chylodonellosis, ichthioftirioz, trichophthirioz and cruciformis. Proteocephalosis, acanthocephalosis, diplomystomosis are the most dangerous among helminths. The short characteristic of these diseases is described and the methods of prophylaxis of these diseases are suggested. The review can be useful both for scientists dealing with the problem of whitefish acclimatization on the territory of Ukraine and for fish breeders already engaged in the whitefish aquaculture in Ukraine and abroad. Descriptions of symptoms of diseases will be useful for preliminary diagnostics of diseases.

Key words: whitefish, parasites, ectoparasites, helminthes, diseases, ichthyobodosis, trichodinosis, chylodonellosis, ichthioftirioz, trichophthiriosis, chloromycosis, ergasilosis, lerneosis, argulosis, roteocephalosis, mechinorinchosis, diplostomosis.

ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ СИГОВЫХ РЫБ (ОБЗОР)

А. В. Ващенко, andreaschenko@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, г. Київ

Н. Н. Матвиенко, mnarine73@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, г. Київ

И. А. Кравченко, Інститут рибного господарства НААН, г. Київ

А. И. Мрук, amruk@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, г. Київ

Цель. Проанализировать массив специальной литературы и обобщить информацию об основных распространенных паразитарных болезнях сиговых видов рыб.

Результаты. Представленная работа содержит характеристику основных паразитарных болезней сиговых рыб с описанием основных возбудителей, клинических признаков болезней, и основных мер профилактики для предотвращения возникновения этих заболеваний в хозяйствах, специализирующихся на выращивании сигов.

Практическая значимость. Обзор может быть полезным как для ученых, занимающихся проблемой акклиматизации сигов на территории Украины, так и для рыбоводов, уже задействованных в процессах разведения сиговых в Украине и за ее пределами. Описания симптомов заболеваний будут полезными для предварительной диагностики заболеваний.

Ключевые слова: сиги, паразиты, эктопаразиты, гельминты, болезни, ихтиободоз, триходиноз, хилодонеллез, ихтиофтириоз, трихофтириоз, хлоромикоз, эргазилез, лернеоз, аргулез, ротеоцефалез, метехиноринхоз, диплостомоз.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

В Україні нараховується велика кількість озер та водосховищ, загальна площа яких складає близько 1 млн га, куди входить каскад дніпровських водосховищ — 675 тис. га, лимани — 15,6 тис. га, озера — 63,5 тис. га, водойми охолоджувачі — 15 тис. га, водойми Дністра та Сіверського Дінця — 36 тис. га

[1]. Малі водосховища характеризуються високим ступенем евтрофності та значним продукційним потенціалом, який недостатньо використовується в рибогосподарському відношенні, оскільки їхня іхтіофауна переважно представлена малоцінними та смітними видами риб.

Для реконструкції іхтіофауни цих водойм, з метою підвищення їхньої рибопродуктивності, доцільно вселяти швидкоростучі види риб із різним спектром живлення, що дозволить повніше використовувати природну кормову базу. Продукція сигових користується попитом й на зовнішньому ринку, що також є хорошим стимулом для удосконалювання біотехнічних розробок щодо розвитку різних методів культивування цих цінних риб [2, 3]. За сучасних ринкових умов пріоритетності набули випасні технології, основними об'єктами вирощування яких є планктоноідні риби. В Україні вирішення даної проблеми успішно проводиться за рахунок далекосхідних інтродуцентів — білого та строкатого товстолобиків. Проте сучасний ринок вимагає більш широкого асортименту риб з цінними харчовими якостями. Однією із перспективних для розведення є родина сигових [4].

АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Сигові входять до ряду *Salmoniformes*, на даний час представленого 3 підрядами (*Salmonidae*, *Coregonidae*, *Thymallidae*) [5–12]. Сигові риби є широко розповсюдженими в субарктичній та бореальній зонах Європи, Азії та Північної Америки видами та найважливішими компонентами екологічної системи та цінними об'єктами місцевого та промислового рибництва. Серед багатьох видів існують прохідні, напівпрохідні, озерні та річкові форми. За розташуванням рота і, відповідно, характером живлення виділяють 3 групи сигів: з верхнім ротом (ряпушки); з кінцевим ротом (тугун, пелядь, омуль); з нижнім ротом (чир, муксун, сиг звичайний) [13]. Довжина тіла різних представників родини коливається від 8 до 150 см, маса — від 5 г до 40 кг. Нерест у переважної більшості видів сигових відбувається восени або на початку зими, і тільки в прісній воді. У сига та ряпушки нерест відбувається ранньої весни під льодом [14]. Сигові види риб мають високі харчові якості та є дієтичним та делікатесним продуктом. Їх реалізація завжди приносить економічний прибуток.

Але, поряд з цим, потрібно враховувати і ризики за розведення сигів. Так, однією з проблем є паразитарні хвороби. Більшість паразитарних захворювань, відомих для сигів, відносяться до ектопаразитозів. Це іхтіободоз (костіоз), триходиноз, хілодонельоз, іхтіофтиріоз, трихофріоз та крустацеози. З гельмінтозів найбільш небезпечними є протеоцефальоз, акантоцефальоз, диплостомоз [15]. Коротка характеристика захворювань подана нижче.

Іхтіободоз (костіоз) широко розповсюджений у різних зонах рибництва, причому чутливими до нього є багато видів риб, особливо молодь.

Збудником є *Ichthiobodo necator* (*Costia necatrix*) що відноситься до родини *Bodonidae*. Це дуже маленький паразит розміром 8–15 мкм. Тіло у нього грушовидної форми, у центрі якого розташоване округле ядро. На передньому кінці знаходяться два досить довгих джгутики, за допомогою яких паразит може плавати. На передньому кінці (яким він приєднується до риби) сформовано пальцеподібні вирости, які входять в клітину господаря та висмоктують її вміст.

Розмножується паразит повздовжним поділом. Процес може відбуватися після появи другої пари джгутиків. Поза господарем паразити гинуть упродовж 1 год. За настання несприятливих умов, тіла їх округлюються і вони втрачають свою активність. Паразити живуть за температури 2–30°C; зниження показника рН не впливає на їхнє розмноження.

Іхтіободоз — захворювання, типове для ослабленої молоді практично всіх вирощуваних видів риб, найчастіше лососевих та сигових. Розвивається за неякісної годівлі та за несприятливих умов утримання риб. Виникненню захворювання сприяють підвищені щільності посадки, недостатній водообмін, забрудненість води органічними речовинами тощо. У ставових господарствах іхтіободоз частіше виявляють у нерестових ставах. В індустріальних господарствах захворювання може виникнути в будь-яку пору року.

Клінічні ознаки та патогенез: на боках тіла хворих риб утворюються плями, які в подальшому зливаються в суцільний сіруватий наліт. Часто спостерігається руйнування плавців. Процес починається з відмирання тканини між плавцевими променями, після чого вони оголюються. Уражені зябра набувають блілого забарвлення та вкриваються слизом. Внаслідок нестачі газообміну хворі мальки піднімаються до поверхні води, скупчуються на притоці, заковтують повітря.

Діагноз захворювання ставлять за результатами паразитологічного обстеження риби, на підставі знаходження паразитів в зішкребах з поверхні тіла та зябер.

Основним заходом з профілактики іхтіободозу є дотримання оптимальних умов під час вирощування молоді риб [16–22].

Триходиноз — протозойне захворювання з гострим перебігом, яке вражає шкіру, зябра й зрідка внутрішні органи (сечовий міхур, сечівники) коропа, сазана, карасів, амурів, товстолобиків, форелі та сигових видів риб.

Дане захворювання викликають круговійчасті інфузорії з родини *Trichodinidae* (клас *Oligohymenophora*, підклас *Peritricha*). Тіло інфузорії має тарілкоподібну форму діаметром 26–75 мкм з розташованим всередині округлим опорним диском, який складається з кільця хітиноїдних гачків різного розміру та форми. Макронуклеус підковоподібний, мікронуклеус округлий, і зазвичай, розташований поблизу макронуклеуса. Тіло оточене віночком вій, за допомогою яких інфузорії пересуваються на поверхні риби і плавають у воді. Розмножуються простим поділом. Швидкість розмноження інфузорій цієї групи залежить від температури води, в результаті чого їх можна розділити на теплолюбних, холодолюбивих і евритермних. Серед триходин ставових риб до теплолюбних відносяться *Tripartiella bulbosa* і *Trichodina nigra*, до холодолюбних — *Trichodina pediculus* і *T. domerguei f. acuta*, якими найчастіше й уражаються сигові. До евритермних видів відноситься *Trichodinella epizootica*.

До триходиніозу сприйнятливі різні види та різні вікові групи риб. Однак найбільш схильні до захворювання риби молодших вікових груп. У зв'язку з цим, дане захворювання дуже небезпечне у нерестових ставах та для вирощуваної на рибницьких заводах молоді. Дорослі риби, як правило, слугують джерелом інвазії та є носіями паразитів.

Збудники поширюються із зараженою рибою або з водою, в якій триходини

можуть досить довго плавати. Поза тілом господаря триходини можуть жити до 1 доби.

Тіло уражених риб за даного захворювання вкривається білуватим слизом, кількість якого залежить від кількості паразитів. Чим більше паразитів знаходиться на рибі, тим більше слизу на поверхні її тіла. Сильно уражені риби занепокоєні та тримаються поблизу притоку, ополонок, заковтують повітря.

Вважається, що триходини можуть виділяти ферменти, які розчиняють цитоплазму клітин господаря. Встановлено, що *Trichodina nigra*, яка прикріплена до кінців респіраторної складки, руйнує епітелій. З уражених капілярів витікає плазма та формені елементи крові. Рясне виділення слизу ускладнює газообмін та порушує дихальні функції зябер. Не виключено, що патогенний вплив зумовлено всмоктуванням в організм господаря продуктів розпаду відмерлих тканин. Зокрема, на пошкоджених ділянках можуть селитися різні хвороботворні та сапрофітні мікроорганізми, які ускладнюють перебіг хвороби.

Діагноз захворювання ставлять на підставі знаходження великої кількості збудників в зішкребах з поверхні тіла та зябер [16–22].

Хілодонельоз — протозойна хвороба риб, яку викликають найпростіші одноклітинні організми — інфузорії родини *Chilomidodontiidae*.

Це захворювання викликає значну загибель цюголіток у зимувальних ставах навіть у тих регіонах, де період зимівлі триває 6–7 міс.

Тіло хілодонел стиснуте, округле (*Ch. hexasticha*) або серцевидне (*Ch. piscicola*). *Ch. piscicola* досягає довжини 45–70 мкм, ширини 38–57 мкм, *Ch. hexastichus* має довжину 32–86 та ширину 26–66 мкм. Тіло вкрите поздовжніми рядами війок та має на черевному боці ближче до переднього кінця округлий цитостом. Цитостом веде у довгий канал — глотку, стінки якої мають підтримувальний апарат, який складається з 16–20 паличок, добре помітних як на нативних, так й на забарвлених препаратах. Паразит повзає по тілу риби та живиться за рахунок клітин епітелію, в які встромляє паличковий апарат, що здатний вивертатися через ротовий отвір. У середині тіла паразита розрізняють яйцевидне ядро (макронуклеус), ядерце (мікронуклеус) та 2 скорочувальні вакуолі.

Розмноження хілодонели відбувається поділом навпіл у поперечному напрямку.

Статевий процес у хілодонели не простежено, хоча низкою учених відзначено, що у паразита спостерігається кон'югація. За несприятливих умов паразит може утворювати цисти спокою. Утворені цисти зберігаються впродовж тривалого часу на дні водойми або у товщі води до часу, коли для паразита знову створюються сприятливі умови. Встановлено, що світло лімітує розмноження хілодонел.

Збудник захворювання зустрічається у дуже багатьох прісноводних риб, як у молоді, так і у дорослих, в усі сезони року. Однак захворювання частіше виявляють в ослабленої з будь-яких причин риби. Молодь лососевих та сигових хворіє частіше влітку — в несприятливий для цих холодолюбних риб сезон. Вирішальний вплив на чисельність хілодонели виявляє фізіологічний стан, та в

першу чергу, вгодованість риби. Встановлено, що особливо сильно бувають уражені риби з низькою вгодованістю. У результаті голодування настає відмирання клітин шкірного епітелію, які і є найбільш сприятливим субстратом для паразитів.

Це захворювання, зазвичай, спочатку виникає у слабо вгодованих цьогорічок, у подальшому відбувається ураження і добре вгодованих риб, що може викликати і їхню загибель.

За важкої форми хілодонельозу на поверхні тіла риби з'являється блакитно-сірий наліт. Особливо добре такий наліт виражений на поверхні голови. Його поява пов'язана з подразненням шкіри, яке викликається великою кількістю хілодонел, що супроводжується посиленням слизовиділенням. Під час перегляду під мікроскопом зішкребу з тіла риби навіть за малого збільшення можна помітити десятки паразитів. За інтенсивного зараження риби поводяться неспокійно, піднімаються до поверхні, слабнуть, легко ловляться сачком та навіть руками. Після того, як кількість хілодонел долає критичну межу, однорічки вискакують з води та падають назад у воду. Цей симптом дуже характерний для хілодонельозу, що пояснюється порушенням шкірного дихання, яке у молоді риб відіграє значну роль у загальному дихальному процесі.

Патогенний вплив паразитів виявляється у порушенні дихальних функцій поверхні тіла та зябер, внаслідок сильного їх пошкодження.

Діагноз ставлять на підставі клінічних ознак та за виявлення великої кількості інфузорій в зішкребах з поверхні тіла та зябер.

Важливим заходом попередження масового захворювання є створення сприятливих умов, які стимулюють ріст та розвиток риби, добра вгодованість підвищує опірність до захворювання. Зокрема, в першу чергу важливо забезпечити риб повноцінними кормами.

Для запобігання розповсюдженню паразитів, рибу перед зимівлею слід провести через антипаразитарні ванни.

Для знищення цист паразитів ложе ставів після проведення зимівлі необхідно дезінфікувати негашеним або хлорним вапном [16–22].

Іхтіофтиріоз — захворювання багатьох прісноводних риб. Він широко поширений у ставових, індустріальних, нерестово-виросщувальних господарствах та на рибницьких заводах. Є відомості щодо виникнення іхтіофтиріозу за певних умов і у природних водоймах. Часто викликає масову загибель риб.

Збудником захворювання є війчасті інфузорії *Ichthyophthirius multifiliis*. Тіло паразита округле, діаметром до 1 мм. На його поверхні розташовуються ряди війок. Макронуклеус великий, підковоподібний, у молодих форм витягнутий. До макронуклеусу прилягає невеликий мікронуклеус. Є численні скоротливі вакуолі. Паразит живе під епітелієм шкіри та зябер господаря. Від інших інфузорій відрізняється тим, що розмноження відбувається поза тілом господаря.

Зрілі паразити (трофонти) розривають епітеліальний горбок, під яким знаходяться та потрапляють у воду. Опустившись на дно, вони приклеюються до різних підводних предметів. Після цього навколо паразита утворюється ніжна драглиста циста, під якою відбувається багаторазовий поділ на 2. Після

закінчення поділу з одного трофонта утворюється до 2 тис. дочірніх клітин, які називаються бродяжками. Спочатку бродяжки мають округлу форму, потім сигароподібну. За допомогою ферменту бродяжки розчиняють стінку цисти та виходять у воду, де плавають за допомогою війок. За потрапляння на рибу, бродяжки проникають під епітелій, де ростуть та дозрівають. Бродяжки, які не знайшли рибу, гинуть. Тривалість життя бродяжок у воді — до 2 діб. Найбільш сприятливою температурою для розвитку іхтіофтиріусів вважається 21–26°C. Зі зниженням температури розвиток уповільнюється, за її підвищення — прискорюється.

За несприятливої температури води (менше 1,5 і вище 32,0°C) поділ паразитів може відбуватися незвичайним способом. Зрілі трофонти виходять з епітеліального горбка, але не залишають рибу. Вони утворюють нетипові цисти а починають в них ділитися амітотично, утворюючи 4, іноді 8, 16 дочірніх особин, що нагадують за формою материнську, але меншого розміру. За цих же температур у іхтіофтиріусів описаний статевий процес за типом кон'югації.

До захворювання сприйнятливі всі види прісноводних риб різних вікових груп. Найбільш патогенний паразит для молоді, однак є випадки загибелі і палідників. У перехворілих риб виробляється постінвазійний імунітет. Важкі епізоотії частіше спостерігаються у господарствах, де раніше захворювання не відзначалося. Поширюється воно під час перевезення риб, а також з водою із джерела водопостачання, де мешкають заражені паразитом малоцінні види риб. Спалахи захворювання відзначають навесні та на початку літа і у зимувальних ставах.

За незначного ураження риб паразитів можна виявити при мікроскопії зішкребів з поверхні та зябер. За сильного зараження великих паразитів добре видно у вигляді невеликих білих горбків («манка»). У разі сильного зараження з хворої риби сходять епітелій, риби задихаються, йдуть до притоку і гинуть. Після захворювання іхтіофтиріозом риби набувають імунітету, який зберігається до 8 місяців.

Діагноз ставлять на підставі клінічних ознак та виявлення в зішкребах паразитів.

Основою боротьби з іхтіофтиріозом є профілактика. Крім загальних заходів, рекомендується утримувати плідників та ремонтних особин окремо від молодших вікових груп, ретельно осушувати стави та дезінфікувати їхнє ложе, не допускати потрапляння до них смітної риби. У господарствах, стаціонарно неблагополучних за іхтіофтиріозом, рекомендується переходити від природного нересту до заводського способу отримання потомства.

Лікувати хворих риб складно з тієї причини, що паразит надійно захищений від дії лікувальних речовин, оскільки перебуває під епітелієм господаря. Тому основні заходи боротьби ґрунтуються на знищенні вільноплаваючих форм паразита — бродяжок, які легко піддаються впливу хімічних речовин, які вносять у водойми [16–22].

Трихофріоз. Збудником захворювання є *Trichophrya piscium*, яка локалізується на зябрах риб. Тіло трихофрій мішковидної асиметричної форми. Сисні щупальця розташовуються на передньому та задньому кінцях тіла,

прикріплюються за допомогою особливої секреції. Розмножуються шляхом множинного зовнішнього та внутрішнього брунькування.

Ці паразити зустрічаються на зябрах різних видів риб, як в Євразії, так і у Північній Америці, в американського сомика, чорного американського окуня, молоді лососевих, сигових видів риб, звичайного окуня, у білого та чорного амурів, амурської щуки, краснопірки, товстолобиків та ін. Захворювання відзначені у Китаї, Чехії, Росії.

У риб з великою кількістю паразитів змінюється забарвлення зябер. Так, у сигових уражені зябра стають блідо-рожевого з жовтувато-помаранчевим відтінком кольору. Припускають, що паразити можуть висмоктувати кров із зябрових судин.

Заходів боротьби з даним захворюванням не розроблено [16–22].

Хлоромікоз, або жовтяниця форелі є досить рідкісним захворюванням. Було вперше відзначене у Франції. Відоме також у США. У Росії спалах захворювання спостерігався в одному форелевому господарстві Ленінградської області та на деяких лососевих заводах Північного-Заходу Росії.

Рід *Chloromyxum* — типові порожнинні паразити. Зустрічаються у сечовому та жовчному міхурах, у сечових каналцях нирок і сечоводів. Вегетативні стадії — плазмодії різної форми. Форма спор сферична або близька до неї, з 4 капсулами, розташованими на одному полюсі. Іноді одна пара полярних капсул більша, ніж інша. Стулки спор гладкі або забезпечені реберцями.

Хворобу викликають мікроспориції *Chloromyxum truttae*, які паразитують у жовчних протоках печінки та порожнині жовчного міхура.

Амебоїди — невеликі, неправильної або округлої форми тільки діаметром 40–70 мкм. Спори дрібні, округлі, діаметром 10 мкм. На одному з полюсів розташовуються 4 дрібні жалкі капсули. Стулки спор товстостінні, забезпечені поздовжніми реберцями. Дозрілі спори з жовчю потрапляють у кишечник риби і з екскрементами виносяться у воду, де стають джерелом нового зараження.

Відомо, що господарями *Ch. truttae* можуть бути райдужна та струмкова форелі, а також американська паляя. Однак захворювання описано тільки у струмкової форелі. Згідно зі спостереженнями російських вчених, хвороба проявляється у плідників у переднерестовий та нерестовий періоди, пізньої осені та на початку зими. Спалах захворювання може завдати великої шкоди рибному господарству, спричиняючи упродовж короткого періоду загибель значної частини стада плідників.

У риб, сильно уражених паразитом, спостерігається гостре запалення кишечника. Екскременти набувають жовто-бурого кольору. Риби перестають брати корм та худнуть. Поступово плавці та окремі ділянки тіла забарвлюються у жовтий колір.

Під час розтину хворої риби спостерігається зміна кольору печінки на сірувато-рожевий та збільшення жовчного міхура, який переповнений жовтувато-червоною жовчю. Патогенний вплив паразита проявляється у порушенні діяльності жовчного міхура, печінки та кишечника.

Діагноз ставлять на підставі клінічних та патологоанатомічних ознак та за виявлення спор збудника в жовчному міхурі.

Заходи боротьби розроблені недостатньо. Рекомендуються спуск та дезінфекція ложа неблагополучних ставів негашеним або хлорним вапном, виведення їх на літування, під час якого спори гинуть. За перевезення риби з одного господарства до іншого слід ретельно дослідити жовч, та в разі виявлення збудника не дозволяти вивезення риби з ураженого господарства. Ікра допускається до вивозу [16–22].

Крустацеози — це група хвороб риб, збудниками яких є представники типу членистоногих (*Arthropoda*), класу ракоподібних (*Crustacea*).

Ракоподібні різностатеві, із вираженим статевим диморфізмом. Насінники та яєчники парні. Чоловічі статеві продукти виділяються у вигляді сперматофорів (пачок склеєних сперматозоїдів, укладених в оболонку), які самці приклеюють до статевих отворів самок.

Ракоподібні, які паразитують у риб, відносяться до трьох родин: *Copepoda* (веслоногі), *Branchiura* (зяброхвости) і *Isopoda* (рівноногі). Запліднені яйця *Copepoda* виношують в яйцевих мішках, що відходять від статевих отворів. Зяброхвости приклеюють яйця до підводних предметів, рівноногі — до кінцівок самок.

Для сигових видів риб найбільшу небезпеку являють збудники ергазильозу, лернеозу та аргульозу.

Збудники **ергазильозу**, що паразитують на зябрах прісноводних риб, відносяться до родини *Ergasilidae* та широко розповсюджені у водоймах. Найчастіше зустрічаються *Ergasilus sieboldi* і *E. briani*. Однак захворювання викликають в основному *E. sieboldi*.

Статевозріла самка *E. sieboldi* має грушоподібне тіло, довжиною 1,0–1,5 мм, з розширеним переднім та звуженим заднім кінцем. Перший грудний сегмент злитий з головним; є 5 пар плавальних ніжок. Кіготь у *E. sieboldi* довший, ніж у *E. briani*; на статевому сегменті *E. sieboldi* є дрібні шипики, а у *E. briani* їх немає.

Розвиток *E. sieboldi* і *E. briani* проходить майже однаково. Статевозріла самиця, як і усі представники родини *Copepoda*, має 2 яйцевих мішки. В кожному мішку *E. sieboldi* по 100–110, у *E. briani* 18–20 яєць. Тривалість ембріонального розвитку — 6 діб за температури води 20°C та 3,5 доби за 25°C. Яйцеві мішки формуються з квітня по вересень при температурі води не нижче 14°C. Самці живуть близько 2 тижнів, потім гинуть, а самиці заносяться з водою у зяброву порожнину риб, на зяброві пелюстки, де закріплюються за допомогою антен. За сприятливих умов упродовж 3 тижнів самиці дають два покоління личинок. Живляться ергазильози зябровою тканиною та кров'ю господаря.

Обидва види рачків характеризуються слабо вираженою специфічністю та паразитують у більшості видів прісноводних видів риб, представників родин коропових, окуневих, лососевих, тукових та ін. Особливо схильні до ураження сигові риби, зокрема, пелядь, чудський сиг, також лин, лящ, щука.

Спалахи захворювання відбуваються головним чином влітку, у липні–серпні, однак іноді і восени. Самиці, що прикріпилися в кінці вегетаційного сезону,

розмножуються тільки навесні наступного року.

Обидва види рачків в основному локалізуються на зябрових пелюстках риб: *E. sieboldi* на їх зовнішній стороні, *E. brianii* — між пелюстками. Іноді обидва види паразитують одночасно. У пеляді за високої інтенсивності зараження паразити прикріплюються також біля основи парних плавців, навколо ануса та очей. Прикріплений до зябрових пелюсток, паразит деформує та розриває їх, стискує судини та спричиняє їх закупорювання. У заражених риб відзначають підвищене слизоутворення, руйнування та некроз зябрової тканини. Пошкоджена ділянка бліда, на ураженому місці з часом може розвинути сакпролегнія.

Навіть за високих рівнів зараження загибелі риб виявлено не було, однак спостерігається негативний вплив рачків на риб. У хворій риби знижується темп росту, а маса зменшується приблизно вдвічі. Погіршується якість м'яса за рахунок зниження кількості жиру з 15 до 3,8%. Деякі самиці після хвороби стають яловими. Таким чином, ергазильоз становить серйозну загрозу рибицтву.

Діагноз захворювання ставлять на підставі клінічних, епізоотологічних даних і мікроскопічного дослідження риби.

Заходи боротьби: перш за все, запобігання потраплянню збудників у водойми. Для цього проводять заходи загального санітарно-профілактичного комплексу. Особливо важливий ретельний контроль за перевезеннями риби з метою недопущення заражених особин у водойми [16–22].

Лернеоз викликається самками паразитичних рачків з роду *Lernaea*. Характерною ознакою видів цього роду є будова прикріпного органу, розташованого на головному кінці. Він має вигляд хітинових гіллястих виростів, або «якоря», за допомогою якого паразит утримується на тілі риби. Будова якоря дуже мінлива та значною мірою залежить від виду господаря. Збудник — *Lernaea cyprinacea* Linne (1758). Реєструється у ставових коропово-пеляжних господарствах. Рачки зустрічаються на поверхні тіла всіх вікових груп пеляді.

Довжина статевозрілої самки *L. cyprinacea* без яйцевих мішків — 10–16 мм. Головний кінець її забезпечений двома парами виростів. Довжина дорзальних виростів — 4,0–5,6 мм, вентральних — 2,0–2,8 мм.

Лернеї розвиваються без участі проміжного господаря. Личинки тимчасово живуть на шкірі або зябрах різних видів риб, не проявляючи специфічності. Розвиток рачка супроводжується складним метаморфозом, який включає 3 наупліальні та 5 копеподитних стадій. Оптимальна температура розвитку 23–30°C. Зимують паразити, прикріплюючись до риби.

У водойми з рибою паразити потрапляють з водою із водопостачальних ставів та інших джерел водопостачання, населених рибами. Рачки поширені повсюдно, проте захворювання спостерігається переважно у південних районах країни.

На тілі риб паразит за допомогою твердих головних виростів закріплюється в м'язовому шарі. На місці прикріплення паразита утворюється глибока виразка, абсцес. Краї виразки яскраво-червоного кольору, іноді сіруваті, різко обмежені від здорової тканини. Перебіг процесу може бути ускладнений вторинною мікрофлорою. Запальний процес захоплює поверхневі шари та м'язову тканину.

Під час проникання через епідерміс у дерму, паразит може досягати шару скелетної мускулатури. У місці його проникнення у риби розвивається запалення.

Діагноз ставлять на підставі клінічних даних та виявлення рачків. У мальків загибель настає при паразитуванні 2–3 рачків, інтенсивність інвазії у цьоголіток — від 14 рачків до 80 у тріліток на одну особину.

Вивезення риби з неблагополучних за лернеозом водойм забороняється. Для профілактики здійснюється весь комплекс загальних оздоровчих заходів: недопущення в господарство ураженої риби; встановлення фільтрів на водопостачальних системах, що запобігає проникненню личинок стадій рачка; роздільне вирощування молоді та риб старших вікових груп. Навесні рекомендується витримувати протягом 1 тижня залитий став без риби: в результаті личинки паразита, які проникли туди, гинуть без господаря на 4–5-й день [14–20].

Аргульоз — поширена хвороба риб як штучних, так природних водойм, особливо у південних регіонах. Збудник — *Argulus foliaceus* Linne (1758). Часто зустрічається за штучного розведення пеляді.

Аргулюси — великі рачки, що досягають довжини 4–12 мм. Тіло широке, овальної форми, сплюснене, сірувато-зеленого кольору.

Навесні за температури 10–14°C самиці починають відкладати яйця, прикріплюючи їх до різних підводних предметів. У кожній кладці кількість яєць може бути різною — від декількох штук до декількох сотень. Тривалість подальшого розвитку залежить від температури. Терміни ембріонального розвитку коливаються від 15 до 55 діб. За підвищення температури води швидкість розвитку ембріонів в яйцях збільшується. Личинки протягом 2–3 діб плавають у воді і, зустрівши рибу, прикріплюються до неї на поверхні тіла та зябер. Личинка, яка за цей час не прикріпилася до риби, гине. Рачки ростуть та розвиваються на рибі та за 15–18 діб досягають статевої зрілості. Тривалість циклу розвитку рачків залежить від температури. За температури 10–20°C розвиток закінчується через 70–100 діб, при температурі 20–28°C — через 50–65 діб. Восени за температури 8–10°C розвиток рачка припиняється і він залишається на рибі до весни. За підвищення температури води він продовжує розвиватися. У різних кліматичних зонах рачки за літо можуть давати 2–3 покоління. Яйця паразита нестійкі до висихання.

Найбільш небезпечні вони для молоді риб. Старші вікові групи риб слугують джерелом інвазії.

Аргулюси — теплолюбні паразити, причому найбільшу небезпеку вони становлять у теплу пору року.

Прикріплений до тіла риби, аргюлюс хоботком проколює шкіру і смочє кров. На місці проколу можуть утворюватися ранки, через які в організм риби може проникати інфекція.

Діагноз ставлять на підставі клінічних ознак та виявлення збудників у зішкребах з поверхні тіла.

Для профілактики аргульозу не допускається спільне утримання старших вікових груп риб та молоді.

Обмежити чисельність аргулюсів можна шляхом встановлення щитів, на яких рачки відкладають яйця. Через 2 тижні після установки їх виймають з води, очищають від кладок яєць аргулюсів та просушують упродовж доби. Потім їх встановлюють знову. Під час просушування щитів яйця рачків гинуть [16–22].

Протеоцефальоз. Збудник — *Proteocephalus exiguus*, *P. longicollis* Zeder (1880). Захворювання характерне для цьоголіток пеляді. Ураження молоді пеляді відбувається у червні, коли мальки переходять на живлення циклопами (перший проміжний господар стрічкового гельмінта).

Гельмінти паразитують у кишечнику. Черви білого або світло-сірого кольору довжиною від декількох міліметрів до 20 см. Сколекс округлої форми з чотирма простими присосками. На його вершині може перебувати п'ята тім'яна присоска або її рудимент, рідше залозистий орган. Стробіла з чітким розчленуванням.

Цикл розвитку протікає з одним або двома проміжними господарями. Першими проміжними господарями є безхребетні ракоподібні, — представники родів *Cyclops*, *Eucyclops*, *Macroscyclops*, *Mesocyclops* та ін. Риби заражаються під час поїдання інвазованих рачків. У кишечнику остаточних господарів гельмінти стають статевозрілими у літній період через 1,5–2,0 міс.

Протеоцефальоз відзначають у природних водоймах, в основному у великих озерах у сигових риб, де він виникає у весняно-літню пору року. *Proteocephalus exiguus* найчастіше виявляють у водоймах, в яких ці риби є аборигенами. Захворювання вражає всі вікові групи риб. Найбільш небезпечно воно для молоді сигових. Можлива загибель через закупорювання кишечника гельмінтами. Сигові риби, які є бентофагами (чир, муксун та ін.), після переходу на живлення бентосом меншою мірою заражаються цим захворюванням, ніж сигові, які живляться планктоном.

Риби, заражені восени, залишаються інвазованими до весни наступного року та після чергового відкладання яєць гельмінти елімінуються з кишечника. Джерелом інвазії є заражені риби та циклопи.

Хворі риби тримаються у поверхневому шарі води та на мілководді. Риба малоактивна, виснажена. У неї знижуються харчова активність та вгодованість. Зябра та слизові оболонки анемічні, луска матова. Зокрема спостерігається деяке збільшення об'єму черевця.

Гельмінти, накопичуючись у великій кількості, спричиняють механічний вплив на стінки кишечника, відбувається закупорювання його просвіту та непрохідність харчової грудки. У місцях прикріплення цестод виникають виразки, порушується цілісність судин.

Патологоанатомічні зміни залежать від інтенсивності інвазії. За високого ступеня зараження (50–100 екз.) стінка кишечника запалюється, потоншується, легко розривається. У печінці та нирках виявляють зміни, характерні для хронічної інтоксикації.

Діагноз ставлять на підставі епізоотологічних та клінічних даних з урахуванням результатів розтину риб та видового визначення виявлених у кишечнику гельмінтів.

З метою запобігання поширенню цього захворювання забороняється

вивозити всі види риб та безхребетних з неблагополучних за протеоцефалозом водойм.

З метою профілактики захворювання у неблагополучних озерах спільно з пеляддю вирощують сигових-бентофагів, а також риб, несприйнятливих до даного захворювання (короп, сазан, товстолобик тощо), або зариблюють однорічками сигових видів риб [16–22].

Метехіноринхози лососевих. Збудники — скреблянки з родини *Echinorhynchidae* (*Metechinorhynchus salmonis* і *M. truttae*).

Збудник *M. salmonis* має тіло веретеноподібної форми, масивне, розширене у передній частині; хоботок майже циліндричний, завжди зігнутий під тупим кутом до осі тіла.

Проміжними господарями у обох видів паразитів є рачки-бокоплави. Проміжним господарем *M. salmonis* є реліктовий рак *Pontoporeia affinis*, *M. truttae* — *Gammarus pulex*. Остаточні господарі — лососеві та сигові види риб.

Інтенсивність інвазії багатьох видів риб буває дуже високою. Сиги заражаються *M. salmonis* з 3-річного віку, під час переходу на живлення бентосом. *M. truttae* виявлений у різних лососевих, у тому числі у форелі, яка вирощувалась у ставках.

Навколо хоботка відзначається сильне розростання сполучної тканини. Стінка кишечника в ушкодженному місці помітно потовщується, відбувається відкладення вапна (петрифікація), кишечник перестає поглинати перетравлену їжу. Іноді стінка задньої кишки натискає на яйцепровід та робить його непрохідним, в результаті чого відбувається резорбція ікри та загибель риби. При інтенсивності інвазії понад 100 паразитів гіперемію кишечника можна помітити вже при розтині риб. В окремих випадках спостерігається розрив стінок кишечника.

Діагноз ставлять на підставі патологоанатомічного розтину, виявлення гельмінтів та встановлення їх видової належності.

Заходи боротьби з метехіноринхозом повинні бути спрямовані на запобігання потраплянню збудника у господарства [16–22].

Диплостомози широко розповсюжені захворювання риб, викликані метацеркаріями трематод роду *Diplostomum*.

У чистому вигляді зустрічаються рідко, значно частіше вони утворюють асоціації з декількох форм диплостомозів — комбіновані диплостомози.

Диплостомози значно поширені, як у природних водоймах, так і у рибницьких господарствах. Диплостомоз виявляється у двох формах.

Перша, найбільш поширена (хронічна) форма, — паразитарна катаракта, яка проявляється у помутнінні кристалика під впливом метацеркаріїв паразита, які знаходяться у ньому.

Друга форма (гостра) — церкаріозний диплостомоз, що виникає у момент проникнення церкарій паразита у рибу.

Метацеркарії локалізуються в оці риб, в основному у кристалику,

склоподібному тілі, а також між склерою та ретиною. Тіло метацеркарія овальне, прозоре, розміром до 0,5 мм.

Життєвий цикл трематод роду *Diplostomum* складний та протікає за участю трьох господарів: проміжних — моллюски *Lymnaeidae*; додаткових — риби і круглороті, та остаточних — рибоїдні птахи, переважно чайки та качки.

Диплостомозами уражаються всі види прісноводних та прохідних риб, але найбільш сприйнятливі до них лососеві, сигові, осетрові та більшість коропових риб. Найбільшу небезпеку вони становлять для личинок, мальків та цьоголіток.

Потенційно неблагополучними за диплостомозом можуть бути всі водойми, в яких мешкають ставковики, та які, хоча б зрідка, відвідуються рибоїдними птахами — чайками, крячками та качками.

Зараження риб відбувається у теплу пору року за температури води понад 7–10°C. З віком зараженість риб зростає, хоча приживлюваність церкарій у дорослих риб значно нижче, ніж у молоді. Найбільш схильні до захворювання форелі, сиби, пелядь, з коропових — товстолобики, тобто риби, що живуть у товщі води. Відзначено випадки диплостомозу у пеляді в озерах та у форелі, вирощуваної у садках, встановлених поблизу берега.

Температура істотно впливає на швидкість розвитку паразитів у моллюсках. З її підвищенням збільшується вихід церкарій з моллюсків та посилюється їхня активність.

За гострої форми диплостомозу спостерігаються різні відхилення у поведінці риб, пов'язані з актом прикріплення та проникнення церкарій у рибу (підвищене занепокоєння, відмова від їжі; характерні різкі стрибки, під час яких риба прагне потертися об різні предмети; енергійні рухи тіла, що нагадують реакцію струшування). Відзначають також появу комплексу ознак, що викликаються міграцією паразита у рибі та ураженням кровоносної (окремі крововиливи на ділянці зябрових кришок та біля основи плавців, великі синці в очах та у головному мозку) та центральної нервової систем (порушення координації рухів, зміна забарвлення тіла, прискорений ритм руху зябрових кришок, відсутність реакції на зовнішні подразники) та летальні випадки без очевидних причин. Смерть можуть викликати поодинокі особини церкарій, що опинилися в ході міграції у головному мозку риби.

За хронічної форми диплостомозу спостерігається часткове або повне помутніння кришталика (паразитарна катаракта), а за високої інтенсивності інвазії — розрив капсули кришталика та, як наслідок цього, звуження зіниці до точкових розмірів, деформація рогівки. У риб знижується темп росту, порушується жировий обмін.

Попередній діагноз ставлять на підставі клінічних ознак та виявлення інвазійних метацеркарій у кришталиках з визначенням їх видової приналежності.

Надійних методів терапії при диплостомозах риб не існує. Тому всі заходи боротьби з цими захворюваннями зводяться до скорочення чисельності збудників на паразитичних та вільноживучих стадіях розвитку з урахуванням специфіки їх життєвих циклів. Вони полягають у боротьбі з остаточними (рибоїдні птахи) та проміжними (моллюски) господарями збудників. Боротьба з рибоїдними птахами

ведеться шляхом скорочення чисельності чайок, крячок та качок, якщо ці види не занесені до Червоної книги, або їх відлікуванням.

Боротьба з моллюсками здійснюється хімічним та біологічним методами [16–22].

Пісцикольоз риб. Захворювання викликає п'явка *Piscicola geometra*, яка паразитує на тілі риб. Тіло у неї циліндричне, довжиною до 35 мм, шириною до 3 мм. На передньому кінці тіла міститься присоска, на якій розташовані 2 пари очей. Задній кінець тіла забезпечений присоскою, краї якої виходять за межі тіла. Забарвлення п'явок сильно варіює залежно від забарвлення тіла риб, на яких вони паразитують. Зазвичай *P. geometra* має тіло буро-оливкового або зелено-сірого кольору. Розвиток п'явок прямий, відбувається без участі проміжного хазяїна. Влітку п'явка відкладає кокони на дно водойми, водорості та інші підводні предмети, іноді на берег, в сирий ґрунт. Кокони вкриті щільною оболонкою і мають довжину 1,50 мм, ширину — до 0,75 мм. У другій половині літа з коконів виходять молоді п'явки, які нападають на рибу.

Захворювання вперше зареєстровано у період акліматизації пеляді у Прибалтиці. *P. geometra* поширена майже в усіх водоймах по всій території Європи та Азії у багатьох видів риб. П'явки зазвичай паразитують на поверхні тіла та плавцях, а також у ротовій та зябровій порожнинах. Хворі риби неспокійно плавають, труться об береги. За високої інтенсивності зараження спостерігається сильне схуднення риби. Присавшись до тіла риби, п'явка руйнує шкірні покриви та викликає утворення невеликих виразок, що часто кровоточать. У місцях ураження поселяються бактерії та гриби, які обтяжують перебіг захворювання.

Діагноз ставлять на підставі клінічних ознак та за виявлення збудника.

Профілактика пісцикольозу передбачає обов'язкове виконання загальних санітарно-профілактичних та рибницько-меліоративних заходів. Особливо важливо своєчасно знищувати водну рослинність, до якої прикріплюються кокони. Присутність п'явок у ставках — ознака занедбаності господарства, оскільки надлишок жорсткої рослинності, до якої приклеюються кокони, та засміченість ставів сприяють масовому розмноженню паразитів [16–22].

Таким чином, підсумовуючи вищесказане, можемо відмітити, що сигові схильні до захворювань, характерних і для інших родин риб, — коропових та лососевих. Захворювань, властивих тільки для сигів, які можуть мати загрозу для аборигенних риб, не зареєстровано. Всього у сигів зареєстровано 41 вид патогенних паразитів, але ми зупинились на найбільш небезпечних та поширених протозоозах, гельмінтозах та крустацеозах, які становлять загрозу для рибництва. Проти всіх згаданих інвазій існують розроблені санітарно-оздоровчі заходи та різноманітні біологічні та хімічні засоби профілактики та боротьби, спрямовані на їх попередження та знищення.

Однак, як свідчать дослідження багатьох науковців з різних країн світу, дуже часто зустрічаються зараження сигових відразу декількома захворюваннями одночасно. Так при дослідженнях європейського сига *Coregonus lavaretus* в озері Норсьо було виявлено *Trematoda rudolphi*, *Dibothriocephalus* spp., *Proteocephalus* sp., *Acanthocephala*, *Argulus coregoni*, *Salmincola* sp. нематода (Diesing, 1861). Найбільш поширеними паразитами сига були акантоцефали (екстенсивність інвазії складала 36%, за її інтенсивності 4,4 паразити на рибу, та *Proteocephalus*

sp. (екстенсивність інвазії складала 24%, при інтенсивності інвазії — 0,7) [23].

Дослідження паразитофауни сигових риб роду *Coregonus* з озера Баунта та Великого Капилюші Ципо-Ціпиканської системи (верхів'я р. Вітим) виявили, що видовий склад паразитофауни сигів представлено 25 видами. Найбільше видове різноманіття паразитофауни (20 видів) відмічали у баунтовського сига *C. baunti* — локального ендеміка озер Велике і Малі Капилюші; найменше (9 видів) мала сибірська ряпушка *C. sardinella* з оз. Баунт. Паразитофауна пиж'яна *C. pidschian* в оз. Великі Капилюші налічувала 17 видів, в оз. Баунт — 13 видів [24].

За дослідження американського сига (*Coregonus clupeaformis*), що мешкав у північних озерах Саскачевана, також виявлено цестоди (*Triaenophorus crassus*, *Proteocephalus longicollis*, *Cyathocephalus truncatus*), трематоди (*Diplostomum sp.*, *Posthodiplostomum minimum*, *Diplostoid metacercaria*, *Tylodelphys scheuring*, *Uvulifer ambloplitis*, *Ichthyocotylurus erraticus*), моногенії (*Discocotyle sagittata*), акантоцефали (*Acanthocephalus dirus*, *Echinorhynchus sp.*, *Neoechinorhynchus tumidus* au, *Pomphorhynchus bulbocolli*), нематоди (*Cystidicola farionis*, *Raphidascaris acus*), веслоногі рачки (*Salmincola extensus*, *Salmincola extumescens*) а також п'явка *Piscicola geometra* [25].

Також у карликового сига (*Prosopium coulteri*) у західній Монтані було виявлено 9 видів паразитів та 12 видів паразитів виділено з гірського сига (*Prosopium williamsoni*) у тому ж регіоні [26].

У Байкальського сига Чивиркуйської затоки озера Байкал було виділено 28 видів. Абсолютно домінуючою була цестода *Cyathocephalus truncatus* (екстенсивність інвазії 70,9%), субдомінантним видом був *Proteocephalus longicollis* (екстенсивність інвазії 42,8%), третім видом за поширенням був *Phyllodistomum umblae* (екстенсивність інвазії 30,4%). Також виділені *Diphyllbothrium dendriticum* (18,8%), *Diplostomum spathaceum* (13,4%) та акантоцефали переважно *Metechinorhynchus truttae* (10,2%) [27].

При дослідженні сигів *Coregonus lavaretus pidschian* та *C. l. pravdinellus* Телецького озера, що є найбільшою водоймою гірського Алтаю, було виявлено, що обидва види були заражені трьома видами гельмінтів: *Triaenophorus crassus* (Cestoda), *Proteocephalus sp.* (Cestoda) та *Discocotyle sagittata* (Monogenea) [28].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Швидкий ріст сигових риб, які створюють конкурентоспроможну харчову продукцію за один або два нагульних сезони при їх делікатесних гастрономічних перевагах та високій економічній рентабельності процесу вирощування, забезпечує безперечний пріоритет товарному сигівництву. Продукція сигових користується попитом й на зовнішньому ринку, що також є хорошим стимулом для удосконалювання біотехнічних розробок щодо розвитку різних методів культивування цих цінних риб. Однак за збільшення обсягів виробництва, перевезення риб з інших господарств та згущення посадок риб, виникають проблеми із захворюваннями різної етіології. У вищевикладеному матеріалі зібрано та описано основні паразитарні захворювання, які зустрічаються у сигових риб та наведено основні симптоми означених захворювань, що допоможе своєчасному їх виявленню.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гринжевський М. В. Аквакультура України. Львів : Вільна Україна, 1998. 364 с.
2. Новоселов А. П., Студенов И. И. Сиговодство как один из путей развития рыбного хозяйства в европейском секторе Арктики // Природные ресурсы и комплексное освоение прибрежных районов Арктической зоны : сб. науч. тр. Архангельск, 2015. С. 94—101.
3. Muchachev I. S., Gunin A. P. A review of the production of cultivated whitefishes in Urals and West Siberia // Archive Hydrobiol. 2002. Vol. 57, spec. iss. : Advanc. Limnol. P. 171—181.
4. Грициняк І. І., Мрук А. І., Захаренко Г. А. До питання доцільності вселення пеляді у рибогосподарські водойми України // Рибогосподарська наука України. 2007. № 2. С. 51—58.
5. Берг Л. С. Рыбы пресноводных вод СССР и сопредельных стран. Т. 1. Москва — Ленинград : АН СССР, 1948. 468 с.
6. Решетников А. И. Экология и систематика сиговых рыб. Москва : Наука, 1983. 301 с.
7. Решетников А. И., Мухачев И. С. Пелядь. Систематика, морфология, экология, продуктивность. Москва : Наука, 1989. 304 с.
8. Решетников Ю. С. О систематическом положении сиговых рыб // Зоологический журнал. 1975. Т. 54, вып. 11. С. 1656—1671.
9. Решетников Ю. С. Экология и систематика сиговых рыб. Москва : Наука, 1980. 301 с.
10. Решетников Ю. С. Современные проблемы изучения сиговых рыб // Вопросы ихтиологии. 1995. Т. 35, № 2. С. 156—174.
11. Мухачев И. С. Биотехника ускоренного выращивания товарной пеляди. Тюмень : ФГУИПП, 2003. 175 с.
12. Некрасов И. С. Морфофункциональные особенности сига-пыжьяна (*Coregonus lavaretus pidschian*) и хариусов (*Thymallus*) в разноширотных озерах Сибири с низкой антропогенной нагрузкой : дис. ... кандидата биол. наук. Тюмень, 2019. 175 с.
13. Ихтиология : краткий курс лекций для студентов II курса направления подготовки : 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» / сост. Поддубная И. В. Саратов : ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», 2016.
14. Атлас пресноводных рыб России / ред. Решетников Ю. С. Москва : Наука, 2002. С. 135—163.
15. Радченко Н. М. Паразиты сиговых рыб Кубенского озера // Четвертое Всесоюзное совещание по биологии и биотехнике разведения сиговых рыб : матер. докл. Тюмень, 1990. С. 136—138.
16. Ихтиопатология / Головина Н. А. и др. Москва : Мир, 2003. 448 с.
17. Давыдов О. Н., Темниханов Ю. Д. Болезни пресноводных рыб. Киев : Ветинформ, 2004. 544 с.
18. Грищенко Л. И., Акбаев М. Ш., Васильков Г. В. Болезни рыб и основы рыбоводства. Москва : Колос, 1999. 234 с.
19. Васильков Г. В. Паразитарные болезни рыб и санитарная оценка рыбной продукции. Москва : ВНИРО, 1999. 191 с.

20. Быховская-Павловская И. Е. Паразиты рыб. Руководство по изучению. Ленинград : Наука, 1985. 118 с.
21. Ихтиопатология / Байер О. Н. и др. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1977. 432 с.
22. Noga E. J. Fish Diseases: diagnosis and treatment. St. Louis : Mosby, 1995. 367 p.
23. Factors determining parasite abundance in European perch, *Perca fluviatilis*, European whitefish, *Coregonus lavaretus*, and Arctic charr, *Salvelinus alpinus*, in an oligotrophic lake, southern Norway / Olk T. R. et al. // Fauna Norvegica. 2020. Vol. 40. P. 109—129.
24. Паразитофауна сиговых рыб рода *Coregonus* из водоёмов Ципоципижанской системы (Забайкалье) / Пронин Н. М. и др. // Вопросы ихтиологии. 2015. Т. 55, № 5. С. 603—610.
25. Pietrock Michael, Hursky Olesya. Fish and ecosystem health as determined by parasite communities of lake whitefish (*Coregonus clupeaformis*) from Saskatchewan boreal lakes // Water Quality Research Journal of Canada. 2011. Vol. 46(3). P. 219—229.
26. Newell R., Canaris A. G. Parasites of the Pygmy Whitefish, *Prosopium coulteri* (Eigenmann and Eigenmann) and Mountain Whitefish *Prosopium williamsoni* (Girard) from Western Montana // Proceedings of the helminthological society. 1969. Vol. 36(2). P. 274—276.
27. Dugarov Zh. N., Pronin N. M. Baikal Whitefish *Coregonus baicalensis* Dybowski, 1874 Parasite Communities and Host Age // Biology Bulletin. 2010. Vol. 37, No. 6. P. 630—637.
28. Helminth community structure in sympatric pair of whitefish *Coregonus lavaretus* from Teletskoye Lake / Vlasenko P. et al. // Diseases, parasites & behavior : 14th International Symposium on the Biology and Management of Coregonid Fishes, 22–26 June, 2020, Jyväskylä, Finland : abstracts. Jyväskylä, 2020.

REFERENCES

1. Hrynzhewskiy, M. V. (1998). *Akvakultura Ukrainy*. Lviv: Vilna Ukraina.
2. Novoselov, A. P., & Studenov, I. I. (2015). Sigovodstvo kak odin iz putej razvitiya rybnogo hozjajstva v evropejskom sektore Arktiki. *Prirodnye resursy i kompleksnoe osvoenie pribrezhnyh rajonov Arkticheskoy zony: sb. nauch. tr. Arhangel'sk*, 94-101.
3. Muchachev, I. S., & Gunin, A. P. (2002). A review of the production of cultivated whitefishes in Urals and West Siberia. *Archive Hydrobiol*, 57, spec. iss.: *Advanc. Limnol.*, 171-181.
4. Hrytsyniak, I. I., Mruk, A. I., & Zakharenko, H. A. (2007). Do pytannia dotsilnosti vselennia peliadi u rybohospodarski vodoimy Ukrainy. *Rybohospodarska nauka Ukrainy*, 2, 51-58.
5. Reshetnikov, A. I., & Muhachev, I. S. (1989). *Peljad'. Sistematika, morfologija, jekologija, produktivnost'*. Moskva: Nauka.
6. Berg, L. S. (1948). *Ryby presnovodnyh vod SSSR i sopredel'nyh stran*. Vol. 1. Moskva — Leningrad: AN SSSR.
7. Reshetnikov, Ju. S. (1980). *Jekologija i sistematika sigovyh ryb*. Moskva: Nauka.

8. Reshetnikov, Ju. S. (1975). O sistematičeskom položennii sigovyh ryb. *Zoologičeskij zhurnal*, 54, 11, 1656-1671.
9. Reshetnikov, Ju. S. (1995). Sovremennye problemy izučennija sigovyh ryb. *Voprosy ihtiologii*, 35, 2, 156-174.
10. Muhachev I. S. (2003). *Biotehnika uskorenogo vyrashhivannja tovarnoj peljadi*. Tjumen': FGUIPP.
11. Nekrasov, I. S. (2019). Morfofunkcional'nye osobennosti siga-pyzh'jana (*Coregonus lavaretus pidschian*) i hariusov (*Thymallus*) v raznoširotnyh ozerah Sibiri s nizkoj antropogennoj nagruzkoj. *Candidate's thesis*. Tjumen', 2019. 175 s.
12. Poddubnaja, I. V. (Comp.). (2016). *Ihtiologija: kratkij kurs lekcij dlja studentov II kursa napravlenija podgotovki: 35.03.08 «Vodnye bioresursy i akvakul'tura»*. Saratov: Saratovskij GAU.
13. Reshetnikov, Ju. S. (Ed.). (2002). *Atlas presnovodnyh ryb Rossii*. Moskva: Nauka, 135-163.
14. Radchenko, N. M. (1990). Parazity sigovyh ryb Kubenskogo ozera. *Četvertoe Vsesojuznoe soveshhanie po biologii i biotehnike razvedennja sigovyh ryb: mater. dokl.* Tjumen', 136-138.
15. Golovina, N. A., et al. (2003). *Ihtiopatologija*. Moskva: Mir.
16. Davydov, O. N., & Temnihanov, Ju. D. (2004). *Bolezni presnovodnyh ryb*. Kiev: Vetininform.
17. Grishhenko, L. I., Akbaev, M. Sh., & Vasil'kov, G. V. (1999). *Bolezni ryb i osnovy rybovodstva*. Moskva: Kolos.
18. Vasil'kov, G. V. (1999). *Parazitarnye bolezni ryb i sanitarnaja ocenka rybnoj produkcii*. Moskva: VNIRO.
19. Byhovskaja-Pavlovskaja, I. E. (1985). *Parazity ryb. Rukovodstvo po izučennju*. Leningrad: Nauka.
20. Bauer, O. N., et al. (1977). *Ihtiopatologija*. Moskva: Legkaja i pishhevaja promyšlennost'.
21. Newell, R., & Albert, G. (1969). Canaris Parasites of the Pygmy Whitefish, *Prosopium coulteri* (Eigenmann and Eigenmann) and Mountain Whitefish *Prosopium williamsoni* (Girard) from Western Montana. *Proceedings of the helminthological society*, 36, 2, 274-276
22. Noga, E. J. (1995). *Fish Diseases: diagnosis and treatment*. St. Louis: Mosby.
23. Olk, T. R., et al. (2020). Factors determining parasite abundance in European perch, *Perca fluviatilis*, European whitefish, *Coregonus lavaretus*, and Arctic charr, *Salvelinus alpinus*, in an oligotrophic lake, southern Norway. *Fauna Norvegica*, 40, 109-129.
24. Pronin, N. M., et al. (2015). Parazitofauna sigovyh ryb roda *Coregonus* iz vodojomov Cipocipikanskoj sistemy (Zabajkal'e). *Voprosy ihtiologii*, 55(5), 603-610.
25. Pietrock, Michael, & Hursky, Olesya. (2011). Fish and ecosystem health as determined by parasite communities of lake whitefish (*Coregonus clupeaformis*) from Saskatchewan boreal lakes. *Water Quality Research Journal of Canada*, 46(3), 219-229.

26. Newell, R., & Canaris, A. G. (1969). Parasites of the Pygmy Whitefish, *Prosopium coulteri* (Eigenmann and Eigenmann) and Mountain Whitefish *Prosopium williamsoni* (Girard) from Western Montana. *Proceedings of the helminthological society*, 36(2), 274-276.
27. Dugarov, Zh. N., & Pronin, N. M. (2010). Baikal Whitefish *Coregonus baicalensis* Dybowski, 1874 Parasite Communities and Host Age. *Biology Bulletin*, 37(6), 630-637.
28. Vlasenko, P., et al. (2020). Helminth community structure in sympatric pair of whitefish *Coregonus lavaretus* from Teletskoye Lake. *Diseases, parasites & behavior: 14th International Symposium on the Biology and Management of Coregonid Fishes, 22–26 June, 2020, Jyväskylä, Finland: abstracts*. Jyväskylä, 2020.

ВИКОРИСТАННЯ АНТИГЕЛЬМІНТНОГО ПРЕПАРАТУ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ПАРАЗИТИЧНИМИ НЕМАТОДАМИ МОЛЮСКА ГЕЛІКСА МАЛОГО СІРОГО (*HELIX ASPERSA* (MÜLLER))

Н. В. Шмиголь, n.moiseeva114@gmail.com, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

Н. Б. Єсіпова, yesipova.natalia@gmail.com, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

Т. С. Шарамок, sharamok@i.ua, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

Мета. Оцінити показники зараження нематодами молюска *Helix aspersa* Muller, експериментальним шляхом виявити оптимальну концентрацію антигельмінтних препаратів та охарактеризувати ефективність їх дії.

Методика. Експериментальна робота тривала 15 діб. Результати експериментів оцінювали за наступними показниками: екстенсивність та інтенсивність інвазії паразитами; виживання молюсків (% від загальної кількості особин, що використовувались у експерименті); активність живлення оцінювали за відносною кількістю корму, який з'їдали молюски за добу, і виражали у%.

Вплив різних концентрацій альбендазолу на структурний стан тканин і органів молюсків оцінювали за гістологічними дослідженнями. Відібрані проби фіксували у 4%-вому розчині формаліну, потім виготовляли гістологічні зрізи з подальшим фарбуванням гематоксилін-еозином. Аналіз гістологічних препаратів здійснювався за допомогою світлового мікроскопа при збільшенні об'єктиву 8х та 40х і фотографічної цифрової камери «Scienclab T500 5.17 М».

Результати. За результатами експериментів кращі показники антигельмінтної дії та виживання равликів отримані при використанні альбендазолу при додаванні його в комбікорм у кількості 0,02% від живої маси молюсків. При цій концентрації відмічалося повне знищення статевозрілих особин *Alloioneta appendiculatum*, а також зниження зараженості равликів яйцями гельмінтів зі 100 до 10%. Дослідження гістоструктури тканин та органів молюсків показали, що використання альбендазолу в концентраціях 0,01 та 0,02% не викликало помітних патологічних змін у м'язах та мозку молюсків. Проте у клітинах епітелію кишечника та печінки відмічались певні структурні порушення, які виявлялись у вакуолізації цитоплазми, руйнуванні клітинних оболонок, лізисі і пікнозі ядер. Відносна кількість таких клітин з патологією становила близько 10–15% за використання 0,01% альбендазолу, та збільшувалась до 30–50% при використанні альбендазолу в кількості 0,02% від живої маси равликів. При застосуванні препарату трематозолу не було виявлено помітного антигельмінтного ефекту.

Наукова новизна. Вперше експериментальним шляхом визначений лікувальний ефект і оптимальна схема дегельмінтизації молюсків *Helix aspersa* при зараженні паразитичною нематодою *Alloioneta appendiculatum*.

Практична значимість. Отримані результати являють інтерес для підприємств, які займаються вирощуванням молюсків.

Ключові слова: молюск *Helix aspersa* Muller, нематодоз, екстенсивність та інтенсивність інвазії, антигельмінтні препарати, морфо-гістологічні показники.

USE OF AN ANTHELMINTIC TO CONTROL PARASITIC NEMATODES OF *HELIX ASPERSA* (MÜLLER)

N. Shmyhol, n.moiseeva114@gmail.com, Dnipro National University named after Oles Honchar, Dnipro

N. Yesipova, yesipova.natalia@gmail.com, Dnipro National University named after Oles Honchar, Dnipro

T. Sharamok, sharamok@i.ua, Dnipro National University named after Oles Honchar, Dnipro

Purpose. To estimate the parameters of infestation of *Helix aspersa* by nematodes, experimentally identify the optimal concentration of anti-helminthic drugs and assess their effectiveness.

Methodology. The experimental work on the development of therapeutic measures against nematodes of *Helix aspersa* (Müller) lasted for 15 days. The results of the experiments were evaluated by the following indicators: extensiveness and intensity of parasite infestation; survival of mollusks,%. Feeding activity was assessed by the relative amount of feed the mollusks ate per day. At the beginning of the experiments, histological examinations of mollusk tissues were performed. Selected samples were preserved in 4% formalin solution and then histological sections were made, which were than frozen with subsequent staining with hematoxylin-eosin. Histological analysis was performed using a light microscope at 8x and 40x magnification and a Sciencelab T500 5.17 M photographic digital camera. Assessment of changes in the histostructure was performed visually and using morformetric analysis on mollusk intestine samples. Two variants of the experiment with albendazole (variant № 2 and 3) and control were evaluated.

Findings. According to the results of the experiments, the best indicators of the anthelmintic effect and survival of snails were obtained using albendazole added to compound feed at a concentration of 0.02% of the live weight of mollusks. At this concentration, complete destruction of mature individuals of *Alloionema appendiculatum* was noted, as well as a decrease in the infection of snails with helminth eggs from 100% to 10%. The study of the histostructure of tissues and organs of mollusks showed that the use of albendazole at concentrations of 0.01% and 0.02% did not cause noticeable pathological changes in the muscles and brain of mollusks. However, certain structural abnormalities were observed in the cells of the intestinal and liver epithelium, which were detected as vacuolization of the cytoplasm, destruction of cell membranes, lysis and pycnosis of nuclei. The relative number of such cells with the pathology was about 10-15% when using 0.01% albendazole, and increased to 30-50% when using albendazole at a concentration of 0.02% of the live weight of snails. No noticeable anthelmintic effect was found when using trematозole.

Scientific novelty. For the first time, the therapeutic effect and the optimal scheme of deworming of mollusks *Helix aspersa* infected with the parasitic nematode *Alloionema appendiculatum* were determined experimentally.

Practical significance. The obtained results are of interest to enterprises engaged in snail farming.

Key words: mollusk *Helix aspersa* Muller, nematodosis, extensiveness and intensity of invasion, anthelmintic drugs, morpho-histological parameters.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИГЕЛЬМИНТНОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ БОРЬБЫ С ПАРАЗИТИЧЕСКИМИ НЕМАТОДАМИ МОЛЛЮСКА ГЕЛІКСА МАЛОГО СЕРОГО (*HELIX ASPERSA* (MÜLLER))

Н. В. Шмыголь, n.moiseeva114@gmail.com, Днепропетровский национальный университет им. Олеса Гончара, г. Днепр

Н. Б. Есипова, yesipova.natalia@gmail.com, Днепропетровский национальный университет им. Олеса Гончара, г. Днепр

Т. С. Шарамок, sharamok@i.ua, Дніпровський національний університет
ім. Олеся Гончара, г. Дніпр

Цель. Исследовать показатели заражения нематодами моллюска *Helix aspersa* Muller, экспериментальным путем выявить оптимальную концентрацию антигельминтных препаратов и оценить эффективность их действия.

Методика. Экспериментальная работа продолжалась 15 суток. Результаты экспериментов оценивали по следующим показателям: экстенсивность и интенсивность инвазии паразитами; выживание моллюсков (% от общего количества особей, которые использовались в эксперименте; активность питания оценивали по относительному количеству корма, который съедали моллюски за сутки, и выражали в %.

Влияние различных концентраций альбендазола на структурное состояние тканей и органов моллюсков оценивали по результатам гистологических исследований. Отобранные пробы фиксировали в 4%-ном растворе формалина, затем изготавливали гистологические срезы с последующим окрашиванием гематоксилин-эозином.

Результаты. По результатам экспериментов лучшие показатели антигельминтного действия и выживания улиток получены при использовании альбендазола при добавлении его в комбикорм в количестве 0,02% от живой массы моллюсков. При этой концентрации отмечалось полное уничтожение половозрелых особей *Alloioneta appendiculatum*, а также снижение зараженности улиток яйцами гельминтов со 100 до 10%. Исследование гистоструктуры тканей и органов моллюсков показало, что использование альбендазола в концентрациях 0,01 и 0,02% не вызывало заметных патологических изменений в мышцах и мозге моллюсков. Однако в клетках эпителия кишечника и печени отмечались определенные структурные нарушения, которые проявлялись в вакуолизации цитоплазмы, разрушении клеточных оболочек, лизисе и пикнозе ядер. Относительное количество таких клеток с патологией составило около 10–15% при использовании 0,01% альбендазола, и увеличивалось до 30–50% при использовании альбендазола в количестве 0,02% от живой массы улиток. При использовании препарата трематозола не было обнаружено заметного антигельминтного эффекта.

Научная новизна. Впервые экспериментальным путем определен лечебный эффект и оптимальная схема дегельминтизации моллюсков *Helix aspersa* при заражении паразитической нематодой *Alloioneta appendiculatum*.

Практическая значимость. Полученные результаты представляют интерес для предприятий, занимающихся выращиванием моллюсков.

Ключевые слова: моллюск *Helix aspersa* Muller, нематодоз, экстенсивность и интенсивность инвазии, антигельминтные препараты, морфо-гистологические показатели.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Щорічно в світі споживається більше 150 тис. тонн равликів, і попит росте з кожним роком. При цьому багато підприємців зіткнулися з проблемою зараження равликів нематодами, що негативно впливає на життєдіяльність моллюсків, їхній ріст, розмноження та часто призводить до їхньої загибелі [1]. Це дає негативні наслідки для підприємств, а в деяких випадках може становити загрозу для життя людини.

Найбільш поширеними паразитуючими нематодами у *Helix aspersa* при штучному вирощуванні є вид *Alloioneta appendiculatum* та представники родини *Daubayliidae*. Паразити негативно впливають на репродуктивну функцію моллюсків, знижують продуктивність та викликають смертність.

Нематода *Daubaylia bonaerensis* була виявлена у *Helix aspersa* з фермерських господарств Аргентини. На сьогодні описано вісім видів нематод роду *Daubaylia* — сім у катушкових равликів і один вид у п'явці, знайдений у ставу, де сталося зараження равликів. У дорослих равликів *Helix aspersa* нематода паразитує в гермафродитних протоках [2].

При паразитологічному дослідженні фермерських господарств Франції (20 ферм), що займались вирощуванням *Helix aspersa*, встановлено, що найчастіше зараження відбувалося нематодами *Ailoionema appendiculatum*. Цей вид був значною мірою поширений серед молоді та дорослих равликів, з екстенсивністю зараження від 49 до 60%. У дорослих особин на стадії розмноження частка зараження коливалася від 14 до 61%. Присутність нематод негативно позначалася на виробничих показниках [5].

Ailoionema appendiculatum вперше був знайдений і описаний у 1859 р. [7]. Його наявність була підтверджена в Європі та Австралії [3, 6, 8]. У Словенії цей вид був знайдений ще в 1970-х рр. [4]. Пізніше нематода була виявлена в ґрунтах виноградника в Приморському районі Словенії. Встановлено, що нематоли живуть у всіх органах порожнини тіла, а також у м'язах ноги. Механізми інвазії різні, починаючи з проникнення через стінку тіла (молодь нематод, що знаходиться в ґрунті), до зараження равликів під час спарювання.

Зараженість моллюсків паразитами була визнана однією з головних причин низької продуктивності моллюсків при їх вирощуванні [5].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Науковий та практичний інтерес являє дослідження методів лікування равликів від нематод. Важливо зберегти якість сировини як харчового товару і при цьому повністю позбутися як від дорослих особин червів, так і від їхніх яєць. Вирішення даних питань дозволить ефективно боротися з паразитами, уникнути великих збитків для підприємств та гарантувати безпечність споживання равликів людиною.

Паразитарний вплив *Ailoionema appendiculatum*, як найбільш розповсюдженого виду нематод, на моллюсків залишається слабо вивченим. Достовірної інформації про методи лікування моллюсків від цих паразитів теж не виявлено. Враховуючи збитки фермерських господарств від паразитів, подальші дослідження в цьому напрямку необхідні.

У зв'язку з цим, метою представленої роботи було: оцінка показників зараження нематодами моллюска *Helix aspersa*, проведення його лікування експериментальним шляхом, виявлення оптимальної концентрації антигельмінтних препаратів та оцінка ефективності їхньої дії.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Об'єктом дослідження були інвазовані нематодами равлики *Helix aspersa* Müller у віці 2-х років (210 екземплярів), які були завезені з фермерського господарства, розташованого на Заході України.

Експериментальна робота проходила в науково-дослідній лабораторії гідробіології, іхтіології та радіобіології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро). Вид паразитичної нематоди — *Alloionema appendiculatum* Schneider визначений в Інституті зоології імені Шмалгаузену (м. Київ).

Експериментальна робота щодо розробки лікувальних заходів проти нематодозу равликів *Helix aspersa* (Müller) тривала 15 діб. Молюски були розсаджені у контейнери по 10 екз. Кожний варіант дослідів проводився в 3-разових повторностях.

На початок дослідів молюски візуально мали здоровий вигляд, активно рухалися, реагували на корм, воду, мали здоровий панцир.

Для досліджень були обрані антигельмінтні препарати альбендазол та трематозол, що використовуються в сучасній ветеринарії. Обидва препарати доступні і відносно недороговартісні. В експериментах використовували препарат «Альбендазол» у вигляді порошку — 10%, 1 г препарату містить 100 мг альбендазолу. Препарат «Трематозол» — емульсія, 1 мл (мг) містить оксиклозанід — 95,0 мг; пірантелупамоат — 200,0 мг.

Схема проведення експериментів була наступною:

Варіант № 1 — до добової дози корму додавали альбендазол у кількості 0,01% від загальної живої маси молюсків (без урахування маси черепашки). Препарат додавали через 1 добу трикратно. Добова доза корму становила 3 г.

Варіант № 2 — до добової дози корму додавали альбендазол у кількості 0,02% від загальної живої маси молюсків (без урахування маси черепашки). Препарат додавали через 1 добу трикратно.

Варіант № 3 — до добової порції води додавали трематозол в кількості 0,06 мл. Добова доза комбікорму становила 3 г. Частота проведення — через 1 добу трикратно.

Контрольний варіант — молюсків годували комбікормом (3 г/добу) та давали питну воду. Лікувальні заходи не проводили.

У всіх варіантах дослідження фіксували активність поїдання корму, виживання молюсків та проводили щоденно паразитологічні дослідження.

У молюсків визначали індивідуальну середню масу ($M \pm m$) з черепашкою та без черепашки (жива маса). Паразитологічні дослідження проводили методом повного паразитологічного розтину [9]: відбирали слиз з поверхні м'язової частини тіла, фекалії, м'язи ноги, внутрішні органи (печінка, гонади, кишечник), які піддавалися мікроскопії.

Екстенсивність інвазії (EI) визначали як відношення інвазованих до неінвазованих особин, виражене у відсотках. Інтенсивність інвазії (II) — середня кількість паразитів на одного молюска.

Для оцінки впливу антигельмінтних препаратів на структуру тканин і органів молюсків проводили гістологічні дослідження. Відібрані проби фіксувались у 4%-ному розчині формаліну і далі виготовляли гістологічні зрізи з подальшим фарбуванням гематоксилін-еозином [12]. Аналіз гістологічних препаратів

здійснювався за допомогою світлового мікроскопа при збільшенні об'єктиву $8\times$ та $40\times$ і фотографічної цифрової камери «Sciencelab T500 5.17 М».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

При паразитологічному обстеженні у молюсків та у їхніх фекаліях були виявлені нематоди *Alloionema appendiculatum* Schneider на різних стадіях розвитку та їхні яйця. В печінці, гемолімфі, статевих органах равликів було знайдено у великій кількості яйця нематод (рис. 1), а в фекаліях — власне нематоди та їхні яйця (рис. 2).

Рис. 1. Нематода в фекаліях молюска

Fig. 1. Nematodes in mollusk's excrements

Рис. 2. Яйця нематод в гонаді молюска

Fig 2. Nematode eggs in mollusk's gonad

Початкові показники зараження молюсків личинками нематод становили: EI — 86%; II — $4,3 \pm 0,26$ екз. на 1 молюска. Також у 100% молюсків були присутні в

масовій кількості яйця нематод, які потрапили у тканини, очевидно, з гемолімфи.

У фекаліях молюсків були виявлені личинки і статевозрілі нематоди у кількості від 25 до 65 екз. Також у фекаліях були присутні у великій кількості (понад 100 екз. у полі зору мікроскопа, 8^х) яйця нематод.

У таблиці 1 наведені результати досліджень, які були отримані одразу після закінчення лікувального курсу.

Таблиця 1. Показники зараження молюсків *Helix aspersa* Müller після проведення лікувальних обробок антигельмінтними препаратами

Table 1. Indicators of mollusks *Helix aspersa* Müller invagination after treatment with anthelmintic drugs

Варіант досліджу / Version of experiment	Умови проведення експерименту / Conditions of experiment	Частота проведення / Frequency	Зараженість нематодами / Invermation with nematode		Зараженість яйцями нематод / Invermation with nematode eggs	
			%	екз. у пробі / spc. in the sample	%	екз. у пробі / spc. in the sample
1	Альбендазол (0,01% від живої маси*) з кормом / Albendazole (0.01% of live weight *) with food	Трикратно, через добу / Three times a day	10	1–2	15	10–30
2	Альбендазол (0,02% від живої маси*) з кормом / Albendazole (0.02% of live weight *) with food	Трикратно, через добу / Three times a day	–	–	10	10–20
3	Трематозол (0,06 мл/добу) з водою / Trematozole (0.06 ml / day) with water	Трикратно, через добу / Three times a day	90	30–50	90	масово / total
Кон- троль / Control	Лікувальні препарати не використовувались / Without drugs	–	100	більше 50 / more than 50	100	масово / total

Примітка. * — маса молюска без черепашки.

Note. * — mollusk mass without shells.

Використання альбендазолу у кількості 0,01% від загальної маси молюсків (варіант № 1), показав непоганий антигельмінтний ефект, але повного позбавлення від паразитів не відбулося.

При використанні альбендазолу з кормом в кількості 0,02% від живої маси (варіант № 2) молюски повністю позбавились нематод. Інвазованість яйцями нематод знизилась зі 100 до 10%. У фекаліях молюсків нематоди також були відсутні. Виживання слимаків у цьому варіанті досягало 90%. Активність живлення під час експерименту дещо знизилась. Очевидно, наявність альбендазолу у кормі не стимулювала апетит у равликів. Різниця у масі равликів

між дослідом і контролем не перевищувала 10–15%, і після лікування швидко нарощувалась.

Застосування трематозолу при додаванні його у воду (варіант № 3) не було ефективним. Показники зараження личинками нематодами та їхніми яйцями залишались на високому рівні (90%), хоча у порівнянні з контрольним варіантом були нижче на 10%. Показники виживання равликів становили лише 50%.

У контрольному варіанті протягом експерименту зараженість нематодами зростала: EI досягла 100%, II зросла до $12,3 \pm 0,97$ екз./моллюска. Висока інвазованість паразитами спричинила загибель моллюсків. Показник виживання у контрольному варіанті становив лише 30%.

Найбільші показники виживання моллюсків були відмічені при використанні альбендазолу в кількості 0,01 та 0,02%, і становили 90% (табл. 2). У порівнянні з контролем цей показник був перевищений утричі.

Таблиця 2. Виживання та активність живлення моллюсків *Helix aspersa* Müller після проведення лікувальних обробок антигельмінтними препаратами

Table 2. Survival and feeding activity of *Helix aspersa* Müller mollusks after anthelmintic treatments

Варіант дос- ліду / Version of experiment	Умови проведення експерименту / Conditions of experiment	Виживання, % / Survival rate, %	Активність жив- лення, % / Feeding activity, %
1	Альбендазол (0,01% живої маси*) / Albendazole (0.01% of live weight *)	90	54
2	Альбендазол (0,02% живої маси*) / Albendazole (0.02% of live weight *)	90	50
3	Трематозол (0,06 мл/добу) / Trematozole (0.06 ml / day)	50	60
Контроль / Контроль	Лікувальні препарати не використовувались / Without drugs	30	54

Примітка. * — маса моллюска без черепашки.

Note. * — mollusk mass without shells.

Для оцінки впливу альбендазолу різних концентрацій на фізіологічний стан моллюсків досліджували гістоструктуру печінки, кишечника і м'язів у дослідних та контрольних особин.

У контрольному варіанті структура печінки виглядала щільною. Добре проглядалися печінкові частки. Гепатоцити в основному цілісні, правильної полігональної форми. Клітинна оболонка не порушена. Ядра розміщувалися переважно у центральному положенні і мали цілісну оболонку. У цитоплазмі жирові вакуолі займали візуально близько 40% площі клітини (рис. 3). Проте 8–10% клітин мали певні порушення (вакуолізація цитоплазми, зміщення ядра до периферії, деформація оболонки, лізис ядра). Такі клітини з патологією розташовувалися зонально. Це може бути пов'язано як з тимчасовою локалізацією у моллюсків паразитарних нематод, так і їх токсичною дією.

Рис. 3. Гістоструктура печінки молюсків у дослідних та контрольному варіантах: А — дослід 1, Б — дослід 3, В — контроль

Fig 3. Mollusk liver histostructure in experimental and control versions: A - experiment 1, B - experiment 3, B - control

У дослідному варіанті з використанням 0,01% альбендазолу спостерігалася вакуолізація гепатоцитів. Збільшилася кількість деформованих клітин. Замість полігональної форми вони стали овально витягнутими. На вигляд тканина печінки втратила щільну консистенцію. На препараті з'явилися порушені печінкові частки. Відмічено ексцентричність ядер і явища каріолізу (близько 10–15% від загальної кількості клітин у п.з. мікроскопа).

При збільшенні дози альбендазолу до 0,02% спостерігалася збільшення відносної кількості гепатоцитів з патологічними явищами (до 30–50% від загальної кількості клітин). Помічено руйнування печінкових часточок. Структура тканини стала пухкою. З'явилися ділянки із заміщенням печінкової тканини на сполучну тканину. Серед патологій найчастіше зустрічалися: руйнування клітинної оболонки, некротичні явища, каріолізис та каріопікноз, інтенсивна вакуолізація цитоплазми.

У всіх варіантах дослідів будь-яких помітних змін у структурі м'язової тканини не спостерігалось (рис. 4).

Відмічено лише невелике збільшення кількості залозистих клітин, які пронизують м'язові волокна, у першому варіанті та масове збільшення їх у другому варіанті дослідів.

У дослідних зразках також відзначалися невеликий рівень вакуолізації та ріст сполучної тканини. Вигляд клітин та ядер у нормі, лізису та розривів оболонок тканин не спостерігалось.

Рис. 4. Гістоструктура м'язів молюсків у дослідних та контрольному варіантах: А — дослід 1, Б — дослід 3, В — контроль

Fig. 4. Mollusc muscle histostructure in experimental and control versions: A - experiment 1, Б - experiment 3, В - control

У структурі кишечника равликів контрольного варіанту (рис. 5, В) видно, що архітектура тканини цілісна, війчастий епітелій щільний, клітинні оболонки цілісні.

На препаратах кишечника молюсків першого варіанту, яким додавали в корм 0,01% альбендазолу, спостерігалось порушення структури війчастого епітелію, зменшувалася кількість крипт та збільшилася відстань між ними, що свідчить про пригнічення функціональної активності епітелію кишечника. В епітеліальних клітинах відмічалось зміщення ядра до периферії, деформація клітинної оболонки, явища лізису ядер. Таких клітин на препаратах від 5 до 10% від загальної кількості клітин у полі зору мікроскопа.

У другому варіанті досліді, при збільшенні концентрації альбендазолу до 0,02%, відмічалось зменшення, а в деяких місцях — повне руйнування крипт. На препаратах до 20% епітеліальних клітин у стані некрозу — порушена клітинна оболонка, лізис ядра.

Виявлено достовірну різницю між цитометричними показниками в контрольному та дослідних варіантах (табл. 3). Так, довжина ворсинок кишкового епітелію у варіанті № 1 та варіанті № 2 була більшою на 33,9 та 26,4% відповідно порівняно з контролем.

Рис. 5. Гістоструктура кишечника молюсків у дослідних та контрольному варіантах: А — дослід 1, Б — дослід 3, В — контроль

Fig. 5. The intestinal histostructure of mollusks in experimental and control variants: A - experiment 1, Б - experiment 3, В - control

Таблиця 3. Довжина ворсинок кишечника молюска *Helix aspersa*

Table 3. The length of the villi of the intestine of the mollusk *Helix aspersa*

Варіанти дослід / Version of experiment	$M \pm m$, мкм $n=100$ / $M \pm m$, мкм $n=100$	δ
Варіант № 1 / Version No 1	$32,4 \pm 0,5^*$	2,5
Варіант № 2 / Version No 2	$30,6 \pm 0,2^*$	2,4
Контроль / Control	$24,2 \pm 0,1^*$	1,9

Примітка. * — різниця між показниками достовірна при $p \leq 0,05$.

Note. * — the difference between the indicators is significant at $p \leq 0,05$.

Відносна кількість клітин з патологією становила близько 10–15% при застосуванні 0,01% альбендазолу, та збільшувалась до 30–50% — при використанні 0,02% альбендазолу (табл. 4).

Таким чином, за результатами експериментів кращі показники антигельмінтної дії та виживання равликів отримані при використанні альбендазолу за додавання його в комбікорм у кількості 0,02% від живої маси молюсків. Застосування подвійної дози альбендазолу має посилений лікувальний ефект при використанні препарату трикратно через одну добу. Даний спосіб є надійним та дешевим у лікуванні виноградного равлика при нематодозах.

Таблиця 4. Відносна кількість клітин з патологічними явищами у молюсків при різних концентраціях альбендазолу, %

Table 4. The relative number of cells with pathological phenomena in mollusks at different concentrations of albendazole, %

Варіанти дослідів / Version of experiment	Дослідні тканини / Дослідні тканини		
	Епітелій кишечника / Intestinal epithelium	Печінка / Liver	М'язи / Muscles
Варіант № 1 (0,01% альбендазолу) / Version No 1 (Albendazole 0.01%)	5–10	10–15	Одиничні / One-time
Варіант № 2 (0,02% альбендазолу) / Version No 2 (Albendazole 0.02%)	До 20	30–50	Одиничні / One-time
Контроль / Control	Одиничні / One-time	8–10	Одиничні / One-time

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Аналіз наукової літератури показав, що незважаючи на довготривалий закордонний досвід штучного розведення молюсків *Helix aspersa*, відомості щодо паразитарних хвороб та їх лікування обмежені. Серед паразитарних нематод у молюсків при штучному розведенні найбільш розповсюджена *Alloionema appendiculatum* Schneider, але особливості зараження молюсків недостатньо вивчені, а інформація щодо лікування відсутня.

Результати проведених експериментальних досліджень показали, що додавання альбендазолу в корм у кількості 0,01% від загальної маси молюсків має непоганий антигельмінтний ефект, проте повного позбавлення від паразитів не відбулося. При збільшенні концентрації альбендазолу до 0,02% відмічалось повне знищення дорослих особин нематод і зниження зараженості їх яйцями зі 100% до 10%. Використання антигельмінтного препарату трематозолу з питною водою в кількості 0,06 мл/добу не призвело до будь-якого помітного антигельмінтного ефекту.

Активність живлення молюсків у дослідних та контрольному варіантах суттєво не відрізнялась і коливалась у межах 50–60%. Найбільші показники виживання молюсків були відмічені при використанні альбендазолу з кормом в кількості 0,01 та 0,02% від живої маси молюсків і становили 90%. У порівнянні з контролем цей показник був вищим утричі.

Дослідження гістоструктури тканин та органів молюсків показали, що використання альбендазолу в якості лікувального препарату проти нематод в концентраціях 0,01 та 0,02% не викликало помітних патологічних змін у м'язах молюсків. Проте у клітинах епітелію кишечника та печінки відмічались певні патологічні зміни, які виявлялись у вакуолізації цитоплазми, порушенні структурної будови органів, руйнуванні клітинних оболонок, лізисі ядер. Кількість таких клітин з патологічними явищами коливалась від 30 до 50%.

ЛІТЕРАТУРА

1. Snail farming: a survey of breeding management, hygiene and parasitism of the garden snail, *Helix Aspersa* Muller / Cabaret J. et al. // Journal of Molluscan Studies. 1988. Vol. 54, № 2. P. 209—214.
2. Camino B., Gomzalez S. *Daubaylia n. sp. (Nematoda, Daubayliidae)*, a parasite of the snail *Helix aspersa* (Müller) (Mollusca, Pulmonata, Helicidae) from Argentina // Studi Trent. Sci. Nat. 2011. P. 29—32.
3. Baylis H., Daubney R. Report on the parasitic nematodes in the collection of the Zoological Survey of India // Memorial Indian Museum. 1922. № 7. P. 263—347.
4. Žiga L., Jenna L., Trdan S. Massive occurrence and identification of the nematode *Alloionema appendiculatum* Schneider (*Rhabditida: Alloionematidae*) found in Arionidae slugs in Slovenia. // Acta agriculturae Slovenica. 2010. № 95-1/ P. 43—49.
5. Cabaret J., Morand S. Single and dual infection of the land snail *Helix aspersa* with *Muellerius capillaris* and *Alloionema appendiculatum* (*Nematoda*) // J. Parasitol. 1990. № 76. P. 579—580.
6. Charwat S., Davies K. A nematode isolate for biocontrol of pest snails in south Australia // Nematologica. 1998. № 44. P. 469—470.
7. Morand S., Wilson M. J., Glen D. M. Nematodes (*Nematoda*) Parasitic in Terrestrial Gastropods. Natural Enemies of Terrestrial Molluscs. Wallingford, 2004. P. 644.
8. The role of parasite release in invasion of the USA by European slugs / Ross J. et al. // Biological Invasions. 2009.
9. Löw P., Molnár K., Kriska G. Atlas of Animal Anatomy and Histology. 2016. P. 49—77. ISBN 978-3-319-25172-1.
10. Миносян В., Ивашев М., Сергиенко А. В. Фармакодинамика альбендазола // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 10. С. 77—78.
11. Walker S. Trends and Changes in Drug Research and Development // Springer Science & Business Media. 2012. P. 109.
12. Lillie R. Histopathologic Technic and Practical Histochemistry. New York : McGraw-Hill book, 1965.

REFERENCES

1. Cabaret J., Morand S., Aubert, C., & Yvore P. (1988). Snail farming: a survey of breeding management, hygiene and parasitism of the garden snail, *Helix Aspersa* Muller. *Journal of Molluscan Studies*, 54(2), 209-214.
2. Camino, B., & Gomzalez, S. (2011). *Daubaylia n. sp. (Nematoda, Daubayliidae)*, a parasite of the snail *Helix aspersa* (Müller) (Mollusca, Pulmonata, Helicidae) from Argentina. *Studi Trent. Sci. Nat.*, 29-32.
3. Baylis, H., & Daubney, R. (1922). Report on the parasitic nematodes in the collection of the Zoological Survey of India. *Memorial Indian Museum*, 7, 263-347.
4. Žiga, L., Jenna, L., & Trdan, S. (2010). Massive occurrence and identification of the nematode *Alloionema appendiculatum* Schneider (*Rhabditida: Alloionematidae*) found in Arionidae slugs in Slovenia. *Acta agriculturae Slovenica*, 95-1, 43-49.
5. Cabaret, J., & Morand, S. (1990). Single and dual infection of the land snail *Helix aspersa* with *Muellerius capillaris* and *Alloionema appendiculatum* (*Nematoda*). *J. Parasitol.*, 76, 579-580.

6. Charwat, S., & Davies, K. (1998). A nematode isolate for biocontrol of pest snails in south *Australia*. *Nematologica*, 44, 469-470.
7. Morand, S., Wilson, M. J., & Glen, D. M. (2004). Nematodes (*Nematoda*) Parasitic in Terrestrial Gastropods. *Natural Enemies of Terrestrial Molluscs*. Wallingford, 644.
8. Ross, J., Ivanova, E., Severns, P., & Wilson, M. (2009). The role of parasite release in invasion of the USA by European slugs. *Biological Invasions*, 4.
9. Löw, P., Molnár, K., & Kriska, G. (2016). *Atlas of Animal Anatomy and Histology*. ISBN 978-3-319-25172-1.
10. Minosyan, B., Ivashev, M., & Sergienko, A.V. (2014). Farmakodinamika al'bendazola. *Sovremennye naukoemkie tekhnologii*, 10, 77-78.
11. Walker, S. (2012). *Trends and Changes in Drug Research and Development*. [S. l.]: Springer Science & Business Media.
12. Lillie, R. (1965). *Histopathologic Technic and Practical Histochemistry*. New York McGraw-Hill book.

FISHERIES SCIENCE OF UKRAINE

“Fisheries Science of Ukraine” — a scientific journal, has been published in Ukraine since 2007. “Fisheries Science of Ukraine” included in the List of Specialized Publications of Ukraine, which can be used for publishing results of doctor’s and candidate’s thesis (biological and agricultural subject specialism – 091, 207), recertification of 17.03.2020 (decision of Ministry of Education and Science of Ukraine №409)

Founder and publisher of the journal — Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

State registration certificate KB № 20934-10734 PR of 18.08.2014

EDITOR-IN-CHIEF

Natalia Matvienko, Doctor of Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Ichthyopathology, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF

Ihor Hrytsyniak, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Academician of the NAAS of Ukraine, Director, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Natalia Kolesnyk, Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of International Scientific and Technical Cooperation and Intellectual Property, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

EDITORIAL BOARD

BIOLOGY

Daniel Patrick, Doctor of Biological Sciences, Head of Biology Department Laboratories of the Pyrenees and Landes, FRENCH REPUBLIC

Ihor Buzevych, Doctor of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Leonid Buchatskyi, Doctor of Biological Sciences, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Leading Research Scientist of the Laboratory of Biotechnologies in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Oleksandr Didenko, Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Department of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Vasyl Sondak, Doctor of Biological Sciences, Head of the Water Bioresources Department, National University of Water and Environmental Engineering, UKRAINE

Yuriy Rud’, Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Bio-technology in Aquaculture, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Oleksandr Potrokhov, Doctor of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Biology of reproduction of fish, Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, UKRAINE

Pavlo Kutishchev, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Aquatic Bioresources and Aquaculture, Kherson State Agricultural University, UKRAINE

Liudmyla Dragan, Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Laboratory of Ecological Studies Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Kruzhilina Svetlana, Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist, Head of the section of Study Reservoirs Bioresources, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Oleh Marenkov, Candidate of Biological Sciences, Head of Department of General Biology and Water Bioresources, Oles Honchar Dnipro National University,

UKRAINE

AQUATIC BIORESOURCES & AQUACULTURE

Boris Gomelsky, Doctor of Biological Sciences, Professor, Kentucky State University, UNITED STATES OF AMERICA

XU Pao, Doctor, Professor, Director of Freshwater Fisheries Research Center, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Jedrzey Krupinski, Doctor of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director, National Research Institute of Animal Production, POLAND

Gautam V. Zodape, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Zoology of Shivaji University Kolhapur, REPUBLIC OF INDIA

Oleksandr Tretiak, Doctor of Agricultural Sciences, Senior Research Scientist, Deputy Director in scientific works, Institute of Fisheries of the NAAS, UKRAINE

Vitaliy Bekh, Doctor of Agricultural Sciences, Aquaculture Department, National University of Life and Environmental Sciences, UKRAINE

Oleksandr Kostenko, Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Veterinary Medicine and Zootechnics Department, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, UKRAINE

Tetiana Sharamok, Candidate of Agricultural Sciences, Assistant professor in the Department of General Biology and Water Bioresources, Oles Honchar Dnipro National University, UKRAINE

Liudmyla Chepil, Candidate of Agricultural Sciences, Assistant professor in the Department of Animal Biology, National University of Life and Environmental Sciences, UKRAINE

Zsigmond Jeney, Doctor of Sciences, Honorary Professor of Pannon University, HUNGARY

Denys Breus, Candidate of Agricultural Sciences, Assistant professor in the Department of Ecology and Sustainable Development named after Professor Yu.V. Pilipenko, Kherson State Agrarian University, UKRAINE

SCIENTIFIC EDITORS OF SECTIONS

are staff employees of the Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine: **Natalia Tushnytska**, Candidate of Veterinary Sciences, Senior Research Scientist, Scientific Secretary of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yaroslav Tuchapskyi**, Candidate of Agricultural Sciences, Head of the Carp Breeding Laboratory of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Yuriy Zabytyvskyi**, Candidate of Biological Sciences, Senior Research Scientist of Section of Sturgeon of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Antonina Mruk**, Head of the Laboratory Salmonids Culture of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Tetiana Hryhorenko**, Candidate of Agricultural Sciences, Head of the Laboratory of Hydrobiology and Technology of Invertebrates Cultivation of the Institute of Fisheries of the NAAS; **Hanna Kurinenko**, PhD of Agricultural Sciences, Senior Research Scientist, Head of the Department of Fish Selection.

Editorial board of the Journal “Fisheries Science of Ukraine”: Institute of Fisheries NAAS, 135, Obukhivska St, Kiev-164, Ukraine, 03164; tel.: +38 097 700 77 25. <http://fsu.ua>, info@fsu.ua

Layout design: Natalia Kolesnik, Serhiy Shinkar, Yevheniy Arkhanhelskyi, Oleksandr Bezusyi; **Making-up:** Yevheniy Arkhanhelskyi, Maria Simon;

Literature editing: Tetiana Shvets; **Corrector:** Hanna Kovalchuk

Postal address:

Editorial board of the Journal "Fisheries Science of Ukraine",
Institute of Fisheries NAAS,
135, Obukhivska St, Kiev-164, Ukraine, 03164

Phone mobile: +38(094) 827-01-86

Web-site: <http://fsu.ua>

E-mail: fsu.journal@gmail.com